

bicunda favere videntur sententiæ *Cl. D. de Graef. de Organ. Mul. Gener. dicat* sc. etiam in homine ex ovario per tubam in uterum ova descendere. Coeterum quæ in utero apparuerunt, monstrare videntur, non usq; adeò omnia benè composita esse ibidem in fine puerperij: nisi fortè in puerperio, seu mortis candidata malè habita fuerit.



CAPUT X.

Non parum animum torfit, quomodo cicuta aquatica tot tantaque symptomata in pueris & puellis excitarit, illis tandem mortem attulerit, hæ verò evaserint, nullis post se relictis deterioris valetudinis vestigiis? Animadverti symptomatum quorundam generandi modum, exempli gr. vertiginis diversimode explicari posse; nec certam rationem mortis propè definire licere, cum in *Jacobo Madero* quædam pro apoplexia, quædam pro syncope militarint, quamvis fortè ambo symptomata concurrerint. Rei difficultatem augent Medicorum dissidia, aliter atque aliter afficiendi à venenis modum tradentium: quidam sanguinem coagulari, lympham inspissari & spiritus densari à venenis existimant; quidam sanguinem & lympham contra nimium fundi spiritusque dissipari opinantur; alii inexplicabili ratione corrumpi tradunt. Hanc ob causam putarunt venena in exigua quantitate, vel assumpta, vel foris advenientia, & vulnere illata admodum sui multiplicativa esse, instarque fermenti totam massam sanguineam, nunc citius nunc tardius, inficere posse. Alij neque spiritibus, neque sanguine, aut lymphâ valdè immutatis, venena plurima sævissima symptomata, vellicatis membranis nervosis & ad contractionem irritatis, fibris nunc paucioribus nunc pluribus, excitari probarunt, à quorum sententia *D. Willis in l.c.* non abhorret, eique favere videntur experimenta *Nob. D. Redi*, inter quæ passim occurrit neminem à gallinis, aut colum-

columbis morfu viperarum enectis, & postea comestis, quicquam damni passum fuisse, quod nullus evitasset, si massa sanguinea à viperæ morfu de pravata fuisset, ut plerique sibi imaginantur. Huc pertinent quæ de Tora seu Aconito Pardalianches *Gesnerus*, aliisque venenatis succis, quibus tela à venatoribus inficiuntur, alij Authores memorant, tradentes simul sine noxa carnibus ferarum his telis peremptarum, vesci posse. Nullus tamen dubito, quin quandoque utraque ratione œconomia corporis humani à venenis pervertatur.

Ut in uno alterove certior fierem, vel saltem propius ad veritatem accederem, tum solus tum Amicis veritati litantibus hac in refociliis, ipsemet experimenta in brutis facere constitui: dedimus itaque canibus, lupis aliisque brutis venena vegetabilia & mineralia: quorumlibet effectus pro virili annotavi, ad omnia quantum potui symptomata attendi, simulque tum in viventibus, tum in demortuis, Anatomiam in subsidium vocavi, sanguinem & lympham consideravi, partesque ad quas venenum appulit, perlustravi: ex his quorundam symptomatum sc. vomitus, singultus, colicæ, dysentericæ, aliorumque fiendi modos discere potui: & si fortè non omnia affecutus sim, ansam tamen tum aliis, tum mihi ulterius inquirendi dedit; atque imprimis *Φιλιάτρεις* stimulum præbebit hæc audendi, cum unâ operâ, & viscerum structuram, & quomodo medicamenta in corpus agant perspicere possint.

Novi hos conatus à quibusdam improbari; quosdam cavillare nos operam ludere, cum non liceat, ut ipsi loquuntur, à brutis ad hominem argumentari: Nolo scriptum sive ethnicum sive satyricum *Hieronimi Rorarij Exlegati Pontificij*, quod *animalia bruta ratione melius homine utantur*; quam materiam quoque *Philo Jud.* versavit, ut videre est apud *Euseb. Hist. Eccl. l. 2. c. 18.* his opponere, tantum considerandum propono, annon bruta quoque alimenta in ore præparata per gulam in ventricu-

lum demittant, ibique assumpta subigant, subacta ad intestina ablegent ulterius perficienda? annon ibi quoque chylus à facibus secernatur, chylus separatus cum sanguine unitus coalescat atque in ejus naturam permutetur, non secus ac in homine? Num aliis organis ad actiones has perficiendas necessariis quam homines utantur? Annon quoque à summo creatore dotata sint membranis nerveis sentientibus, fibris moventibus, liquore & calore foventibus? Num defraudentur ad vegetationem & augmentum requisitis? aut avarior natura quam erga homines in illis appareat? Certè nisi obbrutuerint, aut superciliosè naturam ipsam consulere spreverint, non magnum, aut ipsorum præconceptis opinionibus usque adeo favens discrimen invenient, si modo innoxio cruore & sordibus, faciliè aquâ expiandis, manus contaminare non abhorruerint delicatuli. Hos ausus nec turpes, nec Medico indignos existimo, cum ad sanitatem hominis conservandam & reparandam spectent, quibus Medicum imprimis invigilare decet; nec quicquam honori ipsorum derogabit, si modo nullam maculam bonæ conscientiae aspergere studebunt. Crudelitatem quidam hic causantur, qui tamen non verentur intra viscera condere τὰ τετραπόδα τῆς γῆς, καὶ τὰ θηρία, καὶ τὰ ἐρπυσία, καὶ τὰ πτερυγία τῶν ὁρατῶν; ac tantum non quotidie ventriculum infarciunt bubulâ, vitulinâ, ovillâ, piscibus similibusque, quæ malesuada fames, aut gulæ intemperies imperat. Spretis his seu cavillis seu naniis, laudatissima experimentorum certamina *Nob. D. Redi & Cl. D. Charras* indefesto studio in naturam veneni viperini inquirentium malui imitari, utcunque variorum brutorum cædibus constent. Non memini me hæcenus vel legisse, vel à quoquam audivisse, Medicis Cæsareis vitio versum fuisse, quod fontibus venena suggererint, ut videre est apud *Matthiol. & Schenk. l.c. supra*: volui tamen nunquam simile tentare, quamvis luculenta occasio ante aliquot annos oblata fuerit: Venit enim ad me Agyrta quidam Neapolitanus, semet

femet appellans *Tarquinium de Roma*, importunè aliquoties sollicitavit, ut ipsi venenum efficacissimum publicè exhibendum curarem, cuius virulentiam mox debellaturus sit suo El. Orvietano, atque ita se demonstraturum, hoc non præstantius alexipharmacum in mundo reperiri: primum ipsum cum iniqua petitione repuli variis argumentis, nimirum officium meum esse prodesse non nocere hominibus, sanare non occidere: Magistratus fontibus licitè ratione vitam, idque per famulos ad hunc laborem conductos tollendam curare; deinde Orvietanum medicamentum esse calidum; posse ipsi exhiberi venenum corrosivum, cuius vim tantum absit, ut obtusum sit Orvietanum, quin potius inde auctum iri; denique me nosse temeritatem hanc, veneni turpis lucri causa sumendi pessimè cessisse, ac quosdam vitæ & animæ iacturam fecisse. Noluit his cedere; urfit propinationem veneni, dixit hanc non denegasse Medicos quosdam celeberrimos Germaniæ & Helvetiæ; monstravit amplissima testimonia à Medicis subscripta, & sigillo Urbium quarundam, etiam inclytarum, munita: fraudem subesse certo me scire regessi: id pernegavit. Cum importunus esse non desisteret, dixi me hac de re cum Collegis collaturum, & communi consilio aliquid facturos. Tum temporis aliam ob causam conventus celebratur; proposui *Cl. D. D. Christophoro Hardero* mecum *Poliatro & Nob. D. D. Friderico Lucio Scretæ à Zavorziz*, Agyrtæ huius sollicitationes, addidi que illum huc venisse, ut nostrorum loculos fraudulenter emungeret, more impostorum istorum; teste *Scipione Mercuriali degli Errori popolari d'Italia lib. 4. cap. 5.* ventriculum una atque altera hora ante statum tempus venenum sumendi, impleturum oleo, aliisvè pinguibus, veneni spicula obtundentibus. Conclusum fuit circum foraneo isti his legibus venenum dandum; includendum, remotis famulis, aliisque fraudum ministris, conclavi alicui solum, coenam mediocrem concedendam; cavendum ne pinguibus potiatur à cœ-

nâ usque ad statam horam & tum sc. 12. vel 14. horis, à coenâ elapsis in publico theatro, erecto suggestu, à pharmacopœi famulo dosin veneni integram oblatam haud cunctanter, absque ullo dolo deglutiendam esse. Annuit ille cum quadam alacritate simulata, at mox evasit, erupit; nec quicquam de illo his in oris hætenus auditum fuit.

Minus culpabor si venenorum agendi rationem in brutis explorem, ut hominibus prosum; quod etiam alii nuper fecerunt, inter quos *Exc. D. Joh. Sigism. Elsholz. Serenissimi Electoris Brandenburg. Medicum Ordinari.* nomino, qui *Clysmat. Nov. p. 18.* in venam siphone stigma arsenicale ingessit. Nunc singulorum brutorum, in quibus hæc tentavi historias propono, quarum singulis adnotatu digniora scholia quædam subjungo.




Cicute Aquaticæ data Historia.

1.

CAni molosso robusto, cujusmodi laniones ad urgenda jumenta, pecora & vitulos in itineribus adhibent, d. 1. Sept. 1676. horâ 2. pomeridianâ objeci cicutam aquaticam minutè concisam & contusam, carni vitulinæ assæ involutam; verùm statim subodorato veneno bolum hunc gustare noluit: aliam buccellam carnis solius mox devoravit. Itaque ligatis pedibus, ore bacillo diducto, radicum istarum contusarum 3j. circiter intrudi, nares digitis compressi, unde dimidiam circiter unciam deglutivit. Post dimidiam horam salivavit & subinde eructavit: capite tremuit: aliquantulum pedibus vacillavit: nullum aliud symptoma notatu dignum supervenit. Circa 7. vesperi catenam, quâ arbori in horto alligatus erat, sæpius mordit. Per noctem in horto relictus vinculum coriaceum morsu tandem perrosit ac cum catena ferrea aufugit, danubiam tran-

tranavit: d. 3. Sept. alacris hinc inde per vicum cursitavit, ac si nec vel minimum à cicuta passus fuisset.



Scholion.

Cicutam aliquomodo ventriculum afflixisse, salivatio & ructus significant, verum lesio non magni momenti erat, quia non vomuit, cum alias ad vomitum faciles sint, sibi quæ sæpe illum gramine devorato moveant: fortè minus ventriculo molesta fuit, quia cibo plenus erat & vinculo liberatus, multum aquæ danubium tranans bibit, unde sequentibus diebus alacrior factus hinc inde cursitavit. Capitis tremor & pedum vacillatio, labent leviculam ad cerebrum pertigisse innuunt, evanuerunt eloto ventriculo frigida potu.

II.

Dominus *Joh. Christophorus Simonius Tubingensis*, Chirurgus præstans d. 8. Sept. 1676. cani juvenculo famelico, cui cibus 24. horis denegabatur, radicum à me relictarum, minutim concisarum, citra additamentum, ultra unciam intrudit. Post elapsam horam dimidiam salivavit, vomuit, spuma pugni magnitudine ex ore pependit: mox miserè ipsum torfit, varie convulsus fuit, nunc opistotono, nunc emprostotono, nunc tetano; nunc oculos pervertebat, quandoque jactabatur: convulsionibus aliquantum remittentibusangebatur, ut in nullo loco manere posset; in gressu titubavit, & paulò post rursus in alterutrum latus præcipitatus ruit: duravit afflictio duabus horis. Postea vires recuperavit, alacrior evasit. Hinc denuò aliam radicum portionem ingessit, salivam statim movit, non vomuit, semel alvum solvit. Convulsionibus per vices affligebatur: surgens protinus in latus præcipitabatur: omnem cibum, etiam carnes, & potum fastidiit: supervixit ad diem tertium usque: ad secundam usque horam ante obitum subinde agitabatur,angebatur, ut nullo in loco

loco permanere posset : incedens brevi in latus cecidit. Ultimis vitae horis, ceu fessus, jacuit, solummodo respiravit, donec exspiravit.

Cadavere aperto ventriculus plane constrictus & corrugatus invenit : continuus ille radices integras, non comminutas nec emollitas, quales sc. intruserat; cetera prorsus vacuus & exsuccus fuit : deterso pauco muco, vidit internam superficiem rubicundioris debito, & in fundo, ubi praecipue jacebant frustula radices, maculae rubrae livescens apparuerunt, foris ampliores quam in superficie interna ventriculi. Intestina prorsus erant vacua, contracta, & intus veluti sicca : in fine recti mucum viridem reperit. Vesica parva, corrugata, vacua. Ventriculi cordis pleni erant sanguine nigro concreto.

III.

Eodem tempore lanionis molosso eandem radicem minutim concisam cum lacte ingessit; salivam movit, vomitum excitavit, quo radicem aliaque contenta ventriculi largè ejecit; non convellebatur; nec quicquam sinistri postea passus est.

*Scholia ad Hist. II.*

I.

Cicutae radix minutim concisa sola citra ullum additamentum cani juvenculo, data ut penitus ejus vires innotescerent.

2. Post brevem moram in ventriculo vires suas exseruit, ac monstravit se non frigidam & torpidam esse, nam primum salivavit, non ob vellicationem quandam circa oscula ductum salivarium in ore, sed irritationem nimiam in ventriculo, unde per gulam sursum trusa fuit spuma; forte etiam quia contracto ventriculo & gulâ, partes in faucibus, communi tunica nervosâ gaudentes, corrugatae aliquo modo fuerunt, non secus ac vomitum

tum quandoque salivatio præcedere solet. Deinde anxietatem quandam excitavit rodendo & vellicando nervosa ventriculi, quæ etiam cessantibus convulsionibus persistit, ob quam nullo in loco persistere valuit; nam hujus causam in ventriculo hæsisse post obitum patuit, dum apparuit radicem ventriculum non egressam fuisse, nec quicquam aliud extra illum in duodeno alibi in intestinis repertum fuit, cui anxietas attribui posset. Mox aderant convulsiones variæ eæque vehementissimæ, effectus causæ non ignavæ & frigida. Denique sectione manifestissime constitit cicutam calidam esse, non solum ex superficie rubicunda anfractuum, sed potissimum ex maculis rubris foris quam intus latioribus, quæ non à simplici sed propè caustica cicutæ vi productæ fuerunt, ac gangranosi quidpiam occultasse videntur.

3. Convulsiones caniculo huic evenientes exemplum sunt, à causa irritante extra principium nervosum locata illas commoveri posse: nam radices non egressæ erant, limites ventriculi, nullæ illarum vestigia in intestinis reperta fuerunt: nullæ ibi radices, nullus succus virosus apparuit: nec credibile mucum viridem in extremo recti inventum, à radice originem traxisse, cum cætera intestina munda essent, talisque mucus pridem bile tinctus huc pelli potuerit. Eadem ratione in ventriculo permanens vertiginem titubantem excitavit.

Radix convulsiones concitasse videtur, non solum ob ro-
sionem aut irritationem vehementem, sed quoque ob arctissi-
mam & procul dubio valde dolorificam constrictionem, tum
orificiorum, tum totius reliqui ventriculi, ob quam Præses sy-
stematis nervosi indignabundus & propè furiosus, varij generis
motus convulsivos, instituit; nam nec vomuit, nec dejecit, ac post
mortem contractus & corrugatus visus fuit. Inter vehemen-
tissimos motus convulsivos induciæ quædam caniculo concede-
bantur, quamvis radix in ventriculo persistenter, nec irritare de-
sicerit,


fierit, ut ex anxietate ob quàm in certo loco permanere nequirit, abundè constat; quod procul dubio factum, quia Archæus fessus & multis spiritibus deperditis à tumultibus cessare cogebatur, licet nihil exhibitum fuerit quod ipsum demulset, aut sopivisset, quod pomum citri, Archæo furioso reddito à morfu viperarum, *Cl. D. Frideric. Hoffmann. in Clav. Pharmaceut. Schræder. Libr. 4. f. 1. Tit. de Pan. Citr.* egregiè fecisse memorat. Idem tamen quoque evenit principio nervorum propius afflicto, unde epileptis sæpè longæ feriæ à paroxysmis conceduntur, imprimis si paroxysmi vehementius solito affligant. Devictis radicibus spiculis acrioribus & fortè prorsus obrusis, caniculus alacrior factus, post duas horas superatas & fortè nihil horum amplius passus fuisset, nisi denuo novarum radicum farrago intrusa fuisset. Hæc utcunque convulsiones per vices intermittentes quoque excitarint, nihilominus gravius affligerunt, nam non amplius incedere valuit, tum ob spirituum animalium consumptionem, à convulsionibus per triduum propè durantibus, tum ob vitalium defectum in momenta majorem; nam toto triduo omnem cibum & potum fastidiit, massaque sanguinea & à calore cicutæ & ab agitationibus convulsivis procul dubio valdè efferbuit, indeque non reparatis spiritibus, penuriam spirituum summam necessariò attulit. Radix hæc virus suum potentius in caniculum hunc exseruit, tum ob ætatem teneriorem & crustaceam tunicam rariorem, minusque contra hujusmodi injurias obfirmatam, tum quia nihil in ventriculo præter solenne fermentum idque paucum aderat, quod spicula ipsius obtudisset; unde ob fermenti paucitatem nec radix quidem emollita fuit.

4. Fastidiit omnem cibum & potum, non ob stuporem stomachi, quem sensu valuisse ad extremum, tum anxietates, tum motus convulsivi probant, sed propter hospitem adversissimum, sc. radices quibus ventriculus infarctus erat. Sic in febribus

bribus quidam omnem cibum abhorrent & ad vini nomen nauseant, utcunq̃ue antea bibuli fuerint, & siticulosi sint: phrenetici quoque nec aquam poscunt. Hydrophobiam tamen adfuisse non dixerim, cum aquam appositam non fugerit & chirurgus sectionem impunè peregerit.


5. Intestina & vesica vacua & exsucca fuerunt, quia ob famis & sitis triduanam tolerantiam, labores convulsivos propè continuos & vim calefaciendi cicutaë, maxima pars lymphæ exhausta fuit.

6. Mortuus est caniculus tertio demum die, quia sensim spiritus animales & vitales consumpti fuerunt, ob sævissima symptomata & quia misellus nunquam vel minimo refocillatus fuit. Cor tandem elanguit, tum ob spirituum inopiam, tum ob enervationem à frequentissimis convulsionibus, à quibus non immunè fuisse, credibile est, toto systemate nervoso tumultuante. Et licet duabus horis mortem præcedentibus, à motibus convulsivis nihil ampliùs huiusmodi passum sit, nihilominus à prægressis afflictionibus ita prostratum fuit, ut sanguinem protrudere nequirit, sanguis in grumum coaluit, non propter vim aliquam coagulantem cicutaë, cum potiùs contraria & fundens ipsi inest, sed ob motum cordis cessantem: sanguine, ut alias in sanissimis solet, sponte ad coagulationem tendente.



Scholia ad Hist. III.

Molossus Lanionis denuo virus cicutaë elusit vomitu: fortè etiam lacipsius acrimoniam mitigavit. Nuper *D. Theodorus Zwingerus* *Φιλίατος*, diligentissimus Avitarum virtutum medicarum hæres, feli semen cicutaë aquaticæ cum lacte ingessit, quod sine ullo symptomate toleravit, quamvis ipforum ventriculi minùs injurias quàm canini perferant.



Historia IV.

Cicutæ aquaticæ virus experiundi otium & occasionem nactus Doneſchingæ d. 15. Sept. 1676. canem vetulum, mediocris magnitudinis, coloris fufci, cætera vulpi fimilem, à tempore vespertino ad horam 10. antimeridianam d. 16. Sept. ab omni cibo & potu jejunum detinui: tum cicutæ aquaticæ recentis radices contuſas, unciarum quatuor pondere, pedibus ligato & ore piſtillo diducto, intrudi; ægerrimè radices in ventriculum admifit, & iteratis vicibus diu in gula detinuit, ut partim naribus oclufis, partim foris, gulam deorſum fricando, illuc promovendæ fuerint. Cum ligabatur ac radiceſ intruſione vexabatur, largiſſimè alvum & veſicam exoneravit. Vinculis ſolutus, aliquandiu angſ videbatur ac celerius reſpiravit, ſed inde nec vomuit nec alvum ſolvit; paulò poſt vegetus iterum evaſit, ac ſi nihil adverſi prorſus pateretur. Itaque horâ primâ pomeridianâ radices in taleolos & majora fruſta conciſas, mediante bacillo, linteo obvoluto & oleo imbuto, ultra quatuor uncias intrudimus. Vinculis ſolutus aliquandiu celerius reſpiravit, quod potius torturæ quàm radiceſ virulentia tribuendum erat, nam in aliud conclave ultra quinquaginta paſſus deductus, nunquam nutavit, neque ullum viſceris alicujus afflicti ſignum edidit ad 10. uſque vespertinam: circa illud tempus crebro ad vomitum ſtimulabatur, atque liquor aliquis uſque ad fauces trudebatur, quem tamen protinus ruruſ deſglutiit: totâ nocte quietus fuit. d. 17. ſept. mane vegetus erat, nunc ſurrexit, nunc ruruſ decubuit, appoſitam aquam bibere noluit. Horâ 9. matutinâ ruruſ ad vomitum urgebatur, liquorquè uſque ad fauces pertingebat, quem ſtatim iterum deſglutiit: poſtea crebro pedes lingere coepit: Horâ 12. carnes & fruſtrum panis cum offibus avidè comedit & paulò poſt bibit: quod itidem fecerat hora 7. vespertina

tinâ noctu inquietus erat, & vinculis, quibus ne aufugeret, constrictus erat, se liberare conabatur, aut quiritabatur. d. 18. sept. vividus erat ac validus, ac si ne micam radicis accepisset: siticulosus multum aquæ bibit, & comedisset, si cibus datus fuisset. Itaque horâ 10. antimeridianâ constitui succum ex herba & radicibus contusis, & aquâ fervidâ aliquamdiu maceratis, fortiter expressum infundere: dum pedes vinculis stringuntur, pistillum ori transversim inditur, magnâ vi ligamenta rumpit, venatorem morsu graviter vulnerat, ac fæces atro virescentes in cylindros compactas, copiosè egerit & largissimè mingit. Tanto robore recuperato, post aliquot dierum famem, & superatâ cicuta virulentia, vix & non nisi post multos labores ligando, ad infusionem aptari potuit. Infudi tandem ante undecimam hujus liquoris plus quàm libras duas. A liquore infuso abdomen valdè intumuit. Postquam vincula maximam partem ablata fuerunt, largissimè vomuit mucum tenacissimum, subnigrum, allium redolentem cum aliquot radicum cicuta taleolis emollitis, sed non dissolutis, quos ultra septuaginta duas horas intra ventriculum continuit. Circa duodecimam crebro præ anxietate situm mutavit, nunc sedit, nunc in ventrem, nunc in latus decubuit, non nunquam prono capite diù attonitus stetit: paulò post saliva spumæa copiosè ex ore manare coepit, non secus ac si mercurius vel illitus vel ingestus fuisset.

Ante primam pomeridianam mucum album, penitus spumeum, similem salivæ ex ore stillanti, copiosum, magno nixu evomuit: ab illo tempore salivatio parcius eveniebat: valdè angebatur: sæpe ad vomitum stimulabatur; respiravit celeriter cum sono quodam tristi & querulo: situm sæpe mutavit, ut quo se verteret, nesciret; Post 3. pomerid. rursus mucum copiosum, spumeum, atro virescentem, cum aliquot taleolis radicis cicuta 16. sept. intrusæ, magno nixu evomuit. Ab illo tempore ad 10. noctis sæpissimè ad vomendum urgebatur, at liquorem & quic-

quid ad fauces usque protrudebatur, nunquam amplius egressit, plerumque gemebundus expiravit, ferè decubuit, omnibus tamen sensibus valuit, & irritatus baculum morfu petiit: accedentes fixis oculis intuebatur, & ad quemlibet strepitum attendebat: ructus & crepitus foetidissimos, allium redolentes, crebro emisit. Cibus sc. bubulam elixam, & frustulum pellis cervinae, in quo receptaculum lachrymae continebatur, circa septimam degustare noluit, & naribus propius admotum, aversabatur. Totâ nocte ferè inquietus fuit: audiui aliquoties vinculum ferreum, quo pedi mensae alligatus fuit & totum corpus succutere: an aliquid convulsivi passus fuerit? prae densissimis tenebris videre nequii: mane tamen d. 19. Sept. circa quintam ipsum lorum, ubi coriaceum erat, avulsiße & cibum in coena appositum devorasse, comperi. Valdè tum languidus erat, minusque alacris, unde facilè passus est se denuo mensae alligari: Vomituriebat sæpius, nihil tamen excrevit; respiravit adhuc sono querulo. Circa 7. matutinam ulterioris morae impatientes, funiculo collo circumposito, ipsum strangularunt: vix suffocari potuit, & statim in principio funiculum, vehementissimè corpus agitando dirupit, parùm minxit: per alvum præter flatum nihil emisit. In cadavere sequentia observatu digniora notavi. Primum abdomine aperto, omnia intus verè fervebant, imprimis epar attactu admodum calidum erat; ventriculus non admodum distentus fuit, dum adhuc calebat, postquam friges fieri cœpit, magis intumuerat: intestina maximam partem gracilia, contracta & corrugata, etiam rectum, videbantur: Coecum turgidius fuit: superficies ventriculi externa ex albo rubescebat: intestina albicantiora fuerunt: epar erat atro rubescens: pancreas solito rubicundius: lien longè pallidior hepate. Renes à solita facie non desciverunt: vesica distentissima & lotio flavo impleta fuit. Vasa ejaculatoria abscisa instar vermium corrugabantur. Pectore resecrato omnia quoque intus æstuabant: pulmones in sinistro latere

utrin-

utrinque non penitus subsiderunt, sed aëre adhuc aliquantum turgebant, adeo ut vesiculæ in lobis sinistri lateris videri possent; non tamen ita inflati ut vel tertiam cavitatis partem vix adimplerent: in sinistro latere ex albo rubescebant; in dextro intense rubri fuerunt. Cor sanguine admodum turgebat. Gula valdè inflata & foris admodum rubicunda fuit. Dum in chyli receptaculo ferè inani & non nisi paucâ lymphâ prædito occupor, ac intestina cum ventriculo & gula eximo, cor perfrigit: inciso dextro ventriculo omnis sanguis in illo, & auricula in grumum magnum, atrum potius quàm rubicundum, sed facile dissolubilem concrevit: similem in sinistro, sed multo minorem inveni. In vena cava ascendente & descendente sanguis maximam partem fluidus, & non nisi ille grumofus fuit, qui cum cordis grumis continuus erat: alibi ex vasis sanguiferis sauciatis emanavit sanguis fluidus, intense rubicundus & ad nigredinem aliquam vergens. Vesicula biliaria plena erat bile valdè flavâ, viscidissimâ. Incisâ gulâ erupit foetor, tetrum alij foetorem spirans: intus prorsus alba fuit, mucò pellucido oblita: sulci recti. Ventriculo à stomacho ad duodenum secundum longitudinem inciso, circa stomachum occurrit aqua turbida; in fundo inveni aliquot radicum taleolos; quam plurimos pilos, quorum quidam jam in pilam nuce juglande majorem compacti fuerunt, plures per universam superficiem ventriculi spargebantur, atque intra anfractus abscondebantur; omnes similes erant illis quibus canis tegebatur; frustulum pellis cervinæ pilis adhuc confixæ; frustulum pinguedinis condensatæ magnitudine avellanæ; denique plurimum muci, cui etiam pili involvebantur & reliqua ejus contenta: mucus iste qui in ejus cavitate fluctuabat, turbidus erat, albus potius quàm flavus, aut atro virescens; nec spumeus fuit. Circa pylorum in antro ad uncia unius latitudinem mucus croceus, sed paucus hærebat. His omnibus sublati anfractus comparuerunt, mucò pellucido tenui obducti; qui de-

tersus

tersus protinus, ceu è poris pulsus, novus repullulabat, etiam citra compressionem forinsecus factam. Intus anfractus omnes, maximè in fundo, tum in parte prominente, tum intra interstitia rubebant: alicubi, imprimis in interstitiis apparuerunt maculae intensius rubrae, quàm ipsi anfractus erant, quae fere in locis tribus exulceratae fuerant. In principio antri pylori prominuit tuberculum valdè rubrum, pisi magnitudine, in cacumine propè exulceratum: reliqua pars antri, ipseque pylorus non rubebant, sed albicantes manserunt post elotam flavedinem. Intestina sex ulnas longa omnia crassiora solito erant, forte quia vacua ferè erant, nec ullum discrimen observavi, nisi quod portio illorum amplior esset, tum imprimis sub pyloro ad ulnae dimidia longitudinem, tum ulterius ad ulnam unam cum dimidia: reliqua verò ad coecum usque gracilior. A pyloro ultra duas ulnas illorum cavitas mucò flavo, viscido, pellucido obducta erat; postea ultra ulnam cavitas magis coarctata, omnisque muci flavi expers erat, solummodo mucò albo, pellucido, tenacissimo obducebantur, nihilque prorsus continebant, quàm aliquot vermes cucurbitinos, spithamâ longiores, quasi ex seminibus cucurbitinis secundum longitudinem apicibus conglutinati. Ab hac intestini portione reliquâ, usque ad valvulam in fine ilei, mucò intensè flavo plena erant, cui videbatur aliquid cruoris permixtum: propè illius finem hinc inde excrementa atrovirescentia, sed paucâ quantitate apparuerunt, prorsus digesta, ut cuius rei reliquiae fuerint vix dignosci posset. Coecum quod in duos quasi sinus contortum erat, quoque multum hujus muci continuit, cum excrementis paucis, superioribus similis. Ejusdem generis mucus intestinum rectum incrustabat, & subfinem illius aliquid excrementorum atrovirescentium detinebatur, sed omnino paucum. In toto intestinorum ductu, nec minimum frustulum, vel ossis, vel radices in taleolos concisae apparuit, quamvis longè majore quantitate radix ingesta fuerit, quam
vel

vel evomuit binis vicibus, vel in cavo ventriculi reperi. Deter-
so mucō undique intestinorum, ubicunque flavus erat, ibi in-
testina intus inflammata erant; maximè sub pyloro, & ibi, ubi
intensius flavescebat in illa portione ad valvulam usque, etiam
rectum rubebat magis quàm solet: observavi plerosque ambitus
areolarum, quibus glandulæ circum scribuntur, quoque rubuif-
se, ipsas glandulas verò non nisi in paucis locis. Rubebat quoque
intestinum cœcum intus. Gulam, ventriculū & intestina aquâ
fontanâ sæpius mutatâ per triduum maceravi, ut fibras discerne-
re & separare, aliâque observare possem. In gulâ maceratâ sul-
ci recti pauciores, plures verò transversī inæquales apparue-
runt: foris erant fibræ rectæ: ablatâ membranâ internâ nerveâ,
fibræ carneæ obliquæ ascendentes & glandulæ quàm plurimæ
miliares occurrerunt, quibus foras pressis, interna gulæ superfi-
cies glutinosa & valdè lubrica evasit, ac in parte externa nihil-
ominus glutinosa mansit. Detractâ membranâ nerveâ, à sto-
macho ad pylorum, observavi plurimos nervos, imprimis circa
stomachum & pylorum, eosque non adeo parvos, validos, non
paucos etiam in aliis locis, maximè circa fundum in illam inferi,
atque in illa obliterari & in membranam degenerare: deinde
plurima vasa sanguifera inter illam & fibras carneas ferri: In-
super avulsâ hâc membranâ nerveâ à fibris, protinùs omnes an-
fractus evanescere. Præterea dum hæc membrana cum fibro-
sa cohæsit, compresso inter separandum ventriculo, semper in-
terna superficies admodum lubrica permansit, ac mucō viscido
pellucido, imò etiam citra compressionem, aquæ immersa, pro-
tinus iterum copiosè obducebatur, quamvis nullas glandulas
inter hanc & corpus fibrosum observarim, quales in gulâ, mem-
branæ nerveæ foris copiosissimè accumbebant: Imò postquam
illum penitus à fibrosa separassẽ, nihilominus lubrica mane-
bat; quamvis illam iteratis vicibus fontanâ eluerim, cùm faci-
lè corpus fibrosum ab omni lubricitate hâc ratione vindicare-
tur.

tur. Hanc membranam nerveam in plurimis locis inflammata manifestè vidi: aliquot in locis inveni ulcuscula superficialia, mitioribus aphthis similia: tuberculum in antro pylori in hac quoque perstitit, non ulteriùs progressum: videbatur in cacumine exulceratum esse. In fibroso corpore foris per membranam communem transparebant fibræ rectæ, à stomacho ad pylorum protensæ, intus ablatâ membranâ nerveâ, apparuerunt fibræ circulares carneæ, illæque validæ maximè circa medium ventriculi, ut & in antro pylori: à stomacho obliquè primum ferebantur, antequam planè circulares evaserunt: aliud fibrarum genus nullum observavi. Inflammationem membranæ nerveæ ad corpus fibrosum pertigisse nullibi vidi. In toto intestinorum ductu observavi triginta areolas glandularum tubulofarum, à pyloro ad valvulam antè intestinum rectum, valvulæ coli vices agentis, sitam: areolarum circulus extremus limbus, altior est, & prominulus magis quàm fundus, in quo conspicua sunt minuta capitella, acuum similia, ex quorum osculis, foris intestinis compressis, exsudat humor albus, turbidus, viscidiusculus, qualis ex tubulis in gulâ volatilium, compressione prodit. In prima portione ulnari à bilarii ductus insertionem, octo numeravi, dimidii bazij amplitudine, nullam vidi à pyloro ad insertionem ductus usque, sed infra illam demum: In 2. ulna, duas parvas, adeo ut in una quatuor tantum capitella comparuerint: in ulna 3. quatuor majores ovales. In 4. & 5. decem rotundas & ovales: circa finem quintæ ulnæ, inveni tuberculum verrucæ simile, in ambitu inflammatum, supernè excoriatum. In reliqua portione usque ad valvulam, numeravi sex areolas, cæteris ferè ampliores, quarum una quinque uncias longa erat, verùm angustior aliis, maximè circa principium. In portione intestini valvulæ propiore, aliquot areolarum oblongarum limbi, dimidiam partem inflamatæ erant: glandulæ verò ipsæ nullibi. Ibi ubi areolæ in intestinis sitæ erant: intestina luci obversa, magis perspicua seu

eua seu pellucida erant,quàm in aliis locis. Intestinatorum membrana extima, fibris rectis tenuissimis prædita erat; secunda fibris carnosis robustis circularibus: tertia prorsus nervea, ad quam pertingebant plurimi nervuli, validi satis & robusti, & vasa sanguifera, quæ tenuissimorum capillamentorum instar, ceu reticula areolas ambibant; quarta villosa seu mucosa, quæ totam internam cavitatem incrustabat, exceptis areolarum spatiolis, unde ibi intestina pellucida. Dum villosam tunicam abradi obtuso cultello, à nervea plurimum liquoris candidi, turbidi, chylo per similes simul expressi, quamvis per triduum sæpissimè intestina eluerim, etiam propè valvulam intestini recti. Postquam tunicas fibrosas intestinatorum sustuli, *Valvula Kerkeringianæ* prorsus obliterabantur, quæ adhuc conspicuæ erant, quamvis mesenterium abstulerim. Abrasâ fortius tunicâ villosâ, simul abripiébantur in areolis glandularum capitella prominula, & loco illorum apparebant oscula minuta, s. papav. alb. capacia: si verò nullam vim adhibui, perstiterunt capitella integra. Intestinum cœcum in duas quasi cellas diremptum, & rectum instar ventriculi, intus anfractuosa erant; præter communem, etiam quatuor tunicas habuerunt, quarum externa fibris rectis, secunda circularibus præditæ erant: In recto fibræ rectæ insigniores erant, quam in reliquis, circulares quoque robustæ & carnosæ fuerunt: Membrana nerveæ insignia vasa sanguifera accumbebant: In cœco & recto crustacea, seu mucosa, minus villosa erat quàm in reliquis intestinis: in cœco nullas quidem areolas inveni, verum aliquot oscula glandularum vices præstantia: in recto nullum neq; osculum, neq; areolam observare potui, quamvis hoc quoq; intestinum admodum lubricum esset.

Historia V.

Circa idem tempus caniculo semestri, admodum famelico, apposuit jusculum carnis, cui radices cicutæ minutim concisæ immixtæ erant, *Cl. Dom. D. Joh. Conrad Stenzelius, Med. Villinganus*; jusculum avidè devoravit, verum nec vomitum movit nec alvum: debiliior quidem inde evasit, ac internæ afflictionis indicia præbuit, verum post aliquot horas superatas integrè convaluit, nec quicquam deterius passus est, ut narravit Doneschingæ d. 21. sept. 1676.

Scholia ad Historiam IV.

3.

Cicutæ aquatica etiam in hoc cane nullos effectus edidit, unde vel suspicari posses, ipsi vim aliquam refrigerandi, multò minùs congelandi & stupefaciendi inesse; prima quidem vice radicum frustula intrusa, ab hora 10. antimeridiana ad 1. pomeridianam nullam vim exseruerunt, ac si nullus qualitatum excessus in illa lateret; verum novis frustulis ingestis, licet denu post novem horas, ad vomitum stimulabatur sæpius, pulso simul liquore ad fauces, quem tamen rursus deglutiit; idem post vigesimam horam pari conatu fiebat: quod non nisi irritamini cuidam, à radice proveniente attribui potest. Postero quoque die panem, carnes cum ossibus comedit, quamvis radicum frustula in ventriculo superessent, sc. integro appetitu, nec à radice stupefacto. Manifestius cicutæ hujus calor & acrimonia innotuerunt die tertio, succo foliorum & radicum infuso, nam protinus largissimè vomuit contenta cum muco tenacissimo, allium (quod *Horatius* cicutis nocentius *Epod. Od. 3.* existimat) redolente; valdè

te; valdè angebatur, ut vix ullum quieti commodum locum invenire posset; salivavit multum; atque hæc omnia non nisi ventriculo graviter irritato contingere potuerunt, statim enim post ingestum succum, ex radicibus & herba expressum evenerunt, unde etiam mucosum spumoso vomitu rejecto, salivare desinit. Afflictionem ventriculi quoque respiratione quâdam querulâ prodidisse videtur, quia non diu post infusum succum exaudiebatur. Non tamen negarim anxietatem, & hoc respirationis vitium, auxisse intestinorum cruciatus, quorum succum descendisse, crepitus alij foetorem spirantes testabantur. Tum in ventriculo, tum in intestinis rosiones vehementes fuisse indigitar, symptomatum istorum duratio ad diei sequentis horam septimam: nec tamen tanta, ut appetitum sustulerint, cum bubulam elixam, & frustulum pellis cervinæ nocte devoravit. Clarius cicuta calor & acrimonia in cadavere enituerunt: nam aperto abdomine & pectore, nihil gelidi repertum fuit, quin potius omnia fervebant, & epas tactu admodum calidum, atque rubescens, & pancreas solito rubentius fuerunt. In ventriculo ablatis contentis, & absterfo mucosum, manifesta inflammationis indicia occurrerunt, sc. anfractuum & interstitiorum rubor, maculae rubrae, aphthae membranæ nervæ, sublatâ fibrosâ: In intestinis itidem rubor, deterfo mucosum flavo, ambitus areolarum glandulosarum rubicundus, item superficies recti & coeci rubicundior solito. Tuberculum in antro pylori non quidem à cicuta recenter productum existimo, forte ejus excrecentiæ ansam dedit, officulum acutum aliquando devoratum, verum colorem rubicundum cum incipiente exulceratione, non vereretur à cicuta virulentia deducere. Pulmonum ruborem nollem à cicuta noxa derivare, quamvis tota massa sanguinea ab illa calefacta fuerit; adscriberem potius strangulationi, ob quam impedito sanguinis motu, dexter cordis ventriculus distensus, sanguinem non solitâ alacritate per pulmones ad sinistrum ventricu-

lum propellere valuit, unde in media via subsistens, hunc ruborem post se reliquit; cui accessit acris interceptio, sanguinis motum alias per pulmones adjuvantis, si organa respirationi dicata officio suo bene fungantur. Sanguis in dextro cordis ventriculo in grumum concretus, neutiquam patrocinator cicutam frigidam putantibus, nam demum concrevit corde frigefacto & tardius, dum in aliis scrutandis occupabar, dissecto; id aliàs evenit, quamvis calidissima ante mortem sumpta fuerint; præterea grumus, ceu recenter concretus, facilis dissolutus erat, atque in aliis vasis sanguiferis fluidus adhuc mansit: quin cicutæ potius dissolvendi quàm coagulandi vim inesse, copiosa mictio ante succi infusionem, & post mortem vesica urina distenta probant.

2. Id verò præter omnem expectationem evenit, quod systema nervosum minus perpeßum fuerit, nullique graviores tumultus supervenerint. Radicum propè octo uncias, primum quatuor tribus horis ferè sine molestiâ, postea alias quatuor super ingestas, novem horis ventriculus pertulit: & licet elapsis novem horis ad vomitum stimuletur, tandem quoque illarum virulentiam evicit, appetiit, validus evasit, ut die tertio vix vinculis coerceri potuerit; radicum quoque reliquias ultra septuaginta horas toleravit. Insuper radicum portiones ad intestina pervenisse probant, faeces atrovirescentes, in cylindros coactæ, copiosè antè succi infusionem excretæ, & quantitas illarum minor post obitum in ventriculo reperta, quàm ingesta aut vomitu rejecta fuerat. Dum radicum portiones comminutæ in intestinis perstiterunt, vix fieri potuit, quin chylus illarum succo contaminatus, indequè massa sanguinea, spiritusquè animales infecti fuerint: at & hoc sine sensuum perturbatione, aut immutatione, aut motus aliquâ depravatione; nullus sopor, nullus stupor, nulla inquietudo delira observabatur. Post infusum quidem succum animadversum fuit, membranam nervosam
ventri-

ventriculi & intestinorum graviter afflicta fuisse, ex vomitu vehementi, nec mitiore illo, quem cient vitrum antimonij, crocus metallorum, tartar. emeticum, aut gilla Theophr. ex anxietate, ob quam nullibi quietem invenire potuit, & ex salivatione, cum infusionem brevi hæc symptomata secuta sint. Nullus dubito succi hujus plurimum quoque ad massam sanguineam pervenisse nam potulenta citissime ex ventriculo eliminantur, & plus ejus ingestum fuit quam evomit, & post mortem in ventriculo redundavit. Utcunque autem membrana nervea plurima passa sit, continuantibus symptomatibus ab hora 12. merid. d. 18. sept. ad 7. mat. 19. sept. attestantibus quoque inflammationibus in ventriculo & intestinis, item aphthis; licet quoque ad principium nervorum aliquid succi delatum fuerit, non tamen nec ob consensum, nec propiore sede arietata, *Præses systematis nervosi* in cane hoc permovebatur: nam licet decubuerit, omnibus tamen sensibus valuit, baculo irritatus momordit, accedentes fixis oculis intuitus est, & ad quemlibet strepitum attendit. Utcunque nocte inquietus fuerit, & catenam ac corpus succusserit, nihil tamen convulsi passum fuisse conjicio, quia nulla per pavementum excrementa sparsa videbantur, maneque vinculis solutus repertus fuit. At quoque nihil torpidi, stupidi, aut somnolenti in cane hoc observatum fuit, quin potius tota nocte nimis vigilem & permolestum expertus sum, dum mihi somnum in contiguo cubili decumbenti, non semel turbavit: debiliior quidem & languidior mane 19. sept. erat, unde se faciliorem ad vincula præbuit, non ob qualitatem aliquam occultam, sed vexationes ultra tertium diem durantes, parciolem cibum & potum, vomitusque frequentes. Omnia manifestis qualitatibus à cicuta peracta fuisse, manifestè ex sectione tandem patuit. At istud obscurum est, cur *Præses systematis nervosi*, seu *Archeus* non quoque in furias actus fuerit? Cum sæpè ob leviores injurias graviss-

gravissimè indignetur. Id in hoc cane ob plures causas non factum fuisse puto : Primum procul dubio tunica mucosa crassior & densior fuit , quàm in primo cane, ac proinde membranam nerveam fortius contra injurias cicutæ munivit ; id oculis usurpare & certius asserere potuissem, si ἐγχεσθῆσιν, quæ postea mihi innotuit, scivissem ; nimirum ventriculū dissectū fervidæ immergendū ; tunc enim in propatulum venit, non secūs ac crustacea linguarum densissima elixa, antea propè ignota, aut cuticula humana à scabie, aut vesicatorio appposito, aut cute ambusta : ob hanc densitatem hujus tunicæ, radices nihil magni efficere potuerunt ; postea verò à copioso muco, ejus acrimonia magis magisque obtusa fuit, ut etiam longiore morâ non gravius lædere valuerit : succus quidem infusus munimen hoc fortius aggressus est, & ad membranam nerveam penetravit, attamen protinùs fibræ circulares robustæ, pylorum ejusque antrum & medium ventriculū ambientes, in subsidium venerunt, ac magnam intestini hostis vim, vomitu excitato, excusserunt, quòd repetitis vicibus factum fuit, ut reliquias facilius tolerare poterit, nullusque dubito, quin integrè convaluisset, si libertate donatus, & sui juris, factus, ad vicinū Danubij fontem pervenisset, nam nocte apposita devoravit. Denique existimo vetuli hujus canis *Præsidentem Systematis nervosi*, post multas à primordio vitæ ad provectam ætatem exantlatas injurias ita se obfirmasse, ut graves quoque devorare & superare valuerit. Non levem ventriculi & intestinorum membranæ nerveæ labem inustam fuisse, rubor & aphthæ testantur : at tanti non erat, ut ipsum commoverit. Sic adultiores & laborum assueti multa perferunt, quæ ætatem tenellam & delicatulos gravissimè exagitant. Multi cibos coctū difficilimos optimè tolerant, qui teneriores in morbos periculosos præcipitarent. Plures vini amphoris ingurgitatis, ne quidem temulenti redduntur ; alij vel minimum excessum gravissimè luunt. *Anus Attica & Femina Batava* non solum

lum à cicutâ comesta nullum damnum in ventriculo perferse-
runt, sed hæc quoque blando conciliato somno expergefacta,
melius negotiis suis vacare potuit, alias non singulis noctibus
suis ferculis cicutam aspersisset.



Scholium ad Historiam V.

MAlesuada fames compulit hunc caniculum ad devoran-
dum jusculum, cui radices cicutæ intritæ fuerunt: aliàs odo-
ra canum vis ocyus latentem vitæ hostem agnoscit, molossus-
que lanionis etiam carni involutam respuit. Ejus acrimoniam
jusculum obtudisse existimo, unde minus illum læsit; & quam-
vis affligere coeperit, accedente copioso muco amplius mitiga-
ta, & post aliquot horas planè superata fuit, ut nullum damnum
post se reliquerit.



Historia VI.

*Cicuta aquatica Lupo intrusa Do-
neschingæ.*

Die 4. Junij 1677. lupo, qui octo circiter septimanarum
credebatur, ante horam octavam mane, radices *Cicutæ aqua-
ticae* uncias circiter duas contusas vi digito intrudi; humi positus
ululavit vagientis instar, continuò: exiguum portionem vom-
itu rejecit absque magno nixu. Post horæ quadrantem magno
conamine radicum portionem evomuit, sed vix decimam inge-
starum partem: postea diù non amplius nec vomuit, nec ad vo-
mitum stimulari videbatur, verum prodiit solùm ex ore spuma
alba copiosè. Ab illo tempore nutare in dextrum latus coepit,
ac illuc sæpè caput inclinavit, ac si motu convulsivo traheretur.

V

Ante

Ante nonam vehementer ad vomitum stimulabatur, nihil tamen excrevit, quamvis per gulam ad laryngem bolus ascendere & remeare, brevibus intervallis crebrò videretur: continuante aliquandiu hoc nixu linguam, hiantè plurimum ore, longè exseruit, mox convellebatur, caput retrorsum retrahebatur iteratò, pedes extendebat, ac in hac lucta alvum exoneravit, non autem minxit: paulò post totus rigidus sine omni motu & sensu, respiratione penitus cessante, jacuit, ut mortuum putarim. Tetanus iste duravit ad horæ partem circiter duodecimam. Cùm jam jam cultrum admoturus eram, cor rursus se movere, moxque unum alterumque suspirium edere cœpit, paulatimque respiratio, sensus motusque redierunt, atque rursus vagiit, verùm submissa & fracta voce & oculos aperuit. Post nonam conatus vomendi rediit, in quo bolum iteratis & creberrimis ad laryngem pertingere vicibus vidi, descendentem & remeantem brevissimis intervallis, denuo longè exertâ linguâ epilepsiâ corripiebatur. In ipso paroxysmo abdomen incidi, nullo sensus indicio primùm lupo dante: dilatato vulnere, & aliquoties musculis abdominis & peritonæi sauciatis, tandem sensus indicia præbere motu & vagitu cœpit, ac concitatus respiravit.

Penitus denudatis visceribus imi ventris, ventriculus apparuit valdè distentus, tum à radicibus, tum à flatibus, subinde se constrinxit ferè in medio, proximè antrum pylori, ut sulcus ibi videretur & totus angustior, minusque globosus & æqualis, sed rugosior appareret. In collo tunc videbam bolum versùs laryngem ascendere, moxque relabi, nihil tamen prodibat ex ore, quamvis linguam non raro longè exseruerit, ac si ad summas fauces jam aliquid pervenisset. Quando ab amplexu contentorum ventriculus cessavit, à levi contactu, stylo facto, subinde illum repetiit. Intestina propè vacua & contracta erant, nisi sub finem ilei, ubi distentiora. Diaphragmatis centrum nerveum in inspiratione convexum reddebatur, ambitus verò illius car-

neus,

neus, costis adhærens, corrugabatur: In expiratione totum diaphragma planum evadebat: Exciso ventriculo & leviculè diaphragmate in centro fauciato, in inspiratione unicâ vice valdè expandebatur centrum, in expiratione, spuma per vulnus copiosè cum radicum frustulis in abdomen erupit, ac postea diaphragma æqualiter tensus mansit: subinde ore acrem captavit, linguam exseruit, costæ unâ alterâque vice attollebantur & descendebant; cor fortiter adhuc pulsavit, postquam respiratio cessavit. Omnisquè motus animalis substitit.


Post mortem inveni gulam, radicibus in cylindrum coactis, à stomacho ad mediam ejus partem plenam, reliquum ad fauces usque, implebatur & distendebatur muco spumoso, subflavo, cum radicum frustulis: circa fauces inflammata erat, forte à violenta intrusione: in fine una alteraque macula rubra apparuit.

Ventriculus ovi gallinacei amplitudine, plenus erat radicum, quæ multo muco pellucido involvebantur; sublatis contentis & deterso muco anfractus, maximè infundo & ad latera, rubebant; antrum pylori album fuit, ita tamen ut non procul à pyloro appareret macula rubra.

Intestina sub pyloro ferè vacua erant, continentia unum atque alterum frustulum radicis, oblita erant muco flavo, qui ultra ulnam, nunc magis nunc minus obducebat intestina, citra ullum aliud corpus.

In reliquo ductu, ad quadrantis distantiam à valvula ilei, mucus copiosior aderat, atro flavescens: in portione ad valvulam mucus adhuc copiosior, cum recrementis subnigris. Cæcum & rectum prorsus vacua fuerunt. In hepate, renibus & liene nihil notatu dignum occurrit. Vesicula biliaria turgebat felle flavâ. Pulmones albicabant. Sanguis ex cava ascendente emissus, pulchrè rutilus fuit, qui brevi in grumos concresebat: inflatâ cavâ ambæ auriculæ cordis movere se coeperunt, & aliquan-

aliquandiu rythmos continuarunt. Cordis ventriculi sanguine vacui fuerunt, fortè ob prægressas hæmorrhagias & inflationem. Thoracis ductus lymphâ plenus fuit cum pauxillo chyli: Cerebri ventriculi omnes vacui erant: at quatuor sinus implebantur sanguine atro in grumos concreto: similis continebatur in basi cranij, eo loci ubi rete mirabile reconditur.



Scholium ad Hist. VI.

IN hac historia multa occurrunt pertinentia ad illustrationem & confirmationem præcedentium. *Cicuta* maturè se ostendit acrem & calidam, vomitu & valido nixu ad vomitum; spumæ extrusione; atque manifestè exsecutione patuit vis inflammatoria, ex rubore in gulâ & ventriculo excitato, item maculâ rubrâ in fine gulæ & pyloro. Innotuit spumam à ventriculo in fauces pelli, quia gula ad fauces impleta erat. Citò supervenientia hæc symptomata, monstrarunt tunicam crustaceam, raram & teneram, cicutæ spicula eludere non valuisse. Convulsio particularis demonstravit Præsidem systematis nervosi hanc moliri aliquandiu, antequàm totum in tumultum ageret, ut fecit in illis qui post herniotomiam epileptici facti fuerunt: Epilepsia fortissima subsequens documento est, hanc à Præsidente imperari aliquando, gravissimè afflictâ ultimâ nervorum expansione, cum nihil tam brevi temporis intervallo, ad cerebrum de succo radicis penetrarit, quamvis unum alterumvè frustulum radicis ad intestina pervenerit, cum integræ, nec dissolutæ essent. Præses suâ sponte nullis elixiribus refectus, à tumultu cessans, docuit vel aliorum avocatum, vel in opère fessum, sc. quandoque quiescere. Verùm plura de his memorare in seq. historia licebit. Sanguis fluidus demonstravit nihil [coagulativi cicutæ inesse: & licet extravasatus grumuerit, id tamen non cicutæ sed sanguinis indoli ascribendum esse.

Histo.

Historia VII.

Dle 5. Jun. 1677. lupæ prioris sorori uterinæ, magis vegetæ & robustiori, ventriculo jam lacte pleno, dedi horâ 8. matutinâ succi ex rad. & herba *cicuta terrestris* contusis, pauxilloque aquæ maceratis, elicti zvj. circiter. In omnibus planta hæc cicutam referebat, sc. figurâ, caule maculoso cavo, foliorum colore obscure virescente; nisi quod folia averfa, splendida essent. Hæc puellis venatoris cujusdam Doneschingani, non ita pridem, comesta, penè lethum attulit, vomitum, delirium & convulsiones excitando. Post epotum succum incedebat instar temulenti: latebras quæsit, multum dormivit: subinde ad vomitum stimulabatur, nunquam tamen evomit, nam ad fauces protrusa deglutiit, aliquoties alvum exoneravit, ejecitque cum vi quadam liquorem viridem succo persimilem. Crebro & multum minxit: semper æqualiter caluit: nunquam vagiit, aut dolentis, aut sitientis, aut esurientis signa præbuit. Horâ 1. pomeridianâ lac calefactum, digito ori indito, sugendum præbui, quod avidè hausit; vellicata instar canis ludentis murmuravit, & blandiens latravit. Multum minxit. Dormivit ferè continuò ad 5. vespertinam: expergefacta multum oscitavit, ac si somnum nondum absolvisset. Iterum lac mediante digito sorbendum dedi: digitum transversim, aut recta inditum, tam fortiter linguâ & faucibus undique corripuit, ac si digitum deglutitura esset. Post 6. vespertinam rursus iteratis vicibus, viridia & flava cum lacte coagulato excrevit, ac si purgans sumpsisset. Totâ nocte, se post velum parietis abscondens dormivit. d. 6. Junij mane horâ 4. famelica me quæsit, ac catelli instar famelici sequebatur, quorsum cumque gressus moveram: lactis pauxillo dato sèrursus ad quietem composuit.

Die igitur 6. Jun. manè horâ 6. succi radic. cicutæ aquaticæ. per noctem in aqua macerata, primùm unciam, & paulò post ultra uncias duas cum labore infudi: vix quadrante horâ elapso, succum penè omnem cum mucò copioso & lacte coagulato evomuit, & paulò post rursus mucum turbidum bis. Aliquoties ad 10. horam nigra seu atro virescentia, pultacea & viscida alvo deiecit. Ad vomitum sæpe urgebatur ac ore hiabat, nihil tamen prodiit, nam ad fauces ascendentem bolum deglutiit. Diu spuma, aut mucus copiosus ab ore pendeat: Tandem solummodo salivavit multum, salivâ tenui, pellucidâ largiter exstillante. Primum vagiit multum, sed voce submissâ & querulâ: irritatus murmuravit. Antè & aliquandiu post vomitum temulenti instar incedebat, circa 9. verò firmius: latebras quæsiuit. Hora 10. antimerid. lac rursus avidè, mediante digito expatina suxit. Horâ 11. & horâ 1. pomerid. cum vivida & vegeta esset, qualibet vice ultra unciam radicis cicut. aq. macerata in faucestrudi: post horam dimidiam plusquam dimidiam unciam evomuit: per alvum quoque bis egeffit plurima frustula radicis emollitæ, cum mucò turbido, fusco. Mansit hætenus satis adhuc valida, incedebat, solito more latebras quærens: æqualiter calida. Horâ 2. pomerid. dedi radicis cicut. aquaticæ non macerata, parùm in umbra siccata & minutim concisa, unciam circiter, paulò post ad vomitum urgebatur, solâ spumâ succedente, quàm sæpius os lambendo rursus deglutiit: crebrius urgente vomitu, tandem frustulum unum alterumque protrudit. Alvum aliquoties exoneravit, ac cum mucò fusco, turbido radicis maceratarum plurima frustula excrevit. Hætenus rarissimè vagiit, sæpius se quasi ad somnum composuit, ut dormire videretur: æqualiter caluit: oculos splendidos huc usque retinuit.

Circa horam 4. vesp. res ipsius in deterius labi cœperunt. Abdomen intumuit, instar temulenti incescit: ad vomitum stimulabatur: antequam vomeret, abdomen iterato valdè contrahatur,

hebatur, subitum & validum clamorem edidit, os amplissimo rictu dilatavit ac si oscitaret; mentum ad capulum sterni propè accessit; in hoc nixu primùm spuma prodiit, postea sequebantur frustula radices non maceratae, parum immutata & solummodo emollita, mucus irem pellucidus. Usque ad horam septimam aliquoties alvum solvit, faeces erant maximam partem radices maceratae, mucus fuscus, viscidissimus, turbidus, cui aliquid cruoris immixtum erat. Copiosè minxit, quod toto hoc die unquam factum fuisse non observavi: incessus erat languidior. Lacori illitum deglutivit quidem, sed mox vomitus sequebatur. Interea multum quievit, somnum simulans, adhuc aequaliter calida: attrectata protinus evigilavit, ac ad latebras suas quantum potuit properavit. Ad septimam aliquoties alvum exoneravit, faeces erant nunc solummodo mucus turbidus, subfuscus, aliquando flavus, nunc radices, quantum observare potui, adhuc ex illis, quas aquae prius infuderam. Minxit largiter: Urina clara erat, sed flava. Post septimam rursus os magno ritu dilatavit & vomere conabatur, mox minxit, largè emanante urinâ ac statim emissio valido clamore, humi vi quadam prostrata & à pariete cui innitebatur, ultra duos pedes in pavementum projecta, vehementissimè convulsa fuit: Paroxysmus verè epilepticus erat; caput retrorsum trahebatur, dorsum incurvabatur, artus validè nunc succutiebantur, nunc rigidi evadebant, abdomen nunc intumescibat, nunc contrahebatur, respiratio nunc inæqualis, nunc cum stertore peragebatur; oculos pervertebat; labia variè diducebantur, cauda mire agitabatur; in ipso paroxysmo per alvum radices excrevit: tandem respiratio penitus intercipiebatur, instarque mortuae rigida jacebat, spuma copiosa os obtegente: duravit paroxysmus fere ad sextam horæ partem. Superato paroxysmo in pedes surrexit, per aliquot passus incessit, cauda pede calcata murmur, ceu latratum, edidit & morsum intentavit: aliquoties sternutavit.

Vege-

Vegeta satis adhuc subinde pedibus insisteat, os & pedes lambebat; aliquoties faeces pultaceas, mucosas, atro virescentes excrevit: subinde quoque canis instar, capite pedibusque anterioribus ad latus inclinatis, ad somnum se composuit raro vagiit. Post 11. noctis paroxysmus diuturnior & vehementior rediit, quem praecessit conatus vomendi, cum amplissimo & diuturno oris rictu, abdominis contractione, eructatione sonora; item clamor validissimus: in ipso paroxysmo saepius caput valde pavimento allisit, per os mucum fuscum, cum portiunculis radicis non maceratae protrudit & alvum exoneravit, radicis fuscae particulis excretis: semel validum quoque ejulatum edidit: respiratio inaequalior fuit cum stertore, tandem prorsus cessare videbatur ac mortuae similima, copiosa spuma ab ore pendente. Verum & hoc paroxysmo finito vires recuperavit, ac in pedes surgere & incedere valuit. Ab illo tempore usque ad 2. matutinam, propè quolibet horam dimidia supervenit paroxysmus: omnes praecesserunt oris rictus; sonus quidam, ac si aliquid avidè lamberet, linguam palatum fortiter feriente & creberrimè, brevibus intervallis: nostri *Schmerzen* vocant: Clamor validus nunc latratui, nunc vagitui catellorum à matre desertorum, aut percussorum, nunc ululatus, lupis peculiari similis, qui saepè tam sonorus erat, ut aures impensè feriret & me dormientem excitaret: Aliquando singultus; saepè etiam eructatio sonora; abdominis contractio. In ipso paroxysmo urinam & alvinas faeces egressit: nonnunquam vomuit: spumavit copiose: tandem instar mortuae jacuit sine respiratione: finito paroxysmo, omnes sensus & motum recuperavit, at languida evasit & frequentius respiravit; subinde vagiit: pedes lambit, seque ad somnum adhuc componere valuit: Habitus calebat, at nasus & lingua frigesieri coeperunt.

Post horam 2. non amplius surgere valuit, semper alterutri lateri incubuit, artus continuè motu convulsivo succutiebantur:

bantur: aliquando rigeant, caput quassabatur, totus truncus curvabatur retrorsum, non raro antrorsum, cum oculorum perversione, labiorum torsione: respiratio aliquandiu intermittebatur ac propè mortua videbatur, mox tamen oculos aperire & respirare coepit, caput, quietum tenuit, manente motu artuum convulsivo. Hos paroxysmos præcesserant quoque vagitus aliqui, sed voce submissa, oris rictus, vibratio linguae versus caelum palati, singultus, eructationes sonoræ: Videbatur extra paroxysmos istos bolus quidam in colli parte anteriore, à capulo sterni ad laryngem, brevibus intervallis pelli & rursus suo pondere descendere. Inter respirandum crebra suspiria edidit: ipsa respiratio nunc tardior nunc frequentior evasit. Paroxysmos non raro præcessit rugitus ventris satis sonorus. Tum in his paroxysmis, tum extra illos, aliquoties per alvum radicum frustula excrevit cum mucos turbido fusco; subinde minxit, sed parum admodum: ex ore prodiit vel spuma vel mucus. Oculi splendidi manserunt: extrema frigere cum lingua coeperunt, habitu reliquo calido manente. Extra paroxysmos distentum fuit abdomen; quam primum verò contrahi coepit, doloris signa edidit, ad vomitum irritabatur ac ore hiavit, protinus novus aderat. Circa horam 5. d. 7. Jun. mane ante insultum & in ipso insultu, frustula aliquot radicis non maceratae evomuit. Paulò post cutim à capulo sterni ad os pubis & transversim ad ilia incidi, nulla doloris gravioris perpeffi signa præbuit, donec musculos abdominis & peritonæum discidissim, tunc enim caput motavit, artus tetano afficiebantur, vagiit parum & respiratio contentior reddebatur: nihil per alvum aut ex vesica excrevit. Sanguis ex vasis subcutaneis & musculis abdominis splendide rubescens, satis copiosus emanavit, statim concrevens.

Visceribus ventris in apicem productis, vidi ventriculum valde distentum, ovum gallinaceum magnitudine superantem, antèrius æqualem glabrum & propè pellucidum, ita ten-

sum ut reniteretur. Aliquoties ejus pylorus se ita constrinxit ut ejus regio minor multum appareret, durusque admodum instar cartilaginei globuli evasit: aliquando circa principium antri pylori constringebat se ventriculus, unde minor, rugosus & carnosior reddebatur; quàm primùm verò se explicuit, primam amplitudinem cum tensione acquisivit: pylorus, constrictione cessante, mollis & amplius evasit. Ventriculo magis in apicem deducto, vidi partem ejus sinistram $1\frac{1}{2}$ digiti distantia à stomacho pertinaciter constrictam, unde ventriculus quasi ex duobus compositus apparuit: Portio hæc trans constrictionem angustior, carnosior, & rugosior erat: ibi quoque foris inflammationis vestigia videbantur: relaxata hac constrictione parem cum dextra parte amplitudinem & superficiem acquisivit. Intestina flatuum plena erant, ac imprimis in Ileo radicum frustula per tunicas translucebant: corrugabantur subinde, minora evadebant, at valdè lente movebantur. Cœcum amplum incurvum, tensum à contractione non advertenter facta minus & durissimum, instar cartilaginis, evasit: In illo vidi maculas & strias minutas albas, ac si venis lacteis præditum esset. In omnibus apparuerunt foris vestigia inflammationis. Hinc inde quoque in illorum superficie, maculas quasdam latiusculas albas aliquantulum prominulas, sub quibus glandulæ intestinales, reperi. Hepar splendidè rubuit: Vesicula felle plena erat ac sine guttulam bilis effudisset: erat vitellina. Lien saturatè rubicundus videbatur. In mesenterio nullum vitium observavi. Renes pro animalis magnitudine majores: Carunculæ papillares rubræ. In pelvi parum urinæ aderat. Vesica vacua fuit.

Diaphragma in inspiratione corrugabatur in ambitu carnosio, & fibræ crassæ carnosæ veluti musculi lumbricales protuberabant; centrum verò nerveum convexum reddebatur; in expiratione planum totum evadebat. Ad latus rejecto ventriculo, in crure diaphragmatis, dum inspirationem auspicabatur, vidi

vidi illud rugosius fieri, nec ad modum intestinorum se movere, quod in animalibus vegetioribus accuratius observandum. Post denudationem viscerum imi ventris ferè ad septimam horam matutinam respiratio perduravit, cum cordis motu, ita tamen ut respiratio sæpè diu intermitteret, ac demum rediret post plures cordis pulsationes sua sponte, quandoque puncto centro nerveo. Sæpè magno rictu os aperuit ac aërem captavit. Vibrationem diaphragmatis in hac lupa non observavi. Emortua illa pectus aperui: Pulmones albicantes erant, & aëre pleni. Cordis ventriculi ambo sanguine turgidi, ut & vena cava: ex sauciata venâ cavâ & ambobus ventriculis emanavit sanguis copiosè, veluti liquor aqueus, qui brevi in grumos splendidè rubescen-tes concrevit sibi prorsus similes: neque in cordis ventriculis, neque in vasis majoribus vel minimum grumulum inveni. Os spumâ albâ plenum fuit. Gula longior quadrante ulnæ, indice latior multum mucis subflavi & spumosi continuit; prope laryngem hæsit frustulum radices non maceratae: deterlis muco & spuma sub larynge plurimæ glandulæ minutissimis osculis hian-tes, ceu ab acu inflictae, apparuerunt: similes in reliquo ductu observavi usque ad stomachum: quæ magis conspicuæ evase- runt, illâ per biduum in aqua macerata. Inflammationis vesti- gium apparuit luculentum in principio, ubi larynx incumbit & sub larynge, quam portionem inter intrudendum radices digito attrectaveram: præterea etiam in reliquo ejus ductu hinc inde rubor aliquis sparsim occurrit.

Gulâ separatâ ventriculus statim subsidit, ac dimidia propè parte minor seu angustior evasit. Continuit præter radicum non maceratarum frustula pauca, sc. vix sextam ingestorum par-tem, mucum flavum turbidum, & in antro pylori flavio-rem ferèque clarum & pellucidum. Ablatis contentis totus anfractu- osus erat, inflammatus maximè in fundo; ad latera minùs, circa stomachum magis quàm in latere & magis in sinistra parte in-

ferius, quàm in dextra. Antrum pylori non inflammatum erat, excepto limbo versus ventriculum spectante, qui leviculè quoque inflammatus erat. Intestina duas ulnas longa erant. A pyloro ad $\frac{1}{4}$ ulnæ mucus flavus apparuit; eo deterſo, minus inflammatum vidi: postea ad $\frac{1}{4}$ ulnæ chylus mucosus, crassus, turbidus, minus, flavus cum aliquot vermibus brevibus & latis continebatur, cum pauculis radicum frustulis: hinc ultra ulnam dimidiam continebantur plura frustula radicum, tum maceratarum, tum non maceratarum, cum mucro atro rubescence: in his majora, ampliora & conspectiora signa inflammationis apparuerunt. In reliquo ductu usque ad valvulam in extremo ilei, hujus muci atro virescentis major copia, ut & radicum, aderat. Intestina summopere inflammata fuerunt, imo jam atro rubescencia erant, maximè area glandulosa, 3. digitos longa & digito latior; hoc quoque intestinum etiam dissectum & per biduum aquâ maceratum, retinuit suas plicas transversas, ac si fortissime constrictum fuisset: Ubi cunque major copia radicum detinebatur, ibi intensior & amplior inflammatio in conspectum venit, quod imprimis circa ilei finem ad ulnæ dimidiæ longitudinem conspiciebatur.

A pyloro ad valvulam in fine ilei, quindecim rotundas & duas oblongas areolas glandulosas numeravi, quæ per biduum aquâ intestinis maceratis, omniquè mucro & tunicâ crustaceâ sublatis, tum foris tum intus admodum conspicuæ erant: quædam illarum atro rubescences erant: maximè in portione intestinorum inferiorum, ubi plura radicum frustula & diutius detenta fuerunt: ob ilei ibidem constrictionem.

Cœcum continuit mucum turbidum, album, chylosum: intus quoque inflammatum apparuit. Rectum continuit adhuc aliquid de radicibus cum mucro atro virescente, copioso, turbido: Anfractuosum, inflammatum intense usque ad extremum podicem.

Cerebri

Cerebri sinus omnes sanguine atro rubescente grumoso impleti erant: talem sanguinem quoque reperi in basi cranij, ibi ubi rete mirabile detinetur.

Ventriculi omnes mundissimi erant. Abscisâ medullâ spinali in superficie apparuerunt maculae rubrae.

Abrasâ tunicâ crustaceâ intestinorum, manifestè videre potui glandulas, non illi sed nervæ membranæ insculptas esse.

Ductus thoracicus lymphâ plenus erat, absque ulla chyli mixtura, fortè quia nimis tardè in illum inquisivi.

Tum temporis Doneschingæ, ob commissionem quandam, ut vocant, plures viri illustres ac literati aderant, sermoque de cicutæ viribus non semel fiebat. Cum ex *Cl. Bodæi à Stapel ad Lib. 9. Histor. Plant. Theophr. cap. 17. commentario* retulissem, *Cicutam* in Batavia non adeò lethalem esse, quia crescat sub Zona frigida & ventis diffletur, sequentia subnectere volui; eoque magis, cum clima, cicutæ virus non tollere putaverim, & plantæ virulentissimæ in locis frigidissimis, ex. gr. Thora, Neapelus, aliaque crescant, non minus damnosa illis, quæ in calidis regionibus nascuntur.



Historia VIII.

Generosus Dominus Baro de Blitterssorph, Doneschingæ 6. Junij 1677. narravit mihi, in agro seu ducatu Juliacensi magnûm proventum esse *Cicutæ aquaticæ*, crescentis ad margines lacuum & fossarum arcium; cujus frondes, si anseres juniores decerpant, protinus illos in gyrum circumagi & brevi emori: atque hujus causâ illam ab agricolis diligenter extirpari.



Scholia ad Hist. VII.

I.

Nullum haëtenus experimentum feci cicutâ terrestri, quia nec otium nec ansa experiundi illius vires concedebatur. Apud nos non crescit, quod equidem sciam: Nunquam ullum videre contigit, qui illam per errorem comedisset: nec venatoris puellis adstiti. In lupâ hâc, quamvis symptomata mitiora produxerit, prodidit tamen non contemnendis indiciis, se qualitate calidâ, irritante & fundente præditam esse, nam ad vomitum stimulavit, purgavit vi quadam, urinamque crebrò movit: præterea perspicere licuit vim narcoticam ipsi inesse, nam temulenta evasit, multumque dormivit, non ob sanguinis aliquam & spirituum congelationem, quam frequentior mictio, irritatio ad vomitum & violenta liquoris viridis excretio alvina, nullo modo locum habuisse arguunt. Confirmare potius videtur meam opinionem sc. à narcoticis sanguinem attenuari, atque aquea cum spirituosâ ejus portione profundius in medullasam substantiam cerebri irruere, atque hâc ratione somnum & temulentiam parere. Nulla graviora symptomata lupa à sex unciiis liquoris copioso cicutæ succo imbutis passa est, tum quia tunica crustosa ventriculi nerveam contra illius virulentiam probè munivit, tum quia virus per secessum iteratis vicibus maturè excrevit, nec concessum fuit diutius ventriculi & intestinorum tunicis adhærere; liquor enim per alvum ejectus, nihil nisi succus iste infusus fuisse videtur. Virus ejus fortè etiam lac in ventriculo præexistens obtudit. Post aliquot horas rursus appetiit, quia nullam labem tunicæ nervosæ ullibi impressit.

2. Nolo repetere argumenta in hac observatione occurrentia, quæ *Cicutam aquaticam* omnino calidam & acrem tam clarè

clarè probant,quàm clarum est sole in meridie splendente: certè quem *φανόμενα*, in lupa tum vivâ tum mortuâ visâ, non persuadent, nullis rationibus vinci poterit, sed aut ipsemet experiundo aliquid conetur, aut naviget Anticyram.


3. Lupæ isti epilepsia tardè supervenit, sc. demum horâ decimâ tertiâ post succum cicutæ aquaticæ infusum, non solum propter tunicam crustaceam robustiorem, verum potius ob vomitus & dejectiones frequentes, quibus succi maximam partem, vix quadrante horæ elapso ab infusione, iteratis vicibus cum lacte coagulato excrevit: & aliquoties atro virescentia, pultacea, viscida ad horam decimam antimeridianam egressit. Radicis maceratæ frustula horâ 11. antimeridianâ & primâ pomeridianâ intrusa brevi partim evomit, partim copiosè per alvum egressit, unde ad 2. pomeridianam vegeta & valida perstitit: fortè etiam lac acrimoniam succi & radicum multum infregit. Radices horâ 2. pom. in umbra siccata jam plus negotij facessere inceperunt, tum quia nullo lacte attemperabantur, tum quia post tot succorum infusiones & radicum intrusiones, ventriculus & intestina jam laucia à cicutæ spiculis essent. Nondum tamen epilepsiâ agitabatur, quamvis non obscura anxietatis indicia præberet: nam aliquoties radicum frustula per vomitum & secessum rejecerat: Circa septimam vespertinam demum ipsam invasit, sc. postquam membranæ nervæ ventriculi & intestinorum inflammatio invaluit, virusque cicutæ laceßere non desit. Hanc ipsam epilepsiam etiam in lupâ excitatam arbitror, membranâ nervæ ventriculi & intestinorum potius quàm nervorum principio afflicto, *Præsides* seu *Archeos* rebus conclamatis subsidium afferre conante, postquam ventriculi & intestinorum fibræ, hostem necem intentantem omnibus suis moliminibus amplius profligare nequiverunt: nam omnes paroxysmos præcesserunt signa dira patientium, ventriculi & intestinorum, clamores validi, rictus oris amplissimi, conatus vomendi, abdominis
contra-

contractiones: fortè tum intestinorum, ut in colica, & pylori, ut in cardialgia, constrictiones vehementissimæ fiebant, undè dolores exacerbabantur summopere, & revera ventriculi medio ac pyloro tale aliquid evenisse, lupâ dum viva erat apertâ, videre & tangere potui, in medio enim ventriculus coarctabatur & angustior fiebat, pylorus minor & instar cartilaginis durus reddebatur, quin etiam post mortem in intestinis harum constrictionum vestigia reperi; quæ necessario membranâ nervæâ inflammatâ, flatibusque in angustum conclusis, non nisi summè dolorificæ esse potuerunt. Hi ipsi prodromi quoque motus convulsivos præcedebant & comitabantur, postquam non amplius universum corpus convellebatur. Non nego cicutæ particulas ad massam sanguineam & hinc ad cerebrum, cerebellum, imo ipsam spinalem medullam pervenisse, quas partes omnes vasa sanguifera intrare alibi ostendi, & in hujus lupæ medulla spinali patuit: nam radices & succus ad intestina pervenerunt, multum minxit, temulenta reddebatur; attamen illas nervos circa originem non irritasse existimo, non propterea quod cerebri ventriculi omnes mundissimos invenerim, sed potius quia nihil extravasati liquoris circa originem spinalis medullæ vidi; utcunque enim medullosa substantia pravo succo imbuatur, nisi membranæ, imprimis circa nervorum, spinalisque medullæ principium vellicentur, vix convulsiones oborituræ me persuadent primum, crebra experimenta in ranis facta: in his cerebrum denudavi, spiritu nitri attigi, nihil unquam convulsi sequi batur; quam primum verò crura medullosa leviculè stilo, quem spiritu hoc madefeceram, tetigi, protinus convellebantur. Deinde bis vidi cerebrum vulneratum fungosi aliquid, & saniem non paucam protrudisse sine ullis convulsionibus supervenientibus. Denique si particulis à cicuta profectis & sanguini permixtis, convulsiones & epilepsia adscribenda esset, illam statim post succum inglutitum produxissent, nec tum demum, postquam omnia

omnia in ventriculo & intestinis inflammata fuerunt ; nec paroxysmi ad 13. horam dilati fuissent. Præses iste tumultuando, furlum deorsumque omnia ad hostem excutiendum movendo cessavit, non quod stimuli penitus evanuerint, sed quia fessus erat, multumque spirituum, quorum subsidiariâ ope indiget, dissipatum fuit, aut quia non pari ferociâ, constrictione ventriculi & intestinorum laxatâ, urgebatur : Invalescentibus verò inflammatione & constrictione crebrior rediit, & cum, magnâ spirituum jacturâ factâ, extremis jam frigidis, epilepsiam perficere non posset, ultimus ipsius conatus, motus convulsivi erant. Non autem in motu substitit, spiritibus aliunde resectis, nam nihil massæ sanguineæ amplius accessit, unde instaurati fuissent, quin potius illa passa est, quæ majorem stragem spiritibus adferunt.

4. Respiratio in lupa hâc diu intercepta, exemplum præbet illam quandoque cessare posse superstite vitâ, non ob pulmonum aliarumque partium ad respirationem pertinentium vitium aliquod, sed ob convulsionem ; nimirum & in hâc lupâ diaphragma, muscoli intercostales & nervi pulmonici communi calamitati involuti fuerunt, postquam Præses universalem convulsionem machinatus est : sanguis pulmones transiens non congelatus, nec ejus spiritus à cicuta extincti fuerunt ; nam cessante paroxysmo citra ullam restorationem spirituum respiravit, & sanguis ex dextro ventriculo, dum adhuc calebat, instar aquæ fluidus, emanavit. Cæterum diaphragmatis motus ulteriorem inquisitionem meretur, quod sublati intestinis & ventriculo, ligatâ venâ portæ, ac arteriis coeliacâ & mesenterij commodè perageretur.

5. Ex contractione ventriculi tum in lupa, tum in animalium aliorum vivorum sectione vomitus fiendi rationem didici.



Scholium ad Hist. VIII.

ANserum circumgyrationē à comestis frondibus *Cicuta aquatica*, convulsivam conjicio, ex morte brevi subsequente, ac inde illam etiam sub hoc climate non minus lethiferam existimo, quàm istam quæ in viciniis sylvæ Martianæ & Abnobæ montis planitie crescit, loco quoque satis frigido & ventis perflabili.



Historia IX.

Aquila mures capientis Anatome Doneschinga.

Diem 2. Sept. 1676. Manè post 7. sclopeti globulo alæ sinistrae os humeri fractum ipsi fuit, ut viva caperetur. Ante octavam radicis cicutæ aquaticæ ʒij. minutim concisas intrudi: post dimidiam horam elapsam mirè angebatur, hinc inde subsultabat: postea aliquoties vomuit: Vomitu rejecta erant cutis pilosa talpæ, frustula carnea talpæ cum osse femoris, multumque muci: Alvum quoque sæpius exoneravit. Hinc languida fuit nec pedibus amplius diu insistebat, nisi irritata, tum enim per aliquot passus incedebat. Respirabat celerrimè hiante ore & exsertâ ac tremulâ linguâ. Ante 10. antim. denuò ʒij. hujus radicis intrudi. Postea non amplius vomuit; plerunque prona decubuit, capite tremebat, hiante ore; circa 11. iterum surrexit, stetit diu clauso rostro, quasi immobilis uno in loco, rostro se ad parietem firmans, postea rursus subsidit. Supinè locata aliquandiu jacebat immota, celerrimè respirans, hiante ore, postea magna vi rursus se volutabat. Oculi semper vividi erant, quos quaqua versus movebat, obvia quæque observans: unde quoque irritantes rostro petebat. Cerevisiarij famulum unguibus sauciavit: baculum obtrusum

trufum firmissimè arripuit, ut ægerrimè ipsi eripi potuerit. Tempore prandij se mirè hinc inde jactasse, ex cruore vulneratæ alæ per pavementum conclavis disperso conijcere potui. Circa 1. pomerid. plerunque decubuit: rarò surrexit. Circa 2. pomerid. truncatis unguibus & alligato capite, ipsius abdomen incidi vi. væ adhuc. Vidi ventriculum prorsus corrugatum, longèquè minorem, attamen multo crassiore illius ventriculo quam ante triduum secui: vix animadvertenter se constrinxit. Intestina maximè superiora ampliora erant: subinde se hinc inde constringebant, non tamen lumbricorum instar, sed nunc hic, nunc portio illic: minora subinde inadvertenter amplius gracilescabant.

In expiratione in dextro & sinistro latere, membranulæ illæ, quæ diaphragmatis vices obeunt & supra pulmones extensæ, usque ad pubem utrinque pertingunt, ut & transversæ inter hep. & ventriculum sitæ, intumescabant & vesicæ instar seu veli inflabantur: in inspiratione tendebantur: in membranulis his tensis observavi fibras rectas: in inspiratione non solùm pectus & costæ, sed etiam muscoli laterales, abdomini incumbentes, attollebantur: in expiratione concidebant. Musculis istis lateralibus transversim dissectis, celerrimè respiravit atque magno nixu. Tum quoque validissimè toto corpore se movit, capitis vinculum abruptit ac è mensa se præcipitavit. Cor vehementer se movit: vidi quæ cavam à jecore ascendentem se instar auriculæ systole & diastole movere. Cùm ferè per duas horas abdominis & pectoris visceribus denudatis adhuc vixisset, v. alide quæ pedibus reniteretur, quoties vel carnem vel os secui, conspexit per membranas, diaphragmatis vices agentes, pulmonum aliqua intumescentiâ, membranas illas discidi: in pulmonibus utrinquè duo foramina ovalia pili capacia & alia minuta vidi. Discissis istis membranis celerius & laboriosius respiravit ore admodum hiantè, rimâ quæ laryngis patentissimâ, & costas altissimè

tiffimè sustulit. Paulò pòst respiratio intermisit aliquoties, moxque rursus illam validè auspicata est. Subinde quoque cor languidius movebatur. Antequàm respirare desit, tetano validissimo correpta fuit, qui brevi duravit. Postquam respirare desit diù adhuc cor totum, hinc auriculæ ambæ, tandem sola dextra & vena cava adhuc movebantur, etiam tunc quando abscideram venas & arterias axillares. Oculos ad ultimum halitum etiam post obitum diu lucidos retinuit. Toto tormenti tempore nunquam per alvum excernebat, quamvis intestinum rectum & cloaca plena excrementorum essent. Gula distentissima erat tota, maximè verò in medio, ac si ingluviem haberet, quâ alias istæ aves carent.

Emortuâ aquilâ exemi omnia interna à pharynge ad extremum alvi, sibi adhuc coherentia. Gulâ cum ventriculo & intestinis ad cœca separatis, primum gulam incidi: in ejus summitate inveni aliquot frustula radicis concisæ; quibus cum mucò deterfis vidi illam leviculè inflammata, & plurimis glandulis miliaribus præditam, quæ à pharynge ultra unciam unam dispergebantur. In medio gulæ & supra corpus tubulosum inveni cum frustulis radicis pellem talpæ, aliquot officula, carnem flaccidam & jam quasi in pulpam lutulentam, viscidam, subnigram subactam. Ventriculo à stomacho, ad pylorum cum portione intestinorum ad duas spithamas incisis, deprehendi ventriculum prorsus vacuum, valdè anfractuosum, ejus anfractus in fundo rubri & inflammati, superficie tenui erant. Intestini portio prorsus vacua erat: oblinebatur solum mucò flavo; quo absterfo levicule vidi intestina rubicundiora: in duobus locis inveni maculas atro rubescentes teruncij amplitudine, prope exulceratas, unam prope pylorum, alteram paulò inferius, non tamen ubi inferitur ductus choledochus. Reliqua intestina ad rectum usque prorsus vacua erant, nisi quod circa medium ilei duobus in locis vermes in glomerem compactos, eosque mor-

mortuos, & in fine illius strias quasdam oblongas faecum lutulentarum atrovirescentium seu liventium, picis instar cohaerentium invenerim. Intestinum rectum & cloaca plena erant excrementis liquidis, cum urina cretacea mixtis. In hepatis cavo manifestè vidi ductum biliarium hepaticum supra vesiculam biliariam incedere, & seorsim juxta pancreatis portionem sursum ad intestinum repere, aliumque manifestè fundo vesiculæ biliaris ex cavo hepatis emergentem inferi; inflatâ vesiculâ non quidem intumescibat, at ductu hoc vulnerato & inflato statim vesicula biliaria inflabatur.

Circa principium recti nullam valvulam reperi, solum recti principium amplius erat, sine ilei, atque in illo manifestè apparebant duo ostiola in cœca patentia: rectum anfractuosum erat prope finem: ibi quoque limbus discernens rectum à cloaca, in extremo cloacæ alia valvula erat, dimidiâ unciâ distans à podice. Juxta valvulam hanc in sinistro latere ostium facilè reperi in oviductum, qui circa finem anfractuosus in superficie interna fuit, in reliquo ductu fibras rectas habuit: oviductus spithamâ longior: pennâ anserinâ amplior: in summitate patulus, digitum parvum inflatus admittens, ibique fibris circularibus præditus: ab ovario multum distabat, ut mirum quomodo moveretur & accederet ovario ad ova arripienda: intus muco pellucido oblitus erat. Ovarium situm sub hepate inter superiores renés. In quolibet latere tres renes sunt, à quolibet procedit unus ureter qui in unum abeunt. Lien globosus est, avellanæ magnitudine, situs inter hepar & ventriculum: rubicundus. Pancreas duplex habuit inter jejuni portiones situm, ex quibus manifestè ductum seorsim incedentem ad intestinum. Asperâ arteriâ inflata pulmones non intumuerunt. In cordis dextro ventriculo parum omnino sanguinis grumosi, in sinistro propemodum nihil inveni: Nam multum sanguinis ob fauciam alvum, tum ob sectas axillares venas & arterias vivente

adhuc

adhuc & se motitante corde profudit : ut & propter vasa sanguifera iliaca secta.

Macerato ventriculo per d.2. in aqua, absterfo muco, vidi manifestè membranam nerveam in fundo : Corpus tubulosum quoque intus rubicundius erat, quàm convenit, in illo hinc inde maculae erant flavae lenticulares, ac si ambustae fuissent. Gula propè corpus tubulosum quoque inflammata erat, ut & circa principium.



Scholia ad Historiam I X.

1.

Aquila hæc minor aquilis duabus quæ in arce Donefchingana enutriuntur, ac ex petrarum genere creduntur, multo major milvo, etiam gallo gallinaceo. Venatores has vocant *Manser* seu murivoras, quamvis præter mures, lepuseulos, vulpeculas, perdices, anates juniores aliasque aviculas capiant & devorent. Figura similis ei exstat apud *Cl. Jonston. de Avib. l.1. Tit.1. Tab. V.* sub schemate Avis scythicae.

2. Quamvis aves etiam carnivoræ, crustaceam tunicam in ventriculis densiorem habeant homine & quadrupedibus, nihilominus *Cicuta aq.* brevi in membranam nerveam vim suam exseruit, ac se non torpidam testata est; anxietates, subsultuum causas, vomitus & diarrhoeam effecit. Languorem, decubitum in pectus, capitis tremorem, respirationem celeriore hiant ore & tremulâ linguâ, adscriberem potiùs ventriculi, gulæ & intestinorum afflictioni, quàm spirituum alicui jacturæ, aut sanguinis depravationi : nam etiam postquàm secunda vice radix intrusa fuit, oculos vivacissimos quaquà versus movit ac baculum firmissimè arripuit, & viva etiam aperta insigne robur prodidit, diuque retinuit. An convulsa fuerit, cicuta culpâ, certò dicere

dicere non possum, quamvis mirè, dum prandio intereram, se jactasse ex cruore per pavementum conclavis facilè divinare potuerim. Tetanus ille potius evenit propter membranas diaphragmatis vices obeuntes discissas, aquilâ, respiratione propè interceptâ, ad summas angustias redactâ. Fortè tamen supervenisset tandem, si dissectionem ulteriùs distulisset, cum ultimam radicum portionem non evomuerit, ac gulam, ventriculum & intestina jam inflammavit & maculas rubras inusserit.

3. Hujus generis aves carnivoras vomere aliis vicibus vidi: Venatores, quando falcones, accipitres similesque minus avidè cibo inhiant, vomitum & alvum moventia quandoque ipsis ingerunt; vidi aves minores objectas fuisse, quæ cum peninis inglutitæ protinus vomitum cum iuvamine moverunt. Vomitus facilè peragere possunt, cum ventriculi fibræ propè carnosæ sint, quas teneræ quidem gulæ fibræ, attamen robustæ, adjuvant, & non secus ac ex ingluvie, contenta elidunt, gallinarum, columbarum & similibus more.

4. Caro flaccida & jam in pulpam lutulentam, viscidam & subnigram subacta, argumentum est etiam in avibus alimenta in ventriculis verè à fermento dissolvi, non solum atteri ac ex illis attritis, accedente fermento, succum ceu ex contusis amygdalis, affusâ aquâ cremorem elici & exprimi. Hoc confirmant etiam fæces intestinorum, in quibus nulla vestigia carniū vel ossium comparuerunt.

5. Oscula pulmonum patula, ostendunt citra detrimentum animalis aërem in inspiratione ad cavitatem pectoris penetrare, imo in avibus abdomen implere posse, atque illas aërem ex imo ventre in expiratione ducere.

6. Oviductus ostium supremum, ut cunq; ovario non continuum sit, imo multum ab illo distet, quia nihilominus ova arripit & inglutit, non absurdè statui docet, si asseratur extre-
mam

mam tubam *Fallopianam* in aliis animalibus ova ex testiculis foemininis quoque abripere, ac ad uterum deferre.

7. Ductus bilarius hepaticus vesiculæ bilariæ insertus, viam monstrat per quam bilis ad vesiculam bilariam feratur. Similem ductum vesiculæ insertum prope collum in hepate bubulo, casu inveni, dum vermis, quibus hepatici refertissimi erant, caput per ejus osculum in vesiculam exseruit; Laniones hirudines vermes istos vocant. Quia minuti sunt, eorumque insertio obliqua est, non mirum paucis hujusmodi ductulos innotuisse. Inde quoque patet obturato collo vesiculæ bilariæ non sequi icterum, nisi ductus communis quoque obstruatur. Sic aliquando lapidem insignis magnitudinis in foemina, in alia plures inveni in vesiculâ bilariâ, quarum neutra jctERICA erat.



CAPUT XI. De Napello.

Historia I.

Napello trium circiter septimanarum cum *Nob. D. D. Heinricho Scretæ à Zavorziz*, 14. Jul. 1676. radicis *Napelli* recentis bene contusæ drachmam dimidiam cum lacte, horâ 2. pomeridianâ, intrudi: aliquandiu incessit ac si nihil delecterii accepisset, subinde vagiit, quandoque caput succussit, quasi nausearet. Præteritâ propè horâ dimidiâ pedes posteriores traxit, paulò post ingressu ad latus sinistrum inclinavit, atque sæpius in illud lapsus est: subinde totum corpus motu convulsivo concutiebatur. Non diu post evomuit lac spumeum & aliquomodo grumosum. Motus convulsivi aliquandiu continuerunt; hinc in latus decubuit: non obriguit à tetano: decubuit instar moribundi ultra duas horas ab accepto *napello* & quasi suspiciosè vagiit. Ab domo intumuit: illo inciso fortius vagiit & validè artus movit.