

5. Mirum vermes in intestinis ad quæ quoque *napellus* pervenit non necatos fuisse, siquidem ipsi tanta vis deleteria insit. Fortè vel murium vel muscarum, *Napelli alexiteriarum*, naturâ dotati erant. Si omnino tales muscæ aut mures existant aut illis fidendum sit.



CAPUT XII.

De Cocculis.

DE quibus Vid. *Cl. Johan. Bauhin. Historiar. Plantar. l. 3. cap. 155. p. 348.*

Historia I.

Feli masculo adulto d. 28. Decembr. 1677. horâ 9. antimeridiana jejuno dedi præsentibus *Exc. D.D. Heinricho Scretæ* & aliquot Candidatis & studiosis Medicinæ *Coccularum* contusarum & cum jusculo permixtarum drachmas duas. Cochleatim infundimus jusculum, cujus magna portio antequam deglutiret ex ore effluebat, protinus tamen mucosum factum vidimus, nihilominus prope drachmam in ventriculum admisit. A vinculis liberior os lambit. Statim post intrusum jusculum, instar canis cursu longè defatigati, celerrimè linguâ exsertâ & hiantē ore respirare cœpit & paulò post quasi exterrita succutiebat. Vix octante horæ elapso convelli cœpit & primum convulsa jactabatur ad pedis unius & duorum distantiam; tum inter convulsiones, tum ab illis libera sæpius lamentabilem vocem edidit: spuma salis copiose ex ore stillavit: semel manifestè vomere conabatur: nunquam alvum solvit: nec multum eminxisse observatum fuit, quamvis permiçtiones importunæ ipsam ad cocculas damnarint.

rint. Paulò post convulsiones invaluerunt creberrimis paroxysmis & omnis generis, imprimis *ὀμφίλονος* & tetano; non raro solummodo pedibus tremebat. Post paroxysmos aliquoties ceu mortuus jacuit. In ipsis paroxysmis & dum à convulsionibus liber erat, sæpius nullum motum cordis, nullamque respirationem animadvertere potuimus: ambo motus nunc sponte, nunc compresso & constricto atque etiam succusso pectore redierunt, statimque rursus convulsiones ordiebantur pari vehementia: inter convellendum cauda mirè intumuit & arrecta fuit. Ferè ad extremum vitæ oculi splendidi fuerunt; circa finem vitæ retrahi videbantur: tunc quoque jam diu mortuus credebatur; post succussiones tamen denuò iteratò convellebatur atque vocem querulam, sed submissam, edidit.

Ante 10. antimeridianam vivere desiit. Aperto abdomine ventriculus rugosus & anfractuosus quasi conspiciebatur, ac circa principium antri pylori aliquantulum contrahebatur & coarctabatur, sed motu lentissimo; paulò post amplior & superficies planior evasit, diuque talis mansit & non nisi leviculè se subinde contrahendo & corrugando mutabatur. Intestina à pyloro ad finem recti diu motu peristaltico movebantur, qui motus nunc à pyloro supernè, nunc infernè, nunc circa medium incipiebat, & nunc sursum nunc deorsum vergere videbatur, idque diu, quamdiu sc. intestina calebant.

Venæ gastricæ, epiploicæ, mesentericæ & porta admodum sanguine tumebant. Intestina motu peristaltico contracta durissima & quasi cartilaginea videbantur: foris conspicui erant, præter rugas circulares, etiam sulci recti. Cavum hepatis rubicundius erat parte convexâ, atque ibi manifestè apparuit illud ex minutis glandulis compositum. Vesicula biliaria bile virescente turgebat. Pancreas molle mansit. Lien saturatè rubescebat: Renes pallebant. Aperto thorace, pulmones sinistri lateris subalbi cum aliquo rubore permixti, in dextro latere rubicundiores

Aa

erant:

erant : in utroque latere lobi inflati erant , adeo ut pulchre in ipsorum extremitatibus *Vesicula Malpighiana* conspicerentur ; Vena cava ascendens & descendens , item azygos & intercostales sanguine valde distenta erant. Cor ejusque auriculae sanguine admodum turgebant ; dextro ventriculo inciso copiosus & fluidissimus emanavit ; ex sinistro verò , supernè presso corde , cum impetu profiliit : in neutro ventriculo vel auriculis ne minimus quidem grumulus observari poterat , cum tamen extravasatus brevi grumesceret.

Ventriculo à gulâ ad pylori finem supernè inciso , ipsum plenum muco viscido cum jussulo & *coccularum* pulvere mixtis invenimus ; quibus deterfis anfractus albicabant , & alicubi paululum magis quàm alias observatur rubebant , non tamen manifestè inflammati erant. Intestinis à pyloro ad finem recti incisis , sub pyloro in duodeno pauxillum de jussulo muco permixto offendimus. In reliquo ductu ad finem ilei ne minimum vestigium harum apparuit : imo omnia vacua & exsucca erant , mucusque ipse paucus & condensatissimus fuerat : reperimus vermem unum latum , adhuc vivum & plures lumbricos teretes. Circa insertionem ductus bilarij & pancreatici , nec bilis vel alius liquoris guttula visa fuit. Intestinum cœcum & principium recti , plena erant substantiâ pultaceâ pallidè flavescente : in fine recti aliquot scibala sicca & indurata detinebantur. Rectum à sordibus mundatum intus rubicundius cum suis anfractibus fuerat ventriculo.

Inclinatis pulmonibus ad latus vidimus per ductum thoracicum , lympham omnis inquinamenti expertem transperere.

Scholia.

Scholia.

1.

Cocculas acrimoniâ linguæ papulas ferire quilibet, illis leviculè admotis experiri potest, atque in hoc catto manifestè patuit, dum quamprimum unum alterumve cochlear, jusculo pulvere illarum permixto, mucus copiosè tum solus tum cum ingestis emanavit. Acrimoniæ & rofionis effectus quoque erant dolor quem & antequam convulsiones erumpebant, & postea querulo & vehementi clamore prodebat; deinde succussio totius, quasi vellicando subito exterritus fuisset: denique convulsiones brevi emergentes, illæquæ atrocissimæ & frequentissimæ, neutiquam exinanitioni, cuiusmodi nulla unquam facta fuit, multo minus impletioni, cum intra ventriculum perstiterint, adscribendæ.

2. Convulsiones evenerunt non principio nervorum afflicto, cum quicquid jusculi *coccularum* pulvere imprægnati ingestum fuerat, omne intra fines ventriculi includeretur, nec quicquam ad intestina pervenerit, nisi pauxillum quod sub pyloro in duodeno occurrerat, forte illuc detrusum dum forfex per pylorum adigebatur, nam quamvis emortuo catto intestina diu motu peristaltico sursum deorsumque moverentur, motus nunc à pyloro, nunc infernè inciperet, quin etiam principium antri pylori coarctaretur, nihil tamen de jusculo hoc in reliquo duodeno, aut cæteris intestinis reperiebatur, imò adeo ex succa erant, ut in illorum cavo nihil ex vesicula biliaria, nihil ex pancreate, nihil ex glandulis intestinalibus proliceretur, quod utique factum fuisset, cum vix in os ingestum, copiosè salivam moverit. Dein lymphæ nitidissima, omnis coloris peregrini expers in ductu thoracico conspiciebatur. Denique vix octante horæ

Aa 2

elapso

elapso aderant convulsiones, quo temporis spatio brevissimo vix tinctura à muco viscido è *cocculis*, iusculo etiam frigefacto, commixtis elici potuisset. Accessit his arctissima gulæ & stomachi constrictio, unde nec vomuit nec purgabatur; cuius contractionis etiam vestigia post mortem apparuerunt. Certè si tinctura ad intestina & hinc ulterius emanasset, etiam vermes necasset, ex quibus imprimis lumbricus latus manifestè vivebat, quibus procul dubio æquè ac piscibus, pediculis aliisque insectis funestus est. Multò minus evenerunt convulsiones, nervorum ductibus & plexibus inter cerebrum & ventriculum intermediis, affectis, cum illuc non nisi cum sanguine tinctura pervenire potuerit, quod prius affecto cerebro & cerebello neutiquam contigisset.

Cum igitur neque principio nervorum, neque ductu intermedio affecto convulsiones factæ fuerint, necessariò excitatæ fuerunt, illorum extremitatibus ad interiora ventriculi, imprimis ad stomachum & pylorum desinentibus afflicti, ab acrimonia & mordacitate *coccularum*, quæ vel solâ affricione subito suam vim in linguâ exferere solent. Non equidem ventriculum *Cocculæ* multum inflammaverunt, multò minus exulcerarunt, quod fortè ob brevem moram in ventriculo & citam mortem factum fuit, nam antequam hora elaberetur vivere desiit: nihilominus in tam brevi temporis spacio, superficiem muco copioso munitam, rubicundiorē effecerunt, deteriorem labem allaturæ, si diutius in ventriculi interiora virus suum exferere, ac se vire licuisset. Extremitates afflicte in consensum rapuerunt ramulos vagiparis medii ventris visceribus inservientes, unde statim post infusum iusculum, concitatissimè cum lingua exserta & anxietate quadam respirare cogeatur: paulo post in consensum rapta fuit medulla oblongata, unde vehementissimæ convulsiones, quibus etiam totum corpus à statione sua ultra duos pedes jactabatur, eveniebant, quæ etiam per momenta invaluerunt. Oculis aliquandiu suis nitor perstitit, quia cerebrum minus in principio

patie-

patiebatur, quod tamen in posterum non immunè perstitit, tunc sc. quando oculi retrahebantur, nec compulsus, concussus, vellicatus aliquandiu ante obitum, ullius rei sensum se habere testabatur. A paroxysmis aliquales, sed breves, induciæ concedebantur, quia spiritibus dissipatis motum nullum efficere aliquandiu poterant; mox tamen pristinam telam perficere, stimulis illorum extremitatibus, conabantur.

3. Mortuus est non ob narcosin aliquam, cum convulsiones, ad extremum vitæ durantes, nullius stuporis indicium sint, & post paroxysmos torvè circumspectaret. Nec grumefactioni sanguinis causa mortis adscribi potest, cum post mortem sanguis in ventriculis & auriculis cordis, item in vasis majoribus fluidissimus manserit, nec vel minimus grumulus ullibi apparuerit. Potius causa mortis erat cor in motu suo penitus enervatum, quod partim factum fuit, dum ob fibrillas nerveas, vasis majoribus maximè arteriæ aortæ & pulmonibus circumjectas & constrictas, sanguinis expulsio impediabatur; partim dum à sævissimis & frequentissimis convulsionibus spiritus animales dissipati fuerunt, nam ante obitum non solum omnes muscoli languescebant, sed etiam cor ipsum in & post paroxysmum à motu cessabat, redibatque pressò corde aut succussò pectore: tandem sanguinem planè non amplius percellere valuit, quod testabantur ventriculi, & auriculæ cordis & venæ omnes etiam pulmonicæ, sanguine turgidæ. Mortuus est inter inspirandum potius quàm expirandum, unde vesiculæ *Malpighianæ* conspicuæ.



I.

Ab Exc. D. D. *Christophoro Hardero*,
communicata.

Die 8. Nov. 1678. cani venatico, novem ferè annorum, car-
noso tamen, valido & robusto *caccularum* in pulverem re-
dactarum drachmas circiter duas exhibuit. Elapso vix dum me-
diæ horæ spatio, toto corpore, ac si frigeret, tremuit: in hortu-
lum traductus gramen lambere, subinde devorare cœpit: brevi
ventriculus ad vomitum urgebatur, qui & paulò pòst sequeba-
tur: unâ atque alterâ vice stomacho per vomitum à cibis eva-
cuato, tremor artuum in motus convulsivos mutabatur: rictum
sæpius deducebat vero spasmus cynico: stans eructabat pluri-
mum salivæ tenuissimæ, ab ore pendulæ: motus ventriculi nau-
seabundus identidem rediit: tandem humi prostratus, horren-
das convulsiones universales ad quartam ferè horæ partem pas-
sus est. Tandem remittente sensim violentâ ista artuum exten-
sione & convulsione, (non tamen ventriculi, qui perpetuò ad
vomitum irritabatur & sine intermissione spumam eructabat)
paulatim canis se recollegit, caput erigere, surgere ac pedibus
insistere conabatur: quod tamen effectum dare minimè potuit,
sæpius enim recidit, pedesque posteriores corporis onus ferre
recusarunt; vacillavit instar temulenti, oculi caligine suffusi, ut
oblata & accedentes non videret, nec acclamantes audivit. In
hoc statu ferè per horam mansit. Postea in secundum paroxys-
mum epilepticum delapsus est, priore tamen mitiorem & bre-
viorem, quo cessante sensim reviviscere cœpit, robur artubus
restitit, firmo talo stetit, torpor, oculorum caligo & temulentia
discutiebantur, stomachus quievit, suâque sponte convaluit.
Globus sclopeti per caput trajectus vitam sustulit. Canis evi-
scerationi

scerationi subjectus ostendit in ventriculo magnam spumæ copiam & in fundo cibos : detergâ spumâ ventriculus non usque adeò alteratus vel inflammatus, at rubicundior debito erat : ut & intestinorum interna superficies : glandulæ verò nec prominentiores nec rubentiores erant : Nihil *coccularum* in intestinis occurrit.



II.

A Doctissimo D. *Melchior Hurtero*,
Med.Lic. communicata.

Die 8. Januar. 1678. horâ 1. pomeridianâ caniculæ viginti horis jejunæ, *coccularum* contusarum drachmas tres cum pane in bolos redactas exhibuit. Post quadrantem horæ oculis frequenter, ceu obdormitura, niçtavit, mox, ceu ab insomniis territa & expergefacta, caput succussit iteratis vicibus, os lambit, semel atque iterum oscitavit ; sequebantur vomitus ; primum evomuit cibi reliquias crassas & bolos ex *cocculis* ferè integros, hinc materiam pultaceam crassiusculam, postea tenuiorem flavescensem, tandem mucum tenacem album, cujus partem dimidiam ab ore pendentem resorpsit. Ab illo tempore valdè inquieta fuit, surrexit, mox rursus decubuit, frequenter os nunc lambit, nunc aperuit, nunc clausit & maxillas ac si manderet, versavit : exporrecto capite torvè circumspexit : parietes delingebat : celerrimè ceu à longo cursu defatigata, exsertâ & varie commotâ linguâ, respiravit, subinde murmuravit, caput succussit ; pedes tremuerunt : semel voce submissâ & ore propè clauso latravit. Nondum horâ elapsâ adhuc semel evomuit mucum tenacem spumeum, subflavum : pedibus anterioribus insistentens caput erexit, tremebundæ caput succutiebatur : subinde
totum

totum corpus motu convulsivo tentabatur : aliquandiu oculos unico objecto obversos immotosque tenuit. Post horam elapsam saliva copiosissimè ex ore ultra horæ quadrantem emanavit : stupida, ceu omni sensu privata, jacuit, nec baculo percussa ictus percepit ; interdum totum corpus concutiebatur, quandoque solum pedes posteriores tremebant, erecta stare nequirit : semel, instar canis ad iram concitati, murmuravit : tandem capite in terram extenso, clausis oculis, ceu somno obruta jacuit & paulisper quievit : somno finito surrexit, sensus omnes recuperavit, hinc inde cursitavit : & secundà à *cocculis* devoratis horâ, nihil adversi amplius passa est. Vegetæ post dimidiam horam *coccularum* drachmæ duæ cum iusculo carnis ingestæ fuerunt, quas post horæ quadrantem evomit, nullo subsequente alio symptomate, quàm iteratâ capitis succussione. Die 9. Januar. ter *coccula* non parva dosi datæ fuerunt : Primum ante meridiem, unde per alvum egressit fæces atro flavescentes. Post meridiem bis exhibitæ nihil nisi vomitum excitarunt. Die 10. Januar. ante meridiem rursus drachmæ tres *coccularum* intrusæ fuerunt, nullo subsequente symptomate notatu digno, quin potius unâ atque alterâ horâ elapsâ ipsi appetitus rediit, objectos cibos avidè devoravit atque integrè convaluisset, nisi ad nucem vomicam damnata & hujus vim expertura aliter ejus curiositati inservire coacta fuisset.



Scholia.

I.

Cocculæ symptomata in cane & canicula excitarunt invasionis ordine & sævitiâ, non disparia iis quæ *Cicuta aquatica* in hominibus, canibus & lupis effecit. In cane vomitum præcesserant tremor, ceu à frigore, vel potius rigor quidam : in canicula

nicula quidem vomitum antecessit quædam somnolentia, quam prodidit oculorum nictatione & oscitatione, quæ tamen non verè talis erat, nam caput succutiebatur mox sublequente vomitu; potius præ anxietate & gravissima ventriculi afflictione somnum simulavit, quam vehementem fuisse innuere videtur respiratio anhelosa, exsertâ linguâ. Post contenta ex assumptis, evomuerunt mucum viscidum, flavum, album, spumeum; insuper irritato successu diu ad ulteriorem vomitum stimulabantur, convellebantur particulariter & universaliter cum omnium sensuum amissione ac quietis artubus ceu sensibus orbi jacebant, quod imprimis in lupis à *cicuta* præstitum observavi.

2. Motus convulsivos in cane & canicula *cocculæ* excitant non egressæ ventriculi terminos, & solummodo ejus interiora affligendo, nam in cane intestina nihil *coccularum* post mortem ostenderunt, nec observatum fuit has per alvum secessisse: Canicula bolos ferè integros vomuit. Insuper manifestè Præses systematis nervosi primùm particulares convulsiones integris sensibus imperavit, antequam in furias artus Epilepsiam concitavit, quam stupor à spirituum animalium confusione potius, quam jactura excepit.

3. Symptomata in cane & canicula satis clarè probant *cocculis* inesse vim calefacientem & impensè irritantem nec Hel-leboro albo valdè dissimilem, quod etiam confirmat rubor superficie ventriculi & intestinorum sive à fermento ventriculi intestinis communicato & *coccularum* acrimonia imprægnato, sive à bile commota excitatus fuerit.

4. Utcunque *cocculæ* selem interfecerint citissimè ac plurimis animalibus lethiferae sint, canem tamen & caniculam larga satis dosi ingestæ, post superata vehementia symptomata denuo savientes interficere nequiverunt, fortè quia vetulæ erant ac fibras robustiores Cor nactum erat, quas non tam facile, ut in junioribus aliisque animalibus enervare valuerunt. Nec sanguis

ob motum Cordis vel abolitum vel admodum turbatum in vasis subsistens grumefactus fuit, aut si qua coagulabatur, nullum tamen valetudini damnum attulisset, quin potius citra alexipharmacorum aliorumve dissolventium usum supervixissent, nisi globus plumbeus cani & Nux vomica caniculæ vitam abstulisset.

5. Canicula superato primo acerrimo conflictu, minus postea à *cocculis* crebrius & copiosè ingestis lædebatur, nec tantum tumultus excitabantur, non quòd ventriculus in tam brevi & acerbo tyrocinio veneno aslueverit ac ventriculo familiaris redditum fuerit, nec quòd ventriculi membrana nervea stupidior facta adversùs injurias *coccularum* induruerit, nam eundem sensum quem priùs habuit, retinuit, appetiit, oblata avidè devoravit, sed potius propterea, quia ventriculi tunica mucosa, à muco poros ejus oblinente mundata, permisit, ut spicula *coccularum* citiùs membranam nerveam ferirent, unde insurgentes fibræ *cocculas* maturè eliminarunt per vomitum & secessum: fortè etiam multum fermenti benignioris in fundo ventriculi aderat, post longa irritamina ex arteriis elicit, quod acrimoniam *coccularum* infregit.



CAPVT XIII. De Nuce Vomica:

Historia I.

E Atello projectio trium circiter septimanarū, 16. Jul. 1676. limaturæ *Nucis Vomicae* drachmam dimidiam, hora secunda pomeridiana, cum Nob. D.D. Heinricho Scretæ à Zavorzix lacti permixtam infudi. Aliquandiu nihil p. n. observatum fuit, nisi quòd vagiret: elapso horæ quadrante caput subinde succutieba-