

procul dubio glandulae intestinales similem humorem stil-
lantes : nam nullum in actionibus mendum observatum fuit.

VIII.

Vermes hirudinum instar proboscide se internae intesti-
norum tunicae infigentes ac taniarum more ab illis pendentes,
monstrarunt in Hist. 3. rationem & modum, quo intestina, um-
bilicum & inguina perforant, hisque in locis exitum, quorum
omnium exempla etiam mihi in praxi obvenerunt, quærant
apertum sit.




CAPUT XIV.

De Helleboro albo. Historia I.

 Atello trium circiter septimanarum d. 14. Jul. 1676. circa
2. pomerid. cum Cl. D. D. Heinricho Sceta à Zavorziz, Hel-
lebori albi scrupulum lacti immixtum infudi, vix per
momentum admissum maximam partem evomuit & paulò post
flavum per alvum egressit: mox rursus aliquoties vomuit simul-
que convulsivis motibus variè jactatus fuit. Vix quadrante ho-
ræ elapso mortui instar in latus decubuit ac linguâ exsertâ mor-
tuo similis jacuit, movente se solum adhuc diaphragmate: pera-
ctâ horâ cum dimidia semimortui abdomen incidi, unde inter
secandum pedes movere & vagire cœpit: aperto abdomine, ven-
triculum flaccidum & rugosum invenimus: illo exempto cor
& diaphragma satis validè, sed per longiora intervalla, se move-
runt. In inspiratione diaphragmatis motus à cruribus incepit,
ibique in tumorem abdomen spectantem attollebatur, super-
nam planitiem expandebantur, eamque tensam, ita tamen ut in
ambitu viderentur sulci inter fibras carnosas, crassas & veluti

tumidas : in expiratione laxius , æquale & omnibus rugis destitutum evadebat. Tum aliquoties linguam adhuc exseruit , sanguis ex venis & arteriis effluens rutilus , fluidus minimeque grumosus erat. Ventriculo à stomacho ad pylorum supernè discisso invenimus pulverem Hellebori lacti grumoso & muco viscido immersum : contentis ejus sublati circa stomachum intus ventriculus rubebat & aliquomodo inflammatus erat. Jam diu emortuo animale sanguis in ventriculis cordis partim fluidus partim grumosus & obscurior erat.



Scholion.

Helleborus albus quamquam nunquam ventriculi terminos egressus esset , brevi post infusionem Præsidem systematis nervosi ad convulsiones proritavit , acrimoniâ suâ nemini notâ & ex inflammatione stomachi conspicua , nerveam tunicam , ventriculi vellicando sævius quàm ferendo par esset , tenella catelli strues partis in qua ille detinebatur , quamvis magna pars vomitu rejecta fuisset. Si ventriculi villi cum ætate adultiore robustiores evadere potuissent , forsan , ut alii canes *cicutam aquaticam* , *cocculas* aliaque hujus generis eliminasset ac convulsionum & mortis sævitiem effugere potuisset. Sanguis tardius apertis cordis ventriculis & jam frigefacto catello , obscurior & aliquomodo grumosus repertus fuit , qui alias ex semi mortui vasis faucibus rutilus & fluidus profiliit : ut & sic sanguinis grumefactio mortis causa denuntiari nequeat.