


didit aquam hanc præter alios perniciosos effectus primum intensissimam febrim, & vix exstinguibile æstum excitasse, ac compertum casu fuisse ejus præcipuum & prope unicum Alexipharmacum succum citri esse. *Exc. D. D. Verzascha* mercatorem ab Amuleto arsenicali vindicavit inunctione ol. scorpion. *Matthiol.* potione sudorifera ex theriac. dioscord. fracast. & electuario cardiaco, de quibus V. l. c. Memorabile est quod tradit *Cl. D. Kunkel. l. c.* nimirum cuidam tenellæ ætatis contra pediculos suatum fuit linim. ℞. ꝑ. dulcis ʒj. ꝑ. vitæ ʒj. Ung. pomat. ʒj. Pharmacopæus imperitus loco ꝑ. dulcis, permiscuit ꝑ. sublimatum: inde caput valde intumuit cum inflammatione, ut brevi in fontem pereundum fuisset, nisi à Med. Licentiatò intellexisset præsentem antidotum lixivium forte esse: quo cum linteo applicito quoque brevi convaluit, ita tamen ut capilli exciderint. Idem contra *Arsenicum* valere innuit l. c.



CAPUT XXI.

De Mercurio.

Historia I.

CAni d. 16. Dec. 1675. ante primam pomeridianam *Mercurij sublimati* scrupulum dimidium carni involutum exhibui, quem avidè devoravit: paulò post sursum deorsumque purgabatur: vomitu rejecta spumæ & viscida mucosa erant: fæces alvinæ pultaceæ & subflavæ. Alium bolum ex carne objectum citra *mercurij* inquinamentum odorobatur, at tamen degustare noluit. Pedibus & ore ligatis, cane ad latus inclinato, abdomen in latere sinistro incidi, prorupit statim ventriculus admodum inflatus cum intestinorum portione: diu intentus

intentus eram ad ventriculi contractionem : fiebat lentissime, incipiens ferè à pyloro, aut ejus antro : quandoque in medio à fibris circularibus corrugabatur : contractis fibris rectis sulci superficialij secundum longitudinem, in fundo imprimis, exporrecti conspiciebantur : presso ventriculo flatus per os elidebantur ; mox tamen rursus flatibus impletus fuit : Injecta aqua calida per gulam in ventriculum iteratis vicibus ; semper illam cum mucos & spuma rursus evomit : in hoc actu ventriculus non admodum contrahebatur ; at diaphragma valdè succutiebatur ac si illud cum musculis abdominis vomitum plurimum promoveret. Intestinatorum motus peristalticus itidem lentus fuit. Utcunque canis parum comederit diebus prægressis, nihilominus venæ lacteæ in conspectum venerunt, quibus circa pancreas *Afelli* pressis, noduli prominuerunt : Receptaculi quoque chyli portio trans diaphragma cum ductu thoracico chylo plena apparuit : eâ sauciata chylus promanavit, cujus superficiei, oculi, ut loquuntur, pingues innatabant, ut jusculis carnis pinguijusculis. Inflatum ductum propè insertionem bifurcatum inveni. Cane jam diu emortuo, reperitis inflationibus ductus thoracici, cor intumuit ac paulò post auricula dextra aliquandiu verâ systole & diastole moveri incepit : similem motum observavi in crure diaphragmatis, musculo subclavio & in gula prope stomachum, qui nullo modo palpitans erat, sed ex vera contractione & relaxatione fibrarum compositus & alternans ; ac si ab inflatione sanguis adhuc in vasis stagnans per arterias huc propulsus fuisset, & spiritus animales simul ulterius urfisset, vel vegetasset : nam aër per ductum thoracicum inflatus non solum ad dextrum ventriculum, sed etiam ad sinistrum pertigit, unde totum cor intumuit, arteriæ coronariæ implebantur, imo pervenit ad cerebrum, cerebellum, meninges, ipsosque sinus duræ meningis, quod apertè oculis usurpare licuit. Ventriculum cum portione gulæ & duodeni totum exemi : illo à stomacho ad pylorum

inciso inveni unicum bolum carnis & mucum spumeum copiosum: eo deterso nihilominus superficies mire anfractuosa protinus novo mucu pellucido oblinebatur: nullum ulcus observavi: stomachus amplius erat; pylorus multo angustior & constrictior, vix parvum digitum admisit. Circa finem gula & circa stomachum aderant insignes fibrae carnosae circulares, sub limbo pylori in duodeno rubro & quasi inflammato haesit mucus croceus. Ventriculum superne divisum maceravi fervida: tunicam fibrosam à nervea unguibus facile separare potui: nimirum fibras rectas & circulares se decussatim inter secantes; externae rectae, internae circulares; utraque junctae fibrillis obliquis & perpendicularibus: Circulares circa pylorum ejusque antrum & circa stomachum crassae & robustae. A tunica fibrosa ad nerveam plurima vasa sanguifera & nervi emittebantur, vasa sanguifera inplexum reticularem dirimebantur, nervi in tunicam nerveam expandebantur. Ablata tunica fibrosa anfractus omnes obliterated. Ab rasa tunica crustacea seu mucosa cultri manubrio, aliquot oscula rotunda apparuerunt, per quae mucum transudasse arbitrabar; ceterum non similia erant osculis glandularum in ventriculo suo loco repertarum. Intestinis à duodeno ad finem rectis secundum longitudinem incisis in duodeno & principio jejuni continebatur mucus flavus concretus, hinc in toto jejunio & principio ilei mucus albus, in ileo mucus pellucidus concretus, similis gelatinae, quae ex amylo in aqua cocta paratur, in fine ilei similis mucus cum alio fluido & spumoso: Rectum prorsus vacuum & anfractuosum fuit. In toto intestinorum tractu arearum glandularum triginta & unam inveni: erant rotundae & oblongae: foris presso intestino & osculis glandularum rotundis prodiit liquor pellucidus viscidiusculus: erant quaedam magnitudine feminis milij, per microscopium inspectae transparebant ac instar margaritarum splendebant. Jejunum & portio ilei rubebant: in medio arearum glandulo-

dulosarum manifeste aderat superficialia erosio. Venæ capillares intus conspectissimæ erant, ut & valvulæ *Kerkeringianæ*. Mirum unde chylus in lacteis, cum intestina vacua essent tum obfamem perpeffam, tum ob *mercurii* vim purgantem? Una muco à *mercurio* allecto? Inter tunicam fibrosam & nerveam in gula manifestæ conspiciantur glandulæ. In vena cava à capite descendente & ab hepate ascendente ad cor sanguis in tenacem grumum concretus & splendide innigrescens erat, ut ceu culter ex vagina extrahi posset.



Hist. II.

CAnem majorem, pellem, Tigridis instar, pilis nigris guttatim conspersam habentem, cum *Exc. D. D. Heinricho Scretæ* plurimis diebus quotidie bis unguento ex pinguedine suilla & *mercurio* vivo parato, in capite, per totum dorsum, sub axillis & in inguinibus ubi depiliserat & ubi majora vasa sanguifera excurrunt, inungendum curavimus; sc. à 3dec. 1677 ad 25dec. circa 11dec. aliquantulum salivare coepit, brevi tamen salivatio substitit: d. 15dec. in occipite non procul à vertice, tumor nattæ similis emerfit, ab attractu dolens. Ubique locum inunctum attingere valuit litum *mercurialem* lambendo abligurivit. Toto hoc tempore nunc in aëre aprico pluvio, nivolo aut gelido, nunc in hypocausto versabatur: semper vegetus mansit, hinc inde cucurrit: comedit: non magis quam ante inunctionem purgabatur: ultimis diebus ligna & ossa adhuc rodebat, non tamen tam diu ac antea consueverat: subinde tamen dentibus stridebat; aliquando ceu baculo percussus vociferabatur subito: abdomen quandoque tumidius apparebat. A. 26. dec. ad 2. Januar. 1678. postquam inunctiones intermittebantur, symptomata hæc cessarunt nisi quod adhuc dentibus strideret d. 2. Januar. man

mercurij vivi libram dimidiam cum quatuor uncis pinguedinis suillae devoravit, atque ita lambendo patinam exterfit, ut vix paucula grannula *mercurij* superessent. Ab hac *mercurij vivi* portione devorata nulla actio vel minimum laesa fuit: nec quicquam in excrementis p.n. animadversum fuit: imo inde magis famelicus reddebatur.

D. 3. Januar. 1678. mane hora 8. *Mercurij sublimati* drachmam cum mica panis in bolum redactam dedimus, praesentibus *Exc.D.D. Sereta, D.D. Joh. Conrado Brunnero & D. Lic. Scerpsio Durlaccensi*. Vix quadrante horae elapso magno nixu vomere coepit, primum mucum crassissimum tenacissimum, spumeum idque parvis intervallis novies. Prima vice frustulum panis crustaceum sine bolo eiecit, nec in tot vicibus ullum boli vestigium in vomitu reiectis animadvertere potuimus. Circa horam 9. decima vice mucum priori similem primò cruore tinctum, postea adhuc sexies, sed longioribus intervallis & magis magisque cruentum & ultima vice atro rubescentem evomuit: vomitu reiecta semper copiosa erant. Post quemlibet Vomitum secessum, ubi ceu à magno labore fessus quiesceret, quælivit; inde non recessit nec pedibus conculcatus locum mutavit, donec ipsum irritamen internum denuo sollicitaret & quasi experge faceret: tunc enim in pedes surrexit, unum alterumve angulum elegit, ubi ventriculum vomituriens exoneraret. Vomitum praecessit aliquoties pulsus quidam sonorus in hypochondriis, mox capite demisso, rictu amplo, os aperuit & tanta vi, quasi omnibus nervis intensis, mucum egressit ac si ventriculum & omnia intestina eiecturus esset. Aliquoties quoque antequam cruenta vomuit, alvum solvit; primæ faeces erant pinguedo suilla pridie comesta, cui *mercurius vivus* permixtus conspici poterat, postea pultaceæ, etiam crassiores & in scibala coactæ, quibus quoque *¶ vivus* & pili inerant. Circa 6. Vespertinam excrevit faeces cruentas, postea nigras & piceas: bolus *mercurio sublimato*.

limato infarctus nuspam comparuit. Post 6. horam per scalam tractu ultro stabulum petiit, & pluribus passibus citra nutationem incessit: circa 9. placide decubuit ac si dormiret. Toto hoc temporis intervallo nunquam convellebatur. Dum pransimus erupit, an è fonte biberit, rescire non potuimus: repertus in stabulo stramini quietus incubuit, & compulsus ad primam stationem rediit. Omnia oblata fastidiit.

D. 4. Januar. mane hora 6. mortuum in stabulo adhuc calentem, artubus flaccidis, plane non rigidis, invenimus.

In cavitate pectoris nullum sanguinem extravasatum reperimus. Pulmones inflati erant, rubicundiores debito, maxime in latere dextro: in limbis illorum extremis ramuli sanguine turgidi conspicui: ibi quoque apparuit macula quædam nigra inæqualis, citra tumorem, aut duritiem, dimidio bazio angustior. Cordis dexter ventriculus & auricula, vena cava ascendens, descendens, azygos & inter costales à sanguine distentissimæ erant: in sinistro quoque ventriculo & auricula multum sanguinis aderat, minus tamen quam in dextro: in aorta paucus sanguis occurrit. Sanguis neque in ventriculis neque in vasis majoribus & minoribus neque ullibi coaluit nec vel minimus grumulus inventus fuit. Ductus thoracicus & chyli receptaculum lymphæ cruenta plena erant. Aperto abdomine plurimum sanguinis extravasati inter hepar & ventriculum in hypochondrio sinistro, ut & intra duplicaturam omenti circa ventriculum invenimus. Ventriculus & intestina plena & distenta, non tamen valde inflata erant: foras atrorubescencia, in paucis locis minus rubicunda apparuerunt: cæcum solito non multum majus fuit: rectum verò valdè turgidum & nihilominus fulcis rectis profundisque præditum. In reliquo cavo abdominis nullus cruor extravasatus videbatur. Venæ mesentericæ & porta sanguine admodum distentæ fuerunt. Vesica vacua & corrugata: Pancreas rubicundius solito: Lien atro, rubescens:

renes naturali colore tincti. Gula intus rubicunda & inflammata. Ventriculus, mucro cruento spumoso viscido plenus: similis mucus in toto reliquo intestinorum ductu conspiciebatur: in caeco faeces pultaceae flavae cum pilis: in recto faeces pice nigriores & renaces, nulla scibala, nulla vestigia *mercurij vivi* aut *sublimati* apparebant. Contentis sublati ventriculus intus undique rubicundus & inflammatus, excepto antro pylori, videbatur: intestina à pyloro ad imum intestini recti itidem inflammata erant, minus tamen areolae glandularum rubebant. Ab lata tunica fibrosa gulae & ventriculi: inter illam & tunicam nerveam, sanguinem grumosum, extravasatum in plurimis locis reperi, ut & in plerisque intestinis inter has tunicas. In ventriculo & intestinis quoque crustacea rubebat, alicubi etiam abrasa, vel potius erosa, sed non penitus erat. Ventriculo & intestinis aliquandiu aqua maceratis crustacea facile abscedebat: nervea, quamvis per totum ventriculum & in intestinis inflammata esset, nullibi tamen exulcerata, aut erosa conspici potuit. Antrum pylori & areolarum ambitus ab inflammatione immunes erant. Intra Cranium nihil p. n. aut insuetum visum fuit, nisi quod vasa sanguifera & sinus quoque sanguine turgent.



Historia III.

Ex Communicatione *Exc. D. D. Sigmundi
Königs Physici Bernensis.*

NOn ita pridem Puer annos duos cum dimidio natus, hora quinta vespertina clanculum officinam Aurifabri subintrans, *Mercurij sublimati* grana circiter octo inglutiit, unde mox tormina saeva, ventris inflatio & salivatio excitabantur. Mox
Exc.

Exc. D. D. König. vocatus protinus dedit syrup. Emeticum cum succ. cydon. paratum : vomitu peracto, large ipsi lac caprinum cui mucilaginem sem. Psyllij permiscuit, potandum propinavit. Inflatio & tormina brevi cessarunt ac noctu dormivit. Post 14. dies, Phthisis periculum imminens declinavit potu lactis capri- ni cum sem. cydon. & malvæ cocti : nec hæcenus quicquam ad- versi passus est.

Historia IV.

CAtellæ nondum menstruæ d. 27. dec. 1675. cum *Exc. D. D. Heinricho Screta* horâ 11. antimeridianâ dedi *mercurij dulcis* drachmam dimidiam : non diu postea fæces liquidas, pultaceas, pallide flavescentes excrevit. Horâ 1. pomeridianâ siticulosa erat : lingebat manum ad moram lingua propè exsucca ; lac ori instillatum avide deglutiit : seu siticulosa, seu à *¶ dulci* dolens voce admodum submissa vagiit : vegetior tamen perstitit catella illâ cui nuper *magister. Gialappe* intrusimus. Lac non evo- muit. Post 2. horâ pomeridianâ thoracem in sinistro latere in- cidi ; pulmones ex amplo vulnere, etiam costis digito diductis, aëre pleni prorumpabant in inspiratione, nullo vacui metu, cum vulnus admodum patulum esset. Vulnere in abdomine fa- cto ventriculus distentissimus erupit, circa medium constringe- batur, corrugabatur indeque antèrius & in fundo inæqualis & quasi anfractuolus reddebatur sensimque parvus admodum e- vasit : gula distendebatur, nunquam tamen vomuit. Intestina lentissime movebantur. Dum pectus in dextro latere adhuc in- regrum erat, subinde adhuc vagiit fortiterque respiravit : ablato sterno nihilominus in inspiratione adhuc sursum costæ tolle- bantur : ubi verò diaphragma costis annectebatur illæ adduce- bantur & pectus inferius fiebat angustius. Diaphragma in inspi- ratione

ratione planum, in expiratione convexum reddebatur. Cor subinde in motu substitit: inflato ductu thoracico & hinc corde ventriculis, auriculis & vasis coronariis valide rursus cor movebatur, inò ante quartam exemptis ventriculo, intestinis, hepate, liene non sine largissima hæmorrhagia & detruncato capite cordis totius motus perstitit ad hor. 5. usque: auriculæ vero dextræ motus spontaneus fiebat adhuc hor. 8. noctis: ante 10. noctis irritata aliquoties rursus movebatur. Ventriculus prope omino vacuus erat, nihilque præter *¶ dulcem* grumulis involutum, aliosque grumulos lactis sinceris continuit: nulla prorsus inflammatio apparuit. Intestina quoque fere vacua erant; subinde in illis mucus paucus flavus, condensatus & aliquot vermes mortui occurrerunt: cœcum paucum humorem turbidum flavum, & rectum feces atro flavescentes tenacissimas, quibus grumuli cum *¶ dulci* permixtæ erant, continuerunt: Nullibi nec circa areolas inflammata apparuerunt. Ex quibus conclusimus *Mercurium dulcem* minus ventriculo & intestinis infestum esse, quam *Mag. Gialappe*; minusque ferocisse quam illud in alia castella fecerat.



Scholia.

I.

M*ercurius vivus* in cane Hist. II. plurimis diebus illitus & ubi attingere ore poterat abliguritus, & tandem libræ dimidiæ pondere cum pinguedine suilla devoratus, nullam salivationem effecit, forte ob pororum cutis & osculorum vasorum lacteorum, aut glandularum salivalium dispositionem aliam quam in hominibus existit: novi quendam bis *inunctionem mercurialem* admittentem, primum leviolem, postea auctâ *mercurii* dosi fortissimam, citra ullam salivæ promotionem, aut dentium vacilla-

cillationem aut deglutendi difficultatem sustinuisse, imo à diuturna *Empl. de spermat. Ranar.* ꝯ nec vel minimam immutationem in faucibus percepit, quamvis fronti & cubito impositum inveteratos dolores feliciter sustulerit; quod adscribebam glandularum subcutanearum aliarumque exsiccationi à sæpius repetita diata sudorifera. Alias aliquot memorare possem quibus salivatio facillimè à ꝯ *sublimato* in lixivio contra scabiem decocto post unam alteramve artuum lotionem, aut post inunctionem pauco ꝯ *vivo pinguis permixto* factam brevi sublequebatur: nuper cuidam alium lue ꝯ affectum illinenti aphthæ cum larga incipiente salivatione in faucibus abortæ sunt: quibusdam etiam ꝯ *dulcis* diutius detentus salivationem parat; unde à cautiorebus non nisi cum stimulo exhibetur: Puella Hist. III. grana octo assumpta ꝯ *ij sublimati* paulò post salivam moverunt. Admiratione non caret *dimidiam libram* ꝯ *vivi devorata* in cane Hist. II. nullum symptoma quod alicujus momenti esset exstitisse, cum apud *Schenkium* ille Pharmacopeum & apud *Höchstetterum*, Parasitum ingurgitatus male multavit.

II.

Mercurius sublimatus quantum irritando ventriculum & intestina valeat, apparuit ex vomitu & alvi defectione cità post assumptionem in Hist. I. & II. & licet forte in Hist. I. frequens vomitus sectioni abdominis, ventriculi denudationi & frequenti tepidæ injectioni per gulam in ventriculum attribui posset, attamen soli ꝯ adscribendum vehementissimum vomitum Historia II. docuit, cum brevi tempore novies mucum & postea sexies cruentum evomuerit: & ipsa muci copia qualibet uice ejecta irritationem acerrimam ac ut *Cl. Kunkel.* loquitur l.c. gradu & quidem insigni *Arsenico* acriorem probat: quod etiam vomitus & defectiones cruentæ & magna muci cruenti in

ventriculo & intestinis restans abundantia evincunt. Imo spicula *mercurij sublimati* prorsus ignea fuisse patet ex inflammatione & gangræna ventriculi & intestinorum canis in Hist. II. & intestinorum canis in Hist. I. quam quoque procul dubio in ventriculo fecisset, nisi aqua sæpius in ventriculum injecta mitigatus fuisset: cuiusmodi particulis acribus, calidis & tantum non igneis & penetrantibus vesicantia prædita optimè statuit *Exc. D. D. Georg Balthas. Metzger P.P. Celeberrimus in Syllogo Thes. Chiriatric. V II. §. 6.* Hæ particulae propè igneae per crustaceam tunicam ventriculi & intestinorum penetrantes primum extrema venarum capillamenta adusserunt, unde refluxu impedito inflammatio; postea quoque arteriarum combusserunt, unde affluxu vivifici succi prohibito gangræna subsecuta fuit: & procul dubio nisi crustacea tam porosa fuisset, & mucro copiose transsudanti assueta, facilem transitum concessisset, in vesiculas sublata fuisset, non secus ac cutis vesicatoriis impositis. Iisdem particulis portionem crustaceae sustulit in ventriculo canis Hist. II. quibus obstitit nervea ubique compage densiore prædita, unde neque in canibus Hist. I. & II. exulcerata inventa fuit: neutiquam verò crustaceam inflammant, cum nulla vasa sanguifera ad illam pertingant & rubor potius vel sanguinis extravasati tincturae vel transparentis nerveae colori deferendus sit. Sanguis inter tunicam fibrosam & nerveam, ut & inter ventriculum & hepatis & in duplicatura omenti extravasatus fuit, non tam erosus vasis sanguiferis, quam ruptis ob violentissimos vomitus in Hist. II. Quamvis in hoc cane vomitum præcesserit pulsus sonorus in hypochondriis, & procul dubio diaphragma in nixu violentissimo cum pulmonibus vehementissime succussum fuerit, nullum tamen vas in pectore ruptum fuit: at pulmones præcipue in dextro latere rubicundiores, in extremis limbis vasa sanguifera conspectiora & macula rubra apparuit; nisi sanguinis circulationem intercepta hæc adscribere velimus.

III. Fa-

III.

Fastidium canum in Hist. I. & II. soli mucos, non bili deferendum est, cum nulla ad ventriculum ascenderit, & cum carnes objectas fastidirent nihil nisi mucum evomuerint. Inflation abdominis & ventriculi in Hist. I. & III. evenit ob copiam flatuum in ventriculo detentam utroque ejus orificio arcte clauso, unde in cane Hist. I. exprimendus erat: Flatus producti tum à calore & fermento ventriculi, tum à sale sylvestri *mercurii*, ex copiosissimo mucos denuo ob ꝑ ij irritationem continuam prolecto: unde explosis aut expressis flatibus, statim novi renascebantur. Cur nullae convulsiones tantopere irritata membrana nervea ventriculi & intestinorum supervenerint? explicatu perdifficile mihi videtur, cum mitius his partibus afflictis aliquando praeses systematis nervosi excandescat & hac ratione opitulari conetur. Puellus quidem convulsiones evitavit maturo auxilio ab *Exc. D. D. König.* propinato sc. syr. Emeric. cum succ. cydon. parato, cujusmodi antimoniato quendam à veneni saevitia liberatum tradit *Cl. Fabric. Hildan. c. 4. Obs. 37.* & lacte cum mucil. sem. psyll. quae ambo aculeos ignitos ꝑ ij sublimari obtundunt & extinguunt. In cane Hist. I. injectiones aquae calidae in ventriculum forte convulsiones averterunt. At quomodo convulsiones canis Hist. II. penitus derelictus effugerit perobscurum est: certe toto die nihil convulsivi praeter vomitum & pulsationem sonoram illum praecedentem ad horam 9. noctis in illo observatum fuit: num nocte ipsum affligerint nullo in dicio cognoscere potuimus & mane prorsus artubus flaccidis, non rigidis mortuus repertus fuit. Forte praeses systematis nervosi non in auxilium raptus fuit, quia ventriculus validus hostem solum in principio excutere conatus est atque id plurimis nixibus ausus est; postea à tot laboribus dissipatis spiritibus animalibus praeses ventriculo non amplius succurrere valuit: unde quoque

circa vesperam vomere desistit. Verum his nec mihi satis faciores ardua repetita experimenta postulabit.

IV.

Canis Hist. II. Mortuus est non ob coagulationem sanguinis, cum nihil grumosa ullibi in ventriculis, auriculis & vasis inventum fuerit: nec ob defectum sanguinis cum ventriculi cordis, auriculae, vasa, etiam in mesenterio & pectore plena adhuc fuerint: sed ob spirituum vitalium & animalium dissipationem à tot laboribus, quos vomitus crearunt, eorumque corruptionem à gangræna ventriculi & intestinorum, particulis pravis sanguini permixtis, nam receptaculum chyli & ductus thoracicus lymphæ cruenta implebantur. In cane quidam Hist. I. sanguis coagulatus in ventriculis & vasis repertus fuit, at tum demum postquam perfriguit: forte si citius sauciata fuissent vasa sanguinem fluidum stillassent.

V.

Mercurius dulcis in Hist. I V. quoque irritavit, at blande, unde solummodo per alvum egressit, lac avidè deglutiit & procul dubio mortem evitasset, nisi aliter nostræ curiositati inservire catella coacta fuisset. Et omnino post mortem patuit *Mercurium dulcem* mitius irritare ventriculum, quam *Magisterium Gialappa*, cum non tam pertinaciter ventriculi & intestinorum tunicis ad hæreat, nec inflammet ut hoc efficere solet & sæpe propterea torminum & Hypercatharsis autor existit, maximè si vis ejus non probe dilatetur.