

Katzenmilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Kasein %	Albumin %	Fett %	Milch- zucker %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
1	Colostrum, 24 Stunden nach dem Werfen; in 100 cem g	1862	81,63	3,12	5,96	3,33	4,91	0,58	—	—	—	A. Commaille ¹⁾

Kaninchenmilch.

1	Specifisches Gewicht 1,0493	1894	69,50	15,54	10,45	1,95	2,56	50,95	34,26	8,15	Perez ²⁾
---	-----------------------------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	---------------------

Delphinmilch

vom Grind oder Rundkopf (*Globicephalus melas*).

1	Von zu Kirkwall auf den Orkney-Inseln gefangenen Thieren	1890	48,67	—	43,76	—	0,46	—	85,25	—	Frankland ³⁾
---	--	------	-------	---	-------	---	------	---	-------	---	-------------------------

Meerschweinmilch

vom Brautfisch oder Meerschwein (*Delphinus Phocaena*).

1	Gelblich dick von fischigem Geruch	1884	41,11	11,19	45,80	1,33	0,57	19,00	77,77	3,04	Pavise ⁴⁾
---	--	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	----------------------

Molkerei-Erzeugnisse und Molkerei-Abfälle.

Praeservirte Milch.^{*)}

		Spec. Gew.										
1	} Scherff'sche praeservirte Milch	1,0305	1881	88,15	3,60	3,18	4,32	0,75	30,38	26,84	4,86	W. Fleischmann ¹⁾
2		1,0311	1885	89,22	2,75	2,57	4,69	0,77	25,44	23,75	4,07	L. Fresenius ²⁾
3	Aus Romannshorn . . .	1881	87,98	3,26	3,01	5,01	0,79	27,12	25,04	4,34	W. Fleischmann ³⁾	
4	desgl.	1,0323	"	86,52	3,77	4,06	4,93	0,72	29,97	30,12	4,47	F. Strohaer ⁴⁾
	Mittel		.	87,97	3,34	3,21	4,74	0,74	27,76	26,68	4,44	

¹⁾ Compt. rend. 63, 692.²⁾ Staz. sperm. agr. 1894, 26, 615. Chem. Centrbl. 1894, II, 848.³⁾ Chemical News 1890, 61, 63. Milchztg. 1890, 19, 185. Die Milch war von dicker, rahmarter Beschaffenheit und hatte einen stark fischigen Geruch.⁴⁾ Chemical News 1884, 52, 170. Milchztg. 1885, 14, 698.⁵⁾ Jahresbericht d. Milchw. Versuchsanstalt Raden 1881. Rostock 1882, 44 und 1883, 58.⁶⁾ Milchztg. 1885, 16, 545.⁷⁾ Wiener „Neue freie Presse“ 1881.⁸⁾ Die Praeservirung der Milch nach Scherff etc. hat Aehnlichkeit mit dem Pasteurisiren des Bieres und Weines, indem man die Milch in Flaschen einer höheren Temperatur aussetzt. Obige Proben No. 1 und 2 hatten eine bräunlich röthliche Färbung und besaß Probe 1 nach Fleischmann den Geschmack von gekochter, Probe 2 nach Fresenius den von frischer Kuhmilch. Wenngleich die von Fresenius untersuchte Probe sich auch 2—3 Monate unverändert hielt, so giebt Fleischmann doch als Uebelstände dieses Verfahrens an, dass sich das Fett an der Oberfläche abgeschieden hatte und sich nicht mehr gleichmässig vertheilen liess. Auch verhielt sich die Probe No. 1 gegen verdünnte Salzsäure und Lab anders, als frische Kuhmilch.⁹⁾ In Procenten der Asche waren vorhanden:

Kali	Natron	Kalk	Magnesia	Eisenoxyd	Phosphorsäure	Schwefelsäure	Chlor	Kieselsäure
K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	SO ₃	Cl	SiO ₂
24,53 %	10,75 %	23,67 %	2,57 %	Spur	26,93 %	1,13 %	14,17 %	0,56 %

¹⁰⁾ Mit 0,90 % Verlust bei der Analyse.

Präservierte Magermilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
1 ¹⁾	Conserved Milk	1882	90,52	3,52	0,56	4,32	0,79	37,13	5,91	5,94	W. Fleischmann ¹⁾

Peptonisirte Milch.

1	Aus England?	1886	89,20	2,93 ²⁾	3,41	3,80	0,68	27,13	31,58	4,34	P. Vietz ²⁾
---	------------------------	------	-------	--------------------	------	------	------	-------	-------	------	------------------------

Peptonisirte und kondensirte Milch.

1	Kindermilch von Löfflund in Stuttgart	1891	20,58	9,83 ³⁾	12,22	55,10	2,24	12,76	15,40	2,04	Sorholt ³⁾
---	---	------	-------	--------------------	-------	-------	------	-------	-------	------	-----------------------

Milchpepton.

1	Milchpepton	1893	21,09	18,31	27,86	25,71	4,33	23,20	35,31	3,71	Mangfeldt ⁴⁾
---	-----------------------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------------------------

Kondensirte (präservirte) Milch.

Die kondensirte Milch wird durch Eindampfen von ganzer Kuhmilch bis zur Honigkonsistenz im Vakuum mit oder ohne Zusatz von Rohrzucker dargestellt.

1. Ohne Zusatz von Rohrzucker kondensirte Milch.

1	Aus Pardy (Amerika)	1871	53,54	14,44	13,12	16,30	2,60	31,08	28,24	4,95	C. F. Chandler und Scholtzer ⁵⁾
2	desgl.	n	51,50	13,61	14,51	17,47	2,91	28,06	29,92	4,49	
3	desgl.	n	49,23	15,48	14,58	17,75	2,96	30,49	28,72	4,88	
4	Aus Amerika	1871	50,40	17,80	14,20	15,60	2,00	35,89	28,63	5,74	S. Percy ⁶⁾
5	desgl.	n	61,00	10,60	11,20	15,70	1,50	27,18	28,72	4,35	
6	desgl.	n	46,40	19,10	19,80	12,50	2,20	35,63	36,94	5,70	
7	desgl. (verdächtig) ⁷⁾	n	36,20	30,30	20,50	10,80	2,20	47,49	32,13	7,60	
8	desgl. desgl.	n	41,20	28,20	13,60	14,00	3,00	47,96	23,13	7,67	
9	desgl. desgl.	n	40,50	26,50	17,70	12,80	2,50	44,54	29,75	7,13	

¹⁾ Jahresbericht d. Milchw. Versuchsstation Raden 1881. Rostock 1882, 44 und 1883, 58.

²⁾ Milchztg. 1887, 16, 121.

³⁾ Mitgetheilt von B. C. Niederstadt (Milchztg. 1891, 20, 695). Die peptonisirte und kondensirte Kindermilch von Löfflund besteht aus Alpenmilch mit aufgelöstem Weizenextrakt, die ohne weitere Zusätze eingedickt ist. Sie stellt eine gelbliche, flüssig-schmeckende Konserve dar, die vor dem Gebrauch verdünnt wird.

⁴⁾ Zeitschr. Nahrungsm.-Unters., Hyg., Waarenk. 1893, 7, 376.

⁵⁾ Americ. Chemist. 2, 25.

⁶⁾ Milchztg. 1872, 1, 93 u. 179.

⁷⁾ Mit 0,29 % Verlust bei der Analyse.

Die Stickstoff-Substanz zerfällt in: Kasein 0,96 %, Albumin 0,07 %, Lactoprotein und Pepton 1,88 %.

Die Stickstoff-Substanz besteht aus 5,65 % Kasein und 4,18 % Albumin und Pepton.

⁸⁾ Das Milchpepton wurde nach der Methode von A. Stutzer (Zeitschr. anal. Chem. 1892, 31, 500) untersucht und gefunden von dem Stickstoff:

In Wasser löslich					
Fällbar durch Essigsäure	Alkohollösliche Zersetzungsprodukte	In Wasser unlöslich (Albumose)	fällbar durch Ammonsulfat	fällbar durch Phosphorwolframsäure	demnach als Pepton
0,641 %	0,577 %	0,259 %	1,725 %	1,855 %	0,130 %

Demnach besteht die Stickstoff-Substanz aus unverändertem Kasein 4,13 %, Albumosen 12,40 %, Pepton 0,81 %.

Die Asche enthält 1,20 % Phosphorsäure und 1,06 % Chlornatrium.

⁹⁾ Wegen des verhältnissmässig geringen Fettgehaltes gegenüber der Stickstoff-Substanz wahrscheinlich aus abgerahmter Milch hergestellt.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
10	Romanshörner kondensierte Alpenmilch	1881	62,84	11,39	11,11	12,03	2,24	30,65	29,89	4,90	F. Strohmayer ¹⁾
11 ²⁾	Romanshörner, April . . .	"	62,38	9,96	10,16	13,69	2,32	26,47	26,74	4,24	W. Fleischmann ³⁾
12 ²⁾	desgl. Juli	"	61,21	11,22	10,16	13,48	2,33	28,92	26,19	4,63	
13	desgl. "	1882	62,40	12,26	11,63	11,69	2,02	32,61	30,93	5,22	N. Gerber ⁴⁾
14	desgl. "	"	64,53	9,38	11,63	16,34	2,23	26,44	32,79	4,23	Ch. Girard ⁵⁾
15	desgl. "	"	63,55	14,07	10,57	14,01	2,02	38,60	29,00	6,18	Castellucci ⁶⁾
16 ⁶⁾	Aus Casonay (Schweiz) . .	1881	52,32	12,13	13,09	17,43	2,79	25,44	29,15	4,07	W. Fleischmann ⁷⁾
17 ⁶⁾	Aus England	"	56,52	11,03	13,24	15,83	2,34	25,37	30,45	4,06	
18	Amerika	1882	53,04	17,26	16,29	10,64	2,71	36,75	34,69	5,88	Waller ⁸⁾
19	Eagle	"	56,83	15,07	14,36	11,64	2,10	34,91	33,26	5,59	
20	New-York	"	55,86	13,96	14,28	13,90	2,00	31,63	32,35	5,06	
21	National	"	59,24	14,02	13,97	10,44	2,33	34,40	34,27	5,50	M. Schrödt ⁹⁾
22		1885	65,97	8,36	8,46	15,07	1,17	24,57	24,86	3,93	
23	Von Ad. Schreiber in Bremen	1883	63,81	10,32	9,77	13,68	2,29	28,51	27,00	4,56	W. Fleischmann ⁷⁾
24	Von Walcker u. Co. „	1884	55,83	13,25	10,52	17,66	2,80	30,00	23,82	4,80	
25	Herkunft nicht angegeben	"	64,00	11,00	10,50	12,50	2,00	30,56	29,17	4,89	Th. Maben ¹⁰⁾
26		"	65,00	9,00	8,25	15,75	2,00	25,71	23,57	4,11	
27		"	68,90	8,20	8,30	13,00	1,60	26,37	26,69	4,22	
28	Von Gossau (St. Gallen) .	1880	65,25	10,33	10,82	11,59	2,01	29,73	31,14	4,76	W. Eugling ¹¹⁾ ¹²⁾
29	Romanshorn (Thurgau) . .	"	63,42	11,00	11,25	12,12	2,21	30,07	30,75	4,81	
30	Freiburg	"	61,50	11,40	12,30	12,60	2,20	29,61	31,95	4,75	
31	Montreux	"	58,30	11,80	13,10	14,50	2,30	28,30	31,41	4,53	
32	Aus England?	1881	56,96	8,50	16,02	16,32	2,20	19,75	37,22	3,16	A. Völcker ¹³⁾ ¹⁴⁾
33		"	56,92	7,62	17,09	16,22	2,15	13,05	39,67	2,09	
34		"	51,72	11,69	14,33	19,51	2,75	24,21	29,68	3,87	
35	Schweizer	18 ⁸² ₈₃	60,50	10,20	11,82	15,43	2,05	25,82	29,92	4,15	Ch. Girard ⁵⁾
36	Enthielt Borax und Natrium- bicarbonat	"	57,30	—	13,70	—	1,50	—	32,08	—	
37	Alpenmilch; enthielt Calcium- carbonat	"	59,36	12,09	12,24	14,15	2,16	29,75	30,12	4,76	
38		"	68,80	8,56	9,26	12,17	1,21	27,44	29,68	4,39	
39	Enthielt Natriumbicarbonat	"	57,62	11,37	11,57	17,20	2,24	26,83	27,30	4,29	

¹⁾ Wiener „Neue freie Presse“ 1881. Spec. Gew. 1,0997.

²⁾ Bericht der Milchw. Versuchsstation Raden für 1881, 1882, 1883, 1884.

³⁾ Repertorium f. analyt. Chem. 1882, 68.

⁴⁾ Jahresbericht d. Milchw. Versuchsstation Kiel 1885/88, 11.

⁵⁾ Nach The Pharm. Journ. and Trans. in Chem.-Ztg. 1884, 8, 1874.

⁶⁾ Jahresbericht d. landw. Versuchsstation Voralberg in Tisis 1880.

⁷⁾ Analysat 1881.

⁸⁾ Girard, Documents sur les falsifications etc. Laboratoire Municipal. Deuxième Rapport. Paris 1885, 656.

⁹⁾ Es ergaben: No. 11 12 16 17

Verlust 1,49 % 1,59 % 0,50 % 1,05 %

No. 16 ergab ferner 1,74 % Benzoesäure.

¹⁰⁾ Der Wassergehalt ist bei No. 28, 29, 30 u. 31 aus der Differenz berechnet.

¹¹⁾ Die Stickstoff-Substanz ist aus dem gefundenen Stickstoff-Gehalt (bei No. 37 1,36 %, bei No. 38 1,22 % und bei No. 39 1,87 %) durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett		
40	Scherffsche praeservirte und kondensirte Milch von Drenkhan in Stendorf	1883	76,15	7,28	6,12	9,26	1,46	30,52	25,66	4,88	W. Fleischmann ¹⁾
41	"	"	66,21	10,96	8,46	12,31	2,19	32,45	25,04	5,19	
42	"	"	75,53	7,08	6,05	10,02	1,39	28,93	24,72	4,63	
43	auf $\frac{1}{3}$ eingedickt	"	70,94	8,28	6,41	12,57	1,80	28,49	22,06	4,56	J. Cosack ²⁾
44	" $\frac{1}{2}$ "	"	75,54	7,43	6,05	9,42	1,56	30,38	24,73	4,86	
45	desgl.	1885/86	65,97	8,36	8,46	15,07	2,14	24,57	24,86	3,95	³⁾
46	Aus Russland	1891	66,75	10,32	10,01	11,19	1,76	31,04	30,11	4,97	Alex. Jürgens ⁴⁾
47	Allgäuer Rahmmilch	1888	66,02	9,25	9,09	12,88	1,95	27,23	37,91	4,35	M. Wesener ⁵⁾
48	auf $\frac{1}{4}$ eingedickt und sterilisirt	1891	62,87	10,27	10,85	13,78	2,23	27,66	29,22	4,43	B.C. Niederstadt ⁶⁾
49	"	1896	68,14	7,32	11,58	11,54	1,79	22,98	36,34	3,68	M. Blauberg ⁷⁾
50	Kondensirte Milch in Blechdosen, Asche etwas zinnhaltig	1896	63,31	12,24	9,03	12,93	2,49	33,36	24,61	5,34	⁸⁾
51	Ungesüsste kondensirte Milch	1893	63,47	9,30 ⁹⁾	10,72	13,94	2,07	28,20	29,35	4,51	H. Droop - Richmond und L. K. Bostley ¹⁰⁾
52	Von der Norwegian Milk Condensing company	1897	59,26	—	9,30	—	2,11	—	22,83	—	E. Bergstrand ¹¹⁾
53		"	61,92	—	11,87	14,45	2,12	—	31,17	—	
54	Unter Rahmzusatz kondensirt	1895	68,97	8,70	10,05	10,39	1,89	28,04	32,39	4,49	G. Ambühl ¹²⁾
Kondensirte Milch		Mittel	—	61,46	11,17	11,42	13,96	1,99	28,99	29,64	4,64
(ausser No. 7—9)		Schwankungen	—	46,40—56,15	5,03—14,87	8,50—15,29	5,09—17,34	1,32—2,62	13,05—38,60	22,06—39,67	2,00—5,88

¹⁾ Bericht d. Milchw. Versuchstation Raden für 1881, 1882, 1883, 1884.²⁾ Original-Mittheilung.³⁾ Jahresbericht der Milchw. Versuchstation Kiel für 1885/86, 12. Viertel. Nahrungs- u. Genussm. 1887, 2, 363.⁴⁾ Pharm. Zeitschr. für Russland 1891, 30, 199. Viertel. Chemie, Nahrungs- u. Genussm. 1891, 6, 256.⁵⁾ Milchztg. 1891, 20, 695. Die Milch hatte eine gelbliche Farbe, war dicklich wie Rahm und keimfrei; sie enthielt 0,65 % Phosphorsäure (P₂O₅).⁶⁾ Archiv für Hygiene 1896, 27, 112.⁷⁾ Pharm. Centr. 1896, 37, 117. Viertel. Nahrungs- u. Genussm. 1896, II, 126.⁸⁾ Analyst 1893, 18, 170—174. Chem. Centr. 1893, II, 598.⁹⁾ Viertel. Nahrungs- u. Genussm. 1897, 12, 262.¹⁰⁾ Bericht des Kantonchemikers für St. Gallen für das Jahr 1895, 2.¹¹⁾ Mit 0,387 % Kalk, 0,033 % Magnesia, 0,429 % Kali, 0,115 % Natron, 0,031 % Schwefelsäure, 0,488 % Phosphorsäure und 0,228 % Chlor.¹²⁾ Mit 0,81 % Kasein.

2. Unter Zusatz von Rohrzucker kondensierte Milch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Rohr-zucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
1	Aus Cham ^{*)} in der Schweiz	1868	24,13	13,67	8,67	10,82	40,48	2,23	18,02	11,43	2,88	C. Karmann ²⁾
2	desgl.	1873	26,23	9,43	8,34	53,89		2,01	12,78	11,31	2,05	J. Moser und F. Soxhlet ³⁾
3	desgl.	"	23,90	10,16	9,35	54,59		2,00	13,35	12,29	2,14	
4	desgl. ^{3*)}	"	24,70	9,77	6,02	57,40		2,11	12,97	8,00	2,08	
5	desgl.	"	26,95	10,56	9,13	51,13		2,23	14,46	12,50	2,31	J. Forster ⁴⁾
6	desgl.	1872	27,80	8,00	9,26	52,69		2,25	10,99	12,83	1,77	P. Wagner ⁵⁾
7	desgl.	1875	25,95	13,11	10,46	48,32		2,15	17,70	14,13	2,83	N. Gerber ⁶⁾
8	desgl.	1876	28,24	9,41	8,64	51,56		2,13	13,11	12,04	2,10	
9	desgl.	"	26,86	10,85	9,99	49,58		1,71	14,83	13,66	2,37	
10	desgl.	1877	23,51	11,00	10,62	52,96		2,11	14,38	13,88	2,30	A. Hutcheson-Smee ⁷⁾
11	desgl. (engl. Filialen) . .	1876	25,40	18,10	10,00	50,80		1,70	24,30	13,42	3,89	
12	desgl. " " . . .	"	22,50	12,30	10,50	52,90		1,80	15,87	13,55	2,54	
13	desgl. " " . . .	"	20,50	12,70	10,80	54,10		1,90	15,97	13,58	2,56	N. Gerber ⁶⁾
14	desgl.	1879	23,48	11,35	9,70	11,95	41,41	2,11	14,83	12,68	2,50	
15	desgl. Anglo-Swiss Condensed Milk-Company. Spec. Gew. 1,306 . .	1891	25,75	10,40	11,79	11,12	39,02	1,92	14,01	15,88	2,24	
16	desgl.	1894	17,44	—	7,10	—	52,74	1,42	—	8,60	—	E. Bergström ⁹⁾
17	desgl. ^{10*)}	1896	24,70	9,43	10,80	14,13	39,27	1,65	12,55	14,49	2,01	Ch. F. Worcester ¹¹⁾
18	desgl. ^{10*)}	"	24,57	7,92	10,52	14,44	40,90	2,65	10,50	13,95	1,68	
	Mittel (1—18)	—	24,65	11,10	9,55	11,48	41,22	2,00	14,74	12,68	2,36	
19	Aus Vivis-Kempen ^{*)} . .	1872	23,40	10,00	13,83	50,74		2,03	13,05	18,05	2,09	P. Wagner ⁶⁾
20	desgl.	1877	22,07	18,00	11,93	45,26		2,74	23,10	15,31	3,70	Wendler ¹²⁾
	Mittel (19—20)	—	22,74	14,00	12,88	48,00		2,38	18,08	16,68	2,89	
21	Aus Luxburg-Alpina . .	1873	28,38	8,81	12,61	46,55		2,23	12,30	17,61	1,97	E. Schütz ¹³⁾
22	desgl.	"	29,09	7,79	10,43	51,33		2,07	10,99	14,71	1,76	E. Kopp ¹⁴⁾
23	desgl.	1872	24,70	8,81	12,45	51,87		2,17	11,70	16,53	1,87	P. Wagner ⁶⁾
24	desgl.	1875	20,93	9,62	18,78	49,69		1,36	12,17	23,75	1,95	N. Gerber ⁶⁾
25	desgl. (Filiale Sonthofen) .	1876	24,12	10,88	10,27	52,84		1,94	14,34	13,53	2,29	
	Mittel (21—25)	—	25,44	9,98	12,91	50,40		2,07	12,30	17,23	1,97	

*) Arch. f. Pharm. 1865, 135, 218.

2) Jahresber. für Agrik.-Chem. 1873/74, 280. Desgl. 1879, 356 und Erster Bericht über Arbeiten der landw. Versuchsanstalt Wien 1878, 70.

3) Milchztg. 1875 u. 1876 und Alpwirtschaft. Monatsbl. 1878, No. 65.

4) Dasselbst 1876, No. 167, 1700.

5) Forschungen auf dem Gebiet der Viehhaltung. Beilage zur Milchztg. 1879, Heft VII.

6) Milchztg. 1891, 20, 695.

7) Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1897, 12, 362.

8) 27. Jahresbericht des Gesundheitsrathes von Massachusetts. Boston 1896, 664.

9) Milchztg. 1877, 6, 220.

10) L. Kofler hat (Dingler's polytechn. Journ. 198, 161) ebenfalls Analysen von condensirter Milch aus Cham, Savin und Vivis angeführt; diese weichen aber — sie enthalten nur halb so viel Fett als Stickstoff-Substanz — so weit von denen anderer Chemiker ab, dass ich dieselben hier nicht mit aufführe.

11) Diese Probe wird von F. Soxhlet wegen des geringen Fettgehaltes als verdächtig, d. h. als aus theilweise entrahmter Milch hergestellt, bezeichnet.

12) Die Untersuchungsmethoden siehe unten S. 289, Anmerkung.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Rohr-zucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett		
26	Vevey-Schweiz	1872	23,40	10,00	13,83	50,74	2,03	13,05	18,05	2,09	P. Wagner ¹⁾	
27	desgl. (Nestlé)	1879	25,28	10,25	8,62	53,82	2,03	13,72	11,54	2,19	F. Soxhlet ²⁾	
28	desgl.	"	24,75	12,67	11,53	11,19	37,69	2,17	16,64	15,32	N. Gerber ³⁾	
29	desgl. Nestlé's Condensed Milk-Company, spec. Gew. 1,298	1891	25,83	9,12	12,35	9,50	41,12	2,08	12,30	16,65	1,97	B. C. Niederstadt ⁴⁾
30	desgl.	1896	23,85	8,51	10,70	14,25	41,02	1,67	11,18	13,99	1,79	Ch. F. Worcester ⁵⁾
	Mittel (26—30)	—	24,62	10,09	11,39	11,70	40,20	2,00	13,38	15,11	2,14	
31	Genf (Nestlé)	1880	25,35	11,26	9,37	9,47	42,47	2,08	15,08	12,42	2,41	L. Janke ⁶⁾
32	Thun-Schweiz, Gerber u. Co.	1877	35,66	16,35	14,68	30,18	3,12	25,41	22,81	4,07	N. Gerber ⁷⁾	
33	desgl.	1870	26,05	12,46	10,42	11,04	38,19	1,89	16,85	14,09	2,70	u. u.)
	Mittel (31—33)	—	30,86	14,41	12,55	10,31	29,76	2,51	19,11	18,45	3,06	
34	Gruyères in der Schweiz	1873	29,80	8,81	12,61	46,55	2,23	12,55	17,99	2,01	E. Schultze ⁸⁾	
35	Sassie	1868	12,43	17,59	18,31	48,14	3,53	20,09	20,91	3,21	v. Gohren ⁹⁾	
36	Weichnitz	"	28,63	10,85	12,18	—	—	15,20	17,07	2,43	K. Eichhorn ¹⁰⁾	
37	desgl.	1867	21,50	10,20	12,90	52,90	2,50	12,99	15,52	2,08	E. Peters ¹¹⁾	
38	Innsbruck (J. Gfall)	1873	24,53	10,97	11,17	50,06	3,27	14,54	14,80	2,35	J. Moser und F. Soxhlet ¹²⁾	
39	desgl.	"	27,38	9,24	9,61	17,25	34,40	2,12	12,72	13,23	2,04	u. u.)
40	Wien (Hernals)	1879	24,26	10,82	9,63	53,13	2,16	14,29	12,71	2,29	P. Soxhlet ¹³⁾	
41	Mailand	"	26,88	11,07	8,67	51,12	2,26	15,14	11,86	2,42	N. Gerber ¹⁴⁾	
42	desgl.	1878	25,21	14,65	9,21	13,42	35,48	2,03	19,59	12,31	2,13	J. Martenson ¹⁵⁾
43	desgl.	1880	26,75	9,95	8,81	15,13	37,16	2,05	13,58	12,03	2,17	N. Gerber ¹⁶⁾
44	Waterloo (Dairy Co.) ¹⁷⁾	1878	21,67	15,86	9,15	13,48	36,23	2,61	20,25	11,68	3,24	N. Gerber ¹⁷⁾
45	Hamburg (Albers) ¹⁸⁾	1871	15,45	19,76	11,52	16,17	34,65	2,45	23,37	13,63	3,74	Schaeffer ¹⁸⁾
46	Norwegen (Honnar) ¹⁹⁾	1875	32,80	13,13	9,80	41,25	3,01	19,54	14,58	3,13	N. Gerber ¹⁹⁾	
47	desgl.	1876	35,66	16,35	14,68	30,18	3,12	25,41	22,82	4,07	F. Soxhlet ²⁰⁾	
48	desgl.	1879	30,08	9,02	7,54	51,35	2,01	12,90	10,79	2,06		
49	London Hooker's Cream Milk Co.	"	25,56	12,39	9,90	10,18	40,10	1,87	16,64	13,16	2,66	G. Gerber ²¹⁾
50	Wilts (Swindon)	"	24,89	13,08	10,64	13,31	35,47	2,61	17,41	14,17	2,79	
51	Herkunft nicht näher angegeben ²²⁾	1876?	24,30	18,52	10,80	16,50	27,11	2,77	21,82	14,27	3,91	Arth. Hill Hassall ²²⁾
52	(England?)	"	27,00	17,20	11,30	12,00	29,59	2,91	23,56	15,48	3,77	
53		"	26,50	16,39	9,50	17,54	27,06	3,09	22,30	12,93	3,55	
54		"	24,94	15,36	9,50	15,36	32,14	2,43	20,46	12,66	2,27	

¹⁾ Jahresbericht für Agrik.-Chem. 1873/74, 280. Desgl. 1879, 356 und Erster Bericht über Arbeiten der landw. Versuchsanstalt Wien 1878, 70.

²⁾ Das Molkereiwesen von W. Fleischmann 1879, 1052—1053.

³⁾ Forschungen auf dem Gebiet der Viehhaltung. Beilage zur Milchztg. 1879, Heft VII.

⁴⁾ Milchztg. 1891, 20, 695.

⁵⁾ 27. Jahresbericht des Gesundheitsrathes von Massachusetts. Boston 1896, 664.

⁶⁾ Hannov. Monatsschr. wider die Nahrungsfälscher 1880, 62.

⁷⁾ Milchztg. 1875 u. 1876 und Alpwirthsch. Monatsbl. 1878, No. 65.

⁸⁾ Dasselbe 1876, No. 167, 1700.

⁹⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1868/69, 708 u. 709.

¹⁰⁾ Dasselbe 1867, 338.

¹¹⁾ Chem.-Ztg. 1881, 5, 269.

¹²⁾ Pharm. Centrbl. 1871, No. 35.

¹³⁾ Food, its adulteration and the methods for their detection. London 1876, 395.

¹⁴⁾ Diese Proben erscheinen ebenfalls sämtlich verdächtig, d. h. aus theilweise entrahnter Milch hergestellt.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz			Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Rohr-zucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %			
55	New-York, Gail Borden .	1875	27,72	9,92	8,61	51,84	1,81	13,72	11,91	2,20	N. Gerber ¹⁾		
56	desgl. (Aldernay) . . .	1876	28,38	10,22	9,23	51,57	1,56	14,27	12,89	2,28			
57	desgl. (Amer. cond. Milk Co. ²⁾)	1878	25,43	11,35	7,01	10,11	44,22	1,89	15,22	9,40		2,44	
58	Herkunft nicht näher unterschieden (aus der Schweiz, England, Irland, Norwegen und Canadien)	1884	27,50	11,50	10,50	14,40	34,50	1,60	15,86	14,48	2,54	derselbe ²⁾	
59		"	28,30	11,80	9,60	14,70	33,80	1,80	16,46	13,39	2,63		
60		"	27,25	12,12	9,00	15,20	34,40	2,03	16,66	12,37	2,67		
61		"	30,20	12,00	8,00	15,00	32,40	1,90	17,19	11,46	2,75		
62		"	28,50	11,30	8,60	14,00	36,00	1,60	15,80	12,03	2,53		
63		"	29,50	11,50	8,20	14,40	35,00	1,40	16,31	11,63	2,61		
64		"	28,80	12,00	6,70	15,00	36,00	1,50	16,85	9,41	2,70		
65	Aus Vevey und Montreux	1883	26,33	8,54**	9,78	13,85	39,80	1,70	11,59	13,28	1,85	Ch. Girard ³⁾	
66	Aus England?	1881	21,68	9,19**	9,92	56,98	2,23	11,73	12,67	1,88	Völcker ⁴⁾		
67		"	23,49	9,27	6,47	58,66	2,11	12,12	8,46	1,94			
68		"	22,15	8,82	10,69	55,96	2,17	11,37	13,67	1,82			
69		"	24,53	9,44	6,22	57,72	2,09	12,51	8,24	2,00			
70		"	23,49	7,43**	9,53	57,34	2,21	9,71	12,46	1,55			
71	Eingedickte Milch der Fabrik Hollandia in Vlaardingen	1890	29,39	8,58	7,11	12,33	39,65	2,94	12,15	10,07	1,94	f ⁵⁾	
72	Italian condensed Milk Company. Spec. Gew. 1,299	1891	27,07	9,12	10,18	10,92	40,12	2,59	12,51	13,96	2,00	B. C. Niederstadt ⁶⁾	
73	Schmidt's kondens. Milch (Holstein). Spec. Gew. 1,267	"	34,70	11,50	13,89	10,50	26,62	2,79	17,61	21,27	2,82		
74	Kondensierte Vollmilch (aus England?)	1888	26,40	12,60	11,50	14,40	29,95	2,05	17,12	15,63	2,74		
75		"	25,60	10,67	10,40	14,52	33,59	1,90	14,34	13,98	2,29	J. C. Shennstone ⁷⁾	
76		"	26,80	11,07	10,65	14,20	32,15	1,90	15,12	14,55	2,42		
77	„Reindeer Brand“ der Condensed Milk u. Canning Co., Truro, No. 5 . . .	1892	25,67	8,44	7,29	13,49	43,16	1,95	11,36	9,81	1,82	Frank T. Schult ⁸⁾	
78	„Fluid Brand“ von Gebr. Cleever, London u. Liverpool	"	27,70	9,31	5,13	14,30	41,50	2,06	12,88	7,10	2,06		

¹⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 338.

²⁾ Forschungen auf dem Gebiet der Viehhaltung. Beilage zur Milchztg. 1879, Heft VII.

³⁾ Nach Pharm. Journ. und Trans. 1884 in Chem.-Ztg. 1884, 8, 1874.

⁴⁾ Girard, Documents sur les falsifications. Laboratoire municipal. Deuxième rapport. Paris 1885, 633 u. 656.

⁵⁾ Analytiker? Mandbl. tegen de Verfalch. v. Lebensmidd. 1890, No. 12. Molkerei-Ztg. 1890, 46. Viertelj. Nahrungs- u. Genussmittel 1890, 5, 419.

⁶⁾ Milchztg. 1891, 20, 695.

⁷⁾ Analyst 1888, 13, 222 und Viertelj. Nahrungs- u. Genussmittel 1888, 3, 356. Auf die Untersuchungsmethoden des Verf. kann hier nur verwiesen werden.

⁸⁾ Commercial Bulletin No. 6. Ottawa Canada 29, 1892, 11—14. Centrbl. Agrikultur-Chemie 1895, 22, 858.

Die Probe „Reindeer Brand“ war von schwach gelblicher Farbe und vorzüglicher Beschaffenheit, vollständig homogen und gleichmässig löslich in Wasser. Auch die Probe „Fluid Brand“ war von guter Beschaffenheit und leicht löslich.

⁹⁾ Diese Proben erscheinen ebenfalls sämtlich verdächtig, d. h. aus theilweise entrahmter Milch hergestellt.

¹⁰⁾ Aus dem gefundenen Stickstoff durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz			Analytiker	
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Rohr-zucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %		
	Kondensierte Milch aus Amerika.												
	Preis pro can												
79	Standart	0,18	1896	27,63	7,40	9,63	16,75	36,59	2,00	10,23	13,31	1,64	Charles R. Worcester ¹⁾
80	desgl.	0,10	"	30,51	9,09	8,25	10,09	40,54	1,52	13,09	11,90	2,09	
81	Baby	0,10	"	24,48	7,27	11,95	12,18	42,46	1,86	9,63	15,82	1,54	
82	Rose	0,13	"	27,95	8,33	10,88	11,51	39,63	1,70	11,56	15,10	1,85	
83	desgl.	0,10	"	24,70	7,52	10,23	20,06	35,54	1,95	9,99	13,59	1,60	
84	desgl.	0,12	"	26,65	7,50	10,82	11,55	41,98	1,50	10,22	14,75	1,64	
85	Bell	0,09	"	29,68	7,55	9,44	13,96	37,55	1,82	10,74	13,42	1,72	
86	Street Clover	0,10	"	27,18	5,95	9,68	12,18	43,50	1,51	8,17	13,29	1,31	
87	desgl.	0,10	"	28,30	7,00	9,52	9,71	44,18	1,29	9,76	13,28	1,56	
88	J. B. Smith	—	"	30,85	7,84	9,25	13,84	36,50	1,72	11,34	13,38	1,94	
89	Tip Top	0,09	"	29,60	9,39	10,54	12,73	36,05	1,69	13,34	14,47	2,33	Charles R. Worcester ¹⁾
90	desgl.	0,10	"	24,75	7,39	7,80	18,93	39,53	1,60	9,82	10,37	1,57	
91	desgl.	0,10	"	28,18	9,06	10,47	13,34	37,38	1,57	12,61	14,58	2,02	
92	Challenge	0,10	"	29,50	8,32	10,80	11,43	38,28	1,67	11,80	15,32	1,89	
93	Gail Borden Eagle	0,18	"	28,04	8,78	8,25	11,55	41,96	1,42	12,20	11,46	1,95	
94	desgl.	0,18	"	27,27	8,39	10,35	13,84	38,37	1,78	11,54	14,23	1,85	
95	Sachem	0,08	"	29,56	8,37	9,28	15,43	35,79	1,57	11,88	13,17	1,90	
96	Leader	0,09	"	25,44	5,96	9,72	12,69	44,62	1,57	7,99	13,04	1,28	
97	Magnolia	0,10	"	29,11	7,58	10,43	11,75	39,45	1,68	10,70	14,73	1,71	
98	desgl.	—	"	27,90	8,51	7,45	16,58	38,04	1,52	11,80	10,33	1,89	
99	Rival	0,10	"	25,96	6,42	8,42	14,69	43,19	1,32	8,67	11,37	1,39	Charles R. Worcester ¹⁾
100	Buttercup	—	"	34,10	9,25	9,18	7,09	38,92	1,50	14,04	13,93	2,25	
101	desgl.	—	"	31,00	6,90	9,13	11,92	39,64	1,41	10,00	13,23	1,60	
102	Russel	—	"	25,41	8,31	8,05	10,53	46,26	1,44	11,14	10,79	1,78	
103	Ten Cent	0,10	"	24,59	9,83	10,61	13,40	39,99	1,58	13,04	14,07	2,09	
104	Pine Tree	0,10	"	29,50	7,67	9,91	13,13	38,30	1,49	10,87	14,06	1,74	
105	Dime	0,08	"	28,88	9,42	8,22	13,45	38,63	1,40	13,25	11,56	2,12	
106	Daisy	0,10	"	27,50	8,92	9,05	14,25	38,96	1,32	12,30	12,48	1,97	
107	Milk Maid	0,15	"	27,58	8,90	12,34	7,05	42,77	1,36	12,29	17,04	1,97	
108	Thistle	—	"	28,68	8,47	8,03	10,94	42,55	1,33	11,88	11,26	1,90	
	Kondens. Milch aus Amerika No. 79—108, Mittel	—	—	28,02	8,06	9,58	12,89	39,92	1,53	11,20	13,31	1,89	
	Mit Rohrzucker kondens. Milch												
	Gesamtmittel			26,44	10,47	10,07	14,16	36,86	2,00	14,24	13,69	2,28	
	Schwankungen ²⁾			12,43—35,66	5,88—18,69	5,22—17,47	7,16—18,60	26,24—46,99	1,28—3,20	7,99—25,41	7,10—23,75	1,28—4,07	

¹⁾ 27. Jahresbericht des Gesundheitsrathes von Massachusetts. Boston 1896, 664.

²⁾ Die Schwankungszahlen ausschließlich derer für Wasser sind auf den mittleren Wassergehalt (26,44%) bezogen.

³⁾ Untersuchungsmethoden: 40 g der gut durchgemischten Substanz wurden mit Wasser auf 100 ccm aufgefüllt. Von dieser Lösung wurde ein Theil noch mit der gleichen Menge Wasser verdünnt und 5 ccm der so erhaltenen Lösung = 1 g Substanz zur Bestimmung der Trocken-Substanz und der Asche verwandt. 2 g der 40-prozentigen Lösung wurden in einer Filtrirpapierhülle bei 100° getrocknet und im Soxhlet-Apparat extrahirt. Die Eiweißstoffe wurden in 5 ccm mit Kupfersulfat gefällt, entfettet und verascht. Im Filtrat wurde

Kondensierte Halbmilch und Magermilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Milch						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker	
			Wasser o/o	Stickstoff-Substanz o/o	Fett o/o	Milchzucker o/o	Rohrzucker o/o	Asche o/o	Stickstoff-Substanz o/o	Fett o/o			
1	Von Heckmann in Berlin	1882	68,96	12,43	0,26	15,73	—	2,96	40,05	0,84	6,41	W. Fleischmann ¹⁾	
2	Aus England?	1888	30,30	12,60	4,70	15,28	35,15	2,10	18,08	6,74	2,89	J. C. Shearstone ²⁾	
3		"	24,80	12,40	4,70	15,72	38,70	2,42	16,49	6,25	2,64		
4		"	26,80	12,37	4,70	14,60	39,90	2,27	16,90	6,42	2,70		
5		"	28,00	12,10	4,00	14,90	38,70	2,37	16,81	5,56	2,69		
6	Von van den Bergh in Cleve	1896	35,80	10,09	0,27	12,87	38,84	2,13	15,72	0,42	2,52	Versuchstation Münster ³⁾	
7	"Shamrock Brand" von Gebr. Cleever, London und Liverpool . . .	1892	30,22	10,44	0,35	10,80	46,06	2,13	14,98	0,50	2,40	Frank T. Schutt ⁴⁾	
8	Aus Deutschland . . .	1898	26,67	11,63	Spur	13,77	45,28	2,23	15,86	Spur	2,54	R. Hefelmann ⁵⁾	
Mittel (No. 2—8)			—	28,94	12,71	2,63	13,99	39,49	2,24	17,83	3,70	2,85	

Kondensierte Molken.

1	Von Heckmann in Berlin	1882	20,64	11,06	0,38	61,06	—	6,86	13,94	0,48	2,23	W. Fleischmann ¹⁾
---	------------------------	------	-------	-------	------	-------	---	------	-------	------	------	------------------------------

Kondensierte Ziegenmilch.

1	Von Gebr. Sigmond in Klausenburg . . .	1880	20,98	17,00	16,95	15,72	26,75	2,60	21,51	21,45	3,44	V. Goddard ⁶⁾
---	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	--------------------------

Kondensierte Stutenmilch.

1 ⁷⁾	Von Dr. Carrick's	Sommer	1882	17,90	13,50	12,07	54,88	1,65	16,44	14,70	2,63	
2 ⁸⁾	Fabrik in	"	"	18,80	15,23	10,08	54,09	1,80	18,76	12,41	3,00	
3 ⁹⁾	Orenburg dar-	"	1883	26,73	13,69	4,77	53,07	1,74	18,68	6,51	2,99	
4 ¹⁰⁾	gestellt	"	"	24,04	12,17	6,20	55,81	1,78	16,15	8,16	2,58	
Mittel (No. 2—4)				—	21,87	13,65	8,28	54,46	1,74	17,50	10,49	2,80

der Milchzucker volumetrisch nach Fehling und der Rohrzucker aus der Differenz bestimmt. — Nach obigen Analysen sind alle eingedickten Milchproben aus Vollmilch hergestellt. Zur Berechnung des Fettgehalts der verwendeten Milch wurde ein fettfreier Trocken-Substanzgehalt von 9,5% in der Milch angenommen.

Bei 13 von demselben Verfasser früher untersuchten Proben kondensierter Milch schwankte der Wassergehalt von 23,32—31,68%, der Fettgehalt von 3,15—7,83%. Nach 26. Jahresbericht des Gesundheitsrathes von Massachusetts, Boston 1895; Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1895, 10, 615.

¹⁾ Bericht der Milchw. Versuchsstation Raden 1882. Rostock 1883, 8, 22.

²⁾ Analyst 1888, 13, 222. Vierteljahresschr. Chemie Nahrungs- u. Genussm. 1888, 3, 356. Auf die Untersuchungsmethoden des Verfassers kann hier nur verwiesen werden.

³⁾ Original-Mittheilung.

⁴⁾ Commercial Bulletin No. 6. Ottawa Canada 29/12 1892, 11—14. Centrbl. Agrrikultur-Chemie 1893, 22, 858. Die Milch ist etwas bläulich gefärbt, von guter Beschaffenheit und leicht löslich in Wasser.

⁵⁾ Zeitschr. öffentl. Chem. 1898, 4, 451. Die Milch enthält 0,47% Milchsäure.

⁶⁾ Milchztg. 1890, 9, 362.

⁷⁾ Milchztg. 1883, 12, 329 und 1884, 13, 164.

⁸⁾ No. 1 u. 2 waren durch Zusatz von 2,33% Zucker und Eindampfen auf ca. 1/4 ihres Gewichtes, No. 3 u. 4 durch Zusatz von 3% Zucker und Eindampfen auf ca. 1/4 ihres Gewichtes dargestellt. Die kondensierte Stutenmilch soll wie kondensierte Kuhmilch als Ersatz der Muttermilch für Säuglinge dienen.

Milchpulver.

milchpulver.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
I. Aus Vollmilch.											
1	Pure compressed cream Milk von der „Fabrik kondensirter Milch“ in Gossau in der Schweiz	1888	3,92	24,38	26,04	38,51	7,24	25,37	27,10	4,06	Ambühl ¹⁾
2	Von A. Rosam in Pilsen	1896	8,77	23,10	22,10	26,26 _{*)}	3,53	25,32	24,22	4,05	LachslausHouda ²⁾
3	Von C. Drenkhan in Stentorf	1895	5,55	21,76 _{*)}	21,35	46,21	5,13	23,04	22,61	3,69	Versuchstation Münster ³⁾
	Mittel	.	6,08	23,09	23,14	42,39	5,30	24,58	24,64	3,93	
II. Aus Magermilch.											
1	Pure compressed Milk-extract von der „Fabrik kondensirter Milch“ in Gossau in der Schweiz	1888	4,17	35,56	1,65	52,37	7,51	37,11	1,72	5,94	Ambühl ¹⁾
2	Milchpulver von C. Drenkhan in Stentorf	1892	6,71	29,42	0,80	57,25	5,82	31,54	0,86	5,05	J. König ⁴⁾
3	Milchpulver (aus der Schweiz?)	1890	5,80	29,90	2,40	56,10	5,80	31,74	2,55	5,08	P. Vieth ⁵⁾
4	Milchpulver von C. Knoch in Melle	1893	13,51	28,48	2,03	49,21	6,77	32,93	2,35	4,27	Versuchstation Münster ³⁾
	Mittel	.	7,55	30,81	1,73	53,43	6,48	33,33	1,87	5,33	

Rahm.

1	Ohne nähere Bezeichnung	1860	83,23	4,24	8,17	3,02	—	25,28	48,72	4,05	F. Hoppe-Seyler ⁶⁾
2		"	80,42	4,29	10,84	3,74	—	21,91	55,36	3,51	
3		"	82,36	4,16	9,76	—	—	23,58	55,33	3,77	
4		1863	59,25	2,20	35,00	3,05	0,50	5,40	85,89	0,86	Alex. Müller ⁷⁾
5		"	52,51	2,69	41,16	3,19	0,45	5,66	86,67	0,91	
6		"	70,41	—	23,05	—	0,59	—	77,89	—	derselbe ⁸⁾
7		"	59,92	2,60	33,55	3,30	0,63	6,48	83,71	1,00	
8		"	60,10	2,73	33,56	2,99	0,62	6,84	84,11	1,09	
9		1867	66,73	3,18	25,04	4,34	0,71	9,56	75,26	1,53	
10		"	71,80	2,75	20,94	3,96	0,55	9,75	74,26	1,56	
11		"	74,20	2,66	17,93	4,57	0,65	10,31	69,50	1,65	

¹⁾ Jahresbericht des Kantonchemikers von St. Gallen für 1888. Milchztg. 1889, 13, 653.
²⁾ Vierteljahrsschr. Nahrungs- u. Genussm. 1896, II, 326. Die Milchsalze wird durch einen Zerstäubungsapparat auf 20° warme Platten gebrüht.

³⁾ Original-Mittheilung.
⁴⁾ Bericht über die Dauerwaren für Ausfuhr und Schiffsbedarf auf der 5. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Bremen 1892, 221. Melkerztg. 1892, 16.

⁵⁾ Milchztg. 1891, 20, 69.
⁶⁾ Chem. Centrbl. 1860, 49 u. 65.

⁷⁾ Landw. Versuchsstationen 5, 161.
⁸⁾ Daselbst 9, 276, 285 u. 294.

⁹⁾ Das Milchpulver enthält ferner 20,45% Rohrzucker.
¹⁰⁾ Mit 14,94% Kasein + unlös. Albumin, 1,09% gelöstem Albumin, 5,73% Laktoprotein.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
12	Ohne nähere Bezeichnung	1849	56,04	6,02	34,38	2,67	0,88	13,69	78,21	2,19	Orthmann ¹⁾
13		1859	63,28	4,22	29,46	2,08	0,40	11,49	81,88	1,86	Hamburg ²⁾
14		1863	74,46	2,69	18,18	4,08	0,59	10,53	71,18	1,69	A. Völcker ³⁾
15		"	64,80	—	25,40	—	0,10	—	72,16	—	
16		"	56,50	—	31,57	—	0,40	—	72,57	—	
17		"	61,67	2,62	33,43	1,56	0,72	6,84	87,22	1,09	Gérard ⁴⁾
18		"	79,52	—	15,56	—	0,63	—	75,98	—	
19	Bei 6°C. 16 St. Aufrahmung	1875	77,45	2,86	14,31	5,38	—	12,68	63,46	2,03	U. Kreuter ⁵⁾
20	" 28 " "	"	77,37	3,17	15,07	5,39	—	14,01	66,55	2,24	
21	" 40 " "	"	75,59	3,01	17,41	3,99	—	12,33	71,32	1,97	
22	Bei 8°C. 16 " "	"	77,46	3,58	13,24	5,72	—	15,88	58,74	2,54	
23	" 28 " "	"	75,73	4,20	16,27	3,80	—	17,31	67,04	2,77	
24	" 40 " "	"	74,93	2,75	17,07	5,25	—	10,97	68,09	1,76	
25	Bei 10°C. 16 " "	"	75,89	3,47	15,25	5,39	—	13,98	63,25	2,30	
26	" 28 " "	"	74,82	2,54	17,61	5,03	—	10,08	69,94	1,61	Arth. Hül Hassall ⁶⁾
27	" 40 " "	"	72,75	2,48	18,65	6,12	—	9,10	68,44	1,46	
28	Bei 15°C. 16 " "	"	73,46	3,48	17,31	5,75	—	13,11	65,60	2,10	
29	" 28 " "	"	71,77	3,10	20,45	4,68	—	10,98	72,44	1,76	
30	Ohne nähere Bezeichnung	1876	62,12	5,83	30,64	1,27	0,14	15,39	80,89	2,46	
31		"	61,50	5,14	32,22	0,74	0,40	13,35	83,69	2,14	
32		"	63,24	2,70	31,42	2,36	0,28	7,34	85,47	1,18	
33		"	49,10	5,20	42,82	2,46	0,42	10,22	84,13	1,63	
34		"	43,04	7,40	44,76	4,45	0,35	12,99	78,23	2,08	
35		"	45,82	6,38	44,33	2,92	0,50	11,78	81,82	1,88	W. Fleisch- mann ⁷⁾
36	Mit Lehfeldt's Centrifuge ⁸⁾	1878	29,55	1,42	67,63	2,25	0,12	2,02	96,00	0,32	A. Völcker ³⁾
37	Mit de Laval's Separator	1880	66,12	2,69	27,69	3,03	0,47	7,94	81,73	1,27	J. König ⁹⁾
38	Nach Swartz'schem Verfahr. ¹⁰⁾	1878	68,40	—	22,08	—	—	—	69,87	—	Storch ¹¹⁾
39	Aus Milch altmilchender,	1877	77,26	3,89	14,64	3,52	0,69	17,10	64,38	2,73	
40	dänischer Kühe	"	77,34	3,73	14,73	3,52	0,68	16,46	65,00	2,63	
41	desgl. frischemilchender Kühe	"	79,96	3,31	12,28	3,77	0,68	16,51	61,27	2,64	Schmidt ¹²⁾
42	Mittel von 7 Proben ¹³⁾	1881	65,26	—	28,31	—	—	—	81,49	—	

¹⁾ Landw. Erfahrungen von Hohenheim 1849, 131.²⁾ Landw. Versuchsstationen 1859, I, 98.³⁾ Journ. of the Roy. agric. Soc. of England 1863, 24, 298.⁴⁾ Die Milch, von Beuno Martiny 1871, 2, 67 u. 110.⁵⁾ Landw. Jahrbücher 1875, 4, 249 u. s. f.⁶⁾ Hassall, Food: Its adulteration and the methods for their detection. London 1876, 395.⁷⁾ W. Fleischmann, Das Molkereiwesen 1878, 704.⁸⁾ Journ. of the Roy. Agric. Soc. of England 1880, 2, 160.⁹⁾ Original-Mittheilung.¹⁰⁾ Von H. Cordes mitgetheilt in Milchztg. 1881, 10, 606.¹¹⁾ Milchztg. 1882, II, 103.¹²⁾ Rahmstücke.¹³⁾ Mittel von 4 Analysen.¹⁴⁾ Die Rahmproben stammten aus der Genossenschafts-Molkerei in Itzehoe; sie enthielten:

Maximum	80,29 % Wasser	50,98 % Fett
Minimum	43,21 " "	13,07 " "

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker %	Asche %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
43	Nach Swartz'schem Verfahren und mit Centrifuge . . .	1882	78,93	2,76	13,88	3,75	0,68	13,10	65,88	2,10	W. Fleischmann ¹⁾
44	Mit de Laval's Separator. Spec. Gew. 1,0200 . . .	1884	76,64	3,07	15,15	4,50	0,64	13,14	64,85	2,10	
45	Centrifugenrahm ²⁾ . Spec. Gew. 1,015 . . .	1890	71,02	3,02	21,95	3,32	0,58	10,42	75,74	1,67	Fred. D' Hont ³⁾
46	Gewöhnlicher Rahm, keimfrei	1897	68,48	—	28,80	—	0,64	—	91,37	—	E. Bergström ⁴⁾
47	Besonders dicker Rahm, „	„	47,23	—	49,19	—	0,26	—	93,22	—	
Mittel (ohne No. 36)			67,61	4,12	23,80	3,92	0,55	12,72	73,47	2,04	
Schwankungen ⁵⁾			43,04—83,23	1,75—8,19	15,78—30,19	0,62—6,23	0,11—1,10	5,40—25,28	48,72—93,22	0,86—4,04	

Devonshire-Rahm (Clotted cream).

Nach P. Vieth⁶⁾.

Der Clotted cream wird folgendermassen bereitet: Die Milch wird in flachen Blechsatten zum Aufrahmen hingestellt. Nach 12 Stunden werden die Satten in ein kochendes Wasserbad, das in einem gewöhnlichen Küchenherd eingestellt ist, eingehängt, bis der Rahm durch das Abdampfen von Wasser und die Bildung einer Haut eine eigenthümliche Beschaffenheit angenommen hat. Sodann werden die Satten herausgenommen, nochmals 10 Stunden stehen gelassen und dann der Rahm abgenommen. Der durch gelindes Rühren gemischte Rahm erhält eine salbenartige Beschaffenheit, der Geschmack ist der von gekochter Milch, er wird als Delikatesse mit Früchten genossen.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz				Fett in der Trocken-Substanz %
			Wasser %	Fett %	Stickstoff-Substanz + Milchzucker %	Asche %	
1	19 Proben . . . Mittel	1886	36,11	57,36	6,01	0,51	89,78
2	Wöchentlich 1mal untersucht	„	32,59—42,13	50,36—61,43	4,61—8,93	0,42—0,77	—
3	55 Proben . . . Mittel	1887	36,94	55,51	6,97	0,58	88,03
4	51 Proben . . . Mittel	1888	31,16—44,16	46,92—62,00	4,80—10,73	0,46—0,85	—
5	55 Proben . . . Mittel	1888	35,54	57,09	6,80	0,57	88,56
6	51 Proben . . . Mittel	1889	31,57—44,11	45,78—61,40	5,32—9,36	0,44—0,80	—
7	51 Proben . . . Mittel	1889	36,69	56,69	6,09	0,53	89,54
8	51 Proben . . . Mittel	1889	30,95—45,01	47,72—62,83	4,93—7,82	0,44—0,65	—

¹⁾ Bericht d. Milchv. Versuchsstation Raden für 1882, 24 und für 1884, 26.

²⁾ Fred. D' Hont, Contribution à l'étude du lait courtaï. Typolithographie de Jules Vernant 1890. Milchztg. 1890, 19, 706.

³⁾ Vierteljahresschr. Nahrungs- u. Genussm. 1897, 12, 362.

⁴⁾ Milchztg. 1887, 16, 120; 1888, 17, 129; 1889, 18, 141; 1890, 19, 185; 1891, 20, 60; 1892, 21, 191.

⁵⁾ 15 l Vollmilch gaben beim Centrifugiren 3,5 l Rahm und 12 l Magermilch. Die Zusammensetzung von Vollmilch und Magermilch war folgende:

	Spec. Gew.	Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Asche	Kalk (CaO)	Phosphorsäure (P ₂ O ₅)
Vollmilch	1,032	85,90	3,50	5,05	4,70	0,79	0,22	0,23 %
Magermilch	1,034	90,40	3,62	0,925	5,05	0,59	0,21	0,22 „
Rahm	—	—	—	—	—	—	0,155	0,17 „

Das spec. Gew. wurde mit der Westphal'schen Waage, das Kasein nach Kjeldahl, das Fett durch Ausziehen im Soxhlet'schen Apparat mit Aether und der Milchzucker gewichtsanalytisch mit Fehling'scher Lösung bestimmt.

⁶⁾ Das Mittel für Milchzucker ist aus der Differenz berechnet. — Die Schwankungszahlen für die natürliche Substanz sind auf den mittleren Wassergehalt von 67,61 %, bezogen.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz				Fett in der Trocken-Substanz
			Wasser	Fett	Stickstoff-Substanz + Milchzucker	Asche	
			%	%	%	%	%
5	51 Proben . . . Mittel	1890	35,16	58,35	5,97	0,52	89,99
	Schwankungen	—	29,18—41,80	51,19—64,66	5,17—6,59	0,45—0,60	—
6	51 Proben . . . Mittel	1891	33,95	59,30	6,21	0,54	89,78
	Schwankungen	—	25,16—45,55	46,34—68,59	4,96—8,80	0,42—0,77	—
	Mittel	—	35,69	57,37	6,39	0,55	89,21
	Schwankungen	—	25,16—45,55	45,78—68,59	4,61—10,73	0,42—0,85	—

Die Magermilch von der Herstellung des Devonshire-Rahms hatte folgende Zusammenstellung:

		Spec. Gew.	Trocken-Substanz	Fett
1890	Mittel	1,0350	11,03	1,60
	Schwankungen	1,0385—1,0360	10,52—11,66	1,24—2,26
1891	Mittel	—	—	1,79
	Schwankungen	—	—	1,28—2,60

Saurer Rahm der Londoner Aylesbury Dairy Company hatte nach H. Droop-Richmond (Analyst 1897, 22, 93—95; Chem. Centrbl. 1897, I, 1033—1034) folgende Zusammensetzung:

	Trocken-Substanz	Fett	Asche
Minimum	56,42 %	46,66 %	0,52 %
Maximum	75,18 „	68,23 „	0,90 „
Mittel	67,64 „	59,16 „	0,68 „

Gärtner'sche Fettmilch.

Die Gärtner'sche Fettmilch wird in der Weise hergestellt, dass Kuhmilch mit soviel Wasser versetzt wird, dass der Kaseingehalt dem der Frauenmilch gleich ist; darauf wird diese verdünnte Milch centrifugirt, wobei als fettreicher Theil die Gärtner'sche Fettmilch erhalten wird.

No.	Fettmilch vom	Spec. Gewicht	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Stickstoff in der Trocken-Substanz	Säuregrade, 1/10 Normal-Alkal	Analytiker
			Wasser	Kasein	Albumin	Fett	Milch-zucker	Asche	Kasein	Albumin	Fett			
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	ccm	
1	20/8 1897 . . .	1,0257	90,85	1,47	2,75	4,57	0,36	16,07	30,05	2,57	7,5			
2	7/11 „ . . .	1,0252	90,91	1,36	0,15	2,92	4,29	0,37	14,96	1,65	32,12	2,66	7,0	
3	22/12 „ . . .	1,0263	90,12	1,22	0,38	3,05	4,90	0,33	12,35	3,85	30,87	2,59	8,0	
4	27/8 „ . . .	1,0254	91,62	1,48	2,38	4,15	0,37	17,66	28,40	2,83	7,2			
5	11/9 „ . . .	1,0275	90,96	1,03	0,62	2,13	4,89	0,37	11,39	6,86	23,56	2,92	8,5	
6	30/9 „ . . .	1,0255	91,32	1,45	0,15	2,40	4,28	0,40	16,71	1,73	27,65	2,95	10,6	
7	11/10 „ . . .	1,0260	91,27	1,39	0,63	1,96	4,40	0,35	15,92	7,22	22,45	3,70	8,7	
8	19/10 „ . . .	1,0260	91,33	1,30	0,35	2,03	4,54	0,45	14,99	4,04	23,18	3,04	8,4	
9	12/11 „ . . .	1,0260	91,15	1,43	0,16	2,24	4,57	0,45	16,16	1,81	25,31	2,96	8,8	

G. Rupp (Forschungsberichte über Lebensmittel etc. 1896, 3, 130—132) untersuchte vom 20/8 1895 bis 6/2 1896 24 Proben Gärtner'sche Fettmilch aus der Milchkuranstalt von Dr. Jansen in Karlsruhe und fand in 100 ccm g:

¹⁾ Bericht über die Thätigkeit des milchwirthschaftlichen Instituts zu Hameln für 1897. Milchztg. 1898, 27, 354.

	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz	
	Wasser	Kasein	Fett	Milchzucker	Asche	Kasein	Fett
Minimum	88,60	1,20	2,70	4,50	0,31	10,53	23,68
Maximum	90,40	1,68	3,90	6,00	0,41	17,50	40,63
Mittel	89,60	1,46	3,20	5,15	0,33	14,02	32,16

Nach Niederstadt (Milchztg. 1897, 26, 88) hatten 17 Proben Gärtner'sche Fettmilch aus Hamburg

im Mittel	3,16 % Fett	1,70 % Kasein	5,55 % Milchzucker
Minimum	2,70 " "	1,24 " "	4,90 " "
Maximum	3,60 " "	2,34 " "	5,80 " "

Nähere Bezeichnung	Spec. Gewicht	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz
		Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett	
Gärtner'sche Fettmilch:									
Gesamtmittel (50 Proben)	1,0260	90,00	1,62	3,11	4,93	0,34	16,18	31,05	2,59
Schwankungen	1,0252—1,0275	88,60—91,62	1,20—2,34	1,96—3,90	4,15—6,00	0,31—0,45	10,53—23,14	22,45—40,63	1,68—3,70

Rahm aus Büffelmilch.

Rahm aus rumänischer Büffelmilch enthielt nach W. Fleischmann (Bericht Raden 1886 Rostock 86, 63): 37,00 % Wasser, 56,79 % Fett, 5,75 % Protein + Milchzucker, 0,46 % Asche.

Schlamm aus Centrifugen

(der in den Trommeln zurückbleibt, etwa 0,10 % der Milch).

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett		
1	Aus De Laval's Separator bei 6200 Touren der Trommel in der Minute	6. Februar 1880	67,33	28,99	0,19	—	3,49	88,74	0,58	14,20	W. Fleischmann ¹⁾
2		30. Juni "	68,73	25,79	2,02	0,44	5,01	82,48	6,46	15,20	
3		28. Oktober 1882	67,31	27,42	1,16	—	4,11	83,88	3,55	13,42	
4		7. Mai 1883	65,90	26,00	—	3,26	3,73	76,25	—	12,20	
5	bei 6200 Umgängen	15. Januar 1884	65,88	25,93	1,37	3,20	3,54	76,06	4,02	12,16	
	Mittel	—	67,03	26,86	1,20	1,34	3,57	81,47	3,65	13,03	

¹⁾ Bericht der Milchw. Versuchstation Raden für 1883, 25 und für 1884, 27.

²⁾ Einschl. Milchsücker.

³⁾ Die Asche hatte im Mittel von 2 Analysen folgende proc. Zusammensetzung:

Kalk	Natron	Kalk	Magnesia	Eisenoxyd	Phosphorsäure	Chlor	Sonstige Bestandtheile
(CaO)	(Na ₂ O)	(CaO)	(MgO)	(Fe ₂ O ₃)	(P ₂ O ₅)	(Cl)	
2,39 %	1,01 %	33,87 %	2,53 %	1,39 %	33,09 %	1,28 %	24,73 %

Butter.

I. Kuhbutter.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kaseln %	Milch- zucker %	Sonstige stickst.- freie Stoffe %	Asche %	Fett %	Stick- stoff- Substanz %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
1		1864	13,67	85,00	0,51	0,70	—	0,12	98,46	0,59	0,09	Alex. Müller und Eiseudack ¹⁾
2		"	14,02	82,03	2,58	—	—	1,37	95,41	—	—	
3		"	13,16	82,01	2,01	—	—	2,82	93,36	—	—	
4		"	11,42	85,35	1,92	—	—	1,31	96,35	—	—	
5		"	11,71	84,39	2,58	—	—	1,32	95,58	—	—	
6		"	11,29	85,75	1,30	—	—	1,70	96,66	—	—	
7		"	6,10	90,18	1,87	—	—	1,85	96,04	—	—	
8		"	10,07	87,05	1,37	—	—	1,51	97,78	—	—	
9		"	12,69	83,95	1,81	—	—	1,55	95,01	—	—	
10		"	16,13	81,86	1,85	—	—	0,16	97,60	—	—	
11		"	20,20	77,33	2,28	—	—	0,19	96,78	—	—	
12		"	13,46	83,34	0,99	—	—	2,21	96,30	—	—	
13		"	10,08	86,57	1,20	—	—	2,15	96,27	—	—	
14		"	14,84	83,51	1,59	—	—	0,06	98,06	—	—	
15	Schwedische Butter	"	18,29	79,61	1,93	—	—	0,17	97,43	—	—	
16	aus verschiedenen Orten	"	21,10	74,29	4,35	—	—	0,26	94,16	—	—	
17	Schwedens	"	8,87	88,89	0,91	—	—	1,33	97,53	—	—	
18	und nach verschiedenen	"	18,59	80,52	0,80	—	—	0,09	98,91	—	—	
19	Methoden dargestellt	"	17,03	81,55	1,33	—	—	0,09	98,29	—	—	
20		"	23,47	74,60	1,80	—	—	0,13	97,48	—	—	
21		"	14,96	83,35	1,59	—	—	0,10	97,99	—	—	
22		"	15,25	83,03	1,57	—	—	0,15	97,97	—	—	
23		"	9,24	83,52	0,64	0,60	—	6,00	92,02	0,71	0,11	
24		"	13,82	84,78	1,27	—	—	0,13	98,38	—	—	
25		"	7,66	88,83	0,29	—	—	2,59	96,20	—	—	
26		"	9,93	88,13	0,44	0,46	—	1,04	97,44	0,49	0,08	
27		"	12,56	83,57	0,78	0,43	—	2,66	95,57	0,89	0,13	
28		"	15,91	83,22	0,45	0,35	—	0,07	98,97	0,54	0,09	
29		"	15,30	82,89	0,75	0,88	—	0,18	97,86	0,89	0,14	
30		"	18,18	79,45	1,08	1,11	—	0,18	97,10	1,32	0,21	
31		"	13,00	85,69	0,62	—	0,69	—	98,49	0,71	0,01	
32		"	14,00	84,90	0,54	—	0,56	—	98,72	0,63	0,10	
33		"	11,44	86,08	0,54	0,70	—	1,24	97,20	0,61	0,10	
34		1867	13,82	84,78	1,27	—	—	0,13	98,38	—	—	Alex. Müller ²⁾
35		"	12,56	83,57	0,78	0,43	—	2,66	95,57	0,89	0,14	
36		"	15,91	83,22	0,45	0,35	—	0,07	98,97	0,54	0,09	
37	Septemberbutter, Holstein	"	10,25	86,88	0,52	0,49	—	1,86	96,80	0,58	0,09	
38	Frühjahrsbutter, Schweden	"	11,45	83,32	1,63	—	—	3,60	94,09	—	—	
39	Sommerbutter, desgl.	"	9,48	87,00	3,60	—	—	3,13	96,11	—	—	

¹⁾ Landw. Versuchstationen 1864, 6, 3.²⁾ Dasselbst 9, 276.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker	
			Wasser %	Fett %	Kaseln %	Milch- zucker %	Sonstige stickst.- freie Stoffe %	Asche %	Fett %	Stick- stoff- Substanz %		Stickstoff in der Trocken- Substanz %
40	Rahmbutter	1868	13,11	85,97	0,84	—	0,08	98,94	—	—	O. Lindt ¹⁾	
41	Vorbruchbutter	"	19,96	78,54	1,25	—	0,25	98,13	—	—		
Holsteiner Butter:												
42	Sehr fein	1872	11,68	86,95	0,19	0,85	—	1,43	98,45	0,22	0,04	A. Emmerling ²⁾
43	Mittelfein	"	12,09	84,76	0,39	0,81	—	1,95	95,28	0,44	0,07	
44	Recht fein	"	10,35	86,96	0,26	0,82	—	4,83	97,00	0,29	0,05	
45	Mittelmässig	"	10,09	85,50	0,28	0,69	—	2,24	95,10	0,31	0,05	
46	—	"	12,64	84,10	0,58	0,86	—	2,09	96,27	0,66	0,11	
47	—	"	14,42	82,91	0,50	1,07	—	1,78	96,88	0,58	0,09	
48	Oelig	"	10,81	86,43	0,32	0,75	—	1,85	96,91	0,36	0,06	
49	Normal und gut	"	12,29	85,50	0,57	0,59	—	0,93	97,48	0,65	0,10	
50	Gesalzene Butter	1873	5,50	90,96	0,50	—	—	3,02	96,25	0,53	0,08	R. Alberti ³⁾
51		"	10,60	86,62	0,63	—	—	2,03	95,77	0,70	0,11	
52	Theebutter	"	14,20	85,55	1,25	—	—	0,11	99,68	0,29	0,05	J. Moser ⁴⁾
53	Gute Marktbutter	"	13,70	86,06	1,42	—	—	0,12	99,70	0,49	0,08	
54	Schlechte "	"	17,08	82,60	1,72	—	—	0,20	98,43	0,87	0,14	F. Dahl ⁵⁾
55	Aus süsser Sahne	"	12,06	84,00	0,75	0,64	—	2,45	95,52	0,84	0,13	
56		"	12,05	84,43	0,51	0,47	—	1,98	96,00	0,58	0,09	
57	Aus saurer Sahne	"	11,88	83,21	0,92	0,74	—	3,17	94,43	1,04	0,17	
58		"	12,49	82,75	0,90	0,61	—	3,11	94,56	1,03	0,17	
59	I. Preis 1,10 Mk.	"	28,75	63,95	3,25	—	—	4,05	89,75	4,56	0,73	N. Gröger ⁶⁾
60	II. " 1,20 "	"	15,05	76,55	4,70	—	—	3,70	90,11	5,53	0,88	
61	III. " 1,30 "	"	12,72	83,60	2,60	—	—	1,12	95,78	2,98	0,48	
Schweizer Butter:												
62	Speisebutter	frische Butter	"	8,16	85,54	6,30	—	—	93,14	—	—	E. Schutze ⁷⁾
63	Vorbruchbutter		"	10,02	85,34	4,57	—	—	94,84	—	—	
64	Gemischte Butter	Butter- schmalz	"	11,68	83,09	5,23	—	—	94,08	—	—	
65	Speisebutter		"	(0,07)	99,00	0,93	—	—	(99,07)	—	—	
66	Vorbruchbutter		"	(0,04)	99,63	0,33	—	—	(99,66)	—	—	
67	Gemischte Butter		"	(0,06)	97,61	2,33	—	—	(97,67)	—	—	
68			1876	35,12	61,09	1,22	—	2,57	94,16	—	—	J. König u. G. Brimmer ⁸⁾
69			"	25,27	71,99	1,37	—	1,37	96,33	—	—	
70			"	27,55	69,82	1,07	—	1,56	96,37	—	—	
71			"	34,12	63,97	1,37	—	0,54	97,10	—	—	
72			"	30,42	66,68	1,15	—	1,75	95,83	—	—	
73			"	17,45	80,60	0,82	—	1,13	97,64	—	—	
74			"	27,53	67,65	2,33	—	2,49	93,35	—	—	
75			"	25,53	70,15	1,81	—	1,51	95,48	—	—	

¹⁾ Jahresbericht f. Agrik.-Chem. 1868/69, 711.

²⁾ Landw. Wochenbl. f. Schleswig-Holstein 1872, 499.

³⁾ Jahresbericht f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 289 u. 290.

⁴⁾ Landw. Ztg. f. Westf. u. Lippe 1876, 3.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker		
			Wasser o/o	Fett o/o	Kasein o/o	Milch- zucker o/o	Sonstige stickst.- freie Stoffe o/o	Asche o/o	Fett o/o	Stick- stoff- Substanz o/o	Stickstoff in der Trocken- Substanz o/o			
76	Süsse Butter	Aus süßem Rahm	1876	13,12	83,92	0,62	—	0,63	0,14	96,59	0,71	0,11	1,23	Kochsalz V. Storch ¹⁾
77	desgl.		"	13,41	83,82	0,61	0,46	0,74	0,12	96,80	0,70	0,11	1,30	
78	desgl.		"	10,45	85,40	0,54	0,32	0,53	0,16	95,37	0,60	0,10	2,92	
79	Saure Butter		"	17,09	80,01	0,87	0,13	0,71	0,15	96,50	1,05	0,17	1,17	
80	desgl.		"	11,57	85,43	0,62	0,17	0,39	0,12	96,61	0,70	0,11	1,87	
81	Seeländer Höckerb.	Aus saurem Rahm	"	9,60	86,77	0,71	0,25	0,62	0,15	95,98	0,67	0,11	2,25	V. Storch ¹⁾
82	Schlechte Butter		"	9,80	83,36	1,00	—	0,80	0,25	92,42	1,11	0,18	4,97	
	Spec. Gew. Schmelzpunkt													
83	0,927 22,5 C.		1859	18,11	80,22	1,59	—	—	0,08	97,96	1,94	0,31	1,00	Spuren C. Körner ²⁾
84	0,921 19,9 "		"	16,59	81,07	1,24	—	—	0,10	97,19	1,49	0,24	0,04	
85	0,925 19,3 "		"	17,74	80,99	1,15	—	—	0,08	98,45	1,40	0,22	0,14	
86	0,920 19,2 "		"	10,58	86,34	1,19	—	—	0,14	96,56	1,33	0,21	0,10	
87	0,927 21,9 "		"	15,94	81,88	2,02	—	—	0,10	97,41	2,40	0,38	0,10	
88	Alpenbutter	31,7 "	1877	10,81	86,14	1,86	—	—	0,20	96,58	—	—	—	W. Engling ³⁾
89		37,8 "	"	14,97	83,33	1,46	—	—	0,24	98,00	—	—	—	
90	Proben durch Milch- buttern erhalten ⁴⁾		1879	17,97	76,95	4,77	—	—	0,31	93,81	—	—	—	M. Schreder und Ph. du Rot ⁴⁾
91			"	16,03	81,17	2,69	—	—	0,11	96,67	—	—	—	
92			"	15,33	81,87	2,65	—	—	0,15	96,69	—	—	—	
93	Proben durch Rahm- buttern erhalten ⁵⁾		"	14,65	82,76	2,51	—	—	0,08	96,97	—	—	—	
94			"	13,78	83,80	2,28	—	—	0,14	97,19	—	—	—	
95			"	13,79	84,32	1,75	—	—	0,14	97,81	—	—	—	
	Italienische Butter:							Milch- säure						
96	Lodi		1878	13,66	84,95	0,36	0,60	—	0,43	98,39	0,42	0,07	0,38	A. Menozzi ⁶⁾
97	"		"	19,78	77,18	1,89	0,47	0,12	0,56	96,21	2,36	0,38	0,11	
98	Mailand ⁷⁾		"	14,78	83,87	0,60	0,44	0,10	0,20	98,42	0,70	0,12	0,10	
99	Codogno		"	15,08	83,38	0,65	0,57	0,09	0,23	98,19	0,77	0,12	0,27	
100	Lodi		"	15,47	83,34	0,58	0,31	0,14	0,16	98,59	0,69	0,10	0,15	
101	Meierei Malco		"	15,35	82,45	1,45	0,38	0,17	0,19	97,40	1,71	0,27	0,17	
102	Lodi		"	14,53	83,98	0,53	0,71	0,14	0,11	98,26	0,62	0,10	0,17	
103	"		"	15,25	83,25	0,79	0,36	0,15	0,19	98,26	0,93	0,15	0,17	
104	"		"	14,82	83,08	0,91	0,53	—	0,13	97,53	1,07	0,17	0,18	
105	"		"	15,59	83,57	0,99	0,59	0,10	0,16	99,00	1,07	0,17	0,13	
106	"		"	15,72	82,44	0,93	0,56	0,22	0,14	97,82	1,10	0,18	0,16	
107	"		"	15,03	83,56	0,67	0,45	0,14	0,15	98,34	0,79	0,13	0,16	
108	"		"	16,12	82,01	0,83	0,72	0,14	0,17	97,77	0,99	0,16	0,16	

¹⁾ Milchztg. 1876, 5, 1722.²⁾ Zeitschr. d. landw. Vereins f. Rheinpreussen 1859, 103.³⁾ Nach einem Separatabdruck aus Milchztg. 1877.⁴⁾ Milchztg. 1879, 8, 558.⁵⁾ Nach Rendiconti del R. Istituto Lombardo [2], 5, Heft IV, in Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung (Beilage zur Milchztg.) 1879, 8, 294—296.⁶⁾ Die durch Verbuttern des Rahmes gewonnene Butter enthält 2—5% Fett mehr als die durch Milchbuttern erhaltene Butter; letztere Methode lieferte zwar mehr Butter aus der gleichen Menge Milch; dieses Mehr verteilt sich aber auf einen höheren Gehalt an Wasser und Kasein.⁷⁾ Das Fett der einzelnen Buttersorten lieferte 85,5—87,8% unlösliche Fettsäuren.⁸⁾ Der Rahm zu dieser Butter wurde durch die Lehfeldt'sche Centrifuge erhalten.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein %	Milch- zucker %	Milch- säure %	Asche %	Fett %	Stick- stoff- Substanz %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
109	Lodi	1878	15,56	83,02	0,56	0,69	0,04	0,14	98,32	0,66	0,11	A. Menozzi ¹⁾
110	"	"	14,18	84,57	0,66	0,33	0,12	0,14	98,54	0,77	0,12	
111	"	"	14,43	83,94	0,88	0,47	0,19	0,15	98,10	1,03	0,16	
112	Westfälische Butter, Rahm	"	13,42	85,57	0,92	—	0,09	0,09	98,83	—	—	J. König und C. Krauch ²⁾
113	nach Swartz'schem Ver- fahren gewonnen	"	13,09	85,71	0,92	—	0,28	0,28	98,62	—	—	
114	Desgl. nach Holst. Verfahren	"	12,92	85,71	0,95	—	0,42	0,42	98,43	—	—	
115	Aus Lehfeldt'schem Rahm .	"	15,42	81,94	1,74	—	0,90	0,90	96,88	—	—	G. Cantoni ³⁾
116	"	"	14,88	83,85	0,60	0,44	0,04	0,20	98,52	0,70	0,11	
117	"	"	15,08	83,37	0,65	0,57	0,09	0,23	98,17	0,77	0,12	
118	Beste Sorten Butter von	"	15,35	82,45	1,45	0,38	0,17	0,19	97,40	1,71	0,27	M. Schmoeger ⁴⁾
119	Lodesan (Lombardei)	"	14,53	83,98	0,53	0,71	0,14	0,11	98,26	0,62	0,10	
120	"	"	15,25	83,25	0,79	0,36	0,15	0,19	98,23	0,93	0,15	
121	Gemisch niederer Buttersorten	"	19,78	77,48	1,09	0,47	0,12	0,56	96,58	1,36	0,22	M. Schmoeger ⁴⁾
122	Aus süßem Rahm Mittel von je 5 Anal.	1880	13,65	83,62	0,61	0,56	0,04	1,52	96,84	0,71	0,11	
123	Aus saurem Rahm	"	14,23	82,83	0,80	0,54	0,05	1,55	96,57	0,93	0,15	

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					Butterfett			Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein u. Zucker %	Salz %	Fett in der Trocken- Substanz %	Spec. Gew. bei 17,8° C.	Schmelz- punkt ° C.	Unlös- liche Fettsäuren %	
124	Juli 1875, Surrey . . .	1875	4,15	—	—	—	—	0,9135	30,0	—	J. Bell ⁵⁾
125	"	"	6,80	89,13	0,80	3,27	95,64	0,9131	31,1	—	
126	"	"	15,50	80,70	1,70	2,10	95,47	0,9131	31,1	—	
127	"	"	11,40	87,07	0,77	0,76	98,20	0,9123	32,2	—	
128	"	"	7,55	90,27	1,15	1,03	97,67	0,9139	29,4	—	
129	"	"	12,70	85,64	0,86	0,80	98,06	0,9128	30,0	—	
130	"	"	11,67	85,27	0,86	2,20	96,53	0,9123	30,8	87,20	
131	Sept. 1875, County Galway	"	11,79	84,14	0,68	3,39	95,41	0,9131	31,3	—	
132	"	"	14,04	82,82	1,51	1,63	96,32	0,9116	31,3	—	
133	"	"	10,12	86,56	0,70	2,62	96,34	0,9130	31,2	—	
134	"	"	4,91	93,12	0,43	1,54	97,96	0,9121	31,7	87,42	
135	"	"	11,73	85,69	0,47	2,11	97,09	0,9130	31,7	—	
136	"	"	11,83	86,23	0,80	1,14	97,78	0,9127	31,7	86,60	
137	"	"	13,22	84,76	0,68	1,34	97,64	0,9127	31,0	—	
138	Devonshire . . .	"	16,99	79,00	1,36	2,65	94,40	0,9124	31,5	—	
139	Cornwall . . .	"	12,26	82,28	0,94	4,52	93,72	0,9129	30,8	—	
140	Cumberland . . .	"	11,92	82,34	1,52	4,22	93,46	0,9124	30,8	—	

¹⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 298.

²⁾ Chem. u. techn. Untersuchungen der landwirthschaftl. Versuchsstation Münster. 2. Bericht, 1878—1880, 47.

³⁾ L'Industrie laitière 1878, No. 44.

⁴⁾ Milchztg. 1880, 9, 273.

⁵⁾ Milchztg. 1877. (Journ. Roy. Agric. Soc. Engl. 1877, 7)

⁶⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 298.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz				Fett in der Trockensubstanz	Butterfett			Analytiker
			Wasser	Fett	Kasein u. Zucker	Salz		Spec. Gew. bei 37,8° C.	Schmelzpunkt ° C.	Unlösliche Fettsäuren	
141	Sept. 1875, Cumberland	1875	12,96	82,88	0,36	3,80	95,23	0,9130	31,1	—	J. Bell ¹⁾
142	" "	"	9,72	87,18	0,28	2,82	96,60	0,9120	31,1	—	
143	" "	"	8,18	87,76	0,92	3,14	95,57	0,9127	30,6	—	
144	" "	"	12,84	83,40	0,98	2,78	95,66	0,9127	30,8	—	
145	" Dorsetshire	"	16,85	80,27	0,11	2,77	99,49	0,9119	31,0	—	
146	" "	"	16,37	79,85	0,56	3,22	95,50	0,9119	30,8	—	
147	" "	"	17,06	79,93	0,88	2,13	96,40	0,9120	30,7	—	
148	" "	"	17,03	79,86	0,86	2,25	96,23	0,9123	31,0	—	
149	" "	"	18,37	79,64	0,39	1,63	97,52	0,9121	30,7	—	
150	" "	"	13,24	85,11	0,40	1,25	98,13	0,9122	30,8	—	
151	Okt. 1875, Cumberland	"	12,22	86,83	0,34	0,61	98,90	0,9114	31,8	—	
152	" "	"	13,02	85,65	0,61	0,72	98,50	0,9113	32,3	—	
153	" "	"	11,74	86,52	0,42	1,32	98,03	0,9117	32,2	—	
154	" "	"	8,72	90,00	0,70	0,58	98,64	0,9122	31,4	—	
155	" "	"	9,55	86,04	0,24	4,17	95,16	0,9120	31,5	—	
156	Novbr. 1875, Suffolk	"	14,41	81,85	0,64	3,10	95,68	0,9124	31,7	86,87	
157	" "	"	12,75	74,82	0,61	3,82	94,42	0,9116	33,3	87,80	
158	" "	"	14,26	81,70	0,22	3,82	95,26	0,9129	31,4	86,45	
159	" "	"	9,11	82,21	0,40	8,28	91,43	0,9128	31,4	86,00	
160	" "	"	11,52	84,15	0,41	3,92	95,09	0,9139	30,8	85,50	
161	" "	"	9,60	83,13	0,82	6,45	91,94	0,9123	31,7	—	
162	" Devonshire	"	14,36	81,52	1,46	2,66	95,22	0,9130	31,4	—	
163	" "	"	15,52	78,86	1,54	4,08	93,29	0,9118	31,7	87,40	
164	" "	"	17,56	78,32	1,14	2,98	95,01	0,9124	31,7	—	
165	" "	"	17,18	78,58	1,24	3,00	94,85	0,9130	31,4	—	
166	" "	"	16,28	78,84	1,56	3,32	94,13	0,9128	31,4	—	
167	" "	"	18,72	77,68	1,36	2,24	95,55	0,9124	31,7	—	
168	" "	"	16,42	79,18	1,60	2,80	94,78	0,9122	31,1	86,87	
169	" "	"	13,62	82,78	0,60	3,00	95,86	0,9108	32,2	88,00	
170	" Suffolk	"	13,14	78,16	2,96	5,74	89,96	0,9140	31,1	—	
171	Dec. 1875, County Londonderry	"	19,40	76,34	0,56	3,70	94,74	0,9130	31,7	—	
172	" "	"	13,70	82,14	1,86	2,30	92,90	0,9123	32,2	—	
173	" "	"	15,94	78,98	2,68	2,40	93,99	0,9111	33,1	—	
174	" "	"	18,52	74,48	2,16	4,84	91,39	0,9120	32,5	—	
175	" "	"	14,90	77,56	1,50	6,04	90,03	0,9119	32,5	—	
176	" "	"	14,98	80,14	1,14	3,74	94,24	0,9110	33,1	—	
177	Jan. 1876, Kent	1876	11,71	84,49	0,76	3,04	95,73	0,9131	31,4	—	
178	" "	"	13,51	82,89	0,70	2,90	95,82	0,9131	31,4	—	
179	" "	"	18,64	77,89	0,79	2,68	95,73	0,9105	33,9	88,60	
180	" "	"	17,60	78,82	0,98	2,60	95,69	0,9106	33,9	—	
181	" Surrey	"	13,55	83,16	0,80	2,49	96,22	0,9109	33,3	88,35	
182	" "	"	14,60	—	—	—	—	0,9122	31,7	—	
183	" County Cork . .	"	13,63	85,31	0,62	0,44	98,79	0,9111	31,9	87,72	

¹⁾ Vergl. Anmerkung ¹⁾ S. 299.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz				Fett in der Trockensubstanz	Butterfett			Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein u. Zucker %	Salz %		Spec. Gew. bei 37,8 °C.	Schmelzpunkt °C.	Unlösliche Fettsäuren %	
184	Jan. 1876, County Cork	1876	16,46	81,29	1,12	1,13	97,30	0,9102	33,6	88,75	J. Bell ¹⁾
185	"	"	13,57	84,94	0,84	0,65	98,28	0,9114	31,7	87,50	
186	"	"	14,98	83,66	0,68	0,68	98,39	0,9099	33,6	89,15	
187	"	"	15,34	83,57	0,69	0,40	98,70	0,9106	32,8	—	
188	"	"	14,64	84,08	0,82	0,46	98,46	0,9104	33,1	—	
189	Febr. 1876, Carnarvonshire	"	11,41	84,86	0,70	3,03	95,81	0,9124	33,3	87,01	
190	"	"	10,43	86,54	0,57	2,46	96,58	0,9115	31,7	—	
191	"	"	13,79	81,99	1,26	2,96	95,11	0,9106	33,9	88,22	
192	"	"	11,05	80,80	0,44	7,71	90,82	0,9107	33,9	—	
193	"	"	11,36	82,63	1,04	4,97	93,19	0,9111	33,9	88,42	
194	"	"	16,24	74,16	0,40	9,20	88,55	0,9113	33,9	88,12	
195	"	"	11,71	83,74	0,95	3,60	94,88	0,9115	32,2	—	
196	März 1876, Normandie . .	"	16,89	73,32	1,23	8,56	88,20	0,9115	31,9	—	
197	"	"	11,59	86,48	0,44	1,49	97,81	0,9121	32,5	86,96	
198	Wiltshire . . .	"	13,21	84,49	0,56	1,74	97,33	0,9118	32,5	—	
199	"	"	12,52	84,57	0,79	2,12	96,66	0,9115	32,5	87,35	
200	"	"	11,99	84,79	0,99	2,23	96,32	0,9118	31,7	—	
201	"	"	12,57	84,96	0,89	1,58	97,19	0,9115	32,5	87,65	
202	"	"	11,81	76,75	3,06	8,38	87,03	0,9125	31,7	86,90	
203	"	"	12,08	81,79	3,74	2,39	93,00	0,9116	33,3	87,74	
204	"	"	12,89	80,27	3,15	3,69	92,15	0,9121	32,2	86,92	
205	"	"	13,08	81,87	2,72	2,33	94,15	0,9106	33,3	88,29	
206	"	"	11,18	81,71	5,32	1,79	92,01	0,9117	33,1	87,60	
207	"	"	19,12	72,93	4,02	3,93	90,14	0,9109	33,6	88,40	
208	"	"	13,39	78,31	1,62	6,68	90,45	0,9104	33,6	—	
209	County Monaghan	"	15,60	77,35	0,54	6,51	91,66	0,9101	33,3	88,90	
210	"	"	13,59	69,97	1,36	15,08	80,96	0,9095	34,2	—	
211	"	"	13,50	83,37	0,55	2,58	96,38	0,9110	33,1	—	
212	"	"	14,55	78,28	1,31	5,86	90,73	0,9103	33,9	—	
213	"	"	12,43	83,47	0,55	3,55	95,32	0,9107	33,3	—	
214	"	"	11,81	84,64	0,70	2,85	95,98	0,9109	33,3	88,62	
215	County Londonderry	"	13,88	82,22	0,75	3,15	95,46	0,9115	32,2	87,66	
216	"	"	14,34	81,57	0,78	3,31	95,19	0,9119	32,5	—	
217	"	"	12,57	82,60	0,51	4,32	94,49	0,9107	33,3	88,74	
218	"	"	13,56	83,40	0,75	2,29	96,49	0,9120	32,5	87,42	
219	"	"	11,56	85,15	0,47	2,82	96,30	0,9118	32,5	88,05	
220	"	"	13,92	83,43	0,52	2,13	96,86	0,9106	34,4	88,65	
221	Dorsetshire . .	"	8,88	86,12	0,50	4,50	94,47	0,9109	33,6	88,46	
222	"	"	12,55	83,88	1,35	2,22	95,96	0,9122	33,1	—	
223	"	"	12,81	84,67	0,74	1,78	97,12	0,9108	33,6	88,07	
224	"	"	10,61	87,65	0,63	1,11	98,08	0,9109	33,1	88,21	
225	Staffordshire . .	"	12,87	84,81	0,76	1,56	97,36	0,9124	31,9	87,14	
226	"	"	12,84	84,93	0,56	1,67	97,41	0,9113	32,2	87,90	

¹⁾ Vergl. Anmerkung *) S. 299.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					Butterfett			Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein u. Zucker %	Salz %	Fett in der Trocken- Substanz %	Spec. Gew. bei 17,5 °C.	Schmelz- punkt °C.	Unlös- liche Fettsäuren %	
227	März 1876, Staffordshire	1876	13,11	84,77	0,46	1,66	97,57	0,9118	33,1	—	J. Bell ¹⁾
228	" "	"	10,93	87,20	0,62	1,25	97,93	0,9119	31,7	87,30	
229	" "	"	12,79	85,52	0,66	1,03	98,09	0,9101	33,9	—	
230	April 1877, County Sligo	"	12,36	83,53	0,87	3,24	95,31	0,9101	33,9	—	
231	" "	"	11,02	86,22	0,87	1,89	96,91	0,9118	32,8	—	
232	" "	"	14,61	80,68	0,85	3,86	94,48	0,9109	32,5	88,46	
233	" "	"	14,12	82,54	1,06	2,28	96,08	0,9128	32,2	—	
234	" County Galway	"	13,78	84,47	0,85	0,90	97,99	0,9124	33,1	86,79	
235	" "	"	10,24	84,55	1,22	3,99	94,19	0,9114	33,6	87,79	
236	" "	"	11,75	82,99	1,93	3,33	94,03	0,9115	33,9	87,51	
237	" "	"	15,17	80,88	1,99	1,96	95,36	0,9113	33,6	87,66	
238	" "	"	14,37	80,53	1,89	3,21	94,06	0,9094	34,7	87,66	
239	" "	"	14,50	82,45	1,61	1,44	96,47	0,9094	35,0	89,90	
240	Mai 1876, Cornwall . . .	"	15,70	81,27	1,49	1,54	96,39	0,9118	33,3	—	

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein %	Milch- zucker %	Milch- säure %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %		
241	Aus gekühltem Milch	1878	13,90	84,73	0,84	0,42	—	0,12	0,98	98,37	0,16	F. Storch ²⁾
242	Rahm von alt-											
243	Aus ungekühltem Rahm milchenden Kühen											
244	Aus gekühltem Milch											
245	Rahm von frisch-	1881	10,87	84,68	0,64	0,51	—	3,30	0,72	95,01	0,12	
246	Aus ungekühltem Rahm milchenden Kühen											
247	Durch Verkneten von Rahm gewonnen, 20 Tage alt, gesalzen											
248	Durch 2maliges Centrifugiren des Rahms gewonnen, talgiger Geschmack . . .											
249	Durch Verkneten aus süßem Rahm, 26 Tage alt, schwach ranzig	"	16,43	83,04	0,22	0,05	—	0,26	0,26	99,37	0,04	W. Fleischmann ³⁾
250	desgl. schwach gesalzen .	"	12,46	86,09	0,79	0,16	—	0,49	0,90	98,34	0,14	
251	desgl. schwach gesalzen .	"	11,06	86,71	0,79	0,45	—	0,99	0,89	97,49	0,14	
252	Aus Centrifugenrahm durch 2mal. Centrifugiren im Handbutterfass gewonnen	"	12,76	86,33	0,48	0,22	—	0,21	0,55	98,96	0,09	
253	Handbutterfass gewonnen	"	10,36	88,08	0,36	0,33	—	0,88	0,40	98,26	0,06	

¹⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 299.²⁾ Von H. Cordes mitgetheilt in Milchztg. 1881, 10, 606.³⁾ Bericht d. Milchw. Versuchstation Raden für 1881, 29—32, für 1882, 24 u. 44, für 1883, 29 u. 31.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kaseln %	Milch- zucker %	Milch- säure %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	
251	Aus mässig gesäuert. Rahm unter Zusatz von 4% Salz gewonnen	1881	13,80	83,35	0,68	0,22	—	1,95	0,79	96,69	W. Fleischmann ¹⁾
252	Käsemilchbutter (bei Fabrikation von Tilsiter Fettkäse gewonnen) . . .	"	14,73	83,92	0,62	0,43	—	0,29	0,73	98,42	
253	Aus gesäuertem Rahm im Holsteinischen Butterfass	1882	13,99	83,69	1,03	—	—	1,28	—	97,30	
254	Ueberarbeitete, schlechte, krümelige Butter . . .	1883	11,46	84,59	2,04	—	—	1,91	—	95,54	H. Fresenius ²⁾
255	Dänische Centrifugenbutter ³⁾	1886	8,53	89,40	0,42	0,46	—	1,19	0,46	97,74	
256	Schlechte Butter aus Oberbayern	"	(29,28	68,42	1,02	1,03	—	0,20)	1,44	96,75	
257	Aus Osigny ⁴⁾	1884	9,80	86,25	2,23	1,63	—	0,10	2,47	95,62	E. Schmidt ⁵⁾
258	Aus Flandern ⁶⁾	"	10,54	86,50	1,42	0,69	—	0,85	1,59	96,69	
259	Aus der Normandie, nach der Klassifizierung der Jury bei der Ausstellung im Palais de l'Industrie folgend ⁷⁾	1886	12,40	86,71	—	0,16	—	0,73	—	98,98	
260		"	13,36	85,48	—	0,20	—	0,96	—	98,67	E. Duclaux ⁸⁾
261		"	12,28	86,76	—	0,17	—	0,79	—	98,91	
262		"	10,72	88,30	—	0,13	—	0,85	—	98,90	
263		"	13,34	86,01	—	0,20	—	0,45	—	99,24	
264		"	11,62	86,52	—	0,30	—	1,56	—	97,90	
265		"	14,00	85,31	—	0,20	—	0,49	—	99,20	
266		"	13,03	86,33	—	0,11	—	0,53	—	99,26	

¹⁾ Vergl. Anmerkung ⁵⁾ S. 302.

²⁾ Centrbl. f. Agrik.-Chem. 1886, 15, 287.

³⁾ 3. u. 4. Jahresber. d. Untersuchungsstation d. hyg. Instituts in München 1885, 10—16.

⁴⁾ Ann. agron. 1884, 10, 496.

⁵⁾ Comptes rend. 1886, 102, 1022.

⁶⁾ Das Butterfett ergab nach Hehner's Methode 87,47% unlösliche Fettsäuren; 5 g desselben erforderten nach Reichert-Meißl 29,70 cem $\frac{1}{100}$ Normal-Natronlauge.

⁷⁾ Es ergab das Butterfett:

	No. 257	No. 258
Unlösliche Fettsäure nach Hehner	88,37%	89,15%
Schmelzpunkt derselben	+ 39,08 "	+ 40,00 "
Lösliche, flüchtige Säuren	4,45 "	4,45 "

Das Fett von No. 257 ergab 5% Butyrin, 60% Olein und 35% Margarin.

⁸⁾ Das Butterfett lieferte ferner an flüchtigen Säuren:

	No. 259	260	261	262	263	264	265	266
Capronsäure	2,10%	2,18%	2,17%	2,23%	2,26%	2,00%	2,08%	2,19%
Buttersäure	3,55 "	3,52 "	3,53 "	3,60 "	3,65 "	3,38 "	3,52 "	3,46 "
Verhältnis beider Säuren in Äquivalenten	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Fett %	Kasein %	Milch- zucker %	Milch- säure %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	
267	I. Gewöhnlich ge-	1885	14,78	83,35		1,77		0,09	—	97,81	—
268	Versuch knetet ^{*)} . . .										
	Centrifugirt ^{*)} . . .	"	14,49	84,09		1,29		0,12	—	98,34	—
269	II. Gewöhnl. geknetet	"	14,83	83,95		1,14		0,08	—	98,57	—
270	Versuch Centrifugirt . . .	"	12,81	85,51		1,52		0,16	—	98,22	—
271	III. Gewöhnl. geknetet	"	14,94	83,64		1,33		0,10	—	98,33	—
272	Versuch Centrifugirt . . .	"	14,33	84,14		1,41		0,12	—	98,21	—
273	IV. Gewöhnl. geknetet	"	15,19	83,49		1,23		0,09	—	98,33	—
274	Versuch Centrifugirt . . .	"	15,06	83,29		1,49		0,15	—	98,06	—
Praeservirte Butter der deutschen Marine:											
275	Aus Deutschland, wahr-	1882	12,19	84,34	0,69	0,78	—	2,00	0,79	96,05	0,13
276	scheinlich Stallbutter . .										
	desgl., Grasbutter . . .	"	10,88	86,11	0,69	0,51	—	1,81	0,77	96,62	0,12
277	desgl., " . . .	"	10,79	85,79	0,69	0,87	—	1,86	0,77	96,17	0,12
278	Aus Dänemark, Grasbutter	"	9,49	84,62	0,69	0,81	—	4,39	0,76	93,49	0,12
279	" " " . . .	"	8,34	86,14	0,70	0,61	—	4,21	0,76	93,98	0,12
280	Aus Deutschland, Stallbutter	"	10,14	87,11	0,65	0,46	—	1,64	0,72	96,94	0,12
281	Aus Dänemark, Grasbutter	"	9,36	84,95	0,70	0,49	—	4,60	0,77	93,72	0,12
282	" " " . . .	"	9,58	82,91	(0,79)	(0,59)	—	6,13	0,87	91,69	0,14
283	" " alte Butter . . .	"	8,57	86,16	0,61	0,49	—	4,17	0,67	94,24	0,11
284	Aus Deutschland, Grasbutter	"	11,12	85,28	0,44	0,62	—	2,54	0,50	95,95	0,08
285	" " " . . .	"	11,03	85,43	0,44	0,64	—	2,46	0,49	96,02	0,08
286	" " " . . .	"	11,43	84,99	0,44	0,57	—	2,57	0,50	95,85	0,08
287	" " " . . .	"	11,08	85,25	0,44	0,66	—	2,57	0,49	95,87	0,08
288	" " " . . .	"	13,32	84,38	0,63	0,59	—	1,08	0,73	97,35	0,12
289	" " " . . .	"	13,71	83,83	0,62	0,73	—	1,11	0,72	97,15	0,12
290	" " " . . .	"	11,35	85,86	0,70	0,36	—	1,73	0,79	96,85	0,13
291	Ohne	1883	13,04	83,01	1,31	—	2,64	—	95,46	—	
292	nähere Bezeichnung										
293	Alte Butter	"	9,89	87,00	1,03	—	2,08	—	96,55	—	
294	Frische "	"	8,88	85,47	1,09	—	4,56	—	93,80	—	
295	Schwach ranzig	"	8,63	83,50	1,31	—	6,56	—	91,39	—	
296	In Geschmack und Geruch	1885	8,26	89,54	0,65	0,13	—	1,42	0,71	97,60	0,11
	gute Butter	"	9,30	85,06	1,13	0,43	—	4,08	1,25	93,78	0,20
297	desgl.	"	11,52	84,06	1,42	0,35	—	2,65	1,60	95,00	0,26
298	Ranzig	"	10,34	86,64	1,04	0,82	—	1,16	1,16	96,64	0,19
299	desgl.	"	13,26	82,56	1,44	0,34	—	2,40	1,66	95,18	0,27

¹⁾ Bericht d. Milchw. Versuchstation Raden für 1885. Rostock 1886, 28.

²⁾ Bericht d. Milchw. Versuchstation Raden für 1882, 44, für 1883, 29.

³⁾ Jahresbericht der Milchw. Versuchstation Kiel für 1885/86, 9.

⁴⁾ Mittel der von Baquet konstruirten „mechanischen Buttercentrifuge“ behandelt, welche bezweckt, die aus dem Butterfass genommene rohe Butter durch Centrifugalkraft von der Buttermilch zu befreien, im Mittel der obigen vier vergleichenden Versuche enthielt die centrifugirte Butter 0,76 % Wasser weniger als die mit der Hand geknetete Butter, dagegen mehr Fett und etwas mehr an Protein, Milchzucker und Asche.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz %	Analytiker
			Wasser	Fett	Kasein	Milch-zucker	Milch-säure	Asche	Stick-stoff-Substanz	Fett		
			%	%	%	%	%	%	%	%		
	Butter aus Rahm, der separirt wurde:											
300	a) bei 65 ⁰⁰)	1890	12,10	84,39	1,36	—	—	2,25	1,55	96,01	0,25	7 ¹⁾
301	b) bei 28 ⁰⁰)	"	13,46	82,14	1,20	—	—	3,30	1,39	94,92	0,22	
302	Butter nach dem Centrifugenverfahren gewonnen	1889	13,15	83,74	3,11			—	96,42	—	Klinger ²⁾	
303	Butter nach dem Kothe'schen Temperirverfahren gewonnen (Milchbuttern)	"	14,33	82,82	2,85			—	96,67	—		
304	Butter aus Abendmilch	6/10 1890	15,72	80,87	1,12	0,71	—	1,59	1,32	95,95	0,21	Hübcher und Krüger ³⁾
305		8/10 "	16,22	79,92	1,21	0,75	—	1,90	1,44	95,39	0,23	
306	Butter aus Morgenmilch.	20/10 "	14,46	81,68	1,24	0,89	—	1,72	1,45	95,49	0,23	W. Fleischmann ⁴⁾
307	Rahm pasteurisirt	21/10 "	13,11	83,52	1,00	0,72	—	1,65	1,15	96,12	0,18	
308	Mit dem Butterseparator	16/10 1890	15,33	81,03	1,92	—	—	1,73	—	95,70	—	derselbe ⁵⁾
309	von de Laval hergestellt	30/10 "	15,53	81,44	1,02	0,86	—	1,16	1,21	96,41	0,19	
310	Butter mit der Baquet'schen Butter-Centrifuge hergestellt	1885	14,34	84,09	1,57			—	98,17	—	derselbe ⁵⁾	
311	In der gewöhnlichen Weise mit der Hand geknetet	"	15,11	83,49	1,40			—	98,35	—		
312	Schweizer Butter { Mittel 67 Proben { Minimum Maximum	1894	13,41	85,41	0,90		0,11	—	98,64	—	Fr. Seiler und Robert Heuss ⁶⁾	
		"	11,24	82,93	—		0,06	—	95,43	—		
		"	15,64	88,25	—		0,17	—	—	—		

Dauerbutter für Schiffsbedarf auf den Ausstellungen der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Bremen und Hamburg.
Prämiirt Bremen 1891.**)

Prämiirt Bremen 1891.**)											
No.	Nähere Bezeichnung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Reichert-Meiß'sche Zahl	Analytiker
		Wasser o/o	Fett o/o	Kasein o/o	Milch- zucker o/o	Asche o/o	Chlor- natrium o/o	Stick- stoff- Substanz o/o	Fett o/o		
313	Ohne nähere Bezeichnung	7,08	89,33	0,62	0,60	2,37	—	0,67	96,13	0,11	J. König ⁷⁾
314		8,58	88,37	0,58	0,53	1,94	—	0,63	96,66	0,10	
315		7,48	89,55	0,70	0,57	1,70	—	0,76	96,79	0,12	
316		9,26	88,46	0,81	0,53	1,94	—	0,89	97,49	0,14	
317		9,76	89,04	0,56	0,40	2,24	—	0,62	98,67	0,10	

¹⁾ Analytiker nicht angegeben. Mejeri Tidning 1890, No. 50; Milchztg. 1890, 19, 45.

²⁾ Württembergisches Wochenblatt vom 4/5 1879. Milchztg. 1890, 19, 394.

³⁾ Milchztg. 1891, 20, 731.

⁴⁾ Milchztg. 1890, 19, 601.

⁵⁾ Bericht der Molkerei Raden für 1885. Rostock 1886.

⁶⁾ Chem. Centrbl. 1894, II, 459—60.

⁷⁾ Bericht über Dauerwaren für Ausfuhr und Schiffsbedarf. Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1891, 6, 223.

⁸⁾ Die Haltbarkeit der aus pasteurisirtem Rahm hergestellten Butter war grösser, indem sie nach 4 Wochen sich noch als völlig gut erwies, während die andere sich bereits bedeutend verändert hatte. Die verwendete Vollmilch hatte 3,29% Fett und wurde beim Erwärmen auf 65° C. bis auf 0,15% und bei 28° C. auf 0,25% Fett entrahmt.

⁹⁾ Die Butterproben hatten sämtlich eine Reise nach Australien mitgemacht.

Prämiirt Hamburg 1897.*)

No.	Art der Zubereitung	Erhalteter Preis	Wasser		Fett		Kasein		Milchzucker		Mineralstoffe		In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz		Reichert'sche Zahl	Säuregrade der Butter des Butterfettes	Analysirter
			0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			
318	Pasteurisirte Vollmilch, bezw. Rahm, gesalzen	1. Pr.	11,36	85,12	0,44	0,38	2,80	2,20	0,50	96,03	0,08	30,15	2,8	2,3					
319	Nicht angegeben; gesalzen	2. "	12,64	83,40	0,48	0,41	3,07	2,97	0,53	95,47	0,09	33,28	9,2	8,9					
320	desgl.	2. "	15,13	81,73	0,48	0,26	2,40	2,31	0,57	96,30	0,09	32,10	6,7	7,2					
321	Pasteurisirte Milch, Reinkulturen; gesalzen	Preis	12,14	82,85	0,68	0,52	3,81	3,64	0,77	94,29	0,12	31,05	6,3	4,0					
322	Milch u. Rahm stark gekühlt, bei 9° verbuttert; gesalzen		11,48	84,28	0,69	0,40	3,13	3,15	0,78	95,21	0,12	31,35	6,6	4,6					
323	desgl., aber ungesalzen		13,50	84,95	0,67	0,53	0,35	0,25	0,77	98,21	0,12	31,50	7,3	5,2					
324	Pasteurisirte Sahne; Reinkulturen; gesalzen	3. Pr.	11,63	85,13	0,27	0,17	2,80	2,70	0,31	98,59	0,05	30,80	2,9	3,0					
325	Mittelst Centrifuge u. holst. Butterfasses; Rahm theilweise pasteurisirt; gesalzen	Anerkennung	12,02	85,74	0,66	0,35	1,23	1,15	0,75	97,45	0,12	31,01	8,1	4,7					
326	Mittelst Separators und holst. Butterfasses hergestellt; gesalzen	desgl.	13,78	83,97	0,53	0,26	1,46	1,38	0,61	97,39	0,10	32,65	7,0	2,7					

Zusammensetzung der Butter des Londoner Marktes. Nach Untersuchungen von P. Vieth. Mittheilungen des Laboratoriums der Aylesbury-Dairy-Company London.**)

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser %	Fett %	Fettfreie organische Substanz %	Asche %	Kochsalz %	Unlösliche Fettäuren nach Holmer %	Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett)
A. In London von der Aylesbury-Dairy-Company hergestellte Butter.***)									
327	{ Mittel	1887	12,93	85,15	0,90	1,03	—	88,08	—
	{ Schwankungen	"	9,54-14,39	82,57-88,34	0,44-1,26	0,09-3,15	—	87,40-88,86	—
328	{ Mittel	1888	11,72	86,53	0,41	1,34	1,20	88,32	13,1
	{ Schwankungen	"	10,94-12,62	85,66-87,59	0,14-0,73	0,79-2,51	0,68-2,30	88,27-88,39	12,9-13,3
					ohne NaCl				Reichert-Wollny'sche Zahl (5 g Fett)
329	{ Mittel	1889	11,55	87,13	1,32	0,96	—	—	26,9
	{ Schwankungen	"	8,03-13,48	85,62-90,49	0,63-2,83	0,38-2,44	—	—	25,8-29,2
330	24 Proben { Mittel	1890	11,21	86,80	0,54	1,45	—	—	27,6
	{ Schwankungen	"	7,85-14,11	82,97-89,62	0,26-1,30	0,41-2,36	—	—	25,3-30,0
331	{ Mittel	1890/92	11,12	86,86	0,57	1,45	—	—	—
	{ Schwankungen	"	7,26-15,79	81,59-90,92	0,22-1,59	0,21-2,36	—	—	—
Mittel aus den Jahresmitteln			—	11,71	86,49	0,81	1,27	88,20	27,3

*) Bericht über Dauerwaren für Ausfuhr und Schiffbedarf. Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1897, 12, 282.

**) Die Butterproben hatten sämmtlich eine Reise nach Australien mitgemacht. Konservierungsmittel waren in denselben nicht nachweisbar.

***) Milchztg. 1888, 17, 128; 1889, 18, 141; 1890, 19, 187; 1891, 20, 69; 1892, 21, 330. Vergl. ferner Milchztg. 1890, 19, 381; 1891, 20, 1149 und 1892, 21, 191.

****) Neuere Untersuchungen der Butter des Londoner Marktes siehe H. Droop-Richmond, Analyst 1895, 20, 54-56, Chem. Centrbl. 1895, I, 796-797, und unten S. 312.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser %	Fett %	Fettfreie organische Substanz %	Asche %	Kochsalz %	Unlösliche Fettstoffe nach Hahn %	Reichert-Wollny'sche Zahl (5 g Fett)
B. Französische Butter.*)									
332	Mittel	1888	13,79	84,86	1,16	0,19	0,08	87,38	26,9
	Schwankungen	"	13,40-14,41	83,98-85,58	0,98-1,56	0,14-0,25	0,05-0,12	87,15-87,55	26,1-27,5
333	Mittel	1889	13,80	84,78	ohne NaCl	1,42	0,08	—	28,9
	Schwankungen	"	13,22-14,44	83,74-85,62	—	1,00-2,00	0,05-0,17	—	26,7-30,5
334	45 Proben Mittel	1890	13,86	84,54	1,51	—	0,09	—	28,7
	Schwankungen	"	11,63-15,57	82,85-86,50	1,05-2,17	—	0,02-0,16	—	25,6-30,8
335	Ungesalzen Mittel	1890/92	13,93	84,57	1,40	—	0,10	—	—
	Schwankungen	"	13,05-15,98	82,77-85,65	0,93-2,00	—	0,02-0,21	—	—
336	Gesalzen Mittel	"	12,50	83,70	1,78	—	2,02	—	—
	Schwankungen	"	11,13-13,52	82,34-85,46	1,65-1,97	—	1,62-2,64	—	—
	Mittel aus den Jahresmitteln	—	13,58	84,49	1,53	—	0,47	87,38	28,2
C. Dänische und Schwedische Butter.									
337	Mittel	1888	13,72	83,11	1,09	2,08	1,85	87,78	28,3
	Schwankungen	"	11,78-15,65	81,72-85,49	0,71-1,71	1,32-2,71	1,12-2,44	87,30-88,43	27,6-29,3
338	Mittel	1889	13,75	82,84	ohne NaCl	3,41	2,07	—	28,2
	Schwankungen	"	11,86-16,96	78,91-85,64	—	2,21-4,70	1,06-3,00	—	27,2-29,8
339	Dänische Butter, 5 Proben Mittel	1890	13,59	83,44	1,08	—	1,89	—	28,8
	Schwankungen	"	12,03-15,62	80,66-85,63	0,94-1,18	—	1,16-2,55	—	27,3-29,9
340	desgl., 26 Proben Mittel	1890/92	13,24	83,83	1,03	—	1,90	—	—
	Schwankungen	"	8,98-15,62	80,66-87,51	0,71-1,28	—	1,16-2,80	—	—
	Mittel aus den Jahresmitteln	—	13,58	83,31	1,84	—	1,93	87,78	28,4
D. Schleswig-Holsteinische (Kieler) Butter.									
341	Mittel	1889	11,59	86,04	ohne NaCl	2,40	1,29	—	26,5**)
	Schwankungen	"	8,39-15,23	82,00-89,45	—	1,70-2,89	0,84-1,81	—	21,9-29,8
342	Mittel	1890	12,99	84,33	1,23	—	1,45	—	27,7
	Schwankungen	"	10,49-16,26	80,38-87,63	0,86-2,82	—	0,73-2,16	—	21,3-30,7
343	23 Proben Mittel	1890/92	12,69	84,70	1,13	—	1,48	—	—
	Schwankungen	"	10,23-17,71	78,83-87,78	0,86-1,46	—	0,99-2,23	—	—
	Mittel aus den Jahresmitteln	—	12,42	85,02	1,59	—	1,41	—	27,1
E. Australische Butter.									
344	5 Proben Mittel	1890/92	11,55	86,00	1,20	—	1,25	—	—
	Schwankungen	"	9,23-13,66	83,87-88,58	0,85-1,78	—	0,08-2,31	—	—
345	Die Butter enthält Borsäure, jedoch nicht über 1/2 %	1891	12,22	84,14	1,00	2,64	2,56	—	—
346	Australische Butter***)	1889/90	13,42	80,97	0,50	0,78	4,33	—	28,9
347	desgl.)	1895	9,36	89,30	0,97**)	0,47	—	—	26,85
	Mittel aus den Jahresmitteln	—	11,64	85,10	0,82	1,30	2,71	—	27,9
F. Finnische Butter.									
348	Mittel	1890/92	13,01	84,26	ohne NaCl	1,47	1,26	—	—

*) Vergl. Anmerkung ***) S. 306.

**) Bei 5 Proben betrug die Reichert-Wollny'sche Zahl unter 25,0. Die Butter hatte einen normalen Geschmack und gutes Aussehen.

***) Diese Probe ist nicht von P. Vieth sondern von M. Schrodtt ausgeführt. Jahresbericht des milchw. Instituts Kiel für 1888/89, 9. Vierteljahresschrift Nahrungs- u. Genussm. 1890, 5, 289.

*) Untersucht von Sabatino Marucci. Vierteljahresschrift Nahrungs- u. Genussm. 1895, 10, 349.

**) Mit 0,63 % Kasein und 0,34 % Milchzucker.

Mittlere Zusammensetzung der Butter.

Nähere Bezeichnung	Zahl der Analysen	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		
		Wasser %	Fett %	Kasein %	Milch- zucker %	Asche %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %
Gesamt-Mittel	351	13,45	83,70	0,76	0,50	1,59	0,88	96,71	0,14
Minimum	—	4,15	69,96	0,19	0,05	0,02	0,22	80,96	0,04
Maximum	—	35,12	90,92	4,78	1,63	15,08	5,53	99,70	0,88

Aus den vorstehenden Tabellen ergeben sich ferner, je nach der Herkunft der Butter und der Herstellungsart geordnet, folgende Mittelzahlen:

Schwedische Butter, No. 1—41 aus- schliesslich 37	40	13,84	83,81	0,63	0,60	1,12	0,73	97,27	0,12
Holsteinsche Butter, No. 37, 42—61 und 341—343	24	12,83	83,30	0,99	0,78	2,10	1,14	95,56	0,18
Englische Butter, No. 124—240 und 327—331	121	13,26	84,51	—	1,06	1,19	—	97,32	—
Französische Butter, No. 259—266	13	12,97	88,55	—	0,18	—	—	98,30	—
Italienische Butter, No. 96—111	16	15,33	83,00	0,83	0,51	0,20	0,98	98,02	0,16
Australische Butter, No. 344—347	?	11,64	85,10	—	0,55	2,71	—	96,31	—
Präservierte Butter der deutschen Marine No. 275—299	25	12,22	83,52	0,78	0,48	3,00	0,89	95,15	0,14
Dauerbutter für Schiffsbedarf, No. 313 bis 326	14	11,13	86,33	0,59	0,42	2,23	0,66	97,14	0,11
Butter aus süßem Rahm	15	12,96	84,32	0,62	0,57	1,53	0,70	96,88	0,11
Butter aus saurem Rahm	15	13,27	83,95	0,82	0,59	1,37	0,94	96,80	0,15
Butter durch Milchbuttern gewonnen	3	16,44	80,00	—	3,37	0,19	—	95,27	—
Butter durch Rahmbuttern gewonnen	3	14,07	83,63	—	2,18	0,12	—	97,32	—
Butter durch Centrifugieren des Rahms gewonnen	6	13,30	85,25	0,42	0,76	0,27	0,48	98,69	0,07
Butter durch Verkneten des Butter- rahms gewonnen	6	13,86	84,55	0,79	0,49	0,31	0,91	98,06	0,14

Bemerkungen zu den vorstehenden Mittelzahlen.

Bei der Berechnung der Mittelzahlen ist in der Regel das Fett aus der Differenz berechnet worden. Nur bei denjenigen Mittelzahlen, bei denen in der Mehrzahl der Analysen eine Bestimmung des Kaseins und Milchzuckers nicht ausgeführt wurde, ist der Milchzucker bzw. das Kasein aus der Differenz berechnet. Der Milchsäuregehalt der Butter betrug im Mittel 0,12%.

Untersuchungen über den Wassergehalt der Butter.

I. Schleswig-Holsteinsche Butter.

1. Nach M. Schrodtt (Landw. Wochenbl. für Schleswig-Holstein 1890, 779; Centrbl. Agrik.-Chem. 1891, 20, 143—144) hatten die aus allen Theilen der Provinz stammenden Butterproben folgenden Wassergehalt:

	unter 10 % Wasser	10—15 % Wasser	über 15 % Wasser
Von 43 Proben Gutsbutter	3 Proben: 7,0 %	32 Proben: 74,4 %	8 Proben: 18,6 %
Von 42 Proben Butter aus Genossenschafts- und Sammelmolkereien	2 „ 4,8 „	34 „ 80,9 „	6 „ 14,3 „

Der Wassergehalt der Gutsbutter schwankte von 7,91—17,80 % und betrug im Mittel 13,29 %, während der Wassergehalt der Genossenschafts- und Sammelmolkereibutter von 8,89—18,85 % schwankte und im Mittel 13,35 % betrug.

2. Nach Henzold (Milchztg. 1894, 23, 642 u. 484):

	Minimum	Maximum	Mittel
23 Proben aus Gutsmeiereien	7,82 %	19,26 %	12,77 %
26 „ aus Genossenschaftsmeiereien	11,07 „	17,57 „	13,66 „
37 „ der Meierei der Versuchstation Kiel	5,90 „	16,81 „	11,70 „

II. Ostpreussische Butter.

Nach Rob. Eichloff in Kleinhof-Tapien (Milchztg. 1894, 23, 733).

Der gefundene Wassergehalt war folgender:

Wasser %	36 Proben Butter aus der Molkerei Kleinhof-Tapien (nicht über 3 Tage alt)	6 Proben Butter aus auswärtigen Molkereien (ca. 1 Monat alt)	24 Proben Bauernbutter, gekauft auf dem Wochenmarkte in Kleinhof-Tapien
	Zahl der Proben = % der Gesamtmenge	Zahl der Proben = % der Gesamtmenge	Zahl der Proben = % der Gesamtmenge
8—10	1 2,78	—	—
10—11	—	1 16,67	1 4,17
11—12	4 11,11	2 33,33	1 4,17
12—13	13 36,12	2 33,33	3 12,50
13—14	7 19,44	1 16,67	2 8,33
14—15	9 25,00	—	4 16,68
15—16	2 5,55	—	3 12,50
16—17	—	—	2 8,33
17—20	—	—	2 8,33
20—23	—	—	3 12,50
23—26	—	—	1 4,16
über 26	—	—	—
Niedrigster Wassergehalt	11,07 %	10,66 %	10,95 %
Höchster „	15,34 „	13,37 „	26,19 „
Mittlerer „	13,29 „	11,95 „	14,49 „

III. Hessische Butter.

Nach Untersuchungen der Versuchstation Marburg (Milchztg. 1895, 24, 22).

Es betrug der Wassergehalt bei den Untersuchungen von Oktober 1893 bis Ende Juli 1894:

	Minimum	Maximum	Mittel
111 Proben Molkereibutter	9,1 %	21,4 %	13,4 %
21 „ Hofbutter (von grösseren Gütern)	11,5 „	23,6 „	13,0 „
113 „ Marktbutter	7,65 „	25,1 „	13,8 „

IV. Westfälische Butter.

Nach Untersuchungen der Versuchstation Münster (4. Bericht der landw. Versuchstation Münster 1896, 224).

Bei 38 Proben Molkereibutter schwankte der Wassergehalt von 10,06—17,91 % und betrug im Mittel 13,55 %.

Einen Wassergehalt von

	10—11 %	11—12 %	12—13 %	13—14 %	14—15 %	15—16 %	16—17 %	17—18 %
hatten	7	2	9	7	5	5	2	1 Proben

Der Aschengehalt der Proben betrug im Mittel 1,04 % und schwankte von 0,23—2,15 %.

* Bei der Berechnung dieser Mittelzahl sind die Proben mit mehr als 20 % Wasser ausgeschlossen.

V. Hannoversche Butter. (Milchztg. 1894, 23, 575.)

Nach Untersuchungen der landw. Versuchsstation Hildesheim und des milchw. Instituts Hameln von Oktbr. 1893 bis Ende Juni 1894 bei 74 Proben Molkereibutter, 39 Proben Bauernbutter, 32 Proben ostfriesischer Tonnenbutter:

unter 8 % Wasser	2 Proben = 1,38 %
8-10 ausschl. " " " " " "	9 " = 6,21 "
10-12 " " " " " "	16 " = 11,03 "
12-14 " " " " " "	50 " = 34,48 "
14-16 " " " " " "	44 " = 30,34 "
16-18 " " " " " "	21 " = 14,48 "
18-20 " " " " " "	2 " = 1,38 "
über 20 " " " " " "	1 " = 0,70 "

Die geringsten Schwankungen zeigten sich bei Molkerei- und Gutsbutter, die grössten bei Tonnenbutter.

Mittel aller Proben (145) = 14,06 % Wasser.

Minimum = 7,2 " "

Maximum = 21,4 " "

VI. Schlesische Butter. (Milchztg. 1894, 23, 561.)

Wasser %	In Proskau untersucht				In Breslau von der landw. Versuchsstation untersucht			
	44 Proben aus dem Institut		236 Proben Bauernbutter		140 Proben Molkereibutter		42 Proben Bauernbutter	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
7-8	—	—	1	0,4	2	1,4	—	—
8-9	—	—	1	0,4	10	7,2	—	—
9-10	—	—	6	2,3	14	10,0	1	2,4
10-11	—	—	5	2,1	26	18,6	1	2,4
11-12	—	—	5	2,1	31	22,1	2	4,8
12-13	3	6,8	5	2,1	30	21,4	1	2,4
13-14	7	15,9	24	10,2	14	10,0	7	16,7
14-15	9	20,5	53	22,5	10	7,2	3	7,1
15-16	6	13,6	49	20,8	—	—	2	4,8
16-17	10	22,7	34	14,4	1	0,7	2	4,8
17-18	5	11,4	22	9,3	1	0,7	5	11,9
18-19	4	9,1	27	11,4	—	—	4	9,5
19-20	—	—	7	2,9	—	—	6	14,2
20-21	—	—	2	0,8	1	0,7	8	19,0
über 21	—	—	—	—	—	—	—	—
	44		236		140		42	

Juli 1893 bis Juni 1894	Molkereibutter:	Minimum	Maximum
	Proskau (Institutbutter)	11,08 %	18,96 %
	Breslau	7,28 "	33,41 "
	Bauernbutter:		
	Proskau	7,17 "	39,19 "
	Breslau	9,65 "	48,38 "
	Jahresmittel aus 462 Einzeluntersuchungen		14,72 %

In dem Original (Landwirth vom 24/8 1894, auch in der Milchzeitung) sind Minimum und Maximum, sowie Mittel der einzelnen Monate angegeben.

VII. Dänische Butter.

1. Nach P. V. F. Petersen (Milchztg. 1893, 22, 721) hatten 1288 Butterproben einen mittleren Wassergehalt von 14,58 %. Der Wassergehalt schwankte von 10,51—19,05 %.

Es enthielten an Wasser: 10,51—13,00 % 13,00—16,00 % 16,00—19,05 %

Der Einfluss des ein- oder mehrmaligen Knetens nach dem Einsalzen auf den Wassergehalt erhielt aus folgenden Zahlen:

	Sommer	Winter	Mittel
einmaliges Kneten	14,47 % Wasser	15,37 % Wasser	14,98 % Wasser
mehrmaliges Kneten	13,97 " "	14,80 " "	14,41 " "

Den Einfluss der Zeit, welche zwischen dem Einsalzen und dem letzten Kneten liegt, auf den Wassergehalt zeigen folgende Versuche:

bis 6 Stunden	14,72 % Wasser	15,11 % Wasser	14,98 % Wasser
6-12 "	13,84 " "	13,95 " "	13,86 " "
12-24 "	13,30 " "	13,53 " "	(13,75 %) % Wasser.

*) Druckfehler!

2. Nach P. Frijs. (Mittheilungen vom Versuchslaboratorium der Kgl. Veterinär- u. Landbauhochschule zu Kopenhagen. Centrbl. Agrikultur-Chemie 1894, 23, 424.) Die nachfolgende Zusammenstellung umfasst sämtliche, seit dem Jahre 1890 bei den Ausstellungen des Dänischen Versuchslaboratoriums vorgeführten Butterproben. Die untersuchte Butter entspricht der normalen Butterproduktion dänischer Meiereien. Dieselbe stammte von 468 verschiedenen Meiereien und zwar 107 Gutameiereien und 361 Genossenschaftsmeiereien in allen Gegenden Dänemarks. Es wurden im Ganzen 2091 „Dritteln“, durchschnittlich 4–5 Dritteln von jeder Meierei, untersucht. Der durchschnittliche Wassergehalt sämtlicher Proben war 14,59%. Es enthielten:

9,00–9,99 % Wasser:	1 Probe	entsprechend	0,1 %	sämtlicher Proben
10,00–10,99 „	4 Proben	„	0,2 „	„
11,00–11,99 „	57 „	„	2,7 „	„
12,00–12,99 „	355 „	„	11,2 „	„
13,00–13,99 „	464 „	„	22,2 „	„
14,00–14,99 „	583 „	„	27,9 „	„
15,00–15,99 „	418 „	„	20,0 „	„
16,00–16,99 „	218 „	„	10,4 „	„
17,00–17,99 „	88 „	„	4,2 „	„
18,00–18,99 „	21 „	„	1,0 „	„
19,00–19,99 „	2 „	„	0,1 „	„

Berechnet man dagegen für jede einzelne der 468 Meiereien den durchschnittlichen Wassergehalt ihrer Butter, so findet man:

11,00–11,99 % Wasser bei	2 Meiereien	entsprechend	0,4 %	von allen Meiereien
12,00–12,99 „	23 „	„	4,9 „	„
13,00–13,99 „	105 „	„	22,4 „	„
14,00–14,99 „	207 „	„	44,2 „	„
15,00–15,99 „	85 „	„	18,2 „	„
16,00–16,99 „	41 „	„	8,8 „	„
17,00–17,99 „	5 „	„	1,1 „	„

H. Droop-Richmond (Analyst 1894, 19; Chem. Centrbl. 1894, I, 357) untersuchte 560 Proben englischer und kontinentaler Butter auf Wassergehalt. Es enthielten:

7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 % Wasser
2	8	18	37	76	95	210	88	21	3	2 Proben.

VIII. Schwedische Butter nach N. Engström.

(Tidskrift för landtmän 1894, 15, 73–75; Centrbl. Agrikultur-Chemie 1894, 23, 789–790.)

Bei den permanenten Butterausstellungen in Malmö und Göteborg wurden im Jahre 1893 im Ganzen 743 Proben Butter von 219 Molkereien, aus 19 verschiedenen Landestheilen herrührend, untersucht und dabei als mittlerer Wassergehalt 13,86% gefunden. Der Wassergehalt der einzelnen Proben war folgender:

Wassergehalt . . %	10,70–10,99	11,00–11,99	12,00–12,99	13,00–13,99	14,00–14,99	15,00–15,99	16,00–16,99
Zahl der Proben . .	4	39	110	250	222	98	20
entsprechend Procent							
sämtlicher Proben	0,5	5,3	14,8	33,6	29,9	13,2	2,7

Gruppiert man die Molkereien nach dem gefundenen mittleren Wassergehalt ihrer Butter, so ergeben sich folgende Zahlen:

Wassergehalt %	11,43–11,99	12,00–12,99	13,00–13,99	14,00–14,99	15,00–15,99	16,42
Zahl der Molkereien . . .	8	30	80	79	21	1
entsprechend Procent sämtlicher Molkereien	3,6	13,7	36,5	36,1	9,6	0,5

IX. Englische Butter des Londoner Marktes

hatte nach H. Droop-Richmond (Analyst 1897, 22, 93–95; Chem. Centrbl. 1897, I, 1033–1034) folgenden Wassergehalt im Jahre 1896:

	Minimum	Maximum	Mittel
frische Butter	12,40 %	15,18 %	13,82 %
gesalzene Butter	10,46 „	17,92 „	13,94 „

X. Französische Butter des Londoner Marktes

hatte nach H. Droop-Richmond (Analyst 1897, 22, 93–95; Chem. Centrbl. 1897, I, 1033–1034) folgenden Wassergehalt:

	Minimum	Maximum	Mittel
frische Butter	11,76 %	15,94 %	14,40 %
gesalzene Butter	9,35 „	14,35 „	12,21 „

Kuhbutter aus Colostrummilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Fett	Kasein	Milchzucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett		
1	Zweimal geknetet und aus- gewaschen	1897	16,51	81,57	1,71	0,16	0,05	10,48	97,70	1,64	R. Eichloff ¹⁾

2. Ziegenbutter.

1	Ziegenbutter ²⁾	1884	22,40	75,00	1,75	0,67	0,18	2,26	96,65	0,30	E. Schmidt ³⁾
2	desgl. aus der Schweiz(?) ⁴⁾	1892	11,23	87,38		1,39		—	97,31	—	Schaffer ⁵⁾
3	desgl. ⁶⁾	1893	8,20	86,50	0,90	0,70	3,70	0,98	94,23	0,16	E. Gutzeit ⁷⁾
Mittel			—	—	—	—	—	—	—	—	

3. Büffelbutter.

1	Aus Marienburg in Sieben- bürgen	1884	15,50	82,31		2,01	0,17	—	97,41	—	W. Fleischmann ¹⁾
2	Aus Ungarn	1888	17,67	80,98		1,19	0,16	—	96,38	—	F. Strohmayer ²⁾
Mittel			—	16,59	81,64	1,60	0,17	—	96,89	—	

¹⁾ Milchztg. 1897, 26, 67—68.²⁾ Ann. agronom. 1884, 10, 496.³⁾ Landw. Jahrbuch der Schweiz 1892. Milchztg. 1892, 22, 222.⁴⁾ Milchztg. 1893, 22, 756.⁵⁾ Bericht der Milchw. Versuchstation Raden für 1884, 27.⁶⁾ Zeitschr. f. Nahrungsmittel-Untersuchung u. Hygiene 1880, 2, 19.⁷⁾ Stickstoff $\times 6,39$.

⁸⁾ E. Schmidt ermittelte auch das Verhalten des Butterfettes aus Ziegen- und Schafmilch gegenüber dem aus Kuhmilch und findet:

	Kuhbutterfett	Ziegenbutterfett	Schafbutterfett
Unlösliche Fettsäuren nach Hehner	88,57—89,15 %	84,40 %	85,25 %
Schmelzpunkt derselben	39,08—40,00 "	38,08 "	40,50 "
Lösliche, flüchtige Fettsäuren	4,45 "	4,51 "	4,77 "
Das Fett bestand aus			
Butyrin	5,00 %	5,50 %	6,00 %
Olein	60,00 "	64,00 "	58,00 "
Margarin	35,00 "	30,50 "	36,00 "

⁹⁾ Schaffer fand für das Fett: Spec. Gew. bei 100° C. = 0,8668, Schmelzpunkt 30° C., Köttsdorfer'sche Zahl 226,0, Reichert-Meissl'sche Zahl 24,0, Refraktion (nach Jean) 31,5°.

¹⁰⁾ Die Butter hatte eine weissgelbe Farbe, die Konsistenz war fest, der Geschmack ranzig. Das ausgelassene Butterfett, das sehr fest war, hatte: Spec. Gew. 0,8652, Schmelzpunkt 35,4° C., Hehner'sche Zahl 86,2, Reichert-Meissl'sche Zahl 23,2, Jodzahl 26,7.

¹¹⁾ Für das Fett der Büffelmilch fand F. Strohmayer im Vergleich zum Kuhbutterfett:

	Schmelzpunkt	Erstarrungs- punkt	Erstarrungs- punkt der Fettsäuren	Koettstorfer'sche Zahl	Reichert-Meissl'sche Zahl
Büffelmilchbutterfett	31,3° C	19,8° C	37,3° C	222,4 mg	30,4 cem $\frac{1}{10}$ Normal-Natronlauge
Kuhbutterfett	31,0—31,5 "	19,0—20,0 "	37,5—38,0 "	227,7 "	24,0—22,8 "

Margarine (Kunstbutter).

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Fett	Kasein	Milch-zucker	Asche	Chlor-natrium	Fett	Stick-stoff-Substanz	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
1	Ohne nähere Bezeichnung	1877	12,01	82,03	0,74	5,22	—	93,23	—	—	—	A. Mott
2		"	11,25	87,15	0,57	1,03	—	98,20	—	—	—	T. Brown
3		"	10,01	87,91	0,23	1,85	—	97,69	—	—	—	J. König ¹⁾
4		1878	7,77	91,56	0,40	0,27	—	99,27	—	—	—	J. Moser ²⁾
5	Aus Hamburg . . .	1884	9,33	85,78	2,89	2,00	—	94,61	—	—	—	W. Fleischmann ³⁾
6	" " . . .	"	9,00	87,46	1,02	2,52	—	96,11	—	—	—	
7	Ohne nähere Bezeichnung	1886	11,26	83,64	1,67	3,58	—	94,25	—	—	—	R. Seidner ⁴⁾
8		"	10,94	84,11	1,83	3,12	—	94,44	—	—	—	
9		"	10,18	85,52	0,72	3,47	—	95,21	—	—	—	
10		"	13,57	83,83	1,23	1,25	—	96,74	—	—	—	
11	Aus England? . . .	"	10,93	84,99	1,14	2,94	—	95,42	—	—	—	P. Vietz ⁵⁾
12	Holländische Margarine . . .	1886	8,78	87,44	1,34	2,44	—	95,86	—	—	—	W. Fleischmann ⁶⁾
13	Deutsche Margarine, hergestellt mit	1896	6,60	89,78	0,27	—	2,74	2,71	96,12	0,29	0,05	K. Wroblek ⁷⁾
14		"	7,31	89,75	0,89	—	1,88	1,87	96,83	0,96	0,15	
15		"	6,59	89,80	0,40	—	2,84	2,82	96,14	0,43	0,07	
16		"	6,76	90,58	0,45	—	2,05	2,04	97,15	0,46	0,08	
17		"	6,72	90,24	0,23	—	2,62	2,60	97,13	0,25	0,04	
18		"	5,50	91,60	Spur	—	2,54	2,50	96,93	Spur	Spur	
19	Margarine „F“ . . .	1897	8,80	88,78	2,33	1,58	1,53	97,35	—	—	—	A. Furthel ⁸⁾
20	desgl. „FF“ . . .	"	8,50	88,81	2,69	1,76	1,74	97,06	—	—	—	
21	desgl. „Brillant“ . . .	"	8,60	88,90	2,40	1,60	1,50	97,27	—	—	—	
Mittel			—	9,07	87,59	0,99	2,35	2,15	96,33	0,39	0,06	

¹⁾ Original-Mittheilung.²⁾ Erster Bericht der Versuchsstation Wien 1878, Tabellen XXIX.³⁾ Bericht der Milchw. Versuchsstation Raden für 1884, 28.⁴⁾ 3. u. 4. Jahresber. d. Untersuchungsstation d. hygien. Instituts in München 1885, 10.⁵⁾ Milchztg. 1886, 15, 131.⁶⁾ Bericht der Molkerei Raden für 1886. Rostock 1886, 66.⁷⁾ Technische Erläuterungen zum Entwurfe eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Butter etc. (Sonderabdruck aus den „Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. XII. Julius Springer, Berlin 1896, 9).⁸⁾ Apoth.-Ztg. 1897, 12, 220—221. Chem. Centrbl. 1897, I, 948. Verf. fand ferner in

	Margarine F	FF	Brillant
Hehner'sche Zahl	94,5	94,9	94,7
Reichert-Meißl'sche Zahl	0,33	0,44	1,43
Ranzigkeit	2,27 ⁹⁾	1,6 ⁹⁾	2,2 ⁹⁾

⁹⁾ Die Fettmischung bestand aus Oleomargarin, Neutrallard, Baumwollsaamenöl, Sesamöl und Erdnussöl. Von den Milchsorten wurden auf 500 Pfd. der Fettmischung je 210 l Milch angewendet, von dem sauren Rahm 50 Pfd. Die Margarineproben wurden nach dem Salzen noch mehrmals durchgeknetet. Die Margarineproben hatten sämmtlich das Aussehen guter Butter; sie waren äusserlich weder unter sich noch von Naturbutter zu unterscheiden. Die aus saurer Vollmilch hergestellte Margarine war die beste; auch die mit Buttermilch und saurer Magermilch hergestellten Sorten wurden als sehr gut bezeichnet. Die Rahm-Margarine war zu fest, aber sonst von guter Beschaffenheit. Die mit süsser Vollmilch hergestellte Margarine hatte nur schwaches Aroma und wurde als minderwerthig bezeichnet. Die Wasser-Margarine hatte gar keinen butterähnlichen Geruch, sondern nur den der angewandten Fette.

Anhang zu Butter.

Versuche über Rahmsäuerung.

Versuche über das Verbuttern von Rahm, welcher mit Salzsäure angesäuert wurde.

Von Hittcher in Kleinhof-Tapiau (Milchztg. 1894, 23, 425).

Nach dem Rahmsäuerungsverfahren von C. Fr. Müller-Königsfeld b. Nordenham (Beschreibung des Verfahrens: Milchztg. 1894, 23, 306).

Amstag. 18. 23. 1909.

No.	Datum	Rahmmenge	Alter des Rahms	Wärme des Rahms bei Austritt aus der Centrifuge	Menge der zuge- setzten Salzsäure	Vom Zusatz der Säure bis zum Beginn des Butterns verstrichen Minut.	Verlauf des Butterns				Procentige Ausbeute an		Procentiger Fettgehalt von		Ausbutterungsgrad	Beschaffenheit der Butter beim Heraus- nehmen der Butter aus dem Fasse	
							Wärmegrade		Umdrehungen der Welle in der Minute	Dauer des Butterns	einmal gekneteter, ungesalzener Butter	Buttermilch	Verlust	Rahm			Buttermilch
							zu Anfang	zu Ende									
1	21/3 94	328,0	frisch	70	800	30	10,0	12,0	137	21	23,17	72,87	3,96*)	20,08	0,72	97,26	normal
2	22/3 "	325,0	"	70	800	35	10,3	12,5	140	26	24,74	73,66	1,60	21,20	0,65	97,69	"
3	24/3 "	362,5	"	70	650	30	10,8	12,5	139	25	25,26	74,66	0,08	21,88	0,51	98,28	"
4	28/3 "	326,0	"	70	950	30	10,0	12,5	141	26	25,16	73,46	1,38	21,78	0,45	98,45	"
5	30/3 "	284,0	"	60	800	30	11,0	13,4	142	25	33,10	65,53	1,37	27,49	0,33	99,21	schmierig**)
6	31/3 "	289,0	"	60	800	30	11,0	12,0	139	14,5	34,08	65,30	0,62	27,63	0,41	99,04	normal
7	13/4 "	326,2	"	65	900	30	11,6	13,4	136	23,0	23,43	75,47	1,10	20,14	0,50	98,10	"
8	14/4 "	313,7	"	70	900	36,5	10,8	13,0	141	27,3	19,74	79,05	1,21	17,00	0,47	97,76	"
9	18/4 "	290,7	"	65	800	32	11,5	13,5	140	19,0	24,49	75,03	0,48	20,42	0,35	98,72	schmierig
10	19/4 "	324,0	"	65	900	7	10,7	12,8	139	19,3	20,71	78,49	0,80	17,60	0,44	98,01	noch sehr feinkörnig***)
11	20/4 "	298,0	"	70	900	10	11,3	14,0	132	31,3	14,77	84,63	0,60	11,96	0,41	97,07	normal
12	21/4 "	290,6	"	65	800	9	11,5	14,0	140	18	25,81	73,54	0,65	20,40	0,63	97,65	schmierig
13	26/4 "	292,2	"	70	895	20	9,0	12,2	140	30,3	10,37	79,88	0,75	16,14	0,43	97,82	normal
14	28/4 "	310,2	24 Std.	65	820	11,5	8,2	11,6	140	36,7	25,53	73,21	1,26	22,20	0,23	99,23	"
15	11/5 "	284,2	frisch	60	800	35	10,0	12,8	139	22	22,17	77,83	0,00	19,30	0,525	97,10	"
16	12/5 "	267,6	24 Std.	60	710	32,5	10,3	13,0	139	24	26,53	73,47	0,00	23,62	0,39	98,78	grobkörnig u. etwas schmierig
17	16/5 "	288,7	frisch	21	850	35	11,2	13,6	139	25	21,06	78,28	0,66	18,28	0,61	97,37	normal
18	17/5 "	294,2	"	50	890	47	11,8	13,8	126	25	22,26	77,46	0,28	19,68	0,96	96,18	weich u. etwas schmierig
19	18/5 "	323,4	"	55	795	24	10,4	12,7	126	28,5	22,14	77,33	0,53	19,49	0,60	97,59	sehr feinkörnig
20	19/5 "	279,6	"	70	730	36	9,8	12,0	135	26	25,18	74,17	0,65	22,23	0,54	98,16	normal
21	21/5 "	287,2	"	30	730	41	10,2	12,6	155	27	24,44	75,04	0,52	21,04	0,60	97,91	"
22	22/5 "	306,6	"	30	820	28	10,1	12,8	125	55	20,74	79,10	0,16	17,89	0,54	97,60	"
23	23/5 "	298,7	"	30	910	18	10,0	12,7	138	28	20,29	78,81	0,90	17,36	0,60	97,23	"
24	24/5 "	279,0	"	30	800	36	9,3	11,8	133	33,5	21,29	78,03	0,68	18,60	0,44	98,11	"
25	25/5 "	280,7	"	70	850	22	9,4	11,8	139	24	22,92	76,98	0,10	20,04	0,65	97,50	"
26	26/5 "	309,2	24 Std.	70	908	11	9,8	12,2	139	31,3	26,72	73,28	0,00	23,80	0,32	99,04	"
Im Ganzen		7769,1	—	—	—	706,5	270,9	331,2	3559	671,7	—	—	—	—	—	—	—
Im Mittel		298,8	—	—	—	27,2	10,4	12,7	137	25,8	23,63	75,57	0,80	20,28	0,51	98,07	—

Bemerkungen. Der Wasser- und Fettgehalt der erhalten fertigen Butter im Mittel von 4—6 Proben waren normal, 11,87 u. 81,86 % im Mittel, Kasein (Stickstoff $\times 6,29 =$) 0,64 %. Der Geschmack der Butter war ausgezeichnet rein. Es fehlte vollständig das sonst für Sauerrahmbutter charakteristische Aroma. Die Buttermilch schmeckte nicht so gut wie die gewöhnliche. Die angewendete Salzsäure enthielt 27,6 Gew. % HCl.

*) Etwas Buttermilch wurde vergossen.

**) Der Rahm war sehr fettreich.

***) Die Butterung wurde absichtlich beendigt, ehe die Butterklumpchen die gewünschte GröÙe hatten.

Versuche über das Verbuttern des nach dem Müller'schen Verfahren mit Salzsäure angesäuerten Rahms.

Von H. Tiemann in Kiel (Milchztg. 1894, 23, 701).

21 Versuche mit frischem Rahm	Zu 100 kg Rahm wurde zugesetzt g	Nach Zusatz der Säure bis zum An- fang des Butterns verstrichen Minuten	Wärme während des Butterns		Dauer des Butterns Minuten	Umdrehungen der Welle in der Minute	Ausbeute		Fettgehalt		Ausbutterungs- grad %
			zu Anfang °C.	zu Ende °C.			an fertiger Butter %	an Butter- milch %	des Rahms %	der Butter- milch %	
Mittel	147,0	13,7	10,8	14,2	37	166	27,1	69,9	24,2	0,76	97,81
Minimum	95,0	6	8	13,0	25	140	—	—	19,32	0,45	96,92
Maximum	287,8	20	12,5	16,0	56	180	—	—	26,40	1,02	98,69

Die Butter hatte meist beim Herausnehmen aus dem Fasse eine normale Beschaffenheit. Bei den Versuchen, wo etwas viel Salzsäure zugesetzt war (153,5—287,8 g HCl auf 100 kg Rahm), zeigte die Butter beim Herausnehmen aus der Trommel einen an Schwefelwasserstoff erinnernden Geruch.

Bei allen Kostproben machte sich das Fehlen des Aromas deutlich bemerkbar, im Uebrigen konnte der Geschmack mit Ausnahme einiger weniger Fälle, bei deren Verbuttern der unangenehme Geruch sich bemerkbar machte, als ziemlich gut bis gut bezeichnet werden. Doch zeigten fast alle Proben einen geringen oder stärkeren eigenthümlichen Beigeschmack und waren dieselben mehr oder weniger ölig.

Fernere Literatur über obigen Gegenstand: Tamm-Flensburg, Versuche über das Ausbuttern von Rahm, der mit Salzsäure angesäuert wurde. Milchztg. 1894, 23, 750.

Versuche über das Verbuttern von Rahm, der mit Milchsäure angesäuert wurde.

Von H. Tiemann (Milchztg. 1895, 24, 385).

(Verfahren von C. Bolle in Berlin.)

Gebrauchsanweisung von C. Bolle-Berlin:

Der Rahm wird gleich nach dem Verlassen der Centrifuge auf 8—9° R. abgekühlt und mit der entsprechenden Menge Milchsäure versetzt. Ist das geschehen, so lässt man ihn unter öfterem Umrühren 1—1½ Stunden stehen und verbuttert ihn dann sofort in gewohnter Weise.

Die Milchsäure sollte, bevor sie dem Rahm zugesetzt wird (um eine gründliche Vermischung damit zu erleichtern), in einem hölzernen Eimer mit der etwa vier- bis fünffachen Menge kalten Wassers verdünnt werden. Für eine gehörige Vermischung des Rahms mit der verdünnten Säure ist Sorge zu tragen.

Der Säurezusatz richtet sich nach dem Geschmack und den Bedürfnissen der Kundschaft. In keinem Falle sollte derselbe weniger als 250 Gramm unverdünnter Milchsäure für 100 Liter Rahm betragen. Beobachtet wurde, dass bei Verwendung von ca. 500—625 Gramm Säure auf 100 Liter Rahm eine sehr gute Ausbutterung bei entsprechend geringem Fettgehalt der Buttermilch (0,35—0,38 %), welche in diesem Falle ziemlich sauer ist, erzielt wurde. Der Zusatz an Säure macht sich reichlich durch die höhere Butterausbeute und die bessere Beschaffenheit derselben bezahlt.

Beim Abmessen der Säure sind Gefäße von Glas, Porzellan, gebranntem Thon oder Holz zu wählen; Metallgefäße sind zu vermeiden, da sie von der unverdünnten Säure angegriffen werden.

Dieselbe ergänzend, bemerkt die betreffende Firma, dass nach den Versuchen, die dortselbst gemacht worden sind, die Butterungstemperatur mit 8—8½° R. beginnen sollte. Der Fettgehalt der Buttermilch betrug in diesen Fällen 0,4—0,6 %. Der Zusatz an Milchsäure betrug bei 100 Litern Rahm 400 Gramm Säure. Bei Erhöhung dieses Zusatzes wurde stets ein entsprechender Rückgang im Fettgehalt der Buttermilch beobachtet.

Rahm mit Milchsäure (mit 53,55 % freier Milchsäure (C₂H₄O₃) angesäuert.

14 Versuche; bei 5 Versuchen wurde der stets frische Rahm pasteurisiert	Zu 100 kg Rahm wurde zugesetzt g	Minuten vom Zusatz der Säure bis zum Beginn des Butterns	Wärme beim			Umdrehungen der Welle in der Minute	Dauer des Butterns Min.	Ausbeute		Fettgehalt		Ausbutterungs- grad %
			Zusatz der Säure °C.	Anfang des Butterns °C.	Ende des Butterns °C.			an fertiger Butter %	an Butter- milch %	des Rahms %	der Butter- milch %	
Mittel	849,3	71	11,3	11,7	13,21	159,2	55,7	28,39	69,63	23,75	0,42	98,7
Minimum	465,0	60	9,5	10,0	12,0	130	18	20,92	64,36	18,00	0,20	96,6
Maximum	1000,0	90	13,0	13,0	15,3	180	40	34,36	77,01	28,00	0,97	99,4

Rahm mit (4–5 %) gewöhnlichem Rahmsäuer angesäuert.

10 Versuche mit 22 Stunden altem Rahm; 5mal pasteurisiert, 5mal nicht pasteurisiert	Zu 100 kg Rahm zugefügt wurde Milchsäure	Minuten vom Zusatz der Säure bis zum Beginn des Butterns	Wärme beim			Umdrehungen der Welle in der Minute	Dauer des Butterns Min.	Ausbeute		Fettgehalt		Ausbutterungs- grad %
			Zusatz der Säure ° C.	Anfang des Butterns ° C.	Ende des Butterns ° C.			an fertiger Butter %	an Butter- milch %	des Rahms %	der Butter- milch %	
Mittel	—	—	—	14,2	14,5	149	25	29,97	67,90	25,72	98,97	
Minimum	—	—	—	13,5	13,5	135	20	26,00	63,30	22,40	98,5	
Maximum	—	—	—	16,0	16,5	160	30	34,17	72,14	29,64	99,3	

Anmerkungen zum Milchsäureverfahren: Die Verbutterung wurde in einem kleinen Holsteinschen Butterfasse vorgenommen.

Der Butterungsverlauf war bis auf 1 Fall, bei welchem die Butterungstemperatur (15°) zu hoch war, ein normaler. Die Konsistenz und Körnigkeit war nach beendeter Butterung in den meisten Fällen eine normale.

Der Fettgehalt der Milch war 3,55 % im Mittel; es wurden 26,5–28,0 kg, im Mittel 26,8 kg, Milch zu 1 kg Butter gebraucht.

Der Geschmack der Buttermilch war ein sehr angenehmer. Der Wassergehalt der fertigen Butter schwankte zwischen 16,92 und 12,09 %.

Der Geschmack der Butter war in den meisten Fällen ziemlich gut bis gut, aber ohne jeglichen Ausdruck nur in ganz wenigen Fällen war derselbe weniger gut, was vielleicht auf das Butterungsmaterial z. Th. zurückzuführen sein mag. Es gelangte nämlich mehr oder weniger Rahm von altemilchenden Kühen zur Verarbeitung.

Ganz besonders machte sich aber das Fehlen jeglichen Aromas bemerkbar, was ausserordentlich bei den vergleichenden Geschmacksprüfungen zwischen Sauerrahmbutter und Milchsäurebutter hervortrat.

Durch das Pasteurisieren des Rahms wird der Ausbutterungsgrad durchaus nicht ungünstig beeinflusst.

Versuche über den Einfluss der Konzentration des Butterungsmaterials auf die in der Buttermilch zurückbleibende Fettmenge.

Von John Sebelien.

Von John Sebellien.

Bezeichnung des Rahmes		Konzentrierter Rahm			Verdünnter Rahm			
		Fettgehalt		Vom Rahmfett sind in der Buttermilch zurückgeblieben	Fettgehalt		Vom Rahmfett sind in der Buttermilch zurückgeblieben	
		des Rahms	der Butter- milch		des Rahms	der Butter- milch		
Versuch		%	%	%	%	%	%	
Gesäuerter Rahm	I	18,55	0,42	1,82	12,09	0,33	2,42	Landwirtschaft- liche Versuchs- stationen 1888, 35, 321; Milchzeitung 1888, 17, 1007.
	VI	19,51	0,32	1,33	12,82	0,36	2,38	
	II	19,69	0,70	2,86	13,26	0,43	2,85	
	V	20,29	0,51	2,08	13,70	0,44	2,86	
	III	22,34	0,55	1,95	10,90	0,34	2,83	
IV	22,5	0,37	1,28	11,00	0,30	2,47		
Mittel		20,48	0,48	1,89	12,29	0,37	2,64	
Süßer Rahm	IX	23,04	1,41	4,55	7,64	0,80	9,51	
	X	23,15	1,15	3,67	7,71	0,80	9,47	
	XI	22,80	1,82	5,91	7,60	0,84	10,42	
	VII	19,40	1,42	5,78	10,00	0,95	8,49	
	VIII	24,28	1,97	6,18	12,35	0,75	6,34	
XII	21,41	1,68	5,84	10,62	1,01	8,32		
Mittel		22,01	1,57	5,21	9,32	0,87	8,76	
	III	36,82	1,92	2,97	8,65	0,46	4,80	Landwirtschaft- liche Versuchs- stationen 1889, 36, 119; Milchzeitung 1889, 18, 335.
	IV	36,26	1,56	2,54	8,62	0,53	5,53	
	I	30,53	1,12	2,44	8,17	0,63	7,00	
	II	28,52	0,77	1,81	7,56	0,55	6,84	
	V	33,80	0,97	1,72	9,63	0,49	4,59	
Mittel		33,07	1,27	2,30	8,47	0,53	5,75	

Versuche mit dem Butterseparator.

Von Hittcher (Milchztg. 1891, 20, 731).

I. Temperatur der austretenden Butter 14, 14½ u. 15° C.

Verarbeitete Milchmenge und Zahl der Versuche	Verarbeitete Milch- menge in d. Stunde kg	Tourenzahl	Temperatur		Ausbeute in %				Fettgehalt in %				Zu 1 Pfd. Butter gebrauchte Milch Pfd.	Ausbeutungs- grad %
			der Milch °C.	der Butter °C.	Butter	Magermilch	Buttermilch II	Verlust	der Milch	der Magermilch	der Buttermilch II	des Rahms		
Morgenmilch bis auf 1 Probe, stündl. verarbeitete Milchmenge 402—462 kg, Mittel von 9 Vers.	429	7169	27,8	14,4	3,67	93,11	2,02	1,20	3,406	0,421	3,711	29,96	27,5	85,06
Abendmilch bis auf 1 Probe, stündl. verarbeitete 324—363 kg, 5 Versuche	332	7378	28,3	14,6	3,97	92,24	2,37	1,42	3,575	0,324	4,060	30,019	25,3	90,38

II. Temperatur der austretenden Butter 16 u. 16½° C.

Morgenmilch, stündl. verarbeitet 412—480 kg, 5 Versuche	443	7160	28,6	16,2	3,25	92,22	3,58	0,95	3,347	0,435	3,951	25,879	30,9	77,30
Gekühlte Abendmilch, stündl. ver- arbeitet 337—346 kg, 2 Versuche	342	7300	26,8	16,5	3,92	92,16	2,10	1,85	—	—	—	—	25,5	—

III. Temperatur der austretenden Butter 17—18° C.

Morgenmilch, stündl. verarbeitet 400—440 kg, 9 Versuche	425	7158	28,9	17,1	3,24	93,13	2,53	1,11	3,133	0,356	3,059	21,298	31,22	82,06
desgl., stündl. verarbeitet 375 bis 395 kg, 5 Versuche	386	7200	29,5	17,0	3,36	91,79	3,73	1,00	3,220	0,350	—	—	30,00	80,41

IV. Temperatur der austretenden Butter 17—18° C.

Stündl. verarbeitet 401—436 kg, 5 Versuche	421	7195	29,7	17,1	3,80	92,185	2,01	1,805	3,225	0,438	—	25,47	26,3	94,40
Stündl. verarbeitet 374—377 kg, 3 Versuche	379	7170	28,0	17,7	3,77	92,33	2,41	1,49	3,456	0,444	3,207	22,942	26,6	86,92
Stündl. verarbeitet 350—359 kg, 7 Versuche	355	7279	27,9	17,5	3,80	92,68	2,20	1,33	3,419	0,395	3,060	—	26,5	88,39
Stündl. verarbeitet 331—348 kg, 8 Versuche	341	7200	27,8	17,4	3,90	92,85	2,32	0,88	3,416	0,358	3,023	—	25,7	88,37

NB. Der Butterseparator besteht aus 2 Haupttheilen, der eine besorgt die Trennung der Milch in Rahm und Magermilch, der andere scheidet aus dem Rahm die Butter aus. Der Hergang der Verarbeitung ist folgender: Zunächst wird die Milch in der rotirenden Separatortrommel in Rahm und Magermilch zerlegt. Da der mit 25—27° C. austretende Rahm noch nicht verbuttert werden kann, wird er zuvor über einen Kühler geführt und gelangt im abgekühlten Zustande in das Butterfass, woselbst er etwa eine Minute lang verweilt und während dieser Zeit in Butter und Buttermilch zerlegt wird, welche beide gemeinschaftlich in die auf das Ende des Butterfasses aufgestreifte Blechkappe eintreten und in einen untergestellten hölzernen Eimer hineinfallen. Aus diesem Gefäß wird die Buttermilch durch einen unmittelbar an dem Boden des Eimers befindlichen Hahn abgezapt. Da nun diese Buttermilch (I) sehr fettreich ist — sie enthält häufig mehr als 5% Fett —, lässt man sie noch einmal die Trommel passieren. Die davon erhaltene Buttermilch ist als Buttermilch II bezeichnet.

Versuche mit Johannson's Butterextraktor.

Von Chevron (L'industrie laitière 1892, No. 27 u. 29; Milchztg. 1892, 21, 548).

Nähere Bezeichnung	Wasser %	Fett %	Kasein %	Milch- zucker %	Asche %	Bemerkungen
Butter nach dem alten Verfahren (7 Proben)	15,92	82,69	—	1,39	—	Die Butter ist nur einmal geknetet.
Extraktorbutter aus denselben Milch (4 Proben)	20,03	78,05	—	1,92	—	
Gewöhnliche Süßrahmbutter	15,83	83,03	—	1,14	—	
desgl. mit 5% gesalzen und nochmals geknetet	14,80	80,11	0,61	0,28	4,11	
Extraktorbutter	21,30	77,10	—	1,70	—	
desgl. mit 5% gesalzen und nochmals geknetet	13,12	85,12	1,21	0,12	2,02	—

Die Leistungsfähigkeit des Extraktors erhält aus folgenden Zahlen:

Versuch	Das Gesamtfett vertheilt sich nach % auf			Stündliche Leistung kg	Bemerkungen
	Butter	Magermilch + Buttermilch	Verlust		
I	80	—	—	—	5000 Touren, weshalb die Milch zweimal durch- gelassen wurde.
II	78	11,5	10,5	530	6000 Touren; die Milch wurde nur einmal entrahmt.
III	84	11,0	5,0	416	desgl.
IV	89,27	10,0	0,73	800	Für Separatoren-Entrahmung berechnet.

Erträge an Rahm, Butter und Magermilch an der Versuchsmolkerei Kleinhof-Tapiau.
(Milchztg. 1892, 21, 426.)

Die Entrahmung der Milch ergab:

im Jahre	Rahm	Magermilch	Verlust
1888/89	17,24 %	82,05 %	0,71 %
1889/90	17,03 „	82,51 „	0,46 „
1890/91	16,36 „	82,98 „	0,66 „
Mittel 1888/91:	16,88 %	82,52 %	0,60 %

Beim Verbuttern der Milch mittelst des Butterseparators waren zur Herstellung von 1 kg Butter erforderlich im Jahre 1889/90: 27,310 kg und im Jahre 1890/91: 29,530 kg Milch.

Butterausbeute nach den verschiedenen Butterungsverfahren in Proskau.

Nach M. Schmoeger und J. Klein.

Berichte von Proskau 1883/84, 30; 1884/85, 18; 1885/86, 13; 1889/90, 28; 1890/91, 24; 1891/92, 18; 1892/93, 15.)

Zu 1 kg Butter waren erforderlich kg Milch:

im Jahre	Swartz'sches Verfahren	Holsteinsches Verfahren	Centrifugal-Verfahren
1883/84	33,82 kg	32,30 kg	31,53 kg
1884/85	34,18 „	34,56 „	29,38 „
1885/86	34,73 „	36,54 „	30,13 „
1888/89	33,97 „	34,30 „	29,67 „
1889/90	33,71 „	34,12 „	29,65 „
1890/91	35,56 „	37,82 „	29,15 „
1891/92	30,33 „	31,93 „	27,63 „
1892/93	31,66 „	34,13 „	27,86 „

Vergleichende Butterungsversuche.

Von Wüthrich und Streit (Mitt. d. Milchw. Vereins im Allgäu 1894, 219; nach den Berner Bl. f. Landwirthsch. 1894).

Versuchs- No.	Butterungsmaterial *)		Tempe- ratur ° C.	Zeit- dauer Min.	Buttermilch		Fett in der Butter kg	Ausbutterungsgrad		
	Gewicht kg	darin Fett kg			Gewicht kg	darin Fett kg		einzel	Durch- schnitt	
I. Mühlsteinbutterfass (Inhalt 270 Liter).										
1	120	11,040	15	60	106,0	0,795	10,245	92,8	88,5	
2	160	10,944	15	70	148,5	1,128	9,816	89,9		
3	130	8,840	17	50	120,5	1,530	7,310	82,8		
II. Victoriabutterfass (Inhalt 175 Liter).										
4	62	4,414	15	135	56,5	0,197	4,217	95,4	89,8	
5	44	2,697	16	120	40,5	0,336	2,361	87,5		
6	55	6,116	17	75	47,5	0,812	5,304	86,7		
III. Holsteinbutterfass (Inhalt 360 Liter).										
7	136	12,920	13	40	118,0	1,003	11,917	92,2	92,8	
8	118	10,171	12	35	104,5	0,783	9,388	92,3		
9	110	11,088	12	35	97,5	0,663	10,425	94,1		
IV. Lefeldtbutterfass (Inhalt 280 Liter).										
10	100	6,290	14	45	91,5	0,997	5,293	84,2	88,9	
11	100	8,030	13	45	92,0	0,607	7,423	92,4		
12	108	7,020	12	60	97,5	0,683	6,337	90,2		

Das Holsteinsche Butterfass erheischt am meisten Betriebskraft, dann kommt das Lefeldt'sche, dann das Mühlstein- und zuletzt das Victoriass, welches am wenigsten Betriebskraft erfordert.

Am leichtesten zu reinigen sind das Holsteinsche und das Victoriass, am schwierigsten das Mühlsteinsche.

Die beste Butter lieferte das Holsteinsche, am wenigsten befriedigten in dieser Beziehung das Mühlstein- und Victoriass, da bei diesen Fässern bei einer bedeutend höheren Temperatur gebuttert werden musste.

*) Als Butterungsmaterial wurde Vorbruch mit Zusatz von Rahm verwendet.

Prüfung des Triumphbutterfasses von E. Ahlborn-Hildesheim.
Von Backhaus-Göttingen (Milchztg. 1892, 21, 370).

Mittel aus 6 Versuchen	Rahm- menge kg	Dauer des Butterns Min.	Temperatur des Rahms			Buttermilch		Butter beim	
			Anfang	während	Ende	Menge	Fett	1. Wiegen	2. Wiegen
			des Butterns		° C.	kg	%	kg	kg
Butterfass von Lehfeldt	31,993	32,67	18,83	18,65	18,17	22,15	1,795	6,149	5,858
Triumphbutterfass	31,993	32,33	18,75	18,50	18,04	22,074	1,517	6,349	5,951

Versuche mit dem Radiator.

1. Versuche auf der Molkereischule zu Poligny in Frankreich. (Milchztg. 1897, 26, 823—824.)
Die 4 angestellten Versuche ergaben folgende Resultate:

Bezeichnung der Versuche	Stündliche Leistung kg	Wärme der aus dem Erhitzer kommenden Vollmilch ° C.	Wärme des vorgebutter- ten Rahms ° C.	Wärme des Kühlwassers für die Rahm- schleuder ° C.	Gewicht der Butter in % der Milch	
					roh	geknetet
1. Versuch: 30/3 1896	661	58	17	6	9,95	3,95
2. „ 10/4 1896	660	65	17,5	4	9,83	4,04
3. „ 25/4 1896	643	49	18	5	10,00	4,00
4. „ 6/5 1896	646	67	17	4	9,68	3,91

Die Zusammensetzung von Vollmilch, Magermilch und Butter war folgende:

Bezeichnung der Versuche	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz %
	Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett	
	%	%	%	%	%	%	%	
I. Vollmilch:								
1. Versuch	86,67	3,89	3,72	4,94	0,78	29,18	27,98	4,67
2. "	86,41	4,10	3,71	5,03	0,75	30,17	27,30	4,83
3. "	86,35	4,05	3,92	4,96	0,70	29,67	28,72	4,75
4. "	86,66	3,95	3,75	4,92	0,72	29,61	28,11	4,74
II. Magermilch:								
1. Versuch	89,92	3,76	0,16	5,40	0,76	37,30	1,59	3,97
2. "	89,92	4,03	0,22	5,16	0,67	39,98	2,18	6,40
3. "	90,00	4,03	0,20	5,12	0,66	40,30	2,00	6,45
4. "	90,23	3,82	0,22	5,08	0,65	39,09	2,25	6,25
III. Butter:								
1. Versuch	17,05	1,02	81,40	0,37	0,16	1,23	98,13	0,20
2. "	19,40	1,34	77,80	1,17	0,21	1,66	96,52	0,27
3. "	16,60	0,67	81,08	1,52	0,13	0,80	97,22	0,15
4. "	17,30	0,80	80,60	1,13	0,17	0,97	97,46	0,16

2. Versuche mit dem Radiator im Vergleich mit Separator und Butterfass. Von L. Nilson
und K. L. Söndén (Centrl. Agrik.-Chem. 1896, 25, 50—53).

Bezeichnung der Versuche	Stünd- liche Leistung kg	Durchschnitts- temperatur beim Pasteurisieren ° C.	Umdrehungen der Centrifuge in der Minute	Fetthalt der verarbeiteten Milch %	Aus 100 kg Milch fertige Butter kg	In der Butter		Zu 1 kg Butter erforderlich Milch kg	Von Milchlott gehen in die Butter über %
						Wasser	Fett		
						%	%		
Radiator	Mittel aus {	670	55—65	6000	3,250	27,67	17,80	79,20	27,15
Separator u. Butterfass {	5 Versuchen {	1120	58—64	5600	3,256	26,92	11,61	85,37	27,91
Radiator	Mittel aus {	635	60—65	6000	3,20	27,46	15,63	81,04	27,31
Separator u. Butterfass {	3 Versuchen {	1035	60—65	5600	3,20	26,45	12,86	85,21	28,35

Käse.

I. Rahmkäse oder überfetter Käse.

Unter „Rahmkäse“ sind die aus Rahm oder aus ganzer Milch unter Zusatz von Rahm gewonnenen Käse zu verstehen, bei denen der prozentige Fettgehalt den des Kaseins bedeutend übersteigt.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Asche	Stickstoff-Substanz	Fett		
1	Eigentlicher Rahmkäse*)	1875	30,34	2,02	67,32	—	0,32	2,90	96,66	0,46	Hassall ¹⁾
2	Gervais-Käse	1884	52,94	11,80	29,75	2,58**)	2,93	25,08	63,22	4,01	J. König ²⁾
3	Neufchâtel, alt	1896	44,84	12,00***)	36,73	—	2,95	21,76	66,59	3,48	A. Stutzer ³⁾
4	desgl., frisch	?	34,50	20,69 ⁹⁾	41,90	—	3,60	31,59	63,97	5,05	A. Payen ⁴⁾
5	desgl., frisch		36,60	14,18	40,70	(9,02)	0,50	22,37	64,20	3,58	
6	Französische Rahmkäse, (Fromage Gervais)	1886	47,94	—	43,76	0,29	0,52	—	84,06	—	P. Vietz ⁵⁾
7		"	45,69	—	45,96	0,31	0,44	—	84,63	—	
8		"	42,07	—	48,41	0,22	0,53	—	83,57	—	
9		"	33,57	—	58,58	0,25	0,46	—	88,18	—	
10	Neufchâtel	1885	51,72	20,73	23,99	—	3,56	42,94	49,69	6,87	e. Klenze ⁶⁾
11	desgl. aus Amerika	1895	44,47	14,06	33,70	4,24	2,99	25,32	60,69	4,05	7)
	Mittel (1—11)	—	42,15	14,20	42,33	0,20 ¹⁾	1,10	24,56	73,17	3,93	
12	Stilton-Käse, ziemlich frisch	1861	32,18	24,31	37,36	2,22	3,93	35,84	55,09	5,74	A. Fölcker ⁸⁾
13	" alt	"	20,27	(33,55) ⁹⁾	43,98	—	2,20	—	55,16	—	
14	" nicht mehr	"	38,28	23,93	30,89	3,70	3,20	38,77	50,05	6,20	
15	" frisch	"	38,23	24,38	29,12	2,76	5,51	39,47	47,14	6,32	
16	"	1876	31,37	27,66	31,37	—	4,39	40,30	45,71	6,45	Hassall ¹⁾
17	" aus England ¹⁰⁾	1893	31,22	24,28	37,24	—	3,86	35,30	54,14	5,65	Griffiths ¹¹⁾
18	" Amerika	1895	30,35	28,85	35,39	1,59	3,82	41,42	50,81	6,63	7)
19	"	1894	19,40	21,10	42,20	—	2,60	26,18	52,36	4,19	Wm. Chatteray, T. H. Parmam u. C. G. Moore ¹²⁾
20	"	"	21,20	26,30	45,80	—	2,90	33,38	58,12	5,34	
	Mittel (12—20)	—	29,17	25,73	36,87	4,63 ¹⁾	3,60	36,33	52,06	5,81	

¹⁾ Hassall, Food: Its adulteration and the methods for their detection. London 1876, 450.

²⁾ Original-Mittheilung.

³⁾ Zeitschr. anal. Chem. 1896, 35, 493.

⁴⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. [2], 3, 232.

⁵⁾ Milchztg. 1887, 16, 120.

⁶⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.

⁷⁾ Nach den Untersuchungen des chemischen Bureaus des Ackerbaurdepartements vom Jahre 1895 aus dem Jahres-

⁸⁾ Bericht des Ackerbaurdepartements in Washington, Milchztg. 1896, 25, 541.

⁹⁾ Journal of the Royal agric. Soc. of England 1861, 22, 37.

¹⁰⁾ Milkereiztg. 1893, 50. Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1893, 8, 367.

¹¹⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

¹²⁾ Ein aus süßer Sahne bereiteter Weichquark.

¹³⁾ Darin 0,32% Milchsäure.

¹⁴⁾ A. Stutzer fand ferner:

Stickstoff in Form von

	Ammoniak	Amid	Albumose, Pepton	unverdaulicher Substanz	Kasein, Albumin	Kalk	Phosphorsäure	Chlor-natrium
Gervais	0,031	0,099	0,298	0,166	1,329	0,14	0,23	0,76 %
Camembert	0,386	1,117	0,855	0,115	0,397	0,03	0,76	2,21 "
Schweizer	0,188	0,459	0,455	0,119	3,871	1,56	0,82	1,56 "

¹⁵⁾ Bei den Käse-Analysen von A. Payen ist die Stickstoff-Substanz aus dem Stickstoff-Gehalt durch Multipli-

¹⁶⁾ kation mit 6,25 berechnet.

¹⁷⁾ Bedeutet Stickstoff-Substanz + Milchzucker.

¹⁸⁾ In siedendem Wasser waren löslich 3,1 %.

¹⁹⁾ Aus der Differenz berechnet.

König, Nahrungsmittel. I. 4. Aufl.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
21	Englische Rahmkäse ¹⁾	1886	30,24	—	62,80	—	1,48	—	—	91,31	—	F. Veth ¹⁾
22		"	32,40	4,16	60,48	1,74	1,08	—	6,15	89,47	0,98	
23		"	27,69	2,00	66,80	2,20	1,01	—	2,76	92,38	0,44	
24		"	32,30	2,35	61,88	2,16	1,03	—	3,47	91,40	0,56	
	Mittel (21—24)	—	30,66	2,84	62,99	2,03	1,14	—	4,13	91,14	0,66	
25	Double Cream	1894	57,60	19,00	39,30	—	3,40	—	44,81	92,69	7,17	Wm. Chatteroy, T. H. Pharran u. G. G. Moore ²⁾ F. Sochid ³⁾
26	Stracchino-Käse ⁴⁾ . . .	1873	52,57	17,01	26,73	—	3,69	—	35,72	56,68	5,74	
27	Stracchino-K. fast reifer	1877	42,42	24,81***	29,60	0,04	3,13	—	43,09	51,41	6,89	G. Musso u. L. Menozzi ⁵⁾
28	" Stracchino, "	"	40,27	23,01	34,62	—	3,13	—	38,52	57,96	6,16	
29	" frisch . . .	"	47,09	20,00	29,00	0,06	3,85	—	37,80	54,81	6,05	
30	" "	"	34,21	25,56	36,92	—	3,95	—	38,85	56,27	6,22	
31	" 1 Jahr alt	"	31,16	26,77	39,32	—	3,76	—	38,89	57,12	6,24	
32	" "	"	36,15	24,42***	34,15	1,02	4,26	—	38,25	53,48	6,12	
33	" "	"	29,82	—	39,04	—	4,63	—	—	55,63	—	A. Maggiora ⁶⁾
34	desgl., überreif I . . .	1892	34,41	26,75 ⁷⁾	37,52	—	4,07	1,33	40,78	57,20	6,52	
35	" II . . .	"	32,43	25,94 ⁸⁾	34,08	—	6,76 ⁹⁾	0,99	38,37	50,43	6,14	
36	" III . . .	"	37,63	26,94 ⁸⁾	36,19	—	10,45 ⁹⁾	0,91	43,19	58,12	6,91	v. Klenke ¹⁰⁾
	Mittel (26—36)	—	38,01	23,39	34,04	—	4,70	1,08	39,35	54,92	6,30	
37	Hohenburger Rahmkäse .	—	38,67	26,90	29,13	—	5,30	—	43,48	47,49	7,01	A. Sott ¹¹⁾ Johnston ¹²⁾
38	Imperialkäse von R. Markert in Fulneck (Mähren) „Fro- mage-Austrofrancaise“ .	1892	31,20	8,38	53,40	3,92	3,10	—	12,18	77,62	1,95	
39	Kronenkäse aus Amerika .	"	31,40	5,25	57,98	2,20	3,17	2,72	7,65	84,52	1,22	
	Rahmkäse (Gesamtmittel)	—	36,56	18,85	41,39	—	3,96	—	29,72	65,24	4,76	

¹⁾ Milchzeitung 1887, 16, 120.

²⁾ Analyst 1894, 19, 145-147; Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

³⁾ Erster Bericht über Arbeiten der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Wien. 1878. Tabelle XXIX.

⁴⁾ Le Stazioni sperimentali agrarie Italiane 1877, 6, 4. Heft, und Forschungen auf dem Gebiet der Viehhaltung 1878, 43.

⁵⁾ In demselben wurde gefunden: Milchsäure: No. 21 0,51% No. 22 0,14% No. 23 0,30% No. 24 0,28%
Kochsalz: " 1,15 " " 0,70 " " 0,70 " " 0,86 "

⁶⁾ Der Stracchino-Käse wird theils aus ganzer, süßer Milch, theils aus dieser unter Zusatz von Rahm dargestellt, wobei eine niedrige Temperatur beim Laben und eine hohe nach dem Käsen beim Trocknen massgebend sind. Ob alle hier aufgeführten Sorten aus ganzer Milch unter Zusatz von Rahm gewonnen sind, lässt sich aus der Zusammensetzung nicht mit Sicherheit schliessen. Musso, Menozzi und Bignamini (vergl. Giov. Musso: Il Caseio, Tecnologia Chimica etc. Roma 1887, 53) bestimmten in 2 Sorten Stracchino-Käse die einzelnen Stickstoffverbindungen mit folgendem Ergebnisse:

Stracchino:	Wasser	Casein	Albumin	Peptone	Amide	Ammoniak	Fett	Asche
Frisch	55,02%	14,26%	1,28%	0,74%	1,54%	0,05%	24,51%	2,63%
Reif	40,37	14,93	0,71	0,86	8,15	0,42	30,83	3,75
*** Aus dem Stickstoff-Gehalt nach Abzug des Ammoniaks durch Multiplikation mit 6,25 berechnet. Die Käse enthielten:								
Ammoniak	No. 6	7	8	9	28	29	30	31
Milchsäure	—	—	—	—	0,064	0,067	0,281	0,349
	0,29	0,31	0,22	0,25	—	1,470	0,907	—

⁷⁾ A. Maggiora fand ferner:

	Gesamt-Stickstoff	Rohprotein	Reinprotein	Amid-Stickstoff	Ammoniak-Stickstoff	Säuregrade des Fettes (eem Normal-Alkali für 100 g Fett)
I	4,28%	26,75%	16,25%	1,01%	0,68%	29,01
II	4,15	25,93	7,95	1,49	1,26	37,00
III	4,31	26,94	3,62	1,88	1,85	49,53

Aus dem Parmesan bildeten sich nicht unbedeutende Mengen ammoniakalische Salze, Tyrosin und Leucin. Die mikroskopische Untersuchung zeigte die bekannten Käsemikroorganismen: Micrococcus candidus, Micrococcus citreus und roseus, Sarcina alba sowie Spirillen, Saccharomycesarten und Schimmelpilze.
¹¹⁾ Der hohe Aschengehalt rührt davon her, dass die Käse mit einer Gypskruste zur Erhaltung ihrer Form umgeben waren.

No.	Herkunft der Käse	In der natürlichen Substanz ¹⁾							In der Trocken-Substanz		
		Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker %	Milch- säure %	Asche %	Kochsalz %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %
6	Leschtane bei Belgrad	58,94	25,32	19,35	2,48	0,198	3,85	3,13	—	—	—
7	Mokrling „ „	43,93	32,37	18,11	2,62	0,177	2,70	0,94	57,73	32,30	0,24
8	Kreis Uzice	50,77	28,92	7,77	—	1,02	4,81	2,23	58,74	15,78	0,40
9	Umgebung Belgrada	62,22	—	19,45	—	0,391	2,66	1,19	—	51,50	—
10	Japuze bei Belgrad	66,12	—	14,35	—	0,191	2,56	1,27	—	51,56	—
11	desgl.	42,10	—	22,82	—	0,52	2,43	0,93	—	57,96	—
12	Umgebung Belgrada	56,20	18,25	20,32	2,41	1,07	3,82	2,61	41,21	46,40	6,50
13	desgl.	60,72	15,41	17,34	3,51	1,14	3,02	1,95	39,23	44,14	6,28
14	Mokrling bei Belgrad	49,05	—	28,58	—	1,44	3,12	2,01	—	56,10	—

2. Fettkäse.

Unter „Fettkäse“ ist der aus ganzer Milch dargestellte Käse zu verstehen, dessen Fettgehalt mehr oder weniger gleich dem des Kaseins ist.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker	
			Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %		
1	Backstein-Käse aus Baiern	1867	45,24	23,14	28,16	—	3,46	—	42,26	51,42	6,76	O. Linné und C. Möller ¹⁾	
2	desgl. aus Bern	"	35,80	24,44	37,40	—	2,36	—	38,07	58,26	6,09		
	Mittel (1—2)	—	40,52	23,29	32,78	—	2,91	—	40,16	54,84	6,42		
3	Bellelay-Käse (Weich-) .	1867	37,59	28,88 ²⁾	30,05	—	3,48	—	46,27	48,15	7,40	dieselben ¹⁾	
4	" "	1887	39,62	25,70	30,10	—	4,72	3,35	42,48	49,85	6,70	E. Schultze ³⁾	
	Mittel (3—4)	—	38,61	27,29	30,08	—	4,10	2,91	44,37	49,00	7,10		
5	Von Brie	1865	53,99	14,94 ²⁾	24,83	0,61	5,63	—	32,47	53,96	5,20	A. Payen ⁴⁾	
6	" "	"	45,20	18,31	25,70	5,19	5,60	—	33,79	46,90	5,36		
7	" " unreif.	1885	55,69	17,29	21,42	—	5,60	—	39,02	48,34	6,24	v. Klenze ⁵⁾	
8	Brie { Von den Pariser Ausstellungen 1884/85	1887	53,84	17,40 ²⁾	24,60	—	4,16	3,26	37,69	53,29	6,03	Ducloz ⁶⁾	
9		"	49,73	17,16	28,74	—	4,37	3,42	34,13	57,17	5,46		
10		"	50,51	17,87	27,61	—	4,01	3,04	36,11	55,79	5,78		
11		"	50,05	19,34	27,04	—	3,57	2,67	39,92	54,13	6,39		
12	Alter aus Marcy	"	46,06	19,94	29,50	—	4,50	3,70	36,97	54,69	5,92		
13	Nach Art d. Brie-Käses dargestellt	1862	51,90	18,75	21,00	3,65	4,70	—	38,98	43,66	6,24	A. Payen ⁴⁾	
14		"	45,24	19,75 ²⁾	30,31	—	4,70	3,69	36,07	55,35	5,77		
15		Port-du-Salut	"	47,51	22,56	25,93	—	4,00	1,90	42,98	49,40	6,88	Ducloz ⁶⁾
16		"	"	48,02	24,29	24,00	—	3,69	1,56	46,71	46,13	7,47	
	Mittel (5—16)	—	49,79	18,97	25,87	0,83	4,54	3,05	37,91	51,55	6,07		

¹⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 354 u. 355.

²⁾ Landw. Jahrbücher 1887, 16, 317.

³⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. [2], 3, 232.

⁴⁾ Die Stickstoff-Substanz zerfiel in: Eiweißstoffe 24,33 %, Eiweißersatzprodukte 1,37 %, Nuclein (unverdaulich) 0,22 %.

⁵⁾ Bei den Käseanalysen von Payen ist die Stickstoff-Substanz aus dem Stickstoff-Gehalt durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

⁶⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 323.

¹⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.

²⁾ Ducloz, Le Lait 1887, 282, 296, 300.

³⁾ Ducloz, Le Lait 1887, 282, 296, 300. Ueber weitere Bestimmungen in diesen Käsen siehe unten.

⁴⁾ Ducloz, Le Lait 1887, 282, 296, 300. Ueber weitere Bestimmungen in diesen Käsen siehe unten.

⁵⁾ Ducloz, Le Lait 1887, 282, 296, 300. Ueber weitere Bestimmungen in diesen Käsen siehe unten.

⁶⁾ Ducloz, Le Lait 1887, 282, 296, 300. Ueber weitere Bestimmungen in diesen Käsen siehe unten.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz %	Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %		
17	Camembert 1	1894	47,90	21,80	21,90	—	4,70	—	41,84	42,03	6,69	W. Chittaway, T. H. Plarman u. C. G. Moore ¹⁾
18	Camembert 2	"	43,40	24,40	22,60	—	3,80	—	43,11	39,93	6,90	
19	desgl.	1896	50,90	18,13 ^{*)}	27,30	—	3,14	2,21	36,92	55,60	5,91	A. Stutzer ²⁾
20	Cantal	1887	36,26	24,50 ^{**)}	34,70	—	4,45	2,23	38,59	54,44	6,17	
21	Crescenza	"	56,75	18,91 ^{**)}	21,34	—	2,90	1,34	43,72	49,34	7,00	Ducoux ³⁾
22	Cheddar-Käse, englisch	1862	37,85	25,00 ^{***)}	28,91	4,91	3,33	0,52	40,23	46,59	6,44	
23	" " "	"	31,70	27,19	36,18	1,95	2,98	0,34	39,81	52,97	6,37	A. Völcker ⁴⁾
24	" " "	"	32,88	29,87	29,25	4,92	3,08	0,29	44,50	43,55	7,12	
25	" " "	"	38,43	32,37	23,28	2,10	3,82	0,65	52,57	37,81	8,41	A. Völcker ⁴⁾
26	" " "	"	39,43	30,37	27,08	0,22	2,90	0,23	50,14	44,71	8,02	
27	" " "	"	38,39	28,37	23,21	6,80	3,23	—	46,05	37,67	7,37	A. Völcker ⁴⁾
28	" " "	"	30,53	23,38	41,58	2,45	2,06	0,09	33,65	59,85	5,38	
29	" 3 Monate alt	1861	36,17	24,93	31,83	3,21	3,86	1,18	39,06	49,87	6,25	derselbe ⁵⁾
30	" 6 " " "	"	31,17	26,31	33,68	4,91	3,93	1,15	38,22	48,92	6,12	
31	" 6 " " "	"	33,92	28,12	33,15	0,96	3,85	1,23	42,60	50,17	6,81	derselbe ⁵⁾
32	" 11 " " "	"	30,32	28,18	35,53	1,66	4,31	1,55	40,44	50,99	6,47	
33	" " " "	"	37,85	25,00	28,91	4,91	3,33	0,52	40,22	46,52	6,44	Jones ⁶⁾
34	" " " "	"	38,43	32,37	23,28	2,10	3,82	0,65	52,57	37,81	8,41	
35	" 2 Jahre alt	1858	36,04	28,98	30,40	—	4,58	—	45,31	47,53	7,25	A. Völcker ⁴⁾
36	" (amerikanischer)	1861	27,29	25,87	55,41	6,21	5,22	1,97	35,58	48,70	5,69	
37	" " "	"	33,01	27,37	33,38	2,82	3,39	0,47	40,86	49,83	6,54	A. Völcker ⁴⁾
38	" " "	"	31,01	26,25	30,90	7,43	4,41	1,59	38,05	44,79	6,09	
39	" " "	"	38,24	26,81	26,05	3,64	5,26	1,94	43,41	42,18	6,94	Cladwell ⁷⁾
40	" " "	1877	31,41	27,18	37,88	—	3,53	—	39,63	55,23	6,34	
41	" " "	"	35,68	25,57	35,15	—	3,60	—	39,75	54,65	6,36	Cladwell ⁷⁾
42	" " "	"	35,24	25,85	35,68	—	3,23	—	39,92	55,10	6,39	
43	" " "	"	33,73	26,65	35,57	—	4,05	—	40,21	53,67	6,43	Cladwell ⁷⁾
44	" Faktorei-Käse	"	34,18	28,88	33,92	—	3,02	—	43,88	51,53	7,02	
45	" a. Massachusetts	"	38,50	26,58	31,19	—	3,73	—	43,22	50,72	6,92	Cladwell ⁷⁾
46	" Maine und	"	28,11	28,15	41,03	—	2,71	—	39,16	57,07	5,26	
47	" Wisconsin	"	35,49	26,12	34,05	—	3,34	—	40,49	52,78	6,48	

¹⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

²⁾ Zeitschr. anal. Chem. 1896, 35, 493—502.

³⁾ Duclaux, Le Lait 1887, 282, 296, 300.

⁴⁾ Journ. of Roy. agric. Soc. of England 1862, 23, 170.

⁵⁾ Dasselbst 1861, 22, 39.

⁶⁾ Dasselbst 1858, 19, 420.

⁷⁾ Siehe Schatzmann: Alpenwirthsch. Monatsblätter 1877, 158.

^{*)} Vergl. Anmerkung ^{***)} auf S. 321 bei Gervais-Käse.

^{**)} Duclaux bestimmte in den Käsen noch ferner:

	No. 8	9	10	11	12	Camembert No. 14	15	16	Cantal No. 20	Crescenza No. 21
Füllfähiges Kasein	11,75	11,97	—	—	—	13,96	18,96	20,88	11,09	15,63
Leuliches	5,65	5,19	—	—	—	5,79	3,60	3,41	13,50	3,28
Kasein-Pepton	3,71	6,57	3,18	6,51	8,61	7,98	4,92	3,61	—	0,65

	Ammoniak, freies, für 1 kg	gebundenes, " 1 "	Buttersäure	***) 1 "
	0,89 g 0,36	— 1,6	0,5	— 0,00
	0,56 " 2,95	— 3,3	2,0	— 0,00
	2,00 " 1,10	0,7	0,5	0,4

^{***)} Die Zahlen für die Stickstoff-Substanz sind bei den Völcker'schen Analysen aus dem Stickstoff-Gehalt durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff	Fett	Milchzucker etc.	Asche	Daarls Kochsalz	Stickstoff	Fett		
48	Cheddar-Käse, genussreif.	1885	35,22	33,47	27,91	—	3,40	—	51,67	43,08	8,27	e. Klenze ¹⁾
49	"	1882	30,32	28,18	35,53	1,66	4,31	1,55	40,44	50,99	6,47	A. Völcker ²⁾
50	" Loail-Cheese	"	22,09	26,00	37,22	10,01	4,68	1,86	33,39	47,77	5,39	
51	" englisch ³⁾	1893	36,34	22,98	34,36	—	4,22	—	36,10	53,98	5,78	Griffiths ⁴⁾
52	"	1895	35,41	27,61	31,03	2,00	3,95	—	42,75	48,04	6,84	"
53	" amerikanisch	"	38,00	25,47	30,25	1,43	4,97	—	41,08	48,79	6,57	
54	" consumreif	1893	31,50	26,25	37,00	5,25	—	—	38,32	54,01	6,13	L. L. von Sigke ⁵⁾
55	Cheddar, englisch	1894	33,00	27,40	29,50	—	4,30	—	40,90	44,03	6,54	
56	"	"	35,50	27,80	25,60	—	4,20	—	43,10	39,69	6,90	Wm. Chatterway, T. H. Florman u. C. G. Moore ⁶⁾
57	"	"	33,80	26,70	30,50	—	4,10	—	40,33	46,07	5,45	
58	" Canada	"	33,30	27,60	30,60	—	3,60	—	41,38	45,88	6,62	
	Mittel (22—58)	—	34,06	27,26	31,75	3,36	3,75	1,01	41,33	47,87	6,61	
59	Chester-Käse	1865	30,39	34,75	21,68	6,09	7,09	—	49,92	31,14	7,99	A. Payen ⁷⁾
60	"	"	35,90	25,81	26,30	7,79	4,20	—	40,27	41,03	6,44	
61	" junger	1861	35,96	24,08	29,34	5,17	4,45	1,91	38,20	46,54	6,11	A. Völcker ⁸⁾
62	" alter	"	32,59	26,06	32,51	4,53	4,31	1,59	38,66	47,37	6,19	
	Mittel (59—62)	—	33,96	27,68	27,46	5,89	5,01	1,75	41,91	41,77	6,70	
63	Cheshire-Käse	1894	37,80	25,70	31,30	—	4,20	—	41,32	50,32	6,61	Wm. Chatterway, T. H. Florman u. C. G. Moore ⁶⁾
64	"	"	31,60	26,50	35,30	—	4,40	—	38,74	51,61	6,20	
65	Derby-Käse	1876	31,68	24,50	35,20	4,38	4,24	—	35,86	51,52	5,79	Sheldon ⁹⁾
66	Dunlop-Käse, 1 Jahr alt, 1845 bereitet	1846	38,46	25,87	31,86	—	3,81	—	42,04	51,77	6,74	Jones ¹⁰⁾
67	Edamer Käse, 1. Preis	1872	32,57	23,97	32,19	6,35	4,67	—	35,55	47,74	5,68	
68	" 2. "	"	33,62	23,48	33,99	6,34	2,42	—	35,38	51,21	5,66	Dahl ¹¹⁾
69	" 3. "	"	42,85	19,39	27,33	5,15	5,62	—	33,93	47,82	5,43	
70	"	1873	36,10	29,43	27,54	—	6,93	—	46,06	43,10	7,37	J. Moser ¹²⁾
71	" handelsreif	1885	41,88	29,47	24,05	—	4,60	—	50,71	41,38	8,11	e. Klenze ¹³⁾
72	"	1887	33,20	29,60	28,00	2,60	6,60	3,30	44,31	41,92	7,09	A. Mayer ¹⁴⁾
73	" amerikanische	1895	36,28	24,06	30,26	4,50	4,90	—	37,76	47,49	6,04	"
	Mittel (67—73)	—	36,64	25,68	29,03	3,54	5,11	—	40,53	45,81	6,48	

¹⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.²⁾ Milchztg. 1882, II, 439.³⁾ Molkereiztg. 1893, 50. Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1893, 8, 367.⁴⁾ Nach Untersuchungen des chemischen Bureaus des Ackerhandelsdepartements vom Jahre 1895 aus Jahresbericht des Ackerbausekretärs in Washington. Milchztg. 1896, 25, 541.⁵⁾ Journ. amer. chem. Soc. 1893, 15, 605—610. Chem. Centrbl. 1894 I, 295.⁶⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.⁷⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. (2) III, 232.⁸⁾ Journ. of Roy. agric. Soc. of England 1862, 22, 39.⁹⁾ Prize Essay on cheesemaking etc. Newcastle under-Lyme 1876, 7.¹⁰⁾ Journ. of the Royal agric. Society of England 1858, 19, 420.¹¹⁾ Milchztg. 1872, I, 210.¹²⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 291. Diese Analyse rührt vermuthlich von A. Payen her.¹³⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.¹⁴⁾ Ebendort 1887, 16, 87.¹⁵⁾ In Wasser löslich 2,10 %.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	
74	Cacio cavallo aus frischer Kuhmilch	1892	19,76	37,83 ¹⁾	36,71	—	5,60	3,26	47,15	45,74	G. Sartori ²⁾
75	desgl. aus einem Gemisch von centrifugierter Kuhmilch u. frischer Schafmilch	"	22,09	36,06 ²⁾	35,90	—	5,80	3,16	46,28	46,08	
76	Cacio cavallo ³⁾ (der Edamer Siciliens)	1893	23,68	23,63 ⁴⁾	29,25	1,73	7,63	3,39	30,96	38,33	Spica und Blasi ⁵⁾
77	Incanestrato ⁶⁾	"	29,07	23,71 ⁴⁾	30,09	1,55	9,46	5,04	33,43	42,43	
78	Emmentaler, 1. Preis	1867	37,44	30,64	28,54	—	3,38	—	48,98	45,62	O. Lindt und C. Müller ⁷⁾
79	" 2. "	"	36,70	30,44	28,98	—	3,88	—	48,09	45,78	
80	" 3. "	"	34,92	31,26	29,88	—	3,94	—	48,03	45,91	J. Moser ⁸⁾
81	" nicht prämiert .	1866	31,78	31,84	31,74	—	4,70	—	46,67	46,53	
82	" 1873? 1. Preis	—	24,17	37,51	33,37	—	4,95	—	49,47	44,01	Hornig ⁹⁾
83	" I. 1873	1873	35,14	30,86	31,00	—	4,00	—	47,58	47,80	
84	" II. —	—	35,20	36,81	23,59	—	4,40	—	56,81	36,40	v. Klenze ¹⁰⁾
85	"	1869	33,53	29,99	30,29	0,31	5,88	—	45,12	45,57	
86	" echt, genussreif .	1885	35,18	32,23	27,99	—	4,60	—	49,72	43,18	
87	" Allgäuer E. desgl. "	"	37,46	32,33	25,41	—	4,80	—	51,69	40,63	

¹⁾ Staz. sperim. agrar. Ital. 1892, 22, 337. Milchztg. 1892, 21, 823.

²⁾ Staz. sperim. agrar. Ital. 23, 133—135.

³⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 354 u. 355.

⁴⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 291. Diese Analyse rührt vermutlich von A. Payen her.

⁵⁾ Beiträge zur Geschichte, Technik und Statistik der Käseerei. Wien 1869, 40.

⁶⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.

⁷⁾ Das Rohprotein bestand aus:

	Protein	Ammoniak-Stickstoff	Amid-Stickstoff
I. Cacio cavallo aus Kuhmilch	34,13 %	0,062 %	0,665 %
II. " aus Kuh- und Schafmilch	32,57 "	0,050 "	0,609 "

Die Reichert-Meißel'sche Zahl betrug bei I. 25,30, bei II. 28,71.

⁸⁾ Zur Herstellung des Incanestrato werden Morgen- und Abendmilch von gleicher Temperatur in ein hölzernes oder kupfernes Gefäß filtriert; auf je 1 l Milch wird 1 g Lab (Ziegen- oder Schafmilch) zugefügt, wodurch nach $\frac{1}{4}$ Stunde die Gerinnung eintreten soll. Zu der durchgeseihten Masse wird etwa 2 % der Milchmenge an Wasser zugegeben. Nach 5 Minuten langem Absetzen wird der Käsestoff in zylindrischen Körben gesammelt, durch diese die Molken filtriert und der Käsestoff mit den Händen zusammengedrückt; zuweilen wird er dann noch in einem Holzgefäß 2—3 Tage aufbewahrt, wodurch er einen bestimmten Säuregrad erlangt; sodann wird er in Molken $\frac{1}{4}$ Stunde lang gekocht, im geflochtenen Korb gepresst und gesalzen. Der so hergestellte Incanestrato ist der sog. gekochte. Eine andere Art ist der nur in der Gegend von Messina vorkommende „Majocchino“, der aus Kuh-, Ziegen- und Schafmilch bereitet und nach dem Kochen noch 4 Wochen lang mit Salz behandelt und mit Olivenöl stets feucht gehalten wird. Die Käse erhalten aromatische Zusätze von Safran, Pfeffer oder Gewürznelken. Der Cacio cavallo, der „Edamer Italiens“, wird aus Kuhmilch allein oder unter Zusatz von Ziegen- und Schafmilch zunächst wie der Incanestrato hergestellt, nur wird derselbe statt in einem Korb in einem Holzgefäß mit den Händen gepresst und 2 Tage lang der Ruhe überlassen, hierauf wird er in warme Molken getaucht, in 1 cm breite Streifen geschnitten und diese wieder zusammengeknetet. Diese Procedur wird am 2. u. 3. Tage wiederholt. Der Käse wird dann in Stücke gepresst, die 1—2 oder 5 kg schwer sind und in Salzlake getaucht bleiben, bis sie genügend hart geworden sind. Die obigen Analysen sind Mittel aus 23 sicilianischen Käsesorten.

⁹⁾ Verf. fanden ferner:

	Gesamt-Stickstoff	Eiweiß-Stickstoff	Amid-Stickstoff	Ammoniak-Stickstoff	Phosphorsäure
Cacio cavallo	4,87 %	3,78 %	0,99 %	0,10 %	1,28 %
Incanestrato	5,06 "	3,71 "	1,17 "	0,09 "	1,20 "

¹⁰⁾ Musso, Menozzi und Bignamini (vergl. Giov. Musso: Il Cacio, Tecnologia, Chimica etc. Roma 1887, 53) bestimmten in 2 Sorten Emmentaler-Käse die einzelnen Stickstoffverbindungen mit folgendem Resultat:

No.	Wasser %	Kasein %	Albumin %	Pepton %	Amide %	Ammoniak %	Fett %	Asche %
1	37,59	20,38	0,63	0,75	4,20	0,11	31,47	4,15
2	41,22	21,90	0,55	0,74	3,79	0,11	26,53	4,58

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett		
88	Emmenthaler, völlig reif	1886	35,22	23,25 ^{*)}	32,95	2,90	5,68	3,08	35,89	50,86	5,74	E. Schulze u. F. Reuter ^{*)}
89	" fast völlig reif	"	30,49	25,31 ^{*)}	34,70	4,06	5,44	2,16	36,41	49,92	5,83	
90	" nicht völlig	"	35,93	24,37 ^{*)}	29,71	3,17	6,82	4,22	37,72	46,37	6,04	
91	" ausgereift	"	36,54	27,75 ^{*)}	27,56	3,55	4,60	1,19	43,73	43,43	7,00	
92	" gebläht reif	"	35,30	27,75 ^{*)}	29,38	2,86	4,71	1,65	44,44	45,41	7,11	
93	" frischer Käse	"	40,92	25,00	28,14	3,03	2,91	0,01	42,32	47,63	6,77	
94	" reifer Inneres	"	35,93	24,37	29,71	3,17	6,82	4,22	38,04	46,37	6,09	
95	" Käse Rinde	"	27,06	29,12	32,56	4,23	7,03	2,90	39,91	44,64	6,39	
	Mittel (78—95)	—	34,38	29,49	29,75	1,46	4,92	2,43	45,03	45,35	7,20	
96	Schweizerkäse	1896	33,01	31,70	30,28	—	5,30	1,56	37,32	45,20	7,57	A. Stutzer ^{*)}
97	Gloucester-Käse, 7—8 W. alt	1861	37,20	24,50	27,30	7,44	3,56	0,85	39,01	43,47	6,24	
98	" 5.5 Mon.	"	31,96	29,37	31,37	2,85	4,45	1,35	43,17	46,11	6,91	
99	" 7 Mon.	"	27,68	35,12	30,80	1,46	4,95	1,27	48,56	42,59	7,76	
100	" Doppelt-	"	32,44	32,00	30,17	0,97	4,42	1,41	47,37	44,66	7,58	
101	" " "	"	38,83	26,25	26,77	3,18	4,97	2,04	42,91	43,76	6,87	
102	" " "	"	38,14	26,56	24,16	6,40	4,74	1,28	42,94	39,06	6,87	
103	" " "	"	33,41	27,75	32,69	2,23	3,92	1,01	41,67	49,09	6,68	
104	" " "	"	32,80	—	27,22	—	5,22	1,27	—	40,51	—	
105	" " "	"	40,88	—	22,81	—	4,43	1,45	—	38,58	—	
106	" Einfach-	"	28,10	30,31	33,68	3,72	4,19	1,12	42,02	46,86	6,74	A. Völcker ^{*)}
107	" " "	"	31,96	29,37	31,37	2,85	4,45	1,35	43,17	46,11	6,91	
108	" " "	"	37,20	24,50	27,30	7,44	3,56	0,85	39,01	43,47	6,24	
109	" " "	"	31,81	26,12	29,26	8,63	4,18	1,50	38,30	42,91	6,13	
110	" " "	"	37,91	31,25	22,70	3,30	4,84	1,23	50,33	36,57	8,05	
111	" " "	"	36,50	25,75	28,75	4,68	4,32	1,38	40,55	45,28	6,49	
112	" Doppelt-	1845	35,81	37,96	21,97	—	4,25	—	59,14	34,23	9,46	
113	" Einfach-	1875	32,42	34,46	27,42	—	5,70	1,46	51,00	40,57	8,16	
114	" " "	1876	23,52	31,70	29,94	—	5,48	—	41,45	44,37	7,52	
115	" englisch ^{***)}	1893	34,10	21,68	37,93	—	4,32	—	32,90	57,56	5,26	
116	Double Gloucester	1894	33,10	31,80	23,50	—	5,00	—	47,53	35,11	7,60	Wm. Chittenden, Pharmaz. u. Moore ^{*)}
117	" " "	"	37,40	28,30	28,10	—	4,60	—	45,21	44,89	7,23	
	Mittel (97—117)	—	34,39	28,90	28,30	3,86	4,55	1,30	44,05	43,13	7,05	

*) Preuss. Landw. Jahrbücher 1887, 16, 317.

**) Zeitschr. analyt. Chem. 1896, 35, 493—502.

*) Journ. of the Royal agric. Society of England, 22, 50.

*) Dasselbat 1858, 19, 420.

*) Hassal, Food: Its adulteration and the methods for their detection. London 1876, 450.

*) Molkereiztg. 1893, 50. Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1893, 8, 367.

*) Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

*) Die Stickstoff-Substanz zerfällt in:					
	No. 88	89	90	91	92
Stickstoff	%	%	%	%	%
Eiweissstoffe	18,60	21,73	21,85	24,91	25,76
Mit Stickstoff	2,90	3,25	3,41	3,71	3,59
Eiweissersatzungsprodukte	6,91	6,64	5,46	5,78	6,57
Mit Stickstoff	0,82	0,80	0,58	0,73	0,85
Nuclein (unverdaulich)	—	0,15	0,16	—	0,12

**) Vergl. oben Anmerkung **) auf S. 321 unter Gervais.

***) In Wasser löslich 1,98 %.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff	Fett	Milchzucker etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff	Fett		
118	Gorgonzola-Käse	1873	43,56	24,17	27,95	—	3,32	—	42,82	49,52	6,85	J. Moser ¹⁾
119	"	1869	36,72	25,67	33,69	0,21	3,71	—	40,57	53,24	6,49	Hornig ²⁾
120	"	1885	26,81	33,80	35,29	—	4,10	—	44,81	48,22	7,01	v. Klenze ³⁾
121	"	1887	42,80	23,14	29,70	—	4,36	2,21	40,45	51,92	6,47	Duclaux ⁴⁾
122	" (nicht ganz reif) . . .	"	38,69	22,78	34,07	—	4,46	2,64	37,15	55,56	5,94	
123	"	1894	40,30	27,70	26,10	—	5,30	—	46,40	43,72	7,42	Wm. Chittaway, T. H. Plarman u. C. G. Moore ⁵⁾
124	"	"	33,90	25,80	26,70	—	4,60	—	39,03	40,39	6,24	
	Mittel (118—124)	—	37,54	25,98	30,57	1,65	4,26	2,34	41,60	48,95	6,66	
125	Holländer Käse**)	1865	36,10	30,00	27,50	5,60	0,80	—	46,95	43,04	7,51	A. Payen ⁶⁾
126	"	"	41,41	25,63	25,06	1,69	6,21	—	43,74	42,67	7,00	
127	"	1876	30,10	32,81	27,57	—	6,84	—	46,94	36,58	7,51	Hassall ⁷⁾
128	" (Goudascher)	1887	38,80	24,40	31,20	—	5,60	2,80	39,87	50,98	6,38	A. Meyer ⁸⁾
129	"	1894	37,60	29,10	22,50	—	6,50	—	46,63	36,06	7,46	Wm. Chittaway, T. H. Plarman u. C. G. Moore ⁵⁾
	Mittel (125—129)	—	36,80	28,33	26,46	3,22	5,19	2,60	44,83	41,87	7,17	
130	Mareilles-Käse	1876	40,07	23,31	28,73	1,96	5,93	—	38,90	47,94	6,22	Hornig ²⁾
131	Romadur-Käse oder	1866	56,60	18,76	17,05	0,81	6,78	—	43,23	39,26	6,92	
132	Romadour-	1869	(51,21	33,60	9,16	0,02	6,01	—	66,82	18,77	11,02)	J. Moser ¹⁾
133	"	1878	42,70	26,80	24,29	—	6,24	—	46,77	42,34	7,48	
134	" " genussreif	1885	(43,21	40,13	10,56	—	6,10	—	70,66	18,55	11,31)	v. Klenze ³⁾
	Mittel (131, 133)	—	49,65	22,78	20,66	0,40	6,51	—	45,24	41,30	7,24	
135	Fromage de Seeburg***)	1892	36,68	24,38	30,68	—	5,27	—	39,13	48,45	6,26	A. Stütz ⁹⁾
136	Rottenburger Schlosskäse	1885	45,92	22,01	27,17	—	4,90	—	40,70	50,24	6,53	v. Klenze ³⁾

¹⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 291. Diese Analyse rührt vermuthlich von A. Payen her.

²⁾ Beiträge zur Geschichte, Technik und Statistik der Käseerei. Wien 1869, 40.

³⁾ Milchztg. 1885, 14, 389.

⁴⁾ Duclaux, Le Lait 1887, 304.

⁵⁾ Analyst 1894, 19, 145—147; Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

⁶⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. [2] 3, 332.

⁷⁾ Hassall, Food: Its adulteration and the methods for their detection. London 1876, 450.

⁸⁾ Milchztg. 1885, 14, 87.

⁹⁾ Erster Bericht der Versuchsanstalt Wien. 1878, Tab. XXXIX.

¹⁰⁾ Zeitschr. Nahrungsmittel-Untersuchung. Hygiene, Waarenkunde 1892, 6, 454.

¹¹⁾ Duclaux bestimmte in den beiden Sorten Gorgonzola-Käse ferner:

No.	121	122
Unlösliches Kasein	10,77	13,22
Lösliches "	12,37	9,56
Kasein-Pepten	11,72	8,50

	für 1 kg	
Ammoniak, freies,	2,00	4,00
" gebundenes, " 1 "	5,10	
Buttersäure " 1 "	1,80	0,70

Musso, Menozzi und Bignamini (vergl. Giov. Musso: Il Cacio, Tecnologia, Chimica etc. Roma 1877, 53)

bestimmen die einzelnen Stickstoffverbindungen in einem Gorgonzola-Käse mit folgendem Ergebnisse:

Wasser	Kasein	Albumin	Pepten	Amido	Ammoniak	Fett	Asche
%	%	%	%	%	%	%	%
32,37	5,66	0,87	1,74	17,52	0,79	37,47	3,38

¹²⁾ Vermuthlich identisch mit „Edamer“ Käse.

¹³⁾ Hergestellt auf den R. v. Klein'schen Gütern.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
	Russischer Käse:											
137	Nach Schweizer Art bereitet	1882	29,80	20,57	37,20	6,74	5,96	2,41	29,30	52,99	4,69	A. Kalantarov ¹⁾
138		"	32,51	26,16	29,68	4,21	7,44	4,78	38,76	43,83	6,20	
139		"	35,44	28,81	28,97	0,57	6,21	3,09	44,63	46,42	7,14	
140		"	34,68	24,15	32,53	3,72	4,92	1,63	36,96	49,80	5,91	
141	"	"	31,26	24,54	32,94	6,90	4,36	1,45	35,70	47,92	5,71	
	Mittel (137—141)	—	32,74	24,85	32,26	4,43	5,78	2,67	37,07	48,19	5,93	
	Englischer Käse:											
142	Leicester ²⁾	1893	34,77	27,86	28,00	—	4,16	—	42,71	42,93	6,83	Griffiths ³⁾
143	Chefir ⁴⁾	"	27,55	31,00	36,00	—	3,24	—	42,79	49,69	6,85	
144	Cotherstone ⁵⁾	"	38,20	23,82	30,25	—	3,92	—	38,54	48,79	6,07	
145	Doset ⁶⁾	"	41,44	22,25	27,56	—	4,51	—	38,00	47,06	6,08	
	Mittel (142—145)	—	35,49	26,13	30,40	4,02	3,96	—	40,51	47,12	6,48	
146	Schwarzenberger Käse	1873	47,20	17,77	29,04	—	5,99	—	33,66	55,00	5,38	J. Moser ⁷⁾
147	" "	1869	(59,25)	24,09	10,44	0,02	6,17	—	59,16	25,64	9,46	Hornig ⁸⁾
	Schwedischer Käse:											
148	Chester v. Rieseberga ⁹⁾	1872	26,80	29,20	37,9	1,70	3,7	—	39,88	51,78	6,38	Aber. Müller ¹⁰⁾
149	Gulhemer.	"	31,90 (31,60 ¹¹⁾)	31,2	—	5,3	—	—	45,82	—	—	
150	Von Flieshut in Småland	"	36,00 (29,80)	31,9	—	2,3	—	—	49,84	—	—	
151	Von Färlöse bei Calmar	"	23,10 (32,2)	39,7	—	5,0	—	—	51,63	—	—	
152	Von Bergquarna	"	33,40 (33,9)	28,2	—	3,5	—	—	42,34	—	—	
153	Nahe an der Rinde 1863	"	31,90 (31,6)	31,2	—	5,3	—	—	45,81	—	—	
154	desgl. 1864	"	30,90 (31,2)	32,7	—	5,2	—	—	47,32	—	—	
155	Käse frisch	"	40,42	24,80	28,00	1,65	5,43	—	41,62	46,99	6,66	
156	desgl. reif, 1 Jahr alt	"	33,12	27,35	31,70	2,96	4,87	—	40,89	47,40	6,54	
157	Schweizer Käse, 1. Preis	1867	29,34	23,20	36,44	6,11	4,78	—	32,83	51,57	5,25	
158	" " 2. "	"	38,64	23,21	29,13	4,36	4,39	—	37,83	47,46	6,08	Dahl ¹²⁾
159	" " 3. "	"	36,02	24,76	32,05	4,59	2,39	—	38,70	50,10	6,19	
	Mittel (148—159)	—	32,54	26,05	32,50	5,06	3,85	—	38,62	48,17	6,19	
160	Bosnischer Trapistenkäse	1892	45,90	20,90 ¹³⁾	26,10	—	4,00	—	38,63	48,24	6,18	L. Adametz ¹⁴⁾
161	Spalen-Käse ¹⁵⁾	1887	28,14	28,24 ¹⁶⁾	33,69	2,55	7,38	4,46	39,30	46,88	6,29	E. Schulze u. Bemerke ¹⁷⁾
162	Vacherin-Käse ¹⁸⁾	"	54,02	17,12 ¹⁹⁾	23,74	2,04	3,08	1,77	37,23	51,63	5,96	

¹⁾ Nach Journ. d. russ. chem. Gesellsch. 1882, I, 155; in Berichte d. deutschen chem. Gesellsch. in Berlin 1882, 1220.

²⁾ Molkereiztg. 1893, 50. Viertel. Nahrungs- u. Genussm. 1893, 8, 367.

³⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 291. Diese Analyse rührt verantheilich von A. Payen her.

⁴⁾ Beiträge zur Geschichte, Technik und Statistik der Käseerei. Wien 1869, 40.

⁵⁾ Landw. Jahrbücher 1872, I, 85.

⁶⁾ Molkereiztg. 1872, I, 210.

⁷⁾ Molkereiztg. 1892, 21, 313.

⁸⁾ Preuss. landw. Jahrbücher 1887, 16, 317.

⁹⁾ In siedendem Wasser waren löslich: Leicester 5,21%, Chefir 2,21%, Cotherstone 3,81%, Doset 4,24%.

¹⁰⁾ Diese Probe ist wohl aus entrahmter Milch gewonnen.

¹¹⁾ Dieser Käse enthält 0,7% Ammoniak.

¹²⁾ Die eingeklammerten Zahlen bedeuten Stickstoff-Substanz + Milchzucker.

¹³⁾ Der Käse enthält 2,4% stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte (als gleiche Theile Leucin u. Tyrosin berechnet).

¹⁴⁾ Die Stickstoff-Substanz zerfällt in:

Stickstoff Eiweissstoffe Eiweisszersetzungserzeugnisse Nuclein

No. 161 26,14% (4,04% Stickstoff) 4,64% (mit 0,48% Stickstoff)

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

" 162 16,18% (2,40% " ") 2,80% (" 0,34% " ")

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
163	Vacherin-Käse	1867	45,87	25,29	27,21	—	1,63	—	46,72	50,27	7,50	O. Lindt und C. Müller ¹⁾
164	Vorarlberger Käse . . .	1876	32,92	25,65	31,99	2,55	6,89	—	38,24	47,69	6,12	
165	" "	"	34,28	28,58	29,49	1,81	5,38	—	43,49	44,87	6,96	W. Engling u. v. Kleuze ²⁾
166	" "	"	35,79	30,32	26,06	2,21	5,62	—	47,22	40,59	7,56	
167	" "	1880	34,48	27,80	31,45	1,95	4,32	—	42,43	48,00	6,79	
	Mittel (164—167)	—	34,37	28,09	29,76	2,13	5,55	—	42,84	45,39	6,85	
	Amerikanische Käse:											Reichert'sche Zahl für 2,5 g Fett
168	Rahmvollkäse	1892	34,88	23,06	35,10	3,00	3,96	1,32	35,41	53,90	5,67	Johnson ³⁾
169	desgl.	"	35,67	24,00	34,74	1,77	3,82	1,19	37,31	54,03	5,97	
170	desgl. alt	"	29,87	28,31	35,62	2,41	3,79	0,99	40,37	50,79	6,46	
171	Pineapple ⁴⁾ gelb, 4 Mon. alt	"	30,95	27,00	33,26	2,16	5,63	2,34	39,12	48,17	6,26	
172	desgl. weiss, 8 Monate alt	"	28,01	27,12	37,25	2,52	5,10	2,14	37,67	51,74	6,03	
173	desgl. gelb, 16 Monate alt	"	25,69	28,81	36,76	2,56	6,18	2,61	38,77	49,47	6,20	
174	desgl. gelb, 5 Jahre alt .	"	11,62	34,45	45,20	2,75	5,88	1,86	58,98	51,14	6,24	
175	Neufchâtelers	"	57,25	15,03	22,30	2,94	2,48	1,42	35,16	46,69	5,63	
176	Brie	"	60,20	15,94	20,96	1,37	1,53	0,40	40,05	52,66	6,41	
177	Alter englischer, imitiert	"	20,74	30,12	42,72	1,27	5,15	1,47	38,00	53,90	6,08	
178	Schweizer	"	33,79	26,12	33,25	1,77	5,07	1,85	39,45	50,22	6,31	—
179	Limburger	"	42,12	23,00	29,40	0,38	5,10	3,51	39,74	50,79	6,36	
180	Käse ähnlich in der Textur wie Pineapple	"	18,66	32,16	41,80	2,24	5,14	1,38	39,54	51,39	6,33	14,6
	Mittel (168—180)	—	33,03	25,74	34,26	2,44	4,53	1,73	38,43	51,15	7,26	
	Fettkäse, Mittel	—	36,31	26,21	29,53	3,39	4,56	1,80	41,28	46,37	6,60	
178 Analysen	Schwankungen	—	11,62—56,75	18,06—37,67	19,83—37,66	0,21—8,18	0,81—8,50	0,01—4,53	29,30—59,14	31,14—59,85	4,69—9,46	

Die Schwankungszahlen für die festen Bestandtheile sind auf den mittleren Wassergehalt von 36,31% bezogen.

3. Halbfetter Käse.

Unter „halbfetter Käse“ ist der aus theilweise entrahmter Milch (meistens zwölfstündiger Abendrahmmilch) bzw. aus einem Gemisch von Magermilch und Vollmilch (meistens Morgenmilch) dargestellte Käse zu verstehen.

1	Gruyère ¹⁾	1865	40,00	31,25	24,00	1,75	3,00	—	52,08	40,00	8,33	A. Pagen ²⁾
2	Gruyère	"	32,05	34,25	28,40	0,51	4,79	—	50,40	41,73	8,06	
3	Gruyère oder Grivère ³⁾	1. Preis frisch	1867	34,57	32,51	29,12	—	3,80	49,67	46,04	7,75	v. Lindt u. C. Müller ⁴⁾
4	"	2. " "	"	35,74	29,95	30,64	—	3,67	46,61	47,68	7,46	

¹⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 354 u. 355.

²⁾ Bericht d. landw. Versuchstation Tisigro 1875—76, Bregenz 1887, 12 und Milchztg. 1880, 9, 597.

³⁾ Connecticut Experiment Station. Report 1892, 156. Centrbl. Agrik.-Chemie 1894, 23, 203.

⁴⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. Chim. [2] 3, 232.

⁵⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 254.

⁶⁾ Der Pineapple (Pichtenzapfen) ist eine der ältesten Käsearten in den Vereinigten Staaten und hat grossen Ruf. Generali del Caseificio. Roma 1887, 55) bestimmten in 4 Sorten Gruyère-Käse (Cacio grivère) die einzelnen Stickstoffverbindungen mit folgendem Resultat:

No.	Wasser %	Kasein %	Albumin %	Pepton %	Amide %	Ammoniak %	Fett %	Asche %
1	20,11	27,79	0,61	0,45	8,02	0,17	37,70	5,32
2	29,02	21,95	0,62	0,88	8,68	0,26	33,43	5,88
3	20,43	24,41	0,70	1,13	7,04	0,40	39,75	5,84
4	35,66	18,13	0,60	1,10	6,47	0,22	31,48	5,95
Mittel	26,31	20,57	0,63	0,89	7,80	0,26	35,59	5,77

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zuck. etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett		
5	Greizerer ¹⁾	1887	40,61	26,1	26,59	1,94	4,68	2,10	44,08	44,75	7,05	E. Schulze ¹⁾
6	Gruyère	"	36,00	30,84 ²⁾	29,29	—	3,87	0,57	48,19	45,77	7,71	Ducoux ³⁾
7	desgl. amerikanisch	1895	34,87	25,87	29,91	5,51	3,84	—	39,70	45,89	6,35	***)
8	"	1894	38,20	28,60	31,30	—	4,70	—	46,25	50,65	7,40	Wm. Chittaway, T. H. Farman u. C. G. Moore ⁴⁾
9	"	"	35,70	31,80	28,70	—	3,70	—	49,46	44,63	7,92	
	Mittel (1—9)	—	36,41	30,14	28,72	0,74	3,99	1,23	47,39	45,17	7,58	
10	Grana aus Reggio ⁵⁾	1887	32,56	32,27**)	21,75	8,35	5,07	1,65	47,85	32,25	7,66	Ducoux ³⁾
11	" " Lombardia	"	30,09	38,42**)	26,04	—	5,45	1,76	54,26	37,25	8,79	
12	Grana, 16 Stunden alt	1894	48,37	31,88**)	13,24	1,50	3,71	—	61,75	25,59	9,88	Nicola Roccia- chio ⁶⁾
	Mittel (10—12)	—	37,01	34,41	19,97	3,87	4,74	1,71	54,62	31,70	8,74	
13	Holländer, aus	1887	35,37	34,12**)	24,72	—	5,79	2,89	52,79	38,25	8,45	
14	bezw. nach Frank-	"	32,74	36,04	24,63	—	6,69	3,61	53,58	36,62	8,57	
15	reich	"	44,43	25,59	23,75	—	6,13	3,84	46,05	42,74	7,37	Ducoux ³⁾
16	Holländer Art aus	"	38,94	31,66	24,03	—	5,37	2,30	51,85	39,35	8,30	
17	dargestellt Holland	"	35,08	34,64	25,90	—	4,38	1,58	53,36	39,90	8,54	
	Mittel (13—17)	—	37,35	32,40	24,61	—	5,65	2,84	51,75	39,32	8,28	
18	Vorarlberger Battelmattkäse	1876	44,24	21,22	29,42	2,25	2,86	—	38,06	52,96	6,04	
19		"	47,98	22,75	24,11	2,45	2,71	—	43,73	46,85	7,00	
20		"	49,27	23,20	22,04	2,35	3,14	—	45,73	43,45	7,32	
21		"	47,67	24,48	23,58	3,35	2,92	—	46,78	45,06	7,48	W. Engling u. v. Kienle ⁷⁾
22		"	50,53	23,11	20,52	3,08	2,76	—	46,71	41,48	7,45	
23		"	46,54	23,48	24,84	2,28	2,86	—	43,91	46,46	7,03	
24		"	47,73	22,70	24,08	2,62	2,87	—	43,43	46,07	6,95	
	Mittel (18—24)	—	47,71	22,99	24,08	2,35	2,87	—	43,88	45,97	7,02	
25	Aus Westfalen	1879	46,08	26,77	19,02	1,02	6,45	—	49,65	35,27	7,94	J. König ⁸⁾
	Halbfetter Käse, Gesamt-Mittel	—	40,22	29,07	24,41	2,06	4,24	1,81	48,63	40,84	7,78	

¹⁾ Preuss. landw. Jahrbücher 1887, 16, 314.

²⁾ Ducoux, Le Lait 1887, 307 u. 310.

³⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

⁴⁾ Centrbl. Bakter. Par. 1894, 15, No. 17. Milchztg. 1894, 23, 363.

⁵⁾ Milchztg. 1877 u. 1878, No. 11 u. 12.

⁶⁾ Original-Mittheilung.

⁷⁾ Die Stickstoff-Substanz zerfällt in: 22,61 % Eiweissstoffe (3,55 % Stickstoff), 5,34 % Eiweissersatzungsprodukte (mit 0,64 % Stickstoff), 0,18 % Nuclein.

⁸⁾ Ducoux bestimmte in den Käsesorten ferner:

	Gruyère No. 6	Grana No. 10	No. 11	Holländer No. 13	No. 14	No. 15	No. 16	No. 17
Unlösliches Kasein	24,54	25,56	23,70	22,38	25,87	—	—	24,40
Lösliches	6,30	16,71	14,72	11,74	10,17	—	—	10,24
Kasein-Pepton (filtrirbares Kasein)	4,33	18,50	15,80	8,43	9,78	6,07	7,57	10,24
Ammoniak, freies, für 1 kg	0,29	0,02	0,03	0	0	0	0	0,03
gebundenes, " 1 "	0,58	1,50	2,50	0,95	0,61	0,43	5,70	6,20
Buttersäure	2,50	2,00	1,80	1,50	1,50	1,20	1,20	5,10

***) Vergl. Anmerkung *) S. 326 unter Cheddarkäse.

⁹⁾ Giov. Musso, Menozzi und Bignamini (vergl. Giov. Musso: Il Caseo, Tecnologia, Chimica e Microbiologia Generale del Caseificio. Roma 1887, 53) bestimmten in dem Grana-Käse die einzelnen Stickstoffverbindungen mit folgendem Ergebnisse:

	Wasser	Kasein	Albumin	Pepton	Amide	Ammoniak	Fett	Asche
Grana No. 1	27,96	27,84	1,20	0,64	17,38	0,20	18,67	5,75
" 2	40,78	19,04	0,50	0,46	18,00	0,33	16,88	4,36

¹⁰⁾ Der Käse enthält ausserdem 1,02 % Amide und 0,31 % Milchsäure.

4. Magerkäse.

Aus ganz oder theilweise entrahmter Milch dargestellter Käse, bei welchem der Fettgehalt bedeutend niedriger als der Kaseingehalt ist.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Analytiker	
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz		
	Alter, Monate												
1	Dänischer Exportkäse	7 —	1878	43,87	34,00	10,74	5,73	3,96	1,70	60,57	19,13	9,69	V. Storch ¹⁾
2		5 1. Prämie . .	"	38,78	30,31	23,70	2,65	3,45	1,11	49,51	38,71	7,92	
3		4 1. " . .	"	46,05	30,25	13,46	5,36	3,58	1,30	56,07	24,95	8,97	
4		4 2. " . .	"	47,76	30,32	9,34	5,90	4,17	2,51	58,04	17,88	9,29	
5		4 1. " . .	"	46,33	30,56	12,55	5,15	3,33	2,08	56,94	23,38	9,11	
6		3 1/2 talgig . .	"	46,66	27,69	15,04	5,48	3,44	1,69	51,91	28,20	9,11	
7		3 1/2 2. Prämie . .	"	48,10	29,06	11,88	5,03	3,60	2,33	55,99	22,90	8,96	
8		3 1/2 1. " . .	"	46,47	27,75	14,27	5,51	3,45	2,55	51,84	26,66	8,29	
9		3 schlechte Beschaffenheit .	"	49,88	30,19	9,73	5,32	3,65	1,33	60,24	19,41	9,64	
	Mittel (1—9)	—	45,99	30,01	13,41	5,10	3,63	1,86	55,55	24,58	8,88		
10	Engadiner (Ober-) ^{*)} . .	1867	47,30	36,34	11,40	—	4,96	—	68,96	21,44	11,03	O. Lindt und C. Müller ²⁾	
11	Simmenthaler ^{*)}	"	41,02	48,37	8,43	—	2,18	—	82,01	14,29	13,12		
12	desgl.	"	43,67	49,16	3,40	—	3,77	—	87,27	6,04	13,96		
	Mittel (10—12)	—	43,99	44,62	7,74	—	3,64	—	79,66	13,92	12,74		
13	Kümmelkäse, 2. Preis . .	1866	47,12	31,61	7,36	10,43	3,42	—	59,77	13,92	9,56	Dahl ³⁾	
14		" 3. "	"	40,54	31,61	16,87	8,13	3,17	—	52,62	28,36		8,42
	Mittel (13—14)	—	43,83	31,45	12,11	9,32	3,29	—	56,00	21,14	8,96		
15	Nügelkäse oder Nügelost .	1866	48,51	32,72	6,13	8,59	3,79	—	63,55	11,91	10,17	derselbe ⁴⁾	
16		desgl. aus Schweden	aus 43,87	28,93	15,89	6,47	4,84	—	51,54	28,31	8,25		
17			Führer 45,39	33,12	9,97	6,39	5,13	—	60,65	18,25	9,70	A. Völcker ⁴⁾	
18			Zahl. 1870	42,44	42,12	3,36	9,85	2,22	—	73,18	5,84		11,78
	Mittel (15—18)	—	45,05	34,17	8,84	7,95	3,99	—	62,19	16,08	9,95		
19	Blauer Dorsetkäse ^{**)} . .	1892	41,55	—	8,76	—	5,60	2,93	—	14,99	—	B. Vieth ⁵⁾	
20	Magerkäse aus Amerika	1	"	52,15	26,31	15,35	2,04	4,15	1,70	54,98	32,12	8,80	Johnson ⁶⁾
21		2	"	53,08	26,81	13,80	2,00	4,31	1,22	57,10	29,41	9,14	

^{*)} Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 1879, 166—232. Aus dem Stickstoff-Gehalt durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

^{**)} Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1867, 354.

^{*)} Milchztg. 1872, I, 310.

^{*)} Journ. of the Roy. Agric. Soc. of England 1879, 2, 333.

^{*)} Milchztg. 1892, 21, 191.

^{*)} Connecticut Experiment Station Report 1892, 156. Centrbl. Agrik.-Chem. 1894, 23, 203.

^{*)} Diese Käsearten sind als „halbfette“ in den Originalen aufgeführt; wegen des sehr niedrigen Fettgehaltes gegenüber dem Kasein rechne ich sie zu den Magerkäsen.

^{*)} Die Bezeichnung „blau“ bezieht sich auf die von Schimmelpilzen gebildeten Adern, welche eine charakteristische Eigenschaft dieses Käses bilden. Der Käse war brüchig und von recht angenehmem, pikantem Geschmack.

^{*)} Die Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett) betrug bei 1: 10,5, bei 2: 14,7.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %		
22	Parmesankäse	1865	27,60	43,75	16,00	6,95	5,70	—	60,43	22,10	9,81	A. Pagen ¹⁾
23	"	"	30,31	34,25	21,68	6,87	7,09	—	49,15	31,11	7,86	
24	"	1873	34,57	35,15	24,05	—	6,23	—	53,72	36,76	8,60	J. Moser ²⁾
25	"	1878	31,16	48,25	12,58	—	6,99	—	70,09	18,27	11,21	
26	"	"	33,27	41,00	17,17	2,25	6,31	—	61,44	25,73	9,83	L. Monetti u. G. Mazze ³⁾
27	"	"	30,20	44,56	18,65	0,10	6,49	—	63,96	26,72	12,21	
28	"	"	32,01	41,44	19,97	0,84	5,74	—	60,95	29,37	9,75	
29	"	"	33,90	41,50	21,28	—	7,18	—	62,78	32,19	10,05	
30	"	"	30,43	37,62	23,42	3,33	5,20	—	54,07	33,66	8,65	
31	"	"	36,11	42,00	17,12	—	6,39	—	65,74	26,79	10,52	
32	"	"	30,24	43,56	22,83	—	6,05	—	62,44	32,73	9,99	
33	" amerikanischer	1895	31,34	41,99	19,22	1,20	6,25	—	61,16	27,99	9,79	Wm. Chatterway, T. H. Florsman u. C. G. Moor ⁴⁾
34	"	1894	32,50	43,60	17,10	—	6,20	—	64,59	25,33	10,33	
Mittel (22—34)			31,82	40,56	19,34	1,99	6,29	—	60,96	28,36	9,75	
35	Vorarlberger (aus Feldkirch . . . aus Dornbirn . . . desgl. —)	1877	48,75	34,48	5,28	7,21	4,28	—	67,28	10,30	10,76	W. Engling u. v. Klenze ⁵⁾
36		"	56,85	29,10	3,84	5,25	4,96	—	67,44	8,90	10,79	
37		"	44,65	40,11	2,82	7,02	5,42	—	72,47	5,13	11,59	
38		"	49,03	33,63	10,08	3,43	3,82	—	66,00	19,77	10,56	
39	Mittel v. 4 Analysen	"	50,20	31,08	12,17	2,76	3,79	—	62,41	24,44	9,99	
Mittel (35—39)			49,89	33,68	6,84	5,14	4,45	—	67,21	13,71	10,76	
40	Aus Westfalen	1877	46,56	29,85	11,16	7,98	3,45	—	55,86	20,88	8,94	J. Ködy u. C. Kirsch ⁶⁾
41	Schweizer Magerkäse . .	1885	50,41	41,90	3,99	—	3,70	—	84,49	8,05	13,52	
42	Aus England	1882	38,39	28,37	23,21	6,80	3,23	1,33	46,02	37,67	7,36	A. Volker ⁷⁾
43												
44	Leydener Magerkäse . .	1887	46,90	35,90	11,00	1,00	5,20	1,40	67,61	20,72	10,82	J. Moser ⁸⁾
45	Aus Separator-Magermilch (Backsteinkäse)	1884	73,12	19,84	2,76	2,17	2,11	—	73,81	10,27	10,27	
46	Magerer Backsteinkäse .	1880	61,04	23,85	6,80	3,48	4,83	—	61,22	17,48	9,79	W. Fleischmann ⁹⁾

¹⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. [2] 3, 232.²⁾ Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1873/74, 2, 291.³⁾ Landw. Versuchstationen 1878, 21, 211.⁴⁾ Vergl. oben unter Cheddarkäse, Anmerkung ¹⁾ S. 326.⁵⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.⁶⁾ Milchztg. 1877 und Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1878, 509.⁷⁾ Chem. u. techn. Untersuchungen d. Versuchstation Münster 1878, 107.⁸⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.⁹⁾ Ebendort 1882, II, 439.¹⁰⁾ Ebendort 1887, 16, 87.¹¹⁾ Bericht d. Milchw. Versuchstation Raden für 1880, 34 und 1884, 30.

¹²⁾ Aus dem Stickstoff-Gehalt nach Abzug des Ammoniak-Stickstoffs durch Multiplikation mit 6,23 von uns berechnet. Die Proben enthielten:

No.	25	26	27	28	29	30	31
-----	----	----	----	----	----	----	----

Ammoniak	0,142	0,388	0,146	0,286	0,316	0,134	0,248 %
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz							In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zuck. etc.	Milch-säure	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
47	Sog. „Schwedischer Käse“ aus Italien ¹⁾ (aus centrifugirter Milch) . . .	1893	41,63	43,95	5,87	—	—	8,55	8,10	75,30	16,91	12,05	L. Carcano ²⁾
48	Gislev-Käse ³⁾ (von Gislev bei Kvædrup in Dänemark)	1890	49,22	41,53	2,96	—	—	—	—	81,78	5,83	13,08	B. Böggild ⁴⁾
	Magerkäse { Mittel	—	43,06	35,59	12,45	4,22	—	4,68	2,39	62,51	21,86	10,00	
	{ Schwankungen	—	30,24-73,12	27,20-51,69	2,92-21,45	0,08-11,22	—	2,11-7,34	—	46,02-87,27	5,13-37,67	7,36-13,96	

Die Schwankungszahlen für die festen Bestandtheile sind auf den mittleren Wassergehalt von 43,06% bezogen.

5. Sauermilchkäse.

(Auch Quargel, Quark, Käsematte oder Topfen oder Ziger genannt.)

Aus saurer abgerahmter Milch für sich allein oder auch unter Zusatz von saurer Buttermilch durch Erwärmen hergestellt. Zur Bereitung des Zigers verwendet man auch süsse Molken.

1	Quargeln aus Olmütz	1869	44,54	41,04	3,37	0,16	—	10,89	—	74,00	6,08	11,84	Hornig ¹⁾
2		1873	52,49	38,02	7,70	—	—	1,79	—	80,03	16,21	12,80	Sachlet ²⁾
	Mittel (1—2)	—	48,51	39,53	5,53	0,09	—	6,34	—	77,01	11,14	12,32	
3	Sauermilchquarg aus Sachsen, frisch . . .	1879	76,39	17,17	3,07	2,33	—	1,04	—	72,72	13,00	11,64	J. König ³⁾
4	Topfenkäse	1896	72,44	16,91	6,22	1,99	1,08	1,36	—	61,36	22,57	9,82	Vers.-Stat. Münster ⁴⁾
5	Quarg oder Topfen aus München ⁵⁾	1879	60,27	24,84	7,33	3,54	—	4,02	—	62,52	18,45	10,00	M. Rubner ⁶⁾
6	Vorarlberger Ziger	1877	68,51	22,13	3,15	3,90	—	2,31	—	70,28	10,00	11,24	W. Engling und v. Klenze ⁷⁾
7		„	74,74	14,99	4,33	3,93	—	2,02	—	59,34	17,14	9,49	
8		1880	68,47	18,72	5,22	3,97	—	3,62	—	59,37	16,56	9,50	
9	Vorarlberger Sauerkäse aussen . . .	1885	56,61	36,42	4,48	—	—	2,49	—	83,94	10,32	13,43	v. Klenze ⁸⁾
10	innen	„	50,58	42,37	4,56	—	—	2,49	—	85,73	9,23	13,71	
	Mittel (6—10)	—	63,78	25,98	4,58	3,07	—	2,59	—	71,73	12,65	11,47	
11	Ziger	1885	31,00	64,62	3,48	—	—	0,90	—	93,65	5,04	14,98	F. Schlotz u. Bencke ⁹⁾
12	Schabziger	„	38,17	45,73	12,27	—	—	3,83	—	73,96	19,84	11,82	
13	desgl. Glarner ¹⁰⁾ (grüner Kräuterkäse)	„	47,02	37,06	6,60	—	—	10,10	7,53	69,95	12,46	11,19	

¹⁾ Staz. sperim. agrar. Ital. 1893, 24, 5—8. Centrbl. Agrik.-Chem. 1891, 23, 208.

²⁾ Ugeskrift for Landmæn 1890, 2, No. 20, 14/11 90. Centrbl. Agrik.-Chem. 1891, 20, 287.

³⁾ Beiträge zur Geschichte, Technik und Statistik der Käseerei 1869, 30.

⁴⁾ Erster Bericht der Versuchstation Wien von 1870—75. Wien 1878. XXIX.

⁵⁾ Original-Mittheilung.

⁶⁾ Zeitschr. f. Biologie 1879, 496.

⁷⁾ Milchztg. 1877 u. 1880, 9, 597; siehe auch Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1878, 7, 508.

⁸⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.

⁹⁾ Preuss. landw. Jahrbücher 1887, 16, 317.

¹⁰⁾ Der Käse hatte einen etwas pikanten Geschmack und körnige Beschaffenheit; er enthielt: 34,29% albuminoide Substanzen, 0,47% Zersetzungsprodukte der Albuminoide, 0,20% Nuclein, 0,21% Ammoniak bei 6,12% Gesamt-Stickstoff, 5,22% Eiweiss-Stickstoff, 0,98% Zersetzungsprodukte des Stickstoffs, 0,17% Ammoniak-Stickstoff. Der Käse enthielt ferner 0,48% freie Fettsäuren.

¹¹⁾ Der Gislevkäse ist aus sehr stark entrahmter Magermilch mit nur 0,15% Fett hergestellt.

¹²⁾ Die Laibchen wogen 26—28 g.

¹³⁾ Aus entrahmter Milch unter Zusatz von Buttermilch hergestellt.

¹⁴⁾ Die Stickstoff-Substanz zerfällt in: 31,76% Eiweissstoffe (mit 5,05% Stickstoff), 7,53% Eiweisszersetzung-Produkte (mit 0,85% Stickstoff), 0,85% Nuclein + Rohfaser des Zigerklee.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz							In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker etc. %	Sonstige stickstofffreie Stoffe %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	
14	Mainzer saurer Handkäse	1885	53,74	37,33	5,55	—	—	3,38	—	80,70	12,00	e. Klenz ¹⁾
15	Kirgisischer	"	8,59	78,68	1,31	1,93	—	9,46	8,01	83,89	1,43	W. Leutner ²⁾
16	Sauerkäse, Kratt ³⁾	"	10,14	69,74	1,45	0,81	—	17,84	13,34	77,61	1,63	W. Leutner ²⁾
Gesamtmittel (ausschl. 15 und 16)			52,36	36,64	6,03	0,90	—	4,07	3,03	76,91	12,66	12,30

6. Molkenkäse. (Mysost)

Durch vorsichtiges Eindampfen der durchgeseihten Molken (vorwiegend) in Skandinavien gewonnen.

1	Schwedischer Molkenkäse	aus Kuhmilch	1866	23,98	8,88	9,63	43,31	8,82	5,28	—	11,62	12,67	1,87	Dahl ¹⁾
2			"	18,58	7,17	15,64	41,73	11,30	5,58	—	8,77	19,33	1,41	
3			"	26,03	6,77	16,21	33,98	10,92	6,09	—	9,15	21,91	1,46	
4		aus Ziegenmilch	"	21,07	10,57	20,36	39,03	5,69	3,28	—	13,39	25,79	2,14	A. Fischer ²⁾
5			"	25,29	9,10	20,98	29,21	1,54	3,88	—	12,18	28,08	1,95	
6			"	26,49	10,78	14,76	36,38	7,14	4,45	—	14,66	20,08	2,35	
7			1870	24,21	9,06	20,80	41,01	—	4,92	—	11,95	27,44	1,91	Fr. Wernstedt ³⁾
		Mittel	—	23,66	8,90	16,91	37,81	7,94	4,78	—	11,68	22,19	1,87	
							Milch-säure **)							
8	Schwedisch. Molkenkäse aus centrifugirter Kuhmilch (bei No. 6 ist auf 6 Theil Magermilch 1 Theil Buttermilch zugesetzt)	1	1885	24,37	8,51	0,11	0,16	60,96	5,89	—	11,25	0,15	1,80	Fr. Wernstedt ³⁾
9		2	"	28,98	8,26	0,07	0,11	56,27	6,31	—	11,63	0,10	1,86	
10		3	"	33,60	7,69	1,53	0,14	51,16	5,88	—	11,58	2,30	1,85	
11		4	"	29,80	9,03	1,79	0,13	53,34	5,91	—	12,86	2,55	2,06	
12		5	"	30,32	7,76	0,42	0,02	55,00	6,38	—	11,14	0,60	1,78	
13		6	"	38,80	8,94	1,59	0,03	45,98	5,48	—	14,44	2,57	2,31	
		Mittel	—	30,85	8,37	0,92	0,10	53,79	5,98	—	12,25	1,33	1,96	Fr. Wernstedt ³⁾
14	Schwedischer Molkenkäse aus vor dem Stand abgerahmter Milch	1	1885	32,35	9,19	2,28	0,11	49,79	6,29	—	13,58	3,37	2,17	
15		2	"	31,88	8,57	1,09	0,42	52,15	5,89	—	12,58	1,60	2,01	
16		3	"	31,46	8,98	1,37	0,10	52,31	5,78	—	13,10	2,00	2,10	
17		4	"	28,29	7,31	0,24	—	58,50	5,66	—	10,18	—	1,63	
18		5	"	30,62	8,56	3,50	0,10	51,77	5,45	—	12,34	5,05	1,97	
19		6	"	31,96	7,72	2,61	0,10	51,76	5,85	—	11,35	3,84	1,82	
20		7	"	31,85	7,81	1,37	0,08	53,06	5,83	—	11,46	2,00	1,83	
21		8	"	24,62	6,95	2,57	0,02	59,70	6,14	—	9,22	3,41	1,48	
		Mittel	—	30,38	8,14	2,11	0,13	53,63	5,86	—	11,69	3,03	1,87	

¹⁾ Milchztg. 1885, 14, 369.²⁾ Chem.-Ztg. 1885, 9, 254.³⁾ Milchztg. 1872, 1, 210.

Für die nicht bestimmten Bestandtheile der Käse und für angegebene Verluste sind hier Rubriken nicht aufgeführt.

⁴⁾ Journ. of the Roy. agric. Soc. of England 1870, 2, 533.⁵⁾ Aarsberetning om de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Freneme Christiania 1885, 78—83. Centrbl. Agric.-Chem. 1890, 19, 420—421.⁶⁾ Der Kritt wird aus sauer gewordener, abgerahmter Kuh-, Ziegen-, Schaf- und Kamelmilch gewonnen, indem man dieselbe mit Kochsalz versetzt, in Säcken unter Beschwerden mit Steinen auspresst, die Käsemasse in kleine Kugeln formt und auf Matten in der Sonne trocknet.⁷⁾ Die Milchsäure wurde durch Titration des Aetheranzuges ermittelt.

No.	Nähere Bezeichnung		Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz							In der Trocken-Substanz			Analytiker
				Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Milch-säure %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
22	Schwedischer Molkenkäse aus Vollmilch	1	1885	29,56	6,77	6,68	51,50	0,02	5,57	—	9,61	9,34	1,54	Fr. Wernickold ¹⁾
23		2	"	27,59	6,95	8,50	51,27	0,03	5,66	—	9,60	11,74	1,54	
24		3	"	26,50	7,08	6,20	54,56	0,02	5,67	—	9,63	8,44	1,54	
25		4	"	26,76	6,69	10,09	51,37	0,03	5,06	—	9,12	13,78	1,46	
26		5	"	28,90	6,43	7,45	51,73	0,02	5,49	—	9,04	10,48	1,45	
27		6	"	24,99	6,67	7,78	55,02	0,03	5,54	—	8,89	10,39	1,42	
28		7	"	27,22	6,43	8,29	52,55	0,04	5,51	—	8,84	11,39	1,41	
29		8	"	27,79	6,34	10,54	49,95	0,03	5,37	—	8,78	14,60	1,40	
	Mittel (No. 22—29)	—		27,41	6,42	8,19	52,24	0,03	5,48	—	8,84	11,14	1,41	
30	Ziegenmolkenkäse, auf der Molkerei-Ausstellung in Stavanger ausgestellt	1	1893	15,53	10,63	32,68	46,02	5,14	—	12,58	38,69	2,01	Fr. Wernickold ²⁾	
31		"	"	20,16	10,50	24,40	39,04	5,90	—	13,15	30,56	2,10		
32		"	"	17,60	6,31	22,00	47,78	6,31	—	7,66	26,70	1,23		
33		"	"	26,53	9,44	14,93	42,69	6,41	—	12,85	20,32	2,06		
34		"	"	17,66	8,94	20,94	46,68	5,78	—	10,86	25,43	1,74		
35		"	"	24,51	5,39	16,75	46,78	6,57	—	7,14	21,88	1,14		
36		"	"	20,67	4,43	10,98	58,07	5,91	—	5,58	13,84	0,89		
37		"	"	24,56	5,34	16,23	47,41	6,46	—	7,08	21,78	1,13		
	Mittel (No. 30—37)	—		20,90	7,60	19,70	45,74	6,06	—	9,61	24,90	1,54		

Margarinekäse (Kunstkäse).

1	Schmalzkäse (amerikanischer)	1882	38,26	27,37 ³⁾	21,70	8,29	—	4,38	1,25	44,33	35,15	7,09	A. Völcker ³⁾
2		"	38,26	(36,55) (34,55)	21,07	—	—	5,12	—	57,58	34,11	9,21	P. Vieth ⁴⁾
3	Oleomargarinkäse (amerikanischer)	"	37,65	24,87 ³⁾	25,95	8,17	—	3,36	0,62	39,89	41,62	6,38	A. Völcker ³⁾
4		"	37,99	(34,65) (34,55)	23,70	—	—	3,66	—	55,88	38,22	8,94	P. Vieth ⁴⁾
5	Amerikan. Kunstkäse aus Magermilch unter Zusatz von thierischem und pflanzlichem Fett	1883	23,49	36,21	34,92	0,11	—	5,24	—	47,33	45,64	7,57	Willard u. Griffiths ⁵⁾
6		"	28,20	37,01	30,18	0,10	—	4,51	—	51,55	42,03	8,25	
7		"	26,55	35,58	33,85	0,12	—	3,90	—	48,44	46,09	7,75	
8		"	31,81	36,10	28,68	0,01	—	3,20	—	52,94	42,06	8,47	
9	Cheddar-Kunstkäse . . .	1888	38,31	29,47	29,13 ⁶⁾	—	—	3,09	0,61	47,78	47,22	7,64	P. Vieth ⁴⁾

¹⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 336.²⁾ Aarsberetning om de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Fremme i Norge. 1893. Centrbl. Agrk-Chem. 1894, 23, 843—846.³⁾ Milchztg. 1882, II, 438.⁴⁾ Ebendort 1882, II, 519.⁵⁾ Nach Chem. News 47, 85; in Wiener landw. Ztg. 1883, 75.⁶⁾ Milchztg. 1888, 17, 128.⁷⁾ Stickstoff $\times 6,25$.⁸⁾ Aus der Differenz berechnet, als „Kasein“ etc. bezeichnet.⁹⁾ P. Vieth verscifte das Käsefett nach Hehner's Methode und fand:

	No. 2	No. 4
Unlösliche Fettsäuren	90,46 %	91,82 %
Daraus berechnet sich:		
Butterfett	63 "	46 "
Fremdes Fett	37 "	54 "

Hiernach muss die verwendete abgerahmte Milch 1,25 % und 1,00 % Fett enthalten haben.

⁷⁾ Das Fett enthielt 92,76 % unlösliche Fettsäuren; die Reichert'sche Zahl betrug 0,9 $\frac{n}{10}$ KOH.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff	Fett	Milchzucker etc.	Asche	Barin Kochsalz	Stickstoff	Fett		
10	Fromage de Hollande. Holl. Edamer Kunstkäse . .	1890	29,80	—	22,80	—	7,06	—	—	32,47	—	J. Coster u. J. Mazure ¹⁾
11	Holländischer Kunstkäse .	1888	33,62	34,25	25,45	1,18	5,50	—	51,60	38,34	8,26	C. J. Lookeren-Campagne ²⁾
12	Amerikan. Margarine-Käse	1894	30,60	30,80	27,70	7,30	3,60	—	44,38	39,91	7,10	W. Chataway, T. H. Flamm u. C. G. Moore ³⁾
13	Deutscher Margarine-Käse	1895	55,25	16,48	22,32	6,68	4,90	—	37,05	49,88	5,93	M. Kühn ⁴⁾
14		"	46,59	21,67	23,11	8,63	6,51	—	40,58	43,27	6,49	
15	desgl. mit Olivenöl hergest.	"	53,09	22,89	16,29	2,19	5,54	—	38,35	34,73	6,14	
16	Marg.-Holländer Käse	?	40,32	24,89	23,96	5,59	5,24	2,69	41,71	40,19	6,67	C. Bischoff ⁵⁾
17	Edamer "	1895	42,00	25,35	24,24	3,01	5,40	2,69	43,71	41,79	6,99	
18	Limburger "	"	52,58	25,35	14,14	2,73	5,20	2,81	53,46	29,82	8,55	
19	Romadour "	"	45,24	23,10	26,14	0,62	4,90	2,92	42,18	47,74	6,75	
20	Edamer "	1896	34,77	27,83	26,97	—	—	—	42,66	41,35	6,83	Karl Windisch ⁶⁾
21	Gouda "	"	36,65	25,49	28,25	—	—	—	40,24	44,60	6,44	
22	Limburger "	"	46,92	21,39	27,04	—	—	—	40,30	50,94	6,45	
23	" "	1898	47,41	22,37	20,64	4,42	5,16	2,41	42,54	39,25	6,81	
24	" "	"	49,73	22,89	18,57	3,90	4,91	2,16	45,53	36,94	7,28	
25	Romadour "	1896	37,75	21,81	34,46	—	—	—	33,43	55,36	5,35	
26	" "	1898	44,61	23,77	23,13	2,86	5,63	3,01	42,91	41,76	6,87	
27	" "	"	45,88	23,04	21,60	3,92	5,56	2,74	42,57	39,91	6,81	
28	" "	"	46,24	22,35	24,08	2,06	5,27	2,33	41,57	44,79	6,65	
29	Münster- "	1896	48,70	22,00	25,17	—	—	—	42,88	49,06	6,86	
30	" "	1898	47,07	23,41	21,49	2,82	5,21	2,55	44,23	40,60	7,06	
31	" "	"	44,93	24,22	23,28	1,79	5,78	2,84	43,98	42,27	7,04	
	Mittel	—	40,85	21,59	24,00	8,60	4,96	2,44	36,50	40,57	5,84	
	Schwankungen ^{***)}	—	23,49-55,25	19,77-34,06	17,66-32,75	0,01-6,22	2,77-12,19	0,59-3,50	33,43-57,58	29,82-55,36	5,35-9,21	
32	Kunstkokoskäse („Fromage artificiel de coco“)	1892	47,00	—	1,72	—	6,20	—	—	3,24	—	F ⁷⁾

¹⁾ Milchztg. 1891, 20, 973.²⁾ Holländische Maatschappij van Landbouw. 1888, Dezember. Milchztg. 1888, 17, 1034.³⁾ Analyst 1894, 19, 145. Mitgeteilt von K. Windisch, vergl. Anmerkung ⁵⁾.⁴⁾ Chem.-Ztg. 1895, 19, 554, 601 u. 648.⁵⁾ Mitgeteilt von Karl Windisch in den technischen Erläuterungen zu dem Entwurfe eines Gesetzes, betr. den Verkehr mit Butter, Käse etc. (Sonderabdruck aus den Arbeiten des Kaiserl. Gesundheitsamtes 1896, 12, 56 und „Ueber Margarinekäse“ Sonderabdruck aus den Arbeiten des Kaiserl. Gesundheitsamtes 1898, 14, 92.)⁶⁾ † Rev. intern. des fals. vom 15/9 1892. Milchztg. 1892, 21, 662.⁷⁾ „Neutralisationsziffer“ der Fettsäuren 1,5 cem.^{***)} Von der Asche sind löslich 2,48 % (Kochsalz). Das Fett hatte 94,5 % unlösliche Fettsäuren.^{*)} Die Schwankungszahlen für die festen Bestandtheile sind auf den mittleren Wassergehalt von 40,85 % bezogen.^{*)} Der Kunstkokoskäse bestand aus einer elastischen Substanz zwischen zwei ziemlich harten Rinden.

Amerikanischer Käse.

Zusammensetzung und Verdaulichkeit,¹⁾ ermittelt von L. B. Arnold²⁾.

No.	Nähere Bezeichnung	Wasser %	Fett und Extrakt %	Kasein %	Salze %	Zeit der Verdauung St. Min.	Bemerkungen
1	Camembert, kleiner französischer Käse, halbflüssig, gleicht dem französischen Brie, scharf .	50,41	20,55	25,49	3,52	2,00	Die Veränderung hörte nach 1 Stunde und 45 Minuten auf.
2	Gute amerikanische Nachahmung des Brie	41,50	36,15	17,63	4,70	2,00	Wie No. 1.
3	Amerikanische Nachahmung des Neufchâtelers Käses	37,45	34,60	24,04	3,90	1,00	Schnelle aber unvollkommene Verdauung.
4	Amerikanische Nachahmung von Pont l'Évêque	26,02	50,80	20,64	2,54	0,45	Fast vollkommen verdaut.
5	Pont l'Évêque, echt, wie oben .	44,57	21,80	30,36	3,97	4,00	Verdauung in 4 Stdn. nicht vollendet. Riecht nach Milchsäure.
6	Ganzer Rahmkäse, scharf und mager, Amerikanische Faktorei	36,72	29,18	30,95	3,34	4,00	Schwerer Schaum von Fett und Kasein. Nicht völlig in 4 Stdn. verdaut.
7	Philadelphia Handkäse	33,14	1,86	58,66	6,03	4,00	Bedeutender käsiger Bodensatz, in 4 Stdn. nicht völlig verdaut.
8	Käse von abgerahmter Milch, sehr porös und mager	35,31	20,63	39,26	4,79	3,45	Quark bleibt fast unaufgelöst.
9	Amerikanische Nachahmung englischen Molkereikäses	27,92	36,04	36,76	5,24	3,45	Ziemlich gut verdaut.
10	Amerikanischer Cheddar	30,92	34,10	30,60	4,36	1,00	Gut verdaut.
11	Jung, Amerika, mit Säure fabricirt	32,97	31,13	31,78	4,13	3,45	
12	Salbeikäse, sehr porös und weich	33,32	28,62	33,11	4,23	1,15	Sehr vollständige Verdauung.
13	Ganda, Holland, alt und schön .	21,90	24,81	46,95	6,32	2,00	Unvollkommen verdaut.
14	Amerikanischer Limburger . . .	23,26	34,98	35,05	6,69	2,15	Gute Verdauung, aber schrecklicher Geruch.
15	Amerikan. Limburger, 2. Sorte .	35,65	30,85	27,57	5,91	1,30	Gut verdaut.
16	Edamer aus Holland	29,23	28,71	33,89	8,14	1,15	Gut verdaut.
17	desgl.	29,56	27,43	32,31	8,49	3,45	Nicht so gut verdaut.
18	Käse von $\frac{1}{4}$ abgerahmter Milch aus Illinois	26,72	32,65	36,16	4,46	3,45	Schmutzig aussehender und trüber Chymus.
19	Sapsago, Kräuter-Käse	13,30	15,52	57,59	13,57	3,45	Verdauung unvollkommen.
20	Leydener oder Comyn-Käse, aus Holland	25,44	6,48	58,45	9,60	3,30	Verdauung unvollkommen.
21	Englischer Chester, alt und reif	24,69	37,08	33,36	4,85	1,15	Fast vollständig verdaut. Gut.
22	Holländischer Käse	27,54	19,02	44,67	8,70	3,00	Bedeutend viel ungelöste Substanz auf der Oberfläche u. am Boden.
23	Magerer Käse aus abgerahmter Milch, Faktoreifabrikat	33,15	2,68	58,94	5,14	4,50	

¹⁾ Zu den Verdauungsversuchen wurden stets 6 g Käse mit 0,6 g Pepsin aus Schweinemägen, 120 g Wasser und 24 Tropfen Salzsäure bei Blutwärme digerirt und unter öfterem Umschütteln von $\frac{1}{4}$ zu $\frac{1}{4}$ Stunde so lange beobachtet, bis keine Veränderung mehr wahrzunehmen war.

²⁾ Milchztg. 1879, 8, 468 u. s. w.

No.	Nähere Bezeichnung	Wasser %	Fett und Extrakt %	Kasein %	Salze %	Zeit der Verdauung St. Min.	Bemerkungen
24	Faktoreikäse	32,86	33,94	30,09	3,14	3,30	Verdauung sehr vollständig.
25	"	37,29	23,09	34,75	4,97	3,45	Nicht ganz so gut wie der vorige.
26	Amerikanische Nachahmung des Münsterkäses, ein. deutsch. Käses	29,22	29,85	33,66	7,26	2,00	Quark völlig aufgelöst.
27	Schöner amerikan. Molkereikäse	21,05	28,34	44,23	6,36	1,00	Quark in 20 Minuten fast ganz aufgelöst.
28	Nachahmung des englischen Mol- kereikäses	25,44	34,45	35,35	4,50	2,00	Vollkommen verdaut.
29	Hell, abgerahmter Faktoreikäse .	32,37	20,13	43,36	4,15	3,00	Molken ganz aufgelöst.
30	Parmesan-, italienisch, abgerahmt	23,01	12,49	55,85	8,41	2,00	Chymus wolkig. Unvollk. verdaut.
31	Roquefort, alter, französ. Wernert	28,35	29,98	32,84	8,82	2,00	Vollkommen verdaut. Fett verdaut.
32	Roquefort, neuer	28,87	33,70	28,82	8,66	2,15	Fast vollk. verdaut. Fett verdaut.
33	Faktoreikäse	21,02	39,46	33,61	5,62	1,30	Fast vollkommen verdaut.
34	Cheddar, aus vollem Rahm . .	35,84	22,74	37,87	3,53	3,00	60% des Käses aufgelöst.
35	Aus vollem Rahm	38,11	22,45	35,74	3,69	3,30	20—30% des Käses aufgelöst. Ge- ringe Einwirkung auf das Fett.
36	Cheddared Käse	33,72	29,70	32,19	4,78	1,15	Ganz aufgelöst.
37	2 Jahre alter Idamkäse . . .	20,19	36,72	35,52	7,57	2,00	
38	Stiltonkäse	16,26	38,69	41,48	3,56	2,30	
39	9 Monate alter Faktoreikäse .	26,10	30,52	39,63	3,74	4,00	
40	Nachgeahmter Schweizerkäse. Sy- rakus	38,51	24,84	32,02	4,57	2,40	$\frac{1}{2}$ verdaut. Chymus klar.
41	Echter Schweizerkäse od. Gruyère. Syrakus	—	—	—	—	2,30	Gleich dem vorigen. $\frac{1}{6}$ aufgelöst.
42	Nachgemacht Limburger. Syrakus	48,60	21,29	23,58	6,52	3,10	$\frac{1}{2}$ aufgelöst.
43	Nachgeahmter Limburger, ein an- derer Käse	35,05	32,18	27,93	4,82	2,20	Sehr geringer Bodensatz.
44	Echter Schweizerkäse, eingeführt, alt. Syrakus	28,35	29,16	36,60	5,89	1,30	Sehr klarer Chymus.
45	Molkereikäse aus vollem Rahm. Syrakus	35,93	27,18	32,85	4,03	2,10	Dicke Schicht Oel auf der Ober- fläche. Chymus schön, wenig Bodensatz.
46	Sapsago od. Kräuterkäse, kleiner, grüner Käse. 6 Unzen. Syrakus	27,51	6,17	53,63	12,92	3,30	Schlecht verdaut. Bedeutender Bodensatz.
47	Neuer Faktoreikäse, 4 Wochen alt	36,93	21,97	37,48	3,60	3,00	
48	Echter Roquefortkäse	22,47	34,02	34,99	8,24	1,45	
49	3 Jahre alter Cheddarkäse . .	13,48	34,56	45,13	6,82	2,30	
50	Amerikanische Nachahmung eng- lischen Molkereikäses	16,44	40,24	37,41	5,90	2,45	
51	Amerikanischer Käse	37,10	22,13	37,38	3,39	—	} von E. E. Bragg analysirt ¹⁾ (1879).
52	"	49,18	28,63	18,35	4,64	—	
53	"	37,90	25,94	31,66	4,50	—	

¹⁾ Journal of the American Chemical Society 1879, I, 64.

Verdaulichkeit von Schweizerkäse.

M. Rubner (Molkereiztg. 1889, 41) fand, dass der Käse die Ausnutzung anderer Nahrungsmittel, z. B. der Milch, nicht unwesentlich erhöhen kann. Es gehen als unverdaulich verloren bei einer Einnahme von:

	2291 g Milch und 220 „ Käse	2050 g Milch 218 „ Käse	2209 g Milch 517 „ Käse	Milch bei kleineren Mengen
Trocken-Substanz . . .	6,0 %	6,8 %	11,3 %	8,4 %
Eiweiss	3,7 „	2,9 „	4,9 „	7,0 „
Fett	2,7 „	7,7 „	11,5 „	7,11 „

Sonstige Käseanalysen.

Coster, Hoorn und Mazurn: 8 Analysen von holländischen Käsen (Wasser, Fett und Asche). Rev. intern. fals. 1889, vom 15/8.

Schafkäse.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken- Substanz		Stickstoff in der Trocken- Substanz %	Analytiker	
			Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %			
1	Roquefort-Käse, genussreif	1885	38,94	21,92	34,14	—	5,00	—	35,90	55,91	5,74	e. Klenze ¹⁾	
2	"	1865	34,50	26,31	30,10	3,19	5,90	—	40,17	45,95	6,43	A. Fayen ²⁾	
3	"	"	26,53	31,68	32,31	5,03	4,45	—	43,12	43,98	6,90		
4	Roquefort, 1 Monat alt	1880	36,93	25,79	31,23	—	4,78	—	40,89	49,52	6,54	Hornig ³⁾	
5	desgl., ganz alt	"	23,54	27,00	40,13	—	6,27	—	35,44	52,48	5,65	N. Sieber ⁴⁾	
6	Briesen-Käse aus Ungarn	1869	43,08	23,28	28,04	0,02	5,58	—	40,90	49,26	6,54		
7	Tesselscher Schafkäse	1887	54,40	30,10	18,30	1,40	5,80	3,40	44,08	40,13	7,05	A. Mayer ⁵⁾	
8	Roquefort (amerikanischer)	1895	31,20	27,63	33,16	2,00	6,01	—	40,16	48,20	6,43	Wm. Chatterway, T. H. Farmar u. C. G. Moore	
9	desgl.	1894	29,60	28,30	30,30	—	6,70	—	40,20	43,04	6,43		
10	Briesen-Käse { 3 Wch. alt aus Siebenbürgen { 1 Jahr alt	1887	49,20	23,10	23,10	1,00	4,40	—	45,47	45,47	7,28	Georg Meier ⁶⁾	
11		"	"	37,70	25,20	25,20	2,70	5,80	—	40,45	40,45		6,47
12	Urde (Ziegenkäse) aus Siebenbürgen, 1 Jahr alt	"	28,00	5,70	57,50	2,70	6,10	—	7,92	79,86	1,27		
Roquefort-Käse (No. 1—5, 8 und 9) Mittel			—	31,61	26,47	33,13	3,20	5,59	—	38,70	48,44	6,19	

Vergl. auch oben Cacio cavallo unter Fettkäse aus Kuhmilch S. 327.

¹⁾ Milchztg. 1885, 14, 389.

²⁾ Journ. de Pharm. 16, 279 und Bull. soc. chim. [2] 3, 232.

³⁾ Beiträge zur Geschichte, Technik und Statistik der Käseerei. Wien 1869, 40.

⁴⁾ Journ. f. prakt. Chem. 1880, N. F., 21, 203 etc.

⁵⁾ Milchztg. 1897, 16, 87.

⁶⁾ Vergl. oben unter „Cheedar-Käse“ Anmerkung ⁴⁾, S. 326.

⁷⁾ Analyst 1894, 19, 145—147. Chem. Centrbl. 1894, II, 387.

⁸⁾ Mitgeteilt von Paul Thiele. Milchztg. 1897, 26, 727—729.

⁹⁾ Aus der Differenz berechnet.

Katschkawalj (Serbischer Schafkäse).

Katschkawal] (Serbischer Schafkäse).

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker etc. %	Asche %	Darin Kochsalz %	Stickstoff-Substanz %	Fett %		
13	Bessere Sorte von Pirot	1895	31,21	26,63	32,24	2,15	7,77	4,96	38,71	46,87	6,19	A. Zega und M. Bajic ¹⁾
14	desgl.	"	32,06	24,40	33,96	4,10	5,48	3,12	35,91	49,98	5,75	
15	Geringere Sorte von Pirot	"	37,23	23,50	29,51	3,93	5,83	2,67	37,43	47,00	5,99	
16	desgl.	"	37,01	21,66	29,64	5,18	6,51	3,58	34,39	47,05	5,50	
	Mittel (No. 13—16)	—	34,61	24,42	31,71	2,86	6,40	3,83	37,35	48,49	5,98	
17	Aus Vranja	1895	32,69	24,75	33,85	1,59	7,12	4,82	36,77	50,29	5,88	Georg Mayer ²⁾
18	Aus Kopannik	"	36,62	24,68	30,58	0,81	7,21	4,03	38,94	48,25	6,23	
19	Mittel von 10 Analysen verschiedener Sorten	—	35,72	24,24	31,00	2,74	6,28	4,01	37,42	47,85	5,99	
20	Kaskaval ³⁾ aus 3 Woch. alt	1887	50,50	28,10	14,10	2,50	4,80	—	56,77	28,49	9,08	
21	Siebenbürgen 1 Jahr alt	"	39,10	28,00	25,50	1,40	6,00	—	45,97	41,87	7,36	
	Schafkäse, Gesamtmittel	—	36,42	24,73	30,33	2,67	5,85	3,31	38,91	47,70	6,23	

Untersuchungen von Schaf-Ricotta (Quarg) und Schafkäse.

Nach Giuseppe Sartori. (Staz. sperim. agrar. Ital. 1890, 18, 434; Milchztg. 1890, 19, 629 u. 1001.)

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz			Stickstoff in der Trocken-Substanz
			Wasser	Stick- stoff- Substanz	Fett	Milch- zucker	Milch- säure	Asche	Stick- stoff- Substanz	Fett		
			o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o		
1	Schaf-Ricotta von S. Maria di Galeria	I	1890	43,80	8,66	36,46	9,77	0,59	0,72	15,41	64,38	2,47
2		II	"	42,48	13,61	31,64	11,16	0,33	0,78	23,66	55,01	3,79
3		III	"	43,29	12,94	31,90	10,36	0,49	1,02	22,82	56,25	3,65
	Mittel	—	—	43,27	11,73	33,31	10,42	0,43	0,84	20,66	58,76	3,31

Käse aus Schafmilch:**)

Käse aus Schafmilch:—)											
Cacio Viterbo.											
		Zeit der Her- stellung					Chlor- alkalien	Asche ohne Kochsalz			
1	Milch, durch die Waldartischocke (Cinaria scolymus) geronnen; Farbe gelblich, Geruch penetrant, Geschmack kräftig salzig, aromatisch	1888	28,50	34,19	30,93	—	5,03	1,35	47,82	43,26	7,65
2	Mit flüssigem Lab von Sordi und Lodi hergestellt; Farbe normal gelb; Geschmack nach Schafen; wenig entwickelt; Geruch angenehm	1888	27,47	35,59	30,50	—	5,39	1,05	49,07	42,05	7,85
3	—	—	29,70	33,69	31,30	—	4,34	0,97	47,92	44,52	7,67
4	Gewöhnlicher Käse mit normaler gelber Farbe und pikantem Geschmack . .	1889	29,13	34,00	30,30	—	5,51	1,33	47,98	42,75	7,68
5	Auf der Versuchsstation Lodi fabricirt; Farbe blassgelb; Masse etwas löcherig; Geruch schafartig; Geschmack fade .	1890	32,90	30,74	32,90	—	4,58	1,82	45,81	49,03	7,33

¹⁾ Chem.-Ztg. 1895, 19, 1920. Katschkawalj ist ein Schafkäse, der als Exportartikel eine ziemlich Rolle spielt und im gerösteten Zustande genossen wird. In Betreff der Herstellung muss auf das Original verwiesen werden.

²⁾ Mitgeteilt von Paul Thiele. Milchztg. 1897, 26, 727—729.

³⁾ Durch das Verrühren des Käses mit heissem Wasser geht bei der Fabrikation des Kaskaval eine grössere Menge Fett in die Molken über.

⁴⁾ Von diesen Käsen wurden No. 1, 4 u. 5 mittelst des Rundstockes bearbeitet, während bei der Bearbeitung von No. 2 u. 3 eine sog. englische Käsepresse mit doppeltem Hebel verwendet wurde.

Die Zusammensetzung der Stickstoff-Substanzen war folgende:

	Käse No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
Gesamt-Stickstoff	4,83 %	5,26 %	4,72 %	4,70 %	4,30 %
Albuminoid-Stickstoff	4,27 „	4,84 „	4,28 „	4,40 „	3,76 „
Stickstoff der Produkte der Zersetzung . .	0,54 „	0,42 „	0,41 „	0,25 „	0,54 „
Ammoniak-Stickstoff	0,157 „	0,150 „	0,138 „	0,125 „	0,117 „

Diesen Stickstoffmengen entsprechen:

Albuminoide	27,95 %	31,57 %	28,12 %	28,93 %	24,63 %
Produkte der Zersetzung der Albuminoide .	5,94 „	4,00 „	5,27 „	4,86 „	6,08 „
Nuclein	0,261 „	0,183 „	0,162 „	0,256 „	0,201 „
Ammoniak	0,191 „	0,162 „	0,169 „	0,152 „	0,143 „
Freie Fettsäuren	0,95 „	1,00 „	0,85 „	0,73 „	0,84 „

Die Untersuchungsmethoden waren folgende:

In der Ricotta wurde die stickstoffhaltige Substanz durch Multiplikation des Stickstoffs $\times 6,25$ bestimmt. — Milchnucker nach der Tabelle von Soxhlet berechnet. — Wasser: 2 g wurden in destilliertem Wasser gelöst, mit Sand gemischt und bei 100° C. getrocknet.

Von den Käsen wurden keilförmige Ausschnitte entnommen. Die einzelnen Bestimmungen wurden in folgender Weise ausgeführt:

Wasser: 2 g Käse mit 20 g Sand gemischt und in eine Porzellanschale im Gay-Lussac'schen Ofen behandelt.

Fett: aus dem Rückstand von der Wasserbestimmung durch wasser- und säurefreien Aether ausgezogen.

Asche: 5 g verkohlt, bei mässiger Hitze ausgewaschen, Rückstand verbrannt, Lösung eingedunstet und schwach gegläht.

Gesamt-Stickstoff-Substanz aus der Differenz der übrigen Bestandtheile.

Die Chloralkalien wurden aus den Käseproben in einer Porzellanschale gewonnen, indem 2 g der entfetteten Trockenmasse mit Barytwasser behandelt wurden. Darauf wurde die Flüssigkeit verdampft und der Rückstand verkohlt, der dann mit destilliertem Wasser ausgelaugt wurde.

Albuminoide nach Benecke u. Schulze. 20 g entfettete Masse wurden mit 400 g Wasser in eine Porzellanschale behandelt. Nach 12-stündigem Stehen wurde Wasser bis zum Gewicht 500 g zugesetzt. Die Albuminoide wurde aus 100 g der Lösung durch Ansäuern mit Essigsäure und Fällen mit Tannin erhalten, der Niederschlag wurde mit tanninhaltigem Wasser gewaschen und im Filtrat Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt (7).

Zur Bestimmung der Zersetzungsprodukte wurden 100 ccm der obigen Lösung eingedampft, vom Gewichte des Trockenrückstandes dasjenige der Asche der Albuminoide abgezogen und auf diese Weise die Menge der Zersetzungsprodukte gefunden. Die Flüssigkeit, aus der die Albuminoide entfernt waren, diente zur Bestimmung des Stickstoffgehaltes der Zersetzungsprodukte, zu welchem Zwecke dieselbe im Trockenbade nach Zusatz von etwas Schwefelsäure verdunstet wurde. Stickstoff-Bestimmung nach Kjeldahl. Zur Ammoniak-Bestimmung wurden 100 ccm Lösung mit Magnesia destilliert. Nuclein = unverdauliches Eiweiss nach Stutzer. Flüchtige Fettsäuren wurden durch Titration des mit Alkohol-Aether gelösten Fettes mit $\frac{n}{10}$ Kalilauge berechnet.

Ziegenkäse.

Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
		Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett		
Schweizer Ziegenkäse	I 1890	40,00	—	14,00	—	11,90	—	—	23,33	—	J. Coster und J. Mazure ¹⁾
	II „	33,00	—	7,40	—	—	sehr viel	—	11,21	—	

Rennthiermilchkäse.

Aus Vefsen im nördlichen Norwegen	1893	27,70	23,79	43,11	2,97	2,43	—	32,90	59,63	5,26	Werenskiöld ²⁾
---	------	-------	-------	-------	------	------	---	-------	-------	------	---------------------------

¹⁾ Milchztg. 1891. 20. 973. Die „Neutralisationsziffer“ der Fettsäuren betrug bei I: 10,63 ccm, bei II: 2,9 ccm.
²⁾ Bericht über die Wirksamkeit der agrrikultur-chemischen Kontrollstation in Christiania im Jahre 1893. Contrib. Agrik.-Chem. 1894. 23. 843—846. Der Rennthiermilchkäse hatte einen Durchmesser von ca. 25 cm bei 10—12 cm Höhe, eine bräunliche Rinde ungefähr wie halbgelbes Leder, einen durchdringenden Geruch und ein nur wenig appetitliches Aussehen. Der Geschmack war bei der Ankunft ungefähr wie derjenige von frischem Magerkäse. Nach 6-wöchentlichem Liegen im Keller hatte der Geschmack sich sehr verbessert und erinnerte sehr an den des Roquefortkäses.

Stutenkäse.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker etc.	Asche	Darin Kochsalz	Stickstoff-Substanz	Fett	
1	Ohne nähere Bezeichnung	1892	19,76	37,83	36,71	—	5,60	3,26	47,15	45,75	Giuseppe Sartori ¹⁾
2		"	22,09	36,03	35,90	—	5,80	3,16	46,25	46,08	

Pflanzenkäse.

Die Pflanzenkäse aus Sojabohnen sind in dem später folgenden Kapitel „Sojabohne“ behandelt.

Anhang zu Käse.

I. Untersuchungen über Käsereifung.

1. E. von Freudenreich (Landw. Jahrb. der Schweiz 1892; Milchztg 1893, 22, 290) stellte Versuche darüber an, ob der Reifungsvorgang beim Emmenthaler Käse von aussen oder von innen vor sich geht. Er überzog drei Käseproben mit Paraffin und fand dabei folgende Verhältnisse:

	I. Käse mit einer Paraffinschicht überzogen	II. Wie I. aber unter Quecksilberverschluss	III. Wie I. nach dreitägigem Salzbad
Aussehen	ziemlich stark gebläht, mit grossen, feuchten Löchern	etwas gebläht, sehr weich, mit grossen, glänzenden Löchern	wie frischer Käse, im Innern gelocht
Geruch	säuerlich	—	—
Geschmack	etwas bitterlich, aber gereift	etwas bitterlich, aber gereift	wie etwas junger Käse, salzig, nicht bitter
Farbe des Teiges	gelblich	—	weiss
Wasser	40,89 %	41,55 %	43,38 %
Fett	59,11 "	25,93 "	25,71 "
Fettfreie Trocken-Substanz	—	32,52 "	30,91 "
Eiweiss-Substanz	—	24,97 "	23,92 "
Eiweisszersetzungs-Produkte	4,80 "	4,70 "	3,19 "
Salze	2,85 "	2,85 "	4,20 "
Keime von Mikroorganismen im Gramm	25 Millionen	7—8 Millionen	18 $\frac{3}{4}$ Millionen

Der etwas höhere Wassergehalt dieser Käseproben im Vergleich zu den von Benecke und Schulze gefundenen Zahlen für gleichaltrige Käse erklärt sich durch den Luftabschluss, der die Verdunstung hemmen musste.

Nach den vorliegenden Versuchen schreiten die Reifungsvorgänge im Emmenthaler Käse in der ganzen Käsemasse zugleich fort und hängen dieselben nicht bloss von der Wirkung der auf der Oberfläche sich vermehrenden Bakterien ab. Die Bakterien, welche die Reifung hervorbringen, sind also nicht so sehr in der Rinde, als im Innern des Käses zu suchen.

¹⁾ Staz. sperim. agr. ital. 1892, 22, 337—339. Chem. Centrbl. 1892, II, 369.

2. Untersuchungen über den Reifungsprocess des Backsteinkäses stellte J. Klein an. Bericht über die Thätigkeit des Milchw. Instituts Proskau 1886/88, 17. J. Klein hat den selbst hergestellten Backsteinkäse in verschiedenen Reifestadien untersucht und dessen Veränderungen festgestellt; bei Probe I war der Käse 8 Tage alt, bei Probe II 3 Wochen und bei den anderen Proben je 14 Tage älter. Die Untersuchung ergab:

	I	II	III	IV	V	VI
	%	%	%	%	%	%
Wasser	57,42	56,41	56,02	55,20	55,48	54,70
In der kochsalzfreien Trocken-Substanz:						
Reinfett	17,81	19,38	20,44	19,33	19,56	20,99
Stickstoff in Form von Ammoniak	0,0	0,18	0,259	0,598	0,867	0,856
Gesamt-Stickstoff	10,44	10,66	10,92	11,07	11,16	11,22
Rohprotein	65,30	65,50	66,69	65,49	64,36	64,80
Reinprotein	62,24	58,63	53,97	60,80	54,04	61,10
Kasein	55,57	44,85	38,67	43,70	48,55	55,81
Cholesterin	0,74	0,86	0,55	0,44	0,76	0,65
Löslicher Stickstoff	—	4,72	4,27	8,72	8,00	9,04
Lösliches Rohprotein	—	26,71	29,80	54,45	50,01	56,54
Löslicher Eiweiss-Stickstoff	—	3,01	1,52	2,67	2,37	3,13
Lösliches Reinprotein	—	18,81	9,44	16,73	14,81	19,34
Milchsäure	3,26	2,84	2,82	3,09	3,30	2,99
Reinsäure	6,34	5,75	5,84	5,34	5,97	5,46
Phosphorsäure	2,72	2,42	2,51	2,50	2,46	2,54
Kalk	2,31	1,83	1,84	1,73	1,73	1,85
Magnesia	0,134	0,116	0,133	0,119	0,116	0,131

3. Untersuchungen über den Einfluss des sogenannten Nachwärmens bei der Käsefabrikation auf die Reifungsprodukte der Käse von F. Schaffer. Landw. Jahrb. d. Schweiz 1895, 9, 93. Chem.-Ztg. 1895, 19, Rep. 307.

Die Versuchskäse, nach Emmenthaler Art hergestellt, wurden bei 48°, 52°, 56° und 60° nachgewärmt. Die Resultate waren folgende:

Bestandtheile	In der frischen Käsemasse:				Auf die fettfreie Trocken-Substanz berechnet:			
	nachgewärmt auf				nachgewärmt auf			
	48° %	52° %	56° %	60° %	48° %	52° %	56° %	60° %
Wasser	29,99	28,44	25,44	25,41	—	—	—	—
Fett	29,56	29,89	33,10	31,19	—	—	—	—
Fettfreie Trocken-Substanz	40,45	41,67	41,46	43,40	40,45	41,67	41,46	43,40
Gesamt-Stickstoff	5,03	5,70	5,25	4,49	12,47	13,68	12,66	10,35
Gesamt-Extrakt	15,80	15,01	12,27	12,37	39,06	36,02	29,59	28,50
Lösliche Asche	5,33	4,33	4,42	3,96	13,18	10,39	10,66	9,12
Gesamt-Stickstoff des Extraktes	1,54	1,49	1,08	1,13	3,81	3,58	2,60	2,60
Lösliche Eiweisskörper	7,93	7,66	5,63	6,03	19,60	18,38	13,58	13,89
Eiweiss-Zersetzungsprodukte	2,54	3,02	2,22	2,38	6,28	7,25	5,35	5,48
Stickstoff derselben	0,33	0,32	0,22	0,21	0,81	0,77	0,54	0,48

4. St. Bondzynski (Landw. Jahrb. der Schweiz 1895, 8, 189; Vierteljahresschrift Chemie der Nahrungs- u. Genussmittel 1895, 10, 170—175) studirte die Stickstoffverbindungen des Käses bei der Reifung; er fand:

Bestandtheile	I. Emmentaler Käse, vollkommen ausgereift, 16 Monate alt (Glader)	II. Emmentaler Käse, 14-16 Monate alt, guter Geschmack, unregelmäßig und gross gelocht	III. Emmentaler Mager- käse, 3 Monate alt, Reifung wenig vorgeschritten	IV. Allgäuer Alpenkäse, nach Limburger Art, Rei- fung weit vorgeschritten, verkaufsfähig, weisse Centralechicht vorhanden	V. Romadourkäse, nach Limburger Art, voll- kommen verkaufsfähig	VI. Roquefortkäse, französischer Herkunft, scharf im Geschmack	VII. Camembertkäse, französischer Herkunft, vollkommen ausgereift, von sehr fein. Geschmack	VIII. Spälenkäse, aus- nicht vollkommen aus- gereift, von unregelmä- ssiger Qualität
	%	%	%	%	%	%	%	%
Wasser	32,25	30,45	47,46	54,45	55,50	36,05	52,00	29,10
Fett	31,54	32,62	2,54	21,95	15,50	34,33	25,40	30,23
Fettfreie Trocken-Substanz	36,21	36,95	50,00	23,60	29,00	29,62	22,60	40,67
Gesammtasche	5,26	4,71	8,91	5,11	5,00	6,88	4,79	—
Stickstoffhalt. Substanzen ^{*)}	30,95	32,24	41,09	18,49	24,00	22,74	17,81	—
Proteinstoffe ^{**)}	24,17	25,46	36,33	17,29	22,81	16,94	13,83	—
Gesamt-Stickstoff . . .	4,51	4,63	6,26	2,86	3,77	3,39	2,61	—
Lösliche Bestandtheile. a) In dem natürlichen Käse:								
Gesamt-Extrakt	13,56	14,01	21,50	18,90	24,71	17,75	15,18	13,15
Asche	3,22	2,71	6,53	4,56	4,17	6,02	4,57	4,26
Gesamt-Stickstoff . . .	1,44	1,51	2,18	2,17	3,06	1,64	1,52	1,12
Gesamt-Eiweisskörper ^{***)}	3,35	4,52	10,16	13,15	19,35	5,93	6,93	—
Stickstoff derselben . .	0,51	0,69	1,54	1,99	2,93	0,90	1,00	—
Eiweisskörper, fällbar durch Ammoniumsulfat . . .	2,06	3,52	9,40	13,20	—	5,43	5,46	—
Eiweisszersetzungsprodukte ^{§)}	6,99	6,78	4,76	1,20	1,19	5,80	3,98	—
Stickstoff derselben . .	0,93	0,82	0,64	0,17	0,13	0,74	0,53	—
b) In der fettfreien Trocken-Substanz:								
Gesamt-Extrakt	37,45	37,91	43,00	80,08	85,21	59,92	67,12	—
Asche	8,89	7,33	13,06	19,32	14,38	20,32	20,22	—
Gesamt-Stickstoff . . .	3,98	4,08	4,36	9,19	10,55	5,54	6,77	—
Gesamt-Eiweisskörper . .	9,25	12,23	20,32	55,72	66,72	20,02	29,33	—
Stickstoff derselben . . .	1,40	1,86	3,08	8,44	10,10	3,04	4,42	—
Eiweissstoffe, fällbar durch Ammoniumsulfat . . .	5,69	9,52	18,80	55,92	—	18,33	24,16	—
Eiweisszersetzungsprodukte	19,05	18,35	9,52	5,04	4,10	19,58	17,61	—
Stickstoff derselben . . .	2,56	2,22	1,28	0,75	0,45	2,50	2,35	—
c) Von 100 Theilen des Gesamtstickstoffs sind in Lösung gegangen:								
Im Ganzen	31,93	32,61	34,82	75,87	81,16	48,37	58,61	—
In Form von Eiweissstoffen	11,30	14,90	24,60	69,58	77,71	26,50	38,31	—
In Form von Eiweisszer- setzungsprodukten . . .	20,63	17,71	10,22	6,29	3,45	21,87	20,30	—
d) 100 Theile der Eiweisszersetzungsprodukte enthalten:								
Stickstoff	13,30	12,09	13,44	14,16	12,76	13,31	10,91	—

^{*)} Die stickstoffhaltigen Substanzen sind durch Abzug der Gesamtasche von der Trocken-Substanz berechnet.

^{**)} Die Proteinstoffe sind durch Abzug der Eiweisszersetzungsprodukte von den stickstoffhaltigen Substanzen ermittelt worden.

^{***)} Die Eiweisskörper sind durch Multiplikation des durch Phosphorwolframsäure gefällten Stickstoffs mit 6,25 berechnet.

^{§)} Die Eiweisszersetzungsprodukte sind aus der Differenz zwischen dem gesamtstickstoffhaltigen und dem löslichen Eiweissstoffe genommen.

Die Weichkäse (Limburger und Camembert) sind, wenn man als Maass zur Beurtheilung des Reifegrades die Menge der löslich gewordenen Substanz annimmt, als am weitesten gereift zu bezeichnen. Die „Tiefe“ der Reifungsvorgänge findet ihren Ausdruck in der Menge der gebildeten Eiweisszersetzungsprodukte.

Alle Bestandtheile ausser Wasser und Fett wurden in der fettfreien Substanz bestimmt. Der wässrige Auszug wurde bei 50° hergestellt, nur bei den nach Limburger Art hergestellten Käsen IV und V wurde Zimmertemperatur angewendet, weil bei höherer Temperatur Auszüge erhalten wurden, die beim Filtriren Emulsionen bildeten, wodurch der Gehalt an „löslichem Stickstoff“ bedeutend erhöht wurde.

In dem wässrigen Auszuge wurde bestimmt:

- Extrakt durch Trocknen in einer Platinschale während 30–40 Stunden bis zum annähernd gleichbleibenden Gewicht;
- Asche durch Verkohlen und Weissbrennen des Trockenrückstandes;
- Gesamtstickstoff nach Kjeldahl;
- Die löslichen Eiweissstoffe durch Fällung mit Phosphorwolframsäure;
- Die Albumosen nach J. König und W. Kisch durch Aussalzen mit neutralem Ammoniumsulfat.

5. R. Krüger (Molkereiztg. 1892, No. 20, 21, 22, untersuchte die Veränderungen in der Zusammensetzung camembertartiger Weichkäse während der Reifung.

Bezeichnung der Käse	Gewicht g	Wasser %	Alkohol- extrakt %	Ather- extrakt %	Freie Säure (Milchsäure) %	Asche %	Chlor- natrium %
Käse I, 3 Tage nach dem ersten Salzen	278,425	54,67	5,27 neutral	18,39 sauer	0,61	3,33	1,70
Käse II, 14 Tage später	247,590	48,93	5,55 sauer	21,17 sauer	entsprechend 23 cem N- 10-Alkali	4,83	2,69
Käse III, 6 Wochen alt	206,427	37,70	6,11 schwach alkalisch	26,20 neutral	0	4,20	1,98

Die Zusammensetzung des frischen Käses und der Molken aus derselben Milch war folgende:

	Vollmilch	Käse	Molken
Wasser	87,75 %	59,42 %	94,00 %
Eiweiss (nach Ritthausen)	3,51 %	17,13 %	0,51 %
Fett	3,49 %	17,24 %	0,49 %
Milchzucker	4,51 %	4,70 %	3,91 %
Asche	0,72 %	1,56 %	0,56 %

6. B. A. van Ketel und A. C. Antusch (Nederl. Tijdschr. Pharm. 1897, 9, 82. Chem. Centrbl. 1897, I, 770) bestimmten den Gehalt verschiedener Käsesorten an Stickstoffverbindungen nach der Methode von A. Stutzer (Zeitschr. anal. Chemie 1896, 35, 493) und fanden:

No.	Käsesorte	Wasser %	Gesamt- Stickstoff %	Stickstoff in Form von			
				Ammoniak %	Amid-Ver- bindungen %	Albumosen u. Peptocin %	Kasein u. Albumin %
1	Edamer	43,3	3,29	0,08	0,37	0,22	2,62
2	desgl.	25,5	4,97	0,20	0,49	0,17	4,11
3	Gouda	39,6	3,64	0,12	0,33	0,35	2,84
4	desgl.	30,4	3,39	0,26	0,87	0,44	1,82
5	Leidenscher	38,7	6,35	0,22	0,82	0,26	5,05
6	desgl.	35,0	4,67	0,21	1,10	0,17	3,28
7	Friesischer	29,2	4,28	0,12	0,10	0,09	3,97
8	desgl.	29,0	4,37	0,13	0,13	0,11	4,00

Der Gehalt von unverdaulichem Stickstoff betrug nur 0,03–0,04 %.

II. Fr. J. Herz (Chem. Ztg. 1895, 19, 1787—1788) stellte Versuche an über die **Beziehungen** zwischen dem Fettgehalt in der Milch und in den daraus bereiteten Limburger Käsen und fand:

Bestandtheile	Vollmilch "1/1 95	1/2 Vollmilch, 1/2 12-stündig entrahmte Milch "1/2 95	12-stündig entrahmte Milch "1/1 95	1/2 12-stündig, 1/2 24-stündig entrahmte Milch "1/2 95	24-stündig entrahmte Milch "1/1 95
A. Milch.					
Spec. Gewicht	1,0321	1,0338	1,0339	1,0352	1,0358
Trocken-Substanz . . %	13,69	12,73	12,19	11,37	11,09
Fett %	4,50	3,35	2,88	1,93	1,56
Fettfreie Trocken-Subst. %	9,19	9,38	9,31	9,44	9,53
Fettgehalt der Trocken-Substanz %	32,87	26,31	23,59	16,92	14,09
B. Daraus bereiteter Käse (unreif).					
Trocken-Substanz . . %	53,61	52,38	53,49	47,62	45,41
Fett %	27,80	24,49	21,00	14,95	12,35
Fettfreie Trocken-Subst. %	25,81	27,89	32,49	32,67	33,06
Fettgehalt der Trocken-Substanz %	51,86	46,74	39,26	31,39	27,19

III. A. Devarda (Zeitschr. analyt. Chem. 1897, 36, 751—766) hat eine Anzahl Käsesorten des Wiener Marktes auf ihren Gehalt an **Wasser und Fett**, sowie das Fett derselben auf **Reinheit** geprüft. Er fand:

No.	Käsesorte	Wasser %	Fett %	Fett in der Trocken- Substanz %	Reichert- Meissner'sche Zahl des Fettes	Zeiss' Refrakto- metergrade des Fettes bei 40° C.	Köttstorfer'sche Versäufungszahl des Fettes
1	Imperial (Rampach)	35,18	55,93	86,28	27,8	43,1	
2	" (Varasdin)	27,41	41,51	57,18	27,0	43,6	
3	Gervais	49,25	40,33	79,46	31,8	42,1	
4	Hagenberger	44,18	32,29	57,84	26,8	42,7	
5	Mährischer Schwarzenberger	34,95	35,96	55,28	27,6	44,9	
6	Tiroler Schwarzenberger	44,22	22,81	40,89	24,8	46,4	
7	desgl.	42,5	23,75	41,30	27,0	42,4	230,4
8	Limburger, jung	34,53	35,44	54,13	27,9	45,0	
9	desgl.	35,4	30,19	46,73	20,1	47,0	216,0
10	desgl.	—	—	—	27,2	45,6	225,9
11	Limburger, alt	35,21	27,35	42,21	30,9	42,8	
12	Gorgonzola, jung	36,68	33,59	53,04	23,4	—	
13	" grün, alt	34,37	33,99	51,79	26,7	43,8	
14	" weiss, jung	44,28	27,78	49,84	28,6	43,8	
15	" grün, jung	37,20	30,80	49,04	24,8	43,8	
16	" grün, alt	40,89	30,02	50,78	23,4	—	
17	Neufchateller	55,28	23,63	52,83	25,0	44,9	
18	Roquefort, jung	30,04	36,71	52,47	31,3	—	
19	Camembert, S. Bessard du Parc & Co., Calvados	52,70	24,89	52,62	30,1	43,4	
20	" , imit.	52,12	24,52	51,21	29,8	43,3	

No.	Käsesorte	Wasser %	Fett %	Fett in der Trocken- substanz %	Reichert- Meissner Zahl des Fettes	Zoll's Refraktro- meternge des Fettes bei 40° C.	Köttstorfer'sche Vermehrungszahl des Fettes
21	Camembert, M. F. David, Paris	53,77	21,80	47,15	28,7	43,4	
22	Briekäse	55,75	22,51	50,87	31,6	41,4	
23	Trappistenkäse aus Bosnien	43,15	28,68	50,44	26,1	43,5	
24	Liptauer Schafkäse	43,90	27,95	49,82	29,5	45,0	
25	desgl.	39,20	29,62	48,71	29,0	44,6	
26	desgl.	—	—	—	30,9	44,9	234,4
27	Stilton, mit Wein getränkt	30,39	34,16	49,07	31,7	43,1	
28	Romadour	51,59	23,74	49,03	26,9	43,5	227,0
29	Romadour-Kunstkäse	47,80	26,62	50,99	2,0	50,2	
30	Chester	33,83	32,34	48,87	31,3	42,8	
31	Stracchino	62,28	17,49	46,36	26,3	43,0	
32	Holländer Rahmkäse	40,40	27,02	45,33	32,8	—	
33	" Kunstkäse	40,28	26,71	44,72	3,1	50,0	
34	Groger Sommerkäse	34,03	29,75	45,09	28,4	—	
35	" Winterkäse	36,52	28,01	44,12	32,2	—	225,0
36	Schlosskäse, Engelstein	30,86	31,16	45,06	26,2	—	226,0
37	Ellischauser Käse	58,66	17,80	43,05	23,6	43,1	
38	Burgkäse aus Deutschland	—	—	—	28,1	43,1	
39	Parmesan	27,33	28,26	38,88	30,0	43,7	
40	Parmesankäsefett, vor 20 Jahren gewonnen	—	—	—	27,8	43,6	230,6
41	Emmentaler Sommerkäse	30,33	30,04	43,11	28,4	—	232,6
42	" Käse	—	—	—	23,9	42,5	
43	" Käsefett, vor 20 Jahren gewonnen	—	—	—	31,0	43,6	235,0
44	Edamer	40,61	21,41	36,04	32,4	44,0	
45	"	—	—	—	23,1	—	
46	"	33,01	17,95	26,79	31,3	—	
47	"	36,28	—	—	30,5	44,3	
48	Edamer Kunstkäse	37,80	27,33	43,93	1,7	49,4	
49	desgl.	34,78	25,08	38,45	2,5	50,3	
50	Glarner-Schabziger (Kräuterkäse)	39,35	6,36	10,48	15,4 ¹⁾	41,8	216,6
51	Olmützer Quargel	50,90	2,68	5,45	26,0 ¹⁾	44,1	

Zur Wasserbestimmung liess Devarda etwa 10 g des in kleine Stücke zerschnittenen Käses in einer Glasschale bei gewöhnlicher Temperatur im Vakuum über Schwefelsäure 24—36 Stunden stehen und trocknete darauf 2—6 Stunden bis zur Gewichtskonstanz bei 100°. Zur Fettbestimmung wird die so getrocknete Masse verrieben und ohne weiteres mit Aether ausgezogen.

IV. Giuseppe Sartori (Staz. sperim. agr. Ital. 1894, 26, 339; mitgeteilt von Nic. Boichichio) untersuchte eine Kuhmilch und den aus derselben gewonnenen Käse, nachdem aus 380 l Milch 20 l Rahm, welche 7,5 kg Butter lieferten, gewonnen waren; er fand für die Milch von 44 Schweizerkühen:

Spez. Gew., 15°	Wasser	Fett	Eiweissstoffe	Milchzucker	Asche
1,0306	87,50 %	3,45 %	3,50 %	4,73 %	0,77 %

Der Käse (Labkäse) hatte 16 Stunden nach der Herstellung folgende Zusammensetzung:

Wasser	Fett	Eiweissstoffe	Amide	Milchzucker	Milchsäure	Asche
48,37 %	13,24 %	31,88 %	1,02 %	1,50 %	0,31 %	3,71 %

V. Aschen italienischer Käse-Sorten nach Mariani und Tasselli. (Milchztg. 1896, 25, 118; nach Stazioni sperim. agr. Ital. 1895, 28.)

Bezeichnung der Käse	Trocken-Substanz	Reinasche	Chlor	Kalk	Phosphor-säure	Kalk: Phosphorsäure = 1:
	%	%	%	%	%	%
Weichkäse.						
Aus frischer ganzer Milch . . .	47,81	3,33	1,08	0,64	0,82	1,28
Lombardischer Käse	71,37	2,70	0,69	0,60	0,72	1,19
Stracchino.						
a) Quadratkäse	58,63	4,33	1,45	0,71	0,85	1,21
b) reif, mässig scharf, gut . . .	76,73	4,61	1,41	0,66	1,04	1,56
c) reif, sehr scharf, vorzüglich .	71,67	4,35	2,72	0,68	1,07	1,56
Hartkäse.						
Lombardischer Grana aus saurer	75,65	5,59	0,47	2,08	2,25	1,08
desgl. von Reggio Milch	77,98	4,65	0,58	1,58	1,70	1,07
Cacio cavallo, aus Vollmilch . .	78,22	6,33	2,12	1,13	1,40	1,24
desgl. von Adria	70,66	5,70	1,49	1,03	1,46	1,42
Schafkäse von Pisa	75,66	6,77	1,86	1,37	1,71	1,25
Käse aus Schaf- und Ziegenmilch						
aus den toskanischen Maremmen	71,92	6,68	1,46	1,61	1,88	1,17
Schafkäse derselben Herkunft . .	72,10	8,22	2,60	1,58	1,83	1,16
Käse von Aosta	75,21	4,28	0,91	1,01	1,29	1,27
Edamer	77,98	5,80	1,59	0,79	1,38	1,75
Käse von centrifugirter Milch . .	55,24	7,47	2,15	1,10	1,85	1,67

Abgerahmte Milch, Magermilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Salze	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
			%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Süsse Milch	1856	90,05	3,11	1,25	4,87	0,72	31,26	12,56	5,00	H. Scherer ¹⁾
2	" " " " " " " "	"	89,90	3,47	1,64	4,48	0,61	34,36	16,24	5,50	
3	Schlicker-Milch	"	90,47	3,60	0,56	4,61	0,76	37,77	5,88	6,04	
4	" " " " " " " "	"	90,35	3,51	0,47	4,79	0,88	36,37	4,87	5,82	
5	Morgenmilch bei 5—9° in 48 Stunden aufgerahmt .	"	90,24	—	0,62	—	—	—	6,35	—	Ign. Moser ²⁾
6	Abendmilch bei 5—9° in 48 Stunden aufgerahmt .	1858	89,36	—	1,37	—	—	—	12,98	—	
7	Fettarme Milch, bei 16° in 7 1/4 Stunden aufgerahmt	"	90,06	—	1,27	—	—	—	12,78	—	

¹⁾ Zeitschr. d. landw. Centralvereins f. Prov. Sachsen 1856, 248. Angaben über die Art der Aufrahmung liegen nicht vor.

²⁾ Arenstein's Allgem. Land- und Forstw.-Ztg. 1858, 612. Die ursprüngliche Milch enthielt:

No. 5. Morgenmilch	86,80 %	Wasser	4,62 %	Fett	12,20 %
" 6. Abendmilch	85,31 "		5,34 "		14,69 "
" 7. Milch von Kühen ungar. Rasse	88,26 "		3,04 "		11,74 "
" 8. Gekaufte Milch	86,65 "		4,16 "		13,35 "

Milch unter No. 5 u. 6 war alsbald durch Einstellen in ein Kühlbad auf 15° C. abgekühlt worden.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	
8	Fettreiche Milch, bei 16° in 7 $\frac{1}{4}$ Stunden aufgerahmt	1858	86,49	—	0,95	—	—	—	9,04	<i>Ign. Moser</i> ¹⁾
9	Von dem Gute Ensked bei Stockholm Spec. Gew.	1857	90,18	—	0,84	—	—	—	8,55	<i>Michaelsen</i> ²⁾
10	I. bei 62° F.	1,0370	89,65	3,01	0,79	5,72	0,83	29,08	7,63	<i>A. Volcker</i> ³⁾
11	II. " " "	1,0337	89,40	2,94	0,76	6,05	0,85	27,74	7,17	
12	III. " " "	"	89,00	3,01	1,93	5,28	0,78	27,36	17,54	
13	—	1865	90,41	3,68	0,32	4,80	0,79	38,38	3,35	<i>J. Lehmann</i> ⁴⁾
14	Saure Schlickermilch . .	1868	90,91	3,19	0,97	4,10	0,83	35,09	10,67	<i>E. Heiden</i> ⁵⁾
15	" " Sept.	1873/75	91,75	3,05	0,64	3,86	0,70	36,97	7,76	<i>E. Heiden u. Gans</i> ⁶⁾
16	" " 26. Jan.	"	90,70	2,65	0,80	5,28	0,57	28,50	8,60	
17	" " 29. " "	"	90,97	2,93	0,78	4,71	0,61	29,52	7,86	
18	" " Novbr.	"	91,73	3,13	0,91	3,53	0,70	37,85	11,00	
19	" " 1. Decbr.	"	92,45	2,57	0,78	3,63	0,57	34,04	10,33	
20	" " 4. " "	"	92,57	2,81	0,68	3,38	0,56	37,82	9,15	
21	" " 23. Novbr.	"	90,92	2,88	0,68	4,78	0,74	31,72	7,49	
22	" " 25. " "	"	91,07	2,89	0,59	4,71	0,74	32,36	6,61	
23	" " 27. " "	"	90,86	2,79	0,55	5,04	0,76	30,53	6,02	
24	" " 2. Febr.	—	90,86	2,79	0,52	5,12	0,71	30,53	5,69	
25	" " 4. " "	—	90,74	3,03	0,66	4,79	0,80	35,64	7,13	<i>Al. Müller</i> ⁷⁾
26	Saure Milch 7. Decbr.	1874	91,07	3,02	0,69	4,48	0,74	33,82	7,73	
27	" " 10. " "	"	90,68	3,22	0,58	4,71	0,81	34,55	6,22	
28	" " 16. Novbr.	"	91,03	2,94	0,53	4,72	0,78	32,78	5,91	
29	" " 18. " "	"	91,31	3,01	0,52	4,44	0,72	34,64	5,98	
30	" " 6. u. 9. Dec.	"	91,23	2,77	0,34	4,95	0,71	31,59	3,88	
31	" " 10. u. 12. Dec.	"	91,29	2,77	0,34	4,85	0,75	31,60	3,90	
32	" "	"	92,20	3,06	0,89	3,09	0,76	39,25	11,41	
33	" "	"	92,42	3,02	0,67	3,22	0,67	39,84	8,84	
34	" "	"	91,74	3,27	0,90	3,26	0,83	27,48	10,90	
35	Saure blaue Milch, bei 0° nach 20 Stunden abgerahmt	1862	89,96	—	1,02	—	0,61	—	10,16	

¹⁾ Vergl. Anmerkung ²⁾ S. 350.

²⁾ Weende's Jahresber. 1857/61, 160. (Polyt. Journ. 149, 59.) Die volle Milch enthielt 12,16 % Trocken-Substanz und 3,32 % Fett.

³⁾ Journ. Roy. agric. Soc. of England 1863, 24, 298.

⁴⁾ Amtsblatt für die Landw. Ver. Sachsens 1865, 55.

⁵⁾ O. v. Gruber und Fritzsche. Bericht der Versuchstation Pomuritz 1868/69, 27.

⁶⁾ Versuchstation Pomuritz. Beiträge zur Ernährung des Schweins. 1. Heft, 11, 20, 29, 41, 43.

⁷⁾ Landw. Versuchstationen 1867, 9, 138, 276, 364. Die ursprüngliche Milch enthielt:

	Trocken-Substanz	Fett	Protein	Milchzucker	Salze
Zu No. 35—37	13,05	4,49	3,19	4,68	0,69
" " 38	13,19	3,97	—	—	—
" " 39	12,66	3,97	3,43	4,52	0,74

Von der Domaine Tullgarn. Magermilch ebendaher enthielt nach einer Aufrahmungszeit von 36 Stunden: Abendmilch 1,09, Morgenmilch 0,97, Abendmilch 1,00 % Fett.

No. 38 stammte von Abendmilch von 1,0315 spec. Gew. bei 25° C., die in einer Glasschale mit stark konvexem Boden aussehnte.

No. 41 u. 42. Die untersuchten Proben kamen vom Rittgute Riseberga (Ayreshire-Halb- und Vollblutkühe). Die Aufrahmung erfolgte in 90—100 mm tiefen kupfernen Milchsatten in einem holsteinschen Keller.

No. 43. Von Morgen- und Abendmilch von 3,59 % Fettgehalt.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
36	Saure blaue Milch, bei 15° nach 20 Stdn. abgerahmt	1862	88,96	3,25	2,27	4,89	0,63	29,44	20,56	4,71	Al. Müller ¹⁾
37	Saure blaue Milch, bei 30° nach 20 Stdn. abgerahmt	"	88,91	—	3,02	—	0,58	—	25,83	—	
38	Nach 24 Stunden bei 20°	1861	89,60	—	1,19	—	0,80	—	11,44	—	
39	Morgenmilch nach 36-stünd. Aufrahmen	1862	89,76	3,51	1,16	4,81	0,76	34,28	11,33	5,48	
40	—	1863	90,64	3,77	0,55	4,66	0,78	40,28	5,88	6,44	
41	Nach 24-stünd. Aufrahmung, Februar	"	89,80	—	1,30	—	—	—	12,75	—	
42	Nach 36-stünd. Aufrahmung, Februar	"	90,04	3,41	1,06	5,09	0,74	34,24	10,64	5,48	
43	Nach 24-stünd. Aufrahmung, Juni	1864	—	—	0,82	—	—	—	—	—	
44	Marktmilch	1,0362	1879	89,05	—	0,60	—	—	5,48	—	
45	"	1,0368	"	90,00	—	0,90	—	—	9,00	—	
46	"	1,0365	"	89,16	—	1,37	—	—	12,64	—	J)
47	"	1,0370	"	89,50	—	0,97	—	—	9,24	—	
48	"	1,0372	"	89,29	—	1,25	—	—	11,67	—	
49	"	1,0340	"	90,78	—	0,165	—	—	1,89	—	
50	Von Milch altmilchender dänischer Kühe	1878	90,23	3,76	0,84	4,38	0,79	38,49	8,60	6,16	Storch ²⁾
51	Von Milch frischemilchender dänischer Kühe	"	90,20	3,93	0,59	4,47	0,80	40,10	6,02	6,42	
52	Magermilch	1882	90,48	3,45	0,79	4,50	0,78	36,24	8,30	5,80	H. Struve ³⁾
53	Im Mittel v. 20 Prob. 1,0350	1881	90,24	—	0,66	—	—	—	6,76	—	
54	" " " 12 " 1,0350	"	90,41	—	0,77	—	—	—	8,03	—	Schultz ⁴⁾
55	" " " 14 " 1,0351	"	90,16	—	0,81	—	—	—	8,23	—	
56	Mittel n. W. Fleischmann 1,0345	"	89,85	4,03	0,75	4,60	0,77	39,70	7,39	6,35	W. Fleischmann ⁵⁾
	Mittel 1,0357	—	90,43	3,26	0,87	4,74	0,70	34,09	9,09	5,45	
	Schwan- 1,0337-	—	88,31-	2,62-	0,18-	3,79-	0,47-	27,36-	1,89-	4,38-	4,38 ⁶⁾
	kungen 1,0372	—	92,57	3,85	2,47	5,46	0,96	40,28	25,83	6,44	

¹⁾ Vergl. Anmerkung 7) S. 351.

²⁾ Chem. Laboratorium der Sanitätsbehörde in Bremen. Milchtztg. 1880, 9, 55.

³⁾ Mitgeteilt von H. Cordes. Milchtztg. 1881, 10, 606.

⁴⁾ Jahresber. d. Agrik.-Chem. 1883, 396. (Journ. f. prakt. Chem. N. F. 27, 249.) Die stickstoffhaltigen Substanzen bestanden aus unlöslichem Kasein 2,61 %, löslichem Kasein 0,09 %, Albumin 0,39 %, Pepton 0,36 %.

⁵⁾ Milchtztg. 1882, II, 104. (Veröffentlichungen d. K. d. Gesundheitsamtes vom 9. Jan. 1882.) Die Magermilchproben enthielten:

No.	Genossenschafts-Molkerei	Trocken-Substanz		Fett		das spec. Gew. betrug	
		Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
53.	Genossenschafts-Molkerei Kiel	10,71 %	9,16 %	1,38 %	0,24 %	1,0362	1,0330
54.	Itzehoe	10,08 "	8,95 "	1,34 "	0,32 "	1,0355	1,0345
55.	Aus anderen Molkereien	10,44 "	9,13 "	0,57 "	0,26 "	1,0370	1,0330

⁶⁾ W. Fleischmann, Das Molkereiwesen, Braunschweig 1875, 363.

Nach Gussander'schem Verfahren, flache Satten.

Nach Gussander'schem Verfahren, flache Satten.											
No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Analytiker	
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %		
1	Bei 16° C. nach 23 Stunden	1855	90,32	—	0,74	—	—	—	7,64	—	A. Stöckhardt ¹⁾
2	" 15° " " 20 "	1862	89,67	3,25	1,24	5,22	0,62	31,43	12,02	5,05	Al. Müller ²⁾
3	" 15° " " 33 "	"	89,76	3,51	1,16	4,81	0,76	34,28	11,33	5,48	
4	Vom Gute Oerby, Ende März	1865	90,05	—	0,40	—	—	—	4,02	—	E. Heiden ³⁾
5	Schlickermilch, 1. Februar .	1875	91,26	2,78	0,25	4,88	0,83	31,81	2,86	5,09	
Mittel		—	90,21	3,18	0,74	5,12	0,75	32,53	7,57	5,20	

Nach Swartz'schem Verfahren. Eis- und Kaltwasser-Verfahren.

Nach Swarts'schem Verfahren. Eis- und Kaltwasser-Verfahren.												
1	Sauermilch, 4. Februar . .	1874	90,95	2,92	0,61	4,77	0,75	32,27	6,74	5,16	E. Heiden ⁴⁾	
2	" 17 " . .	1876	90,98	2,95	0,34	4,98	0,75	32,70	3,77	5,23		
3	" 20. " . .	"	91,03	2,88	0,43	4,92	0,74	32,11	4,79	5,14		
4	In Eiswasser gekühlt, Spec. Gew. nach 24 Stunden, 1,0356	"	90,32	3,04	1,05	4,93	0,71	31,62	10,85	5,06	W. Fleischmann ⁵⁾	
5	In Eiswasser gekühlt, nach 12 Stunden	"	90,38	3,22	0,84	—	0,78	33,47	8,73	5,36	F. Storch ⁶⁾	
6	desgl. nach 36 Stunden . .	"	90,89	3,19	0,40	—	0,76	35,02	4,39	5,60		
7	desgl. " 12 " . .	"	90,34	3,09	1,31	—	0,74	31,99	13,56	5,12		
8	desgl. " 24 " . .	"	89,73	3,19	0,96	4,17	0,85	31,06	9,34	4,97	J. König ⁷⁾	
9	Mittel von 7 Analysen . .	1878	91,50	—	0,50	—	—	—	5,88	—		
10	Nach 36 Stunden Spec. Gew. 1,0343	1880	—	—	1,06	—	—	—	—	—	F. Petersen ⁸⁾	
11	" 24 " 1,0311	"	—	—	0,45	—	—	—	—	—		
12	" 12 " 1,0341	1882	—	—	0,71	—	—	—	—	—	W. Fleischmann ⁹⁾	
13	" 24 " 1,0336	"	—	—	0,58	—	—	—	—	—		
Mittel			1,0337	—	90,68	3,03	0,70	4,84	0,75	32,53	7,56	5,20

¹⁾ Neue schwedische Milchwirtschaft ohne Keller 1856, 19. Die Vollmilch enthält 12,88 % Trocken-Substanz, 4,26 % Fett.

²⁾ Landw. Versuchsanstalten 1867, 9, 138 u. f. Die Vollmilch zu 2) enthält 87,34 % Wasser, 3,97 % Fett.

³⁾ Versuchsanstalt Pommritz. Bericht derselben über Ernährung der Schweine. Hannover u. Leipzig 1876.

⁴⁾ Ebendasselbst.

⁵⁾ Milchztg. 1876, 5, 2205. Die Vollmilch enthält 4,23 % Fett, 2,90 % Kasein, 0,41 % Eiweiss, 4,51 % Zucker, 0,69 % Salze. Reaktion amphoter.

⁶⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 4, 180. Stickstoffhaltige Substanz von uns aus dem angegebenen Stickstoff-Gehalt durch Multiplikation mit 6,25 berechnet.

⁷⁾ Original-Mittheilung.

⁸⁾ Milchztg. 1880, 9, 557.

⁹⁾ Ber. d. Milchw. Versuchsanstalt Raden 1882, 21.

Entrahmung durch Centrifuge.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
1	Lefeld'sche Centrifuge 1,0353	1876	90,73	3,38	0,46	5,34	0,72	36,46	4,96	5,83	W. Fleischmann ¹⁾
2	De Levals Separator 1,0348	1884	91,16	4,03	0,29	3,77	0,75	45,59	3,28	7,29	
3	" " —	1880	90,71	3,31	0,22	5,12	0,64	35,63	2,37	5,70	Aug. Völcker ²⁾
4	Centrifugal-Milch 1,0350	1879	90,52	3,84	0,29	5,54	0,77	40,51	3,06	6,48	N. Gerber und P. Radenhausen ³⁾
5	Mittel verschied. Analysen .	—	90,68	3,49	0,29	4,76	0,78	37,45	3,11	5,99	
6	Mittel verschied. Analysen der Amherster Molkerei .	1884/85	89,78	3,53	0,33	5,56	0,80	34,54	3,23	5,53	C. A. Goetzmann ⁴⁾
7	Handseparator 1,0340	1890	90,40	3,62	0,03	5,05	0,79	37,71	0,31	6,04	D. Hont ⁵⁾
Mittel			90,57	3,61	0,27	4,80	0,75	38,27	2,91	6,12	

Nach Holstein'schem Verfahren.

1	Holsteinsche Keller-Milch in 90—100 mm hohen kupfernen Satten	nach 24 Stdn.	1863	89,80	—	1,30	—	—	12,75	—	AL. Müller ⁶⁾
2	" " " " " "	" 36 "	"	90,04	3,07	1,06	5,09	0,74	30,82	10,64	
Mittel			—	89,92	3,11	1,18	5,24	0,75	30,82	11,70	4,93

Magermilch unter dem Einflusse des Stehens und Gefrierens.

Nach Versuchen des Hygienischen Institutes in Hamburg (Milchztg. 1897, 26, 638).

30 l Milch waren durch 72-stündiges Stehen in einem Kühlraum in einer Blechkanne vollkommen gefroren und dann langsam ohne Durchmischung des Inhalts aufgethaut. Es ergaben sich folgende Resultate:

	Spec. Gew.	Trocken-Substanz	Fett
Magermilch aus dem oberen Theile des Gefäßes	1,0061	1,70 %	Spuren
Magermilch aus dem unteren Theile des Gefäßes nach Entfernung der Mittelschicht	1,0375	9,84 "	0,20 %
Magermilch nach völligem Durchmischen des ganzen Menge	1,0355	9,40 "	0,15 "

¹⁾ W. Fleischmann: Das Molkereiwesen 1878, 704. 2. Ber. der Milchw. Versuchstation Baden 1884, 26. Die Magermilch wurde im allgemeinen Betriebe der Radener Molkerei bei Durchlauf von 292,2 kg Vollmilch durch die Trommel bei 30,7° C. und bei 6500 Umgängen in der Minute gewonnen. Der Gehalt an Milchzucker betrug bei direkter Bestimmung 3,645 %; der oben angegebene Gehalt wurde aus der Differenz berechnet.

²⁾ Journ. Roy. agr. Soc. England 1880, 1, 160.

³⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 1879, 7, 316.

⁴⁾ Milchztg. 1880, 16, 121.

⁵⁾ Jahresber. der Agrik.-Chem. 1885, 623. (Massach. Agr. Exp. St. Bull. 17.) Durchschnitt der Analysen vom 6. November 1884 bis 5. Februar 1885.

⁶⁾ Milchztg. 1890, 19, 706. Die Zusammensetzung von Vollmilch, Magermilch und Rahm war folgende:

	Spec. Gew.	Wasser	Kasein	Fett	Milchzucker	Asche	Kalk	Phosphorsäure
Vollmilch	1,0320	85,90	3,50	5,05	4,70	0,79	0,22	0,226 %
Magermilch	1,0340	90,40	3,62	0,025	5,05	0,708	0,214	0,22 "
Rahm	1,0150	71,02	3,02	21,95	3,32	0,59	0,155	0,17 "

⁷⁾ Landw. Versuchstationen 1866, 9, 147. Milch von Voll- und Halblut-Ayreshire-Kühen.

Anhang zu Magermilch.

I. Magermilch bei Aufrahmung unter verschiedenartigen Einflüssen.

Nach Höhe der Milchschrift und Temperatur.

A. Stückhard u. J. Nyberg.¹⁾ Milch mit 12,48 % Trocken-Substanz und 3,33 % Fett.

		Wasser	Fett	Trocken-Substanz	Grad der Ausrahmung
		%	%	%	%
I. Bei 22° C.	a. bei 23,6 cm hoher Schicht	90,61	0,590	9,39	85
	b. „ 4,7 „ „ „	90,39	0,301	9,61	92
II. „ 10° „	a. „ 23,6 „ „ „	90,93	0,305	9,07	92
	b. „ 4,7 „ „ „	91,32	0,225	8,68	94

Milch mit 11,93 % Trocken-Substanz; 14,1 cm hohe Schicht.

I. Bei 20° C.	a. nach 22 Stunden	91,32	—	8,68	—
	b. „ 30 „	91,52	—	8,48	—
II. „ 9,5° „	a. „ 22 „	—	—	—	—
	b. „ 30 „	91,75	—	8,25	—

A. Rosing u. Aal.²⁾ Morgenmilch vom $\frac{13}{4}$ 1864 in je 8 Blechsatten, und vom $\frac{19}{4}$ in 6 Satten.

Die Vollmilch enthielt:

 $\frac{13}{4}$ 12,08 % Trocken-Substanz, 3,166 % Fett.

		Procent. Fettgehalt der Magermilch	
		Milch vom $\frac{19}{4}$	vom $\frac{13}{4}$
		bei 4½° C.	bei 14° C.
$\frac{19}{4}$ 12,15 „	„ 3,331 „	—	1,648
	Nach 6 Stunden	—	—
	„ 7 „	1,099	1,377
	„ 12 „	0,444	0,868
	„ 18 „	0,425	0,602
	„ 24 „	0,296	0,517
	„ 30 „	0,285	0,516
	„ 36 „	0,280	0,401
	„ 60 „	0,240	—

Morgenmilch. $\frac{21}{4}$ 1865 in Gussander'schen Blechsatten, nach 26 Stunden:

Meierei, aufgestellt bei 10—12° C. 0,506 %

Keller, „ „ ca. 1° „ 0,318 „

Milch vom $\frac{21}{4}$ 1865 mit 3,138 % Fett in Gussander'schen Blechsatten:

Meierei, aufgestellt bei ca. 12—13° C. 0,302 %

Keller, „ „ „ 2—3° „ 0,261 „

J. Moser.³⁾ Ungleich fette Milch bei verschiedener Temperatur. (1858.)

		Wassergehalt	Trocken-Subst.	Fett
		%	%	%
Auf 15° R. gekühlt,	Morgenmilch, frisch . . .	86,80	13,20	4,62
48 Stunden lang im Kühl-	„ abgerahmt . . .	90,24	9,76	0,62
bad von 5—9° R.	Abendmilch, frisch . . .	85,31	14,69	5,34
	„ abgerahmt . . .	89,36	10,64	1,37
Ca. 23° R. warme Milch	Fettärmere Milch, frisch . .	88,26	11,74	3,04
in einem Raume von 16° R.	„ „ abgerahmt . . .	90,06	9,94	1,28
während 7¼ Stunden.	Fettreichere Milch, frisch .	86,65	13,35	4,16
	„ „ abgerahmt . . .	89,49	10,51	0,95

¹⁾ Chem. Arkersmann 1856, 56.²⁾ R. Martini, Die Milch. (Asbjörnsen, Norsk Landmandsbog f. 1868, 103.)³⁾ Arenstein's Allgem. Land- u. Forstw.-Ztg. 1858, 612.

Al. Müller.⁵⁾ Magermilch von 3.49 % Fettgehalt.

		Höhe der Milchschiebt mm	Fettgehalt in 100 cem					
			nach 12	23	24	72	96	120 Stunden
8,5—11° C.	a. bei	1. 0	0,92 g	0,63 g	0,29 g	0,25 g	0,31 g	0,32 g
		2. 95	1,95 "	1,62 "	1,23 "	1,11 "	1,05 "	0,88 "
		3. 190	2,08 "	1,81 "	1,46 "	1,32 "	1,17 "	1,01 "
		4. 285	2,22 "	— "	— "	— "	— "	— "
20—24° C.	b. bei	1. 0	0,66 "	0,43 "	— "	— "	— "	— "
		2. 95	2,05 "	1,58 "	— "	— "	— "	— "
		3. 190	2,32 "	1,87 "	— "	— "	— "	— "
		4. 285	2,41 "	— "	— "	— "	— "	— "

Al. Müller.²⁾ Milch von 3,85 % Fettgehalt, gab nach der Aufrahmung in Magermilch:

	Milchmenge ccm	Höhe der Milchschiebt mm	Fettgehalt	
			nach 24	nach 36 Stunden
1. Verschlussene Glasflasche	580	120	0,42 ^{0/10}	0,20 ^{0/10}
2. Offenes Cylinderglas	1500	255	1,36 "	1,42 "
3. " "	712	202	1,25 "	0,78 "
4. " "	760	100	0,13 "	0,18 "
5. Gussander'sche Blechsätze	2000	28	0,13 "	0,14 "

Al. Müller.³⁾ Frische Morgenmilch von 3,99 % Fettgehalt lieferte bei 15° C. Magermilch von:

	Höhe der Milchsäure	Fettgehalt (bei Proben vom Boden) nach 12 Stdn.	nach 24 Stdn.
1.	25 mm	0,25 %	0,29 %
2.	100 "	0,30 "	0,34 "
3.	200 "	0,39 "	0,43 "

Al. Müller,⁴⁾ Milch bei 20° C.:

Bezeichnung der Milchsicht		Fett in 100 cem Magermilch nach 12 Stunden
I. Hoher Cylinder bei 335 mm Höhe der Milchsicht	1. am Boden	0,66 g
	2. 95 mm	2,05 "
	3. 100 "	3,32 "
	4. 285 "	2,41 "
II. Flacher Cylinder, 6,85 mm Höhe	1. am Boden	0,56 "
	2. 75 mm	1,90 "

Al. Müller.⁹⁾ Frische Abendmilch vom $\frac{20}{1}$ 1862 in tubulirten Glasglocken bei 170 mm hoher Schichtung (1-3).

	Nach 20 Stunden	Trocken-Subst.	Wasser	Fett	Zucker	Protein	Salz
1. Auf nahe 0° C. gekühlt	10,04	89,96	1,02	8,41			0,61%
2. Bei ca. 15° C.	11,04	88,96	2,27	4,89	3,25		0,63 "
3. " " 30° C.	11,69	88,31	3,02	8,09			0,58 "
4. Gussander'sche Sutte bei ca. 15° bei ca. 5 cm hoher Milchschieht	10,33	89,67	1,24	5,22	3,25		0,62 "
Ursprüngliche Milch	13,05	86,95	4,19	4,48	3,19		0,69 "

⁵⁾ Landw. Versuchsstationen 1866, 8, 72. Im Mai 1863 wurden 2 gleiche Cylinder zu je 335 mm Höhe mit 2370 g frischer Morgenmilch von 3,49 % Fettgehalt gefüllt, mit Deckel versehen, worin 4 Röhre zur Probenahme aus verschiedener Höhe befestigt waren.

²⁾ Landw. Versuchsstationen 1867, 9, 129.

²⁾ Ebendasselbst 1865, 7, 137.

⁴⁾ Ebendaselbst 1866, **8**, 398.

³⁾ Ebendasselbst 1865, 7, 137.
⁴⁾ Ebendasselbst 1866, 8, 398.
⁵⁾ Ebendasselbst 1867, 9, 139. Der Autor bemerkt, dass die Proben der abgerahmten Milch nicht so genommen werden konnten, dass auf ihren Fettgehalt sichere Schlüsse zu gründen wären.

Al. Müller.¹⁾ Abendmilch vom $\frac{1}{2}$ 1862 in cylindrischen Glasglocken, mit Glasplatte bedeckt, gesammte abgerahmte Milch nach 20 Stunden:

	Trocken-Subst.	Wasser	Fett
1. ungefähr 20°. .	11,55	88,45	2,48 % (nach 23 Stdn. sauer)
2. " 35°. .	12,73	87,27	3,79 " (" 14 " " und geronnen)
3. " 50°. .	—	—	— " (" 17 " noch süß, aber in Gährung)
			(" 20 " sauer)

Ursprüngliche Milch 13,71 86,29 4,44 "

Frische Morgenmilch vom $\frac{3}{12}$ 1862, von 3,35 % Fettgehalt, in Glasflaschen von ca. 1200 ccm Inhalt zu 110 mm Höhe geschichtet.

Nach 18 Stdn. Fettgehalt d. Magermilch

a) nahe am Boden b) nahe unt. d. Rahmdecke

	a)	b)
1. Bei 28°, verkorkt	0,92 %	?
2. " 18°, offen	0,53 "	1,70 % (gesäuert u. geronnen)
3. " 18°, verkorkt	0,47 "	1,68 "
4. Abwechselnd (8-mal) auf 32 $\frac{1}{2}$ ° erwärmt		noch süß.
u. auf 6° gekühlt, verkorkt, unbewegt	0,60 "	1,26 "
5. Bei 1°, verkorkt in eiskaltem Wasser	0,53 "	1,25 "

Dahl.²⁾ Morgenmilch von 3,217 % Fettgehalt (Swartz'sches Verfahren).

	nach 24 Stunden	Fettgehalt der Magermilch bei 4°	bei 8-10°
" 36 "		0,61 %	1,19 %
" 48 "		0,52 "	1,11 "
		0,48 "	1,04 "
		bei 3°	bei 6,5°
" 24 "		0,52 %	0,73 %
" 36 "		0,48 "	0,60 "

Abendmilch von 3,31 % Fettgehalt.

U. Kreusler, Kern u. Dahlen.³⁾ Milch von 2,95 % Fett wurde in cylindrischen Glasgefäßen von etwa 6 cm Durchmesser etwa 18,6 cm hoch aufgefüllt, in Wasserbädern genau gleichbleibenden Temperaturen ausgesetzt.

Temperatur ° C	Procentiger Fettgehalt der Magermilch. Dauer der Aufrahmung in Stunden:									
	8	16	28	40	52	64	76	88	112	136
2	—	1,895	1,708	1,429	1,377	1,201	1,118	—	0,802	0,633
4	2,229	1,909	1,632	1,557	1,265	1,084	0,945	—	0,728	0,546
6	2,279	1,822	1,626	1,213	1,214	1,078	0,889	0,837	0,699	0,588
8	2,050	1,871	1,508	1,358	1,137	0,981	0,824	—	0,658	0,550
10	1,994	1,742	1,398	1,171	1,080	0,899	0,797	0,692	0,602	—
15	1,824	1,467	1,096	0,917	—	—	—	—	—	—
20	1,460	1,264	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1,502	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1,481	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Milch von 2,95 % Fettgehalt.

Höhe der Milchsicht	Procentiger Fettgehalt der Magermilch					
	bei Temperatur:	6°	2°	4°	8°	10°
35 mm		0,979	0,831	0,603	0,436	0,559
186 "		1,708	1,632	1,626	1,508	1,398

¹⁾ Landw. Versuchstationen 1867, 9, 140, 141.

²⁾ B. Martiny, Die Milch II, 76.

³⁾ Landw. Jahrb. 1875, 4, 280.

G. Naser.¹⁾

			Temperatur	Gehalt der Magermilch	
				nach 15 Stunden an Trocken-Subst.	an Fett
1. Milch von 13,64 % Trocken-Subst. u.	a. in Eis gekühlt	bei 5° C.		12,28 %	1,30 %
3,79 % Fett, 5 cm hoch	b. nicht gekühlt	" 19° "		12,64 "	1,45 "
2. Milch von 12,68 % Trocken-Subst. u.	a. in Eis gekühlt	" 3,5° "		10,34 "	0,50 "
3,22 % Fett, 5,5 cm hoch geschüttet	b. nicht gekühlt	" 20° "		11,24 "	1,43 "

Einfluss der atmosphärischen Luft auf die Absonderung des Rahms und den Gehalt der Magermilch.

Al. Müller.²⁾ Frische Abendmilch von 4,0 % Fettgehalt, bei 16° C. Anfangstemperatur.

			Fettgehalt nach 24 Stdn. vom Boden genom. Proben	
11/3 1861	Verschlussenes Gefäß	sauer und geronnen	—	—
	Cylindrisches	offen, säuerlich, nicht geronnen	0,6 %	
	Flaches	vollkommen süß	0,4 "	

Einfluss des Luftdruckes.

Dahl.³⁾ Milch von guter Beschaffenheit in Cylindergläsern mit einem Durchmesser von 4,9 cm und bis zur Höhe von 34 cm über dem Boden mit Milch gefüllt.

1873 Datum	Fettgehalt der ursprüngl. Milch	Dauer in Stunden	Temperatur °C	Fettgehalt der Magermilch	
				bei Luft- verdünnung	bei gewöhnl. Druck
24/1	3,64	24	1—6	1,28 %	1,08 %
25/1	3,20	47	2—9	0,97 "	0,79 "
27/1	3,20	47	10—16,5	1,74 "	1,62 "
27/1	3,35	22	2—6	1,21 "	1,15 "
28/1	3,36	23	3—7	1,44 "	1,36 "

Einfluss des Kochens der Milch.

Al. Müller.⁴⁾ Milch von 3,49 % Fettgehalt, 1. Mai 1863 wurde in Gefässen 81—85 mm hoch geschichtet.

			Fettgehalt der Magermilch in 100 cem nach 12 Stdn. nach 23 Stdn.	
I. Milch frisch gekocht, bei 9,0° C.	am Boden entnommen	0,79 g	0,64 g	
aufgestellt	unter der Rahmdecke	?	2,97 "	
II. Erst nach 12 Stunden in Wasser	am Boden entnommen	?	0,41 "	
auf ca. 95° erhitzt, bei 9° aufgestellt	unter der Rahmdecke	?	1,65 "	
(Devonshire-Verfahren)				
III. Ohne Erwärmen, aufgestellt bei	am Boden entnommen	0,56 g	0,31 "	
20—22° C.	unter der Rahmdecke	1,90 "	1,56 "	

Verschiedene Art der Abrahmgefässe.

Al. Müller. ⁵⁾	Morgenmilch 29/6 1861.	Milchmenge cem	Höhe mm	Fettgehalt der Magermilch		
				nach 9 1/2 Stdn.	nach 24 Stdn.	nach 36 Stdn.
1.	Verschlussene Glasflasche	580	120	—	0,42 %	0,20 %
2.	Offenes Cylinderglas	1500	255	—	1,36 "	1,42 "
3.	"	712	202	—	1,25 "	0,78 "
4.	"	760	100	—	0,13 "	0,18 "
5.	Gussander'sche Blechsatto	2000	28	0,43 %	0,13 "	0,14 "

¹⁾ W. Fleischmann, Das Molkereiwesen 1878.²⁾ Landw. Versuchsanstalten 1867, 9, 122.³⁾ Milchzig. 1873, 2, 708. W. Fleischmann, Das Molkereiwesen. Braunschweig 1875, 238.⁴⁾ Landw. Versuchsanstalten 1866, 8, 612.⁵⁾ Ebendasselbst 1867, 9, 129. Der Fettgehalt der zur Abrahmung aufgestellten Milch betrug 3,85 %; dieselbe wurde noch 31° warm in einem Zimmer bei 22—23° aufgestellt.

Nähere Bezeichnung der Milch	Vollmilch		Zimmer- Wärme °C.	Dauer der Aufnahme Std.	Magermilch									
	Trocken- Substanz %	Fett %			Trocken- Substanz %	Fett %	Ausrah- mungs- grad %	Trocken- Substanz %	Fett %	Ausrah- mungs- grad %	Trocken- Substanz %	Fett %	Ausrah- mungs- grad %	
					Holzbütten			Emailirt. Gusseisen			Verzinkt. Eisenblech			
					Gleiches Gewicht, Milchhöhe der Schüttung verschieden									
Kirchner. ¹⁾														
1. Abendmilch, $\frac{8}{12}$ 1877	12,00	3,265	ca. 13	38	9,30	0,645	82,55	—	—	—	9,59	0,490	86,78	
2. " $\frac{10}{12}$ "	11,85	3,35	"	38	9,58	0,48	87,91	—	—	—	9,59	0,41	89,76	
3. " $\frac{13}{12}$ "	11,41	3,03	"	38	9,19	0,435	87,49	—	—	—	9,27	0,437	87,30	
4. " $\frac{15}{12}$ "	11,85	3,18	12	38	9,62	0,588	84,17	9,39	0,49	86,66	9,29	0,33	90,86	
5. " $\frac{22}{12}$ "	11,87	3,18	9	38	9,81	0,817	78,60	9,77	0,760	78,30	9,75	0,800	78,11	
6. " $\frac{3}{1}$ 1878	12,02	3,46	11,5	38	9,69	0,86	78,89	9,46	0,66	83,23	9,40	0,50	87,41	
7. " $\frac{7}{1}$ "	11,86	3,44	11	38	9,19	0,345	91,85	9,12	0,325	91,85	9,18	0,300	92,58	
					Gleiche Höhe der Schüttung (45 mm), ungleiches Gewicht									
8. " $\frac{8}{1}$ "	12,00	3,50	12	38	9,39	0,41	90,77	9,29	0,255	94,05	9,32	0,24	94,37	
9. " $\frac{12}{1}$ "	11,71	3,21	12	38	9,25	0,39	89,74	9,27	0,26	93,26	9,15	0,303	92,24	
10. " $\frac{15}{1}$ "	11,85	3,29	11	38	9,40	0,425	89,47	9,23	0,20	94,99	9,24	0,18	95,40	
11. " $\frac{19}{1}$ "	11,92	3,27	10,5	38	9,59	0,515	86,16	9,07	0,26	93,52	9,17	0,155	96,00	
12. " $\frac{26}{1}$ "	11,78	3,06	12	38	9,44	0,49	86,21	9,31	0,235	93,65	9,20	0,165	95,48	
13. " $\frac{28}{1}$ "	11,98	3,52	11	38	9,32	0,35	92,10	9,29	0,335	92,17	9,18	0,28	93,44	
14. Mittel von 1—7 (Höhe der Schüttung: Holz 41 mm, Emaille 65 mm, Blech 56 mm) . . .	—	—	—	—	—	—	84,49	—	—	85,01	—	—	87,54	
15. Mittel v. 8—13 (Höhe der Schüttung gleich- mässig 45 mm) . .	—	—	—	—	—	—	89,07	—	—	93,61	—	—	94,49	
					Holzbütten			Thonbütten			Blechsatten			
					Gleiche Höhe der Schüttung (60 mm), nahezu gleiches Gewicht									
Schrodt u. von Peter. ²⁾														
1. Morgenmilch, $\frac{13}{4}$ 1880	—	3,12	10,5	24	—	0,755	79,15	—	0,600	84,18	—	0,539	85,10	
2. " $\frac{14}{4}$ "	—	3,155	11	24	—	0,83	78,48	—	0,70	80,72	—	0,69	81,15	
3. " $\frac{16}{4}$ "	—	3,096	11,5	24	—	0,77	78,95	—	0,56	87,74	—	0,53	85,31	
4. " $\frac{18}{4}$ "	—	3,06	11,5	24	—	0,835	77,37	—	0,62	82,32	—	0,485	86,42	
5. " $\frac{17}{4}$ "	—	3,10	11,5	24	—	0,875	79,42	—	0,755	79,13	—	0,695	81,82	
6. " $\frac{19}{4}$ "	—	2,985	11	24	—	0,60	83,09	—	0,49	87,12	—	0,42	88,88	
7. " $\frac{20}{4}$ "	—	3,095	13	24	—	0,84	76,78	—	0,775	79,64	—	0,60	83,44	
8. " $\frac{22}{4}$ "	—	2,95	12,5	24	—	0,63	81,72	—	0,51	85,83	—	0,48	85,90	
9. " $\frac{23}{4}$ "	—	2,73	12,5	24	—	0,60	80,96	—	0,585	81,06	—	0,57	81,32	
10. " $\frac{28}{4}$ "	—	2,88	10	36	—	0,42	87,60	—	0,22	93,65	—	0,27	92,04	
11. " $\frac{30}{4}$ "	—	2,82	10	36	—	0,57	82,44	—	0,49	85,18	—	0,525	83,59	
12. " $\frac{30}{4}$ "	—	2,935	11	36	—	0,65	81,81	—	0,38	88,98	—	0,42	87,91	
13. " $\frac{1}{5}$ "	—	3,022	11	36	—	0,634	82,06	—	0,506	85,92	—	0,447	87,41	
14. " $\frac{2}{5}$ "	—	3,049	10	36	—	0,738	79,32	—	0,695	80,51	—	0,586	83,47	
15. Mittel von 1—9 . .	—	—	—	24	—	—	79,55	—	—	82,75	—	—	84,37	
16. " 10—14 . .	—	—	—	36	—	—	82,65	—	—	86,85	—	—	86,88	

¹⁾ Milchztg. 1878, 7, 185. Die Milch stammte jedesmal von 5 Kühen und war stets von amphoterer Reaktion; sie gelangte unmittelbar nach dem Melken in die Gefässe.

²⁾ Milchztg. 1880, 9, 373. Die Holzbütten waren innen und aussen mit Oelanstrich versehen.

⁵ N. J. Pford u. Storch. Milchztg. 1877, 6, 629. Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 2, 79, 81.

ermilch
Spec.
Gew.

Nähere Bezeichnung des Aufnahmeverfahrens		Dauer der Aufnahme Std.	Temperatur des Eiswassers °C.	Fettgehalt der Vollmilch %	Fettgehalt der Magermilch %	Ent- nahms- grad %
38. Eis	7/9	34	10	3,46	0,52	—
39. Wasser		34			0,89	—
40. Büten		34			0,51	—
41. Kis	24/9	34	10	3,89	1,28	—
42. Wasser		34			1,67	—
43. " "		34			1,69	—
44. Eis, stark	2/10	34	9,7	3,63	1,24	—
45. Wasser in Holzbassin		34			1,38	—
46. " " gemauertem Bassin		34			1,43	—
47. " " Holzbassin		34	14,4		1,43	—
3) Swartz'sches und Holstein'sches Verfahren: ¹⁾						
48. Swartz'sche Gefäße m. Eiskühl.	Milch von 10 Angler Kühen (12,07 % Trocken-Substanz) Winterfutter	36	5—8	3,35	0,73	—
49. Holstein'sche Satten		36	ca. 14		0,49	—
50. Swartz'sche " "	Milch v. 10 Angler Kühen b. Weide- gang (12,53 % Trocken-Substanz)	36	5—8	3,65	0,54	—
51. Holstein'sche " "		36	14		0,37	—
52. Eiskühlung ²⁾		—	—	—	0,19	—
53. " "		—	—	3,78	0,20	—
54. " "		—	—	—	0,29	—
Tremser- (auch Oberkühlung) und Swartz'sches (Boden- und Seitenkühlung) Verfahren: ³⁾						
55. Tremser Verfahren mit Wasser gekühlt 4 Stunden		24	7,5	3,27	1,233	67,6
56. " " " " " 5 " "		24	8,5	3,28	1,215	68,0
57. " " " " " 6 " "		24	8,0	3,41	1,122	72,0
58. " " " " " 12 " "		36	8,5	3,76	0,923	79,0
59. Tr. m. Wasser gekühlt 5 Stunden	28/5	24	9,5	3,115	1,05	70,6
60. Sw. " " " 24 " "		24	12,0		1,04	70,7
61. Tr. " " " 12 " "	29/5	24	11,0	3,350	1,335	65,1
62. Sw. " " " 24 " "		24	11,5		1,22	67,9
63. Tr. " " " 2 1/2 " "	31/5	24	9,5	2,85	1,085	66,2
64. Sw. " " " 2 1/2 " "		24	11,8		0,640	80,8
65. Tr. " " " Milch vorher durch Lawrence'schen Kühler gegangen 1/6	24	24	9,5	3,31	1,130	70,2
66. Sw. " " " " "		24	12,0		1,011	73,8
67. Tr. mit Wasser gekühlt 4 Stunden	3/6	24	10,8	3,15	0,990	72,6
68. Sw. " " " " "		24	9,5		0,360	90,4
69. Tr. " " " 2 1/2 " "	4/6	24	11,0	2,755	1,020	68,0
70. Sw. " " " 2 1/2 " "		24	9,0		0,510	84,3
71. Tr. nach 2 1/2 stünd. Kühlung mit Wasser, Eis Eisverbrauch wie oben	4,1 kg	24	10,0	2,90	1,050	70,0
72. Sw. Eis	18,0 " "	24	9,5		0,645	81,0
73. Tr. " "	4,2 " "	24	10,2	3,08	1,21	65,8
74. Sw. " " wie vorher	24,0 " "	24	11,2		0,63	83,0

¹⁾ M. Schrodt und Ph. du Roi. Milchztg. 1879, 8, 585. Im Mittel von je 5 Aufnahmversuchen.²⁾ N. Engström. Milchztg. 1879, 8, 661.³⁾ M. Schrodt. Milchztg. 1880, 9, 625.

Nähere Bezeichnung des Aufrahmverfahrens		Dauer der Aufrahmung Std.	Temperatur der Milch beim Abrahmen °C.	Fettgehalt der Vollmilch %	Fettgehalt der Magermilch %	Ent- rahmungs- grad %
		Eisverbrauch				
75. Tr.	wie vorher	24	10,0	3,035	1,07	69,0
76. Sw.	wie vorher	24	10,0	—	0,75	87,5
77. Tr.	wie vorher	24	10,0	2,90	1,215	63,0
78. Sw.	wie vorher	24	13,0	—	0,520	84,4
79. Tr.	wie vorher	24	10,5	2,98	1,19	65,4
80. Sw.	wie vorher	24	13,2	—	0,89	74,6
81. Tr.	wie vorher	24	10,5	2,705	0,95	70,3
82. Sw.	wie vorher	24	13,0	—	0,62	80,1
83. Tr.	wie vorher	24	11,5	2,84	1,05	67,1
84. Sw.	wie vorher	24	15,2	—	0,645	79,8
85. Tr.	wie vorher	30	12,0	2,74	0,79	74,8
86. Sw.	wie vorher	30	14,0	—	0,435	86,0
87. Tr.		24	—	3,24	1,54	—
88. Sw. Kaltwasser		24	—	—	1,05	—
89. Tr.		24	—	1,05	1,39	—
90. Kaltwasser		24	—	—	0,73	—
6) Aufrahmung in Blechsatten ohne Kühlung ¹⁾ bei 10—12° C. des Lokales. Schüttung in der Höhe von 45—50 mm:						
91. Milch von Angler Kühen; im Mittel von 10 Versuchen		—	—	3,28	0,425	—
Maxim.		—	—	—	0,528	—
Minim.		—	—	—	0,299	—
7) 92. Swartz'sches Verf. mit Eiskühlung ²⁾						
93. desgl.		—	ca. 2	3,313	0,698	Sp. Gew. 1,0342
94. desgl.		—	"	3,269	0,799	1,0342
95. desgl.		—	"	3,020	0,673	1,0342
96. desgl.		—	"	3,366	0,467	1,0340
97. desgl.		—	"	3,272	0,519	1,0339
97. Aufrahm. bei einer mittleren Temperatur von 15° C.		—	—	3,313	1,350	1,0333
98. desgl.		—	—	3,269	1,035	1,0332
99. desgl.		—	—	3,020	1,024	1,0330
100. desgl.		—	—	3,366	0,931	1,0332
101. desgl.		—	—	3,272	0,357	1,0340
8) 102. Swartz'sches Verf., ³⁾ Abendmilch						
103. Amerikanische Massenaufrahmung, Reimer's Milchwanne, m. Destinorisch. Rahmrechen		24	ca. 3	2,97	0,63	82,47
104. desgl.		24	"	3,035	0,68	80,86
105. desgl.		24	"	2,405	0,505	81,86
106. desgl.		24	5	2,80	0,78	76,12
107. desgl.		24	7	3,12	0,83	77,63
108. desgl.		36	7	2,885	0,285	91,53
109. desgl.		36	7	2,72	0,46	85,56

¹⁾ M. Schrodtt und du Roi. Milchztg. 1879, 8, 558.

²⁾ P. Vieth. Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 8, 349.

³⁾ M. Schrodtt. Milchztg. 1880, 9, 400.

Nähere Bezeichnung des Aufrahmverfahrens	Dauer der Aufrahmung Std.	Temperatur der Milch beim Abrahmen °C.	Fettgehalt der Vollmilch %	Fett der Magermilch %	Ent- rahmungs- grad %
109. wie 108	36	7	2,96	0,345	90,09
110. desgl.	24	6,5	3,005	0,605	83,03
9) Amerikanische Massenaufrahmung, ¹⁾ System Reimer's, Rahmrechen u. Ahlborn'sche Abflusseinrichtung f. Rahm:					
111. } Höhe der Schüttung 12,3 cm bei ca. 14° C.	24	—	3,147	0,828	78,07
112. }	34	—	3,274	0,753	81,96
113. }	36	—	3,153	0,744	79,71

Verschiedene Aufrahmverfahren.

Kaltwasser- und Cooley'sches Verfahren.

M. Schrodt u. H. Hansen. ²⁾		Vollmilch Fettgehalt %	Temp. d. Milch beim Abrahmen °C.	Magermilch Fettgehalt %	Entrahmungs- grad %
12-stündige Aufrahmdauer.					
1. a) Ungekühlte Milch, Mittel von	Cooley	3,14	11,4	1,223	66,7
2. je 5 Versuchen	Kaltwasser	3,14	11,4	1,453	58,8
3. b) Gekühlte Milch, ca. 14° C.,	Cooley	3,08	11,8	1,316	62,3
4. Mittel von je 5 Versuchen	Kaltwasser	3,08	11,8	1,487	56,5
24-stündige Aufrahmdauer.					
5. Ungekühlte Milch, Mittel von	Cooley	3,27	8,04	0,417	89,2
6. je 12 Versuchen	Kaltwasser	3,27	8,04	0,500	87,0
36-stündige Aufrahmdauer.					
7. a) Ungekühlte Milch, Mittel von	Cooley	3,12	12,0	0,489	86,5
8. je 5 Versuchen	Kaltwasser	3,12	12,0	0,609	83,0
9. b) Gekühlte Milch, 13—15° C.,	Cooley	3,40	11,0	0,929	76,5
10. Mittel von je 5 Versuchen	Kaltwasser	3,40	11,0	1,008	72,4
36-stündige Aufrahmdauer.					
11. Ungekühlte Milch, Mittel von	Cooley	3,01	12,0	0,788	77,6
12. je 5 Versuchen	Kaltwasser	3,01	12,0	0,918	73,1

Cooley'sches Verfahren.

Cooley'sches Verfahren.						
H. P. Armsby, A. F. Hilbert u. T. G. Short. ³⁾			Wassertemperatur °C.			
Mittel ganzer Perioden:						
Periode	I	Kuh No. 1, Jersey-Kreuzung	4,51	0,66	0,69	92,0
"	II		4,24	1,38	0,46	94,0
"	III		4,04	1,32	0,52	93,8
"	IV		3,80	1,36	0,42	94,6

¹⁾ W. Fleischmann. Bericht der Milchw. Versuchsstation Raden 1888, 47.²⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 16, 368. Das Cooley'sche Verfahren unterscheidet sich von dem Kaltwasserverfahren nur dadurch, dass bei ersterem gleichzeitig auch Luftabschluss stattfindet und dass geschlossene Gefässe unter Wasser zu stehen kommen. Bei allen vorstehenden Versuchen wurde bei dem „Kaltwasser-Verfahren“ fast auch einmal so viel Milch verwendet als bei dem Cooley'schen. Der hohe Fettgehalt der Magermilch bezw. die schlechte Entrahmung der Milch bei den Versuchen unter 9—12 wird auf die Beschaffenheit der Milch, welche man als „träge“ bezeichnet, und welche bei Uebergang von Trocken- zu Grünfütterung aufzutreten pflegt, zurückgeführt.³⁾ Vergl. Anmerkung ¹⁾ S. 364.

<i>H. P. Armsby¹⁾ etc.</i>	Periode	I	II	III	IV	Kuh No. 2, reine Jersey	Kuh No. 3, Jersey-Kreuzung	Vollmilch	Wasser-	Magermilch	Entrahmungs-
								Fettgehalt %	temperatur °C.	Fettgehalt %	grad %
								6,06	1,38	0,24	97,5
								5,90	2,55	0,10	97,9
								5,80	2,72	0,19	97,9
								5,73	2,74	0,25	97,5
								6,17	1,27	0,31	96,9
								6,05	2,43	0,43	95,3
								5,95	2,72	0,26	97,6
								6,06	2,71	0,27	97,2

Procentiger Fettgehalt der Voll- und Magermilch nach sofortigem und verzögertem Einguss in die Cooley-Kannen (Kaltwasser-Aufrahmverfahren).

Nach Babcock, Milchztg. 1892, 21, 332.

Anzahl der Versuche, Zeit zwischen Melken und Eingiessen	Fettgehalt der Milch	Bei sofortigem Eingiessen			Bei verzögertem Eingiessen in die Kannen		
		Fettgehalt der Magermilch			Fettgehalt der Magermilch		
		Max. %	Min. %	Mittel %	Max. %	Min. %	Mittel %
27 Versuche und Verzögerung 15 Minuten	4,31	0,51	0,22	0,33	0,60	0,26	0,40
26 " " " 20—40 "	4,62	0,56	0,32	0,39	0,71	0,38	0,51
38 " " " über 40 "	4,51	0,48	0,23	0,30	0,71	0,30	0,47

Aufrahmung in der Forsaga'schen Milchsätte, verglichen mit den Swartz'schen Milchbehältern (Centrbl. Agrik.-Chem. 1890, 19, 787—788).

Die Forsaga'sche Milchsätte lieferte folgende Resultate:

Milchmenge, l	65	65	100	100
Zeit der Aufrahmung, Stunden	5	5	5	10
Fett in der Magermilch, %	0,55	0,43	0,50	0,28

Die gewöhnlichen hohen Swartz'schen Eimer ergaben folgende Resultate:

Milchmenge, l	—	35	35	35
Zeit der Aufrahmung, Stunden	12	24	48	72
Fett in der Magermilch, %	0,69	0,83	0,57	0,42
		0,58	0,62	0,56
				0,37

Henry H. Wing u. Clinton D. Smith (Ball. landw. Versuchsstation an der Cornell Universität Ithaca N. Y. XX. Septbr. 1890, S. 60—67; Centrbl. Agrik. Chem. 1891, 20, 698—703 machen Angaben über den Fettgehalt der Magermilch bei verschiedenen Abrahmmethoden in Satten, mit und ohne Wasserzusatz.

¹⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 17, 1. Bei jeder der drei Kühe wurden vier Fütterungsperioden von je 2—4 Wochen eingehalten, nämlich:

Fütterung für den Tag:

Periode I.	Kuh No. 1. Maismehl 4,5 kg, Kleeheu 6,9 kg. 1884. 1.—18. März.
	Kuh No. 2 u. 3. Weizenkleie 2,3 kg, Maismehl 3,2 kg, Sauerheu von Klee 4 kg und Wiesenheu nach Belieben. 1885. 2.—28. Februar.
Periode II.	Kuh No. 1. Maismehl 2,5 kg, Baumwollsaamenmehl 0,9 kg, Kleeheu 6,9 kg. 1888. 19. März bis 8. April.
	Kuh No. 2 u. 3. Weizenkleie 2,3 kg, Maismehl 1,8 kg, entöltes Leinmehl 1,4 kg, eingesäuerter Rothklee 4 kg, Wiesenheu nach Belieben. Kuh No. 2 vom 1.—18. März. Kuh No. 3 vom 1.—21. März.
Periode III.	Kuh No. 1. Maismehl 2 kg, Malzkeime 2,2 kg, Kleeheu 6,9 kg. 1884. 9.—22. April.
	Kuh No. 2 u. 3. Weizenkleie 2,3 kg, Maismehl 3,2 kg, entöltes Leinmehl 1 kg, Sauerheu und Klee 4 kg, Wiesenheu nach Belieben. 1885. 22. März bis 11. April.
Periode IV.	Wie Periode I. Kuh No. 1. 1884. 23. April bis 13. Mai. Kuh No. 2 u. 3. 12. April bis 2. Mai.

Die Kühe waren sämtlich frischmilchend.

Nähere Bezeichnung der Milch	Fettgehalt der Vollmilch		Fettgehalt der Magermilch			
			Eisverfahren nach 34-stündiger Aufrahmung		Bütten	
	%	%	%	%	%	%
N. J. Fjord u. Storch. ¹⁾						
1879. Rosvang.						
1. September 8., Abendmilch	3,28	3,22	0,73	1,11	0,63	0,64
2. " 9., Morgenmilch	3,25	3,17	0,73	1,27	—	—
3. November 2., Morgenmilch	—	—	1,34	1,90	1,26	1,42
4. " 2., Abendmilch	—	—	1,54	2,48	1,54	2,04
5. " 22., Morgenmilch	—	—	1,66	2,38	0,96	1,24
6. " 22., Abendmilch	—	—	2,05	2,59	1,10	1,36
1880. Rosvang.						
7. September 2., Abendmilch	—	—	0,53	0,94	0,66	0,50
8. " 3., Morgenmilch	—	—	0,51	1,08	0,65	0,44
9. Oktober 5., Abendmilch	—	—	0,81	1,45	0,74	0,92
10. " 6., Morgenmilch	—	—	0,79	1,34	0,68	0,82
11. November 23., Abendmilch	—	—	1,42	2,44	1,04	1,11
12. " 24., Morgenmilch	—	—	2,12	2,57	1,08	1,12
Alte Kühe.						
13. April 21., Abendmilch	—	—	0,20	0,42	0,43	0,43
14. " 22., Morgenmilch	—	—	0,17	0,44	0,23	0,45
Fettgehalt der Magermilch: Centrifugen von Nielsen u. Petersen						
1881. Rosvang, Egebaksunde und Marselisborg.						
15. Rosvang, Mai 4., Morgenmilch	0,24	0,27	0,89	1,08	0,59	0,82
16. " 4., Abendmilch	0,15	0,17	0,66	0,98	0,48	0,76
17. " Juni 14., Morgenmilch	0,15	0,14	0,58	0,95	0,52	0,79
18. " 14., Abendmilch	0,13	0,17	0,52	0,17	0,49	0,74
19. " August 23., Morgenmilch	0,24	0,17	0,67	1,77	0,57	0,60
20. " 23., Abendmilch	0,11	0,05	0,66	1,33	0,49	0,73
21. " September 3., Abendmilch	0,13	0,07	0,80	1,36	0,54	0,63
22. " 4., Morgenmilch	0,13	0,05	0,81	1,43	0,54	0,66
23. Egebaksunde, August 27., Morgenmilch	0,05	0,04	0,51	1,25	0,50	0,48
24. " 27., Abendmilch	0,10	0,09	0,48	1,09	0,60	0,53
25. Marselisborg, Septemb. 12., Morgenmilch	0,09	0,12	0,49	0,79	0,42	0,45
26. " 12., Abendmilch	0,09	0,12	0,47	0,61	0,45	0,53
27. " 19., Morgenmilch	0,13	0,10	0,90	1,07	0,63	0,65
28. " 19., Abendmilch	0,09	0,14	0,47	0,58	0,47	0,72
Centrifuge von de Laval						
	Shorthorn	Jüten	Shorthorn	Jüten	Shorthorn	Jüten
29. 1880. Juli 12—23. (verschiedene Ställe)	—	—	0,23	1,45	0,40	0,57
30. " 9., Morgenmilch	0,14	0,19	0,31	1,37	0,43	0,55
31. " 9., Abendmilch	0,14	0,16	0,23	0,89	0,37	0,47
32. " 12., Morgenmilch	0,16	0,20	0,28	1,15	0,35	0,59
33. " 12., Abendmilch	0,16	0,16	0,36	1,15	0,43	0,70
34. September 12., Abendmilch	0,19	0,30	0,29	1,10	0,45	0,47
35. " 13., Morgenmilch	0,19	0,22	0,38	1,62	0,45	0,63

¹⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 1881, II, 98.

Nähere Bezeichnung der Milch	Fettgehalt der Centrifugen- Magermilch		Fettgehalt der Magermilch			
			Eisverfahren		Bütten	
	nach 34-stündiger Aufrahmung					
	%	%	%	%	%	%
1881. Mai bis Sept. Durchschnitt d. Analysen.	Shorthorn	Jüten	Shorthorn	Jüten	Shorthorn	Jüten
36. Vestervikloster und Vejlegaard	0,17	0,22	0,30	1,25	0,41	0,57
37. desgl. und verschiedene Höfe	0,16	0,18	0,32	1,15		
	Centrifugen von Nielsen u. Petersen					
	Angler	Jüten	Angler	Jüten	Angler	Jüten
38. Rosvang	0,76	0,14	0,71	1,13	0,53	0,72
39. Egebaksunde	0,08	0,07	0,50	1,17	0,51	0,56
40. Marselisborg	0,10	0,12	0,57	0,76		

II. Entrahmung durch Centrifugen verschiedener Systeme.

Heinr. Petersen's Schäl-Centrifuge.

Heinr. Petersen's Schäl-Centrifuge.

Nähere Bezeichnung der Milch	Vollmilch		Magermilch		
	Spec. Gew.	Fett %	Spec. Gew.	Fett %	Reaktion
<i>W. Fleischmann.¹⁾</i>					
1. Aus Oldesloe	8/2	1882	—	—	schwach säuerlich
2. " "	30/3	"	—	—	
3. " Woldegk	17/12	1883	1,0315	2,946	
4. " " (700 l Milch in d. Stunde)	6/5	1884	—	—	sauer
5. " Stavenhagen	7/8	"	—	—	—
6. " Hamburg	11/11	"	—	—	gewässert
7. " "	20/11	"	—	—	—
8. " "	12/12	"	—	—	gewässert

Nähere Bezeichnung der Milch	Milch in der Stunde kg	Trommel- umläufe in der Min.	t °C.	Vollmilch		Magermilch		Anschei- nungs- grad %
				Spec. Gew.	Fett %	Spec. Gew.	Fett %	
<i>W. Fleischmann u. R. Sachtleben.²⁾</i>								
FrISCHE Morgenmilch der Radener Herde:								
9. Mittel von 5 Versuchen	370,4	1677	5	—	3,237	—	0,827	78,5
10. " " 6 "	374,1	1664	10	—	3,117	—	0,601	84,0
11. " " 5 "	378,4	1644	15	—	3,136	—	0,438	88,4
12. " " 5 "	381,0	1661	20	—	3,149	—	0,403	89,1
13. " " 5 "	394,9	1671	25	—	3,126	—	0,331	90,9
14. " " 6 "	383,1	1661	30	—	3,059	—	0,284	92,1
15. " " 6 "	377,0	1669	35	—	3,040	—	0,254	92,9
16. " " 9 "	383,0	1663	40	—	3,520	—	0,224	94,4
17. Transportirte Milch aus Mamerow, frISCHE Morgenmilch, Mittel von 6 Versuchen	400,9	1681	25	—	3,137	—	0,307	91,9
18. 12 Stunden alte Abendmilch der Radener Herde, Mittel von 6 Versuchen	378,1	1632	25,4	—	3,156	—	0,354	90,7

¹⁾ Ber. d. Milchw. Versuchsanstalt Raden 1888, 21; 1883, 46; 1884, 75 u. ff.²⁾ Milchztg. 1882, II, 593 u. 610.

Anhang zu Magermilch.

Centrifugen von Burmeister und Wains.

Kleine dänische Centrifuge.

Magermilch

W. Fleischmann.¹⁾

1. Aus Woldegk (500 l Milch in der Stunde)

Spec. Gew.
1,0340

Fett
0,434

Reaktion
sauer

M. Schmoeger.²⁾

Milch in der
Stunde
kg

Temperatur
der Vollmilch
°C.

Vollmilch
Fett
%

Magermilch
Fett
%

2.	30. Januar	190,0	33,1	3,37	0,27
3.	31. "	193,0	35,0	3,39	0,26
4.	28. "	285,0	33,7	—	0,41
5.	29. "	305,0	34,4	3,36	0,41
6.	4. Februar	188,7	27,5	3,49	0,30
7.	26. "	196,2	27,5	3,12	0,29
8.	1. März	305,3	27,5	3,35	0,44
9.	2. "	294,8	27,5	—	0,40
10.	4. März	189,5	20,0	—	0,45
11.	5. "	165,0	20,0	—	0,45
12.	6. "	279,2	20,0	2,95	0,74
13.	28. Februar	290,4	20,0	—	0,50
14.	3. März	279,2	20,5	3,22	0,59
15.	7. März	171,1	13,1	3,21	0,50
16.	10. "	181,5	13,7	—	0,55
17.	12. "	266,7	13,1	—	0,86

M. Schmoeger.³⁾ Einfluss des während des Centrifugirens innegehaltenen Verhältnisses zwischen ablaufender Magermilch und Rahm; Mittel von je 2 Versuchen. Temperatur und Milchmenge in den angegebenen Grössen annähernd.

		Milch in der Stunde	Temperatur der Vollmilch	Vollmilch Fett %	Magermilch Fett %
18.	Rahm : Magermilch = 1 : 9	150 Liter	35 ° C.	3,85	0,175
19.	" : " = 1 : 10	150 "	35 "	3,75	0,180
20.	" : " = 1 : 4	300 "	35 "	3,67	0,27
21.	" : " = 1 : 10	300 "	35 "	3,40	0,52
22.	" : " = 1 : 4	150 "	12,5 ° C.	3,38	0,255
23.	" : " = 1 : 10	150 "	12,5 "	3,58	0,405
24.	" : " = 1 : 4	300 "	12,5 "	3,60	0,67
25.	" : " = 1 : 10	300 "	12,5 "	3,58	1,065

Einfluss des Fettgehaltes der Vollmilch auf die Entrahmung.

26.	Rahm : Magermilch = 1 : 5	150 Liter	35 ° C.	fettarm	2,60	0,21
27.	" : " = 1 : 8	150 "	35 "	fettarm	2,63	0,18
28.	" : " = 1 : 5	150 "	35 "	fettarm	3,50	0,19
29.	" : " = 1 : 5	300 "	35 "	fettarm	2,81	0,385
30.	" : " = 1 : 8	300 "	35 "	fettarm	2,72	0,455
31.	" : " = 1 : 5	300 "	35 "	fettarm	3,45	0,39
32.	" : " = 1 : 5	150 "	7,5 "	fettarm	1,95	0,44
33.	" : " = 1 : 8	150 "	7,5 "	fettarm	1,96	0,345
34.	" : " = 1 : 5	150 "	7,5 "	fettarm	3,07	0,40
35.	" : " = 1 : 5	250 "	7,5 "	fettarm	2,17	1,07
36.	" : " = 1 : 8	250 "	7,5 "	fettarm	2,04	0,795
37.	" : " = 1 : 5	250 "	7,5 "	fettarm	2,97	1,07

¹⁾ Ber. d. Milchwirthsch. Versuchsstation Raden 1888, 21; 1883, 46; 1884, 75 u. ff.

²⁾ Ber. d. Milchw. Instituts Proskan 1883/84, 8.

³⁾ Ebendasselbst 1884/88, 11 u. ff. und 1885/86, 11.

Frisch gemolkene Morgenmilch im Mittel von 4 Versuchen.

	Milch in der Stunde	Temperatur der Vollmilch	Vollmilch Fett %	Magermilch Fett %
38. Rahm : Magermilch 1 : 5	ca. 190 Liter	29° C.	2,64	0,175

In Eiswasser gestellte und wieder angewärmte Mittag- und Abendmilch.

39. Rahm : Magermilch 1 : 5	190 Liter	29° C.	2,91	0,19
-----------------------------	-----------	--------	------	------

Morgenmilch 12 Stunden in Eiswasser gestellt, dann centrifugirt ohne Anwärmen.

40.	Zulauf ca. 200 Liter	12,5° C.	1,50	0,25
41. Kuhwarme Abendmilch	" " 200 "	31,2 "	3,66	0,22
42. " "	" " 300 "	31,2 "	3,66	0,48

Burmeister's kleine Centrifuge.

N. J. Fjord u. Storch.¹⁾

a. Der Gesamt-Magermilch-entnommen:

Temperatur der Vollmilch °C.	Zuströmung in der Stunde Pfd.	Umdrehungen in 1 Stunde	Magermilch Fettgehalt %
24,8	298	1946	0,21
24,7	434	2385	0,22
24,2	701	2931	0,28

b. Magermilch abzüglich des ersten und letzten Antheils.

°C.	Pfd.	%
27,8	278	0,23
27,7	444	0,23
27,9	694	0,22

April bis September 1882:	Pfd.	Mittel	Min.	Max.
Im Mittel von 9 Versuchen (Analysen)	1290	2410	0,12	0,09 0,15
" " " 28 " "	2435	2410	0,22	0,15 0,39
" " " 8 " "	1290	2410	0,12	0,11 0,12
" " " 4 " "	2435	2410	0,25	0,22 0,28
" " " 4 " "	3580	2410	0,41	0,38 0,47
" " " 4 " "	4720	2410	0,71	0,64 0,79

Einfluss des Stehens der Milch auf den Erfolg des nachfolgenden Entrahmens.

Abendmilch:	alsbald entrahmt bei 29,3° C.	am nächsten Morgen kalt 11° C.	Morgen erwärmt 40° C.
a. 450 Pfd. Milch in der Stunde durchschnittlich	0,20	0,49	0,20
b. 300 " " " " "	0,09	0,23	0,10
	alsbald entrahmt bei 30° C.	am nächsten Morgen allein centrifugirt 12° C.	Morgen mit der Hand entrahmt und centrifugirt 12° C.
c. 450 Pfd. Milch, im Durchschnitt v. 4 Versuchen	0,25 %	0,25 %	0,23 %

P. Vieth.²⁾ (1886) Im Mittel von 110 Proben zwischen 0,2 und 0,5 % Fett.*
(1887.) " " " 71 " " 0,14 " 0,43 " " **)¹⁾ Milchztg. 1883, 12, 55 u. 68.²⁾ Milchztg. 1886, 15, 131 und 1887, 120.³⁾ Mit ganz wenigen Ausnahmen.⁴⁾ Der Fettgehalt von 3 anderen Proben lag über 0,5 % und betrug 0,55, 0,62 und 0,63 %.

Nähere Bezeichnung der Versuche				Milch in der Stunde kg	Umdehnungen in der Minute	Wärme der Milch °C.	Vollmilch		Magermilch		Ent- nahme- grad %	
							Spec. Gew.	Fett %	Spec. Gew.	Fett %		
W. Fleischmann u. J. Berendes. ¹⁾												
1.	Im Mittel von je 6 Versuchen			305	3396	40	1,0306	3,766	1,0354	0,303	93,36	
2.				297	3291	30	1,0307	3,685	1,0349	0,358	92,11	
3.				295,8	3357	20	1,0309	3,902	1,0352	0,399	91,83	
4.				302,5	3397	10	1,0311	3,798	1,0346	0,735	84,80	
5.				ca. 200	3380	30	1,0314	3,304	1,0348	0,250	93,92	
6.				" 250	3380	30	1,0314	3,329	1,0348	0,266	93,59	
7.				" 350	3376	30	1,0320	3,559	1,0356	0,392	91,12	
8.				" 400	3334	30	1,0322	3,410	1,0357	0,392	90,55	
			Rahm- ausbeute in %									
9.	Versch. Rahmmenge bei 40° C.	17,6	308	3389	40	1,0322	3,295	1,0354	0,292	92,69		
10.	" " " 40 "	10,4	309	3342	40	1,0322	3,299	1,0355	0,357	90,31		
11.	" " " 30 "	20,7	293	3298	30	1,0319	3,266	1,0352	0,302	92,66		
12.	" " " 30 "	11,5	300	3399	30	1,0319	3,305	1,0351	0,373	90,02		
13.	" " " 20 "	20,5	298	3436	20	1,0318	3,271	1,0349	0,333	91,89		
14.	" " " 20 "	11,0	300	3422	20	1,0318	3,272	1,0349	0,486	86,78		
15.			352	3365	30	1,0319	3,177	1,0350	0,322	51,95		
16.			400	3409	30	1,0319	3,156	1,0349	0,363	90,42		
Verbesserte dänische Centrifuge — Type B — von Burmeister und Wain.												
C. Pepper-Louisenhof. ²⁾												
1.	Warme, eben ermolkene Milch		450	3391	ca. 30	—	—	—	0,411	—		
2.			400	3400	"	—	—	—	0,302	—		
3.			300	3395	"	—	—	—	0,254	—		
4.			250	3398	"	—	—	—	0,179	—		
5.	Kalte, die Nacht über in Kühlwasser gestellte Milch		250	3356	12,5	—	—	—	0,310	—		
6.			200	3390	"	—	—	—	0,226	—		
7.	desgleichen, schwach entrahmt		300	3392	"	—	—	—	0,301	—		
8.			250	3387	"	—	—	—	0,284	—		
9.			200	3398	"	—	—	—	0,129	—		
10.	Warme und kalte, transportirte Milch		350	3398	ca. 20	—	—	—	0,379	—		
11.			300	3395	"	—	—	—	0,299	—		
12.			300	3400	ca. 10	—	—	—	0,320	—		
13.			250	3389	"	—	—	—	0,221	—		

¹⁾ Milchztg. 1886, 15, 589, 609 u. 629. Die 1885 in Raden aufgeführten Versuche währten von Anfang September bis Anfang December. Die verwendete Milch zeigte gleich anfänglich und bis Anfang November die Erscheinung der "Trägheit" der Milch, welche sich ganz erst Mitte November verlor. Die unter 15 u. 16 verzeichneten Proben beziehen sich auf nicht träge Milch; nach der Autoren Berechnung bezieht sich bei den vorstehenden Versuchen und bei Berücksichtigung aller Verhältnisse der Einfluss der Trägheit auf die Entrahmung der Milch derart, dass Magermilch von träger Milch 0,065% Fett mehr enthält als solche von nicht träger. Die Erscheinung der Trägheit der Milch im Ausnehmen zeigte sich in Raden nach 10-jähriger Beobachtung regelmässig zweimal im Jahre.

²⁾ Milchztg. 1885, 14, 697.

Verbesserte dänische Centrifugen von Burmeister u. Wain. Modell 1889.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Stunde	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbente an		Fettgehalt der		Ent- nahme- grad %
					Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	

Handcentrifuge.

Versuche von M. Schrodtt und H. Tiemann. Milchztg. 1890, 19, 823.

10	Mittel	175,0	7246	30,62	21,21	77,89	3,174	0,369	90,84
	Minimum } der	164,8	7360	30,7	21,69	77,28	3,15	0,33	91,82
	Maximum } Leistung	187,3	7104	32,0	18,89	80,44	3,47	0,40	90,62

Centrifuge für Kraftbetrieb.

Versuche von M. Schrodtt und H. Tiemann. Milchztg. 1889, 18, 821.

6	Mittel	500,1	4025	28,47	15,30	84,24	2,885	0,248	92,50
6	"	553,1	4028	28,01	17,50	81,98	3,137	0,323	91,51
6	"	597,4	3969	27,85	16,87	82,48	3,297	0,397	90,03
	Mittel sämtl. 18 Ver- suche bei 25—30°C.	550,2	4007	28,11	16,56	82,90	3,106	0,323	91,35
6	Mittel	397,4	4052	14,57	16,28	83,15	3,292	0,323	91,77
6	"	490,7	3908	14,33	16,31	83,27	3,295	0,412	89,53

B-Centrifuge.

Versuche von J. Klein. Bericht über die Thätigkeit des milchw. Institutes Proskau. 1889/90, S. 19.

					Rahm zu Magermilch wie				
6	Mittel	507,4	4250	34,4	1 : 5,14	3,43	0,167	95,75	
5	"	619,0	4188	34,9	1 : 5,02	3,27	0,214	94,53	
5	"	679,2	4170	34,8	1 : 4,99	3,27	0,212	94,64	
9	Mittel	556,4	4278	26,5	1 : 4,96	3,43	0,206	95,01	
8	"	679,4	4238	25,8	1 : 5,10	3,46	0,265	93,56	

Fesca'sche Centrifuge.

Nähere Bezeichnung der Versuche				Milch in der Stunde kg	Umdrehungen in der Minute	Wärme der Milch °C.	Vollmilch		Magermilch		Ent- nahme- grad %
							Spec. Gew.	Fett %	Spec. Gew.	Fett %	
W. Fleischmann u. R. Sachtleben. ¹⁾											
I. Reihe. Bei annähernd gleichen Milchmengen:											
			Ringe No.								
1.	Im Mittel von 3 Versuchen . . .	13/16	177,9	3907	35	—	3,269	—	1,632	51,0	
2.	" " " 2 " . . .	12/16	178,6	3793	35	—	3,335	—	1,521	55,9	
3.	" " " 3 " . . .	11/16	182,9	3969	35	—	3,175	—	0,503	85,4	
4.	" " " 3 " . . .	10/16	186,8	3969	35	—	3,105	—	0,383	89,3	
5.	" " " 3 " . . .	9/16	184,5	3896	35	—	3,141	—	0,360	90,5	
6.	" " " 3 " . . .	8/16	187,5	4139	35	—	3,129	—	0,352	91,1	

¹⁾ Milchztg. 1883, 12, 369 und 385. Die Zahlen der dritten Reihe sind zum Theil der ersten und zweiten Reihe entnommen.

Lefeldt'sche Centrifugen.

Nähere Bezeichnung der Versuche	Milch in der Stunde kg	Umdrehungen in der Minute	Wärme der Milch ° C.	Vollmilch		Magermilch		Ent-rahmungs-grad %
				Spec. Gew.	Fett %	Spec. Gew.	Fett %	
Modell No. 0 (1883).								
W. Fleischmann u. J. Berendes. ¹⁾								
Molkerei Raden:								
1. Mittel von 9 Versuchen	246	5851	35	1,0312	3,277	1,0347	0,353	90,63
2. " " 10 "	245	6011	30	1,0314	3,375	1,0352	0,355	91,01
3. " " 10 "	250	6046	25	1,0317	3,298	1,0353	0,385	90,36
4. " " 9 "	251	6034	20	1,0309	3,227	1,0346	0,418	88,83
5. " " 3 "	149	5934	25	1,0308	3,218	1,0341	0,252	93,27
6. " " 3 "	319	6000	25	1,0311	3,317	1,0341	0,617	83,76
7. " " 6 "	367	5988	25	1,0306	3,258	1,0338	0,666	82,17
Modell 1885.								
W. Fleischmann u. J. Berendes. ²⁾								
8. Mittel von 4 Versuchen	323,7	6174	35	1,0310	3,073	1,0341	0,348	90,49
9. " " 4 "	318,6	6013	30	1,0310	3,231	1,0343	0,385	90,12
10. " " 4 "	275,9	6367	35	1,0317	3,286	1,0356	0,257	93,35
11. " " 4 "	250,4	6128	30	1,0310	3,437	1,0351	0,283	92,61
12. " " 4 "	268,7	6048	25	1,0316	3,553	1,0358	0,296	92,70
13. Im Mittel der Versuche von No. 10—12 .	265	6181	30	1,0314	3,425	1,0355	0,279	92,89
14. Mittel von 4 Versuchen	225,3	6100	35	1,0320	3,303	1,0360	0,202	94,73
15. " " 4 "	226,4	6234	30	1,0318	3,430	1,0358	0,197	95,09
16. " " 4 "	225,3	6380	25	1,0318	3,348	1,0357	0,266	93,21
17. Im Mittel der Versuche von No. 14—16 .	225,7	6238	30	1,0319	3,360	1,0358	0,222	94,34

Arnold'sche Handcentrifuge No. 0 von Lefeldt und Lentsch in Schöningen.

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchtg. 1892, 21, 514.

Zahl der Versuche	Stündliche Leistung kg	Kurbelumdrehungen in der Minute	Temperatur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent-rahmungs-grad %
				Rahm %	Magermilch %	Vollmilch %	Magermilch %	
5	Ältere Maschine (A)	104,6	60,3	32,2	—	—	3,03	0,30
7	Neuere " (B)	100,0	50,8	33,7	—	—	3,00	0,32
	Mittel der 12 Versuche A und B	103,56	—	—	17,1	82,94	3,01	0,31
5	Neuere Maschine (B).	90,1	50,36	—	15,62	84,97	3,07	0,31

¹⁾ Ber. d. Milchw. Versuchstation Raden 1884, 50.²⁾ Milchtg. 1886, 15, 269. Als Durchschnittswerte ergaben sich für die Entrahmung mittelst dieser Centrifuge Modell 1885, bei 30° C. in der Stunde:
bei 6013 Trommelumgängen i. d. Min. 319 kg Milch i. d. St. bis auf einen Fettgehalt der Magermilch von 0,28% (Reihe 9);
bei 6181 Trommelumgängen 265 kg Milch bis auf einen Fettgehalt i. d. Magermilch von 0,28% (10—12);
" 6238 " 226 " " " " " " " " " " 0,22% (14—16).

Nähere Bezeichnung der Versuche

^{*)} Ber. d. Milchw. Versuchsanstalt Raden 1883, 23, 44, 52.

Handseparator mit liegender Trommel.
Versuche von W. Fleischmann und O. Neubert. Bericht über die Wirksamkeit der Versuchsmolkerei Kleinhof-Tapiau 1887/88. Danzig 1889, 70.

Versuche von M. Schrodtt und O. Henzold. Milchztg. 1887, 16, 258.

Der Separator stellt nur geringe Anforderungen an die Kräfte des Arbeitenden, so dass Ver. annehmen können, dass dieser Handseparator auch von Personen weibl. Geschlechtes bedient werden kann.

Versuche von Kirchner in Halle. Milchztg. 1887, 16, 470.

Anmerkung zu den Versuchen von M. Schrödt, so erhält man bei 148,6 kg stündlicher Leistung

und 30,6° C. bei einem Fettgehalt der Vollmilch von 2,894 % und der Magermilch von 0,467 % einen Entrahmungsgrad von 87,3 %.

Zur einstündigen Inbetriebhaltung ist die Kraft eines kräftigen Mannes erforderlich.

Versuche von Eugling und Klenze. Milchztg. 1887, 16, 569.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung Liter	Kurbel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch ° C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent- rahmungs- grad %
					Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	
15	Mittel	134	39	28,5	16,1	83,90	4,37	0,35	92,8
	Minimum der Leistung	105	36	25,0	12,8	87,20	3,81	0,40	90,8
	Maximum „ „	147	40	30,0	19,0	81,00	4,19	0,29	94,3

Die erforderliche Arbeitskraft war eine unerwartet geringe. Junge Leute von 18—20 Jahren drehten bis zu 2 Stunden, ohne sich dabei sichtlich anzustrengen.

Handseparator mit senkrecht stehender Trommel.

Versuche von M. Schrodtt und O. Henzold. Milchztg. 1887, 16, 258.

		kg	Trommel- umdrehg.						
20	Mittel	85,1	6090	29,9	18,49	80,88	3,324	0,426	89,55
	Minimum der Leistung	64,97	6000	30,1	15,90	84,10	3,06	0,46	87,35
	Maximum „ „	109,0	5910	29,4	21,47	77,43	3,52	0,55	87,73

Bezieht man die Mittelzahlen bei einer stündlichen Leistung von 80 kg Milch von 30° C. auf eine Geschwindigkeit von 6000 Umdrehungen in der Minute und nimmt man nach Fleischmann an, dass der procentige Fettgehalt der Magermilch im umgekehrten Verhältniss zum Quadrat der Messzahl der Trommelumdrehungen in der Minute steht, so berechnet sich ein Fettgehalt von 0,412 %, was einem Entrahmungsgrade von 89,89 % entspricht.

Nach den Versuchen waren die Ansprüche, welche der Betrieb des Separators an die Kräfte des Arbeitenden stellt, recht erheblich; es konnte die Arbeit bei einer Innentemperatur von 40 Kurbelumdrehungen in der Minute von einer mittelkräftigen Person kaum länger als 1 Stunde geleistet werden.

Baby-Handseparator.

Versuche von Joh. Siedel. Milchztg. 1889, 18, 973.

			Kurbel- umdrehg.						
8 17 12	Mittel	49,2	43,8	26,9	16,21	80,13	4,770	0,301	94,93
	„	49,8	40,0	30,3	17,27	80,93	4,876	0,236	96,06
	„	56,8	40,0	32,0	19,47	79,40	4,855	0,210	96,52

Versuche von W. Fleischmann und O. Neubert. Wirksamkeit der Versuchsmolkerei

Kleinhof-Tapiau 1887/88. Danzig 1889, 70.

6	Mittel	59,2	40,0	30,3	17,92	80,00	3,17	0,39	89,83
---	------------------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------

Ueber sonstige Versuche mit de Laval's Handcentrifugen siehe

1. Rava: Kgl. Milchw. Versuchsstation Lodi. Milchztg. 1887, 16, 818.
2. W. Strecker: Journ. f. Landwirtschaft 1887, 35, 313—333.
3. C. Besana: Staz. sperim. agr. ital. 1888, 14, 435—437.

De Laval's Dampfturbinenseparator.

Versuche von W. Fleischmann und O. Neubert. Bericht über die Wirksamkeit der Versuchsmolkerei Kleinhof-Tapiau 1887/88. Danzig 1889, 74.

		kg	Trommel- umdrehg.						
11	Mittel	345,5	6385	30,7	14,47	84,24	3,56	0,29	93,03
	Minimum des Fett- gehaltes der	300,0	6600	34,5	9,75	90,00	3,31	0,24	93,45
	Maximum Magermilch	324,3	6330	31,7	17,25	81,25	3,69	0,38	91,48

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent- rahmungs- grad %
					Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	
10	Mittel	400	6447	30,4	21,42	76,63	3,86	0,37	92,48
	Minimum des Fett- gehaltes der Magermilch	375	6270	29,5	19,25	77,50	3,76	0,30	93,57
	Maximum	400	6800	30,8	19,50	79,75	4,03	0,42	91,60

De Laval's Dampfseparator I vom Jahre 1887.

Versuche von J. Klein. Bericht über die Thätigkeit des milchw. Instituts Proskau 1888/89, 9.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent- rahmungs- grad %
					Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	
6	Mittel	399,1	7200	31,1	1:4,87	3,35	0,17	95,78	
	"	459,6	6974	32,8	1:4,63	3,08	0,22	94,13	
	"	503,5	7070	34,9	1:4,76	3,27	0,22	94,44	
	"	544,8	7003	34,7	1:4,86	3,29	0,24	93,93	

Alfa-Separatoren des Bergedorfer Eisenwerkes.

Handseparatoren.

1. Handseparator „Alfa-B.“

Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapien. Milchztg. 1892, 21, 156.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch °C.	Kurbel- umdrehg. %	Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	Ent- rahmungs- grad %
4	Mittel	248,7	40,0 ^{*)}	29,2	15,16	84,05	3,225	0,254	—	
	Schwankungen	245—253	38,5—41,5	29,0—29,5	10,20—21,60	82,00—88,76	3,10—3,36	0,20—0,33	—	
6	Mittel	247,1	40,3	30,1	14,70	84,04	3,070	0,250	—	
	Schwankungen	244—253	39,5—40,8	28,7—31,7	14,00—16,65	82,00—84,80	2,86—3,23	0,24—0,27	—	
6	Mittel	255,2	40,4	20,7	16,03	83,15	3,279	0,317	—	
	Schwankungen	253—256	39,9—40,8	19,1—21,8	15,40—16,40	82,48—83,80	3,10—3,43	0,29—0,33	—	
6	Mittel	254	40,2	40,0	15,52	83,52	3,211	0,190	—	
	Schwankungen	250—257	39,6—40,9	39,7—40,6	14,80—16,52	82,96—84,24	2,90—3,57	0,17—0,22	—	
3	Mittel	144	40,0	15,1	15,67	83,93	3,035	0,211	—	
	Schwankungen	133—150	39,7—40,3	14,3—15,6	13,67—19,87	79,06—86,00	2,92—3,18	0,19—0,22	—	

Versuche von Backhaus und Neumann. Milchztg. 1892, 21, 338.

7	Mittel	239 ^{*)}	41,34	30,5 ^{*)}	14,32	84,82	3,489	0,220 ^{*)}	—
---	------------------	-------------------	-------	--------------------	-------	-------	-------	---------------------	---

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchztg. 1892, 21, 631.

4	Mittel	247,5	40,5	34,3	15,17	85,26	3,06	0,21	94,17
	"	257,2	40,3	24,6	15,91	84,48	3,19	0,257	93,85
4	"	268,7	40,8	19,5	16,25	84,00	3,10	0,37	90,61
	"	309,5	40,45	34,0	16,42	83,09	3,13	0,258	93,11
2	"	318,7	41,4	24,4	15,50	85,25	3,07	0,36	90,07

Versuche von P. Vieth in Hameln. Milchztg. 1896, 25, 135.

3	Mittel	363,3	42,5	35,5	—	—	3,09	0,133 ^{*)}	—
	Schwankungen	360—368	37,5—45,0	27,2—34,8	—	—	3,00—3,21	0,11—0,15	—

*) 40 Kurbelumdrehungen entsprechen 5080 Trommelumdrehungen.

**) Mittel aus 6 Versuchen.

***) Die Milch wurde kuhwarm verarbeitet.

*) Mittel aus 4 Versuchen. Das Fett wurde in der Magermilch gewichtsanalytisch bestimmt.

**) Nach Gerber bestimmt.

Versuche von E. Ramm. Milchztg. 1897, 26, 52—54.

Zahl der Versuche			Stündliche Leistung	Kurbel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent- rahmungs- grad
			kg		°C.	Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	%
	Mittel von 4 Versuchen		379	45	34	19,0	16,3	2,99	0,218	—
	Schwankungen		nicht vorhanden			12,2—29,4	9,9—22,7	2,64—3,29	0,21—0,23	—
1	Ohne	Erweiterung	353	45	35	14,3	24,7	3,69	0,17	—
	Mit	des Zulaufes	377	45	35	14,0	24,9	3,63	0,17	—
1	Ohne	Erweiterung	348	45	26	14,0	25,2	3,69	0,20	—
	Mit	des Zulaufes	382	45	26	15,6	22,2	3,63	0,20	—
1	Ohne	Erweiterung	346	45	17	13,3	26,2	3,69	0,24	—
	Mit	des Zulaufes	375	45	17	16,0	21,4	3,63	0,25	—

2. Alfa-Handseparator (mit Hegender Welle).

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchztg. 1892, 21, 615.

5	Mittel	251,92	40,88	33,0	14,71	—	3,30	0,18	95,35
4	"	268,45	40,75	24,6	15,37	—	3,30	0,22	94,36
5	"	267,32	41,3	20,1	16,20	—	3,44	0,28	93,18
6	"	274,1	41,03	15,7	17,51	—	3,32	0,39	90,31

Alfa-Handseparator K. (Friktionsantrieb mit Hegender Welle).

Versuche in Kleinhof-Tapian. Milchztg. 1894, 23, 155.

6	Mittel	258	40,2	29,5	15,30	83,44	3,43	0,289	—
	Minimum der Leistung	252	40,0	29,4	15,94	82,97	3,32	0,290	—
	Maximum " "	265	40,0	28,2	17,31	81,63	3,745	0,260	—
	Minimum des Fett- gehaltes der Maximum Magermilch	258	42,0	29,8	11,51	86,46	3,220	0,315	—

3. Alfa-Baby-Separator.

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchztg. 1891, 20, 1001.

5	Mittel	126,9	40,6	34,1	15,41	84,60	2,92	0,176	94,98
6	"	130,5	40,6	25,4	15,93	85,38	2,85	0,198	94,14
6	"	130,0	40,6	20,3	15,34	85,29	2,92	0,247	92,68
5	"	128,9	40,6	15,3	15,59	84,97	3,13	0,324	91,13

Der Kraftbedarf ist ein hoher. Die Centrifuge erfordert, wenigstens so lange sie noch nicht eingelaufen ist, eine erwachsene Person.

Versuche von Hittcher in Kleinhof-Tapian. Milchztg. 1891, 20, 152.

6	Mittel	122,5	40,25	29,54	14,83	84,87	3,406	0,267	93,33
	"	121,0	40,4	14,35	13,00	86,77	3,282	0,680	81,02
6	Minimum der Leistung	115,5	40,0	11,1	7,84 ^{*)}	92,16	3,275	1,180	66,78
	Maximum " "	123,5	41,5	13,0	14,80	84,40	3,410	0,475	88,14

^{*)} Ein Theil des überaus fettreichen Rahmes blieb als eine butterähnliche Masse im Inneren der Trommel und erschwerte während der zweiten Hälfte des Versuches das Austreten des Rahmes beträchtlich. Man muss annehmen, dass die mit fallender Temperatur zunehmende Zähflüssigkeit der Milch bei einem gewissen Wärmegrade so gross wird, dass der aus der Milch abgeschiedene, überaus konsistente Rahm nur noch unvollständig durch den schmalen Rahmschlitz austreten vermag und daher theilweise mit der Magermilch abfließt.

4. Alfa-Kolibri-Handseparator.

Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapiau. Milchztg. 1896, 25, 249.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung	Zahl der Züge in der Minute	Temperatur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Centrifugenschlamm in der Milch %
					Rahm %	Magermilch %	Vollmilch %	Magermilch %	
	a) Mit der Trommel No. 65468.								
6	Mittel I	74,5	62,8	40,3	19,19	80,20	3,28	0,175	0,067
6	" II	74,3	62,1	31,0	16,19	83,10	3,19	0,253	0,060
2	" III	73,7	60,9	25,2	14,89	83,26	3,52	0,510	0,028
6	" IV	73,3	60,7	20,9	19,11	80,01	—	0,885	0,039
	b) Mit der Trommel No. 65492.								
5	Mittel V	75,9	61,3	39,4	18,67	80,49	3,07	0,234	0,079
4	" VI	77,7	60,3	30,2	16,68	82,15	3,14	0,252	—
11	Mittel aus I und V	75,1	62,1	39,9	18,98	80,33	3,185	0,202	0,073
10	" " II " VI	75,7	61,4	30,7	16,39	82,71	3,172	0,252	0,058

Alfa-Separatoren für Kraftbetrieb.

I. Alfa-Separator No. I.

7 Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapiau. Milchztg. 1894, 23, 155.

		Trommel-umdrehg.						Entrahmungsgrad
Mittel	794	5600	30,0	18,00	81,60	3,064	0,169	—
Minimum der Leistung	775	5600	30,0	16,90	82,54	3,123	0,170	—
Maximum " " "	814	5600	30,0	15,02	84,82	2,950	0,185	—
Maximum des Fettgehaltes der Magermilch								—
Minimum	785	5600	30,0	17,52	81,99	3,110	0,160	—

Resultate in der Praxis. Molkerei Fulda-Lauterbach. Milchztg. 1891, 20, 523.

Mittel von 8 Tagen .	745	5350	30,0	—	—	—	0,14	—
Minimum der Leistung	557	5300	30,0	—	—	—	0,17	—
Maximum " "	819	5350	30,0	—	—	—	0,12	—

II. Alfa-Separator No. II.

Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapiau. Milchztg. 1891, 20, 333.

6	Mittel	1590	5370	30,2	15,89	83,58	3,030	0,198	94,6
	Minimum der Leistung	1432	5350	28,7	19,29	80,54	3,200	0,175	95,6
	Maximum " "	1607	5400	29,1	15,00	83,22	3,065	0,200	94,5
5	Mittel	1602	5551	20,2	15,30	84,54	3,148	0,290	92,2
	Minimum der Leistung	1582	5570	20,0	15,68	84,32	3,270	0,280	92,8
	Maximum " "	1622	5525	20,6	15,22	84,78	3,160	0,300	92,0
6	Mittel	1540	5491	10,0	14,56	85,16	3,092	0,579	84,0
	Minimum der Leistung	1520	5450	10,0	14,75	85,25	3,160	0,615	83,4
	Maximum " "	1555	5500	10,0	15,03	84,08	3,070	0,583	83,9

Balance-Centrifugen
der Holler'schen Karlsruhte bei Rendsburg.

Balance-Handcentrifuge.

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchztg. 1892, 21, 494.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der		Ent- nahms- grad %
					Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %	
9	Mittel	203,6	4500	34,2	13,84	83,58	2,84	0,33	90,00
5	"	199,4	4520	24,5	14,03	82,18	3,09	0,414	88,5

Der Gang der Centrifuge ist ziemlich schwer. Um die Tourenzahl innehalten zu können, werden bei längerem Betrieb zwei erwachsene Personen sich viertelstündlich ablösen müssen.

Balance-Centrifugen für Kraftbetrieb.

Versuche von M. Schrod. Milchztg. 1889, 18, 581.

20	Mittel	398,15	6534	28,53	14,59	84,89	2,985	0,236	93,28
10	"	452,7	6500	28,47	15,09	84,55	2,968	0,262	92,54
20	"	512,6	6379	27,6	15,16	84,38	2,911	0,288	91,61
20	"	568,6	6506	27,67	15,24	84,18	2,987	0,320	90,97
4	"	601,3	6460	26,85	15,26	84,22	2,935	0,335	90,32

Versuche von J. Klein. Bericht über die Thätigkeit des milchw. Instituts zu Proskau. 1889/90. S. 23.

Zahl der Versuche		Verarbeitete Milch- menge kg	Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der	Ent- nahms- grad %
						Rahm zu Magermilch wie			
7	Mittel	632,7	6874	33,7		1 : 5,86	3,34	0,267	92,63
5	"	472,6	6986	34,3		1 : 5,80	3,17	0,198	94,52
3	"	606,2	6723	27,1		1 : 5,57	3,08	0,298	92,04
3	"	520,8	6847	25,6		1 : 5,80	3,18	0,243	93,46
3	"	470,8	6843	26,7		1 : 5,88	3,27	0,210	94,51

Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapiau. Milchztg. 1894, 23, 747.

I. Versuche mit der älteren Trommel mit Wellglätten.

Reihe A. Die Milch wurde unmittelbar vor dem Eintritte in die Centrifuge pasteurisirt.

Zahl der Versuche		Verarbeitete Milch- menge kg	Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der	Ent- nahms- grad %
						Rahm	Magermilch		
3	Mittel mehr als 1500	1546	7205	69,5		15,55	83,75	3,29	0,23
4	" 1400—1500	1444	7231	72,6		16,20	83,10	3,30	0,225
3	" 1074—1300	1175	7079	70,0		13,36	85,94	3,37	0,207

Reihe B. Die Milch wurde nicht pasteurisirt.

3	Mittel 1296—1461	1386	7290	35,7	14,86	84,44	3,23	0,27	—
4	" 1405—1669	1516	6756	34,9	12,99	86,31	3,49	0,457 ^{*)}	—
3	" Temp. 12,6—18,5°	1234	7357	15,6	17,09	82,21	3,33	0,436	—

II. Versuche mit einer neueren Trommel mit röhrenförmigen Einsätzen.

Die Milch wurde unmittelbar vor dem Eintritt in die Trommel pasteurisirt.

Zahl der Versuche		Verarbeitete Milch- menge kg	Stündliche Leistung kg	Trommel- um- drehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der	Ent- nahms- grad %
						Rahm	Magermilch		
2	Mittel mehr als 1500	1611	7080	70,3	18,71	80,59	3,31	0,21	—
3	" weniger als 1400	1299	7124	75,7	19,76	79,54	3,26	0,167	—

^{*)} Die Drehungsgeschwindigkeit der Trommel war zu gering.

Flensburger Patent-Centrifuge
des Flensburger Eisenwerkes (Reinhard u. Messmer), hervorgegangen aus der
Flensburger Balance-Centrifuge.

Versuche von A. Klein. Milchztg. 1897, 26, 599—601 u. 665—666.

Zahl der Versuche	Nähere Bezeichnung der Centrifuge	Stündliche Leistung kg	Mittlere Touren- zahl	Tempera- tur der Milch ° C.	Rahm- ertrag %	Fettgehalt der	
						Voll- milch %	Mager- milch %
19	B-Centrifuge (Dampfbetrieb).						
	Mittel	634	7550	34,1	15,2	2,93	0,252
	Schwankungen	483,1-748,2	6800-8200	28-33	12,11-20,28	2,65-3,40	0,173-0,312
17	E-Centrifuge („Germania“) für Handbetrieb.		Kurbel- umdrehg.				
	Mittel	104,2	45,3	34,4	17,32	3,16	0,242
	Schwankungen	58,8-143,5	44,5-45,8	33,0-36,0	15,59-25,64	2,64-3,53	0,130-0,393

Versuche von H. Höft. Milchztg. 1894, 23, 465.

8	A-Centrifuge.						
	Mittel	1088	6750	41,5	—	—	0,138
	Schwankungen	900-1250	6500-7000	40-45	—	—	0,11-0,17

Neue Milchcentrifuge, Patent Mélotte,
der Maschinenfabrik Josef Meys, Hennef a. d. S.

Versuche von E. Ramm. Milchztg. 1897, 26, 52-54.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Kurbel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch ° C.	Rahm		Fettgehalt der	
					der Voll- milch %	Fett- gehalt %	Voll- milch %	Mager- milch %
6	Mittel	373	45	34	13,6	23,8	3,39	0,23
	Schwankungen	353-379	nicht vorhanden		10,1-16,5	21,2-27,6	3,00-3,69	0,22-0,24
11	Alte Trommel mit Einsätzen	ohne erweitertes Zuflussrohr,	45	35	16,4	21,5	3,56	0,205
		je 2 Versuche	45	26	15,7	21,6	3,56	0,24
			45	17	15,7	22,2	3,65	0,28
		mit erweitertem Zuflussrohr,	45	35	12,9	28,1	3,80	0,21
		je 1 Versuch	45	26	12,8	28,1	3,80	0,25
3	Verbesserte Trommel mit 13 Einsätzen		45	17	13,2	26,8	3,80	0,30
		362	45	35	18,7	19,0	3,73	0,147
		355	45	26	16,9	21,8	3,82	0,18
1		362	45	17	17,2	21,0	3,82	0,24

Versuche von C. Hittcher in Kleinhof-Tapiau. Milchztg. 1896, 25, 639.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Kurbel- um- drehungen in der Minute	Tempera- tur der Milch ° C.	Ausbeute an		Fettgehalt der Voll- milch %	Fettgehalt der Mager- milch %
					Rahm	Mager- milch		
30	Mittel	320,8	44,4	31,4	12,91	86,12	3,215	0,232
	Schwankungen	308,6-327,3	43,6-45,6	28,4-35,8	10,96-16,24	83,13-88,47	2,54-3,75	0,155-0,300

Zum Beweise dafür, dass die Milch verschiedener Herden unter gleichen Verhältnissen verschieden stark entrahmt wird, führte C. Hittcher folgende Versuche an:

A. Herde von Toussaint-Goldbach (35 Holländer Kühe).

Zahl der Versuche		Spec. Gewicht		Ständliche Leistung kg	Kurbel- umdrehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Ausbeute an		Fettgehalt der	
		der Voll- milch	der Mager- milch				Rahm %	Mager- milch %	Voll- milch %	Mager- milch %
10	Mittel	1,0323	1,0358	322,9	44,1	31,2	13,35	85,73	3,386	0,271
	Minimum	1,0314	1,0352	308,6	43,6	28,3	12,65	83,98	3,21	0,245
	Maximum	1,0328	1,0363	327,3	45,0	32,5	14,72	87,00	3,61	0,300

B. Herde von Lorenz-Zohphen (25 Kühe, grösstentheils Holländer, ein kleinerer Theil Kreuzungen von diesen mit rasslosem Vieh)

9	Mittel	1,0314	1,0347	322,3	44,7	31,0	11,69	87,44	3,049	0,176
	Minimum	1,0306	1,0337	315,7	43,9	28,4	10,96	86,53	2,65	0,155
	Maximum	1,0326	1,0358	327,2	45,6	35,9	12,92	88,47	3,30	0,195

Mit der Mélotte'schen Centrífuge fanden nach C. Hittcher (Milchztg. 1896, 25, 656):

15	P. Vieth: Milchztg. 1895, 24, 252 . . .	284,8	6435	34,1	—	—	—	—	3,484	0,258
12	Liebig: Molkereiztg. Berlin 1895, 231 . .	308,0	6360	33,5	—	—	—	—	3,170	0,210
20	M. Kühn: Molkereiztg. Hildesheim 1896, 149	313,0	6885	ca. 35	—	—	—	—	3,120	0,237

Victoria-Handseparator

von Watson, Laidlow u. Co. in Glasgow; in Deutschland vertreten durch Dierks und Möllmann in Osnabrück.

Versuche von J. Klein. Milchztg. 1896, 25, 624.

Zahl der Versuche		Stündliche Leistung kg	Kurbel- um- drehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Rahm- menge %	Fettgehalt der		Ent- rahmungs- grad %
						Voll- milch %	Mager- milch %	
	Victoria-Handseparator.							
4	No. 0b { Mittel	72,1	56,1	32,9	15,97	2,95	0,208	—
	{ Schwankungen	70,2—73,2	55,6—56,6*)	32,5—33,3	13,61—16,78	2,32—3,44	0,197—0,220	—
4	No. 1b { Mittel	105,7	52,4	32,7	15,94	3,07	0,223	—
	{ Schwankungen	103,5—107,1	52,2—52,7	32,0—33,8	13,97—17,33	2,79—3,34	0,203—0,250	—
4	No. 2b { Mittel	163,7	46,6	33,6	16,10	3,03	0,321	—
	{ Schwankungen	162,1—164,9	45,8—47,1	32,9—34,2	15,22—16,53	2,745—3,265	0,297—0,337	—
3	No. 2b, Mittel (älter, aber gleich konstruirt)	133,1	45,8	33,8	16,76	3,10	0,248	—

Handcentrifuge „die Geräuschlose“

von O. Braun.

Versuche von J. Klein in Proskau. Milchztg. 1889, 18, 594 und 1890, 19, 874.

		Ständliche Leistung kg	Kurbel- umdrehungen in der Minute	Tempe- ratur der Milch °C.	Rahm- menge %	Fettgehalt der	Ent- rahmungs- grad %	
						Voll- milch %	Mager- milch %	
Handcentrifuge „die Geräuschlose“								
6	Mittel	109,1	4183	34,0	17,0	3,20	0,32	91,6
	Minimum der Leistung	79,83	4000	34—36	17,5	3,60	0,24	94,4
	Maximum „ „	132,09	4900	32,5—33,5	14,2	3,22	0,32	91,5
6	Mittel	122,4	4342	32,7	17,0	3,21	0,30	92,1
	Minimum der Leistung	80,0	3550	32,3	15,2	2,74	0,27	91,6
	Maximum „ „	161,6	4700	32,0	15,7	3,25	0,34	91,0

*) Uebersetzungsverhältniss des Räderwerkes 1:184,3.

patentirte Milchcentrifuge der Aktiengesellschaft Morgards hammars. — Milchztg. 1897, 26, 555.

	Leistung in der Stunde kg	Tourenzahl	Temperatur der Milch °C.	Fettgehalt der Magermilch %
	System des Separators			
Nach Versuchen vom Molkerei-Konsumenten John Larson	I 2600 II 1800 II 1450	5600 5500 5600—5800	65 65 30	0,15 0,14 0,13
Nach Versuchen d. chem. Stat. Oerebo	II 1536 II 1512	— —	— —	0,15—0,17 0,16—0,16
Nach Versuchen d. chem. Stat. Vesteras	II 1500	5300—5350	61—64	0,14—0,18

Centrifugenmilch. Vergleichende Versuche mit verschiedenen Centrifugen.

Nähere Bezeichnung der Centrifuge	Im Mittel von Analysen	Milch in der Stunde Pfd.	Durchschnitt- liche Ge- schwindigkeit	Fettgehalt der Magermilch		
				Durch- schnitt %	Mini- mum %	Maxi- mum %
<i>N. J. Ford u. Storch.¹⁾</i>						
Gewöhnliche Ausrauhung April bis Juli 1882.						
Wärme der süßen Milch durchschnittlich 25° C.						
Kleine Burmeister	9	1290	2410	0,12	0,09	0,15
"	28	2435	2410	0,222	0,15	0,39
De Laval	5	1300	5350	0,18	0,13	0,22
"	7	2450	5350	0,31	0,21	0,39
Nielsen u. Petersen	10	1490	1490	0,11	0,08	0,13
"	14	2810	1490	0,18	0,16	0,20
Grosse Burmeister	4	1870	1950	0,15	0,11	0,17
"	8	2128	1950	0,27	0,21	0,39
September 1882.						
Kleine Burmeister	8	1290	2410	0,12	0,11	0,12
"	4	2435	2410	0,25	0,22	0,28
"	4	3580	2410	0,41	0,38	0,47
"	4	4720	2410	0,71	0,64	0,79
Grosse Burmeister	5	1780	1800	0,07	0,16	0,19
"	5	2158	1800	0,70	0,58	0,79

Sonstige Analysen über den Fettgehalt von Centrifugen-Magermilch.

1. A. Böggild: Molkereiztg. 1893, 50; Viertelj. Nahrungs- u. Genussm. 1893, 8, 361.
2. H. P. Armsby, Wm. H. Caldwell u. L. E. Reber: Prüfung von Milchcentrifugen. Pennsylvania State College Agric. Exper. Stat. 1894, Bull. No. 27. — Centrbl. Agric. Chem. 1895, 24, 842—844. Die Prüfungen beziehen sich auf: 1) De Laval's Alpha-Separator „Acme“, 2) De Laval's Alpha-Turbine, 3) the United States No. 3, 4) a Standard Russian separator.
3. Gieseler-Poppelsdorf: Welchen Handseparator sollen wir anschaffen? Der Landwirt 1892, No. 95. Centrbl. Agric. Chem. 1893, 22, 830—832. Gieseler hat die Resultate der bekannt gewordenen Versuche über die Leistungsfähigkeit der Handmilchcentrifugen in einer Tabelle zusammengestellt. Zum Schluss kommt der Verfasser zu dem Resultate: Der Landwirth kann heute von den Handmilchschleudern verlangen, dass sie von dem in der Vollmilch enthaltenen Butterfett mindestens 94% in den Rahm überführen und dass dieser dabei nicht mehr als 16% der Vollmilch ausmacht.

⁹ Milchztg. 1883, 12, 55. Unter gewöhnlicher Ausrauhung verstehen Autoren eine Arbeitsweise, durch welche die Milch 2–3 Stunden nach dem Melken oder bei dem Wärmegrad, welchen sie dann hat, abgerahmt wird, ohne dass besondere Vorkehrungen zur Abkühlung oder gegen dieselbe getroffen werden, und bei welcher 18–20 % Rahm entnommen werden.

Buttermilch.

Einige Buttermilchanalysen sind bereits oben (S. 308) im Kapitel „Butter“ mitgeteilt worden.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	
1	Ohne nähere Bezeichnung		89,67	3,41	1,58	5,34		33,01	15,30	J. B. Boussingault Quevenne ¹⁾
2			90,80	3,82	0,24	5,14		41,52	2,61	
3	Aus Rahm nach Gussander'schem Verfahren	1855	28,26	—	2,57	—	—	21,91	—	A. Stöckhardt ²⁾
4	Aus Rahm nach Gussander'schem Verfahren	1857	90,83	—	1,21	—	—	13,20	—	
5	Aus Rahm nach gewöhnlichem Verfahren (gusseiserne Satten)	"	91,26	—	1,00	—	—	11,44	—	Ignatz Moser ³⁾
6	Aus frischem, 24 stünd. Rahm, gewässert, Spülw.	1861	82,82	—	8,74	—	0,73	50,88	—	
7	Aus gestandenem, 36 stündigem Rahm, gewässert, Spülw. . . .	"	88,16	—	3,24	—	0,74	27,36	—	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
8	Burchard's Butterf. (a. ⁵⁾	1862	83,87	2,70	8,80	4,03	0,60	16,74	54,56	
9	" " (b.)	"	82,22	2,98	9,70	4,44	0,66	16,76	54,52	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
10	Holmgren's " (a.)	"	93,02	2,19	1,13	3,17	0,49	31,38	16,19	
11	" " (b.)	"	89,55	3,28	1,69	4,75	0,63	31,39	16,17	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
12	Gussander's " (a.)	"	91,64	2,59	1,50	3,66	0,61	30,98	17,94	
13	" " (b.)	"	89,34	3,30	1,91	4,67	0,78	30,96	18,92	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
14	Burchard's Butterf. (nicht gewässert)	"	90,02	2,89	1,48	4,91	0,70	28,96	14,83	
15	Holmgren's " (nicht gewässert)	"	89,79	2,93	1,55	5,15	0,58	28,70	15,18	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
16	Aus schwach saurem Rahm, Burchard's Butterfass, nicht gewässert	"	89,78	—	1,92	—	0,74	18,79	—	
17	desgl., Holsteiner Butterfass, nicht gewässert	"	88,84	3,70	0,42	5,10	0,86	33,16	12,72	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
18	desgl., Holsteiner Butterfass, stark gewässert, a.	"	95,61	1,59	0,66	1,77	0,37	36,22	15,03	
19	desgl., b. ungewässert	"	89,46	3,82	1,58	4,25	0,89	36,21	14,98	Al. Müller und Eisenstuck ⁴⁾
20										

¹⁾ E. Wolff's Landw. Fütterungslehre. Stuttgart 1881, 228.²⁾ Martiny, Die Milch II, 171. (Gussander, Neue schwedische Milchwirthschaft ohne Keller 1856, 19.) Nach Kleefütterung aus Milch mit 12—18 % Trocken-Substanz und 4,26 % Fett.³⁾ Ebendasselbst. (Arenstein's Allgem. Land- und Forstwirthsch.-Ztg. 1858, No. 39.)⁴⁾ Landw. Versuchstationen 1867, 9, 267. Der Rahm, bei 6 nahezu süß, bei 7 sauer, wurde in einem Gussander'schen Bechbutterfässchen verbuttert; auf 332,5 g Rahm kamen 40 g, bezw. bei 7 auf 319 g Rahm 40 g Spülwasser. Der Fettgehalt wurde theils durch Ausziehen des Abdampfückstandes mittelst Aether, theils durch Behandlung der frischen Substanz (auch Buttermilch) mit einem entsprechenden Gemenge von Alkohol und Aether, beide wasserfrei, nach Müller's ausgearbeiteter Methode bestimmt.⁵⁾ Ebendasselbst 1867, 9, 285. Die Butterung von Rahm und Milch ergaben Produkte in nachstehenden Verhältnissen:

bei No.	Rahm bezw. Milch	unter Zusatz von Wasser	ergaben Butter	und Buttermilch
8	5339 g Rahm	472 g	400 g	5111 g
9	2081 "	1027 "	514 "	3094 "
10	672 "	144 "	149 "	667 "
11	12617 "	—	378 "	13239 "
12	5498 "	—	139 "	5104 "

Die Zusammensetzung der Buttermilch auf ungewässerte Buttermilch unter b) bei No. 8—10 wurde von uns berechnet.

⁶⁾ Vergl. Anmerkung ³⁾ S. 385.

Nr.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milchzucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
16	Süßer Rahm, Holsteiner Butterfass, nicht gewässert	1862	88,04	4,09	2,08	4,99	0,80	34,20	17,39	5,47	Al. Müller und Eisenstuck ¹⁾
17	desgl., Gussander's Butterfass, nicht gewässert	"	87,99	4,06	2,33	4,96	0,76	33,80	19,40	5,41	
18	Aus Rieseberga, schw. gewässert	"	89,47	3,37	1,39	5,00	0,77	32,00	13,20	5,12	
19	Milch- desgl. 24 Stdn. später	1866	92,00	—	—	—	—	—	—	—	Robertson ²⁾
20	Oktbr. 3. —	"	93,00	—	—	—	—	—	—	—	
21	" 5. —	"	92,60	4,06	0,42	1,93	0,55	55,42	5,73	8,87	
22	" 7. 0,38 0,55	"	92,40	—	—	—	—	—	—	—	
23	" 8. —	"	92,60	4,35	0,40	1,68	0,50	58,79	5,41	9,41	
24	" 10. 0,38 0,50	"	91,00	4,07	0,13	3,71	0,75	45,22	1,44	7,24	
25	" 14. 0,33 0,44	"	90,60	4,94	0,09	3,52	0,50	52,55	1,96	8,41	
26	" 17. 0,28 0,43	"	91,60	3,91	0,47	2,78	0,80	46,55	5,60	7,45	
27	" 19. 0,38 0,44	"	93,00	3,64	0,14	2,22	0,55	52,02	2,00	8,32	
28	" 21. 0,45 0,53	"	93,30	4,04	0,09	1,97	0,45	60,30	1,34	9,65	
29	April 28. 0,18 0,21	1867	91,60	5,08	0,09	2,35	0,64	60,53	1,07	9,68	A. H. Sorce ³⁾
30	Mai 3. 0,17 0,30	"	92,10	4,72	0,02	2,25	0,67	59,75	0,25	9,56	
31	" 4. 0,18 0,30	"	92,00	5,03	0,17	2,22	0,44	62,88	2,13	10,06	
32	" 20. 0,09 0,27	"	86,90	—	3,60	—	—	—	27,48	—	
33	Aus Devonshire-Rahm	1873	86,40	—	4,00	—	—	—	29,41	—	
34	" Carsharton- "	"	88,86	4,88	1,23	4,21	0,81	43,81	11,04	7,01	
35	Aus 9 Liter Rahm und 2,675 kg Vorbruch, Molkerei der Alpen,	1877	87,95	5,00	0,83	5,26	0,95	41,50	6,89	6,64	
36	Molkerei Stagelse (Dänemark)	"	90,46	2,94	0,66	—	0,75	30,82	6,92	4,93	
37	Dänische Molkerei	1878	89,63	3,15	1,21	—	0,82	30,38	11,67	4,86	
38	Aus Rahm gekühlt	"	89,53	4,48	1,07	4,13	0,79	42,79	10,22	6,85	F. Storch ⁴⁾
39	" ungekühlt	"	87,41	4,20	3,63	4,00	0,76	33,36	28,83	5,34	
40	Aus Rahm gekühlt	"	89,99	3,82	0,85	4,54	0,80	38,16	8,49	6,11	
41	" ungekühlt	"	86,17	3,66	5,04	4,35	0,78	26,46	36,41	4,23	
42	Aus Rahm nach Swartz'schem Verfahren, Mittel aus mehreren Analysen	"	90,42	—	1,91	—	—	—	19,94	—	J. König ⁵⁾

¹⁾ Landw. Versuchsanstalten 1867, 4, 295, 365 u. folg. Die Butterungsansichte war folgende:
Rahm unter Zusatz von Wasser ergaben Butter und Buttermilch
12,30 Pfd. 12,30 Pfd. 3,50 Pfd. 21,1 Pfd.

Als ideale Zusammensetzung der Buttermilch giebt Al. Müller folgende Zahlen (Landw. Versuchsanstalten 1868, 5, 182):
Wasser 89,62 % Fett 1,67 % Protein 3,33 % Milchzucker 4,61 % Salze 0,77 % Trocken-Substanz 10,30 %

²⁾ Weende's Jahresber. 1866/67, 310.

³⁾ Mitgeteilt von C. Petersen. Milchztg. 1873.

⁴⁾ Milchztg. 1878, 7.

⁵⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung, 4, 179. Der Proteingehalt ist von uns aus dem angegebenen Stickstoffgehalte (0,47 bzw. 0,504 × 6,25) berechnet.

⁶⁾ Milchztg. 1881, 10, 606.

⁷⁾ Original-Mittheilung.

König, Nahrungsmittel. I. 4. Aufl.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Salze	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
			%	%	%	%	%	%	%	%	
	Spec. Gew.										
43	Aus süßem Rahm . 1,0350	1876	90,20	4,36	0,76	3,84	0,73	44,49	7,76	7,12	W. Fleischmann ¹⁾
44	" " " . 1,0345	"	90,28	—	0,80	—	0,73	—	8,23	—	
45	Aus gesäuertem Rahm (ohne Spülwasser) bei 14,5° C.	1882	91,26	3,25	0,47	3,94	0,74	36,96	5,38	5,83	derselbe ²⁾
46	Molkerei Raden (ohne Spülwasser)	1884	91,21	3,12	0,32	4,39	0,96	35,50	3,64	5,68	derselbe ³⁾
47	Dieselbe (mit 10% Spülwasser)	"	(92,09)	2,70	0,29	3,96	0,87	35,40	3,67	5,66	
48	Dieselbe (ohne Spülwasser) .	"	90,52	3,76	0,84	4,00	0,75	39,98	8,86	6,40	derselbe ⁴⁾
49	Molkerei Amhorst, Durchschn.	1885	92,00	2,65	0,20	4,55	0,60	33,13	2,50	5,30	C. A. Gocsmann ⁵⁾
50	Mittel von 20 Proben . . .	1881	92,48	—	0,35	—	—	—	4,65	—	Schwartz ⁶⁾
51	" " 10 "	"	91,70	—	0,38	—	—	—	4,59	—	
52	" " 6 "	"	92,01	—	0,29	—	—	—	3,63	—	
53	Mittel von 5 Versuchen, süß. Rahm, Holstein. Butterfass .	1882	90,52	—	0,72	—	—	—	7,60	—	M. Schwoyer ⁷⁾
54	Mittel von 5 Versuchen, sauer, Schlesisches (dän.) Butterf.	"	91,17	—	0,46	—	—	—	5,21	—	
55	Mittlere Zusammensetzung nach Fleischmann		91,24	3,50	0,56	4,00	0,70	39,90	6,39	6,38	W. Fleischmann ⁸⁾
56	Aus Saul's Molkerei in Cassel	1884	91,38	3,70	0,65	3,53	0,74	42,92	7,54	6,87	Th. Dietrich ⁹⁾
	Mittel		90,09	3,91	1,02	4,24	0,74	39,46	10,27	6,31	
	Schwankungen		82,22-93,30	1,66-6,21	0,02-5,39	2,47-5,62	0,37-0,94	16,07-62,88	0,25-54,57	2,68-10,06	

¹⁾ Milchtz. 1876, 5, 2205. Beide Proben waren von ranzigem Geruch, bitterem Geschmack und saurerer Reaktion.
²⁾ Ber. der Milchv. Versuchstation Raden 1882, 24. Der verbutterte Rahm stammt zum Theil vom Eisverfahren, zum Theil vom Centrifugenbetrieb. Die Dauer des Butterns im Holsteinischen Fass betrug 32 Minuten bei 125 Umgängen der Welle in der Minute und bei 14,5° Anfangs- und 16° C. Endtemperatur.

³⁾ Ebendasselbst 1884, 29. Die Differenz aus dem Gewichte der nach Ritthausen bestimmten Proteinstoffe und des nach Lehmann ermittelten Käsestoffes ist als Eiweiß in Rechnung gebracht. Der Milchzuckergehalt wurde aus der Differenz berechnet.

⁴⁾ Ebendasselbst 1884, 29. (Verlust bei der Analyse 0,092 %).

⁵⁾ Jahresber. der Agrik.-Chem. 1885. (Massach. Agr. Exper. Bull. No. 17.) Durchschnitt der Analysen vom 6. November 1884 bis 3. Februar 1885.

⁶⁾ Milchtz. 1882, II, 102. (Veröffentl. d. Kaiserl. Gesundheitsamtes vom 9. Jan. 1883.) Die Buttermilch enthält:

No.	Aus der Genossenschaftsmolkerei Kiel	an Trocken-Substanz		Fett	
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum
51.	" " " Itzehoe	9,42	5,41	0,59	0,16 %
52.	" " sonstigen Bezugsquellen	9,43	7,42	0,56	0,18 "
		9,80	6,21	0,45	0,18 "

⁷⁾ Milchv. Versuchstation Proskau. Milchtz. 1880, 9, 273. Die ursprüngliche Milch stammte von Holländer Kühen und enthielt im Durchschnitt 3,32 % Fett und 11,80 % Trocken-Substanz. Bei den Einzelversuchen wurde der Gehalt der Buttermilch wie folgt ermittelt:

	Fettgehalt					Trocken-Substanz				
Aus süßem Rahm	0,61	0,65	0,80	0,80	0,73	9,32	9,20	9,95	9,45	9,49 %
" saurem "	0,32	0,55	0,60	0,46	0,38	8,57	8,78	9,44	8,92	8,42 "

⁸⁾ Dessen: Das Molkereiwesen. Braunschweig 1875, 605.

⁹⁾ Privat-Mittheilung.

¹⁰⁾ Von den auf S. 308 aufgeführten Analysen sind die No. 331, 352, 359 und 362 nicht mit für die Mittelzahlberechnungen herangezogen.

Molken (Käsemilch, Quargserum).

W. Fleischmann unterscheidet von den Erzeugnissen, die man gewöhnlich unter dem Namen „Molken“ zusammenfasst:

Käsemilch, d. i. die Flüssigkeit, welche bei der Bereitung von Labkäsen zunächst zurückbleibt; Molken, d. i. die Flüssigkeit, welche aus der Käsemilch gewonnen wird, nachdem aus derselben der Zigerkäse event. auch die Käsemilchbutter ausgeschieden wurde;

Quargserum ist Molke der Sauermilchkäserei. Zu unterscheiden von Molke im engeren Sinne wäre auch noch die medicinische oder Apotheker-Molke.

Käsemilch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Milch- zucker %	Salze %	Stick- stoff- Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken- Substanz %	
1	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	1860	92,60	0,96	0,55	5,08	0,81	12,97	7,43	2,08	
2											
3	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	"	92,75	0,87	0,39	5,13	0,86	12,00	5,38	1,92	
4											
5	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	"	93,25	0,91	0,26	4,70	0,88	13,48	3,85	2,16	
6											
7	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	"	92,80	0,91	0,59	5,04	0,66	12,64	8,19	2,02	
8											
9	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	"	92,85	0,93	0,29	5,03	0,90	13,01	4,06	2,08	
10											
11	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse gewonnen	"	93,05	0,95	0,40	4,96	0,64	13,60	5,73	2,18	
12											
13	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse erhalten	"	93,15	0,91	0,14	5,06	0,74	13,29	2,04	2,13	
14											
15	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse erhalten	"	93,10	0,76	0,14	5,31	0,69	11,01	2,03	1,76	
16											
17	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse erhalten	"	92,95	1,20	0,65	4,55	0,65	17,02	9,22	2,72	
18											
19	Bei der Be- reitung von Cheddar- Käse erhalten	"	92,95	1,01	0,42	4,95	0,67	14,33	5,96	2,29	
20											
21	Aus verschiedenen Käsesorten, vermutlich bei der Bereitung von Cheddar-, Gloucester- oder Cheddar-Käse erhalten	1861	92,65	0,81	0,68	5,28	0,58	11,02	9,25	1,76	
22											
23	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	92,95	1,43	0,49	4,49	0,64	20,28	6,95	3,24	
24											
25	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	92,95	1,01	0,29	5,08	0,67	14,33	4,11	2,29	
26											
27	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	93,15	1,06	0,55	4,66	0,59	15,47	8,03	2,48	
28											
29	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	92,95	0,81	0,24	5,27	0,73	11,49	3,40	1,84	
30											
31	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	93,30	1,01	0,31	4,68	0,70	15,07	4,63	3,41	
32											
33	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	93,35	0,91	0,25	5,00	0,49	13,68	3,76	2,19	
34											
35	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	92,70	0,96	0,31	5,31	0,72	13,15	4,25	2,10	
36											
37	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	92,90	0,94	0,18	5,30	0,68	13,24	2,54	2,12	
38											
39	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	93,35	0,94	0,18	5,03	0,60	13,93	2,67	2,23	
40											
41	Bei Handbereitung ge- wonnen	"	93,55	0,94	0,03	4,82	0,66	14,57	0,47	2,33	

^{64-65.} ¹⁾ B. Martiny. Die Milch 2, 243, 255 u. 280. (Journ. Roy. Agric. Soc. England 1862, 23, 170 u. 185—22; 1861, No. 1. An freier Milchlacture (welche in dem für Milchzucker angegebenen Gehalt nicht enthalten ist) enthalten die Proben.

Die Säure (welche in dem für Milchsäure angegebenen Gehalt nicht enthalten ist) enthalten die Pro-																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,36	0,41	0,50	—	0,48	—	0,48	0,46	0,48	—	0,41	0,12	0,54	—	0,39	0,41	0,43	0,40	—	—	—
Die Säure (welche in dem für Milchsäure angegebenen Gehalt nicht enthalten ist) enthalten die Pro-																				

Die natürliche Milch enthält:

Naturliche Milch enthielt:		Wasser	Fett	Proteinst.	Milchzucker	Salze
Vollmilch	zu Molke 1 u. 2	87,40	3,43	3,12	5,12	0,93 %
"	" " " " " " " " " " " 3	87,30	3,75	3,31	4,86	0,78 "
"	" " " " " " " " " " " 4	87,00	3,99	3,44	4,81	0,76 "
Vollmilch	u. Magermilch zu Molke . 5	87,89	3,12	2,94	5,29	0,76 "
"	" " " " " " " " " " " 6	88,50	2,43	3,25	5,03	0,79 "
Magermilch	zu Molke 7	89,00	1,93	3,01	5,28	0,78 "
"	" " " " " " " " " " " 8	89,10	2,31	3,50	4,52	0,77 "
Vollmilch	und Rahm zu Molke . . 9	85,75	6,11	2,94	4,47	0,73 %
"	" " " " " " " " " " " 10	86,73	4,81	2,69	5,01	0,76 "

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Milch-zucker %	Salze %	Stickstoff-Substanz %	Fett %	Stickstoff in der Trocken-Substanz %	
22	Limburger Käse, aus abgerahmter Milch	1867	91,40	0,82	1,05	6,12	0,61	9,53	12,21	1,52	E. Peters ¹⁾
23	aus nach 12 Stunden abgerahmter Milch (Eisverfahren).	1876	93,69	0,87	0,20	—	0,53	13,99	3,17	2,24	V. Storch ²⁾
24	aus nach 36 Stunden abgerahmter Milch (Eisverfahren).	"	93,52	0,85	0,16	—	0,53	13,12	2,47	2,10	
25	aus nach 12 Stunden abgerahmter Milch (36 Stdn. gestand. Rahm, Eisverfahren).	"	93,79	0,74	0,26	4,17	0,54	11,92	4,19	1,91	
26	aus nach 12 Stunden abgerahmter Milch (Eisverfahren).	"	93,67	0,71	0,33	4,27	0,56	11,22	5,21	1,79	
27	aus nach 24 Stunden abgerahmter Milch (Eisverfahren).	1877	93,22	0,82	0,20	4,42	0,56	12,09	2,95	1,93	
28	aus süßer Milch	"	92,76	0,82	0,61	4,50	0,55	11,33	8,43	1,81	A. Galimberti ³⁾
29	" " Buttermilch	"	93,26	0,91	0,19	—	0,68	13,50	2,82	2,16	
30	Molke aus der Käsepresse 12-stündig abger. M.	1876	93,68	0,85	0,50	—	0,51	13,45	7,91	2,15	
31	desgl. 36-stündig abger. M.	"	93,38	0,89	0,39	—	0,50	13,44	5,89	2,15	
32	Bei der Bereitung von Parmesan-Käse in 100 ccm Molke	"	93,85	—	0,40	—	—	—	6,50	—	
33		"	94,12	—	0,45	—	—	—	7,65	—	
34		"	94,07	—	0,49	—	—	—	8,26	—	
35		"	93,37	—	0,57	—	—	—	8,60	—	
36		"	93,81	—	0,50	—	—	—	7,95	—	
37		"	93,29	—	0,58	—	—	—	8,64	—	J. Künig ⁴⁾
38	Von der sogen. Mager- oder Zieger-Käse-Bereitung	1875	94,27	0,78	0,07	3,69	0,59	15,13	1,36	2,42	
39	(Nach Absetzen des Spec. Gew. Bruch. entnomm. 1,0274	1881	93,61	0,81	0,06	4,72	0,58	12,68	0,94	2,03	W. Fleischmann ⁵⁾
40	Aus den Formen abgelaufen 1,0270	"	93,68	0,82	0,028	4,71	0,58	12,97	0,44	2,08	

¹⁾ Der Landwirth 1867, 376.²⁾ Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 1879, 4, 216. Der Gesamt-Proteingehalt wurde aus dem angegebenen Stickstoffgehalt durch Multiplikation mit 6,25 von uns berechnet. Verf. bestimmte ausserdem den direkt fällbaren Käsestoff und das Molkenprotein (Proteinrest) nach Methoden, bezüglich deren wir auf die Originalmittheilung verweisen. Die Proben enthielten:

	No. 23	24	25	26	27	28	29	30	41
Stickstoff	0,139	0,136	0,119	0,113	0,132	0,132	0,145	0,136	0,142 %
Direkt gefällter Käsestoff	—	—	0,64	0,67	0,71	0,71	0,75	0,68	0,74 "
Rest (Molkenprotein).	—	—	0,60	0,40	0,89	0,84	—	—	— "

Die Proben unter No. 30 und 31 entstammen denselben Verkäsungsversuchen wie die unter No. 23 und 24.

³⁾ Milchztg. 1876, 5, 2016. (Il Caseificio 1876, No. 4.)⁴⁾ Landw. Ztg. für Westfalen und Lippe 1875, 76.⁵⁾ Ber. d. Milchw. Versuchstation Raden 1881, 37.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz		Stickstoff in der Trocken-Substanz	Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker	Salze	Stickstoff-Substanz	Fett		
41	Aus einer mitteldeutschen Molkerei	I 1883	97,10	0,24	0,066	2,14	0,46	8,28	2,28	1,32	W. Fleischmann ¹⁾
42		II "	94,03	0,53	0,084	4,34	1,01	8,88	1,41	1,42	
43	Aus einer holsteinschen Molkerei	"	94,60	0,70	0,18	3,76	0,72	12,96	3,33	2,07	
44	Süsse Molken (Holsteinsche und Limburger Käse)	1882	93,79	0,40	0,06	5,11	0,64	6,44	0,97	1,03	M. Schrodt und H. von Peter ²⁾
45	Käsemilch von	1878	93,06	1,07	0,127	5,10	0,58	15,42	1,83	2,47	
46	Radener Magerkäse	1878	92,95	1,02	0,152	4,96	0,61	14,47	2,16	2,32	W. Fleischmann ³⁾
47	Käsemilch von der Herstellung camembertartiger Weichkäse	1892	94,00	0,51	0,49	3,91	0,56	8,50	8,17	1,36	
48	Mittel mehrerer Analysen ⁴⁾	"	93,09	0,84	0,34	5,73		12,16	4,92	1,95	L. L. van Slyke ⁵⁾
49	desgl. ⁶⁾	1893	93,04	0,84	0,38	5,75		12,07	5,46	1,93	
50	Molken von halbfetten Käsen	1896	93,13	—	0,20	—	0,62	—	2,91	—	P. Veth ⁷⁾
51		"	93,02	—	0,40	—	0,59	—	5,73	—	
52		"	93,13	—	0,20	—	0,59	—	2,91	—	
53	Molken von Magerkäsen	"	93,50	—	0,00	—	0,59	—	0,00	—	
54		"	93,20	—	0,10	—	0,55	—	1,47	—	
55		"	93,21	—	0,05	—	0,60	—	0,74	—	
	Mittel	—	93,36	0,85	0,32	4,83	0,64	12,86	4,82	2,06	
	Schwankungen	—	91,40—97,10	0,43—1,34	0,00—0,61	4,22—5,45	0,47—1,12	6,44—20,28	0,00—9,25	1,03—3,24	

Quargserum.

1	Molken	1868	93,58	1,05	0,12	4,45	0,80	16,35	1,87	2,62	E. Heiden ¹⁾
2	"	1875	94,10	0,65	0,16	4,38	0,71	11,02	2,71	1,76	R. Alberti ²⁾
3	"	"	93,55	1,31	0,21	4,37	0,76	19,70	3,16	3,15	
4	"	"	93,49	1,35	0,20	4,20	0,76	20,74	3,07	3,32	
5	Quargserum	1878	93,48	1,04	0,083	4,42	0,82	15,96	1,27	2,55	W. Fleischmann ³⁾
6	"	"	93,18	1,06	0,122	4,38	0,82	15,43	1,78	2,47	
	Mittel	—	93,52	1,07	0,15	4,48	0,78	16,53	2,31	2,65	

¹⁾ Ber. d. Milchw. Versuchstation Baden 1883, 34 u. 35. Zu No. 43 ist die Zusammensetzung durch „Milchsäure, Extraktstoffe und Verlust“ = 0,038 % zu ergänzen.

²⁾ Milchw. Versuchstation Kiel. Milchztg. 1882, II, 427. (Landw. Wochenblatt für Schleswig-Holstein.)

³⁾ W. Fleischmann, Das Molkereiwesen, Braunschweig 1875, 995. Die Proben waren am 16. u. 18. Okt. 1878 in der Gutsmeierei Raden bei der Bereitung von Radener Magerkäse gewonnen. Die Zusammensetzung der Probe ist zu ergänzen mit „Verlust“ 0,0073 % bzw. 0,311 %. Das Gesamtprotein setzt sich zusammen aus:

Niederschlag durch Essigsäure bei Siedehitze No. 45 = 0,599 % und No. 46 = 0,592 %.

„ Gerbsäure „ „ 45 = 0,466 „ „ 46 = 0,426 „

⁴⁾ Hildesheimer land- und forstwirtschaftliches Vereinsblatt 1892, No. 27 u. 28. Milchztg. 1892, 21, 544.

⁵⁾ N. Y. St. Station Bul. 1894, 65, 25—158. Experim. Stat. Record 1894, 5, 893.

⁶⁾ Ber. des Milchw. Institutes Hameln 1890, 28.

⁷⁾ Versuchstation Pomnitz. Bericht 1868/69, 27. Ueber die Bereitungsweise dieser Molken fehlen die Angaben.

⁸⁾ Journ. f. Landwirtschaft 1876, 92. Ueber die Bereitungsweise dieser Molken fehlen die Angaben.

⁹⁾ W. Fleischmann, Das Molkereiwesen, Braunschweig 1878, 995. Die Zusammensetzung ist zu ergänzen mit Verlust 0,169 bzw. 0,494 %. Das Gesamtprotein besteht aus:

Protein, Niederschlag durch Essigsäure bei Siedehitze No. 5 = 0,518 % No. 6 = 0,474 %.

„ Gerbsäure „ „ 5 = 0,520 „ „ 6 = 0,588 „

¹⁰⁾ Die Schwankungen waren in beiden Jahren folgende:

Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchzucker + Salze
92,48—93,57 %	0,65—1,07 %	0,23—0,55 %	5,39—6,34 %

Molken.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz					In der Trocken-Substanz			Analytiker
			Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milch-zucker	Salze	Stickstoff-Substanz	Fett	Stickstoff in der Trocken-Substanz	
1	Schotten (scotta) ¹⁾	1875	93,35	0,53	0,026	5,36	0,57	7,97	0,39	1,28	L. Mancini und G. Musso ²⁾
2	"	"	93,97	0,58	0,042	4,86	0,59	9,62	0,70	1,54	
3	"	"	94,20	0,44	0,031	4,61	0,47	7,59	0,53	1,21	
4	"	"	93,77	0,48	0,035	4,99	0,51	7,70	0,56	1,23	
5	"	"	93,61	0,48	0,035	5,24	0,57	7,51	0,55	1,20	
6	"	"	94,60	0,59	0,038	4,72	0,47	10,93	0,70	1,25	
7	Halbfettkäseerei (mit Vorbruch- und Ziger-Gewinnung)	1877	93,55	0,27	0,10	5,85	0,23	4,19	1,55	0,67	W. Engling und von Klenz ³⁾
8	Magerkäseerei	"	93,92	0,34	0,08	5,34	0,32	5,59	1,32	0,89	
9	Fettkäseerei (mit Vorbruch- und Ziger-Gewinnung)	1878	93,83	0,61	0,16	5,15	0,25	9,89	2,59	1,58	
10	Aus Milch von Allgäuer Kühen	"	93,60	1,18	0,15	4,45	0,62	18,44	2,35	2,95	W. Fleischmann ⁴⁾
11	Aus Kuhmilch (nach Valentiner)	"	93,26	1,08	0,12	5,10	0,41	16,02	1,78	2,56	
Mittel			93,79	0,60	0,07	5,10	0,44	9,59	1,18	1,53	

Molken aus Ziegen- und Schafmilch.

1	Aus Ziegenmilch von Landek	—	93,91	0,40	0,038	5,03	0,62	6,48	0,62	1,04	W. Fleischmann ⁴⁾
2	" " " Kreuth	—	93,77	0,58	0,030	4,99	0,67	5,83	0,32	0,93	
3	" " " " "	—	93,38	1,14	0,372	4,53	0,58	17,22	5,62	2,76	
4	" " " Kreuth	—	93,88	0,62	0,021	4,77	0,70	10,23	0,35	1,64	
Mittel			93,81	0,62	0,11	4,88	0,58	9,94	1,73	1,59	
Aus Schafmilch			91,96	2,13	0,25	5,07	0,59	26,49	3,11	4,24	W. Fleischmann ⁴⁾

¹⁾ Milchztg. 1876, 5, 1959. (Il Caseificio 15/1 1876.) An freier Milchsäure enthielten die Proben:

No. 1 2 3 4 5 6

0,19 0,09 0,10 0,15 0,09 0,08 %

Die Molken (Schotten) stellten eine in's gelbliche spielende, leicht grünlich gefärbte Flüssigkeit dar, welche eine grössere oder geringere Menge Sahnefloeken suspendirt enthielt. Wird der Schotten durch Filtriren von letzteren befreit, so ist derselbe völlig fettfrei.

²⁾ Milchztg. 1878, 7, 144, 156 und 1880, 9, 598. Die Stickstoff-Substanz ist als Laktoprotein (durch Gerbsäure ausfällbar) bezeichnet.

³⁾ Nach Pletzer, Bad Kreuth und seine Molkenkuren, München 1875, 60; in W. Fleischmann, Das Molkereiwesen 1888, 999.

⁴⁾ Nach Valentiner (No. 3 u. 5), Drenkmann (No. 1) und Lehmann (No. 2 u. 4) mitgetheilt von W. Fleischmann in dessen: Das Molkereiwesen, Braunschweig 1875, 999, aus Pletzer, Bad Kreuth und seine Molkenkuren, München 1875, 60.

⁵⁾ Schotten ist hier die Masse, welche von der Käsemilch nach Entnahme des „Vorbruchs“, d. h. des sich beim Erwärmen und Zusatz von Säure auscheidenden fetthaltigen Schaumes, übrig bleibt. Nach W. Fleischmann (Das Molkereiwesen 1878, 912) ist zwar unter „Schotten“ Ziger zu verstehen, nach Art der Bereitung und nach der Zusammensetzung des untersuchten Materials aber ist dieses mit Molken im Fleischmann'schen Sinne übereinstimmend.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Milchsäure	Milchzucker	Stickstoff-Substanz	Fett	Asche	Kohlensäure (frei und gebunden)	Analytiker
			%	%	%	%	%	%	%	%	
26	Aus einer Kumysanstalt an	1883	—	1,55	—	0,98	2,71 ^{*)}	2,17	—	—	J. M. Potichin ^{*)}
27	der Wolga; stark	"	—	—	—	1,04	2,06 ^{*)}	2,53	—	—	
28	Aus Stutenmilch, zweitägiger	"	—	1,65	1,15	2,20	1,12	2,05	—	—	
29	Dargestellt ^{es)} am 13. Okt., aufgefällt am 14. Okt. 1884	1884	90,99	2,47	0,64	2,21	2,25 ^{***)}	1,08	0,36	—	P. Vieth ^{*)}
30	nach 1 Tag, 15. Okt., frischer Kumys . . .	"	91,95	2,70	1,16	0,69	2,00 ^{***)}	1,13	0,37	—	
31	nach 8 Tagen, 22. Okt., mittlerer Kumys . . .	"	91,79	2,84	1,26	0,51	1,97 ^{***)}	1,27	0,36	—	
32	nach 23 Tagen, 6. Nov., alter Kumys . . .	"	91,87	3,29	0,96	0,39	1,99 ^{***)}	1,17	0,33	—	
33	Dargestellt ^{es)} am 22. Okt. 1884	"	92,38	3,26	1,03	0,09	1,76 ^{***)}	1,14	0,34	—	
34	nach 1 Tag, 23. Okt., frischer Kumys . . .	"	92,42	3,29	1,00	—	1,87 ^{***)}	1,20	0,35	—	
35	nach 8 Tagen, 30. Okt., mittlerer Kumys . . .	"	91,42	2,25	0,70	2,30	1,75 ^{***)}	1,22	0,36	—	
36	nach 21 Tagen, 13. Nov., alter Kumys . . .	"	92,04	2,84	1,06	0,73	1,89 ^{***)}	1,10	0,34	—	
37	Dargestellt ^{es)} am 27. Okt., aufgefällt am 28. Okt. 1884	"	91,99	2,81	1,54	0,19	1,69 ^{***)}	1,44	0,34	—	
38	Aus kondensirter Stutenmilch, 10 Monate alt . . .	"	89,13	1,17	1,78	5,13	1,63 ^{***)}	0,80	0,36	—	
39	Voller Kumys { 1 Tag alt . . .	1886	88,90	0,15	0,34	6,03	2,65 ^{***)}	1,35	0,58	—	
40	{ 8 Tage „ . . .	"	90,35	0,94	0,96	3,10	2,72 ^{***)}	1,36	0,57	—	
41	{ 22 „ „ . . .	"	90,57	1,04	1,40	2,18	2,85 ^{***)}	1,38	0,58	—	

^{*)} Vergl. Anmerkung ^{*)} S. 391.

^{*)} Mitgetheilt von M. Smitriew. Petersburg 1883. Deutsche med. Ztg. 1884, 5, 50—51; Rep. anal. Chem. 1884, 4, 77.

^{*)} Landw. Versuchsanstalten 1883, 31, 363 und Milchztg. 1887, 16, 121.

^{*)} Die Stickstoff-Substanz zerfällt in:

	Kasein	Albumin	Parapecton	Pepton	Gesamt-Stickstoff-Substanz
	%	%	%	%	%
No. 22 . . .	2,92	0,49	0,27	0,048	3,73
" 23 . . .	2,53	0,52	0,24	0,024	3,33
" 24 . . .	2,23	0,22	0,27	0,217	2,93
" 25 . . .	1,94	0,47	0,24	0,144	2,79
" 26 . . .	1,73	0,33	0,23	0,422	2,71
" 27 . . .	1,19	0,43	0,22	0,213	2,06

A. Doehmann giebt (Kumys, Wratsch 1882. Vergl. J. Biel, Studien etc.) in derselben Weise für die Eiweissstoffe des Kumys im Mittel von je 3 Analysen an:

	Kasein	Albumin	Parapecton	Pepton	Gesamt-Stickstoff-Substanz
	%	%	%	%	%
12-stündiger Kumys . . .	1,60	0,32	0,47	0,12	2,51
40- „ „ . . .	1,39	0,24	0,84	0,28	2,75
70- „ „ . . .	1,08	0,15	0,71	0,49	2,63

^{*)} Zur Darstellung wurden 3 Theile Milch mit 1 Theil gut in Gährung befindlichem Kumys vermischt, 21 Stunden bei 20° C. stehen gelassen und dann auf Flaschen gefüllt, die mit Kork und Draht verschlossen wurden.

^{*)} Die Stickstoff-Substanz zerfällt in:

No.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kasein	0,83	0,81	1,01	0,80	0,85	0,79	0,67	0,88	0,69	1,00	2,01	1,96	1,88	1,46	1,40	1,20
Albumin	0,37	0,23	0,29	0,15	0,32	0,23	0,27	0,11	0,24	0,30	0,23	0,20	0,43	0,25	0,14	0,14
Laktoprotein + Pepton	1,05	0,96	0,67	1,04	0,59	0,76	0,85	0,74	0,89	0,39	0,34	0,53	0,77	0,48	0,76	0,97

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Milchsäure	Milchzucker	Stickstoff-Substanz	Fett	Asche	Kohlensäure (frei und gebunden)	Analytiker
			%	%	%	%	%	%	%	%	
42	Mittlerer { 1 Tag alt . . .	1886	87,55	0,29	0,68	6,80	2,37 ^{*)}	1,54	0,77	—	P. Vieth ^{*)}
43	8 Tage n . . .	"	88,39	0,97	1,20	4,70	2,41 ^{*)}	1,56	0,77	—	
44	22 n n . . .	"	88,62	1,05	1,67	3,90	2,41 ^{*)}	1,58	0,77	—	
45	Echter Kumys, 2 Tage alt . .	1892	—	—	1,15	2,20	1,12	2,05	0,28	0,758	R. Koch ^{*)}
	Mittel	—	(90,44 ^{***})	1,91	0,91	1,77	2,24	1,46	0,42	0,857	
	Schwankungen	—	87,55—95,28	0,15—3,29	0,34—2,92	0—6,80	1,12—3,73	0,80—2,56	0,28—0,77	0,133—1,860	

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Milchsäure	Milchzucker	Kaseln	Albumin	Laktoprotein und Pepton	Stickstoff-Substanz im Ganzen	Asche	Freie Kohlensäure	Analytiker		
			o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o			
46	1 Tag alt ^{***}	1886	91,87	0,22	0,06	3,95	2,32	0,08	0,32	2,72	0,84	—	P. Vieth ^{*)}		
47	8 Tage n ^{***}	"	92,26	0,45	0,31	3,08	2,17	0,07	0,48	2,72	0,85	—			
48	22 " n ^{***}	"	92,52	0,57	0,56	2,45	2,03	0,07	0,62	2,73	0,84	—			
	Dauer der Gährung Spec. Gew. bei Stdn. + 4°C.								Ariz. albu. m.	Hend. albu. m.					
49	Kumys, bereitet mit Hefe 1 : 4.	8 1,0276	1895	90,29	0,99	0,55	3,67	1,30	0,40	0,10	0,63	2,43	0,31	0,095	A. K. Allik ^{*)}
50		14 1,0260	"	90,66	1,24	0,71	2,99	1,16	0,40	0,13	0,65	2,34	0,31	0,248	
51		36 1,0251	"	90,97	1,53	0,80	2,37	1,07	0,42	0,18	0,66	2,33	0,31	0,345	
52		62 1,0250	"	90,99	1,99	0,85	1,43	1,01	0,41	0,18	0,66	2,26	0,31	0,569	
53		84 1,0238	"	91,66	2,01	0,91	0,98	0,95	0,40	0,19	0,66	2,20	0,32	0,668	
54	12 1,0271	"	90,61	0,60	0,47	3,83	1,19	0,42	0,10	0,59	2,30	0,29	0,022		
55	36 1,0266	"	90,70	1,01	0,59	3,18	1,16	0,41	0,13	0,61	2,31	0,30	0,119		
56	48 1,0265	"	90,83	1,35	0,79	2,50	1,05	0,40	0,16	0,63	2,24	0,30	0,396		
57	12 1,0281	"	90,23	0,80	0,42	3,99	1,26	0,41	0,11	0,63	2,41	0,32	0,066		
58	36 1,0276	"	90,35	1,24	0,79	3,24	1,19	0,43	0,12	0,65	2,39	0,32	0,259		
59	48 1,0275	"	90,57	1,40	0,88	2,75	1,01	0,41	0,18	0,64	2,24	0,32	0,433		
60	84 1,0260	"	90,70	1,59	0,89	2,57	1,03	0,40	0,18	0,66	2,27	0,32	0,589		
61	96 1,0251	"	90,89	2,00	0,93	1,53	0,99	0,40	0,19	0,68	2,26	0,33	0,750		
62	Kumys, bereitet in Poguljanka	4 1,0249	"	91,96	1,08	0,93	1,58	—	—	—	2,24	0,36	0,805		
63		4 1/2 1,0240	"	91,54	1,97	1,40	1,06	—	—	—	2,14	0,36	0,902		
64		5 1,0246	"	92,54	1,95	1,26	0,93	—	—	—	2,10	0,34	0,906		
65		6 1,0241	"	92,78	2,09	1,44	0,73	—	—	—	1,92	0,33	—		
	Mittel (No. 46—65)	—	91,22	1,30	0,78	2,44	1,31	0,33	0,15	0,52	2,33	0,40	0,448		

^{*)} Landw. Versuchstationen 1885, 31, 363 u. Milchztg. 1887, 16, 121.

^{*)} Molkereiztg. 1892, 38.

^{*)} Milchztg. 1887, 16, 121.

^{*)} Inaugural-Dissertation Jurgew. 1895; Chem.-Ztg. 1895, 20, 203.

Die Kumys waren ausschliesslich aus Stutenmilch hergestellt. Die Eiweisskörper wurden mit neutralem Ammoniumsulfat gefällt. Der Milchzucker wurde mit Fehling'scher Lösung titirt, nachdem die Eiweissstoffe mit Phosphorwolframsäure ausgefällt waren. Pepton im Sinne Kühne's konnte nicht nachgewiesen werden.

^{*)} Vergl. Anmerkung ^{*)} S. 392.

^{*)} Der mittlere Wassergehalt ist aus der Differenz berechnet.

^{*)} No. 46 enthält 0,34 % No. 47 0,33 % und No. 48 0,33 % Fett. Der Wassergehalt ist von uns durch Subtraktion der Trocken-Substanz und des Alkoholgehaltes von 100 berechnet.

b. Kumys für Diabetiker.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Milchsäure	Milchzucker	Stickstoff-Substanz	Fett	Glycerin	Asche	Kohlensäure (frei und gebunden)	Analytiker
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	1 Tag alt	1886	92,24	0,28	0,75	2,78	2,85 ^{*)}	0,51	—	0,59	—	P. Voth ^{*)}
2	8 Tage „	„	92,38	0,35	0,86	2,42	2,86 ^{*)}	0,52	—	0,61	—	
3	22 „ „	„	92,55	0,57	1,22	1,64	2,88 ^{*)}	0,51	—	0,61	—	

c. Molken-Kumys.

1	1 Tag alt	1886	89,74	0,30	0,60	7,48	0,98 ^{*)}	0,11	—	0,79	—	P. Voth ^{*)}
2	8 Tage „	„	90,63	1,03	0,91	5,52	0,99 ^{*)}	0,13	—	0,79	—	
3	22 „ „	„	91,07	1,38	1,26	4,34	1,01 ^{*)}	0,15	—	0,79	—	

d. Kumys aus Kuhmilch.

1			1877	88,80	2,25	0,70	3,89	2,02	0,85	0,14	0,41	0,66	Landowsky ^{*)}
2			„	88,63	3,03	0,89	2,31	2,12	0,85	0,19	0,48	1,39	
	Gew. des Kumys	CO ₂											
	g	l	g										
3	747,42	2,543	5,009	1887	88,81	0,87	—	4,33	2,69	2,21	—	0,67	H. W. Wiley ^{*)}
4	729,38	3,140	6,186	„	89,53	0,66	0,47	4,31	2,58	2,15	—	0,85	
5	768,58	3,179	6,269	„	89,15	0,69	0,51	4,33	3,02	2,07	—	0,82	
6	736,04	3,281	6,463	„	89,37	0,81	0,45	4,43	3,01	1,99	—	0,88	
7	745,19	3,579	6,850	„	89,97	0,86	0,48	4,43	2,64	1,67	—	0,91	
8	750,25	2,973	5,757	„	89,87	0,70	0,43	4,33	2,81	1,75	—	0,77	
9	738,84	3,204	6,313	„	89,01	0,73	0,49	4,48	2,89	2,44	—	0,85	
10	752,55	3,263	6,428	„	88,87	0,77	—	—	2,81	2,34	—	0,85	
11	Aus Kuhmilch unter Zusatz von Rohrzucker + Bierhefe nach 12-stündiger Gährung			„	83,36	1,12	0,17	6,39	3,70 ^{*)}	4,35	—	0,67	M. Schroff ^{*)}
Mittel (ausschl. No. 11)				—	89,20	1,14	0,55	4,09	2,66	1,83	0,16	0,43	0,86

e. Kumys von unbekannter Darstellung (wahrscheinlich aus abgerahmter Kuhmilch).

1			1870	90,35	3,21	0,19	2,11	1,86	1,78	—	0,51	0,178	Suter-Nesf ^{*)}
2	Aus Davos		„	89,06	3,62	2,56	2,37	2,09	2,00	—	0,74	1,99	
3			1876	88,73	0,38	0,42	6,33	3,54	0,61	—	0,37	0,36	Arth. Hill Hassell ^{*)}
4	Unbekannt		„	90,01	0,86	0,68	5,05	3,39	0,52	—	0,34	0,82	
5	(wahrscheinlich aus abgerahmter Kuhmilch)		„	91,51	1,28	1,15	3,02	3,83	0,51	—	0,39	1,23	
6			„	88,10	0,40	0,54	8,95	1,26	0,49	—	0,65	0,39	
7			„	(82,29)	0,49	0,37	2,34	4,41	0,19	(9,72)	0,68	0,47	
8			„	(83,16)	0,79	0,61	1,45	4,37	0,16	(9,58)	0,67	0,75	J. Moser ^{*)}
9	desgl.		1872	95,30	—	—	—	1,74	1,69	—	—	—	
Mittel				—	(89,55 ^{*)})	1,38	0,82	3,95	2,89	0,88	—	0,53	0,77

*) Milchztg. 1887, 16, 121.

*) v. Tymowsky, Zur physiol. u. therap. Bedeutung des Kumys etc. München 1877, 15.

*) Foods and Foods adulterants. Bulletin No. 15. Washington 1887, 120.

*) Jahresber. d. Milchw. Versuchsanstalt Kiel für 1886/87, 9.

*) Jahresber. f. Agrik.-Chem. 1870/72, 3, 235 und 1873/74, 2, 287.

*) Dessen Food: Its Adulterations and the Methodes for their Detection. London 1876, 397.

*) Ber. d. Landw. Versuchsanstalt Wien 1878, 32.

*) Die Stickstoff-Substanz zerfällt in:

	Kumys für Diabetiker			Molken-Kumys			Aus Kuhmilch
	1	2	3	1	2	3	11
	%	%	%	%	%	%	%
Kasein	2,19	2,13	2,05	0,15	0,14	0,11	3,04
Albumin	0,30	0,25	0,18	0,39	0,36	0,32	0,34
Laktoprotein + Pepton	0,36	0,48	0,65	0,44	0,49	0,58	0,32

**) Aus der Differenz angenommen.

Kefir (oder Kaphir).

Der Kefir unterscheidet sich dadurch vom Kumys, dass er aus Kuhmilch durch einen besonderen Gährungspilz (das Kefirferment) dargestellt wird.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Fett	Milchzucker	Milchsäure	Kasein	Albumin	Hemi- albuminose	Pepton	Gesamt- Stickstoff- Substanz ^{*)}	Asche	Anal- ytiker	
			o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o		
1	2-tägiger Kefir . .	?	—	0,80	2,00	2,00	0,90	—	—	—	—	3,80	—	Tuschinsky ¹⁾	
2	—	?	—	1,20	0,51	1,37	0,83	—	—	—	—	2,83	0,68	Nesky und Rakosky ¹⁾	
3	Ankefir	1-tägiger . . . 1885	—	0,16	—	—	0,16	3,46	0,42	—	—	—	—		
4	1- " . . .	"	—	—	—	3,46	0,90	3,26	0,80	—	—	—	—		
5	2- " . . .	"	—	?	—	2,98	1,30	3,33	0,78	—	—	—	—		
6	Flaschenkefir	1-tägiger . . .	—	0,32	—	3,84	1,35	2,57	0,75	—	0,023	—	—		
7	2- " . . .	"	—	0,72	—	—	1,50	2,67	0,77	—	—	—	—		
8	3- " . . .	"	—	1,22	—	1,54	1,35	2,57	0,77	—	0,022	—	—		
9	1- " . . .	"	—	0,24	—	—	0,99	2,98	0,43	—	0,041	—	—		
10	2- " . . .	"	—	0,56	—	2,11	1,26	—	—	—	—	—	—		
11	3- " . . .	"	—	0,89	—	1,44	1,35	2,95	0,42	—	0,040	—	—		
12	5- " . . .	"	—	0,81	—	1,44	1,44	2,89	0,43	—	0,039	—	—		
13	6- " . . .	"	—	0,89	—	1,25	1,53	—	—	—	—	—	—		
14	Aus einer Anstalt entnommen	1-tägig.	"	—	—	3,75	0,54	3,34	0,12	0,190	0,035	3,78	—		
15	2- " . . .	"	—	—	—	3,22	0,56	2,87	0,03	0,282	0,046	3,34	—		
16	3- " . . .	"	—	—	—	3,09	0,65	2,99	—	0,409	0,082	3,74	—		
17	Selbst angefertigt	aus 3- " . . .	"	—	—	—	—	2,63	0,22	0,252	0,014	3,33	—		
18	roher 3- " . . .	"	—	—	—	—	—	2,17	0,19	0,254	Spur	2,91	—		
19	Milch 3- " . . .	"	—	—	—	2,75	0,70	2,31	0,21	0,252	Spur	2,98	—		
20	aus gekochter 5- " . . .	"	—	—	—	2,55	0,73	2,76	—	0,162	Spur	3,14	—		
21	Milch 9- " . . .	"	—	—	—	2,40	0,86	2,36	—	0,320	0,056	3,05	—		
22	Alter unbekannt . .	"	90,09	0,64	1,82	1,87	1,44	2,90	0,07	—	0,45	3,42	—	P. Vieth	
23	Aus der Hj. Nyström in	1-tägig.	1886	88,26	0,70	3,35	2,78	0,81	2,98	0,28	0,046	0	3,31	0,79	
24	Gothenburg (aus gekochter Milch)	2- " . . .	"	89,09	0,66	3,10	2,90	0,61	2,74	0,17	0,070	0	2,99	0,65	
25	3- " . . .	"	"	89,49	0,80	2,81	2,37	0,77	2,99	0,11	0,084	0	3,18	0,68	

¹⁾ Vergl. J. Biel, Studien über die Eiweissstoffe des Kumys und des Kefir, St. Petersburg 1886.

²⁾ Milchztg. 1887, 16, 121.

³⁾ Vergl. Anmerkung ¹⁾ S. 396.

⁴⁾ Nach J. Biel (l. c.) fand Silwanow für die Stickstoff-Substanz des Kefir:

	1-tägig.	2-tägig.	3-tägig.	1-tägig.	2-tägig.	3-tägig.	1-tägig.	2-tägig.	3-tägig.	1-tägig.	2-tägig.	3-tägig.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kasein . . .	2,43	2,33	1,93	2,49	2,29	2,01	2,39	2,26	1,98	2,41	2,28	1,95
Albumin . . .	0,19	0,06	0,02	0,20	0,08	0,00	0,21	0,12	0,04	0,20	0,07	0,01
Pepton . . .	0,09	0,14	0,38	0,12	0,18	0,36	0,10	0,16	0,32	0,10	0,19	0,39
Kasein . . .	2,09	1,97	1,89	2,11	2,02	1,90	2,06	1,95	1,81	—	—	—
Albumin . . .	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,003	0,00	—	—	—
Pepton . . .	0,12	0,23	0,42	0,11	0,27	0,40	0,13	0,28	0,43	—	—	—

⁵⁾ Der Alkohol ist bei den Analysen von Seadowen in Graden Tralles angegeben und darnach von uns in Gewichtsprocent umgewandelt.

⁶⁾ J. Biel gibt ferner für Acidalbumin an:

	No. 14	15	16	17	18	19	20	21
	%	%	%	%	%	%	%	%
Acidalbumin	0,095	0,107	0,250	0,218	0,297	0,215	0,217	0,318

⁷⁾ Vergl. Anmerkung ¹⁾ S. 396.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Alkohol	Fett	Milchzucker	Milchsäure	Kasein	Albumin	Homalbuminose	Pepton	Gesamtstickstoff-Substanz	Asche	Analytiker
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26	Selbst-dargestellter	2-tägiger	1886	—	0,23	3,62	3,70	0,67	2,57	0,43	0,07	0	3,07	O. Hammarsten ¹⁾
27	Flaschen-kefir ²⁾	4- "	"	—	0,81	3,63	2,24	0,83	2,59	0,41	0,09	0	3,08	
28	Flaschen-kefir ²⁾	6- "	"	—	1,10	3,63	1,67	0,90	2,56	0,39	0,12	0	3,07	
29	Kefir aus Brünn . . . Spec. Gew.	1890	88,38	0,82	2,88	3,38	1,00	—	—	—	—	4,80	0,48	J. Habermann ³⁾
30	Kefir	3-tägig. 1,0116	1890	—	0,26	3,15	—	1,01	—	—	—	3,68	—	B. C. Niederstadt ⁴⁾
31		2- " 1,0277	"	—	0,22	3,91	—	0,99	—	—	—	3,54	—	
32	1-tägiger Kefir . . .	1891	—	—	2,33	—	0,85	—	—	—	—	—	—	derselbe ⁵⁾
33	Echter Kefir aus Dr. Rudecks echtem präparirtem Ferment in 100 cem . . .	1886	—	0,50	1,80	1,80	0,60	3,65	0,15	0,05	0,20	4,13	—	E. Rudeck ⁶⁾
Mittel			—	88,86	0,84	2,76	2,52	0,98	2,80	0,38	0,18	0,03	3,39	0,65

Kunstkefir (Pseudokefir).

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	100 cem enthalten g									Analytiker
			Alkohol	Fett	Milchzucker	Milchsäure	Kasein	Albumin	Hemialbumose	Laktosynonid	Pepton	
1	Kogelmann'scher Pseudokefir ^{***)}	1886	0	1,10	0,90	1,85	3,50	0	0,90	0,40	Spur	} E. Endeck ⁷⁾
2	Pseudokefir ⁷⁾	"	Spur	1,60	1,30	1,10	3,80	Spur	Spur	0	0	

¹⁾ Upsala läkare förenings förhandlingar 1886, 21. Separatabdruck 1—32. Centrbl. Agrik.-Chem. 1888, 17, 413—417.²⁾ Zeitschr. angew. Chem. 1890, 62.³⁾ Zeitschr. angew. Chem. 1890, 304.⁴⁾ Milchtg. 1891, 20, 624.⁵⁾ Milchtg. 1887, 16, 223.⁶⁾ Gesundheit 1886, No. 22; Milchtg. 1887, 16, 223.⁷⁾ Die Untersuchungsmethoden, welche Hammarsten anwandte, waren folgende: Das Gesamteiweiß (Stickstoff-Substanz) wurde durch Fällung des mit Alkali möglichst neutralisirten Kefirs mit soviel Weingeist bestimmt, dass die Lösung 75—80 % wasserfreien Alkohol enthielt. Die Fällung wurde in bekannter Weise behandelt und aus dem Filtrate wurden Spuren von Eiweiß nach vorausgegangener Konzentration und Ausschütteln mit Aether mit Gerbsäure gefällt. Von dem Niederschlage wurden 67 % als Eiweiß berechnet. Das Kasein wurde bestimmt durch einfaches Verdünnen des Kefirs mit 15—20 Theilen Wasser, worauf der Niederschlag sich während 12—18 Stunden absetzte; derselbe wurde gesammelt, entfettet, getrocknet u. s. w. Das Laktalbumin wurde durch Kochen des Filtrates vom Kasein-niederschlage erhalten und nach den bekannten Regeln weiterbehandelt. Die Pepton-Substanzen (eigentliches Pepton und Propepton zusammen) wurden bestimmt, theils als Differenz zwischen Gesamteiweiß einerseits und der Summe von Kasein und Laktalbumin andererseits, theils auch nach Abscheidung des Laktalbumins durch Fällung mittelst Gerbsäure bei Gegenwart von etwas essigsaurem Natrium und freier Essigsäure. Bei Anwendung dieser Methoden sind die Werthe für Kasein eher zu klein als zu hoch, die Werthe für Pepton eher zu gross als zu klein. Wirkliches, durch Ammoniumsulfat nicht fällbares Pepton im Sinne Kühne's war nicht vorhanden.⁸⁾ Der selbsthergestellte Flaschenkefir wurde durch Mischen und Schütteln von 1 Theil fertigem Kefir mit 4 Theilen ungekochter Milch dargestellt.⁹⁾ Darstellung: $\frac{1}{2}$ saure und $\frac{1}{2}$ süsse Milch werden gemischt, öfters umgeschüttelt und in den Flaschen 3 Tage stehen gelassen. Das Produkt ist ein Getränk von intensiv saurem, widerlichem Geschmack.¹⁰⁾ Darstellung: Durch Einleiten von Kohlensäure in Milch. Der Geschmack ist unangenehm prickelnd; er gleicht dem einer Mischung von Selterswasser mit Milch. Der Pseudokefir scheidet sich schon nach 36 Stunden in Kasein und Molke.

Skr.

Skr, ein unter Wirkung von saurer Gährung und Lab aus Milch in Island hergestelltes Erzeugniss von steifer Syrapkonsistenz enthält nach C. Petersen (Vierteljahresschrift Nahrungs- und Genussmittel 1887, 2, 368):

	Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Milchsäure	Asche
	81,07%	11,09%	3,28%	2,69%	1,74%

Die Asche besteht aus:

	Kalk	Magnesia	Kali	Natron	Phosphorsäure	Schwefelsäure	Kieselsäure	Chlor
	(CaO)	(MgO)	(K ₂ O)	(Na ₂ O)	(P ₂ O ₅)	(SO ₃)	(SiO ₂)	(Cl)
	13,12%	2,19%	15,43%	16,73%	30,33%	6,83%	0,55%	19,00%

Die chlornatriumfreie Asche enthält hiernach:

0,17%	19,10%	3,18%	22,46%	0,20%	44,15%	9,94%	0,80%	—
-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	---

Vegetabile Milch.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	Wasser	Stickstoff-Substanz	Fett	Pflanzen-Dextrin	Rohrzucker	Asche	Analytiker
			%	%	%	%	%	%	
1	Lahmanns vegetabile Milch von Hawel u. Veithen in Köln*)	1893	20,62	12,00	34,72	—	31,00	1,64	A. Stützer ¹⁾
2		1896	24,44	7,50	24,60	1,30	41,80	0,68 ²⁾	derselbe ²⁾
3		"	27,17	10,68	24,60	—	28,73	1,41 ²⁾	Ed. Spöth ²⁾

Citronensäuregehalt der Milch.

Nach Theodor Henkel (Landw. Versuchsstationen 1891, 39, 143—151) beträgt der Citronensäuregehalt der Kuhmilch 1,0—1,4 g in 1 Liter, während Anton Scheibe (Landw. Versuchsstationen 1891, 39, 153—170) nach einer verbesserten Bestimmungsmethode in der Kuhmilch 1,7—2,0 g, in der Ziegenmilch 1,0—1,5 g und in der Frauenmilch 0,54 g in 1 Liter fand.

Zusammensetzung der Milchasche.

W. Fleischmann (Jahresbericht der milchw. Versuchsstation Raden für 1881, S. 37 und 1884 S. 35) untersuchte die Asche von Vollmilch (1881), Rahm, Butter und Buttermilch (1884) der Kühe der Radener Heerde und fand in der Asche:

¹⁾ Mitgeteilt von Fr. Hornef. Intern. klin. Rundsch. 1893, 1273; Centrbl. Agrik.-Chem. 1894, 23, 303—306.
²⁾ Mitgeteilt von H. Höck. Wiener med. Wochenschr. 1896, No. 11, 12, 13; Hyg. Rundschau 1896, 6, 850—851; Chem. Centrbl. 1896, II, 903—904.
³⁾ Pharm. Centrbl. 1896, 37, 542; Chem. Centrbl. 1896, II, 675.
⁴⁾ Lahmann's vegetabile Milch wird aus Mandeln und Nüssen unter Beigabe von Zucker hergestellt. Dieselbe gleicht mit Magensaft versetzt ein sehr feinflockiges Gerinnel, wobei der Unterschied des Pflanzenkaseins hervortritt. Sie ist der Haltbarkeit wegen in kondensierte Form gebracht und wird mit der siebenfachen Menge Wasser beim Gebrauch aufgelöst. Dazu hat Lahmann ein Nahrungssalz, das mit Fleischextrakt Ähnlichkeit hat, konstruiert mit 9,87% Wasser, 36,24% organ. Stoffen und 13,59% Salzen nach Birnbaum. Diese 13,59% Salze haben nach B. C. Niederstadt folgende Zusammensetzung:

	Kali	Natron	Kalk	Magnesia	Eisen-oxyd	Phosphor-säure	Schwefel-säure	Kiesel-säure	Chlor
	(K ₂ O)	(Na ₂ O)	(CaO)	(MgO)	(Fe ₂ O ₃)	(P ₂ O ₅)	(SO ₃)	(SiO ₂)	(Cl)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nahrungssalz der Milch	16,53	21,45	18,90	4,89	0,40	4,46	8,85	1,26	6,57
	24,06	6,05	23,17	2,63	0,44	27,98	1,26	0,06	13,45

⁵⁾ Die Asche besteht aus 20,6% K₂O, 4,0% Na₂O, 35,8% CaO, 0,55% MgO, 0,68% Fe₂O₃, 31,2% P₂O₅, 6,07% SO₃. Freie Säuren enthält das Präparat nicht.
⁶⁾ Die Asche enthält Spuren Fe₂O₃, 0,222% Al₂O₃, 0,300% Alkalien (ber. als Na₂O), 0,368% P₂O₅, 0,076% SO₃, Spuren CaO und Cl. Die Reaktion der wässrigen Lösung ist sauer.

No.	Nähere Bezeichnung	Kalk (CaO) %	Magnesia (MgO) %	Eisenoxyd (Fe ₂ O ₃) %	Kali (K ₂ O) %	Natron (Na ₂ O) %	Phosphor- säure (P ₂ O ₅) %	Chlor (Cl) %	Schwefel- säure (SO ₃) %
1	Milch (Reinasche)*)	22,57	2,84	0,31	23,54	11,44	27,68	15,01	—
2	Rahm	22,81	3,25	2,84	27,65	8,46	21,18	14,51	2,57
3	Magermilch	21,19	3,02	0,89	31,58	9,93	18,84	14,59	3,26
4	Butter	23,16	3,30	Spur	19,39	7,74	44,40	2,61	Spur
5	Buttermilch	19,82	3,58	Spur	24,65	11,59	30,03	13,34	Spur

Schrodt (Jahresbericht der milchw. Versuchsstation Kiel. Milchtztg. 1887, 16, 676) untersuchte die Asche von käsigter Milch aus 2 holsteinischen Meiereien und fand:

1	Meierei I	21,87	2,59	Spur	25,73	14,15	23,75	11,79	3,02
2	„ II	25,45	1,09	Spur	24,29	7,95	30,31	10,64	2,86

Fr. Söldner (Landw. Versuchsstationen 1888, 35, 351—436; Milchtztg. 1889, 18, 5) fand in 1 Liter Milch folgende Salzengen:

Dicalciumphosphat	0,671 g	Monokaliumphosphat	1,156 g
Tricalciumphosphat	0,806 „	Dikaliumphosphat	0,835 „
Calciumcitrat	2,133 „	Kaliumcitrat	0,495 „
Calciumoxyd (an Kasein gebunden)	0,465 „	Chlorkalium	0,830 „
Dimagnesiumphosphat	0,336 „	Chlornatrium	0,962 „
Magnesiumcitrat	0,495 „		

Kindermehle.

Unter „Kindermehlen“ sind im allgemeinen Gemische von kondensirter Milch mit präparirten Cerealien- oder anderen Mehlen zu verstehen; einige der nachfolgenden Kindermehle bestehen indess aus einfach präparirten Mehlen (besonders Hafermehl). Vergl. auch unter „präparirte Mehle.“

A. Bisquit-Kindermehle.

No.	Nähere Bezeichnung	Zeit der Untersuchung	In der natürlichen Substanz						In der Trocken-Substanz				Analytiker
			Wasser	Stick- stoff- Substanz	Fett	Stickstofffreie Extraktstoffe		Rob- faser	Asche	Stick- stoff- Substanz	lösliche Kohlen- hydrate	Stickstoff in der Trocken- Substanz	
			%	%	%	in kalt. Wasser löslich	unlös.	%	%	%	%	%	
1	I. Henri Nestlé in Vevey	1879	5,30	9,85	3,67	41,16	37,85	—	2,17	10,40	43,46	1,66	N. Gerber ¹⁾ u. ²⁾
2		Juni	1879	5,78	9,96	4,49	45,00	32,75	0,50	1,52 (=)	10,57	47,76	
3		1878	6,36	10,96	4,75	77,08	—	1,85	11,70	—	1,87	Phys. Institut Leipzig ¹⁾ Müller ¹⁾	
4		„	—	9,50	—	78,72	—	1,70	10,13	—	1,62		

¹⁾ Nach einer Zusammenstellung von N. Gerber: Milchtztg. 1879, 8, 359.

²⁾ Ferner: Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung 1879, 7, 324.

³⁾ Bei dieser Analyse ist die Kohlensäure und Schwefelsäure als beim Verbrennen entstanden abgezogen.

⁴⁾ Es enthält:

	I No. 2	II No. 2	III No. 3 und 4	VI No. 1 und 2
Phosphor	0,39 %	0,43 %	0,33 und 0,35 %	0,38 % 0,36 %