

16. Klasse. Protozoen. Protozoa.

Wenn wir uns entschließen, diesen jetzt sehr häufig angewandten Namen für die allerniedrigsten Thierformen in Anwendung zu bringen, so geschieht dies eigentlich nur, weil uns kein anderer zu Gebote steht, und ohne damit den in dem Namen ausgedrückten Begriff Urthiere anerkennen zu wollen. Die von uns hier vereinigten Ordnungen werden von Vielen als eigene Klassen angesehen, ebenso wie dies von den Coelenteraten gesagt werden kann.

Einteilung.

1. Ordnung. Infusoria. Besitzen eine contractile Blase.
2. Ordnung. Rhizopoda. Keine contractile Blase; können lange fadenförmige Fortsätze vorstrecken.
3. Ordnung. Porifera. Große pflanzenähnliche Massen, deren thierische Substanz von vielen feinen Löchern durchbohrt ist, um dem Wasser den Eintritt zu gestatten.

I. Ordnung. Infusionsthierc. Infusoria.

(Polygastrica Ehrb.)

Kleine, meist nur bei starker Vergrößerung unterscheidbare, größtentheils sehr bewegliche Thiere, denen man lange Zeit Mund, After und Magen absprach. Ehrenberg glaubte bei allen eine verhältnismäßig sehr hohe Organisation nachweisen zu können, ähnlich der der Räderthiere; er fand nicht nur bei ihnen einen meist mit Wimpern umgebenen Mund, sondern meinte auch, indem er sie mit farbigen Stoffen fütterte, diese in eine große Anzahl von Magensäcken gelangen zu sehen, die bald radienförmig dem Munde anzuhängen schienen, bald Erweiterungen oder vielmehr Anhänge eines schlauchförmigen Darmes seien, der bald gerade, bald geschlängelt vom Munde zum After gehe, oder sich freisförmig umbiege, so daß der After neben dem Munde läge. Dieser Ehrenberg'schen Anschauungsweise tritt eine andere entgegen, von Mayen und Dujardin angeregt, von Lektorem und den Neueren in verschiedener Weise ausgebildet. Nach Dujardin bestehen diese Thiere aus einer gallertartigen, contra-

ctilen Körpersubstanz, der sogenannten Sarcode; in diese werden nach ihm die Nahrungsmittel hineingepreßt, ohne daß ein Verdauungsapparat vorhanden wäre, die angeblichen Magen sind nur Bissen, die ganze Organisation ist eine sehr elementare, nicht einmal ein After ist vorhanden, noch weniger andere Organe oder Organsysteme. Mayen und seine Nachfolger sehen in den Infusorien, deren Organisation ihnen ähnlich wie Dujardin scheint, nur einzellige Thiere.

In neuester Zeit hat sich die Ansicht von einer complicirteren Organisation bei vielen Forschern wieder geltend gemacht; gestützt auf sorgfältige Beobachtungen Focke's, Cohn's und Anderer halten sie die Infusorien für Thiere mit meist sehr großer Leibeshöhle, welche zugleich Verdauungshöhle ist; in dieselbe wird die Nahrung, meist, doch nicht immer, am Grunde eines Schlundes in Bissen geformt, hineingestoßen und rotirt mit dem Inhalte derselben in ihr herum, bis die unverdaulichen Bissen (nach Ehrenberg in Magenblasen) an den After gelangen, wo sie ausgestoßen werden. — Rothgefärbte Punkte, welche zuweilen vorkommen, hält Ehrenberg für Augen; bei zwei Gattungen hat derselbe auch Nervenmark-Ganglien als Unterlage der Augen angegeben (Amblyophis und Euglena); gegen diese Deutung haben sich jedoch die meisten Stimmen erhoben; vielleicht deutet ein uhrglasförmiger, stark lichtbrechender Körper, welchen Lieberkühn zuerst bei Ophryoglena beschrieb, eher auf ein Sinnesorgan. Als Gefäßsystem sehen Viele der Neueren eine contractile Blase an (Samenblase nach Ehrenberg) mit den davon ausgehenden zum Theil sehr langen und verzweigten (Ophryoglena flava), zum Theil circulären Gefäßen; Andere halten dieses Gefäßsystem für ein Excretions- oder ein respiratorisches Wasser-gefäßsystem, indem sie glauben, daß es sich nach außen öffne; außerdem wird nur die Haut des ganzen Körpers als Respirationsorgan angesehen werden müssen. In der Haut sind bei vielen Infusorien (Bursaria, Paramecium etc.) kleine stabförmige oder spindelförmige Körper (Nesselorgane) befestigt, aus welchen ein ziemlich langer Faden hervorschießen kann, durch dessen Berührung andere Infusorien gelähmt werden. Bewegungsorgane sind äußere Wimpern und bisweilen fußartige Haken; doch sind Muskeln bei verschiedenen Arten beobachtet, theils im Körper (Stentor), theils im Stiel der Schnellvorticellen, bei denen der

Stielmuskel sich im Körper in eine Muskelschicht fortsetzt; viele können alle oder bestimmte Stellen des Körpers zu veränderlichen Fortsätzen (Pseudopodien) verlängern oder ausstülpen, welche ebenfalls zur Bewegung dienen (Infusoria rhizopoda). Ehrenberg's Ansicht von der Zwitternatur der Infusorien ist nicht bestätigt, die für Eier von ihm gehaltenen Theile werden jetzt für anderweitige Körpertheile angesehen; der Theil jedoch, welchen er für den Hoden hielt, hat sich als ein Fortpflanzungsorgan herausgestellt. Nach den Beobachtungen Focke's, Cohn's, besonders Stein's und Anderer entstehen in diesem Organ (Nucleus von ihnen genannt) oder einem abgetrennten Theile desselben ein oder mehrere Junge, oft der Mutter sehr unähnlich, welche nach einiger Zeit aus dem Mutterkörper austreten. Nur für die Jungen der Acineten ist das weitere Schicksal bekannt, sie werden wieder Acineten. J. Müller und Andere beobachteten in andern Individuen, zum Theil derselben Arten, für welche die Entstehung von Embryonen im Kern beobachtet ist (Stentor, Paramecium), in diesem Organ oder einem Theile desselben die Entstehung von Bündeln fadenförmiger Körper, welche sehr an Samensäden erinnern und bei Stentor auch eine ähnliche Bewegung zeigten. Nach Stein gestalten manche Infusorien, nachdem sie sich zusammengezogen und mit einer kugelförmigen Hülle, Cyste, umgeben, ihren gesammten Leibesinhalt in Embryonen um, zu denen der zerfallende Nucleus die Grundlage abzugeben scheint. Am häufigsten beobachtet man bei ihnen Theilung, Längs- oder Quertheilung und bei Einigen (Vorticellina, Dendrosoma) Knospenbildung. Eine Vereinigung zweier oder mehrerer Thiere zu einem Ganzen, bei welchem selbst die Leibeshöhle gemeinsam wird (Conjugation oder Zygose), ist bei Vorticellinen, Acinetinen und Rhizopoden-Infusorien beobachtet. Daß die Infusionsthierchen auch durch Urzeugung (generatio aequivoca, originaria) aus den dem Wasser beigemengten organischen Stoffen entstehen, ist früher allgemein geglaubt, jetzt möchte diese Theorie nur noch wenige Anhänger haben. Jedenfalls erscheinen manche Arten leicht in Aufgüssen organischer Substanzen unter Luftzutritt; es ist aber leicht ihr Eindringen von außen zu erklären, da sie nicht nur zu der oben erwähnten Art der Fortpflanzung, sondern auch sonst sehr häufig sich encystiren; in diesem Zustande, in welchem sie eine große Lebensfähigkeit haben, können sie dann sehr leicht vom

Winde verweht werden und in die Aufgüsse gelangen, um hier selbst oder in ihren Nachkommen aus denselben hervor zu gehen. Einige leben im süßen Wasser, andere im salzigen, einzelne Arten (z. B. *Euplotes Charon.*) in beiden.

Viele der früher zu den Infusorien gezählten Wesen werden jetzt mit mehr oder weniger großem Rechte von den Meisten nicht mehr zu ihnen gerechnet, sondern zum Theil selbst von den Botanikern als Pflanzen beansprucht. So ist für die Zitterthierchen (*Vibrionidae* Ehrbg.) kein anderes Merkmal thierischer Natur angeführt, als die Bewegung, in der sie sich aber vielen entschiedenen Pflanzen, z. B. den *Dicillarien* anschließen. Für die *Closterien* und *Bacillarien*, welche von den Botanikern als *Desmidiaceen* und *Diatomeen* zu den Algen gerechnet werden, giebt Ehrenberg nicht nur an, daß sie sich bewegen, sondern auch für einige Arten, daß er sie fressen gesehen; sollte sich dies bestätigen, und sie sonach zu den Thieren zu rechnen sein, so würden wir sie dennoch nicht zu den Infusorien rechnen können, da ihnen die contractile Blase fehlt. Die *Volvocinen*, viele *Monaden* und die *Euglenen* dagegen, welche viele Botaniker gleichfalls für Pflanzen halten, glauben wir zu den Infusorien rechnen zu müssen, weil sie eine contractile Blase besitzen und viele dieser Wesen fressend beobachtet wurden. Wenn noch in neuerer Zeit gewisse Infusorien für Jugendzustände z. B. der *Planarien* gehalten sind, so beruht dies nur auf mangelhafter Kenntniß der eigentlichen Infusorien, die meisten der für Infusorien gehaltenen Embryonen anderer Thiere entbehren den Mund, alle die contractile Blase. — Wir folgen der von *Claparède* und *Lachmann* vorgeschlagenen Eintheilung.

Literatur.

- O. Fr. Müller, *Animalcula infusoria fluviatilia et marina*. Hafniae 1786. 4.
 Ehrenberg, *Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen*. Leipzig 1838. fol.
 Dujardin, *Histoire naturelle des Zoophytes. Infusoires*. Paris 1841. 8.
 v. Siebold, *Lehrbuch der vergleichenden Anatomie*. Band I. p. 7—25. 1848.
 Perty, *Zur Kenntniß kleinster Lebensformen*. Bern 1852. 4.
 Stein, *Die Infusionsthierchen auf ihre Entwicklung untersucht*. Leipzig 1854. 4.

Claparède et Lachmann, Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodes. Genève 1858–59. 4.

Stein, Der Organismus der Infusionsthier nach eigenen Forschungen in systematischer Reihenfolge bearbeitet. 1. Abth. Leipzig 1859. fol.

I. Unterordnung. Infusoria ciliata. Wimperthiere.

(Enterodela Ehrbg. 3. Th.)

Bewegungsorgane: selbst im ausgebildeten Zustande Wimpern; ein Mund; alle besitzen einen After.

A. Wimperthiere mit offenstehendem Munde, welchen sie nicht willkürlich erweitern können; Wimpern treiben die Nahrung mit dem Wasser durch den Mund und daran hängenden bewimperten Schlund.

1. Familie.

Vorticellina. Glockenthierchen. Mund und After in gemeinsamer tiefer Grube, zu welcher eine verschieden lange, rechtsgewundene Spirale von Wimpern führt; der übrige Körper nackt oder zeitweise mit einem hinteren Wimperkranz versehen.

a) Festsitzende, nackte Glockenthierchen. (Vorticellina Ehrbg.)

1. Gatt. Vorticella Müll. Glockenthierchen. Mit einfachem, unverästelten Stiel festsitzend, welcher durch einen Muskel spiralförmig zusammenzuziehen kann. V. microstoma. Vorderer Theil (Peristom) des engglockenförmigen Körpers enger als der mittlere. $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{125}$ ". Gemein in Wässern mit faulenden Substanzen. V. campanula. Vorderer Theil des breitglockenförmigen Körpers nach hinten etwas zurückgeschlagen, breiter als die Mitte. $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{40}$ ". Gemein in süßem Wasser.

2. Gatt. Carchesium Ehrbg. Viele Thiere auf verästeltem Stiele in welchem jeder Zweig seinen isolirten Muskel besitzt. C. polypinum. Vorderer Theil des engtrichterförmigen Körpers nach hinten zurückgeschlagen. Stiel nicht gegliedert. $\frac{1}{20}$ ". Die ganze Colonie bis $1\frac{1}{2}$ ". — Zoothamnium E.

3. Gatt. Epistylis E. Viele Thiere auf verästeltem muskellosen Stiele. E. plicatilis. Die Körperhaut schlägt sich beim Zusammenziehen an der Basis um, $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{60}$ ", die ganze Colonie flach schirmförmig, bis $1\frac{1}{2}$ ". Besonders auf Paludinengehäusen. — Opercularia E.

4. Gatt. Scyphidia Duj. Einzelthiere mit wulstigem Hinterende ohne Stiel, sitzend. Auf nackten Theilen von Mollusken und Würmern. Sc. physarum. Körper cylindrisch. $\frac{1}{20}$ ", auf Physa. — Gerda Clap.

b) In einem häutigen oder gallertartigen Gehäuse sitzende Glockenthierchen (Ophrydina Ehrbg.).

5. Gatt. Ophrydium Ehrbg. Viele Thiere in oft großer Gallertbülle. O. versatile; im süßen Wasser.

6. Gatt. Cothurnia Ehrbg. Jedes Thier mit dem Hinterende in

einem häutigen Gehäuse befestigt, das gleichfalls mit dem hinteren Ende angeheftet ist. *C. imberbis*, auf *Cyclops quadricornis*. — *Vaginicola* E.

7. Gatt. *Lagenophrys* Stein. Mit dem vorderen Rand des Körpers in einem häutigen Gehäuse aufgehängt. *L. vaginicola*. Auf *Cyclops staphylinus*. $\frac{1}{32}$ ".

c) Frei schwimmende oder auf nackten Wasserthieren laufende Vorticellinen, die stets einen hintern Wimperkranz besitzen.

8. Gatt. *Trichodina*. Ein horniger Ring am hintern Leibesende. *Tr. Pediculus*. Der Hornring außen und innen gezähnt. $\frac{1}{30}$ ". Auf Armpolypen, Fischkiemen u. s. w.

Verwandte Gattungen: *Trichodinopsis* Clap. *Spirochona* Stein (?).

2. Familie.

Urocentrina. Kreiselthiere. Mund in einer den Körper umgebenden Furche, in welcher Wimpern, übrigens nackt.

Gatt. *Urocentrum* Nitzsch. *U. Turbo*. Süßwasser.

3. Familie.

Oxytrichina. Geckelthierchen. Außer einer zum Munde führenden Reihe von Wimpern noch andere Körperanhänge, mit deren Hilfe die Thiere kriechen. Rücken nackt. Mund und After auf der Bauchseite des Thieres.

a) Längs des Seitenrandes des Körpers Wimpern.

1. Gatt. *Oxytricha* Bory. Auf dem Bauche Längsreihen von starken Wimpern. *O. multipes*. 7 Längsreihen von Wimpern auf dem Bauche, vier davon reichen bis an das vordere Ende des Thieres, hinten 8 längere und stärkere Anhänge (Ruderfüße). *O. gibba*. 5 Längsreihen von Wimpern. Beide im süßen Wasser. — Verwandte Gattung: *Stichochaeta* Clap.

2. Gatt. *Stylonychia* Ehrbg. Keine Wimperreihe am Bauche, sondern verschiedene, zum Theil gekrümmte (Haken oder Krallen) Körperanhänge, nicht in Reihen gestellt. 5 Ruderfüße oder Griffel. *St. Mytilus*. Körper vorn verbreitert; 13 Haken oder Krallen, 3 nicht verästelte Borsten am Hinterende. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{5}$ ". *St. pustulata*. Körper vorn nicht breiter, sonst ebenso; halb so lang. Beide häufig im süßen und salzigen Wasser.

b) Keine seitliche Wimperreihe.

3. Gatt. *Euplotes* Ehrbg. Wimpern vorn am Körper, Krallen. E. Charon. Starke granulirte Längsstreifen. 10 Krallen, 5 Schleppfüße (Griffel), 4 unverästelte Borsten am Ende. Im Süß- und Salzwasser sehr gemein. $\frac{1}{30}$ ". *E. patella*. 9 Krallen, 5 Schleppfüße, 2 von den vier Borsten verästelt.

Verwandte Gattungen: *Schizopus* Clap. u. Lachm. *Campylopus* Clap. und Lachmann.

4. Gatt. *Aspidisca* E. Vorn keine Wimpern. Krallen und Ruderfüße. *A. Lynceus*. Rücken glatt. 7 Krallen, 5 Schleppfüße. Gemein.

4. Familie.

Tintinnodea. Glockenförmige Thiere, ringsbewimpert, am abgestuften und ausgehöhlten vordern Körperende einige Wimperkreise, zwischen denen der Mund. After an der Seite nahe dem hintern Ende. Alle die zahlreichen bekannten Arten leben in häutigen oder schleimigen Gehäusen, meist in der See; nur eine Art in Schleimröhren bewohnt das süße Wasser.

Gatt. *Tintinnus* Ehrbg. *T. denticulatus*. Im zugespitzten Grunde eines cylindrischen Gehäuses befestigt, welches zierlich chagrinirt und an der Windung gezähnt ist. Meer von Spitzbergen, Nord- und Ostsee, atlantischer Ocean.

5. Familie.

Bursarina. Körper rings bewimpert, zum Munde führt eine Reihe stärkerer Wimpern.

a) *Stentorina*. After vorn auf dem Rücken des Thieres, nahe der zum Munde führenden Wimperspirale; die Thiere sind im Stande, eine häutige oder schleimige Hülle auszusondern.

1. Gatt. *Stentor* Oken. Körper trompetenförmig, Wimperspirale auf dem vorderen Rande der Trompete. *St. polymorphus*. Eine contractile Blase nahe dem Munde, Nucleus band- oder rosenkranzförmig. Farblos, bläulich, grün oder schwarz. $\frac{1}{2}$ ". Süßwasser. — Verwandt: *Freia* Clap. und *Lachm. Chaetospira* Lachm.

b) *Bursarina*. After nahe oder an dem hintern Körperende. Kein Gehäuse.

2. Gatt. *Leacophrys* Ehrbg. Körper vorn durch eine schiefe (Stirn-) Fläche abgestutzt, am Rande derselben die Wimperreihe. *L. patula*. Contractile Blase am Ende des Thieres, davon ausgehend an jeder Seite ein Längsgefäß. Grün und farblos. Im Süßwasser.

3. Gatt. *Spirostomum* E. An der rechten Seite des linearen Körpers eine Wimperreihe bis zum Munde. *Sp. ambiguum*. Mund hinter der Körpermitte, Nucleus sehr lang und gebogen.

4. Gatt. *Plagiotoma* Duj. Ebenso, nur Körper zusammengebrückt und nicht linear. *Pl. cordiformis*. Im Mastdarm des Frosches. *Pl. coli*. Von Malmsten im Mastdarm des Menschen gefunden.

Verwandte Gattungen: *Kondylostoma* Duj. *Balantidium* Clap. *Lembadium* Perty. *Bursaria* Ehrbg. *Metopus* Clap. *Frontonia* Ehrbg.

5. Gatt. *Ophryoglena* Ehrbg. Ein uhrglasförmiges, stark lichtbrechendes Organ dicht am Munde. *O. flava*. Kein Pigment. (Augen-) Fleck; keine Nesselorgane; sehr leicht zu beobachtendes Gefäßsystem.

6. Familie.

Colpodea. Körper nur mit nahezu gleich starken Wimpern bedeckt, keine besondere zum Munde führende Reihe stärkerer Wimpern.

1. Gatt. *Paramecium* Ehrbg. Körper rings bewimpert. *P. Aurelia*. Mund in oder hinter der Mitte des Körpers, After nahe dem hintern Ende des Oesophagus, zwei contractile Blasen. Sehr häufig.

2. Gatt. *Colpoda* Ehrbg. Ebenso, aber ein Busch von Wimpern bildet eine Unterlippe. *C. cucullus*. Sehr häufig in Dachtraufen und Henaufgüssen.

3. Gatt. *Glaucoma* Ehrbg. Eine beständig hin und her klappende kurze Membran, „Lippe“, an jeder Seite des Mundes. *G. scintillans*. Häufig in allen süßen Wässern.

Verwandte Gattungen: *Cyclidium* Ehrbg. *Pleuronema* Duj.

B. Mund in der Ruhe geschlossen, aber wie der Oesophagus willkürlicher Erweiterung fähig, letzterer nicht bewimpert; fressen andere Thiere, oft von bedeutenderer Größe als sie selbst, mittelst Schlingbewegungen.

7. Familie.

Dysterina. Körper vorn und auf dem Bauche bewimpert; ein eingelenkter Fuß; ein eigenthümlicher Stäbchenapparat im Oesophagus.

1. Gatt. *Dysteria* Huxley. Ein Panzer, bestehend aus zwei nur hinten vereinigten Schalen. *D. spinigera*. Eine Schale gewölbt mit 2 Dornen. Nordsee.

Verwandt: *Iduna*. *Aegyria*. *Huxleya* Clap. und Lachm.

8. Familie.

Trachelina. Körper größtentheils bewimpert, ohne Fuß.

1. Gatt. *Chilodon* Ehrbg. Nur der Bauch bewimpert; ein fischreusenartiger Stäbchenapparat im Oesophagus. *Ch. Cucullulus*. Sehr häufig im süßen Wasser.

Verwandt: *Trichopus* Clap. und Lachm.

2. Gatt. *Prorodon* Ehrbg. Der ganze Körper bewimpert. Mund mit fischreusenartigem Apparat am vordern nicht verengten Körperende. *Pr. nivosus*. Nucleus lang S förmig gekrümmt. Häufig im reinen Wasser.

Verwandte Gattung: *Enchelyodon* Clap. und Lachm. *Nassula* Ehrbg.

3. Gatt. *Lacrymaria* Ehrbg. Körper rundlich, rings bewimpert. Mund an der conischen Spitze des sehr beweglichen halsartigen Vordertheils längs gefaltet. *L. Olor*. Nicht selten im süßen Wasser.

Verwandte Gattung: *Phialina* Ehrbg. *Trachelophyllum* Clap.

4. Gatt. *Enchelys* Ehrbg. Körper rings bewimpert. Mund am vordern verengten Körperende. *E. farcimen*. Eine contractile Blase. Im Süßwasser.

Verwandt: *Holophrya* Ehrbg. *Urotricha* Clap.

5. Gatt. *Trachelius* Ehrbg. Ein verzweigter Darm. *Tr. ovum*.

Verwandt: *Loxodes* Ehrbg. *Loxophyllum* Duj. *Amphileptus* Ehrbg.

9. Familie.

Colepina. Ebenso. Körper durch kleine starre Plättchen (Kieselsäure?) gepanzert, zwischen diesen Wimpern.

Gatt. *Coleps* Ehrbg. Mund vorn, After hinten. *C. hirtus*. Hinten 2 oder 3 Spitzen. Sehr häufig.

10. Familie.

Halterina. Körper unbewimpert; nur um den Mund eine Reihe starker Wimpern.

Gatt. *Halteria* Duj. *H. grandinella*. Mit einem Kranze langer Borsten versehen; mit deren Hilfe das Thier oft plötzliche, weite Sprünge macht. Häufig im süßen Wasser.

Verwandt: *Strombidium* Clap.

Anhang: Opalinen. Ohne Mund. Entozoen.

II. Unterordnung. Infusoria suctoria.

Nur in der Jugend Wimpern, später keine Bewegungsorgane; zahlreiche Saugrüssel, mit denen sie andere Infusorien ausfangen.

1. Familie.

Acinetina. Diese Thiere wurden fälschlich von Stein für Entwicklungszustände der Vorticellen gehalten.

1. Gatt. *Podophrya* Ehrbg. Ungepanzert; Körper nicht verzweigt, gestielt. Saugrüssel geknöpft. *P. fixa*. Körper rundlich. Saugrüssel zerstreut, mit einem Stiel an Wasserpflanzen geheftet. Nucleus niereenförmig. Sehr häufig, besonders in fauligem Wasser.

Verwandte Gattungen: *Sphaerophrya* Clap. und Lachm., *Trichophrya* Clap., *Acineta* Ehrbg., *Solenophrya* Clap. und Lachm.

2. Gatt. *Dendrosoma* Ehrbg. Körper nicht gepanzert, durch Knospung zu einem verästelten Baum heranwachsend. Saugrüssel geknöpft. *D. radians*. Bei Berlin selten.

Verwandte Gattung: *Dendrocometes* Stein. *Ophryodendron* Clap. und Lachm.

III. Unterordnung. Infusoria cilioflagellata.

Bewegungsorgane: ein Ring von Wimpern und eine lange Geißel; Organisationsverhältnisse noch wenig erforscht, meist Seethiere, einige im süßen Wasser.

1. Familie.

Peridinaea.

1. Gatt. *Ceratium* Duj. Erwachsen gepanzert, mit Fortsätzen, in der Mitte des Körpers eine Quersfurche mit Wimpern. *C. tripus* mit drei in Form eines Ankers stehenden verschieden langen Fortsätzen. Meer bei Spitzbergen, Nordsee, Ostsee, atlantisches Meer, Mittelmeer.

2. Gatt. *Peridinium* Ehrbg. Ebenso, ohne Fortsätze. *P. tabulatum*. Süßwasser.

Verwandt: *Dinophysis* Ehrbg. *Amphidinium* Clap. und Lachm. *Prorocentrum* Ehrbg.

IV. Unterordnung. Infusoria flagellata.

Bewegungsorgane: eine oder mehrere Geißeln; Mund dicht am Grunde der Geißeln oder zu Saugrüsseln verlängert; haben 3. Th. unbewegliche Ruhezustände, wegen deren sie von vielen für Pflanzen gehalten werden.

1. Familie.

Astasiaea. Körperform sehr veränderlich.

1. Gatt. *Euglena* Ehrbg. Körper beim ruhigen Schwimmen spindelförmig, eine Geißel, ein rother sg. Augenpunkt. *E. viridis*. Grün; kurz spindelförmig; glatt. Säuflig, mitunter das Wasser ganz grün färbend.

Verwandte Gattungen: *Astasia*. *Phacus*.

2. Familie.

Dinobryina. Ebenso, jedes Thier in kleinem Gehäuse, welches mit vielen gleichen zu einem zierlichen verzweigten Stocke vereinigt ist.

Gatt. *Dinobryon* Ehrbg. *D. Sertularia*. Einzelthiere grün, jedes mit einer Geißel. Nicht selten.

3. Familie.

Cryptomonadina. Form wenig veränderlich, in einem vorn stark verengten Gehäuse.

1. Gatt. *Chonemonas* Perty. 2 Geißeln; ein rother Augenpunkt. Panzer mit kleinen Stacheln versehen.

Verwandte Gattungen: *Trypemonas* Perty. *Cryptomonas* Ehrbg.

4. Familie.

Monadina. Ebenso, ohne Gehäuse.

1. Gatt. *Heteromita* Duj. Körper glatt, vorn eine in jedem Sinne bewegliche und eine weit längere gewöhnlich nachgeschleppte Geißel, mit Hilfe deren das Thier sich in plötzlichem Sprunge zurückziehen vermag. *H. ovata*. Nicht selten.

2. Gatt. *Mallomonas* Perty. Körper rundlich mit einer Geißel und mit Springborsten.

Verwandte Gattungen: *Monas* Ehrbg. *Tetramitus* Perty. *Cercomonas* Duj.

5. Familie.

Volvocina. Viele Thiere bleiben nach der Theilung zu einer regelmäßig geformten Colonie vereint.

1. Gatt. *Volvox* Ehrbg. Einzelthiere im Umfange einer Gallertkugel, durch Fortsätze des Körpers verbunden. *V. globator*. Gemein in stehenden Gewässern.

2. Gatt. *Gonium* Ehrbg. Einzelthiere in einer Gallertscheibe. *G. pectorale*. Nicht selten.

3. Gatt. *Syncrypta* Ehrbg. Einzelthiere mit geknöpften Saugrüsseln. *S. Volvox*. Grün, nicht selten in stehenden Gewässern.

V. Unterordnung. Infusoria rhizopoda.

Bewegungsorgane: veränderliche aus- und einstülpbare Fortsätze. Besitzen nach der Ansicht der meisten Autoren keinen Mund, sondern nehmen an jeder Stelle des Körpers Nahrung auf. Von Vielen zur folgenden Ordnung gerechnet.

1. Familie.

Amoebina. Bewegung durch unregelmäßige platte Fortsätze.

1. Gatt. *Amoeba* Ehrbg. Ungepanzert, Fortsätze nach dem Ende allmählich verschmälert. Rundlicher Ruhezustand. *A. radiosa*. Im Ruhezustand mit unregelmäßigen ziemlich allseitig abstehenden spizen Fortsätzen, beim Kriechen die Fortsätze gleichfalls spiz. *A. princeps*. Ruhezustand ohne Fortsätze. Im Kriechen wenige breit abgerundete Fortsätze. Beide häufig.

Verwandt: *Podostoma* Clap. und Lachm. *Petalopus* Clap. und Lachm.

2. Gatt. *Arcella* Ehrbg. Gepanzert, Panzer fest, nur aus einem Secret des Thieres bestehend. *A. vulgaris*. Mehrere contractile Blasen, Panzer ungefähr halbkugelig, chagrinirt.

Verwandte Gattung: *Diffugia* Ehrbg. *Echinopyxis* Clap. und Lachm. *Pseudochlamys* Clap.

2. Familie.

Actinophryina. Dünne zugespitzte Fortsätze gehen strahlig von allen Seiten des Körpers aus oder nur von einem Punkte. An den Fortsätzen eine auf- und absteigende Körnchenbewegung.

1. Gatt. *Actinophrys* Ehrbg. Ungepanzert; Fortsätze von allen Seiten des Körpers. *A. Sol.* Gemein.

Verwandt: *Trichodiscus* Ehrbg. *Plagiophrys* Clap. *Pleurophrys* Clap. *Trinema* Duj. *Euglypha* Duj. *Urnula* Clap. und Lachm.

II. Ordnung. Rhizopoda. Wurzelfüßer.

Der Körper besteht aus einer gallertartigen Masse, aus der lange dünne Fäden (Pseudopodien) hervorgestreckt werden können, an denen man sehr feine Körnchen vom Körper aus längs den Fäden hinströmen sieht. Diese Fäden dienen theils der Bewegung, indem sie sich an fremden Körpern anheften können, theils der Nahrungsaufnahme, indem sie die zur Nahrung geeigneten Körper umfassen, dadurch lähmen, und in das Innere der Körpersubstanz einpressen. Eine bestimmte Verdauungshöhle ist nicht vorhanden; ja es scheint, daß oft den fremde Körper umspinnenden Fäden die Fähigkeit zugeschrieben werden müsse, Nahrungsstoffe auszu ziehen. Eine contractile Blase, wie sie die Infusorien besitzen, ist niemals vorhanden. Weder Nervensystem, noch Circulations- noch Athmungsorgane sind bekannt. Manche sind von kalkigen Schalen umgeben, aus deren Oeffnungen die Fäden hervortreten, andere sind von Kiesel skeleten oder Nadeln gestützt. Alle leben im Wasser, mit wenigen Ausnahmen im Meere.

Literatur

- D'Orbigny, Tableau méthodique de la classe des Cephalopodes. Annales des sc. nat. VII. 1826. p. 245.
 Dujardin, Observations nouvelles sur les Cephalopodes microscopiques ib. 2e sér. III. 1835. p. 108. — Recherches sur les organismes inférieurs. I. Sur la Gromia oviformis et les Rhizopodes en général. Ibid. IV. p. 343.
 Ehrenberg, Ueber noch sehr zahlreiche Thierarten der Kreidebildung und den Organismus der Polythalamien. (Abh. der Acad. der Wiss. zu Berlin 1839.)
 D'Orbigny, Histoire de l'Isle de Cuba par Ramon de la Sagra, Foraminifères; — Hist. nat. des Canaries par Webb et Berthelot, Foraminifères; — Voyage dans l'Amérique méridionale par Alcide d'Orbigny, Foraminifères (Vergl. Archiv f. Naturgesch. 1840. I. p. 398).
 Max Schultze, Ueber den Organismus der Polythalamien nebst Bemerkungen über die Rhizopoden im Allgemeinen. Leipzig 1854. 4.
 J. Müller, Ueber die Thalassicolle, Polychsetinen und Acanthemeten des Mittelmeeres. (Abh. der Acad. der Wiss. zu Berlin 1858.)
 Häckel, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria), eine Monographie. Mit Atlas. Berlin 1862. 4.

I. Unterordnung. **Foraminifera. Foraminiferen.**
(Polythalamia Ehrbg. Schnörkelforallen.)

Kleine, mikroskopische Thiere mit gallertartigem gefärbten Körper, der meist in Abschnitte getheilt, oder einfach ist. Er ist in einer kalkigen, sehr selten knorpeligen oder häutigen Schale enthalten, die der Oberfläche des Thieres vollkommen entspricht, und daher ebenfalls meist in Abschnitte (Kammern) getheilt ist. Manche besitzen eine solide homogene Schale; bei Andern ist sie von zahlreichen feinen Löchern oder Kanälen durchbohrt. Bei Einigen sind auch Kanäle nachgewiesen, welche sich in der Wandung der Kammern gefäßartig verästeln. Die Pseudopodien treten aus einer oder mehreren Oeffnungen oder Poren der letzten Kammer hervor; ihre Länge übertrifft oft die Größe der Schale beträchtlich, um das Zwölffache und darüber. In systematischer Beziehung hat diese Abtheilung von Thieren mannichfaltige Schicksale gehabt. Anfänglich zählte man sie wegen der Aehnlichkeit der Schalen den Cephalopoden zu, Ehrenberg vereinigte sie mit den Bryozoen, Agassiz sieht sie als den Gasteropoden zugehörig an, d'Orbigny bildete aus ihnen eine eigene Klasse zwischen den Schinodermen und Polypen, Dujardin vereinigte sie mit den Infusionsthieren, wir hatten ihnen früher vorläufig die unterste Stelle bei den Mollusken angewiesen. Jetzt hat man sich fast allgemein über ihre Stellung unter den Protozoen geeinigt; keineswegs ist man eben so einig über ihre Umgrenzung. Oft werden ihnen nämlich auch die Infusorien unserer fünften Unterordnung zugezählt, die freilich durch ihre Pseudopodien ihnen ähnlich werden, aber durch die contractile Blase sich bestimmt von ihnen unterscheiden. Erstaunlich groß ist die Menge der an den Meeresküsten vorkommenden Foraminiferen. d'Orbigny berechnete die Zahl der in einer Unze Sand von den Antillen vorhandenen Stücke auf 3890000, während Schulze 1500000 in einer Unze von Molo di Gaeta fand. Somit spielen diese Thiere trotz ihrer Kleinheit eine große Rolle in der Natur. Da die weichen Theile keinen Anhalt für die weitere Eintheilung darbieten, so sind die bisherigen Versuche auf Verschiedenheiten der Schalen gegründet. Wir folgen der neuesten Eintheilung von Schulze.

A. Gehäuse einkammerig; das Thier ungetheilt, der einfachen

Höhle der Schale entsprechend (*Monothalamia* Sch., *Monostega* d'Orb., *Miliolina* Ehrbg.).

1. Familie.

Lagynida. Eine beutelförmige, kalkige oder häutige, nicht fein poröse Schale mit einer großen Oeffnung.

Gatt. *Gromia* Duj. Schale häutig, kugelig mit kurzem Halse. *G. oviformis*. An den europäischen Küsten. *G. flaviatilis*. In der Seine.

2. Familie.

Orbulinida. Eine kugelige, kalkige Schale ohne größere Oeffnung, an der ganzen Oberfläche fein durchbohrt.

Gatt. *Orbulina* d'Orb. *O. universa*. Weit verbreitet.

3. Familie.

Cornuspirida. Eine kalkige Schale wie ein Planorbis-Gehäuse gewunden, mit einer großen Oeffnung.

Gatt. *Cornuspira* Sch. Schale solide oder fein porös, scheibenförmig, auf beiden Seiten gleich, eine große Oeffnung am Ende der Windungen. *C. planorbis*. Mossambique, Triest. *C. perforata* Mossambique.

B. Gehäuse vielkammerig, das Thier aus Segmenten gebildet, welche durch Brücken untereinander zusammenhängen (*Polythalamia*).

a. Die Kammern in einer Spirale angeordnet (*Helicoidea*).

4. Familie.

Miliolida (*Agathistega* d'Orb.). Jede Kammer nimmt eine halbe Windung ein, die einzelnen Windungen entweder in einer oder in verschiedenen Ebenen aufgewickelt; nur eine größere Oeffnung am Ende der letzten Windung, feine Poren fehlen.

1. Gatt. *Biloculina* d'Orb. Kammern in einer Ebene, die letzte bedeckt stets die vorhergehenden, so daß nur zwei sichtbar.

2. Gatt. *Spiroloculina* d'Orb. Kammern nur in einer Ebene, an einander gelegt, ohne sich zu verdecken, daher alle sichtbar.

3. Gatt. *Triloculina* d'Orb. Kammern nach drei Seiten aufgewickelt, drei Kammern sichtbar; Oeffnung rundlich, mit einem Zahn. Viele Arten.

4. Gatt. *Sphaeroidina* d'Orb. Kammern nach vier Seiten aufgewickelt.

5. Gatt. *Quinqueloculina* d'Orb. Kammern nach fünf Seiten aufgewickelt, daher fünf sichtbar; Oeffnung mit einem Zahn. Zahlreiche Arten.

5. Familie.

Turbinoida. Die Kammern sind helixartig geordnet; das Gewinde ist nur auf einer Seite der Schale sichtbar; zuweilen ist die Schale so in die Länge gezogen, daß die Kammern wie in zwei Reihen alternirend nebeneinander liegen. Die Schale besitzt eine größere Oeffnung an der letzten Kammer und ist fast immer an der ganzen Oberfläche fein durchbohrt.

a. Gehäuse flach oder kegelförmig, die Kammern nicht umfassend, Schale glasartig durchsichtig, fein durchlöchert. (Rotalida.)

1. Gatt. *Rotalia* Lam. Schale niedrig, keiselförmig, Oeffnung in der Nähe der vorletzten Windung als Längsspalte. Viele Arten. Einige haben seitliche spornartige Anhänge (*Calcarina* d'Orb.), so *C. calcar*.

2. Gatt. *Planorbulina* d'Orb. Schale feststehend, scheibenförmig, Kammern oben convex, unten platt, sich den Körpern, denen sie aufliegen, anschmiegend. *P. vulgaris*. Weit verbreitet.

3. Gatt. *Asterigerina* d'Orb. Auf der einen Seite der Schale ist ein kleiner Stern sichtbar, eine Folge eigenthümlicher Gruppierung der Schalenkanäle.

b. Gehäuse einer längeren oder kürzeren Traube gleichend, die Kammern oft ziemlich vollständig umfassend; Schale meist dick und grob durchlöchert, oder solide (*Uvolidida*).

4. Gatt. *Bulimina* d'Orb. Schale thurmförmig mit ausgezogener Spira, Kammern wenig vorspringend, die letzte nicht in eine Röhre verlängert.

5. Gatt. *Uvigerina* d'Orb. Wie vorige mit stark vortretenden kugligen Kammern; die letzte in eine Röhre verlängert, an deren Ende die Oeffnung.

6. Gatt. *Guttulina* d'Orb. Kammern bilden drei Längsreihen; Oeffnung rund, am Gipfel der letzten Kammer.

7. Gatt. *Clavulina* d'Orb. Schale nur in der Jugend spiral, thurmförmig, später in einer geraden Linie vorgestreckt.

8. Gatt. *Polymorphina* d'Orb. Kammern nach allen Seiten alternirend, zahlreich, wenig umfassend; Oeffnung rund, am Gipfel der letzten Kammer. *P. irregularis*. Antillen.

c. Gehäuse so lang ausgezogen, daß die Kammern in einer langen Doppelreihe alternirend neben einander liegen (*Textularida*).

9. Gatt. *Textularia* Desf. Kammern in jedem Alter regelmäßig alternirend; Oeffnung halbmondförmig, quer, seitlich. *T. sagittula*. Mittelmeer.

10. Gatt. *Bigonerina* d'Orb. Kammern in der Jugend zweireihig alternirend, im Alter eine Reihe bildend; Oeffnung central.

d. Textulariden, welche in einer Richtung senkrecht auf die ursprüngliche Spirale noch einmal spiral gebogen sind (*Cassidulinida*).

11. Gatt. *Cassidulina* d'Orb. Oeffnung verlängert auf der Mitte der letzten Kammer, quer auf die Ape.

6. Familie.

Nautiloida. Kammern nautilusartig geordnet, das Gewinde ist auf beiden Seiten sichtbar oder auf beiden Seiten verdeckt; die vordere Wand der letzten Kammer mit einer größeren oder mehreren kleineren Oeffnungen; der übrige Theil der Schale meist fein durchlöchert.

a. Gehäus dick, fein durchlöchert, durchscheinend, mit umfassenden Kammern; eine größere Oeffnung im obern Winkel der vorderen Wand der letzten Kammer (*Cristellarida*).

1. Gatt. *Cristellaria* Lam. Gewinde ganz verdeckt durch die übergreifenden Kammern. Oeffnung rund. *C. gibba*. Mittelmeer, Antillen. Zuweilen ist die Oeffnung dreieckig (*Robulina* d'Orb.).

b. Gehäus ähnlich den vorigen; die Oeffnung in der Nähe der vorigen Windung (*Nonionida*).

2. Gatt. *Nonionina* d'Orb. Schale fast kreisförmig, ohne Kiel, Spira verdeckt; Oeffnung eine Querspalte in der Nähe der vorigen Windung. Viele Arten.

3. Gatt. *Nummulina* d'Orb. Schale kreisförmig oder scheibenförmig, zusammengedrückt, kalkig, mit sehr engen und zahlreichen Windungen; Kammern sehr zahlreich. Nur zwei lebende Arten, viele fossil.

4. Gatt. *Amphistegina* d'Orb. Auf der einen Seite zeigt sich in der Mitte eine kleine Rosette, die nach Schulze wie bei *Asterigerina* eine Folge eigenthümlicher Gruppierung der Schalentheile ist.

c. Gehäus dünnhäutig, immer braun durchscheinend, mit oder ohne feine Poren, Kammern sehr schmal; zahlreiche Oeffnungen über die ganze vordere Wand der letzten Kammer zerstreut, oder statt dieser durch Verschmelzung eine größere Oeffnung (*Peneroplida*).

5. Gatt. *Peneroplis* Montf. Schale comprimirt, Oeffnungen zahlreich, zerstreut, oder in Linien geordnet. *P. protea*. Cuba.

6. Gatt. *Vertebralina* d'Orb. Nur eine Oeffnung, welche die ganze Breite der Schale der letzten Kammer einnimmt.

7. Gatt. *Orbiculina* Lam. Schale veränderlich nach dem Alter; Kammern in ihrer ganzen Länge durch Querwände in Höhlungen getheilt; viele Oeffnungen in Längslinien. *O. adunca*. Antillen, indischer Ocean, wird bis 2''' groß.

d. Gehäus dick, fein porös, die vordere Wand der letzten Kammer hat außer den feinen Poren gar keine oder einige sehr kleine Oeffnungen; auf der Oberfläche sämtlicher Kammern spiralförmige, häufig durchbohrende Vertiefungen (*Polystomellida*).

8. Gatt. *Polystomella* Lam. Die Oeffnungen sind noch offen an den Gruben der letzten Röhre. *P. strigilata*. Häufig im adriatischen Meere.

b. Kammern in einfacher Reihe ohne Spirale geordnet (*Rhabdoidea*).

7. Familie.

Nodosarida. Stabförmige Gehäuse, deren Kammern durch eine große

Öeffnung zusammenhängen; Schale dick, von feinen Porenkanälen durchbohrt.

1. Gatt. *Nodosaria* Lam. Schale gerade, Kammern kugelig, durch Einschnitte getrennt, Öeffnung central am Ende eines Vorsprungs. *N. radiculara*. Ohne Längstreifen. *N. aequalis*. Mit Längstreifen.

2. Gatt. *Frondicularia* Desf. Schale seitlich stark zusammengedrückt, mit runder centraler Öeffnung ohne Vorsprung. Arten im Mittelmeer.

3. Gatt. *Vaginulina* d'Orb. Kammern scheidenartig an einander gereiht, zusammengedrückt, ein wenig schief; Mündung rund, am Rande ohne Vorsprung. Arten im adriatischen Meere.

c. Kammern zu unregelmäßigen Haufen gruppiert (*Soroidea*).

8. Familie.

Acervulinida. Meist kugelige, ganz unregelmäßig aneinander gelagerte, ziemlich gleich große Kammern mit fein durchlöcherter Schale und einigen größeren Öeffnungen an unbestimmten Stellen.

Gatt. *Acervulina* Schultze. Schale frei oder angeheftet, Kammern stark gewölbt; größere Öeffnungen meist in den Winkeln zweier Kammern. *A. inhaerens*. Bräunlich, an Tang geheftet oder frei. Im adriatischen Meere.

II. Unterordnung. Radiolaria. Strahlrhizopoden.

Kleine, meist mikroskopische Thiere von gallertartiger Masse, die meist von einem kieseligen Gerüste in Form eines Gitterwerkes oder von Nadeln (*spicula*), Stacheln oder einem schwammigen Fachwerk gestützt sind, und die durch das Vorhandensein von Pseudopodien mit der eigenthümlichen Körnchenströmung sich den übrigen Rhizopoden anschließen. Sie haben fast alle einen vom Mittelpunkt ausgehenden strahligen Bau, zeigen jedoch die verschiedensten Gestalten; sie sind sphärisch, scheibenförmig, glockenförmig, flaschenförmig, kreisförmig oder sternförmig. Zuweilen kommen diese Thierchen einzeln vor, oft setzen sie sich zu Massen von Größe eines halben Zolles zusammen. Der weiche Körper besteht immer aus einer Centralkapsel und dem extracapsularen Weichkörper. Cistern ist von einer derben Haut umschlossen und enthält immer wasserhelle Bläschen, intercapsulare Sarcode und Fett, oft auch Pigment, Alveolarzellen, centripetale Zellgruppen, seltener Concretionen und Krystalle, und bisweilen eine im Centrum gelegene Binnenblase. Sie ist in eine weiche Schleimschicht, den extracapsularen Weichkörper, ein-

gebettet, von der nach allen Seiten die Pseudopodien ausstrahlen. Die Ernährung scheint von den Pseudopodien übernommen zu werden, da man nie Nahrungstoffe im Innern gefunden hat. Die Bewegung ist sehr beschränkt, ja eine eigentliche freie Locomotion geht den meisten ganz ab; sie können sich jedoch willkürlich langsam im Wasser heben und senken. Das Fortpflanzungsorgan scheint in der Centralkapsel zu suchen zu sein. Die Kieselgerüste haben oft ein sehr zierliches Ansehen. — S. Müller unterschied unter den Radiolaria solitaria drei Familien: Thalassicollae ohne Gehäuse, nackt oder mit Kieselspicula, Polycystinae mit kieseligem negartigen Schalengehäuse und Acanthometrae ohne Gehäuse mit kieseligen Stachelradien; unter den Radiolaria polyzoa zwei Familien: Sphaerozoa ohne Gehäuse und Collosphaerae mit kieseligem negartigen Gehäuse. — Häckel, welcher sehr ausgedehnte Untersuchungen über unsere Thiere angestellt hat, unterscheidet im Ganzen 15 Familien, die wir im Folgenden auführen.

A. Radiolaria solitaria (Monocyttaria). Radiolarien mit einer einzigen Centralkapsel oder isolirt lebende Einzelthiere.

a. Ohne Skelet oder mit extrakapsularem Skelet, die Centralkapsel nicht von radialen Skelettheilen durchbohrt. (Ectolithia.)

1. Familie.

Gallert-Radiolarien. Collida Haeckel. Skelet fehlt oder besteht aus mehreren einzelnen, zusammenhangslosen, rings um die Centralkapsel zerstreuten Stücken (spicula); Centralkapsel kugelig.

1. Gatt. Thalassicolla Huxl. Ganz ohne Skelet. Th. nucleata. Mittelmeer.

2. Gatt. Physematium Meyen. Skelet besteht aus mehreren unbundenen, tangential gelagerten soliden Spicula. Ph. Mülleri. Messina. — Bei Anderen sind die Spicula hohl (Thalassoplaneta Haeck).

3. Gatt. Aulacantha Haeck. Die Spicula sind theils tangential, theils radial gelagert, hohl. A. scolymantha. Messina.

2. Familie.

Geflecht-Radiolarien. Acanthodesmida Haeck. Skelet besteht aus wenigen Bändern oder Stäben, welche ein lockeres Geflecht mit weiten Lücken zusammensetzen.

1. Gatt. Lithocircus Müll. Skelet besteht aus einem die Central-

kapsel umgebenden mit Zacken oder Aesten besetzten Kieselringe. *L. annularis*. Nizza.

2. Gatt. *Acanthodesmia* Müll. Skelet besteht aus einem ganz lockeren Geflecht von Kieselbändern mit wenigen weiten Maschen, von dem Geflechte gehen Dornen aus. *A. vinculata*. Nizza.

3. Familie.

Gitterhelm-Radiolarien. Cyrtida Haeck. Skelet eine verschieden gestaltete extrakapsulare Gitterschale, die am einen Pol (Apicalpol) kuppelförmig geschlossen, am andern Pol (Basalpol) meist weit offen ist. Centrakapsel im Apicalpole eingeschlossen. Die Pseudopodien strahlen durch die Gitterlöcher der Schale, und durch die basale Mündung aus.

1. Gatt. *Litharachnium* Haeck. Gitterschale einfach, ungegliedert ohne Einschnürungen, von radialen Rippen durchzogen. *L. tentorium*. Ausgeschweift kegelförmig; Messina.

2. Gatt. *Dictyospyris* Ehrbg. Gitterschale durch eine longitudinale Einschnürung in zwei neben einander liegende Glieder geschieden; ohne Anhänge. *D. messanensis*. Messina.

3. Gatt. *Lithomelissa* Ehrbg. Gitterschale durch eine quere Einschnürung in zwei ungleiche, über einander liegende Glieder geschieden; mit seitlichen Stachelanhängen, ohne Anhänge an der Mündung. *L. thoracites*. Sehr klein, Messina. *L. mediterranea*. Mittelmeer.

4. Gatt. *Eucecryphalus* Haeck. Zweigliedrig wie vorige, ohne seitliche Anhänge, mit einem Kranze zahlreicher Anhänge an der Mündung. *E. Gegenbauri*. Mündung mit einfachem Stachelkranz. *E. Schultzoi*. Mündung mit doppeltem Stachelkranz. Beide in Messina.

5. Gatt. *Eucyrtidium* Ehrbg. Gitterschale drei- oder mehrgliedrig, ohne seitliche Anhänge, mit einem einfachen Stachel am Ende. *E. zancleum*. Gitterschale dreigliedrig. *E. tropezianum*. Gitterschale achtgliedrig. Mittelmeer.

6. Gatt. *Dictyoceras* Haeck. Gitterschale drei- oder mehrgliedrig, mit gegitterten Anhängen am zweiten Gliede, ohne Anhänge an der Mündung. *D. Virchowii*. Messina.

7. Gatt. *Podocyrtis* Ehrbg. Gitterschale drei- oder mehrgliedrig, mit einfachen Anhängen an der Mündung. *P. charybdea*. Mittelmeer. Bei *Dictyopodium* Ehrbg. sind die Anhänge der Mündung gegittert.

8. Gatt. *Bothryocampe* Ehrbg. Gitterschale durch mehrere quere und longitudinale Einschnürungen in Glieder getheilt; auch die Mündung ist übergittert. *B. hexathalamia*. Messina.

4. Familie.

Gitterkugel-Radiolarien. Ethmosphaerida Haeck. Skelet besteht aus einer einfachen, oder aus mehreren in einander geschachtelten Gitterkugeln, deren innerste die Centrakapsel umschließt. Diese wird in der Mitte durch die Pseudopodien schwebend erhalten.

1. Gatt. *Heliosphaera* Haeck. Eine einzige extrakapsulare Gitterkugel mit regelmäßig sechseckigen Maschen, mit oder ohne radiale centrifugale Stacheln. Arten im Mittelmeer.

2. Gatt. *Diplosphaera* Haeck. Zwei concentrische durch Radialstäbe verbundene Gitterkugeln. *D. gracilis*. Messina.

3. Gatt. *Arachnosphaera* Haeck. Mehrere extrakapsulare Gitterkugeln. *A. oligacantha*, *myriacantha*. Messina.

5. Familie.

Röhrenkugel-Radiolarien. Aulosphaerida Haeck. Eine Gitterkugel aus hohlen Balken, von deren Knoten hohle Stacheln hervortreten. Die kugelige Centralkapsel schwebt in der Mitte mittelst der Pseudopodien, welche in das hohle Röhrensystem der Gitterkugel eintreten, und durch die Enden der Radialstacheln ausstrahlen.

Gatt. *Aulosphaera* Haeck. Alle Maschen der Gitterkugel sind gleichseitig dreieckig. *A. trigonopa*, *elegantissima*. Messina.

b. Mit extrakapsularem und intrakapsularem Skelet, die Centralkapsel von radialen Skeletttheilen durchbohrt (*Entolithia*).

6. Familie.

Röhrenbaum-Radiolarien. Coelodendrida Haeck. Skelet besteht aus einer intrakapsularen Gitterschale, von der hohle, die kugelige Centralkapsel durchbohrende radiale Stacheln ausgehen, welche mit Sarkode erfüllt sind und die Communication der intrakapsularen und extrakapsularen Sarkode herstellen.

Gatt. *Coelodendrum* Haeck. Von jedem Pole der Gitterkugel gehen mehrere hohle Rieselstacheln aus, welche sich außerhalb der Centralkapsel baumartig verzweigen. *C. ramosissimum*. Messina.

7. Familie.

Markschalen-Radiolarien. Cladococcida Haeck. Skelet besteht aus einer in der kugeligen Centralkapsel eingeschlossenen Gitterkugel, von der mehrere radiale Stacheln ausgehen; zwischen ihnen zahlreiche Pseudopodien.

1. Gatt. *Rhaphidococcus* Haeck. Die Stacheln einfach, ungezähnt und unverästelt. *Rh. simplex*, *acuter*. Messina.

2. Gatt. *Cladococcus* Müll. Die Stacheln gezähnt oder verästelt. *Cl. arborescens*. Nizza. *Cl. cervicornis*. Messina.

8. Familie.

Stachel-Radiolarien. Acanthometrida. Skelet besteht aus mehreren radialen Stacheln, welche die Centralkapsel durchbohren und in deren Centrum sich vereinigen, ohne eine Gitterschale zu bilden. Die extra-

kapsularen gelben Zellen, die allen übrigen Radiolarien zukommen, fehlen allgemein.

1. Gatt. *Acanthometra* Müll. Zwanzig gleich lange Stacheln ohne Querfortsätze, welche in der Mitte der Centralkapsel mit keilförmig zugespitzten Enden in einander gestemmt sind. Zwischen zwei stachellosen Polen stehen 5 Gürtel von je 4 radialen Stacheln, sie alterniren so, daß alle in 4 Meridianebenen liegen. *A. fusca* mit runden Stacheln. *A. tetracopa* mit vierschneidigen Stacheln. *A. lanceolata* mit lanzettförmigen Stacheln. *A. furcata* mit zweispitzigen Stacheln. Alle im Mittelmeer.

2. Gatt. *Xiphacantha* Haeck. Wie vorige, aber die Stacheln mit einfachen oder verästelten Querfortsätzen. *X. cruciata*, *foliosa*. Mittelmeer.

3. Gatt. *Astrolithium* Haeck. Die 20 nach demselben Gesetz wie bei *Acanthometra* geordneten Stacheln sind gleich und in der Mitte zu einer homogenen Masse vollständig verschmolzen. *A. dieopum*. Messina.

4. Gatt. *Litholophus* Haeck. Mehrere radiale Stacheln ohne bestimmte Anordnung sind mit keilförmiger Basis an einander gelegt, und divergiren im Raume eines Kugelquadranten. *L. rhipidium*. Messina.

5. Gatt. *Acanthochiasma* Krohn. Zehn gleich lange Stacheln durchsetzen die Centralkapsel diametral, und gehen im Centrum an einander vorüber, ohne sich zu verbinden. *A. Krohnii* und *rubescens*. Madeira.

9. Familie.

Doppelkegel-Radiolarien. Diploconida. Skelet besteht aus einer homogenen, nicht gegitterten Kieselshale, welche die Centralkapsel umschließt, und in deren Längsaxe ein die Centralkapsel der Länge nach durchbohrender Stachel verläuft, dessen Mitte mit dem mittleren Theile der Schale verbunden ist; die Pseudopodien treten nur aus zwei Oeffnungen an den Endpolen der Längsaxe hervor.

Gatt. *Diploconus* Haeck. Zwei kieselige, mit der abgestuften Spitze aneinanderstoßende Hohlkegel, in deren Achse ein langer Stachel verläuft, bilden das Skelet. *D. fascos*. Messina. Selten.

10. Familie.

Augen-Radiolarien. Ommatida Haeck. Skelet besteht aus einer, zwei oder mehreren concentrischen extrakapsularen Gitterschalen; die Centralkapsel wird stets von einer Gitterschale umschlossen, von der nach innen radiale Stäbe abgehen, welche sich im Centrum vereinigen.

1. Gatt. *Dorataspis* Haeck. Nur eine extrakapsulare Gitterschale mit 20 radialen Stacheln, die sich in der Mitte mit vierseitig zugespitzter Basis in einander stemmen. *D. costata*. Mittelmeer.

2. Gatt. *Haliomma* Ehrbg. Zwei concentrische Gitterschalen, eine außerhalb, eine innerhalb der Centralkapsel; die radialen Stäbe, welche beide verbinden, verlängern sich nicht nach innen von der inneren Schale. Viele Arten.

3. Gatt. *Tetrapyle* Müll. Wie vorige, in der äußeren Gitterschale vier große Spalten. *T. octacantha*. Diefroth. Nizza.

4. Gatt. *Actinomma* Haeck. Drei concentrische Gitterschalen, zwei innerhalb, eine außerhalb der Centralkapsel. *A. drymodes*. Sechs dreikantige Hauptstacheln und zahlreiche doppelt gabelspaltige Nebentacheln.

11. Familie.

Schwamm-Radiolarien. Spongurida Haeck. Skelet schwammig, besteht im äußern Theile oder ganz aus einem dichtverwebten Aggregate regellos gehäufte Fächer; Centralkapsel von der Form des Skelets, von demselben durchzogen und umschlossen.

1. Gatt. *Spongospaera* Ehrbg. Zwei intrakapsulare Gitterschalen sind von dem Schwammkörper umgeben; mehrere Stacheln durchbohren den letzteren. *S. polyacantha*. Mit vierkantigen Stacheln. Nizza. *S. streptacantha*. Mit dreikantigen Stacheln. Messina.

2. Gatt. *Spongotrochus* Haeck. Schwammkörper flach, mit einfachen Stacheln und ohne centrale Gitterschale. *S. longispinus*. Messina.

3. Gatt. *Spongocyclia* Haeck. Skelet eine schwammige flache Scheibe ohne Anhänge, im innern Theile aus concentrischen Ringen von regelmäßig geordneten Kammern zusammengesetzt. *S. cycloides*. Messina.

12. Familie.

Scheiben-Radiolarien. Discida Haeck. Skelet eine flache gekammerte Scheibe, aus zwei Deckplatten zusammengesetzt, zwischen denen mehrere concentrische Ringe oder die Windungen eines in einer Ebene aufgerollten Spiralbalkens verlaufen; indem letztere von radialen Balken geschnitten werden, entstehen zwischen beiden Platten regelmäßige Kammern; Centralkapsel scheibenförmig.

1. Gatt. *Coccodiscus* Haeck. Centralkammer von drei oder mehreren concentrischen Gitterschalen umschlossen, welche von concentrischen Kammerringen umgeben sind. *C. Darwinii*. Messina; sehr selten.

2. Gatt. *Trematodiscus* Haeck. Die Centralkammer nicht von den übrigen verschieden; keine Anhänge am Rande der Scheibe. *T. orbiculatus*. Messina.

3. Gatt. *Discospira* Haeck. Zwischen den Deckplatten eine zusammenhängende Spiralkreihe von Kammern. Keine Anhänge am Rande der Scheibe. *D. helicoides*. Messina.

13. Familie.

Spiralkammer-Radiolarien. Lithelida Haeck. Skelet kugelig, besteht aus mehreren verwachsenen parallelen Scheiben, deren jede aus einer Spirale von Kammern zusammengesetzt ist; die Spirallaxe ist allen gekammerten Scheiben gemeinsam.

Gatt. *Lithelius* Haeck. Auf der ganzen Oberfläche mit einfachen Stacheln bedeckt. *L. spiralis*. Messina.

B. Radiolaria socialia (Polycyttaria) Radiolarien mit mehreren Centralkapseln, oder in Colonien vereinigt lebende gesellige Thiere.

14. Familie.

Gesellige Gallert-Radiolarien. Sphaerozoida. Skelet fehlt, oder besteht aus mehreren einzelnen zerstreuten Stücken (spicula).

1. Gatt. Collozoum Haeck. Ganz ohne Skelet. C. inermis gelblich, coeruleum dunkelblau.

2. Gatt. Sphaerouzoum Meyen. Spicula von einer Gestalt lagern sich um jede Centralkapsel. S. punctatum. Spicula stabförmig mit drei Schenkeln an jedem Ende. Mittelmeer.

3. Gatt. Raphidozoum Haeck. Spicula von verschiedener Gestalt. Rh. aculeatum. Die einen Spicula nadelförmig, leicht gebogen, die andern viersehnlig. Mittelmeer.

15. Familie.

Gesellige Gitterkugel-Radiolarien. Collosphaerida. Mehrere einfache Gitterschalen umschließen je eine Centralkapsel.

1. Gatt. Siphonosphaera Müll. Die Gitterlöcher in Röhrchen verlängert. S. tubulosa.

2. Gatt. Collosphaera Müll. Gitterlöcher eben, nicht in Röhrchen verlängert. C. Huxleyi. Ohne Stacheln, häufig im Mittelmeer, in vielen Varietäten. C. spinosa. Mit Stacheln besetzt. Messina.

III. Ordnung. Porifera. Schwämme.

Große, vielgestaltige, feststehende, pflanzenähnliche, aus contractilen Zellen bestehende, in süßem und salzigem Wasser lebende Thiere, die sich äußerst langsam in Folge von continuirlicher Bewegung der einzelnen Zellen bewegen. Sie haben entweder gar kein Skelet oder ein aus Kalk- oder Kieselnadeln oder hornartiger Substanz bestehendes. Die Nadeln, sowohl die kalkigen als die kieseligen, haben eine sehr verschiedene Gestalt; sie sind spindelförmig, glatt, zackig, dreistrahlig, stechnadelförmig, gabelförmig, die hornigen Skelettheile bilden theils ein äußerst feinmaschiges Netzwerk (Badeschwamm), theils ein sehr grobmaschiges, und bestehen aus ungleich stärkern Fasern, oder aus dicken Hornfasern, an die sich feine geknöpfte Fäden aus gleicher Substanz überall ansetzen.

Die schleimartige Masse der Poriferen überzieht in Form einer dünnen Membran den ganzen Körper und bildet im In-

nern desselben ein Netzwerk von dickern oder dünnern Parenchymbalken, in ähnlicher Weise wie die Skeletfasern des Badeschwamms; die Parenchymbalken werden bei den skeletführenden von dem Skelet getragen; innerhalb derselben befinden sich bewimperte Kammern von sehr verschiedener Größe bei den verschiedenen Arten; die oft sehr langen Wimpern sitzen auf sehr kleinen Zellen auf. Die ganze äußere Haut ist von äußerst feinen mikroskopischen Löchern durchbohrt; durch diese strömt beständig Wasser ein, ausgestoßen wird dasselbe durch eine einzige oder mehrere häufig weit über den Körper hinausragende, nicht selten mit bloßem Auge sichtbare Ausflußröhren, welche sich wie die zahllosen Einstömungslöcher öffnen und schließen können. Die Einsaugung und Ausstoßung des Wassers kommt durch die in den Kammern schwingenden Wimpern zu Stande. Das Körperparenchym zeigt beim Zerreißen die contractilen Zellen, welche wegen ihrer Bewegungsfähigkeit mehrfach für selbstständige Individuen gehalten worden sind. — In den Poriferen hat man sowohl Spermatozoïden als auch Eier gefunden; erstere entstehen in kugeligen Kapseln in zahlloser Menge und entwickeln sich wie bei vielen andern Thieren; es sind äußerst bewegliche mit einem Köpfchen versehene Fäden. Die mikroskopischen Eier, welche seltener beobachtet werden, haben ein Keimbläschen und einen Keimfleck. Weit leichter findet man die schon mit bloßem Auge bemerkbaren noch unentwickelten Embryonen, welche sich als vereinzelte weiße Flecke im ganzen innern Parenchym vorfinden; sie bestehen aus einer dünnen strukturlosen Hülle und zahllosen dicht an einander gedrängten, stark lichtbrechenden in einer eiweißartigen Substanz suspendirten Körnern, während deren Zerfallen die contractilen Zellen zum Vorschein kommen. Die entwickelteren Embryonen sind auf ihrer Oberfläche mit einem Wimperepithelium besetzt, mittelst dessen sie nach dem Auskriechen mehrere Tage lang im Wasser umherschwimmen. Die Kieselnadeln führenden enthalten Kieselnadeln schon in diesem Stadium; bald setzen sie sich fest, werfen das Wimperkleid ab, bekommen Ein- und Ausströmungsöffnungen und die Gestalt und Organisation der ausgebildeten Schwämme. Bei allen Poriferen des süßen Wassers und bei einigen des Meeres kennt man schon seit langer Zeit eigenthümliche kugelige, für das bloße Auge bereits sichtbare Körper, welche von Einigen für Eier, von Anderen für Sporangien angesehen worden sind.

Bei den Flußschwämmen sind sie mit einer hornartigen Haut versehen, die häufig mit kleinen zierlichen Kieselgebilden (*Amphidisca* Ehrbg.) besetzt ist. Diese kugeligen oder ovalen Körper sind die sogenannten *Gemmulae*; ihren Inhalt bilden dicht zusammengedrückte, mit Kern und *Nucleolus* versehene Zellen. Namentlich gehen im Herbst einige verästelte Flußschwamm-species ganz und gar in solche *Gemmulae* über, die dann dicht gedrängt dem Kiesel skelet anhaften; im Frühjahr tritt die Zellensmasse aus einer kleinen in der Schale befindlichen runden Oeffnung äußerst langsam hervor und nimmt sogleich die Form der *Spongille* an; sämtliche aus den *Gemmulae* hervorgegangene Thiere überziehen das alte Kiesel skelet und fließen so mit einander zusammen, daß sie oft nur eine oder zwei große Ausflußröhren bilden, aus denen das von der ganzen Colonie eingesogene Wasser ausgestoßen wird. Zwei dicht zusammengelegte aus ausgeschnittenen Schwammstücken entwickelte, mit je einer Ausflußröhre versehene *Spongillen* haben nämlich die Fähigkeit, ihre äußere Haut gegen einander zu öffnen und so fest sich mit einander zu vereinen, daß sie einem Individuum gleichen, welches sich aus einem Ei entwickelt hat; von dem einen Exemplar geht die Ausflußröhre ein, und alles eingesogene Wasser beider Exemplare strömt zu der einen übrig gebliebenen Ausflußröhre aus; es gehört diese Erscheinung jedenfalls in das dunkle Gebiet der auch bei Infusorien beobachteten *Conjugation* oder *Zygo*se.

L i t e r a t u r.

Liebert ühn, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der *Spongillen*, Müller's Archiv 1856; und Beiträge zur Anatomie der *Spongien*, *ibid.* 1857.
 Oskar Schmidt, Die *Spongien* des adriatischen Meeres. Leipzig 1862.

1. Familie.

Kalkschwämme. Calcispongia. Kleine meist weißliche Schwämme, mit Kalknadeln.

1. Gatt. *Sycon* Lbkh. Körper compact, spindelförmig, bis $\frac{1}{2}$ Zoll lang, Ausströmungsöffnung der Ansatzstelle gegenüber, mit einem Kranz von langen Nadeln besetzt. *S. ciliatum*. Nadeln im Innern dreistrahlig; auf der Oberfläche mit Bündeln äußerst dünner langer Nadeln besetzt. *S. Humboldtii*. Nadeln weit dicker als bei den vorigen, etwa 6 Mal so dick. Adriatisches Meer.

2. Gatt. *Grantia* Lbkh. Körper unregelmäßig verästelt; viele Ausströmungsöffnungen an den Enden der Äste. Gr. Lieberkühnii. Nordsee und Mittelmeer.

2. Familie.

Hornschwämme. Ceraospongia. Das Skelet besteht aus festen, elastischen Fasern und enthält keine eigenen Nadeln.

1. Gatt. *Spongia*. Die Fasern des Netzwertes sind gleichartig, fast überall gleich dick, sehr elastisch. Sp. officinalis. Badeschwamm. Diese Sammelart enthält eine Menge verschiedener Species, die noch näher festzustellen sind.

2. Gatt. *Spongelia* Nardo. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch die nicht elastischen, sehr brüchigen Fasern. S. elegans (tupha). Aus der unregelmäßigen Basis steigen kürzere und längere meist zugespitzte Äste auf. Häufig bei Venedig in den Lagunen.

3. Gatt. *Filifera* Lbkh. Das Skelet besteht aus dicken Hornfasern, an welche sich überall eine zahllose Menge äußerst feiner in ein kugeliges Köpfchen endender Hornfäden ansetzt. Mehrere Arten.

3. Familie.

Kautschukschwämme. Gumminea. Das Parenchym des Körpers ist sehr dicht und fest, wie Kautschuk, besteht jedoch aus sehr feinen Fasern. Zuweilen enthalten sie Kieselgebilde.

1. Gatt. *Gummina* O. Schm. Ohne Kieselgebilde. G. gliricauda. Adriatisches Meer.

2. Gatt. *Chondrilla* O. Schm. Mit sternförmigen Kieselgebilden *Chnucula*. Adriatisches Meer.

4. Familie.

Rindenschwämme. Corticata. Kugelige oder knollige Schwämme, mit Kieselgebilden, deren festeres Rindengewebe von dem inneren verschieden ist.

1. Gatt. *Tethya* Lam. Kieselsternchen in der Rindenschicht, nur einfache radiale Nadeln im Innern. T. morum, lyncurium.

2. Gatt. *Geodia* Lam. Knollige Schwämme, von Kanälen und Buchten durchzogen; Kieselkugeln in der Rindenschicht; Kieselnadeln von verschiedener Gestalt dringen von innen in die Rindenschicht ein. G. placenta.

3. Gatt. *Ancorina* O. Schm. Keine Kieselsternchen oder Kugeln in der Rindenschicht; diese wird von Bündeln ankerförmiger Nadeln durchsetzt. A. cerebrum. Adriatisches Meer.

5. Familie.

Kieselchwämme. Halichondria. Das Gewebe ist lockerer als bei den Kautschukschwämmen, hat keine Rindenschicht und ist mit Kieselnadeln durchwebt.

1. Gatt. *Spongilla*. Die einzige bis jetzt bekannte Süßwassergattung.

Große, vielgestaltige, unregelmäßige, auch vielfach verästelte Massen bildend, theils grün, theils farblos. Gemmulae sehr groß, bis $\frac{1}{2}$ Linie im Durchmesser.

a) Arten mit gezackten Nadeln: *Sp. erinaceus*. Die Amphibiden der Gemmulae bestehen aus zwei durch einen kleinen Stab verbundenen Mädchen. *Sp. Mülleri*. Die Amphibiden bestehen aus zwei durch ein Stäbchen verbundenen Sternen. b) Arten mit glatten Skelettnadeln: *Sp. fluvialis*, die gemeinste Art; Amphibiden wie bei *Spongilla Mülleri* gestaltet. *Sp. lacustris*. Gemmulae mit hornartiger Schale ohne jeden Kieselbelag.

2. Gatt. *Eesperia* Nardo. Aestige, knollige oder krustenartige Schwämme, im trockenen Zustande brechlich; die Kieselnadeln sind zu einem spröden Netzwerk vereinigt, außerdem hakenförmige oder pantoffelförmige Körperchen. *E. Contarenii*. Benedig.

3. Gatt. *Axinella* O. Schm. Aestige, zähe, biegsame Schwämme mit festerer Hornsubstanz in der Ape, welche die Kieselnadeln umgiebt. *A. verrucosa*, *foveolaria*. Adriatisches Meer.

4. Gatt. *Suberites* Nardo. Fleischig strauchartige oder kumpige Schwämme mit glatter Oberfläche, mit vorherrschend stielnadeln förmigen Kieselnadeln. *S. domuncula* (*Aleyonium Domuncula* Olivi, *Halichondria compacta* Lbkh.) Ziegelfroth; leere Schneckenhäuser, in denen meist *Pagurus Bernhardi* lebt, überziehend. Triest.

5. Gatt. *Vioa* Nardo (*Cliona* Grant). Dendritische Schwämme mit Kieselnadeln, welche sich Gänge in Muschelschalen und Felsen bohren, mit vielen äußerst contractilen Ausströmungsröhren aus der Schale hervorragend. *V. celata* und Andere.

6. Gatt. *Hyalonema* Gray. Ueberaus lange Kieselnadeln treten nach oben aus dem Schwamm hervor und bilden einen zusammengedrehten Schopf. *H. Sieboldi*. Die Kieselnadeln werden über 1' 6" lang; auf seiner Oberfläche schmarozt ein Polyp. Japan.

6. Familie.

Fleischschwämme. Halisarcina. Weiche Schwämme, ohne Kalk- oder Kieselkörper, und ohne Fasern.

Gatt. *Halisarca* Duj. *H. Dujardinii*. In der Nordsee auf Samiarien.

Anhangsweise erwähnen wir nur kurz der noch immer so räthselhaften Schmarozerthiere, welche man Gregarinen genannt hat. Sie bestehen aus einer homogenen äußeren Hülle mit körnigem Inhalte und einem Kerne. Von Einigen werden sie für selbstständige Thiere, von Anderen nur für Entwicklungszustände von Nematoïden gehalten. Als eine Entwicklungsstufe der Gregarinen sind die Behälter mit den Pforospermien oder Pseudonavicellen nachgewiesen. Ihre Bildung soll nach Stein immer durch eine Vereinigung (Copulation) zweier Gregarinen bewerkstelligt werden, nach Lieberkühn genügt dazu aber schon ein Thier.