

Große, vielgestaltige, unregelmäßige, auch vielfach verästelte Massen bildend, theils grün, theils farblos. Gemmulae sehr groß, bis $\frac{1}{2}$ Linie im Durchmesser.

a) Arten mit gezackten Nadeln: *Sp. erinaceus*. Die Amphibiden der Gemmulae bestehen aus zwei durch einen kleinen Stab verbundenen Mädchen. *Sp. Mülleri*. Die Amphibiden bestehen aus zwei durch ein Stäbchen verbundenen Sternen. b) Arten mit glatten Skelettnadeln: *Sp. fluvialis*, die gemeinste Art; Amphibiden wie bei *Spongilla Mülleri* gestaltet. *Sp. lacustris*. Gemmulae mit hornartiger Schale ohne jeden Kieselbelag.

2. Gatt. *Eesperia* Nardo. Aestige, knollige oder krustenartige Schwämme, im trockenen Zustande brechlich; die Kieselnadeln sind zu einem spröden Netzwerk vereinigt, außerdem hakenförmige oder pantoffelförmige Körperchen. *E. Contarenii*. Benedig.

3. Gatt. *Axinella* O. Schm. Aestige, zähe, biegsame Schwämme mit festerer Hornsubstanz in der Ape, welche die Kieselnadeln umgiebt. *A. verrucosa*, *foveolaria*. Adriatisches Meer.

4. Gatt. *Suberites* Nardo. Fleischig strauchartige oder kumpige Schwämme mit glatter Oberfläche, mit vorherrschend stielnadeln förmigen Kieselnadeln. *S. domuncula* (*Aleyonium Domuncula* Olivi, *Halichondria compacta* Lbkh.) Ziegelfroth; leere Schneckenhäuser, in denen meist *Pagurus Bernhardi* lebt, überziehend. Triest.

5. Gatt. *Vioa* Nardo (*Cliona* Grant). Dendritische Schwämme mit Kieselnadeln, welche sich Gänge in Muschelschalen und Felsen bohren, mit vielen äußerst contractilen Ausströmungsröhren aus der Schale hervorragend. *V. celata* und Andere.

6. Gatt. *Hyalonema* Gray. Ueberaus lange Kieselnadeln treten nach oben aus dem Schwamm hervor und bilden einen zusammengedrehten Schopf. *H. Sieboldi*. Die Kieselnadeln werden über 1' 6" lang; auf seiner Oberfläche schmarozt ein Polyp. Japan.

6. Familie.

Fleischschwämme. *Halisarcina*. Weiche Schwämme, ohne Kalk- oder Kieselkörper, und ohne Fasern.

Gatt. *Halisarca* Duj. *H. Dujardinii*. In der Nordsee auf Samiarien.

Anhangsweise erwähnen wir nur kurz der noch immer so räthselhaften Schmarozerthiere, welche man Gregarinen genannt hat. Sie bestehen aus einer homogenen äußeren Hülle mit körnigem Inhalte und einem Kerne. Von Einigen werden sie für selbstständige Thiere, von Anderen nur für Entwicklungszustände von Nematoïden gehalten. Als eine Entwicklungsstufe der Gregarinen sind die Behälter mit den Pforospermien oder Pseudonavicellen nachgewiesen. Ihre Bildung soll nach Stein immer durch eine Vereinigung (Copulation) zweier Gregarinen bewerkstelligt werden, nach Lieberkühn genügt dazu aber schon ein Thier.

In den Pterospormien entwickeln sich amöbenartige Wesen, die sich wieder in Gregarinen umwandeln sollen. — Stein und Franzius unterscheiden drei Familien: 1. Monocystidae, Einzellige; 2. Gregarinariae, deren Körperhöhle durch eine Scheidewand in zwei Hälften getheilt wird; 3. Didymophyidae, die durch zwei Scheidewände in drei Abtheilungen getheilt werden. — Wegen der Literatur vergleiche von Franzius im Archiv für Naturgeschichte 1848 p. 188; Lieberkühn Mém. couron. de l'Acad. de Belgique 1855 und Müller's Archiv 1854.