

**Gargarisma tannatum.** — *Tanningurgelwasser.*

Zu bereiten aus

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zwei Gramm Gerbsäure . . . . .         | 2,0  |
| Einem Decigramm Opiumextrakt . . . . . | 0,1  |
| Zehn Gramm Glycerin . . . . .          | 10,0 |
| Achtundachtzig Gramm Wasser . . . . .  | 88,0 |

**Gelatina glycerinata cum Zinco et Ichthyolo.**

*Ichthyol-Zinkleim.*

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Hundert Teile Zinkleim . . . . .              | 100 |
| werden bei gelinder Wärme verflüssigt und mit |     |
| Zwei Teilen Ichthyolammonium . . . . .        | 2   |
| vermischt.                                    |     |

Badischer Apothekerverein.

**Gelatina roborans.** — *Weingelée.*

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Fünf Teile feinsten weissen Leim . . . . .            | 5   |
| werden mit                                            |     |
| Fünzig Teilen Wasser . . . . .                        | 50  |
| übergossen und nach halbstündigem Quellen unter       |     |
| gelindem Erwärmen gelöst. Hierauf werden              |     |
| Zweihundert Teile weisser Sirup . . . . .             | 200 |
| Dreihundertfünfundsiebenzig Teile Weisswein . . . . . | 375 |
| und                                                   |     |
| Ein halber Teil Citronensaft . . . . .                | 0,5 |
| dazu gemischt, die Mischung kolirt und in Eis         |     |
| gestellt.                                             |     |

**Glycerinum ichthyolatum.** — *Ichthyolglycerin.*

Zu bereiten aus

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Einem Theil Ichthyolammonium . . . . . | 1 |
| und                                    |   |
| Neun Teilen Glycerin . . . . .         | 9 |

Nosokomialvorschrift.

**Glycerinum jodatum.** — *Jodglycerin.*

Zu bereiten aus

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Einem Teil gepulvertem Jod . . . . .     | 1  |
| Einem Teil Kaliumjodid . . . . .         | 1  |
| Achtundneunzig Teilen Glycerin . . . . . | 98 |

E. Dieterich.



**Glycerinum jodoformiatum.** — *Jodoformglycerin.*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zu bereiten aus                |   |
| Einem Teil Jodoform . . . . .  | 1 |
| und                            |   |
| Neun Teilen Glycerin . . . . . | 9 |
| Nosokomialvorschrift.          |   |

**Injectio Argenti nitrici.**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Ein Decigramm Silbernitrat . . . . .      | 0,1   |
| wird in                                   |       |
| Dreihundert Gramm Wasser . . . . .        | 300,0 |
| gelöst. In einem dunklen Glase abzugeben. |       |
| Nosokomialvorschrift.                     |       |

**Injectio composita.**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Zu bereiten aus                                  |     |
| Einem Teil Zinksulfat . . . . .                  | 1   |
| Einem Teil Bleiacetat . . . . .                  | 1   |
| Einhundertachtundneunzig Teilen Wasser . . . . . | 198 |

**Injectio composita Brou.** — *Brou's Injection.*

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Zu bereiten aus                                  |       |
| Einem halben Gramm Zinksulfat . . . . .          | 0,5   |
| Einem Gramm Bleiacetat . . . . .                 | 1,0   |
| Hundert Gramm Wasser . . . . .                   | 100,0 |
| Zwei Gramm Katechutinktur . . . . .              | 2,0   |
| Zwei Gramm safranhaltiger Opiumtinktur . . . . . | 2,0   |

**Injectio Matico.** — *Matikoinjection.*

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Zu bereiten aus                                  |       |
| Fünfundzwanzig Centigramm Kupfersulfat . . . . . | 0,25  |
| Zweihundert Gramm Matikowasser . . . . .         | 200,0 |
| Zehn Gramm Glycerin . . . . .                    | 10,0  |

**Injectio Natrii arsenicosi.**

*Natriumarsenit-Injection.*

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Ein Gramm arsenige Säure . . . . .                          | 1,0   |
| wird unter Erhitzen in                                      |       |
| Fünf Kubikcentimetern vierprozentiger Natronlauge . . . . . | 5 ccm |
| gelöst, die erkaltete Lösung mit Wasser auf das             |       |
| Gewicht von hundert Gramm verdünnt, . . . . .               | 100,0 |
| in kleine Gläschen gefüllt und sterilisiert.                |       |
| Nosokomialvorschrift.                                       |       |