

Suppositoria Belladonnae.

Aus		
Einem Centigramm Tollkirschenextrakt	0,01	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		Nosokomialvorschrift.

Suppositoria Hamamelidis.

Aus		
Zwei Decigramm wässerigem Hamamelisextrakt . . .	0,2	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		

Suppositoria Loretini.

Aus		
Einem Centigramm Loretin	0,01	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		E. Dieterich.

Suppositoria Morphini.

Aus		
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		Nosokomialvorschrift.

Tabulettae Acetanilidi 0,3.

Dreihundert Teile Acetanilid	300	
und		
Hundertsechzig Teile Milchzucker	160	
werden gemischt, mit absolutem Alkohol befeuchtet, getrocknet und durchgeseibt. Alsdann werden		
Zwanzig Teile Weizenstärke	20	
und		
Zwanzig Teile Talk	20	
zugemischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt.		

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae acidi citrici 0,6.

Sechshundert Teile Citronensäure	600
werden erst bei 30—40°, schliesslich auf dem Dampfapparat bei 100° bis zum konstanten Gewicht getrocknet, hierauf mit absolutem Alkohol befeuchtet, getrocknet und durch ein grobes Haarsieb geschlagen. Dem so erhaltenen Pulver werden	
Hundertfünfundzwanzig Teile Milchzucker	125
und	
Fünfunddreissig Teile Talk	35
zugemischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 7 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae acidi salicylici 0,5.

Fünfhundert Teile Salicylsäure	500
werden mit Alkohol befeuchtet, getrocknet und durchgesiebt, alsdann mit	
Hundert Teilen Milchzucker	100
Fünfundzwanzig Teilen Weizenstärke	25
Fünfundzwanzig Teilen Talk	25
vermischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 65 Centigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae acidi tannici 0,06.

Sechzig Teile Gerbsäure	60
Vierhundert Teile Milchzucker	400
Zwanzig Teile Weizenstärke	20
Zwanzig Teile Talk	20
werden gemischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Antipyriini 0,5.

Fünfhundert Teile Antipyrin	500
und	
Zweihundert Teile Milchzucker	200
werden gemischt, mit absolutem Alkohol befeuchtet, getrocknet und durchgesiebt. Hieraus werden durch Druck Tabletten vom Gewicht von 7 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Chinini 0,3.

Dreihundert Teile Chininsulfat	300
werden mit	
Fünfzehn Teilen Haller'schem Sauer	15
angerieben, getrocknet und durchgeseibt. Alsdann werden	
Hundertfünfundzwanzig Teile Milchzucker	125
Fünfzig Teile Weizenstärke	50
Fünfzig Teile Talk	50
zugesetzt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Ipecacuanhae cum Opio 0,6.

Aus Dover'schem Pulver werden durch Druck Tabletten vom
Gewicht von 6 Decigramm gefertigt.

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Morphini 0,01.

Zehn Teile Morphinhydrochlorid	10
werden mit	
Vierhundertfünfundsechzig Teilen Milchzucker	465
innig gemischt und mit einer Lösung von	
Einem Teil Anilinwasserblau	1
in Alkohol gefärbt. Die getrocknete und durch- geseibte Mischung wird mit	
Fünfundzwanzig Teilen Talk	25
versetzt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Natrii bicarbonici 1,0.

Tausend Teile Natriumbikarbonat	1000
und	
Hundert Teile Milchzucker	100
werden gemischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 11 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Natrii carbonici 0,5.

Fünfhundert Teile entwässertes Natriumkarbonat . . .	500
werden mit	
Fünzig Teilen Talk	50
gemischt und daraus durch Druck Tabletten	
vom Gewicht von 55 Centigramm gefertigt. Jede	
Tablette entspricht 1 Gramm krystallisiertem	
Natriumkarbonat.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Opii 0,06.

Sechzig Teile mittelfein gepulvertes Opium	60
Vierhundert Teile Milchzucker	400
Zwanzig Teile Weizenstärke	20
Zwanzig Teile Talk	20
werden gemischt und daraus durch Druck	
Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Phenacetini 0,5.

Fünfhundert Teile Phenacetin	500
und	
Hundert Teile Milchzucker	100
werden gemischt, mit absolutem Alkohol befeuchtet,	
getrocknet und durchgesiebt. Alsdann werden	
Fünzig Teile Weizenstärke	50
und	
Fünzig Teile Talk	50
zugemischt und daraus durch Druck Tabletten	
vom Gewicht von 7 Decigramm gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Rhei 0,5.

Fünfhundert Teile fein gepulverte Rhabarberwurzel . .	500
Zwanzig Teile Milchzucker	20
Dreissig Teile Talk	30
werden gemischt und daraus durch Druck	
Tabletten vom Gewicht von 55 Centigramm	
gefertigt.	

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae solventes.

Zweihundert Teile Ammoniumchlorid	200
Zweihundert Teile mittelfein gepulverter Süßholzsaft	200
Achtzig Teile Milchzucker	80
Achtzig Teile Talk	80
Zehn Teile mittelfein gepulverte Benzoë	10

werden gemischt und daraus durch Druck
Tabletten vom Gewicht von 6 Decigramm gefertigt.

Dr. H. Salzmann.

Tabulettae Thyreoidini 0,1.

Gleiche Teile

Thyreoidin
gepulverter Kakao
gepulverter Zucker

werden gemischt und daraus durch Druck Tabletten
vom Gewicht von 3 Decigramm gefertigt.

Tinctura amara acida.

Ein Gramm verdünnte Salzsäure	1,0
Fünfzehn Gramm bittere Tinktur	15,0
Fünfzehn Gramm aromatische Tinktur	15,0

werden gemischt.

Nosokomialvorschrift.

Tinctura Calami composita.

Zusammengesetzte Kalmustinktur.

Zu bereiten aus

Dreissig Gramm mittelfein zerschnittener Kalmuswurzel	30,0
Zehn Gramm mittelfein zerschnittener Zittwerwurzel	10,0
Zehn Gramm mittelfein zerschnittener Ingwerwurzel	10,0
Zwanzig Gramm unreifen Pomeranzenfrüchten	20,0
Dreihundertfünfzig Gramm verdünntem Weingeist	350,0

Tinctura Cascarae Sagradae.

Sagradatinktur.

Zu bereiten aus

Zwanzig Teilen entbittertem Kaskara-Sagrada-fluidextrakt	20
und	
Achtzig Teilen verdünntem Weingeist	80

Tinctura Ferri acetico-formicata.

(Ersatz für Hensel's Tonikum.)

Sechzig Teile Calciumkarbonat	60
werden mit einer Mischung aus	
Zweihundert Teilen Ameisensäure	200
und	
Hundertfünf und fünfzig Teilen Wasser	155
übergossen und unter Umrühren so lange stehen	
gelassen, bis Kohlensäure nicht mehr entweicht.	
Hierauf wird eine Lösung von	
Einundzwanzig Teilen Ferrosulfat	21
in	
Achtzig Teilen Ferrisulfatlösung	80
Achtzig Teilen Wasser	80
und	
Dreihundertzwanzig Teilen verdünnter Essigsäure	320
zugesetzt. Die Mischung wird in eine Flasche	
gebracht, gut durchgeschüttelt und mit	
Vierhundert Teilen Weingeist	400
und	
Fünfzehn Teilen Essigäther	15
versetzt, 4 Wochen lang unter bisweiligem Lüften	
des Stopfels an einen kühlen Ort zum Absetzen	
gestellt und hierauf filtriert.	
Eine braunrote nach Essigäther riechende Tinktur.	

Badischer Apothekerverein.

Tinctura Frangulae. — Faulbaumtinktur.

Zwanzig Teile Faulbaumfluidextrakt	20
werden mit	
Achtzig Teilen verdünntem Weingeist	80
gemischt,	

Tinctura Pepsini. — Pepsintinktur.

Zu bereiten aus

Zwei Teilen Pepsin	2
Zwei Teilen Salzsäure	2
Sechszwanzig Teilen zusammengesetzter Chinatinktur	26

Form. mag. Berlin.

Tinctura Quebracho Pentzold.

(*Extractum Quebracho liquidum Pentzold.*)

Hundert Teile grobgepulverte Quebrachorinde	100
werden mit	
Tausend Teilen Weingeist	1000
8 Tage unter öfterm Umschütteln maceriert. Die	
filtrirte Kolatur wird zur Konsistenz eines dicken	
Extraktes eingedampft und dieses mit	
Zweihundert Teilen heissem Wasser	200
angerieben. Der wässrige Auszug wird filtrirt.	
Eine braungelbe Tinktur.	

Dr. Pentzold.

Tinctura Quillayae. — *Quillayatinktur.*

Zu bereiten aus

Einem Teil mittelfein zerschnittener Quillayarinde . . .	1
und	
Vier Teilen verdünntem Weingeist	4
Eine braungelbe Flüssigkeit.	

Tinctura Quillayae naphtholica.

Naphtholhaltige Quillayatinktur.

Zu bereiten aus

Zehn Gramm Naphthol	10,0
Dreihundertneunzig Gramm Quillayatinktur	390,0
Einem Gramm Heliotropin	1,0
Einem Tropfen Irisöl	1 gtt

Vomacka.

Tinctura Santali. — *Sandelholzinktur.*

Zu bereiten aus

Zweihundert Teilen feinzerschnittenem Sandelholz . .	200
Eintausend Teilen Weingeist	1000

Tinctura stomachica.

Zu bereiten aus gleichen Teilen

Weiniger Rhabarbertinktur
und
Zusammengesetzter Chinatinktur.

Nosokomialvorschrift.

Traumaticinum Chrysarobini.

Ein Teil Chrysarobin	1
wird mit	
Zehn Teilen Traumaticin	10
angerieben.	Nosokomialvorschrift.

Unguentum acidi borici flavum.

Gelbes Borvaselin.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen gepulverter Borsäure	10
und	
Neunzig Teilen gelbem Vaseline	90

Unguentum acidi borici Listeri.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen feingepulverter Borsäure	10
Zehn Teilen Wachs	10
Zwanzig Teilen festem Paraffin	20
Zwanzig Teilen Mandelöl	20

Unguentum Bismuti.

Zu bereiten aus	
Zwanzig Teilen basischem Wismutnitrat	20
und	
Achtzig Teilen Cold-Cream	80
	E. Dieterich.

Unguentum carbolisatum fortius.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen krystallisierter Karbolsäure	10
und	
Neunzig Teilen Paraffinsalbe	90
	Nosokomialvorschrift.