

Niederschlag durch Ammoniumcarbonat bei Gegenwart von Salmiak.

Das Filtrat vom $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -Niederschlag, welches *Ba*, *Sr*, *Ca*, *Mg*, *K*, *Na* und *Li* enthalten kann, wird zur Zerstörung des Schwefelammoniums mit Salzsäure schwach angesäuert und gekocht, bis der ausgeschiedene Schwefel zusammengeballt und die Flüssigkeit klar geworden ist. Die filtrirte Lösung wird mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaction und hierauf, unter Erwärmung, mit kohlensaurem Ammoniak versetzt. Der hierdurch entstandene Niederschlag, welcher *CO*, *Ba*, *Ca*, *CO*, *Sr* und *CO*, *Ca* enthalten kann, wird in möglichst wenig Salzsäure aufgenommen, und diese Lösung wird zur Trockene verdampft. Den Rückstand, aus BaCl_2 , SrCl_2 und CaCl_2 bestehend, verarbeitet man nach 1, 2, 3 oder 4, nachdem mit ihm folgende Vorprüfung ausgeführt worden ist:

Eine Probe desselben wird in Wasser gelöst, und ein Theil der Lösung mit Strontiumsulfatlösung versetzt; bei Anwesenheit von *Ba* entsteht sofort oder nach kurzer Zeit ein Niederschlag von BaSO_4 ; ist *Ba* nicht vorhanden, so versetzt man den anderen Theil der Lösung mit Calciumsulfatlösung; bei Gegenwart von *Sr* bildet sich nach einiger Zeit ein Niederschlag von SrSO_4 . Bei Abwesenheit von *Ba* sind selbstverständlich nur die für *Sr* und *Ca* angegebenen Trennungen auszuführen.

Trennung von Baryum, Strontium, Calcium.

Methode 1. [Beruht auf der Unlöslichkeit von BaCl_2 und $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ und auf der Löslichkeit von SrCl_2 , CaCl_2 und $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ in absolutem Alkohol.]

Der Rückstand (BaCl_2 , SrCl_2 , CaCl_2) wird mit absolutem Alkohol einige Zeit erwärmt.

Rückstand: BaCl_2 , färbt die Flamme grün. Man löst ihn in Wasser. Zu einem Theil der Lösung fügt man K_2CrO_4 . Gelber Niederschlag: BaCrO_4 . Zu einem andern Theil Strontiumsulfatlösung. Weisser Niederschlag: BaSO_4 .

Lösung, welche CaCl_2 und SrCl_2 enthalten kann, wird zur Trockene verdampft. Die Chloride werden durch zwei- bis dreimaliges Abdampfen mit conc. HNO_3 in die Nitrats verwandelt, und die trocknen Nitrats mit absol. Alkohol erwärmt.

Rückstand: $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$, färbt die Flamme intensiver roth. Die wässrige Lösung giebt mit Gypswasser nach einiger Zeit einen weissen Niederschlag von SrSO_4 . [Aber, Weisser Niederschlag von SrSO_4 .]

Lösung enthält $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, färbt die Flamme gelbroth. Einen Theil versetzt man mit verdünnter SO_4H_2 . Weisser Niederschlag: CaSO_4 . Einen andern Theil versetzt man mit Wasser.

Methode 2. [Beruht auf der Unlöslichkeit von Kieselfluorwasserstoffsaurem Baryum.]

Der Rückstand (BaCl_2 , SrCl_2 , CaCl_2) wird in wenig Wasser gelöst und diese Lösung mit Kieselfluorwasser, SiF_4 , 2HF , und ca. $\frac{1}{4}$ Vol. Alkohol versetzt. Nach einiger Zeit filtrirt man.

Niederschlag: SiF_4 , BaCl_2 , weisse, krystallinische.

Lösung, *Ca* und *Sr* enthaltend, wird eingedunstet, mit einem grossen Ueberschuss von Ammoniumsulfat versetzt und unter Zusatz von etwas Ammoniak einige Zeit gekocht.

Niederschlag: SrSO_4 .

Lösung wird stark mit H_2O verdünnt und mit Ammoniumoxalat versetzt. Niederschlag: CaO , $\text{Ca} + \text{aq}$, in Essigsäure unlöslich.

Methode 3. [Prinzip dasselbe: Durch Kochen mit concentrirten Lösungen von Alkalicarbonaten werden SO_4 , *Ca* und SO_4 , *Sr* in die entsprechenden kohlensauren Salze verwandelt, während BaSO_4 , vorzüglich bei Anwesenheit von Alkalifluoriden, nicht verändert wird.] Der Rückstand (BaCl_2 , SrCl_2 und CaCl_2) wird in wenig Wasser gelöst, Natriumsulfatlösung (1 Th.) in einem Ueberschuss und dann eine concentrirte Lösung von Natriumcarbonat (2 Th.) zugefügt. Man kocht einige Zeit, filtrirt, wäscht den Rückstand, der aus BaSO_4 , SrCO_3 , CaCO_3 bestehen kann, mit heissem Wasser aus und behandelt ihn dann mit verdünnter Salzsäure.

Rückstand: BaSO_4 . | **Lösung** kann enthalten: SrCl_2 und CaCl_2 , und wird nach 1 oder 2 behandelt.

Methode 4. [Beruht auf der Schwerlöslichkeit des chromsauren Baryums.]

Die Carbonate von *Ba*, *Sr*, *Ca* werden in Essigsäure gelöst und zu der Lösung Kaliumbichromat hinzugefügt.

Niederschlag: CrO_3 , *Ba*.

Lösung: *Ca* und *Sr* enthaltend, wird mit Ammoniumcarbonat gefällt, der ausgewaschene N. mit HCl aufgenommen und die Chloride von *Ca* und *Sr* trennt man wie oben.