

GalP. Pol. R. Sar. Br. C. DB. Gr. Pid. R. Sio. T.)

R. Herbae recentis Rutae . . q. v.
Aqua communis . . . q. s.
Destillant. (Ams. B. Bel. Du. Fer. R. Br. C. Re.)

T Herbae partem unam, Aquae bullientis duplum pondus et plures destillationes atque cohobationes; — Ba†, Ful†, et L†. Aquae tres; — Sw. Aquae quatuor; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. (p. sp. = 0,885. — 0,890.) Sax†, et Pol. octo Aquae (destillatio, oleo separato, cum Aqua stillatitia supra novam Herbam et addita Aquae q. s. tam diu repetatur, donec olei desideata quantitas obtenta fuerit); — A†. Aquae duodecim; — DB ut oleum Rosarum; — GalP. ut oleum florum Aurantii.

R. Herb. rec. Rutae
part. viginti quinque
Aqua partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post dies tres destillent. (Br†. Hass†. Pal†. Sar. Pid.)

R. Herbae recentis Rutae . . q. v.
Aqua Rutae . . . q. s.
Destillant. (Wirt†.)

Balsamum Rutae. (Wirt†. Sp)

R. Olei Nucis mosch.
drach. duas c. dim.
— ess. Rutae . . drachmam.
Misce bene.

Aqua Rutae s. ex Ruta. (A†. Ba†. Bor5†. Han†. HC†. Pal†. Sax†. Ams. B. Bel. Pm. Pol. Sar. Br. DB. Gr. Sw. Vm.)

R. Herbae rec. Rutae partem unam.
Aqua . . . q. s.
Destillant (post horas viginti quatuor) partes decem. (Bor5†. Han†. HC†. Ams. B. Bel. Pol. Sw.)

Pal†. Pm. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillant partes duae; — Wirt†. et Br. Aquae sex; destillant trientes duo; — Ba†. sedecim Aquae; destillant partes octo; — Sax†. Aquae quindecim; destillant partes decem; — A†. duodecim Aquae; destillant partes quatuor.

R. Herbae rec. Rutae partem unam.
Aqua . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars; productum denuo supra novam Herbam destillet. (Sar. DB.)

R. Herbae rec. Rutae partes decem.
Aqua Vitae . partem dimidiam.
Aqua pura
part. centum sexaginta.
Destillant partes quadraginta. (Im.)
Gr parandi modum non indicat.

Julep s. Julapium antihystericum. (Sm.)

R. Aquae dest. Rutae,
— — Bryoniae,
— — Flor. Aurant., sing.
uncias duas,
Syrupi Stoechadis,
— Valerianae,
— Paeoniae, sing. . unciam.
Auf drei oder vier Mal zu nehmen.

S.

Sabadilla.

Veratrum Sabadilla, Re. et officinale, Schl.; Sabadille, Mexicanischer Läufsaame, Läufemörder, Läufekörner, Ungeziefertöchter, Mönchensaat; Cévaillé (Gal.); Sabadillkorn (D.); Sabadilla (I.); Cévadilla (Lus.); Nasikiv sabatyli (Pol.); Sabadill, Husarfrae (Suec.)

A†. BorC†. Bor5†. Br†. Han†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wirt†. Wirt†. WW†. M†. Ams. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. GalP. Gen. HsS. LP. LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur. Be. Br. G. Gr. Re. Sp. Z.

4 (Polygamia Monoecia, L.; Colchicaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's. Willd.

denow gab mit Unrecht China als das Vaterland derselben an. (Düss. off. PH. XVIII. t. 12. Suppl. V. t. 2.)

Man wendet die Frucht und die Samen an.

Die Frucht besteht aus drei länglichen, röthlichen, nach Innen aufspringenden, dreisaamigen, geruchlosen, einen scharfen, brennenden, anhaltenden Geschmack besitzenden Kapseln. — Der Samen (samen Sabadilli s. Sabadillae s. Sevadillae s. Cévadillae) ist länglich, gebogen, an einem Ende stumpf, rufschwarz punctirt, von anfangs saßem, bald darauf bitterem, endlich scharfem und Ekel erregendem Geschmack.

Er enthält, nach Meißner, Vesletier und Gaventou, Sabadillsäure (Acidum sabadillicum), Acide cévadique

und Veratrin oder Sabadillin (Veratrinum, Sabadillinum).

Aufregend, reizend, innerlich Pöke im Magen und Brechen, äußerlich, besonders bei jungen Personen, Hautentzündung erregend. Man bedient sich derselben zur Tödtung der Käuse, der Wanzen und der Eingeweidewürmer. Seeliger wandte sie mit Erfolg gegen Bandwurm an. Der Gebrauch erfordert aber viel Vorsicht.

Gabe des Saamens, zwei Gran täglich zwei Mal für ein Kind, mit Syrup oder Honig, für einen Erwachsenen ein Scrupel bis halbe Drachme einmal täglich. Die Abkochung in Aether gegen Ascariden.

Pulvis Capucinatorum. (B*.)

R. *Semina Sabadillae*,
— *Staphydis agriæ*,
— *Petroselinæ*,

Fol. Nicotianæ, sing. part. æq.
Fiat pulvis tenuissimus. — Zur Tödtung des Rostungezeifers. — Dieses Pulver bringt oft Schwindel und andere beunruhigende Zufälle hervor.

Unguentum ad s. contra pediculos.
(Ful*.)

R. *Pulveris Sabadillæ* uncias quatuor.
— *Sinapis*,
— *Pyrethri*, sing. uncias duas.
Axungia præp.
unc. triginta duas.

Pilulae anthelminticæ. (Ca. Sw.)

R. *Sabadillæ*,
Mellis, singulorum . semunciam.
Fiant pilulae viginti granorum. (Sw.)
Ca. *Olei Foeniculi* guttas viginti addit.

Enema s. Clyisma Sabadillæ s. contra ascarides. (Auf. B* Sw.)

R. *Sabadillæ* . . drachmas duas.
Aquæ fontanæ . . uncias decem.
Coque et colaturæ unc. septem adde
Lactis vaccini . . uncias septem.
Infusum ad cimices. *Semina* uncias duas, *Aceti* unciam; digere per duos dies. — Zur Tödtung der Bettwanzen, die Bettstellen damit zu waschen.

Sabbatia.

Sabbatia angularis, Pu.; *Chironia angularis*, L.; eckige Sabbatie; American Centaury (Ang.).

AD

(Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, J.) Eine Pflanze der Vereinigten Staaten, vorzüglich Virginien's. (Bigelow Am med. Bot. III. t. 57.)

Der viereckige, einen Fuß hohe Stängel hat an jeder Ecke einen häutigen Rand und eiförmige, feststehende, einander gegenüberstehende, den Stängel halb umfassende Blätter.

Man wendet das Kraut an und es ist für America der Stellvertreter der *Erythraea Centaurium*.

Bitter, tonisch, fieberwidrig, vorzüglich gegen intermittirende und remittirende Fieber empfohlen.

Gabe des Pulvers eine halbe bis ganze Drachme; als Aufguss zu einer Unze auf eine Pint kochendes Wasser, alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Saccharum.

Saccharum officinarum s. *officinale*, *Arundo saccharina*, L.; Zuckerrohr; *Sucre* (Gal.); *Zucchero officinale* (I.); *Assucar* (Lus.); *Azucar* (His.)

(Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Indien einheimische, zwischen den Wendekreisen häufig angebaute Pflanze. Plinck t. 40. (Tussac Fl. des Ant. I. t. 23. Düss. off. Pl. IX t. 18—20 Bert. Bild I 10. fig 2. Atlas z. Wörterb. d. Naturgesch. 3. Bief. 29 Taf. Fig. 1); *Arundo saccharifera*, L. (Kunth. Amb. v. 74.)

Aus der perennirenden Wurzel dieser Pflanze erheben sich mehrere 1 bis 2 Zoll dicke, 8 10 bis 12 Fuß hohe, mit einem lockern, zelligen, saftigen Mark erfüllte, grüne, gelbe oder violette oder gelb und violet gestreifte Halme, welche von zweizeihigen, 4 bis 5 Fuß langen, schmalen, säneidenden Blättern umgeben werden, und aus deren Spitze sich auf einem nackten, glatten, ungefähr 5 Fuß hohen Blüthenstiele eine sehr große, ästige, ausgebreitete, pyramidal: Blüthenrispe erhebt.

Der untere Theil des Halmes von welchem die Blätter bald abfallen, ist es vorzüglich, in welchem sich der Zuckerstoff in größter Menge ausbildet und den man daher zur Gewinnung des Saftes, aus welchem nachher der Zucker bereitet wird, vorzugsweise benützt. Der Zucker,

Saccharum, *Sacchar*, *Sal Indus*; *Σάκχαρ*, *Σακχαρόν*; *Sucre* (Gal.); *Sugar* (Ang.); *Sukhir* (Ar.); *Cukr* (B.); *Sukker* (D.); *Schukkir* (Duk. Pe); *Azucar* (His.); *Cheni* (Hin.); *Sniker* (Bel.); *Zucchero* (I.); *Saker* (Mah.); *Gula* (Mal.); *Gukiea* (Pol.); *Assucar* (Lus.); *Sorkara* (Sa.); *Soeker* (Suec.); *Sakkarr* (Tel.); *Panchadara* (Tam.)

A†. Bo†. Bo5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. Has-P†. HC†. HN†. L†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†. AD.

Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His. LonN. LP. LPC. Pol. R. RC. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fl. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T. Z.

ist eine dichte, weiße, kristallinische, zerreibliche, geruchlose Substanz von sehr angenehmem süßem Geschmack. Der weißeste Zucker (Saccharum albidissimum, purissimum, officinarum, purificatum), welcher gemeinlich Raffinade genannt wird, ist mehr, der weiße Zucker (Saccharum album), gewöhnlich Melis genannt, weniger rein. Nach Europa wird er als roher Zucker oder Moscovade (Mel Caninae, Saccharum rubrum s. non purificatum s. Moscovatum) gebracht. Der aus der Auflösung des gereinigten Zuckers durch regelmäßige Crystallisation erhaltene Zucker wird Candiszucker, Zuckerkand (Saccharum candum s. cantum s. crystallisatum) genannt, und ist, je nach dem Grade der Reinheit, mehr oder weniger weiß oder gelblich, oder braun und mehr oder weniger durchsichtig (S. candum rubrum et album). Der nicht crystallisirbare Theil des Zuckers heißt Molasse (Saccharum Molasses s. Melas-es, Melustum, Syrupus empyreumaticus, Theriaca communis).

Auch aus *Beta vulgaris*, L. (GalP.)

Bor5†. DB. zeigen unter den zur materia pharmaceutica gehörigen Gegenständen die Rotulae Sacchari, Pastilli simplices, Zuckerkuchen an.

Syrupus simplex s. communis s. simplicissimus s. e Saccharo s. Sacchari s. Sacchari albi, Julapium, Saccharum clarificatum. (A†. Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. His. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Fol. RC. Suec. Taur. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.)

R. Sacchari albi . . . partes tres.
Aqua partem unam.

Dissolve blandi caloris ope, liquori, despumando continue, Albumen unum in Aquae parte una dilutum immitte; coque donec nonnisi parva spumae albae copia appareat et per pannum trajice. (Gal. GalM.)

Parari potest quoque absque ebullitione, dissolvendo Sacchari partes duas in una Aquae, balnei vaporis ope. (Gal); — GalM. Syrupus refrigeratus 35° indicet.

Taur. Sacchari albi libras octo solvere in Aquae font. s. q. in vase aeneo stanno obducto, addere Albumina Ovo-

rum quatuor in aqua per agitationem soluta et omnia simul probe commiscere, tum liquorem per horae quadrantem coquere; effusa circiter librā Aquae frigidae, vas ab igne remove, omni fervoris motu cessato, liquorem per pannum colare et syrupi consistentiam, quod peractum autumabis, quando ipse adhuc calens lente fluat, vel jam refrigeratus guttatim super lapidem effusus formam quasi sphaericam retineat; tunc vase ab igne remoto ac frige facto syrupum per linteum colare et servare in lagemis vitreis; — GalP. Sacchari libras duodecim, Albumina Ovorum duo, Aquae q. s.; — DB. Sacchari libras viginti, Aquae quindecim, Albumina tria; — T. Sacchari libras triginta, Aquae decem, Albumina Ovorum quatuor cum Aquae tanta quantitate subacta, ut pondus libras decem aequet.

Sax2†. Sacchari albiss. unc. sedecim, Aq. font. novem unica ebullitione ad syrupi consistentiam coquere et Albuminis ope despumare; Hass†. Wür†. et Pid. Sacchari partes quatuor et tres Aquae; — Pm. Sacchari libras sex, Aquae quatuor, cum Albumine Ovi clarificare, per pannum linteum colare et in syrupum redigere; — Ams. Ed. et C. Sacchari quindecim et octo Aquae; — A†. Ba†. Ful†. HassP†. Wir†. An. B. Bel. Fenn. Fer. Suec. Fi. et Sw. Sacchari partes duas et unam Aquae; — D. His. LP. et Pm. Sacchari et Aquae, sing. partes aeq.; — His. Sacchari libras duas, Aquae quatuor; — Bor5†. Han†. HC†. HN†. O†. Pol. Sacchari libras tres (uncias triginta duas HN†.) et Aquae uncias viginti; — AD. LonN. CG. Gr. Re. Sacchari libras duas cum dimidia et Aquae octarium; — LPC. Sacchari libras decem, Aquae octarios tres; — Am. Sacchari uncias quindecim et Aquae semioctarium. — LH. Sacchari depur. libras duas cum Aquae una miscere et semel ebullire vel: Sacchari albi libras tres cum Aquae duabus coquere, clarificare, colare et ad debitam consist. redigere; — Li†. Sacchari libras tres et Aquae uncias viginti septem; — Gen. Aquae et Sacchari q. s. ut fiat liquor spissus; — RC. Sacchari libras tres cum dimidia, Aquae libras duas.

Du Syrupum simplicem inter materias pharmaceuticas indicat i. e. venalem; Bor5†. HC† Syrupum communem s. culinarem depuratum, braunen Syrup, inter ingredientia pharmaceutica indicant.

Blandeau syrupum colore penitus privatum ita parare proposuit:

℞. Sacchari . . . libras sexaginta.

Carbonis anim. ablut. unc. sexaginta.

Aquae . . . octarios sedecim.

Liqua ignis clari ope et infunde per duas vel tres vices, Solutionem Albuminum Ovorum no. 6. in Aquae octariis duobus; ab igne remota seponere, despuma et per pannum trajice. (GalH.)

GalP. Sacchari albissimi libras duas solvere in Aquae purae libra, addere Carbonis animalis praeparati uncias duas et po t horas duodecim filtrare per chartam (*Syrupus simplex albus*.)

℞. Sacchari . . . libras quadraginta.

Aquae frigidae libras viginti duas.

Agita solutionem cum Carbone animali loto, et mixturam subinde vehementer movendo per horas viginti quatuor, tunc filtra. (*Durozier*.)

℞. Sacchari . . . libras viginti.

Aquae . . . libras decem.

Albumina Ovorum . . . no. 8.

In autoclave inclusa stent super igne per horae quadrantem. (*Grammaire*.)

℞. praeterea *Syrupum Molasses* s. partem sacchari non crystallisabilem indicat.

Syrupus s. *Tinctura Corallii*. (Gen.)

℞. Corallii rubri,

Cerae flavae, sing. . libras duas.

Cerae liquefactae corallium immitte et tandem coque, donec hujus supremi color penitus cum cera commixtus sit; decantha deinde et igni appropinquando adde

Aquae bullientis . . . sesquilibrium sed sensim infundendo et sub continua agitatione, ne materia e vase revellatur; coque denno ut cera liquefiat et in locum frigidum ad coagulandum seponere; crusta deinde semota syrupum serva.

Rotulae Manus Christi, *Saccharum perlatum*. (Br†. Wir†. Sp.)

℞. Sacchari albi . . . q. v.

Aquae Rosarum . . . q. s.

Fiant rotulae. (Sp.)

℞. Sacchari albi . . . libram.

Aquae Rosarum . . . q. s.

ad dissolvendum saccharum. Coque ad globulum usque et adde

Matris Perlarum pulv. semunciam.

Fiant rotulae. (Br†. Wir†.)

Clyster laxans (LH.) Sacchari impuri (moscowade) uncias tres pro clystere indicat.

Mixtura demulcens. (Gr.): *Spermatis Ceti* drachmas duas. *Virellum Ovi* dimidii, *Syrupi simplicis* semunciam,

Aquae Cinnamomi uncias duas, Aquae quatuor. — Dexters 1 Eßlöffel voll.

Mixtura Theriacae. (LoP.)

℞. *Syrupi nigri* (Molasses)

fluidunciam cum semisse.

Aceti vinosi . . . fluidunciam.

Aquae . . . fluiduncias octo.

Misce.

Sagapenum.

Gummi s. *Gummi-Resina Sagapenum* s. *serapinum*; *Σαγαπέννον*: *Sagapengummi*, *Serapingummi*; *Sagapennum*, *Gomme seraphique* (Gal.); *Sughenus* (Ar. Duk.); *Sagapeno* (His. Lus.); *Sagapeno*, *Serapino* (I.); *Sagapen* (Pol.); *Kandel* (Sa.).

Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. M†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Re. Sa. Sp. T. Va. Z.

Ein Gummiharz in körnigen Massen oder erbsengroßen Tropfen (*Sagapenum* in granis, was jedoch sehr selten vorkommt), äußerlich von röthlichgelber, innen von röthlichweißer Farbe. Der Geruch ist unangenehm, dem des Mand ähnlich, aber weniger stark, der Geschmack scharf.

Diese Substanz kommt, nach Willdenow, von *Ferula Persica*, *Hope* 4, Persisches Seckentkraut (*Pentandria Digynia*, L.; *Umbelliferae*, J.), einer Pflanze Persiens. (Phil. Trans. LXXV. 36. t. 3. 4.)

Reizend, selten angewendet. Reinigung (Bor5†. His3.) wie *G. Ammoniacum*.

Pilulae Sagapeni compositae. (LPC.)

℞. *Sagapeni* . . . unciam,

Aloës . . . semidrachmam,

Syrupi Zingiberis . . . q. s.

S a g o.

Sagu, *Faecula Sagu*; *Sago*; *Sagon* (Gal.); *Sagu* (Ba. Ja. Lus. Mal.); *Sokuhme* (C.); *Sauke chawal* (Duk.); *Sabudana* (Hin.); *Schowarisi* (Tam.); *Zowbium* (Tel.).

Ba†. Bor5†. Ful†. HassP†. iLi†. Wir†. M†. AD. Am. An. B. Fer. GalP. LP. LPC. Lus. R. Taur. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. Pil. Re. Sp. T.

Eine stärkeartige Substanz in kleinen, unregelmäßigen, über Stecknadelknopf großen, weißlichen oder röthlichen, sehr harten, gleichsam, besonders in der Mitte, hornartigen, geruch- und geschmacklosen Körnern (*Grana Sagu*).

Man bereitet den Sago aus dem Mark der Sagopalme, *Sagus Rumphii*. Lank, (No. oecia Hexandria, L.; *Palmae*, J.), welche auf den Molucken wächst. Außer dem wird noch aus andern Palmenarten, *Dioscorea sativa*, *Phaseolus Mungo*, *Cycas circinalis* (Plenck t. 727.), *revoluta*, *Phoenix farinifera*, *Metroxylon Sago* und *Ruffia*, Sago bereitet (Gr. Re.) Der Portland Island Sago wird aus den Wurzeln von *Arum maculatum* gewonnen.

Stärkend, erweichend.

Gelatina Sagu. (Lus. Gr. Re.)

R. Sagu pulverati . . . drachmam.
Aqua uncias octo.

Coque lente, agitando continue, ad consistentiam requisitam. Adde

Sacchari albi q. s. ad gratum saporem.

Gr. Grana in Aqua per horam macerare, defundere, et nova addita coquere ad transparentiam, tunc addere Vinum et Saccharum aut jusulum clarum. — Re. ut gelat. panis biscocti.

Gloucester jelly (Re.): Rad. Eryng. condit. Ichthyocoll., Hord. perl., Ras. Cornu Cervi, sing. uncias duas, Sago, Oryzae, Conservae Rosar., sing. unam. Coque in Aquae libris quatuor (two quarts) ad duarum reman. et exprime. Warm mit Milch oder Wein vermischt.

S a l e p.

Salab, *Radix Salep*; *Salep*; *Salep* (Gal.); *Salibimisri* (Ar. Duk. Hin.); *Salepo* (Lus.); *Salamisrie* (Tam.).

A†. Ba†. Bor5†. BorC†. Br†. Ham†. Han†. Ha-sP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Wi†. Wür†. WW†. M†. AD. Am. Ams. An. B. D. Fenu. GalP. Lus. Pol. R. Suec. Taur. A. Be. C. Fi. G. Gr. Fid. Re. Sp. T.

Eine stärkemehlartige Substanz in kleinen Stücken von der Größe einer Kaffeebohne bis zu der einer Mandel, von strohähnlicher Farbe, welche halbdurchsichtig, fast hornartig ist und einen etwas bock- und saamenähnlichen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack besitzt.

Man bereitet den Salep in Persien aus den Wurzelknollen unbekannter Orchideen. Vorzüglich wird die Wurzel von *Orchis mascula*, L. (Blackw. t. 53. Düss. off. Pfl. IX. t. 11. Plenck t. 643), *militaris bifolia* (Düss. off. Pfl. VI. t. 15.) und *Mörio*, L. (Schk. t. 271. Düss. off. Pfl. XII. t. 14. Plenck t. 645), welche beide in Deutschland, erstere aber vorzüglich häu-

fig in der Türkei und in ganz Asien vorkommen soll, als Salepwurzel benutzt.

Stärkend, nährend, einschließend. Acht und vierzig Theile Wasser bilden durch Kochen mit einem Theile Wurzel ein schleimiges Decoct.

Pulvis Salep. (B*.)

R. Salep sesquunciam.
Sagu unciam.

G. *Tragacanthae* . . . drachmam.

Man versetzt Morgens und Abends einen Kaffeesöffel voll mit Wasser und Milch und macht einen Brei daraus, welcher bei Schwindsucht und Husten von Nutzen ist.

Conditum Saiyrii, *Conserva Orchidis.* (Palt. Wir†. Sar.)

R. Rad. rec. Orchidis . . . libram.
Aqua libras octo.

Macerate per dies aliquot, tunc coque ad molliorem usque; in decocto clarifica deinde

Sacchari albi . . . sesquilibram.

Infunde radicem per tres dies et tunc coque in syrupo a quo in eo retine vel evaporatorii ope sicca. (Sar.)

Palt. et Wir† Radicem in Aqua coquendo mollescere, tunc exstillare et ei infundere Saccharum ad plumam coctum.

Gelatina s. Mucilago Radicis s. Radicum Salep, *Gelatina ex Salep*, *Decoctum Salep* (BorC†. Bor5†. Han†. HN†. Sax2†. An. LP. Lus. Pm. Fi. Gr. Sw. T. Vm.)

R. Salep pulverati . . . drachmam.
Aqua uncias octo.

Coque sufficienter. (Vm.)

Bor5† Salep drachmam, Aqua frigidae uncias duodecim, ad unciarum septem remanentiam decoque (Gelatina); — HC†. Salep pulv. grana quinque, Aqua destill. unciam, ebulliendo et continue agitando solve et cola.

R. Pulveris Salep . . . drachmas duas.
Aqua bullientis . . . uncias sex.

Tritura simul. (An.)

Sax2† Radicis semidrachmam, Aqua font. frigidae unciam, terere in mort. vitreo vel lapideo, addere Aq. font. fervidae uncias quinque, mixta conquare in vitro, donec refrigerint; — Bor5† ut Sax2†, sed Radicis et Aquarum partes dimidias; — BorC†. Salep drachmas duas et Aqua bullientis uncias duodecim; — Gr. Salep uncias duas, Aqua octarios duodecim, adde Magnesia calcinatae uncias tres, ut mucor prohibeatur.

R. Salep pulverati . . . drachmam.
Aqua uncias octo.

Coque et adde

Sacchari sufficientem quantitatem ut sapor gradus prodeat. (Lus.)

LP Salep drachmas duas, Aquae duodecim, Sacchari duas coquere ad consistentiam gelatinae.

Pm. Salep drachmam, Aquae uncias quatuor cum dimidia et Syrupi Sacchari sex quinciam; — Ham†. HN†. Salep drachmas duas, Aquae uncias octo et Syrupi Corticum Aurantium sesquinciam; — Pm. Fi. Salep unciam cum Aquae libris sex ad duarum remanentiam coquere, colare, ad unam lento calore consumere, addere Sacchari uncias duas et ab igne removendo, affundere Aquae Cinnamomi lacteae semunciam; — T. ut Fi. sed sub finem aquae cinnamomi loco Aquae Citri drachmas duas et aliquot guttas solum Aquae Cinnamomi.

R. Pulveris Salep . drachmas duas, Aquae frigidae q. s.

ut coquendo decocti unciae novem obtineantur, cui adde

Syrupi Papaveris . sesquinciam.

Aquae Lauro Cerasi drachmas sex.

Misce bene. (Sw.)

Decoctum Radicis s. de Radice Salep, Infusum Orchidis. (Lit. Wür† Aut. Sa.)

R. Pulv. Rad. Salep . drachmam.

Aquae purae uncias sedecim.

Coque ad colaturae librae unius remanentiam. (Wür†)

Aut. Salep drachmas duas et Aquae uncias duodecim.

R. Pulveris Orchidis . drachmam.

Imbibe Aqua frigida, donec volumen quadruplum obtentum sit; adde deinde

Aquae bullientis . sesquilibram.

Coque per horam dimidiam. (Lit.)

R. Salep pulverati . drachmas duas.

Aquae fontanae q. s.

Decoque ad librarum duarum colaturae remanentiam et adde

Syrupi Papaveris,

— Diacodion, sing. . unciam.

Misce bene. (Sa.)

Mixtura s. Potio demulcens. (Ham†. Sm.)

R. Salep pulverati . scrupulos duos.

Aquae fervidae uncias decem.

Solutioni adde

Sacchari albi semunciam.

Dissolve. (Ham†)

R. Salep drachmam.

Aquae bullientis q. s.

Coque per horae quadrantem et colaturae unciarum quatuor adde

Laudani Sydenh. gutt. quindecim.

Syrupi Diacodion

drachm. quatuor.

Misce bene. (Sm.)

Potio pectoralis. (Sm.)

R. Salep pulverati,

Sacchari Lactis, sing. drach. duas,

Syrupi Diacodion unciam.

— Althaeae uncias duas,

Misce. — Rößelweise.

Chocolata s. Succolata alba s. cum Salep. (GalP. Pic.)

R. Cacao uncias quatuor.

Salep uncias sex.

Aquae uncias octo.

Coque exiguo igne per semihoram et adde

Sacchari albi uncias quatuor.

Farinae q. s.

Fiant tabellae ponderis semunciae.

GalP. Chocolatae simplicis libram,

Rad. Salep pulv. semunciam.

Electuarium Diasatyrum s. aphrodisiacum. (Pal†. Wir†. Bo. Sp.)

R. Cinnamomi drachmas duas.

Vanillae drachmas octo.

Radices Orchidis . drachmas sex.

Marrubii scrupulos duos.

Rad. Eryngii conditae . unc. duas.

Conservae Inulae q. s.

Misce bene. (Bo.)

R. Rad. Orchidis rec. uncias quatuor.

Sacchari ad glob. cocti

unc. duodecim.

Contunde, per cribrum setaceum trahice et tere cum

Nucis Indicae conditae,

Zingiberis conditi,

Pinearum recentium,

Pistaciarum, sing. uncia.

Adde deinde

Pulv. Caryophyllorum,

Cinnamomi,

— Scincor. marin., sing.

semunciam.

Brodii Zingiberis q. s.

ut fiat electuarium. (Wir†. Sp.)

R. Radicis recentis Eryngii,

— — Pastinacae,

— — Orchidis,

Nucum conditarum,

Pinearum,

Pistaciarum, sing. semunciam.

Seminum Anisi,

— — Eruciae,

— — Fraxini,

— — Urticae,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis, sing. drach. quinque.

Scinci marini drach. duas c. dim.

Moschi grana septem.
Mellis despumati . . . libras tres.
Misce fiat electuarium (Palz.)
Gabe, vier bis sechs Drachmen.

Salicaria.

Lythrum Salicaria, L.; brauner Weiderich, Ackerweiderich, Weiderichblutkraut; Salicaire (Gal.), Common willow herb (Ang.); *Wrbina brunatna* (B); *Parcke* (Bel.); *Salicaria* (I).

A†. Ba†. Br†. Ful†. Ham†. Li†. Sax†. Wir†. Wür†. M†. Am. B. Du. Fer. Gal. His. His3. Taur. Be. C. Gr. R. Sp. Z.

4 (Dodecandria Monogynia, L.; *Salicariaeae*, L.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Hayne III. t. 39. Düss. off. Pfl. VI t. 3. Zorn Ic. pl. t. 113. Plenk t. 362.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Salicariae* s. *Lysimachiae purpureae* s. *purpureae spicatae*) ist wulzig und gelb. — Das Kraut besteht aus einem vierkantigen, röthlichen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, herzförmig lanzettigen, ganzen, oben glatten, unten behaarten Blättern. Es ist geruchlos und hat einen schleimigen, bitteren Geschmack.

Man hat es bei Diarrhöe und Ruhr empfohlen. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu vier Scrupel.

Opiatum astringens. (Bo.)

R. Pulv. *Salicariae* grana triginta.
— Rad. *Arnicae* semidrachmam.
— *Aluminis* . . . grana sex.
Conservae Cynorrhodon . . q. s.

Auf einmal und nöthigenfalls binnen vier und zwanzig Stunden zwei Mal wiederholt. Man nimmt es in einer passenden Lisdane.

Decoctum Salicariae. (B*)

R. *Herbae Salicariae* . . . unciam.
Aquae fontanae . . . libram.

Decoque ad unciam octo colaturae remanentiam. — Bei Diarrhöe und Ruhr empfohlen. — Gabe, ein Pössel alle zwei Stunden.

Mixtura antidiysenterica. (Ca.)

R. Pulv. *Salicariae* sesquidrachmam.
Aquae Rhoeados . . . libram.
Syrupi Althaeae . . . unciam.
Gabe, drei und eine halbe Unze alle drei Stunden.

Salix.

In den Pharmacopöden sind angezeigt:

1) *Salix alba*, L.; gemeine Weide; Saule blanc, Saule commun (Gal.); Willow (Ang.); *Wrbina* (K.); *Ppil* (D.); *Sauce* (His.); *Wilg* (Bel.); *Salice* (I.); *Korawierzbowia* (Pol.); *Salgueiro* (Lus.); *Pil* (Suec.).

A†. Ba†. Br†. Ful†. HassP†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fer. Gal. LP. R. RC. Taur. Br. C. Gr. Re. Z.

Ein Strauch oder Baum (*Dioecia Diandra*, L.; *Salicinaeae*, L.), welcher in ganz Europa sehr gemein ist (Blackw. t. 327. Plenk t. 701. Zorn Ic. pl. t. 402. Düss. off. Pfl. Suppl. III. t. 5.)

Man wendet die Rinde der drei- oder vierjährigen Zweige (*cortex Salicis albae*) an; sie ist dünn, biegsam und braunroth, und hat einen eigenthümlichen Geruch und einen sehr adstringirenden, bitteren, balsamischen Geschmack.

2) *Salix fragilis*, L.; Bruchweide; Saule fragile (Gal.)

Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. Li†. O†. Sax2. D. Du. Fer. R. E. Gr. Re.

Ein fast allenthalben in Europa wachsender Strauch. (Lin. Fl. Lapp. t. 8. fig. 6. Düss. off. Pfl. XV. t. 8.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (*cortex Salicis fragilis*) an; sie hat einen etwas balsamischen Geruch und einen sehr bitteren, adstringirenden Geschmack.

3) *Salix capreae*, L.; Eoelweide, Sohlweide; Saule marceau (Gal.).

Ed. Fer. Gal. His3. LonN. C. CG. Gr. Re.

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch.

(Pall. Fl. Ross. t. 87. fig. 2.) Die Rinde (*cortex Salicis capreae*) ist adstringirend.

4) *Salix vitellina*, L.; Dotterweide; Saule osier jaune (Gal.).

D. R.

Ein Strauch des gemäßigten Europa's. (Hoffm. Fasc. I. 57. t. 11. 12. fig. 1—3 und t. 24. fig. 1. Düss. off. Pfl. Suppl. III. t. 6.)

Die Rinde (*cortex Salicis vitellinae*) ist adstringirend.

5) *Salix pentandra*, L.; Baumwollweide, Borbeerweide; Saule pentandre (Gal.).

A†. BorC†. Bor5†. Han†. HC†. HN†. O†. Sax2†. B. Bel. D. Pol. R. RC. Suec. Be. Gr. Sp.

Ein in Europa sehr gemeiner Baum. (Oed. Fl. Dan. t. 943. Plenck t. 702. Düss. off. Pfl. XIV. t. 4.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis pentandrae s. laevis) an; sie ist dünn, biegsam, außen braun und hat einen balsamischen Geruch und einen etwas bitteren und styptischen Geschmack.

Gr. führt außer diesen noch: *Salix Helix*, *monantha*, *purpurea* (Düss. off. Pfl. Suppl. IV. t. 14), *Russeliana* (Düss. off. Pfl. XIV. t. 5.), *vininalis*, *amygdalina*, *Babylonica* und *eriocephala* an, deren Ränder sämtlich sehr bitter und abstringierend sind.

Diese Rinden enthalten ein eigenthümliches Alkaloid, von Fontana, dem Entdecker, Salicin (Salicinum DB.) genannt. Man hat sie als abstringierend und tonisch bei Wechselstößen statt der China vorge schlagen. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer ganzen Unze.

Pulvis Salicis compositus. (RC.)

R. Corticis Salicis . . . uncias novem.
— Quercus . . . uncias duas.
Rad. Gentianae lut. . . unciam.
Misce. — Statt der China.

Cataplasma antisepticum. (Ful.)

R. Corticis Salicis albae pulverati,
Herbae Rutae. sing. uncias duas.
Aqua vitae camphor. unc. tres.
Aceti . . . q. s.

Unguentum Salicis. (Huf.)

R. Succ. Fol. Salicis . . . uncias duas.
Axungiae Porci . . . q. s.
Misce blando calore. — Zum Verband unreiner, scorbutischer und brandiger Geschwüre

Extractum Salicis aquosum. (A+. Bat. Borst. Ful. Han. HassP. HC+. O+. Sax+. Ams. An. B. Pol. RC. Br. DB. T.)

R. Corticis Salicis . . . libram.
Aqua frigida . . . libras decem.
Macerate per dies duos, subinde agitando; cola, sepon, et liquorem decanthatum ad consist extracti inspissa. (Pal.)

R. Corticis Salicis . . . partem unam.
Aqua . . . partes duodecim.
Digere per horas 12, blando calore, tunc per horam unam coque, cola et liquorem ad extracti consistent. consume. (Bat.)

HassP. ut extractum colombo, ligni campechiensis etc.

R. Corticis Salicis . . . partem unam.
Aqua bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquantur cum partibus quatuor Aqua et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem depositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (Borst. Han. O+. An.)

Borst. Corticis libram cum Aqua sedecim ad octo, residuum cum Aqua sedecim ad dimidium decoquere, decoctionem quoties opus fuerit repetere, liquores commixtos ad remanentiam librarum quatuor et deinde balnei vaporis ope ad extracti absinthii consistentiam consumere; — HC+. ut extractum Angusturae; — GalP. ut extractum Liquiritiae; — DB. ut extr. corticis Brasiliensis.

RC. Corticis q. vis cum Aqua octuplo ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consist. consumere; — A+ et Sax+. Corticem pluribus succedentibus coctionibus penitus extrahere et liquores commixtos in balneo aquae post decanthationem inspissare; — Br. coque illum per horas duas cum Aqua partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos consumere; — B. digerere eum per horas 24, tunc coquere per duas cum Aqua partibus decem et coctionem per aequale tempus cum novae Aqua partibus octo repetere; — Ams. bis eum decoquere, primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aqua, qualibet vice ad dimidium redigendis; — T. Coquere per semihoram Corticis libras duas in Aqua libris viginti quatuor et exprimendo colare, coctionem repetere et decocta filtrata inspissare.

Gabe, gehen bis zwanzig Gran.

Extractum Salicis spirituosum. (Ful.)

R. Corticis Salicis . . . libram.
Aqua vitae . . . libras sex.
Digere per dies aliquot et exprime; faeces coquantur cum Aqua libris tribus et cum expressione colentur; colaturas ambas, quamque seorsim, ad mellis consistent. inspissa et tunc commixtas sufficienter consume.

Infuso-decoctum Salicis Bremeri. (B.)

R. Corticis Salicis uncias quatuor.
Spiritus Frumenti . . . uncias octo.
Aqua . . . uncias sedecim.
Digere in vase tecto et cola; residuum deinde coquantur cum Aqua communis unciis triginta ad unciarum quindecim liquidi rema-

nentiam; colaturas commisce. — Fiebermittel. — Zwischen zwei Fieberanfällen zu verbrauchen.

Decoctum Corticis Salicis. (BorCt. B*. DB.)

R. Cort. Salicis concisi . . . unciam.
Aqua fontanae . . . uncias sedecim.

Decoque ad unciarum octo remanentiam. (B*.)

BorCt. Corticis sesquiunciam et Aqua uncias quindecim ad novem redigendas; — DB. ut decoctum Ulm.

Tonisch, fieberwidrig. — Glasweise.

Injectio antiseptica. (Ful†. Ham†.)

R. Corticis Salicis . . . uncias duas.
Aqua libram.

Coquendo parte tertia consumpta, coaturae adde

Camphorae in Alcoholis q. s. solut. semidrachmam.

Mellis despumati . . . unciam.

Decoctura Salicis composita. (RG.)

R. Corticis Salicis drachmas novem.
Gentianae luteae . . . drachmam.

Aqua sesquilibram.

Decoque ad libram. — Interdum addi possunt Corticis Quercus drachmas duae. — Statt des decoct. chinae.

Salicina. (Ga'P. DB.)

Decoque fortiter corticis Salicis s. q., trajice per telam, adde Aqua Calcis vivae clarae q. s. ad praecipitandam materiam colorantem, filtra evapora ad consistentiam syrupi, adde Alcoholis 86° s. q. ad praecipitandam materiam gummosam, filtra, distillatione Alcohol separa et residuum sufficienter evaporatum loco frigido ad crystallisationem seponere. (Ga'P.)

DB. Corticem Salicis vel Populi extrahere cum Aqua calida cum Gelatinae animalis pauxillo mixta, addere Aquam Calcis, colaturam coquere cum Alcohole 22° B. et Carbone animali, Alcohol evaporare, etc.

Pilulae Salicinae. (Va.)

R. Salicinae

Extract Gentianae, sing.
grana duodecim.

Pulv. Liquirit. q. s. ut

F. Pilul. No VI. — Alle 2 Stunden 2 Stück bei Wechselfiebern.

Salisolia.

Man findet drei Arten dieser Pflanzengattung in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Salisolia Soda*, L.; Salzkrout; Soude commune (Gal.); Saltwort (Ang.); Sul alikantska lavhova (B.); Saltyder (D.); Soda (H s.); Loogkruid (Bel.); Soda (I.); Solda (Lus.); Soudaart (Succ.).

M†. Gal. His3 Taur. Gr. Z.

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Chenopodeae, J.) Eine an den Küsten des Mitteländischen Meeres wachsende Pflanze. (Ja. q. Hord. Vind. I. p. 23. t. 63. Plench t. 161.)

Man wendet das Kraut (herba Vitri. Kali) an; es besteht aus ästigen, röthlichen Stängeln mit sitzenden, langen, schmalen, fackelförmigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen unangenehm alkalischen Geschmack.

2) *Salisolia Tragus*, L.; fackeliges Salzkrout; Soude épineuse (Gal.).

M†. Gal. Taur. Gr.

⊙ Eine Pflanze des südlichen Europa's.

3) *Salisolia Kali*, L.; Kalisalzkrout; Soude kali (Gal.).

M†. Gal. Taur. G. Gr.

⊙ Eine Pflanze Südeuropa's. Diese und die vorhergehende Art können statt des gemeinen Salzkrouts angewendet werden.

4) *Salisolia sativa*, L.; dickblättriges Salzkrout.

Taur.

⊙ Eine Pflanze Südspanien's.

Salvia.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Salvia officinalis*, L.; Salbei, Salzbe; Saug commune (Gal.); Sage (Ang.); Ssalweg (B.); Salvie (D.); Salvia (His. I.); Salie (Bel.); Szalwia (Pol.); Salva (Lus.); Salvia (Succ.).

A†. Ba†. BorCt. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wirt†. Wür†. WW†. M†. A†. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. His3. LoP. LP. Lus. Pol. R. RG. Succ. Taur. Be. Br. C. Fl. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

2) (Diandria Monogynia, L.; Labiatae; J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. t. 10. Düss. off. Ph. IV. t. 11. Plench t. 19. Hayne VI. t. 1. Zorn Ic. pl. t. 165.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba s. folia Salviae minoris. Salvia hortensis major et minor, S. virtutis) besteht aus einem vierkantigen, einfachen Stängel mit gegenüberstehenden

henden, eirundlanzettigen, ganzen, geferbten, runzeligen, grünlichgrauen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften und etwas kampferartigen Geruch und einen stöptischen, gewürzhaften, etwas bittern Geschmack — Die violettblauen Blüthen bilden eine endständige Aehre. Man sammelt die Pflanze vor dem Aufblühen.

Reizend, nervenstärkend, tonisch, schwach adstringierend, auflösend und austrocknend.

2) *Salvia Horminum*, L.: edles Scharlachkraut; Sauge Hormin (*Gal.*); Purple-opped sage (*Ang.*); Horminio (*His.*); Edele slarey (*Bel.*); Orminio (*I.*); Ormino (*Lus.*).

Br. Wirt. Gal. His. Be. Gr. Sp.

3) Eine Europäische Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 244.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (*herba Hormini* s. *Gallitrichi*) besteht aus stumpfen, geferbten, unangenehm riechenden und etwas bitter schmeckenden Blättern. — Der Saame ist glatt, schleimig und etwas bitter.

Reizend, tonisch

3) *Salvia pratensis*, L.; Wiesenalbe; Sauge des prés (*Gal.*).

Gal.

4) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw. Herb.* t. 258.)

Man wendet die Blätter (*folia Hormini*) an; sie sind gestielt, langgestreckt, herzförmig, geferbte, runzelig, glatt, von angenehmem Geruch und bitterem, adstringirenden Geschmack.

4) *Salvia sclarea*, L.: zahmes Scharlachkraut; Sauge Sclaree (*Gal.*); Common clary (*Ang.*); Graakuse (*D.*); Maro cortuso (*His.*); Tamne sclarey (*Bel.*); Schiarea (*I.*); Esclarea (*Lus.*).

Wirt. M. Fer. Gal. His. Taur. G. Gr.

5) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (Zorn Ic. pl. t. 484.)

Man wendet das Kraut (*herba Sclareae* s. *Gallitrichi*) an; es besteht aus einem dicken, vierkantigen, sehr ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen und langgestreckten, herzförmigen, runzeligen, spigen, sägezahnigen, gegenüberstehenden Blättern. Es hat einen sehr starken und unangenehmen Geruch und einen bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Bei Gr. findet man außerdem noch: *Salvia Cretica*, *Aethiopica*, welche auf das Nervensystem wirken, und bei Augenkrankheiten, auch als aphrodisiaca gebraucht werden; *Salv. Verbenaca*, *Oculus Christi*; *S. verticillata*, *Horminum sylvestre*, Saamen in's Auge gebracht, lösen sich in Schleim auf und erleichtern die Ausziehung fremder Körper; und *S. lyrata*, gequetschte

Wurzelblätter zur Zerstörung von Warzen und gegen Krebs.

Conserve Florum Salviae. (Wirt. Sar.)

R. *Florum Salviae* . . . partem unam.

Sacchari pulverati . . . partes duas.

Contere. (Wirt.)

Sar. *Florum partem unam et tres Sacchari ad plumam cocti.*

Species s. Herbae aromaticae s. aromaticae vulnerariae s. vulnerariae. (A. B. Gal. P. Re. Vm.)

R. *Herbae Salviae*,

— *Melissae*,

— *Thymi*,

— *Menthae piperiticae*,

— *Hyssopi*,

Flor. Lavand., sing. . . part. aeq.

Concisa misce. (B.)

R. *Foliorum Salviae*,

— *Melissae*,

Summit. floresc. Absinthii,

— *Menthae pip.*,

— *Serpylli*,

Flor. Chamomillae vulgaris, sing. part. aeq.

Concisa misce. (Ba.)

R. *Foliorum Salviae*,

— *Thymi*,

— *Serpylli*,

— *Hyssopi*,

— *Menthae aquatica*,

— *Absinthii*,

— *Origani*, sing. . . part. aeq.

Concisa misce. (Gal. P. DE. Re.)

R. *Herbae Hyssopi*,

— *Marrubii*,

— *Origanii*,

— *Rutae*,

— *Salviae*,

— *Saturejae*,

— *Scordii*,

— *Serpylli*, sing. partes aeq.

Concisa misce. (A.)

R. *Cubebae*,

Nucis mosch., sing. part. unam.

Cinnamomi,

Zingiberis,

Caryophyllorum, sing. part. duas.

Cort. Aurantium part. quatuor.

Menthae crispae,

Rorismarini,

Salviae, singularum partes octo.

Concisa misce. (Vm.)

Aqua de Herbis vulnerariis (Gal.):

Species vulnerar. (Gal.) part. unam.

Aquae comin. decem, destillent partes quatuor.

Extractum Salviae. (A.)

R. *Foliorum Salviae* . . . q. v.

Aquae . . . q. s.

Herba pluribus coctionibus successi-
vis penitus extracta, liquores commisce
et post decanthationem ad extracti con-
sist. inspissa.

Infusum Salviae. BorC†. Ham†. WW†.
DD. Gal M. RC. Suec. Sa. Va.)

℞. Herbae Salviae . . . drachmam.
Aqua bullientis uncias duodecim.
Infunde in vase tecto per horae qua-
drantem et cola exprimendo. (DD)
BorC†. et WW†. Salviae sesquiun-
ciam et Aqua uncias octodecim; —
RC. Suec. Salviae unciam et Aqua
libram (infunde per horam unam et
cola RC); — Ham†. Salviae unciam
et Aqua q. s. ad colaturam unciarum
octo.

℞. Herbae Salviae,
Liquiritiae rasae, sing. . . unciam.
Aqua bullientis . . . q. s.
ut colaturae octarius (litre) obtineatur.
(GalM.)

℞. Foliorum Salviae . . . uncias duas.
Flor. Rosarum rubr. . . unciam.
Aqua bull. unc. tres c. dimidia.
Infunde frigide et cola. (Sa.)
Va. Aqua bull. libras duas.
Reizend, gewürzhaft. — Tassenweise.

Infusum Salviae acidulum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . . . semunciam.
Aqua bullientis . . . q. s.
ut post semihoram digestionis colatu-
rae unciae sex obtineantur. cui adde
Acidi sulph. Aqua diluti

drachmam.
Misce bene. — Gabe, alle halbe Stun-
den eine halbe Tasse.

Gargarisma stimulan. (Ca. Sa.)

℞. Infusi Salviae . . . libras duas.
Roob Juglandis . . . uncias duas.
Alumini . . . drachmam.
Misce. (Sa.)

℞. Infusi Salviae . . . uncias sex.
Tincturae Chinae,
Syrupi Mororum, sing. semunciam.
Spir. Cochleariae . . . drachmam.
Misce. (Ca.)

Infusum Salviae vinosum. (B*. Va.)

℞. Herbae Salviae . . . unciam.
Aqua bullientis . . . libram.
Digere per horam unam, cola et co-
laturae refrigeratae adde
Vini rubri . . . semilibram.
Gabe, eine halbe Tasse alle zwei Stun-
den.

*Decoctum incitans aromaticum s. aro-
maticum.* (B.)

℞. Foliorum Salviae . . . semunciam.

Aqua . . . q. s.
ut librae duae decocti octineantur. Co-
laturae adde

Elixir acidi Halleri . drachmam.
Den Tag über allmähig zu nehmen.

Vinum aromaticum. (Gal. GalM. GalP.)

℞. Specierum aromat. unc. quatuor.
Vini rubri . . . uncias duas.
Macera per dies sex in vase clauso,
cola exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Vini rubri . . . partes decem.
Tincturae aromat. partem unam.
Commisce. (GalM.)

℞. Specier. aromatic.
uncias quatuor.
Vini rubri . . . libras duas.
Alcoolati vulnerarii uncias duas.
Macera per dies octo Species aro-
mat. in vino, trajice cum expressione,
filtra et adde Alcoolatum. (GalP.)
Kneiflich in Waschungen oder Bähungen.

Vinum aromaticum pro fomento. (DB.)

Herb. Rorismarini, Salviae, Hyssopi,
Spicae, Thymi, Fol. Aurantii, Petal.
Rosarum rubrarum, Flor. Chamomil-
lae, Sambuci, Bacc. Juniperi non con-
tus., Salis Ammoniaci, sing. drachmas
duas digerere in temperatura 30° R.
per horas nonnullas cum Vini albi li-
bris quinque, per linteam cum modica
pressione colare et cuilibet libro ad-
dere Alcoholis camphorati unciam.

Vinum Salviae. (Wür†.)

℞. Fol. rec. Salviae . . . sesquiunciam.
Vini rubri . . . sesquilibram.
Post horas 24 macerationis cola.

Fomentum excitans. (Ra.)

℞. Vini Salviae . . . libram.
Alcoholis camphorati uncias octo.
Misce.

*Aqua vulneraria spiritiuosa s. balsa-
mica, Aqua rubra, Tinctura vulneraria
s. vulneraria rubra s. aromatica compo-
sita, Alcoolatum vulnerarium.* (Gal.
GalP. DB. Fi. T. Vin)

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Rorismarini,
— — Saturejae,
— — Origani,
— — Majoranae,
— — Thymi,
— — Serpylli,
— — Hyssopi,
— — Melissae,
— — Calaminthae,
— — Basilici,
— — Menthae aquaticaе,
— — Foeniculi,

Foliorum recentium Angelicae,

— — Absinthii,

— — Rutae,

Summit. floresc. Lavandulae,

— — Hyperici, sing.

unciam.

Alcoholis (10°) . . . libras duas.

Post octo dies macerationis cola exprimendo et filtra. (Gal.)

GalP. loco Menthae aquaticae Mentham piperitam praescribit et Alcoholis 51° Cart. (80 cent.), macerationem quatuordecim dierum; — DB. Salviae, Rorismarini, Thymi, Majoranae, Rutae, Chamomillae roman., Lavandulae, Origani, Hyssopi, Menthae piperitae, sing. sesquunciam, Alcoholi 20° B. libras duodecim, macerare per dies duos et in balneo mariae destillare libras decem; — T. Salviae, Rorismarini, Origani, Majoranae, Thymi, Serpylli, Hyssopi, Melissa, Basilici, Menthae piperitae, Foeniculi, Angelicae, Absinthii, Rutae, Spicae, Hyperici, sing. unciam, Coccionellae drachmas duas, Aluminis scrupulos quatuor, Alcoholis diluti 22° B. Digere per dies quindecim et filtra. — Si loco alcoholis Acetum optimum adhibetur, obtines Aquam vulnerariam acetosam.

Aqua vulneraria acetosa, Acidum acetum dilutum et vulnerarium (Fi.) Angelicae, Salviae Absinthii Roman., Saturejae, Foeniculi, Menthae viridis, Hyssopi, Melissa, Basilici, Rutae, Thymi, Rorismarini, Origani, Calaminthae, Serpylli, Florum Lavandulae, sing. sesquunciam, Aceti fortis libras octo; destillent in balneo aquae librae sex.

R. Foliorum recentium Absinthii,

— — Angelicae,

— — Basilici,

— — Abrotani,

— — Foeniculi,

— — Hyssopi,

— — Majoranae,

— — Melissa,

— — Menthae aquaticae,

— — Origani,

— — Rutae,

— — Rorismarini,

— — Salviae,

— — Serpylli,

— — Thymi,

Flor. Lavand., sing. part. unam.

Aquae Vitae partes triginta duas.

Digere frigide per dies octo, exprime et filtra. (Vm.)

Aqua vulneraria spiritiuosa, Alcoolatum vulnerarium. (GalP.)

Easdem plantas et quantitates, ut ad tincturam vulnerariam aromaticam

(GalP.) supra citatam, Alcoholis 21° Cart. (55 cent.) libras tres macerare per dies sex et destillare libras duas.

Aqua vulneraria Florentina. (DB.)

R. Foliorum Artemisiae,

— Calaminthae mont.,

— Chaerophylli,

— Hyssopi,

— Menthae S. Mariae,

— Pimpinellae albae,

— Rutae,

— Salviae,

— Serpylli,

Florum Chamomillae, sing.

semunciam.

Aceti libras octo.

Macera per quatuor vel quinque dies et destilla libras sex.

Gabe, eine bis vier Drachmen.

Aqua vulneraria ad lotionem. (DB.)

R. Aquae vulnerariae spirituosae (DB.)

unciam.

— Menthae,

— Melissa, sing. libras duas.

Acetum Salviae. (Gal. GalP. DB. Fi. T. Vm.)

R. Fol. rec Salviae . . . part. unam.

Aceti albi partes sedecim.

Macera per dies 14 in vase tecto, subinde agitando, cola ac filtra. (Gal.)

Vm. Salviae partem unam, Aceti octo et octo dies macerationis; — T. Foliorum uncias sex, Aceti libras sex et octo ad decem dies digestionis; — Fi. Foliorum libram, Aceti fortis duodecim et sex dierum digestionem; — GalP. DB ut acetum Rosarum.

Oleum herbae Salviae s. Salviae aethereum, Aethereolum Salviae. (At. Br†. Han†. HassP†. HC†. Pal†. Gal. GalP. Sar. Br. Gr. Re. T.)

R. Herbae floresc. Salviae . . . q. v.

Aquae q. s.

Destillent. (Br.)

Han†. HassP†. HC†. Herbae partem unam et octo Aquae (caeterum ut ol. Absinth. p. sp. = 0,920 — 0,860); — At. Aquae duodecim; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — T. Herbae q. vis, Aquae bull. pondus duplum, destillare quamdiu liquor aliquid extrahit, tunc per plures vices cohobare; — GalP. ut oleum florum Aurantii.

R. Herbae floresc. Salviae

part. viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris . . . partes tres

Post tres dies destillent. (Br†. Pal†. Sar.)

Gr. Oleum Salviae Sclareae destillatum indicat.

Elaeosaccharum Salviae (HassP†.) ut elaeosacch. anisi.

Aqua Salviae s. ex Salvia. (A†. Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Würt. Ams. Gal. GalP. Pm. Pol. Sar. Taur. DB. Sw. Vm.)

R. Herbae floresc. Salviae part. unam.

Aquae q. s.
Post horas 24 destillent partes decem. (Bor5†. Han†. HC†. O†. Ams. Pol. Sw.)

HN†. Herbae libras duas, Aquae fontanae q. s. destillent librae quatuordecim; — HassP†. Herbae libras tres. Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — Pal†. Gal. et Pm. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duas; — Taur. ut aq. Menth. pip.; — GalP. ut aquam Lavandulae; — Li†. et Würt. Aquae sex; — A†. Aquae duodecim, destillent partes quatuor; — Sax2†. Aquae quindecim; destillent trientes duos; — Ba†. sedecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sar. DB. quatuor Aquae; destillent partes duae et denuo destillent supra novam Herbam.

R. Herbae floresc. Salviae part. decem.

Aquae purae partes centum viginti.
— Vitae partem unam.
Destillent partes triginta. (Vm.)

Aqua Salviae composita. (Gal.)

R. Specierum vulner. . partes duas.
Aquae partes viginti.
Destillent partes octo.

Spiritus Salviae, Aqua Salviae spirituosus. (Fer. Gal. Taur. Gr. T.)

R. Herbae floresc. Salviae libram.
Vini albi libras quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Gal.)

R. Herb. floresc. Salviae sesquilibram.
Alcoholis libras octo.

Destillent librae sex. (Fer. Taur.)

T. Herbae florecentis libras duas,
Spiritus Vini 32° octo; destillent circiter librae quinque; — Gr. Summit. libram, Aquae Vitae congiuntum.

Aqua vulneraria s. traumatica s. sclopetaria s. vulneraria spirituosus s. vulneraria alcoholica s. cum Alcohole s. vinosa s. sclopetaria aromatica s. cata-

pularum. Alcohol Salviae vulnerarius, Alcohol polyaromaticus. (A†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Würt. B*. Bel. Gal. His3. Pol. Taur. Br. Ca. Fi. Gr. Pid. Sp. T. Vm.)

R. Herbae Hyssopi,
— Menthae crispae,
— Salviae,
— Rorismar., sing. unc. duas.

Flor. Rorismarini,
— Lavandulae, sing. . unciam.

Aquae Vitae libras decem.
Destillent, donec liquor limpidus prodire cesset. (Li†. Würt.)

R. Herbae Absinthii,
— Anethi,
— Salviae,
— Tanacetii,
— Serpylli,
— Menthae piperitae,
Florum Lavand., sing

sesquinciunciam.

Aquae fontanae libras duodecim.

Alcoholis libras octo.

Post aliquot dierum infusionem destillent librae octo. (Pid.)

R. Herbae Absinthii,
— Rutae,
— Salviae, sing. drach. octo-decim.

— Foeniculi,

— Menthae piperitae,

Flor. Lavand., sing sesquinciunciam.

Aquae fontanae libras duodecim.

Alcoholis libras octo.

Post duos dies infusionem destillent librae octo. (Hass†.)

R. Herb. rec. Agrimoniae,
— — Leontopodii,
— — Bellidis minoris,
— — Bellidis majoris,
— — Betonicae,
— — Buglossi,
— — Foeniculi,
— — Hyperici,
— — Plantaginis,
— — Saniculae,
— — Scrophulariae,
— — Verbenae, sing manip. duos.
— — Aristolochiae,
— — Artemisiae,
— — Virgaureae,
— — Salviae, sing.

Vini generosi libras quadraginta.
Stent in digestionem, donec massa fermentare parumper coeperit et deinde destillando dimidium abstrahe. (Würt.)

R. Radicis Consolidae majoris,
Herbae —

Herbae Artemisiae,
— Bugulae, sing.
manip. quatuor.

— Betonicae,
— Bupthalmi,
— Consolidae minoris,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Verbenae,
— Absinthii,
— Foeniculi, sing. manip. duos
— Hyperici,
— Aristolochiae,
— Telephii majoris,
— Veroniceae,
— Centaurii noris,
— Millefolii,
— Nicotianae,
— Menthae,
— Hyssopi, sing. manipulum.

Vini albi uncias centum quadra-
ginta quatuor

Post trium dierum infusionem destil-
lent. (Sp.)

℞. Radicis Consolidae majoris,
Herb. —

— Bugulae,
— Saniculae,
— Betonicae,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Hyperici,
— Pervincae,
— Hederæ terrestris,
— Artemisiae,
— Veroniceae,
— Verbenae,
— Telephii majoris,
— Millefolii, sing. unc. quatuor.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanacetii,
— Absinthii,
— Chelidonii majoris,
— Foeniculi,
— Clematidis,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae, sing. unc. octo
— Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismar., sing.

unc. quatuor.
Summit. floresc. Lavandulae,

— — Origani,
— — Calaminthae, sing.
unc. sex.

Vini albi . libras quinquaginta.
Destillet dimidia pars. (Wirt.)

Palt. eandem formulam. addendo ta-
men Absinthii pontici, Saturejae, sing.
uncias octo, Basilici quatuor et Virg-
aureae tantidem,

℞. Foliorum Salviae . uncias octo.
— Rorismarini,
— Serpylli,
— Thymi, sing. . . unciam.
Cardamomi minoris,
— majoris, sing. drach. sex.

Macidis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zedoariae,
Galangae,
Calami, singulorum semunciam.
Vini albi . . . libras octo.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post sufficientem digestionem destil-
lent tres quadrantes. (Wirt.)

℞. Florum Lavandulae,
Herb. rec. Hyssopi,
— — Melissae,
— — Menthae crispae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli, sing. unciam.

Alcoholis (0,850) . uncias decem.
Aqua . . . libras duodecim.
Post horas viginti quatuor destillent
librae decem. (A+.)

℞. Herbae recentis Salviae,
— — Absinthii,
— — Menthae piperitae,
— — Rutae,
— — Rorismarini,

Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Alcoholis . . . libras sex.
Aqua communis . . . q. s.
Post horas 24 destillent librae octo-
decim. (Bor+ Han+ HassP+ HC+
HN+ O+ B+ Pol.)

Bor5+ Herbarum et Florum, sing.
uncias duas, Spiritus Vini rectif. ses-
quilibrium, Aqua q. s. destillent librae
sex.

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Saturejae,
— — Foeniculi,
— — Menthae,
— — Hyssopi,
— — Melissae,
— — Basilici,
— — Rutae,
— — Thymi,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Origani,
— — Calaminthae,

Foliorum recentium Serpylli,
Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Alcoholis unc. centum viginti octo.
Destillent. (Sp.)
Taur. omnium partem d' midiam; —
Gr. Scordii uncias quatuor et Folio-
rum Basil. tant-dem addit, caetera ut
antea sed siccata praeter folia angeli-
cae, macerare per dies quatuordecim
et destillando congiuntum unum cum di-
mid. abstrahere.

℞. Herba florescentis Absinthii,
— — Basilici,
— — Catariae,
— — Hyssopi,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Thymi,

Florum Lavand., sing. part. duas.
Aquaе Vitae partes nonaginta sex.
— purae partes quadringentas

quingingenta sex.
Destillent partes centum octoginta
quatuor. (Vm.)

℞. Salviae, Absinthii, Catariae, Hys-
sopi, Melissae, Basilici, Thymi, Rutae,
Majoranae, Rorismarini, Origani et
Lavandulae, sing. partem unam, Aquaе
Vitae quadraginta octo et Aquaе du-
centas septuaginta sex; destillent par-
tes nonaginta duae.

℞. Summitatum Salviae,

— Tanacetii,
— Foeniculi,
— Thymi,
— Lavandulae,
— Absinthii,
— Menthae aquaticaе,
— Hyssopi,
— Chamomillae Romanae,
— Origani,
— Majoranae,
— Calaminthae,

Stipit. et Rad. Angelicae, sing.

unc. duas.

Alcoholis (22°) libr. viginti quatuor.
Post sufficientem macerationem des-
tillent in balneo aquae librae viginti.
(Gal. Ca.)

T. Salviae, Angelicae, Tanacetii, Men-
thae vulgaris, Foeniculi, Thymi, Ma-
joranae, Calaminthae, sing. uncias qua-
tuor, Absinthii, Hyssopi, Origani, Cha-
momillae vulgaris, Lavandulae, sing.
duas, Alcoholis 36° triginta octo; post
duorum dierum digestionem destillent
in balneo aquae liquidi unciae triginta
vel triginta duae.

℞. Florum Lavandulae,
Herb. rec. Absinthii,

Herb. rec. Salviae,

— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Hyssopi,
— — Rutae,
— — Melissae,
— — Thymi,
— — Basilici,
— — Origani,
— — Hyperici, sing. unciam.

Alcoholis (0,935) libras quatuor.
Aquaе libram.

Post horas viginti quatuor destillent
librae tres (Br. Fil.)

Aqua vulneraria aquosa s. pura de-
stillata vulneraria (Fil.): Florum La-
vandulae, Herbarum rec. Hyssopi, Me-
lissae, Menthae piperitae, Origani, Ro-
rismarini, Rutae, Salviae, sing. unciam,
Alcoholis 36° quatuor, Aquaе libras
duodecim; post horas 12 digestionis
destillent librae octo.

℞. Fol. Betonicae,

— Hederæ terrestris,
— Artemisiae,
— Millefolii, sing. unc. quinde-
cim,
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanacetii,
— Absinthii, sing. unc. decem.
— Abrotani,
— Foeniculi,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae, sing. unc. octo.
— Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorism., sing. unc. quatuor.

Summit. floresc. Lavandulae,

— — Origani,
— — Calaminthae, sing.
unc. sex.

Vini gener. libr. sexaginta septem.

Post horas 24 macerationis destillet
dimidia pars. (Br. Fil.)

℞. Fol. Betonicae,

— Agrimoniae,
— Artemisiae, sing. libram.
— Salviae,
— Hyperici,
— Tanacetii,
— Absinthii,
— Menthae, sing. uncias octo.
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Lavand., sing. unc. quatuor.

Vini albi libras triginta (triginta
duas His3)

Destillet in balneo aquae dimidia
pars. (His3.)

R. Herbae Salviae,

- Absinthii,
- Menthae piperitae,
- Rutae,
- Rorismarini,

Flor. Lavand., sing. part. unam.

Aquae . . . partes quinquaginta.

Alcoholis . . . partes duodeviginti
(viginti duas Saxt.).

Post duos dies destillent partes triginta sex (Sax2t.).

DB. Herb. Hyssopi, Melissa. Menthae piperitae, Majoranae, Origani, Rorismarini, Thymi, Absinthii, Rutae, Salviae, sing. partem unam, Aquae partes quadraginta, destillent viginti. *Neußerlich als zertheiltend, und bisweilen innerlich bei Windcolik.*

Fomentatio excitans. (LH) Salviae, Absinthii, Rorismarini, sing. manipulum, Aquae ferv. libram, colaturae adde Alcoholis Camphorae unciam.

Electuarium Winkleri. (Taur.)

R. Radic. Symphyti major,

- Enulae campan.
- Tussilaginis, sing.

uncias quatuor.

Aquae q. s.

Coque ad perfectam mollitiem, cola per linteum et sepon; deinde

Passularum majorum,

— minorum, sing. uncias sex coque in decocto colato ad mollitiem. Tum radices per decoctionem mollitas et in mortario lapideo contusas supra cribrum setaceum cum Passulis coctis pone et pulpam extrahe. Mox

Folior. Salviae,

- Betonicae,
- Hederae terrestr.,
- Hyssopi,
- Pulmonariae,
- Veronicae, sing. manipulum

coque in decocto a Passulis relicto, addendo, si opus fuerit, modicam Aquae dosin, tunc per linteum cola et in eo solve

Sacchari albi libram, evapora ad syrupi densioris consistentiam et syrupo per linteum colato denique adde

Pulpam a radicibus et Passulis obtentam,

Amygdalarum dulc. excortic.,

Pinearum contus., sing.

drachmas tres,

Cinnamomi ceylan. pulver.

drachmas duas,

Groc orient. pulv. . . scrupulum.

Misce exacte.

Elixir vitae mulierum, Aqua s. Balsamum embryonum, Aqua aromatica,

Pharmacopoea universalis II. Bd. 3. Aufl.

Aqua balsamica s. Alcohol aromaticus, Gewürzwasser, Gewürzgeist. (Bor5t. Brt. HassPt. HNt. Pal. Wir. Ams B. Sp.)

R. Micae Panis triticeo modo e furno exsumpti libras duas.

Florum Caryophyllorum rubrorum,

— Tiliae, sing. libram.

Nucis mosch. unc. tres cum dimid.

Florum Lavandulae,

Herbae Salviae,

Sem. Carvi,

— Foeniculi, sing. . . unc. tres.

Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Cubebaram,

Granorum Paradisi,

Zedoariae,

Herbae Menthae crispae,

Radicis Paeoniae,

Seminum Paeoniae,

Visci querni, sing. . . uncias duas.

Macidis semunciam.

Galangae minoris drachmas tres.

Croc drachmas duas.

Vini Maderani . . . libras decem.

Aquae Boraginis.

— Buglosi, sing. libr. quatuor.

— Florum Liliorum Convallium

libras duas et uncias octo.

Aquae Fragorum,

— Rosarum, sing.

uncias sedecim.

Post tres dies digestionis destillet, blando igne, liquidi dimidia pars. (Wir.)

R. Galangae,

Zedoariae, singulorum semunciam.

Herbae Menthae,

— Melissa, sing. . . unciam.

Florum Stoechadis Arabicae,

— Caryophyllorum rubrorum,

— Tiliae, sing. drach. quinque.

Sem. Sileris montani,

— Foeniculi, sing. semunciam.

Nucis moschatae . . . unciam.

Cinnamomi . . . drachmas sex.

Corticis recentis Aurantiorum,

— Citri, sing. . . sesquunciam.

Vini albi libras duas.

Digere per horas 24 et destillando dimidium producti abstrahe. (Pal. Wir.)

Br. eandem formulam sed loco vi. mixturam e libris quinque Aquae Vitae et Aquae libris de em e destillatione liquidi libras sex abstrahere.

R. Rad. Paeoniae,

— Zedoariae,

— Zingiberis, sing. unc. duas.

— Galangae . . . drachmas sex.

Herbae Salviae,

— Melissa,

Herbae Foeniculi,
— Menthae, sing. . . unc. tres.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae, sing. . . uncias sex.
Nucis mosch., sing. . . uncias tres.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubeborum,
Granorum Paradisi,
Macidis, sing. . . uncias duas.
Alcoholis unc. quadraginta quatuor.
Aquaе font.

unc. ducentas quadraginta.
Post aliquot dies infusionis destillando uncias centum nonaginta duas abstrahere. (Sp.)

R. Nucis moschatae,
Macidis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubeborum,
Zingiberis,
Zedoariae, sing. . . semunciam
Galangae minoris drachmas duas.
Florum Lavandulae,
Herb. sicc. Menthae,
— — Salviae, sing. semunciam.
Sem. Coriandri,
— Foeniculi, sing. drach. duas.
Aquaе Vitae . . . sesquilibram.
— purae libr. septem c. dimid.

Macera per tres dies et tunc destillando liquidi libras tres cum dimidia abstrahere. (Ams.)

R. Herbae Salviae . . uncias octo
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Seminum Foeniculi,
Cassiae caryophyllatae (cinnamominae), sing. . . uncias duas.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquaе . . . libras viginti.

Post horas 24 macerationis destillando libras duodecim liquidi abstrahere. (Bor†. HassP†. HN†. B†.)

Bor5† Spiritus Vini rectificati libras sex.

R. Foliorum recentium,
Salviae,
Absinthii,
Menthae piperitae,
Rutae,
Rorismarini,
Summit. Origani, sing.
unc. decem.

— Lavandulae uncias quatuor.
Alcoholis 22° . . libras duodecim.
Aquaе communis . . libras decem.
Macera per horas 24, postea liquoris libras duodecim destilla. (Pm.)

Reizend, stärkend, herzstärkend und bläuhungtreibend. — Gabe, eine halbe bis eine

ganze Unze. — Man wendet es auch äußerlich an; ehemals soll man es zur Verhütung von Fehlgeburt mit Erfolg benutzt haben, indem man eine damit befeuchtete heiße Brodrinde auf den Leib der Schwangeren legte. Heutzutage weiß man, was von der Anwendung solcher reizenden Mittel zu halten ist.

Sambucus.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Sambucus Ebulus*, L.; Zwergholunder, Ättich, Ättichhirschswanz; Hëble, leble, Yëble (Gal.); Dwarf Elder (Ang.); Chebdj (B.); Sommerhyld (D.); Yezgo (His.); Lange vlier (Bel.); Ebbio (I.); Chebd (Pol.); Engos (Lus.); Sommerhyll (Suec.); Wäsonnik (R.); Földi-Bodza (Hu.).

At. Bor†. Br†. Sax†. Wir†. Wür†. M†. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. Lus. Taur. Be. Br. Gr. Pid. Sa. Sp. Z.

Ein Strauch (Pentandria Trigynia, L.; Caprifoliaceae J., Corneae), welcher überall in Europa wächst. (Blackw. t. 480. Planch t. 230. Düss. off. Pl. XVI. t. 19. Zorn 1c. pl. t. 40.)

Man wendet die Rinde der Wurzel, die Blätter, die Früchte und den Saamen an. Die innere Rinde der Wurzel (radix Ebuli s. Sambuci humilis s. agrestis s. Chaenactis) ist weiß und hat einen bitteren, widerlichen Geschmack. Die Wurzel selbst ist langgestreckt, fingerdick. Sie gilt für brechenregend und wassertreibend. — Man verordnet zwei Unzen, mit Wasser aufgegossen; auch kann man eine Unze von dem ausgepressten Saft geben. — Die Blätter (folia Ebuli) sind eiförmig, lanzettförmig, spitzig, gezähnt, oben glatt und glänzend, unten dunkelgrün. Sie haben einen sehr unangenehmen Geruch. Ehemals wendete man sie äußerlich bei Nodum und Erysipel an. — Die Früchte (baccae s. grana Actes) sind schwarze, dreisaamige Beeren von einem süßen und widerlichen Geschmack. Sie werden für auflösend, schweiß- und harntreibend gehalten.

Die Saamen geben, in Wasser gewiecht und ausgepresst, Del.

2) *Sambucus nigra*, L., vulgaris, Lamk.; Gliederbaum, Hollunder; Sureau noir (Gal.); Elder (Ang.); Ukti, khaman (Ar.); Bez (B.); Hyld (D.); Sabuco, Sauco (His.); Vlier (Bel.); Sambuco (I.); Bzowy (Pol.); Sabugueiro (Lus.); Busina (R.); Flaeder (Suec.); Bodza (Hu.).

At. Bor†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†.

AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD.
Du. Ed. Penn. Fer. GalM. GalP. Gen.
HisS. LH. LonN. LPC. Lus. Pol. R.
RC. Suec. Taur. A. Re. Br. C. CG.
Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp.

Ein Strauch Europa's. (Blackw. t. 151.
Fl. Dan. t. 545. Plenck t. 229. Hayne
IV. t. 16. Düss. off. Pfl. V. t. 17. Fl.
méd. VI. 336)

Man wendet die Rinde, die Blätter, die
Blüthen und die Früchte an.

Die mittlere oder innere Rinde der Zweige
(cortex s. alburnum Sambuci), von
welcher man gewöhnlich die dünne und asch-
graue Oberhaut abzieht, ist grün. Sie
hat einen starken und widerlichen Geruch
und einen anfangs süßlichen, hinterher schar-
fen und etwas bitteren Geschmack. — Die
Blätter sind unpaarig gefiedert, dunkel-
grün, glatt, die Blättchen eirundlanzett-
förmig, sägezählig, spitzig. Sie haben ei-
nen unangenehmen Geruch und einen schar-
fen Geschmack. — Die Blüthen (flores
Sambuci) sind weiß, klein und haben ei-
nen starken und unangenehmen Geruch und
einen schleimigen, etwas bitteren Geschmack.
— Die Früchte (baecae Sambuci) sind
saftige, eirunde, schwarze, genabelte, dreis-
saamige Beeren, welche einen röthlichen,
säuerlichen und geruchlosen Saft enthalten.
Man nennt sie nach dem Trocknen werden
grana Actes. — Statt dieser Art ge-
braucht die Americanische Pharmacopoe die
Beeren von Sambucus Canadensis, Willd.
(AD. Gr.)

Bor5†. hat ein Roob Sambuci crudum
s. Succus Sambuci inspissatus crudus.

Pulpa corticis Sambuci nigri (GalP.)
paratur ut succus Rosarum.

Pulvis ad erysipelas. (BorG†.)

R. Florum Sambuci,
Furfuris triticei, sing. part. aeq.
Misce.

Pulvis Florum Sambuci compositus s.
ad erysipelas (HC†.) Florum pulv. un-
cias sex, Boli Armenae praep. tres,
Cretae praep. sesquiunciam, Farinae
Tritici sesquiunciam.

Species sudorificae (ad infusa paranda)
s. diaphoreticae. (Gal. DB. Fi.
Re. T.)

R. Florum Sambuci,
— Boraginis,
— Rhoeados,
Ligni Sassafras, sing. part. aeq.
(Gal. DB. Re.)

R. Foliorum Melissaе,
Flor. sicc. Tiliae, sing. part. tres.
— Sambuc . . . partem unam.
Concisa misce. (Fi. T.)

Succus Sambuci s. Baccarum Sambuci.
(GalP. Sar. DB. T.)

R. Bacc. Sambuci matur. . . q. v.
Contere inter manus, massam tunc
per tres vel quatuor dies fermentatam
cola exprimendo et succum in lagenis
sub olei strato serva.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Succus Ebulis, Baccarum Ebuli (GalP.
Sar. T.)

Ut succum baccarum Sambuci.

Tragea Granorum Actes, Pulvis Sam-
buci. (Wir†. Sp.)

R. Succ. Bacc. Sambuci . . . q. v.
Farinae secalitiae . . . q. s.

In pastam redige et panes parvos ex-
inde forma, qui prope ignem coquan-
tur, donec bene sint siccati; tunc in
pulverem redactos novo succo humecta
et sicca. Quam operationem ter e se-
rie repete. Unciae uni massae pulve-
ratae adde.

Nucis mosch. pulv. . drachmam.
Gegen Ruhr empfohlen. — Gabe, eine
bis zwei Drachmen.

Syrupus Sambuci. (A†.)

R. Succ. Bacc. Sambuci rec. expr.
libram.
Sacchari albi . . . libras duas.
Ebulliant semel.

Roob Sambuci s. sambucinum s. Sam-
buci depuratum, Confectio Sambuci,
Succus Sambuci s. Baccarum inspis-
satus s. inspissatus depuratus, Exira-
ctum Baccarum Sambuci, Succus Bac-
cae Sambuci inspissatus s. depuratus,
Roob Baccarum Sambuci sine Sac-
charo et cum Saccharo. (A†. Ba†.
Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†.
HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†.
Wir†. Wür†. AD. Am. An. B. Bel.
D. Du. Ed. Fer. GalP. Gen. LoP.
LP. Pm. Pol. R. Sar. Taur. Br. C.
DB. Fi. Gr. Sw. T. Vm.)

R. Bacc. Sambuci matur. . . q. v.
Coque in vase stanneo tecto, conti-
nue agitando, per semihoram vel do-
nec dirumpantur; trajice per cribrum
et residuum fortiter exprime; liquores
ambos commisce, mixturae libris quin-
decim adde Sacchari libras quatuor, et
bene despumando ad mellis consist.
usque inspissa. (Bel.)

HC†. Baccas per semihoram vel do-
nec dirumpantur, calefacere, exprime-
re, succum expressum subsidendo etc.
depuratum ad extracti secundi gradus
consistentiam inspissare et unicui-

que librae succi expressi sub fine addere Sacchari pulverati drachmas sex; — B. Succo libras decem, Sacchari quatuor; — An. Succo libras quinque, Sacchari unam; — D. Succo libras quatuor, Sacchari unam; — Ba†. Sax†. Succo sedecim, Sacchari unam; — Fe†. Succo libras quatuor et duas Sacchari; — Hass†. Succo depurati partes octo, Sacchari partem dimidiam; — Bor†. Succo crudo Sacchari albi sedecimam partem addere, qui sit colore nigro, in aqua solutione limpida e nigre cente fusca solubilis, caeterum indolis succi insp. crudi; — LoP. Succo Baccarum octarium, Sacchari communis libras duas, lente evaporent in vase fictili, ut f. confectio.

R. Bacc. Sambuci matur. . . q. v.
Inter manus contritis, succum exprime et per pannum laneum trajice; succi octariis duobus adde Sacchari albi semilibram, tunc ignis vividioris ope ad mellis consist. consume. (Vm.)

Fi. In mortario marmoreo contundere, per d. em unum seponere ad fermentationem usque, exprimere, addere Sacchari pondus duplum, coquere et ad mellis consist. consumere; — Pal†. Sacchari partem unam et duas Succo; — Pal†. AD Am. Ed. et C. quinque Succo; — LP. Succo expressi libras quatuor. Mellis boni unam; — Ful†. Gr. Succo quatuor; — Br†. Hass†. Wir†. Wür†. R. et Sw. Succo sex; — A†. Succo novem; — Bor†. O†. Sax† et Pol. sedecim Succo; — T. Succum e Baccis contritis post duos vel tres dies exprimere, in balneo aquae vel vaporis ad syrupi et adjectis Sacchari unciis tribus pro quaque libra ad mellis consist. inspissare; — Gr. Succo congios sedecim, Sacchari libras octoginta septem.

R. Succo expr. Bacc. Sambuci q. v.
Sepositione depuratum ignis moderati ope sufficienter inspissa. (Li†. Du. GalP. Gen. Sar. Taur. Br. Gr.)

Pm. DB. Succum expressum lento igne despumare, per pannum colare et balnei maris ope ad extracti mollis spissitudinem redigere; — Bor†. HN†. Succum crudum Aqua comm. solvere, post decanthationem colare et primum leni igne, (tunc in balneo vaporis Bor†.) ad syrupi spissioris (mellis HN†.) consist. consumere.

Schweistreibend. — Gabe, eine halbe, anderthalb bis zwei Unzen

Roob s. Pulpa Ebuli. (A†. Ba†. Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Sar. DB. T. Vm.)

R. Bacc. Ebuli rec. . . part. unam
Aqua q. s.

ut empyreuma prohibeatur; coque, donec dirumpantur et exprime succum, qui addendo Sacchari partem sedecimam ad pulpa consist. evaporet. (Ba†.)

A†. Sacchari partem unam et novem ucci; — Vm. Succo decem; — Br†. Ful†. Pa† et Wir†. Succo sex.

R. Succo Baccarum Ebuli . . . q. v.
Cola et in balneo aquae ad electuarii consistentiam inspissa. (Sar.)

DB. T. ut roob Sambuci.

Horntreibend, laxirend. — Gabe, zwei Unzen — Man verschreibt es selten allein und fast immer als Excipient.

Extractum Florum Sambuci. (Sar.)

R. Flor. Sambuci rec. . libras octo.
Macera per tres dies in alembico et destillando in balneo aquae uncias circiter duas abstrahere; residuo aquae tripulum infunde et post horas sex digestionis coquendo ad tertiae partis remanentiam consume; exprime flores, liquorem clarificatum et colatum ad electuarii consist. inspissa et huic non nisi tepido Aquam dest. adde

Mixtura antiasthmatica. (Sm.)

R. Roob Sambuci,
Pulpae Prunorum,
Syrupi Rhoeados, sing. unc. duas,
Nitri drachmam.

Mel Sambuci s. Florum Sambuci.
(Wir†.)

R. Flor. rec. Sambuci . . libram.
Mellis despumati . libras duas.

Aqua Florum Sambuci uncias sex.
Macera per aliquot dies, tunc coque blando igne, cola exprimendo et ad consist. requisitam consume — Eherdem zu erweichenden und zertheilenden Surgetwasser.

Mel Fructuum s. Baccarum Sambuci.
(His§.)

R. Succo Bacc. Sambuci matur.,
Mellis, singulorum . libras duas.

Aqua q. s.
Coque ad syrupi spissi consist. et cola. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Acetum Sambuci s. sambucinum. (Br†. Pal†. Wir†. Wür†. Ams. Gal. GalP. Lus. Sar. Suec. Pid. Sw. T.)

R. Florum Sambuci partem unam.
Aceti partes duodecim.
Macera per dies quatuor, clarifica lacti. ope et filtra. (Suec.)

Gal. Florum partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — GalP. ut acetum Rosarum; — Br†. Pal†. Wir†. et Sw. Aceti sex; —

Sar. et Pid. Aceti quatuor et sex dies macerationis; — Würf. Aceti novem et tres septimanas macerationis; — Ams. Aceti octo et quatuor dies macerationis; — T. Florum uncias sex, Aceti libras sex, digestionem per octo vel decem dies, colare leviter exprimendo, clarificare sepositione vel filtrare et infusionem, si vis, repetere.

R. Flor. Sambuci sicc . . . libram
Aceti communis . . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque et colaturae adde

Alcoholis semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Schweißtreibend, reinigend und austrocknend. — Man wendet es in heißem Zuckersirup an, um Schweiß hervorzuufen. Auch braucht man es in Gurgetwasser, mit Wasser und Honig vermischt, bei Bräune.

Oxymel Sambuci. (Würf. Va.)

R. Aceti Sambuci . . . partem unam.
Mellis albi partes duas.
Coque lente ad consistentiam syrupi.

Decoctum Corticis Sambuci. (B*)

R. Corticis Sambuci manipulos tres.
Aquaе fontanae, . . . libram.
Lactis, singulorum . . . libram.
Decoque ad libras unius colaturae remanentiam. — Von Boerhaave bei Wasserfucht empfohlen. — Gabe, eine Hälfte des Morgens, die andere des Abends.

Infusio s. Infusum s. Tisana Florum Sambuci nigrae. (Hamf. Huf. An. DD. Gal. GalM. RC. DB. Ra. Va.)

R. Florum Sambuci . . . drachmam.
Aquaе bullientis . . . libram.
Digere per horae quadrantem et cola exprimendo. (Huf. DD. Ra.)

Hamf. et GalM. Florum unciam et Aquaе bull. q. s. ad colaturam unciam octo; — An. RC. Florum unciam, Aquaе libram et digestionem per horam calore gradatim ad bullitionem usque aucto; — Va. Florum drachmam ad duas, Aquaе bull. libras duas; — Va. Höt D. Char. Florum drachm. duas; — GalP. Flor. Sambuci drachmam, Aquaе libras duas, digerere per semihoram; — DB. Sambuci semunciam, Aquaе libram, digerere per horam.

R. Florum Sambuci drachmas duas.
Aquaе bullientis . . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et colaturae adde

Syrupi Capilli Veneris . . . unciam.
Misce bene. (Gal.)

Schweißtreibend, bei rheumatischen Affectionen und hitzigen Exanthemen empfo-

len. — Man wendet den Aufguss heiß und reichlich an, nachdem man ihn mit Honig, Sauerhonig oder Weinsyrup vermischt hat.

Aqua sulphurea composita. (Ca.)

R. Infusi Florum Sambuci,
Aquaе Belliluc., sing. . . libram.

In vier und zwanzig Stunden zu trinken, bei chronischen Catarrhen, Drüsenverstopfung, Scropheln und Flechten.

Gargarisma detergens s. detersivum.
(Ful. Sa.)

R. Florum Sambuci . . . unciam.
Aquaе bullientis . . . libram.

Infunde, cola et adde

Nitri semunciam.
Essent. Pimpinellae drachmas tres.

Oxymellis simplicis uncias duas.

Misce bene. (Ful.)

R. Flor. Sambuci,

— Verbasci, sing. manipulum.

Aquaе bullientis q. s.

ad colaturam libras dimidia, cui adde

Nitri semidrachmam.

Salis polychresti . . . drachmam.

Roob Sambuci,

Syrupi Mororum, sing. unciam.

Misce bene. (Sa.)

Fomentatio cum Sambuco. (GalP.)

R. Flores Sambuci

drachmas duas c. dimidia,

Aquaе bullientis libras duas (litre).

Infunde per horam et filtra.

Fomentatio s. Fomentum s. Fetus resolvers.
(Fi. Ra. Sp. Va.)

R. Infus. Flor. Sambuci . . . libram.

Aquaе Vitae camphor. uncias octo.

Misce bene. (Ra.)

Va. Alcoholis camph. uncias quatuor.

R. Flor. Sambuci . . . manipulum.

Aquaе uncias sedecim.

Infunde per horas 12 et adde colaturae

Aquaе Vitae camph. . . unciam.

Acetatis Plumbi . . . drachmam.

Misce. (Sp.)

R. Flor. Meliloti,

— Sambuci, sing. drach. duas.

Fol. Menthae,

— Salviae, sing. . . drachmam.

Aquaе bullientis . . . libras duas.

Colaturae adde

Aquaе Vitae uncias tres.

Misce. (Ra. Va. Hosp. de la Materu.)

R. Infusi Florum Sambuci,

Aceti Vini albi, sing. sesquibram.

Animonii muriat. pulv.

drach. duas.

Misce. (Fi.)

Fomentum siccum. (Fl.)

℞. Flor. Sambuci pulveratorum,
Chamomillae, sing. unciam.
Farinae secalitiae . . . libram.
Misce.

Oleum Sambuci. (GalP. His. His3. Sar. Gr. Re.)

℞. Flor. Sambuci part. unam cum dimid.

Olei Olivarum . . . partes tres.
Post duos dies digestionis in balneo aquae, refrigerata exprime et operationem cum novis Floribus repete. (Sar.)
His. Florum partem unam et tres Olei; — His3. Florum libras tres, Olei octo; — Gr. Re. Florum partem unam et Olei duas coquere, donec criski fiant, exprimere et sepositione clarificare; — GalP. ut oleum Chamomillae.

Oleum Sambuci viride (Gr.): Foliorum Sambuci recent. libram, Ol. Olivarum octarios duos coque, donec crispia fiant, oleum exprime et de novo igni appone, donec pulchrum colorem viridem adeptum sit.

Oleum Sambuci (aethereum) (LPC.)

Paratur ut oleum Rorismarini.

Unguentum Sambuci s. Sambuci Florum s. sambucinum. (AD. Du. His. His3. Lon. (1836.) C. CG. Gr. Re Sp. T.)

℞. Flor. rec. Sambuci . partes tres.
Axungiae Porci . partes quatuor.
Sebi vervecini . . partes duas.
Coque flores cum axungia, exprime et adde sebum (Du. Gr.)

Gr. praeterea: Florum libras viginti octo, Axung. Porci octoginta quatuor, Sevi viginti octo; — Lon. (1836.) C. CG. Gr. Re. coquere Florum et Axungiae part. aeq.; — His. Florum partes quatuor, Sebi tres et Olei Olivarum unam.

℞. Sebi vervecini . . partes tres.
Olei Olivarum . . partem unam.
Liqua simul et in mixtura digere
Florum Sambuci partes quatuor.
Post aliquot tempus cola. (Sp.)
T. Sebi uncias sex, Olei octodecim, Florum pondus aequale, octo dierum digestionem, evaporationem humidi in balneo aquae etc.

℞. Cort. Sambuci libr. duas c. dimid.
Foliorum Sambuci . semilibram.
Axungiae Porci . libras novem.
Post dies septem macerationis coque ad humidi consumpt. usque. (His3.)

℞. Unguenti Sambuci comm. libram.
Cerae albae . . . unciam.
Olei Lavandulae drachmas duas.

Aqua Sambuci s. Florum s. ex Floribus Sambuci. (A+. Bat. Bor5+. Br+. Ful+. Han+. HosP+. HC+. HN+. Li+. O+. Pal+. Sax2+. Wir+. Wür+. Ams. B. Bel. D. Fer. Gal. GalP. His3. LP. LPC. Pm. Pol. R. Sar. Succ. Taur. Br. DE. Fi. Gr. Pid. T.)

℞. Florum Sambuci . partes tres.
Aqua . . . q. s.

Destillant partes sex. (Succ.)

HassP+. destillant partes viginti quatuor; — A+. Florum partes sex et Aquae q. s.; destillant partes octo; — GalP. ut aquam florum Tiliae; — Gal Pm. Sar. Taur. et T. Florum partem unam et quatuor Aquae; destillant partes duas (ut aq. flor. Aur. Taur.); — Bat. Aquae sedecim; destillant partes quatuor; — Pal+. Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Han+. O+. Ams. B. Bel. D. Pol. Aquae q. s.; destillant partes decem; — HassP+. Sax+. et Pid. Aquae octo; destillant partes quatuor; — Wür+. et Br. Aquae sex; — Bor5+. HC+. HN+. Sax2+. Aquae quindecim; destillant partes decem; — Fer. Florum partes tres et Aquae sex; destillant partes sex; — LP. Florum partes quatuor, Aquae quindecim, destillant octo; — DE. Florum libras sex, Aquae libras octodecim, destillant libras duodecim; — Fi. Florum libras tres, Aquae libras quindecim; destillant libras sex; — Gr. e Floribus recentibus e salitis (libras quinquaginta, Aquae q. s., abstrahantur congii viginti).

℞. Florum Sambuci . partes tres.

Aqua . . . partes duodecim.
Flores in saccum include medio cucurbitae ita suspensum, ut aquam non attingat; destillant partes sex. (Ful+. Li+.)

℞. Flor. rec. Sambuci part. sedecim.
Aqua . . . partes quadraginta.

Macera per dies duos et fermentatione incipiente destillant partes viginti. Productio adde

Alcoholis . . . unciam.
Misce bene. (His3.)

LPC. ut aquam Rosarum.

℞. Bacc. Sambuci contus. . . q. v.

In dolio fermentent, donec odorem vinosum emittant; destillant deinde lentius igne et productum si requiritur rectificetur. (Br+. Wir+.)

Vinum Baccarum Sambuci. Elderberry vine (Re.): Baccarum part. unam, Aquae duas, coque per ½ hor., liquorem defunde, baccas per crinium exprime, Succ. mensurae (quart) cuique adde Sacch. Lisboens. librae partes

tres, coque per horae quadrantem, addendo Pip. Jamaicens., Zingib. et Caryophyll. aliquantulum, fermentationi subijce et hac peracta congiis octenis adde Aquae Vitae librae quadrantem etc.

Aqua Ebuli. (Wirt.)

R. Bacc. Ebuli contus. . . q. v.
In delium immitte, fermentationi subijce et simulac odorem vinosum adeptae sunt. blando igne destillent; productum, si requiritur, rectificetur.

Julapium sambucinum. (Wirt.)

R. Aquae Sambuci . . . uncias viginti.
Sacchari albi libr. duas c. dimid.
Ebulliant semel et colentur.

Spiritus Sambuci (Br. Pa. t. Wirt.)

R. Florum Sambuci . . . partem unam.
Aquae Vitae . . . partes quatuor.

Post tres dies macerationis destillet dimidia pars.

Sandaraca.

Gummi s. Resina Juniperi, Vernix sicca; Σανδαράκη; Sandarach, Sandarach, Wachholderharz; Sandaracque, Gomme de genévrier (Gal.); Gum juniper (Ang.); Resina de enebro, Grasilla, Sandaraca (His.); Geneverharb (Bel.).

Bojst. Br. Fulst. Hamst. Hanst. HCst. HNst. Ost. Saxst. Wirt. Würst. Mst. Ams. B. Bel. D. Fer. GalP. Hst. S. Taur. Be. Br. G. Gr. Pid. Re. Sp. T. Z.

Ein Harz in kleinen trocknen Tropfen oder in durchsichtigen Stücken von hell- oder citronengelber Farbe, welche mit der Zeit roth werden. Der Bruch ist glänzend und glatt; Geruch und Geschmack sind dem des gemeinen Harzes ähnlich. Das Pulver ist weiß.

Nach Broussonet's Vermuthung fließt es aus Thuja articulata, Desf., einem Baume (Monoecia Monadelphica, L.; Coniferae, J.) der Berberei (Vahl Symh. 2. p. 96. t. 18. Düss. off. Pl. V. t. 4. Desf. Fl. Atlant. II. t. 252) Gr. führt auch T. quadrivalvis an. Lange Zeit leitete man es von Juniperus communis, L., J. lycia, L.; oder J. oxycedrus her, von denen ersterer bisweilen zwischen Holz und Rinde ein sehr verschiedenes, grünliches Harz, welches Deutscher Sandarach (Sandaraca Germanica); Sandaracque d'Allemagne (Gal.) genannt wird, zeigt.

Reizend.

Sanguinaria.

Sanguinaria Canadensis, L.; Canadisches Blutkraut; Sanguinaire du Canada (Gal.); Bloodroot Puccoon, Indian paint Turmeric (Ang.).

AD. Am. C. Gr. Re.

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Nordamerikanische Pflanze. (Big. Med. Bot. t. 7. Düss. off. Pl. XVI. t. 24.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel ist dick und überall mit vielen Fasern besetzt. Sie liefert einen blutrothen Saft. Ihr Geschmack ist scharf und etwas bitter.

Brechenregend. — Gabe des Pulvers, acht bis zwanzig Gran. — Nach Smith ist ihre Wirkung der des rothen Fingerhuts ähnlich, und sie vermindert ebenso die Schnelligkeit des Pulses. — Der Americaner Dana hat ein eigenthümliches Alkaloid, Sanguinarin (Sanguinarina, DB.), welchem es seine Wirkung verdankt, darin entdeckt.

Die Saamen haben in der Wirkung, nach Barton, Ähnlichkeit mit denen des Stiefapfels.

Infusum Sanguinariae Canadensis. (B*)

R. Rad. Sanguinar. Canad. . . drachmam.

Aquae bullientis . . . uncias quatuor.
Infunde et cola. — Brechenregend, von Tully empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt.

Tinctura Sanguinariae Canadensis.

(AD. Am. B*. C. Re.)

R. Rad. Sanguinar. Canad. unc. duas.

Alcoholis tenuis . . . octarum.
Post sex (decem vel quatuordecim AD.) dies digestionis filtra.

Zu Anfang der Lungenschwinducht, bei Brustwassersucht, beginnendem Groug etc. empfohlen. — Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen und mehr, nach und nach gestiegen.

Sanguis Draconis.

Draconis Sanguis, Gummi s. Resina Sanguinis Draconis; Drachenblut; Sangdracoon (Gal.); Dragon's blood (Ang.); Damulakhwain, Idaramie (Ar.); Damulakhwain (Duk.); Drakowa krew (B.); Drageblod (D.); Sangre de dragon (His.); Heraduky (Hin.); Draakenbloed (Bel.); Sanguis di dragone (I.);

Sanguis de drago (Lus.); Jaranang (Pelembang); Khunisyawashan (Pe.); Pra Smocz krew (Pol.); Catukamrigarakta (Sa.); Drakblod (Suec.); Kandamurgarittum (Tam.); Ctgamurgum nituru (Tel.).

Bat. Borst. Brt. Ful. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Ot. Sax2t. Wirt. Wirt. Mt. Ams. An. B. Bel. D. Fer. GalP. His3. Pol. Suec. Taur. A. Re. Br. C. Fl. G. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. T. Z.

Eine dunkel blutrothe, geruch- und geschmacklose, harte, zerreibliche, trockne, am Feuer schmelz- und entzündbare Substanz, welche mit einem balsamischen Geruche brennt. Man unterscheidet mehrere Sorten:

1) *Sanguis Draconis in granis* (en grains (Gal.), in kleinen gesonderten durchsichtigen Tropfen.

2) *Sanguis Draconis in lacrymis* (en larmes), in eiförmigen, haselnußgroßen, perlenschnurformig aneinandergereihten Stücken.

3) *Sanguis Draconis in placentis* (en pains), in platten, einen Zoll dicken und einige Unzen schweren Massen oder Kuchen.

4) *Sanguis Draconis in tabulis* (en tables), in drei oder vier Zoll langen und sechs bis acht breiten und über einen Zoll dicken Platten.

5) *Sanguis Draconis in canis*, *Pterocarpus Draconis Resina* (Gr.), in kleinen, in Blätter gewickelten Massen.

Dieser Stoff wird aus den Früchten von *Ca'amus Rotang*, L., *petracus*, Lour. et var. *rudentum*, L., *verus*, Lour. (C. Draco, Willd.) (Hexandria Monogynia, L.; Palmae, J.), einem kleinen Baume Ostindien's (Rheede Mal. t. 64. Düss. off. Pfl. XVII. t. 3 4. Berl. Bild. III. 76. fig. 2), und aus dem Stamme von *Pterocarpus Draco*, L. (Diadelphia Decandria, L.; Leguminales, J., einem Baume Südamerika's (Hayne IX. t. 9.); von *P. Indicus*, einem Baume Indien's; von *Pterocarpus santalinus*, L., einem Baume Ostindien's, von *Dracaena Draco*, L. (Hexandria Monogynia, L.; Asparagaceae, J.), auf den Canarischen Inseln (Blackw. Herb. t. 358. Düss. off. Pfl. XVII. t. 1. 2. Berl. Bild. II. 8. fig. 1.); von *Dalbergia monetaria* (Diadelphia Decandria, L.; Leguminales, J.), einem Baume Surinam's und verschiedenen Arten *Croton* gewonnen.

Melandri (f. Hayne getr. Darst. d. Pfl.) fand darin ein eigenes Alkaloid, *Draconin* (*Draconinum*), welches im *S. Draconis* in guttis *lacrymis* nur in geringer Menge enthalten ist, dahingegen das *S. Draconis* in *placentis* fast ganz daraus besteht.

Ein schwaches Adstringens. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zu einer halben Drachme.

Pulvis al haemoptysin. (Sm.)

R. *Sanguinis Draconis* drachmas duas. *Magnesiae subcarb.* drach. quatuor. Divide in partes duodecim. — Alle zwei oder drei Stunden ein Stück mit etwas Wasser.

Pulvis adstringens s. contra casum. (Pal. Sar. Taur. Sp.)

R. *Terrae sigillatae*, *Sanguinis Draconis*, *Mumiae Aegypt.*, sing. semunciam. *Cetacei* drachmas duas. *Rhei* drachmam. Fiat pulvis. (Sp.)

Pal. Trium priorum dictarum substantiarum, sing. drachmas duas et reliquiarum ambarum drachmam.

R. *Eccarum Myrti*, *Balaustiorum*, *Boli Armenae*, *Mastichis*, *Olibani*, *Sanguinis Draconis*, sing. part. aeq. Fiat pulvis. (Sar. Taur.)

Ehedem nach Stürzen empfohlen. — Gabe, zwei Scrupel.

Pulvis dentifricius. (Taur.)

R. *Os Sepiae* uncias sex. *Coralliorum rubr.* praep. uncias duas.

Iridis florent., *Sanguinis Draconis*, *Sin'ali rubri*, sing. sesquiunciam. *Cinnamomi opt.*, *Aluminis crudi*, sing. semunciam. Fiat pulvis subtilissimus.

Tinctura Sanguinis Draconis. (Sar.)

R. *Sanguinis Draconis* pulv. unc. duas. *Alcoholis* libram. Post tres dies digestionis in balneo arenae tepido filtra. Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep s. Julapium adstringens. (Pic.)

R. *Aquae Plantaginis*, — *Rosar. rubr.*, sing. unc. tres. *Corallii rubri*, *Sang. Draconis*, sing. semidrach. *Syrupi Rosarum rubrum*, — *Cydonior.*, sing. drach. sex. *Succi Plantaginis* uncias duas.

Sanguis Draconis factitiuus. (Gr.)

R. *Resinae flavae* libras quatuor. *Olei Olivarum* uncias octo.

Liquatis adde
Boli Venetae,
Santali rubri, sing. . . libram.
Godhold's vegetable Balsam. (Re.)
Essentiae vegetabilium 42 variorum se-
paratim in syrupis servandae et tunc
cum G. Dracon., G. Guaj., G. Arab.
et G. Canad. in Aceti dest. duplo so-
luti, Styracis in Spir. Vin. soluti certa
quantitate et Oleo Cinnamomi com-
mixtae per triennium seponendae, et
tunc primum adhibendae. — Gegen
Schwindsucht und asthmatische Beschwerden.

Sanicula.

Sanicula Europaea, L.; Sanickel; Sa-
nicule d'Europe (Gal.); Sanicle (Ang.);
Sanikel (Bel. D. Suec.); *Sanicula* (His.
Lus.); *Sanicola* (L.); *Zakkiel* (Pol.).
Br. Wir. M. Fer. Gal. P. His. S.
Taur. Be. Br. G. Gr. Re. Sp.
4 (Pentandria Digynia, L.; Umbel-
liferae, J.) Eine Europäische Pflanze.
(Zorn Ic. pl. t. 109.)

Man wendet das Kraut (herba *Saniculae* s. *Diapensiae*) an; es besteht aus
einfachen, langgestielten, runden, fünf-
flappigen, sägezahnigen, glänzenden Wurzelblät-
tern, dünnen Stängeln und sitzenden drei-
spaltigen Stängelblättern. Es hat keinen
Geruch und einen bitteren, etwas abstringi-
renden und salzigen Geschmack.

Es kommt mit zu manchen Brustspecies.

Santalum.

Man kennt drei Hölzer dieses
Namens.

1) *Lignum Santalum rubrum* s. *San-
tali rubri* s. *Pterocarpus*; rothes Sandel-
holz, Kollaturholz; *Santal rouge* (Gal.);
Red Saunders (Ang.); *Sundal almeer*,
Undum (Ar.); *Czerweny santal*, *Czer-
wene santalowe drewo* (B.); *Rackta*
chandana (Beng.); *Honnay* (Com.);
Ruct handun (Cy.); *Lal chudend* (Duk.);
Sandalo rubro (His.); *Ruckut chun-
dun*, *Undum* (Hin.); *Root zandelhout*
(Bel.); *Sandalo rubio* (L.); *Sundul*
surkh, *Buckum* (Pe.); *Kuchandana*, *Ti-
laparni*, *Runjana*, *Ruckta chandana* (Sa.);
Segapu chandanium (Tam.); *Kuchan-
danium* (Tel.).

Br. Wir. M. Fer. Gal. P. His. S.
Taur. Be. Br. G. Gr. Re. Sp. Z.
Lon. Lon. N. LPC. Suec. Taur. A. Be.
Br. C. CG. F. G. Gr. Re. Sp. Z.

Dieses Holz kommt in mehr oder weni-
ger dicken, der Länge nach geschnittenen,
schön rothen, gefurchten Stücken ohne Rinde
oder in Kaspelpähnen vor (scop., rasu-

ra *Ligni Santali rubri*, *Lignum San-
tali rubrum raspatum*), zwischen deren
Furchen ein harziger verhärteter Saft liegt.
Es hat einen sehr merklich gewürzhaften
Geruch und einen etwas harzigen Ge-
schmack.

Es kommt von *Pterocarpus santali-
nus*, L. (*Diadelphia Hexandria*, L.;
Leguminosae, J.), einem Baume Ostin-
dien's.

Pelletier hat darin einen eigenthüm-
lichen färbenden Stoff, das *Santalin*
(*Santalina*, *Santalinum*), *Santaline*, ent-
deckt.

2) *Lignum Santali albi*; weißes San-
delholz; *Santal blanc* (Gal.); *Ayasru*
(Amb.); *White Saunders* (Ang.); *Sun-
del abiez* (Ar.); *Chandana* (Beng.);
Tannuh (Cy.); *Srigunda* (Can.); *Cay-
huyndhan* (Co.); *Sandun* (Cy.); *Sundel*
(Duk.); *Chunden*, *Chandana*, *Katchan-
dan* (Hin.); *Sandalo bianco* (L.); *Tsjen-
dana* (Mal.); *Sundul sufleid* (Pe.);
Chandana, *Malagnja* (Suec.); *Chanda-
num*, *Chandanacittay* (Tam.); *Chan-
danum* (Tel.); *Aikamenil* (Timor.).

Br. Wir. Wür. M. B. Fer. Gal.
His. S. Taur. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr.
Re. Sp.

In der Länge nach geschnittenen, sehr
schweren, mit einer schwärzlichgrauen, et-
was unebenen Rinde bedeckten Stücken von
gelblichweißer Farbe, schwach aromatischem
Geruch und fast gar keinem Geschmack.

3) *Lignum Santali citrini* s. *pallidi*;
gelbes Sandelholz; *Santal citrin* (Gal.);
Yellow Saunders (Ang.); *Zlutý santal*,
Zlute santalowe drewo (B.); *Sandalo*
citrino (L.).

Br. Wir. An. B. Gal. His. S. Taur.
Fi. G. Gr. Z.

Dieses Holz hat eine gelbliche Farbe und
ein feineres Korn als das vorige; es ist
brüchiger, leichter und gewöhnlich ohne Rin-
de. Es hat einen sehr deutlich gewürzhaf-
ten Geruch und fast keinen Geschmack.

Das weiße und gelbe Sandelholz kom-
men von *Santalum album*, L. (*Tetran-
dria Monogynia*, L.; *Onagrarieae*, J.),
einem Baume Ostindien's. (Rumph. Amb.
II. p. 42. t. 11. Diss. off. Pl. XIV.
t. 1. Plenck t. 101. Lamk. Ill. t. 74.).
Sirium myrtifolium? — Hermann
betrachtet das weiße als den Splint, das
gelbe als den Kern des Holzes; nach Mé-
rat ist ersteres das junge, letzteres das
alte Holz.

Das gelbe Sandelholz ist reizend, schweiß-
treibend; das rothe schwach abstringirend.

Decoetum Ligni Santali citrini. (B*.)

R. Rasur. Lig. Santali citr.
semunciam.

Aquae fontanae . . . libras duas.
Coquendo dimidium consume. Glas-
weise.

Oleum Santali citrini vel albi aethe-
reum, Aethereoleum Santali citrini vel
albi. (Wirt. Gr. T.)

R. Rasur. Lig. Santali albi . . q. v.
Aquae . . . partes quatuor.
Macerentur, destillet dimidium et co-
hobetur etc. (T.)

R. Ras. Lig. Santali citrini libr. sex.
Aquae purae . . libras triginta sex.
Salis culinaris . . . libram.
Macerata per quatuor vel quinque dies
et destillando obtentum oleum quod
in fundum descendit, collige.

Aqua Santali citrini (Gr.) statt Rosen-
wasser verkauft.

Unguentum santalinum, Emplastrum
santalinum s. incognitum. (Br. Saxt.
Wirt. Sar.)

R. Olei Myrti . . . libras tres.
Cerae albae . . . uncias novem.
Petal. sic. Rosarum rubr.,
Lig. Santali rubri, sing.

uncias quatuor.
Camphorae . . . semunciam.

Cerae in oleo liquatae pulverem ro-
sarum, tunc Santalum et denique cam-
phoram in olei pauxillo solutam adde.

R. Santali albi,
— citrini,
rubri, sing. drachmas sex.
Flor. rec. Rhoeados sesquiunciam.

— — Rosarum
unc. duas c. dimidia.

Olei rosati . . . libram.
Vinii albi . . . uncias quatuor.

Post duos dies macerationis coque
lente ad humidi consumptionem usque,
cola exprimendo et adde

Boli Armenae,
Cerae albae, sing. . . uncias tres

Camphorae . . . drachmas duas.
Misce. (Wirt.)

R. Pulveris Santali rubri partes sex.
— Croci . . partem unam.

Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis crudi, sing. . . part. 12.

Liqua et massae semirefrig. adde
Resinae Pini,

Cerae flavae, sing. part. sedecim.
Misce bene. (Saxt.)

R. Cerae,
Resinae Pini, sing. unc. quatuor.

Liqua et adde
Ligni Santali rubri sesquiunciam.

Croci . . . drachmas duas.
Olibani,

Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis, sing. sesquidrachmam.
Misce (Br. Wirt.)

Species diarion Santalon. (Pal. Wirt.)

R. Santali albi,
— citrini,

— rubri, sing.
drach. duas et scrup. duos.

Flor. Rosarum unc. tres et drach-
mas tres.

— Violarum . . semunciam.

Rhei,
Seminum Portulaccae,

Eboris ad alborem usti,
Succi Liquirit., sing. drach. duas.

Amyli,
G. Arabici,

— Tragacanth., sing.
scrup. quatuor.

Addi potest

Camphorae . . . scrupulus.

Die Alten verordneten diese Species zur
Verbesserung der unregelmäßigen Hitze der
Leber bei schleichenden Fiebern, Gelbsucht
und Wassersucht. — Gabe, eine halbe bis
ganze Drachme.

Santolina.

Santolina Chamaecyparissus, L.; Gar-
tencypresse, Cypressenstrauch; Santoline à
feuilles de cyprès, Aurone femelle,
Garde-robe (Gal.); Sweet scented la-
vender cotton (Ang.); Santolina (His.
I. Lus.); Cypresskruid (Bel.).

Wirt. M. Fer. Gal. Taur. Be. Br.
Gr. Re. Sp.

† (Syngenesia Polygamia Aequalis.
L.; Synanthereae, Cass.) Eine auf den
Gebirgen des südlichen Europa's wachsende
Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 245.)

Man wendet das Kraut (herba Santo-
linae s. Chamaecyparissi s. Abrotani
foeminei s. montani) an; es besteht aus
grauen, vierzähligen, gezähnten, stumpfen,
immergrünen Blättern und hat einen durch-
bringenden, angenehmen Geruch und einen
gewürzhaften und bitteren Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, wurmwidrig.

Saponaria.

Saponaria officinalis, L.; Seifenkraut,
Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichel-
wurz; Saponaire (Gal.); Soapwort
(Ang.); Mydlj koren (B.); Saeburt
(D.); Jahouera (His.); Zeepkruid (Bel.);
Saponaria, Saponella (I.); Mydelnik

(Pol.); Saboaira, Saponaria (Lus.); Saepaert (Succ.); Szappan (Hu.).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Würt. WW†. A†. Ams. An. B. Be. D. Fenn. Fer. GalP. Gen. LP. Lus. Vol. R. RC. Sacc. Taur. Be. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. Va. Z.

4 (Hexandria Digynia, L.: Caryophylleae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 113. Schk. t. 121. Plenk t. 346. Hayne II. t. 2 Düss. off. Ph. IV. t. 5. Bert. Bild. VI. 95. fig. 2 Fl. méd. VI. 311)

Die Wurzel (radix Saponariae s. Saponariae rubrae) ist dünn, hart, sehr lang, von der Dicke einer Schreibfeder, knotig, außen rötlichbraun, inwendig weiß, runzlich und fast geruchlos. Der Geschmack ist anfangs süßlich und schleimig, wird aber bald bitter, herb und etwas scharf. — Das Kraut (herba Saponariae) besteht aus einem glatten, hohlen, walzenförmigen, gegliederten, wenig ästigen Stängel mit unbehaarten, sehr glatten, dunkelgrünen, fast sitzenden, eiförmig-lanzettförmigen, ganzen und ganzrandigen, dreispitzigen, am Grunde verschmälerten, kaum spitzigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas seifenartigen, schleimigen, schwach bitteren Geschmack.

Das Seifenkraut enthält Harz, Schleimharz und einen eigenen schleimigen Stoff, von Bucholz; Seifenstoff (Saponinum D.) genannt.

Leitisch, schweißtreibend, besonders bei Haut- und venerischen Krankheiten angewendet.

Von Saponaria vaccaria, Vaccaria (Gr.) sind die Samen ethigend und urintreibend.

Succus Saponariae. (Hass†.)

R. Herb. vel Rad. rec. Saponariae

q. v.

Contunde in mortario lapideo exprime s. dulo, succum sepono ac filtra. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Extractum Saponariae. (A†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. An. GalP. Gen. LH. LP. Br. DB. Sw. T. Vm.)

R. Herbae Saponariae libras decem.

Contunde in mortario ferreo, addendo Aquae libras sex, exprime succum, qui semel ebulliat, et tunc leni calore ad syrupi spissi consist. evaporet. (Sw.)

R. Fol. rec. Saponariae . . . q. v.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; sepono, decantha, tunc prope ignem coagulent et denuo colentur; deinde ad massae pilularis con-

sist. evaporata ab igne remove, admisce faeculam sepositam et denuo ad justam spissitudinem redige. (Vm.)

R. Rad. rec Saponariae . . . q. v. Macera per horas aliquot in Aqua, adde majorem Aquae copiam et postquam aliquoties liquor ebulliverit, Albumine clarificatum ad extracti usque consist. consume. (Vm.)

R. Herbae Saponariae partem unam. Aquae communis . . . partes octo.

Infunde per horas 24, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores ambo, post horas 24 sepositionis ad aptam consist. evaporent. (Sax†.)

R. Foliorum recentium Saponariae, Aquae frigidae, sing. part. unam.

Macera per horas 12, tunc adde

Aquae bullientis duplum pondus totius massae. Postquam refrigerint, sepono, Albumine clarifica, igni impone et liquorem spissescere coeptum per pannum trajice et continue agitando, sufficienter consume. (Vm.)

R. Fol. rec Saponariae . 1 lb. duas.

Aquae communis . . . libras decem.

Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepono et decantha liquorem, qui ad consist. requisitam evaporat. (An. Gen.)

Li†. coquere Radicis libras duas in Aquae octo ad quatuor remanentiam et decoctum evaporare.

R. Radicis Saponariae partem unam.

Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; res duum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, quo facto liquores ambo commixti et post sufficientem sepositionem decanthati, ad extracti consistent. evaporent. (Han†. HN†.)

A†. Radicem pluribus coctionibus succedentibus penitus extrahere et liquores commixtos post decanthationem in balneo aquae consumere; — Br. Radicem coquere per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos inspissare; — HassP†. ut extractum ligni Campechiensis; — HC†. Sax2†. LH. ut extractum Absinthii; — LP. ut extractum Rhei; — T. ut extractum Cichorii; — GalP. ut extractum Liquiritiae; — DB. ut extr. Juniperi.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Decoctum Saponariae officinalis. (HN†. B*. Sw. Sy.)

R. Radicis Saponariae uncias duas. Aquae fontanae . . . libras quatuor.

Decoque ad dimidii remar. (HN† B*.)

R. Herbae Saponariae semilibram.
Aquaе libras octo.

Decoque ad dimid. remanent. (Sw. Sy.)

Bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Pfund täglich.

Tisana Saponariae. (GalP.)

Paratur ut tisana Patientiae.

Species resolventes. (Ful†. Sar. Pid.)

R. Rad. Taraxaci,
— Saponariae, sing. unc. duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii, sing. . . unciam.
Flor. Tanacetii,
— Chamomillae, sing.
sesquiunciam

Concisa misce. (Ful†. Pid.)

R. Rad. Taraxaci,
— Saponariae,
— Valerianae min., sing.
part. duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii albi, sing.
partem unam.
Flor. Chamomill. Rom.
part. dimid

— — vulg. . . part. duas.
Seminum Lini . . partes quatuor.
Zum Klystir bei Störungen in den Unterleibeingeweiden.

Species Guajacinae compositae s. Lignorum. (RC.), vgl. Guajacum: Rasurae Ligni Guajaci partes tres, Radicis Bardanae, Caricis, Saponariae, sing. partes duas, Stipit. Dulcamarae partem unam; — Decoctum: Specierum uncias tres, Aquaе bull. libras tres, decoque ad duas, sub finem addendo Radicis Liquiritiae drachmas tres; — Decoctum Specierum cum Mezereio: singulis decocti libris Mezerei drachma addatur vel: Decocti Specierum et Decocti Mezerei, sing. part. aeq.

Sarcocolla.

Gummi Sarcocollae; Sarcocolla, Fischleimgummi: Sarcocolle (Gal.); Unzerat (Ar.); Sarcocolla (His); Kunjudeh (Pe.).

Br†. Wir†. Wür†. M†. Ams. Per. Gal. His3. Taur. A. Be. G. Gr. Re. Sp. T. Z.

In kleinen, unregelmäßigen, eckigen, zerreiblichen Körnern von verschiedener Farbe, vom Bläugelb bis zum dunkeln Granatroth und ganz- oder halbdurchsichtig und un-

durchsichtig, geruchlos und einen scharfen und brennenden Geschmack besitzend.

Es fließt aus allen Theilen und besonders aus den Rinde von Penaea Sarcocolla, L., (Petrandria Monogynia, L.; Acanthaceae, J.), einem Strauche Persiens und Arabiens. (Enc. méd. t. 78. fig. 2.)

Diese Substanz enthält, nach Pelletier, sehr wenig Schleimharz und Gallertstoff mit einer eigenthümlichen Substanz, dem Sarcocollin (Sarcocollinum), Sarcocolline.

Tinctura Sarcocollae. (Sar.)

R. Sarcocollae uncias duas.
Alcoholis libram.
Post tres dies digestionis super arena tepida filtra.

Sarsaparilla.

Radix Sarsaparillae, Salsaparilla, Sarsa, Zarsa, Zarsaparilla; Cassaparille, Sarsaparille; Salsepareille (Gal.); Sarsaparilla (Ang.); Sarsaparylle (B.); Sarsaparil (D.); Zarzaparilla (His); Sarzaparilla (Bel.); Salsapariglia (I.); Sasaparyle (Pol.); Salsaparilha (Lus.); Sassaparill (Suec.).

Bat. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. M†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Va. Z.

So nennt man die Wurzel der Smilax Salsaparilla, L., Smilax officinalis, ♀ (Dioecia Hexandria, L.; Asparagineae, J.), einer Pflanze Persiens und Brasiliens. (Plenck t. 712. Blackw. t. 393. Bert. Jahrb. XII. Bert. Bild. IV. 53. fig. 2. Fl. méd. VI. 303.) (Nach Willdenow, Berl. Jahrb. 1806, werden die Wurzeln von dieser Art fast gar nicht gebraucht, sondern vielmehr die von Smilax syphilitica, Humboldt.) Auch Smilax aspera (Taur.) liefert eine statt der wahren Cassaparille angewendete Wurzel. Sm. coriata-ovata Sax2† Sm. medica Schl. (Düss. off. Ph. Suppl. V. t. 1.)

Es kommen davon vier Hauptsorten im Handel vor:

1) Cassaparille aus Brasilien oder Portugiesische (Radix Sarsaparillae Lisbonensis s. Brasiliensis); in sechs bis acht Fuß langen, etwa zwei Fuß im Umfang haltenden Bündeln, die aus durcheinandergelochtenen, schreibfederdicken, biegsamen, der Länge nach geriefen Wur-

zeln bestehen, welche eine dünne Rinde, aber keinen Ausläufer und keine Behaarung haben. Sie ist außen röthlich oder schwärzlichbraun, innen weiß und mehlig. Der Geruch geht ihr ganz ab, der Geschmack ist etwas bitter. Diese ist am meisten geschätzt. Sie kommt aus Peru und Maranhão.

2) Sarsaparilla von Honduras (Rad. S. dicta Honduras). Die Rinde ist schmutziggelblich, bisweilen weißlich. Sie hat noch ihre Ausläufer und ist sehr lang und faseriger als die vorige. Innen ist die Rinde rosenröthlich weiß, das darunter liegende Holz ist weiß, von fadem, stärke-mehlartigem Geschmack; die Rinde dagegen schleimig und oft deutlich bitter. Sie kommt aus der Hondurashalbinsel.

3) Sarsaparilla von Veracruz (Rad. S. de Veracrucis); mager, dunkel gefärbt und faserig, schlechter als die vorigen.

4) Rothe oder Jamaika-Sarsaparilla, mit Ausläufern versehen, sechs bis sieben Fuß lang, rund und durch das Trocknen zusammengedrückt, mit einer orangefarbenen, röthlichgrauen oder weißlichen Oberhaut bedeckt; die Rinde ist bisweilen feucht und der zunächst unter ihr liegende markige Theil weiß (mehr oder weniger dunkelroth). Man findet sie in kleiner Menge unter den von Honduras kommenden Bündeln. Sie ist zwar wenig geschätzt, verdient aber den Vorzug vor den beiden ersten, indem sie einen bitterern, stärkeren und gewürzhafteren Geschmack und einen deutlichen, schon durch Reiben bemerkbar werdenden Geruch besitzt.

Diese Wurzel verdankt, nach Palotta, ihre Arzneikräfte einem eigenthümlichen Alkaloid, dem Parillin (Parillina, Parillinum), Parigline (DE.), das jedoch Planché nicht darstellen konnte. Goldi hat aus dem Kern der Sarsaparillawurzel noch ein anderes Alkaloid, das Smilacin (Smilacina, Smilacinum), Smilacine, gezogen.

Sie wird im Allgemeinen als harntreibend und besonders schweißregend betrachtet, obgleich in beiden Beziehungen ihre Wirkung sehr schwach ist; offenbar wirkt sie reizend, eine Eigenschaft, welche das Parillin in einem noch weit höheren Grade besitzt. (Nach Palotta wirkt es zugleich depressirend.) Man wendet sie vorzüglich in venerischen Krankheiten, chronischen Rheumatismen und verschiedenen Hautkrankheiten an. — In Pulver giebt man sie zu einer halben bis ganzen Drachme. Gallapfelauß, Kaltwasser, essigsaures Blei und salpetersaures Quecksilber dürfen weder mit dem Pulver, noch mit dem Aufguß und der Abkochung verbunden werden.

Die in Ostindien anstehenden Engländer führen unter dem Namen einheimische oder Indische Sarsaparilla, Country sarsaparilla, die Wurzel von *Periploca indica*, L. (*Pentandria Monogynia*, L.; *Apocynaceae*, J.), einem in diesen Gegenden einheimischen Strauch, an. Diese Wurzel (*Oshba* (Ar.); *Erramassumul*, *Irimusu* (Cy.); *Mugrabu* (Hm.); *Shariva* (Sa.); *Nunnarivayr* (Tam.); *Sugundavala* (Tel.)) wird zu drei oder vier Unzen in Abkochung bei Scropheln, venersischen und Hautkrankheiten empfohlen.

Pulvis sudorificus et tonicus. (Pie.)

R. Sarsaparillae,
Sassafras,
Radiciis Rusci, sing. . partes aeq.
Gabe, eine Drachme alle Morgen in weißem Wein.

Opiatum Arabicum. (Pie.)

R. Sarsaparillae,
Chinae,
Nuc. Avellanae, tost. sing.
unc. quatuor.
Caryophyllorum uncias quinque.
Mell's Narbonensis . . . q. s.

Wird in der Provence häufig gegen venerische Halsgeschwüre und sogenannte chronische oder ausgeartete Syphilis angewendet.

Extractum Sarsaparillae s. Smilacis asperae. (HC†. Wir†. AD. Ams. B. His3. Lon. LonN. LPO. Sar. Taur. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. T.)

R. Radiciis Sarsaparillae . libram.
Aqua bullientis . . . congiunt.
Macerate per horas 24, decoque deinde ad octarium quatuor remanentiam; cola liquorem bullientem et ad extracti consist. consume. (AD. Lon. LonN. C. CG. Gr. Re.)

R. Radiciis Sarsaparillae partem unam.
Aqua bullientis . partes decem.
Digere per horas 24 tunc coque per duas et cola; residuum coquantur per aequale tempus cum novae Aqua partibus quatuor (ad libras octo); liquores commixti ad extracti consist. evaporant. (B. His3.)

Ams. coctionem Radiciis primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aqua, qualibet vice ad dimidium remanentiam; — Fi. Sarsaparillam primum cum Aqua sextuplo coquere. colaturae novam Aquam addere et sic radicem penitus extrahere, tunc decocta consumere; — T. ut extractum ligni Guajaci; — HC†. ut extractum Absinthii; — Taur. ut extr. Helenii, aqua tamen

ad 80° R. calefiat; — LPC. ut extr. Gentianae; — DB. ut extr. Juniperi.

R. Radicis Sarsaparillae . . . libram.
Aqua bullientis . . . libras sex.

Macerata per tres dies, coque parumper, cola exprimendo et ad extracti consist. consume. (Wirz.)

Sar. liquorem coquendo ad duos trientes consumere, colare et evaporare jubet.

Extractum Sarsaparillae alcoholicum (GalP.) ut extractum Cicutae alcohol.

Extractum Sarsaparillae fluidum (AD. Du.) Sarsaparillae libram coquere per horam cum Aquae octariis duodecim, filtrare, residuum iterum cum eadem Aquae quantitate coquere, ambos liquores miscere, ad uncias triginta decoquere et addere Spiritus Vini rectificati uncias duas.

Infusum Sarsaparillae compositum.
(AD. Du. Re.)

R. Rad. Sarsap. Aq. frig. lot et concis. unciam.

Aqua fervidae . . . libram

Macerata per horas duodecim in vase clauso et exprime. (Re.)

AD. Du. Sarsaparillae unciam, Aquae Calcis octarium.

Decoctum Sarsaparillae s. Sarsaparillae simplex s. Salsaparillae s. Smilacis s. Sarsae s. Smilacis Sarsaparillae, Tisana Sarsaparillae. (HC†. AD. Am B*. Du. Ed. Lon LonN. LPC. Lus. Suec. Taur. Br. CG. DB. E. Fi. Gr. Ra. Re. Sa. Sw. Sy. T. Va.)

R. Sarsaparillae . . . uncias sex.

Aqua . . . libras octo.

Digere modico calore per horas duas, exime deinde radicem et contusam lente in infusione ad dimidii aquae remanentiam coque.

AD. Sarsaparillae uncias sex, Aquae octarios sex coquere ad remanentiam quatuor; — Am. Du. et C. Sarsaparillae sesquiunciam, Aquae bull. octarios duos, duas horas digestionis et coctionem radicis contusae ad dimidia partis liquidi remanentiam; — Sy. Sarsaparillae uncias tres, Aquae bull. libras tres, quatuor horas infusionis, infusionem radicis contusae per horas septem et coctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam, vel: Radicis uncias tres, Aquae bull. libras tres, 12 horas digestionis et decoctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam; — Br. Radicis uncias sex, Aquae libras sedecim et post certum tempus digestionis, coctionem ad dimidia par-

tis liquidi remanentiam; — Lus. eundem agendi modum, sed Aquae libras decem; — Paur. ut decoct. Bard.; — B*. Ra. Va. Hôt. D. Sarsaparillae unciam et Aquae libras duas ad tertiam partem redigendas; — Ra. Va. Hosp. Ven. praeterea: Sarsaparillae unciam ad duas et Aquae libras quatuor ad duas redigendas; — B*. Lon LonN. LPC. CG. Gr. et Re. Sarsaparillae uncias quatuor (quinque LPC.), Aquae octarios quatuor, quatuor horas infusionis, tunc duas macerationis radicis contusae et coctionem ad dimidia partis liquidi remanentiam; — Suec. Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae bull. uncias sexaginta quatuor, horas quatuor macerationis, duas digestionis radicis contusae et evaporationem liquidi coctione ad unciam triginta duarum remanentiam; — Fi. Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras quinque cum dimidia, horas quatuor macerationis et coctionem ad libras tres; — T. Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras sex, macerationem per horas quatuor vel sex et decoctionem ad dimidium.

HC†. Radicis uncias tres, Aquae fervidae libras quatuor, per horas 24 in vase leviter tecto prope ignem macerare, dein ad colaturam librarum duarum decoquere; — DB. Sarsaparillae unciam infundere cum Aquae bullientis libris duabus per horas sex, coquere ad libram et per telam trajicere.

Reizend, bei venerischen und rheumatischen Krankheiten angewendet. — Gabe, ein halbes Pfund drei oder vier Mal täglich.

Tisana de Saint-Marie.

R. Sarsaparillae concis. unc. quatuor, Aqua . . . octarios sex.

Decoque ad octariorum quatuor remanentiam; ab igne removendo adde Rad. Liqu. rit. contus.

drach. quatuor.

Post sufficientem infusionem refrigerata cola.

Reizend, bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Man trinkt die vorgeschriebene Menge, Morgens nüchtern, lauwarm, auf sechszehn Mal, alle Viertelstunden ein Glas.

Liquor antivenereus Roueni. (B*.)

R. Dec. Sarsaparill. unc. triginta duas, Nitri . . . drachmas tres.

Aetheris hydrochlorici semunciam.

Spirit. Camphorae . drach. duas.

Olei ess. Anisi . guttas quinque.

Gabe, ein Löffel zwei oder drei Mal täglich.

Syrupus Sarsaparillae. (AD. GalP.
GalP. LPC. CG. DE. Gr.)

℞. Sarsaparillae concisae libras tres.
Aquaе bullientis . libras triginta.

Infunde per horas 24, tunc ad libras
duodecim decoque et cola exprimendo;
residuum coquat in Aquaе libris tri-
ginta ad duodecim remanentiam et cum
expressione coletur, quo facto, de-
cocta ambo commixta ad libras decem
vaporatione redigantur et post reposi-
tionem filtratis addantur

Syrupi Sacchari,

Mellis albi, singulorum librae tres.

Coque celeriter ad requisitam con-
sistentiam.

CG. Gr. Radicis libram, Aquaе con-
gium ad octar. quatuor decoquere et
addere Sacchari libram; — LPC Sar-
saparillae et Sacchari, sing. uncias
quindecim; — DE. Sarsaparillae un-
ciam infundere cum Aquaе fervidae li-
bris decem per horas sex, repetere
hanc operationem, deinde coquere re-
siduum cum Aquaе libris decem per
semithoram, addere Sacchari albi libras
quatuor cum dimidia, ut fiat syrupus
spissus, denique admiscere duas infu-
siones et decoquere ad aptam consi-
stentiam (*Syrupus Smilacis*); — prae-
terea: Sarsaparillae sesquiunciam in-
fundere cum Aquaе fervidae libris de-
cem, repetere cum eadem Aquaе quan-
titate infusionem, miscere liquores, se-
ponere, decanthare, evaporare quar-
tam partem, addere Sacchari albi li-
bras quatuor, ut fiat syrupus, et clari-
ficare Albuminis ope.

℞. Extracti Sarsaparillae uncias sex,
Aquaе purae . libras quatuor,
solve in balneo mariae et adde liquori
calido filtrato

Sacchari albi . . . libras octo.

Fiat syrupus per solutionem. (GalP.)

℞. Rad. Sarsaparillae conc.

libras duas.

Rasur. ligni Guajaci uncias tres.

Fol. Rosarum rubrarum,

— Sennae,

Radic. Liquiritiae, sing.

uncias duas.

Olei Sassafras,

— Anisi, sing. grana quinque.

— Gaultheriae . . . grana tres.

Sacchari albi . . . libras octo.

Alcoholis diluti . octarios decem.

Macera per dies quatuordecim, filtra
cum expressione per chartam et evapora
in balneo aquae ad octarios quatuor
cum dimidio, adde denique Saccharum
et syrupo refrigerato olea. (AD.)

Tisana arabica. (Pie.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.

Chinae unciam.

Aquaе libras octo.

Decoque ad librarum quatuor rema-
nentiam.

In der Provence mit dem opiatum ara-
bicum gegen Syphilis gebraucht.

Species sudorificae. (GalP. LH.)

℞. Radicis Sarsaparillae,

— Chinae,

Rasurae Ligni Guajaci, singularum
partes aequales.

Decoctum Sarsaparillae compositum s.
edulcorans s. sudoriferum s. Ligni Gua-
jaci compositum, Apozema sudatorium
s. sudoriferum, Tisana Sarsaparillae.
(Gal. GalP. His3. LH. Sar. Ca. Ra.
Sp. Sw. Va Vm.)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquiunciam.

Aquaе communis libras quinque.

Coque per semihoram et adde

Ras. Ligni Guajaci sesquiunciam.

Post horae quadrantem ab igne re-
move et adde

Liquiritiae rasae . . semunciam.

Ligni Sassafras . drachmas duas.

Vase tecto, liquidum post refrigera-
tionem cola, seponere et libras tres il-
lius defunde. (Vm.)

℞. Radicis Sarsaparillae,

Ras. Ligni Guajaci, sing. sesquiunc.

Aquaе tepidae . libras quatuor.

Infunde per horas 12 in vase tecto,
coquendo ad libras tres consume, sub
finem addendo

Ras. Ligni Sassafras drach. duas.

Liquiritiae rasae . . semunciam.

Post semihoram infusionis cola. (Gal.)

℞. Ras. Ligni Guajaci uncias duas.

Rad. Sarsaparillae . . unciam,

coque cum

Aquaе font. s. q. per horam,

adde

Radic. Sassafras drachmas duas,

— Liquiritiae . drachmas tres,

digere per horas duas, ut sit colatura
librarum duarum. (GalP.)

His3. Sarsaparillae uncias duas, Gua-
jaci tantidem, Aquaе libras octo ad
quatuor redigendas, Sassafras unciam
et Liquiritiae drachmam; — LH. Sar-

saparillae semunciam, Rasurae Guajaci
drachmas tres macerare per horas sex
in Aquaе libris duabus, deinde ad re-
manentiam unius coquere, sub finem

addere Rasurae Sassafras, Liquiritiae
contusae, sing. drachmas duas, colare et
refrigerato addere Syrupi comm. unciam.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.

Ras. Ligni Guajaci . . unciam.

Chinae semunciam.
 Aquae octarios duos.
 Coquendo dimidium consume, sub
 finem addendo.
 Ligni Sassafras . drachmas duas.
 Cola leviter exprimendo. (Ca.)
 R. Rad. Sarsaparillae uncias triginta.
 Aquae bull. libras viginti quatuor.
 Post horas 24 infusionis decoque ad
 librarum octo colaturam; qua opera-
 tione bis cum residuo repetita, deco-
 ctorum trium cunctorum mixtorum li-
 bris viginti adde
 Florum Boraginis,
 Petalorum Rosarum albarum,
 Foliorum Sennae,
 Seminum Anisi, sing. uncias duas.
 Coquendo ad libras duodecim con-
 sume et cola. (Sw)
 R. Radicis Sarsaparillae,
 — Chinae, sing. uncias duas.
 Ras. Lig. Santali rubri drach. sex.
 — Cornu Cervi sesquiunciam.
 Digere per horas 24, coque tunc in
 Aquae purae libris duodecim ad dimi-
 dii reductionem, sub finem addendo
 Ras. Lig. Santali citr. drach. sex.
 Sacchari albi . . . uncias sex.
 Cola. (His.)
 R. Rad. Sarsaparillae . . . unciam.
 Aquae communis . . . libras tres.
 Sulphureti Antimonii in nodulo
 drachmas duas.
 Collae Piscium . . . drachmam.
 Coquendo tertiam partem consume.
 (Ra. Va. Char.)
 R. Radicis Sarsaparillae,
 — Chinae, sing. . . semunciam.
 Rasurae Ligni Guajaci,
 Antimonii crudi, sing. uncias duas.
 Aquae bullientis . . . libras octo.
 Macera per horas 24, tunc per ho-
 ram coque in vase tecto; adde
 Ras. Ligni Sassafras . . . unciam.
 Rad. Caryophyllatae semunciam.
 Bacc. Juniperi contus. drach. duas
 Coque per horae quadrantem et co-
 la. (Sp.) — Durch Zusatz von einer Unze
 Senna, zu Ende der Kochung, kann man
 dieser Tisane eine laxirende Wirkung er-
 theilen, und sie unterscheidet sich dann nur
 wenig von der tisana antivenerea pur-
 gans.
 R. Radicis Sarsaparillae uncias duas.
 — Chinae,
 Ras. Ligni Guajaci, sing. unciam.
 Antimonii crudi in nodulo
 sesquiunciam.
 Aquae communis . . . libras sex.
 Digere per horas 12 inter cineres ca-
 lidos, tunc lente ad duas libras deco-
 que, sub finem addendo
 Liquiritiae rasae . drachmas sex.

Cola decoctum et bulliens infunde in
 Ras. Ligni Sassafras drach. tres.
 Vas ad perfectam refrigerationem
 usque tege. et cola. (Sar.)
 Bei venerischen, catarrhatischen und ex-
 anthematischen Krankheiten empfohlen. —
 Gabe, mehrere Gläser täglich.
 Tisana sudorifica. (Pie. Ra. Sm. Va.)
 R. Sarsaparillae . . . uncias duas.
 Chinae,
 Dulcamarae, sing. . . unciam.
 Aquae octarios tres.
 Decoque ad tertiae partis consump-
 tionem usque. (Pie) — Gabe, ein
 Glas Morgens und Abends. — Man ver-
 setzt diese Tisane mit einem Drittheil Milch
 und verflüßt sie mit Zucker.
 R. Sarsaparillae,
 Dulcamarae, sing. . . unciam.
 Radicis Saponariae drachmas duas.
 Aquae vitra sex.
 Coquendo tertia parte consumpta,
 adde
 Lactis vaccini . . . vitra duo.
 Misce bene (Sm.) — Täglich in sechs
 Gläsern zu nehmen.
 R. Sarsaparillae,
 Chinae,
 Guajaci, singulorum semunciam.
 Sassafras drachmas duas.
 Aquae libras duas.
 Coque. (Ra. Va. Höt. D.)
 So gebraucht, wie die vorigen.
 Decoctum diaphoreticum incitans, Ti-
 sana sudorifica excitans. (B.)
 R. Radicis Sarsaparillae,
 Ligni Guajaci, sing. drach. tres.
 Dulcamarae,
 Foeniculi, sing. . drachmas duas.
 Aquae q. s.
 ut decocti libra una obtineatur. — Auf
 zwei oder mehrere Male zu nehmen.
 Decoctum antisyphiliticum nutiens.
 (B. Va.)
 R. Sarsaparillae unciam.
 Lichenis Isl. abluti sesquiunciam.
 Aquae q. s.
 ut decocti unciae quatuordecim obti-
 neantur. Colaturae adde
 Syrupi Sacchari . . . unciam
 Auf zwei Mal, Morgens und Abends.
 Decoctum Ichthyocollae compositum.
 (HC†. B*)
 R. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
 Corticis Sassafras,
 Ligni Sassafras, sing. . . unciam.
 Aquae bullientis . libras novem.
 Digere per horas 12, tunc coque et
 adde

Ichthyocollae . . . uncias tres, antea dissolutae in Aquae q. s., ut colatura sit librarum octo.

(Nonnunquam in hoc decocto frustula Stibii sulphurati nigri ponderis unciarum duarum, sacculo linteo inclusa inter decoctionem suspenduntur. HC†)

Von Simbke bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, zwanzig bis fünfzig Unzen täglich.

Apozena compositum s. Tisana (antivenerea) Felizii. (GalP LH. Bo. Ca. DB. Pic. Ra. a. Lagneau.)

R. Antimonii crudi in nodulo uncias quatuor.
Aquae communis libras duodecim.
Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae unciam.
Collae Piscium,
Corticis Buxi,
— Hederae, sing. sesquiunciam.

Decoque ad dimid., trajice per pannum, seponere, decantha et adde Sublimati corrosivi . grana tria Dissolve. (Bo. Ca. Pic.)

Eine Formel von Baumé.

DB. Chinae drachmam, Buxi semunciam, Aquae libras quindecim, Antimonium omittit et caeterum ut antea; — Va. Corticem Hederae omittit. Gabe: täglich nach und nach zwei Pfund zu verbrauchen.

R. Antimonii crudi pulverati in nodulo uncias quatuor.

In ollam fictilem vitream immitte, ita ut fundum non attingat et infunde

Aquae libras sex
Coque per horas duodecim, tunc ad dimidii remanentiam et adde

Sarsaparillae . . . uncias tres.
Collae Piscium . . . semunciam.

Ollam per horas 24 inter cineres calidos relinque et decoctum per linteum teneris texturae trajice. (Ra. Va. Hosp Ven.)

GalP. Sarsaparillae uncias duas, Collae drachmas duas cum dimidia, Antimonii uncias duas cum dimidia, Aquae libras quatuor coquere ad partem dimidiam, trajicere et post sepositionem decanthare; — LH. Sarsaparillae uncias duas, Rasurae Guajaci drachmas duas, Collae tres, Antimonii uncias duas, Aquae commun. libras quatuor, coque ut librae duae supersint. — Gabe, vier Unzen drei Mal.

Die letztere Formel wird heutzutage allein befolgt. Das Antimon ist unnötig; wenn man es wegläßt, so wird die Tisane der vorigen ähnlich.

Wendet man durch Schwefelsäure gebleichten Fischleim an, so behält diese Substanz immer eine gewisse Menge Säure, welche auf die Schwefelbase wirkt und etwas rohes Spießglas bildet. Daber die Koliken und das Erbrechen, welches diese Tisane bisweilen erregt. Chevallier und Idt schreiben jedoch diese Zufälle dem Arsenik zu, welches bisweilen in kleiner Quantität in der Schwefelbase enthalten ist und vom Wasser aufgelöst wird. Besser daher, man setzt den Spießglas gar nicht zu, oder nimmt statt des Fischleims Arabisches Gummi, eine Unze auf anderthalb Pinten der eingekochten Tisane.

Tisana, Decoctum et Bochetum depurans de Vigaroux. (Bo. Pic.)

R. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Fol. Sennae mundat. uncias tres.
Rasurae Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Radiceis Chinae,
— Iridis Florentinae,
Antimonii crud.,
Anisi viridis,
Cremoris Tartari,
Aristolochiae longae,
— rotundae,
Jalapae contusae,
Polypod. querni, sing.

sesquiunciam.
Jugland. rec. c. putam. contus. no. 12.

Vini albi octarios duos.
Infunde per horas 24 inter cineres calidos, tunc adde

Aquae fontanae . . octarios sex.
Consume, modico calore, partem tertiam et per pannum cola. (Tisana Vigaroux.)

Residuum cum Vini albi octariis duobus vel tribus et Aquae uncias sex vel septem pro tertia parte consumpta tisanam dilutiorem praebent. (Bochetum Vigaroux.)

Von der ersten Tisane nimmt man den Tag drei Gläser, die zweite dient zum gewöhnlichen Getränke.

Saint-Marie bereitet mit dieser Abkochung ein Roob antisiphiliticum, wozu folgendes die Formel ist:

R. Tisanae de Vigaroux . octarium.
Sacchari . . . libram ad duas.
Coque ad consistentiam roob.

Dieser Roob soll bei Syphilis gute Wirkung thun. — Gabe, ein Eßlöffel, täglich vier Mal. Nach jeder Gabe nimmt man ein großes Glas einer concentrirten Abkochung der Sarsaparille, und steigt damit, bis man täglich neun bis zehn Löffel Roob verbraucht.

Decoctum catholicum. (Sar. Taur.)
 R. Radicis Gramini . . . sesquiunciam.
 — Sarsaparillae . . . unciam.
 Foliorum Cichorii,
 — Agrimoniae,
 — Betonicae,
 — Capilli Veneris Monspelici,
 — Pimpinellae albae, singulo-
 rum manipulum dimidium.
 — Sennae,

Cuscutae, singulorum semunciam.
 Radicis Liquiritiae drachmas duas.
 Seminum Anisi . . . drachmam.
 Aquae communis libras quatuor.
 Coque sarsaparillam et radicem gra-
 minis in Aqua ad dimidii remanentiam,
 adde liquiritiam et herbas (*Decoct.*
cath. simplex Taur.), macera sennam,
 cuscutam et anisum per horas aliquot
 in Aquae bull. uncis sex, cola et in-
 fusum cum decocto commisce. (*De-*
coct. cath. solutivum Taur.)

Decoctum antivenereum laxans, Tisa-
na antivenerea purgans, Decoctum Gua-
jaci compositum et purgans. (Gal. Ca.
Re Sp.)

R. Radicis Sarsaparillae,
 Ras. Lig. Guajaci, sing. unciam.
 Subcarb. Potassae

gr. viginti quinque.
 Aquae communis libras quatuor.
 Macera per horas 12, subinde agi-
 tando, tunc ad libras tres coctione con-
 sume; infunde deinde in liquido per
 semihoram

Foliorum Sennae,
 Ra. urae Ligni Sassafras,
 Liquiritiae, sing. drachmas duas.
 Rhei,
 Coriandri, sing. . . drachmam.
 Cola leviter exprimendo et post re-
 frigerationem decantha. (Gal. Ca. Re.)

R. Radicis Sarsaparillae,

— Chinae,
 Resur. Sassafras, sing. unc. duas.
 Antimonii crudi . . . unciam.
 Aquae font. libras duas c. dimid.
 Decoque ad libras duas et adde
 Radicis Polypodii . . . semunciam.
 — Rhei . . . semidrachmam.
 — Liquiritiae,
 Foliorum Sennae mundatorum,
 Ligni Sassafras, sing. drachmam.
 Subcarb. Potassae grana quatuor.
 Coriandri . . . semidrachmam.
 Post horas duodecim infusionis his
 ebulliant et colentur (Sp.)
 Den Tag über zu trinken.

Tisana de Vinache. (Ca.)

R. Antimon. crudi in nodulo
 unc. duas

Sarsaparillae,
 Chinae,
 Ligni Guajaci, sing. sesquiunciam.
 Aquae octarios tres.
 Decoque ad octarium et adde
 Sassafras,
 Sennae, singulorum semunciam.
 Post sufficientem infusionem co a,
 seponere et decantha — In venerischen
 und Hautkrankheiten gebraucht. — Gabe,
 mehrere Gläser täglich.

Tisana de Jausterand (Bo.)

R. Radicis Sarsaparillae,
 — Chinae,
 Sulphureti Antimonii in nodulo,
 singulorum uncias duas.
 Salis Tartari . . . drachmam.
 Foliorum Sennae,
 Ligni Sassafras, sing. . unciam.
 Rhei,
 Cort. Chinae contusi, sing.

semunciam.
 Aquae q. s.
 Coque per horas octo, ignis exigui
 ope, in vase tecto, ad octarium sex
 liquidi remanentiam, tunc per idem
 tempus infunde et cola. — Besonders
 bei Eropheln empfohlen. — Gabe, täg-
 lich drei Gläser.

Tisana sudorifica Astruc. (Pie.)

R. Sarsaparillae,
 Sassafras, singulorum uncias duas.
 Guajaci,
 Chinae, singulorum sesquiunciam.
 Antim. crudi in nod. drach. duas.
 Aquae . . . libras duodecim.
 Infunde calide per horas duodecim,
 tunc lente coque, sub finem addendo
 Foliorum Sennae . . . semunciam.
 Radicis Liquiritiae sesquiunciam.

Decoctum antiarthriticum. (Ca.)

R. Sarsaparillae . . . uncias quatuor.
 Antim. crudi in nod. uncias s-x.
 Aquae libras duas.
 Decoque ad dimidium; in reliquis
 infunde
 Radicis Liquiritiae . . . unciam.
 Seminum Anisi . . drachmas duas.
 DB. Sarsaparillae unciam, Aquae li-
 bras tres, Antimonii crudi (quantita-
 tem non indicat) in sacculo inclusi,
 Anisi, Liquiritiae, sing. drachmas duas.
 Bon Quarin empfohlen. — Glasweise
 zu nehmen.

Decoctum Lusitanicum s. antivenereum
Ulyssiponense s. Sarsaparillae compositum
s. cum Mezereo, Aqua Cauperi.
 (AD. Am. B*. Du. GalF. Lon. LonV.
 LP. Lus. Suec. C. CG. Gr. Re. Sp.
 Sw. Sy. Va)

R. Ligni Santali rubri,
— — albi,
— Guajaci,
— Rhodii,
— Sassafras, sing. . . unciam.
Sarsaparillae . . . uncias tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo
uncias duas.

Corticis Mezerei . . . semunciam.
Aquaе bullentis . . . libras decem.
Infunde et coque deinde ad dimidii
consumptionem, sub finem addendo
Liquiritiae rasae . . . semunciam.
Cola. (E*. Galf. sp.)

R. Sarsaparillae,
Ligni Sassafras,
— Santali rubri,
— Guajaci, sing. . . uncias tres.
Corticis Mezerei . . . unciam.
Coriandri drach. sex ad unciam.
Aquaе fontanae . . . libras viginti.
Decoque ad dimidii remanentiam.

(Syr.)
R. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Sassafras,
Guajaci, singulorum . . . unciam.
Aquaе . . . libras decem.
Macera, blando calore, per horas sex,
tunc ad dimidium decoque et sub finem
adde

Liquiritiae rasae . . . unciam.
Corticis Mezerei . . . drachmas tres.
Cola. (sp.)

Gr. Sarsaparillae drachmas sex, Sas-
safras, Corticis Guajaci, Glycyrrh. zae,
sing. unciam, Mezerei drachmas tres,
Aquaе octarios decem, coque ad quin-
que; — AD. Lon. LonN. LPC. Re.
Decocti Sarsaparillae ferventis (e Sas-
sap. unciis octo cum Aq. libris octo
ad dim. redact. Va.) octarios quatuor,
[cortic. radic. AD.] sassafras, Guajaci,
Liquiritiae, sing. unciam (drachmas
decem LPC), Mezerei drachmas tres.
Decoque per horae quadrantem et cola.

R. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
Corticis Mezerei drachmas duas.
Aquaе fontanae . . . libras tres.
Decoque ad libras duas et in fine
adde

Liquiritiae rasae . . . sesquiunciam.
Cola liquidi libras duas. (B*. sy.)

R. Sarsaparillae . . . uncias quatuor.
Radicis Chinae? (salsa hortense)
semunciam.

Aquaе communis . . . libras sex.
Decoque ad librarum trium cum di-
midia remanentiam, sub finem infunde
Mezerei . . . drachmas duas.

Refrigerata cola. (LP.)

In venerischen und Mercurialkrankheiten
empfohlen. — Gabe, fünfzehn bis fünf-
zig Unzen täglich, allmählig gestiegen. —

Die vorstehende Formel ist von Girtanner
und den übrigen vorzuziehen.

Lisbon diet drink. Decoctum Lusita-
nicum (Par.): Sarsaparill. concis., Rad.
Chinae, sing. dr. j, Nuc. Jugland. cort.
sicc. no. 20, Antimon. Sulphuret. unc.
ij, Lapid. Punic. pulv., Aq. dest.
libr. x.

Tisana antivenerea. (LH. Sn.)

R. Sarsaparillae concisae uncias duas,
Corticis Mezerei semidrachmam.
Aquaе fontanae . . . sesquioctarii.
Decoque ad octarium unum et cola-
turae adde Liquoris Swietenii cochlear
majus. (Sm.) — In einem Tage zu ver-
brauchen. — Plene trübe sie sebr.

R. Rad. Sarsaparillae . . . unciam.
Macera per horas tres, tunc coque in
Aquaе sesquilibra ad reman.
librae unius.

Sub finem adde
Radicis Apii . . . unciam.
Cola et adde
Syrupi communis . . . unciam.
Gabe, vier Unzen, drei Mal. (LH.)

Tisana s. Pissana Calluci s. ex Cal-
lac, Decoctum Sarsaparillae ex Callae.
(B*. His3)

R. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Mercur. dulc. in nodulo
drach. duas.

Aquaе . . . libras quindecim.
Decoque ad remanentiam tertiae par-
tis, adde deinde

Fol. Sennae mund. . . unciam.
Seminum Coriandri drachmas sex.
Aluminis . . . semidrachmam.

Coque denno per horae quadrantem
et ante perfectam refrigerationem cola
(Hi 3.)

B*. Coriandri drachmas duas.
Stedem bei venerischen Krankheiten ges-
braucht. — Gabe, sechs Unzen zwei oder
drei Mal täglich, einen Monat oder sechs
Wochen lang.

Decoctum antivenereum Passerini vel
Salvadori. (Pm. DB. Fi. T.)

R. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Fumariae,
Florum Cyani, sing. drach. duas.

Foliorum Sennae drachmas tres.
Aristolochiae rotund. semunciam.
Radicis Scolymi drachmas duas.

Aquaе pluvialis . . . libris sex.
Coque et adde

Mercurii dulcis.
Aluminis usti, sing. . . drachmam.

Decoque ad librarum trium rema-
nentiam, cola per linteum fortiter ex-
primendo. (T.)

DB. Scolymⁱ semunciam, Aquae libras septem cum dimidia, caeterum ut antea, decoquere ad libras duas cum dimidia; — *Fi.* Sarsaparillae uncias octo, Aristolochiae duas, Scolymi unam, Aquae libras viginti, decoque ad duarum partium remanentiam, adde Sennae sesquunciam, Fumariae et Cyani, sing. unciam. Decoque ad libras duodecim, adde Mercurii dulcis, Aluminisusti, sing. semunciam, mixta per duas horas igne blandissimo dige, cola fortiter exprimendo per pannum, ita ut libras decem remaneant; — *Pin.* Ingredientium easdem quantitates ut *Fi.* sed omnia cum Aquae libris triginta ad decem remanentiam decoquere.

Gabe, vier Unzen bis ein Pfund täglich.

Tisana sudorifica et purgans. (Sm.)

R. Sarsaparillae . . . uncias quatuor.
Aquae purae . . . octarios tres.
Coque per horas tres igne per exiguo et sub finem adde

Sennae mundatae,

Salis Epsom., sing. sesquunciam.

Liquiritiae contus. drach. quatuor.

Post horas viginti quatuor cola. —
Gabe, sechs Unzen drei Mal täglich, drei Wochen oder einen Monat lang. — Soll bei chronischen Rheumatismen sehr nützlich seyn. — Sie ist von Rost.

Decoctum Zittmanni. (Bor5⁺. HC⁺. Sax2⁺. B⁺.)

R. Sarsaparillae . . . uncias duodecim.
Aquae fontanae libras nonaginta (mensuras libras HC⁺. libras septuaginta duas Bor5⁺. Sax2⁺. viginti quatuor Por4⁺.)

Digere per horas 24 (per quadrantem horae et coque tum per dimidiam horam HC⁺.), immitte deinde liquido in sacculum inclusa

Pulveris styptici (Ed.) (Sacchari aluminati Bor5⁺. HC⁺.)

sesquunciam

Mercurii dulcis . . . semunciam.

Cinnabaris (Antimonii sublimati)

drachm. m.

Decoque ad libras triginta (mensuras octo Bor5⁺. libras viginti quatuor Sax2⁺.) et sub finem adde

Sem. Anisi,

— Foeniculi, sing. semunciam.

Foliorum Sennae . . . uncias tres.

Radice Liquiritiae sesquunciam.

Liquor (colatus ponderis librarum sedecim HC⁺.), nomen *Decoctum fortius* gerens, sepoatur; residuo (librarum viginti quatuor Bor5⁺.) adde

Sarsaparillae uncias sex.

Aquae libras nonaginta (libras septuaginta duas Bor5⁺. Sax2⁺. mensuras 11b as HC⁺.)

viginti quatuor).

Coque (ad librarum viginti quatuor Bor5⁺. Sax2⁺. mensurarum octo remanentiam Bor4⁺.), sub finem addendo

Coriis Citri.

Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),

Cardamomi minoris,

Liquiritiae, sing. drachm. tres

(Liquiritiae drachm. sex HC⁺.)

Liquorem colatum librarum sedecim (HC⁺.), *Decoctum tenue s. debile s. mitius* nomen gerentem, sepone.

Theden rühmt dieses Präparat bei venerischen Krankheiten.

Roob antisypiliticum, Syrupus Sarsaparillae compositus s. antisypiliticus de Laffecteur s. Savaresi. (HC⁺. LP. Taur. DB. 12 T. Vm.)

R. Sarsaparillae . . . partes quindecim.

Aquae . . . partes centum viginti.

Coque ternis vicibus, singula quaque ad dimidii reman.; colaturas clarificatas ad octodecim partes redige et infunde in

Foliorum Sennae,

Florum Boraginis,

— Rosae moschatae,

Sem. Cumini, sing. part. unam.

Cola et sepone, tunc decanthatis adde

Sacchari albi partes quindecim.

Solve leni calore et refrigerationis momento adde

Mellis albi . . . partes quindecim.

R. Sarsaparillae libras tres.

Sassaparilae,

Ras. Ligni Guajaci, sing. 1 br. duas.

Chinae flavae libram.

Aquae . . . libras quinquaginta.

Decoque per horam circiter unam, filtra et decoctionem cum residuo quater vel quinquies repete, commisce liquores et in his solve

Sacchari albi,

Mellis opt., sing. 1 br. quindecim.

Despuma, filtra per linteum et sufficientem evaporata in urceolum effunde, continentem sacculos duos, ejus alter Anisi uncias quatuor, alter Florum sic Boraginis tantidem continet. exprime

sacculos ante refrigerationem, misce et syrupum para. (T.) — Taur. addit

Radice Chinae libras duas, indicat Boraginis semilibram, Anisi unciam cum

drachmis tribus et Mellaginis s. Mellisae clarificatae libras decem loco Sac-

chari et Mellis; HC⁺. Sarsaparillae,

Chinae, Ligni Guajaci, sing. libras duas,

concrisa et contusa macerare per ho-

ras 24 in Aquae fervidae 1 bris quin-

quaginta, colare et evaporando ad dimidiam liquoris consumptionem redigere, deinde admiscere Mellis despumati, Sacchari albi, sing. libras octo, coquendo ad syrupi spissioris consistentiam redigere admiscendo Infusi Foliorum Sennae, Seminis Anisi, sing. uncias duas; — DB. Sarsaparillae libras duas, Sennae uncias duas, Sassafras quatuor, Guajaci, Chinae, sing. a. a., Dulcamarae unciam, Sacchari, Mellis, sing. libras duas, Aquae libras quatuordecim; — LP. Sarsaparillae uncias triginta, Radicis Cannae de Alagoa tantumdem, Guajaci raspi octo, Sennae tres, Chinae quatuor coque in Aquae libris octodecim per semihoram, cola, residuum denuo in Aquae libris novem per horae spatium, cola et adde Mellis et Sacchari, sing. libras sex, coque ad consist. debitam. — Hat viel Aehnlichkeit mit dem syrupus Guisineri; — B2. Radicis Sarsaparillae, Arundinis Phragmitis, sing. uncias triginta coquere per horam cum Aquae octarii novem, exprimere et residuum cum Aquae eadem quantitate per horas duas coquere, sub finem addere Florum Boraginis uncias octo, Foliorum Sennae, Petalorum Rosarum albarum sing. uncias duas, exprimere et decoctis addere Sacchari albi, Mellis, sing. libras sex et totum coquere ad syrupi consistentiam. Für Männer 6, für Frauen 4 Eßlöffel, ohne Zusatz, 6 Uhr Morgens. Es wird hierauf die Sarsaparillensaft angefangen, indem 2 Unzen Sarsaparilla in 3 Quart Wasser bis auf 2 Quart eingegekocht werden, worauf man das Decoct eine Nacht infundiren (ziehen) läßt und es am Morgen ausdrückt. Man trinkt früh einen Becher und während des Tages noch mehrere Male.

Rob. antisyphiliticum (Re. sec. Lafecteur): Extractum liquidum praeparatum cum Decocto Phragmitis, Sarsaparillae et Sem. Anisi, cui Sublimati quantitas certa additur.

Syrupus Sarsaparillae et Guajaci.

(Am. C.)

R. Sarsaparillae concisae,
Guajaci raspati, sing. libram.
Aquae . . . octarios decem.
Coque per horam unam et exprime.
residuum denuo coquatur cum
Aquae . . . octariis decem
per horas duas, sub finem adde
Petalorum Rosarum,
Gummi Arabici,
Fol. Sennae, sing. . . unciam.
Zingiberis . . . semunciam.
Cola et adde
Mellis despumati,

Sacchari, singulorum libras tres,
Fiat syrupus. — Unterscheidet sich von dem folgenden Syrup nur durch den Namen.

Hierher gehört auch der

Syrupus Sievensii. (B.)*

R. Sarsaparillae,
Ligni Guajaci, sing. . . libram.
Petal. Rosarum rubr. . . unciam.
Aquae . . . q. s.
Coque per horam et liquorem decanthas; residuum cum Aquae aequali quantitate per horas duas coquatur, sub finem addis
Gummi Arabic,
Fol. Sennae, sing. . . uncia.
Zingiberis . . . semunciam.
Decoctis ambobus conjunctis adde
Mellis,
Sacchari, singulorum libras tres et syrupum parum.
B. Sarsaparillae,
Guajaci, singulorum . . libram.
Aquae . . . libras duodecim.
Mellis albi,
Sacchari erudi (cassonade)
singulorum seculibrum.

Syrupus de Sarsaparilla compositus
s. *de Sarsaparilla et Senna compositus*
s. *sudorificus* s. *Guisineri* s. *Sarsaparillae* s. *Smilacis Sarsaparillae* s. *depurans*. (Am. An. B*. GalM. GalP. LH. Taur. C. Ca. Par. Re. Sw. T. Va.)

B. Sarsaparillae . . . libras duas.
Aquae tepidae . . libras duodecim.
Infunde per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum
Aquae communis . . libris decem
et ad sex consumatur. Qua operatione bis vel ter repetita, decocta commisce et leviter coque cum

Florum Boraginis,
Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Semin. Anisi, sing. uncias duabus.
Decoque ad dimidium, cola et adde
Mellis albi,
Sacchari albi, sing. . libras duas.
Coque ad syrupi spissi consist. (B*. GalP. Taur. Ca. Re.)

LH. Sarsaparillae libras quatuor,
Aquae tepidae viginti quatuor, infusionem per horas 24, cocionem ad libras duodecim, colare et residuum cum Aquae libris viginti ad decem decoquere, colare et operationem bis repetere, decoctis quatuor obtentis addere Foliorum Boraginis, Sennae, Seminum Anisi, sing. uncias tres cum dimidia, coquere blande ad dimidiae partis rem, colare et addere Mellis albi, Sacchari,

sing. libras quatuor, etc. — *Par.* Mercurium sublimatum sine quantitatis indicatione addit; — *Gal.* H. Sarsaparillam diu maceratam leviter coquere, et Flores, Sennam Anisumque vel seorsim vel in producto prioris operationis infundere jubet.

Gal. eundem agendi modum indicat ut *Gal.*, sed loco florum Boraginis et Rosarum Folia Boraginis adhibendo; — *Am.* et *C.* loco florum Boraginis eandem quantitatem Liquiritiae, Rosas tamen adhibet; — *Sw.* binis vicibus sequentibus coquere Sarsaparillae libras duas in Aquae libris novem ad trium remanentiam, in ambobus decoctis conjunctis infundere Sennae sesquiunciam, Florum Boraginis, Rosarum mosch. et Cumini, sing. tantidem, colare et cum Sacchari, Mellisque boni, sing. libris duabus syrupum parare et clarificare; — *An.* Infundere Sarsaparillae libras duas cum dimidia in Aquae fervidae libris viginti quatuor per horas 24, tunc coquere ad colaturam librarum octo, operationem binis vicibus sequentibus cum faecibus repetere; decocti hoc modo parati libras viginti quatuor evaporando ad dimidium redigere, sub finem addendo Florum Boraginis, Rosarum rubrarum, Sennae, Anisi, sing. uncias duas et colaturam lente vaporatam, cum Sacchari et Mellis despumati, sing. libris duabus syrupum parare.

Pelleian. pluribus vicibus sequentibus coquere Sarsaparillae libras duas in Aquae q. s. ad duarum liquoris librarum reman., tunc coquere Sennae uncias duas in Aquae libris duabus per horae quadrantem, liquores commiscere et in illis infundere Florum Boraginis, Buglossi, Rosarum alb., Anisi, sing. uncias duas, colare, addere Mellis et Sacchari albi, sing. libras duas, clarificare et denique ad syrupi consist. coquere.

R. Sarsaparillae concis. . . lib. 24
Aquae bull. lib. 170.
Infunde per horas 12 vel 15, tum coque per duas, addendo, horae quadrantem antequam ab igne removeatur

Fol. Sennae libram et unc. octo.
Cola; residuo infunde
Aquae bullientis libras quindecim.
Colaturae expressae adde
Mellis albi . . . libras octodecim.
Sacchari crudi . . libras triginta.
Clarifica Albuminis ope, infunde supra

Cumini contusi
libram et unc. octo.

Coque ad consist. syrupi et adhuc bullienti adde

Extracti Boraginis libras quatuor.
Rürer ist *Keraudren* & *Gormel*:
R. Syrupi Sarsaparillae vel Boraginis libras duodecim.

— Sennae . . . uncias octo.
Calefac in balneo aquae et adde
Extracti Boraginis . . . libram.
Roob Sambuci . . . uncias tres.
Commisce ad perfectam usque solutionem et cola.

Rech. fürzer ist folgende *Gormel* von *Pagneau*:

R. Syrupi Sarsaparillae libras quatuor.
— Sennae . . . uncias tres.
Calefac et adde

Extracti Boraginis uncias quinque.
Roob Sambuci unciam.

R. Sarsaparillae,
Guajaci rasi, sing. . . libram.
Aquae . . . libras duodecim.
Sacchari crudi,
Mellis albi, sing. . . sesquilibram.

F. S. A. syrupus. (*Syr. Cuis. reformatus.* *Va Hosp. Ven.*) Zwei bis vier Unzen, besonders als *Beißel* des liq. *Swietenii*.

Syrupus pectoralis comitis Christiani.
(*Taur.*)

R. Radic. Sarsaparillae,
— Chinae,
— Smilacis asperae,
Ligni Guajaci, sing. semunciam,
Semin. Hordei mundati uncias sex,
Rasurae Eboris . . drachmam,

coque in
Aquae font. libris sex
ad medias, decocto adde

Florum Boraginis,
— Buglossi,
— Rosarum,
— Violarum, sing. manipulum,
in colatura solve

Sacchari albi . . . libras duas.
Clarifica et ad syrupi consistentiam coque.

Syrupus Sarsaparillae vinosus. (*Bo. Pie.*)

R. Radicis Sarsaparillae sesquilibram.
— Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Jalapae,
— Polypodii,
— Chinae,
Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Cremoris Tartari,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
Anisi viridis, singulorum
uncias sex.

Foliorum Sennae uncias duodecim.
Vini albi . . . octarios duodecim.
Macerate per horas sex in vase tecto;
adde deinde

Aquae . . . octarios quindecim.
Coque blando igne per horam unam,
defunde et facibus infunde

Vini albi . . . octarios sex.
Macerate per horas tres, adde deinde
Aquae . . . octarios octo.

Coque per semihoram, defunde, li-
quores ambo commisce, seponere et de-
canthatis adde

Sacchari liquidi (melasse).
— crudi rub., sing. libr. novem.
Coque absque clarificando ad syrupi
consistentiam.

Tinctura Sassafras a Gr. indi-
catur.

Sassafras.

Laurus Sassafras, L.: Fenchelholz,
Sassafras; *Sassafras* (Gal.): Sassafras
(Ang.); Cay-vang di (Co.); Sassafras
(Lus.).

At. Bat. Borst. Brt. Ful. Hamt.
Han. Hassp. HC. HN. Li. O.
Pal. Sax. Wir. Würt. WW. Wt.
AD. Am. Ams. An. Bel. D. Du. Ed.
Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His.
LH. LonN. LP. LPC. Lus. R. Suec.
Taur. Be Br C. CG. Fi. G. Gr. Por.
Re. Sp. Z.

Ein Baum (Enneandria Monogyna,
L. Laurineae, J.) des südlichen America's
(Blackw. t. 267. Plenk t. 316 Mich.
Arb. for. de l'Am. III. t. 7 Big. Am.
med. Bot t. 35. Berl. Bild. Pl. 29.
fig. 1. Düss. off. Pl. VIII. t. 23. Fl.
méd. VI. 312.)

Das Holz (lignum, [trunci et radice])
Sassafras) ist leicht, von schwammigem
Gefüge, brüchig, stahlgrau, geruchlos und
von einem sehr schwachen Geschmack: das
der Wurzel (radix Sassafras) welches zum
Theil noch mit der Rinde bedeckt, zum Theil
davon entblößt ist, ist gelb oder fahlbräun-
lich, röthlich, von süßlichem, gewürzhaftem,
etwas scharfem Geschmacke und fenchelarti-
gem Geruche. — Die Rinde (cortex ligni
Sassafras) ist sehr dick, leicht, mürbe, runz-
lig, graulichbraunroth, innen rostbraun;
hat einen angenehmen, fenchelartigen Ge-
ruch und einen gewürzhaften, etwas schar-
fen Geschmack. (Oleum venale Sax24.)
— Nach AD. wird auch das Mark der
Stängel (medulla stipitum) angewendet.

Reizend, schweiß- und harntreibend, bei
Gicht, Rheumatismen und venerischen Krank-

heiten angewendet. — Gabe des Pulvers,
eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Ligni Sassafras s. Sassafras.
(Wh.)

R. Ras. Ligni Sassafras . . . libram.
Alcoholis . . . libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola
exprimendo, digere, tunc residuum pa-
rumper cum Aquae libris tribus co-
que, clarifica decoctum Albuminis ope
et alcohole destillatione separato, re-
liqua ad extracti consist. consume. —
Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Infusum s. Tisana Ligni Sassafras s.
Sassafras. (B*. GalM. GalP. DB. E2.
T. Va.)

R. Ras. Ligni Sassafras semunciam.
Aquae bullientis . . . libram.

Infunde per horas sex et cola. (B*.)

GalM. Sassafras unciam et Aquae
bull. q. s., ut post horas quatuor in-
fusionis colaturae semilibra obtineat-
ur; — GalP. ut tisanum Quassiae; —
Du. ut infusum florum Chamomillae;
— T. Sassafras drachmam, Aquae bull.
libram; — Va. Ligni unciam ad duas,
Aquae bullientis libras duas; — E2.
Corticis Sassafras semunciam, Radicis Gly-
cyrrhizae drachmas duas, Aquae bul-
lientis octarium. — Eine Hälfte Mor-
aens die andre Abend, in manchen Krank-
heiten von scrophulösem Character.

Decoctum Ligni Sassafras (DB.)

Paratur ut decoctum radicis Sene-
gae.

*Aqua Calcis composita, Aqua benedi-
cta s. benedicta composita.* (Br. AD.
Du. 1826. Lus. Bo. Pic. Sp. Va. Vm.)

R. Ligni Sassafras . . . semunciam.

— Guajaci . . . semilibram.

Liquiritiae unciam.

Coriandri drachmas tres.

Aquae Calcis octarios sex.

Post duos dies digestionis cola. (Br.
AD. Du. Re. Sp.)

R. Ligni Sassafras . . . uncias duas.

Nucis moschatae drachmas tres.

Liquiritiae unciam.

Aquae Calcis . . . libras quatuor.

Macerate per horas 24 et cola. (Lus.
Va.)

Vm. Sassafras uncias duas, Nucis
mosch. drachmas tres, Liquiritiae un-
ciam, Aquae Calcis triginta sex et tres
dies infusionis.

R. Sassafras semunciam.

Liquiritiae unciam.

Aquae Calcis libras sex.

Infunde per duos dies et cola. (Pic.)

R. Rad. Althaeae,
— Saponariae, sing. . unciam.
— Sarsaparillae,
Ligni Sassafras, sing.

Aquae Calcis . . . drach. quatuor.
libras quatuor.
Post duos dies macerationis adde
Syrupi Quinque Radicum aperien-
tium uncias duas.
Misce. (Bo.)

Bei scrophulösen Krankheiten. — Gabe,
täglich mehrere Tassen.

Godfrey's cortial. (Gr. Re.) Sassafras
uncias novem, Semin. Carvi, Coriandri,
Anisi, sing. unam infunde in Aquae oc-
tariis sex et ad quatuor decoque, adde
Theriaca (treacle) libras sex, coque
totum per pauca momenta et refrige-
ratis adde Tincturae Opii uncias tres.

Gargarisma antivenereum. (DB.)

R. Mellis Rosarum . . . unciam,
Decocti Sassafras . . . libram,
Acidi nitrici diluti guttas viginti.

Syrupus e Corticibus s. Cortice Ligni
Sassafras s. Sassafras. (Wirf.)

R. Corticis Ligni Sassafras
uncias tres.
Vini albi . . . uncias viginti duas.
Infunde et colaturae adde
Sacchari . . . uncias triginta duas.

Tinctura s. Essentia s. Alcoholatum s.
Spiritus Ligni Sassafras. (Brf. Wirf.
GalP. Sw*.)

R. Ras. Ligni Sassafras uncias duas.
Aquae Vitae . . . uncias duodecim.
Digere per tres dies et filtra. (Sw*.)
Brf. et Wirf. Sassafras sesquiunciam,
Alcoholis uncias octo et octo (tres)
dies digestionis s. macerationis; —
GalP. ut Spiritum Canellae

Reizend, ehemals als Mittel gegen Ga-
tarrh und als blutreinigend, jetzt beson-
ders als schweiß- und harntreibend betrach-
tet und vorzüglich bei chronischen Rheu-
matismen angewendet. — Gabe, eine
Drachme täglich vier Mal, in Sassafras-
thee.

Essentia s. Tinctura Sassafras s. Ligni
Sassafras composita. (Wirf.)

R. Cort. Ligni Sassafras
unc. quatuor.
Foliorum Salviae . . . uncias duas.
Nucis moschatae . . . unciam.
Cinnamomi . . . semunciam.
Anisi stellati . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . libras duas.

Post tres dies digestionis cola expri-
mendo et filtra. — Reizend, bei Gatar-
rhalbeschwerden, Gicht, Krankheiten von

Luftansammlung manchen Arten von Kräf-
te etc. — Gabe, fünfzig bis achtzig Tropfen.

Oleum Sassafras s. Lauri Sassafras s.
Ligni Sassafras aethericum, Aethereo-
leum Sassafras Ligni. (Ful. Hass. H.
Hass. P. HC. Li. Pal. Wirf. Würf.
AD. Am. Ams. Du. Ed. Fer. Gal.
GalP. Sar. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw.
T.)

R. Ligni Sassafras q. v.
Aquae q. s.
Destillant. (AD. Am. Ams. Du. Ed. C.)

Fu. Würf. et Sw. Ligni partem
unam et quatuor Aquae; — Pal.
Aquae sex; — Hanf. HC. Aquae octo
(caeterum ut ol. Caryophyllor p. sp.
= 1094 HC.); — T. Aquae quatuor,
unum diem macerationis, destillationem
dimidiae partis, cohobationem et se-
parationem olei; — GalP. ut oleum
Cinnamomi.

R. Ligni Sassafras . partes decem.
Aquae . . . partes viginti.
Salis culinaris . . . partem unam.

Post horas duodecim destillent et
oleum fundum petens colligatur. (Gal.)

Sar. Ligni partes tres Aquae viginti
quatuor et unam Salis; — Hass. Wirf.
et Pid. Ligni sex, Aquae triginta et
Salis tres; — Fi. Salis unam cum di-
midia, caeterum ut Fer; — Hass. P.
Ligni, Salis, sing. libras duas, Aquae
sedecim et repetitionem operationis cum
Aqua stillatitia etc.

R. Ligni Sassafras . . libras duas.
Alcoholis uncias octo.
Post duos dies adde

Aquae . . . libras duodecim.
Salis culinaris . . . libram,
Destillant. (Li.)
Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Oleosaccharum s. Elaeosaccharum Sas-
safras. (B*. Gr.)

R. Olei ess. Sassafras gutt. decem.
Sa chari albi . . drachmas tres.
Contere

Gr. Olei guttas sedecim, Magnesiae
alb. Sacchari, sing. unciam.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras.
(Gal. Sar. Dh. Fi.)

R. Ligni Sassafras . partem unam.
Aquae . . . partes octo.

Post horas duodecim [quadraginta
octo DB.] destillent partes quatuor.
(Gal. DB.)

Sar. Ligni partem unam, Aquae sex
et Salis parvam quantitatem; — Fi.
Ligni uncias sex, Aquae libras quatuor

cum dimidia, destillent in balneo aquae calido librae tres

Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras composita (Wirt.)

℞ Ligni Sassafras . . . semilibram.

Cinnamomi uncias tres.

Vini generosi libras decem.

Post aliquot dies digestionis destillet sesquilibra.

Satureja.

In den Pharmacopöen sind angegeben:

1) *Satureja hortensis*, L.; Gartensaturei, gemeines Pfefferkraut; Sarriette des jardins (Gal.); Savory (Ang.); Satureye (B.); Saer (D.); Ajedrea (His.); Koulen (S. I.); Santoreggia (I.); Ozabr (Pol.); Segureilha (Lus.); Kyn-del (Succ.).

At. Brt. Wirt. Wirt. Mf. Ams. B. Fer. GalP. His3. LP. Taur. br. Fi G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

2) (*Didymia Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Blackw. t. 419. Plenk t. 486. Hayne VI. t. 9 Zorn Ic. pl. t. 216.)

Das Kraut (*herba Saturejae* s. *Cunila sativa*) besteht aus einem sehr ästigen, vierkantigen, dünnen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, einfachen, lanzettigen, linienförmigen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften Geruch und einen etwas scharfen, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

3) *Satureja capitata*, L.; kopfförmige Saturei; Thym de Crète (Gal.).

Br. Wirt. Gal. His3. Taur. Be. Gr. Sp.

4) Eine Pflanze des südlichen und östlichen Europa's.

Man wendet das blühende Kraut (*herba et spica Thymi Cretaei s. veri*) an; es besteht aus einem dünnen Stängel mit kleinen, schmalen, entgegengesetzten, gefielten, punctirten Blättern und weißen, eine endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen starken und angenehmen Geruch und einen brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

5) *Satureja Thymbra*, L., Thymbra vera; Saturei; Sarriette de Crète (Gal.). Gal. H. S. Taur. Gr. Re.

6) Eine auf Crete wachsende Pflanze.

Das Kraut (*herba Saturejae cretaei*) hat kleine, eirunde und spizige Blätter.

Gr. führt außer diesen noch an: *Satureja durior*, frutescens, montana, spicata, Juhani.

Oleum Saturejae arthereum, *Aethere-oleum Saturejae*, (Pal.).

℞. Herb. floresc. *Saturejae* part. 25.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris . . . partes tres.

Post tres dies digestionis destillent.

Saxifraga.

Saxifraga granulata, L., weißer Steinbrech, Hunderebe, Reilhaut; Saxifrage blanche (Gal.); Common saxifrage (Ang.); Huid steenbraek (D.); Witte steenbreek (Bel.); Saxifraga branca (Lus.); steenbraecke (Succ.).

Br. Wirt. Mf. Gal. His3. Taur. Be. Gr. Re. Sp.

7) (*Hexandria Digynia*, L.; Saxifrageae, J.) Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (Blackw. t. 214. Plenk t. 345. Hayne III. t. 23. Zorn Ic. pl. t. 309.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Saxifragae albae*) besteht aus kleinen rundlichen Körnern von der Größe der Coriandersamen, welche unter einander mittelst Fasern vereinigt und mit einem rothen Zellchen bedeckt sind, welche man ehemals mit dem unpassenden Namen *sem n Saxifragae albae* belegte. Sie hat einen etwas stypischen und bitteren Geschmack, welcher sich bei m Trocknen verliert. — Das Kraut besteht aus einem ästigen Stängel mit nierförmigen, lappigen Blättern. Es hat einen scharfen, etwas sauren Geschmack, von welchem nach dem Trocknen fast keine Spur zurückbleibt.

Saxifraga aurea von *Chrysosplenium alternifolium* und *oppositifolium* (Gr. Re.). eröffnend, harntreibend, gegen Asthma und Brustkrankheiten. — *S. crassifolia* (Taur.), *Cotyledon*, *tridactylites*, *Geum* (Gr.). eröffnend, harntreibend, bei Gelbsucht, Obstructionen, Scropheln.

Succus Saxifragae. (DB.)

Paratur ut succus *Parietariae*.

Scabiosa.

In den Pharmacopöen sind angeführt:

1) *Scabiosa succisa*, L.; Teufelsabbiss; Scabieuse des bois, Mors du diable (Gal.); Devilshitt (Ang.); Czertkus (B.); Dievelshid (D.); Morisca de diavolo, Succisa (His.); Duivelsbeet (Bel.); Morso, Morsicatura del diavolo (I.); Cisyua (Po.); Morso de diabo (Lus.); Aug-

vaedd (Succ.); Fareblade (Nor.); Pupochnik (R.); Sikkantýd (Hu.).

Br. Wirt. M. An. Gal. LP. Taur. Be. Gr. Re. Sp. Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsacaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne V. t. 37. Düss. off. Ph. VII. t. 20. Zorn Ic. pl. t. 150.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Succisae s. Morsus Diaboli) ist kurz, faserig, außen gelblich, inwendig weißlich und in der Mitte wie benagt, indem sie am Ende jedes Jahres zum großen Theil abstirbt. — Das Kraut besteht aus einem einfachen, runden, behaarten, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen, welche an jedem Gelenke zwei kleine entgegengesetzte, lanzettförmige, ganze Blätter tragen. Es hat einen kaum merklichen Geruch und einen bitterlichen, süßen, stoptischen Geschmack.

Schwach abstringierend, aber wenig gebraucht.

2) *Scabiosa arvensis*, L.; Aker-scabiose; Scabieuse des champs (Gal.); Field scabious (Ang.); Kawias (B.); Scaburt (D.); Escabiosa (H.); Gemeen scharfkruud (Bel.); Scabiosa (I.); Dryakiew polne (Pol.); Escabiosa dos campos (Lus.); Aker-vaedd (Succ.).

At. Br. Wirt. Würt. M. Ams. Fer. Galp. His. Taur. Be. Br. Gr. Re. Sp. Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsacaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 447. Blackw. t. 185. Schk t. 22. Hayne V. t. 38. Zorn Ic. pl. t. 141.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel ist lang, dünn, weiß und hat keinen merklichen Geruch und einen bitteren, stoptischen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten, hohlen Stängel und eirundlanzettigen, gezähnten untern und wie gefiederten obern Blättern. — Die Blüthen sind blaspurpurroth.

Aqua Scabiosae. (Pal.)

R. Herbae Scabiosae partem unam.

Aquae partes tres.

Destillet dimidia pars.

Tisana Scabiosae arvensis. (Galp.)

Paratur ut tisana Cichorii.

Scammonium.

Scammoneum, Diacrydium, Resina s. Gummi-Resina Scammoniae s. Scammo-

neae; Σκαμμόνια; Scammonium, purgierender Bindensaft; Scammonée (Gal.); Scammony (Ang.); Skammonia (B.); Sukumunia (Ar. Duk.); Skammonium (D. Succ.); Escamonea, Scamonea (His. Lus.); Mehmudeh (Hin.); Scammonium (Bel.); Scamonea (I.); Skammonia, Sok suznikowy (Pol.).

Bat. Borst. Br. Hant. HassPt. HC. HN. Lit. O. Sax. Wirt. Würt. M. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Galp. Galp. His. L. H. Lon. N. LP. LPC. Lus. Pol. R. Succ. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Z.

Ein Gummiharz, von welchem man drei Sorten unterscheidet:

1) *Scammonium de Aleppo s. Aleppense s. Ha'epense s. Syriacum, Diagridium, Gummi-Resina Scammoniae s. Convolvuli Scammoniae, Scammonium von Aleppo, Scammonée d'Alep (Gal.)*, in regelmäßigen, aschgrauen, leichten, trocknen, sehr zerreiblichen Massen. Der Bruch ist glänzend, das Pulver bräunlichweiß, der Geruch stechend und etwas widerlich, der Geschmack scharf und bitter.

Es ist der getrocknete Milchsaft von *Convolvulus Scammonia*, L.; 4 (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.), einer Pflanze Syriens (Lenck i. 92. Mill. Diet. t. 102. Zorn Ic. pl. t. 214. Düss. off. Ph. IX. t. 3.)

2) *Scammonium Smyrnaeum, Scammonium von Smyrna, Smyrnisches oder Antiochisches Scammonium; Scammonée de Smyrne (Gal.)* ist schwerer, dichter, weniger zerreiblich, dunkler, von unangenehmerem Geruch und nicht so geschäftig wie das vorige.

Es kommt von *Periploca Secamone*, L. 4 (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaceae, J.) einer Pflanze Aegyptens. (Alp. de pl. Aeg. t. 48.) — Sibthorp leitet es von *Cynanchum Monspeliacum* her.

3) *Scammonium Monspeliacum; Scammonium von Montpellier; Scammonée de Montpellier (Gal.)*, ist ganz schwarz, sehr hart und dorb.

Es kommt von *Cynanchum Monspeliacum*, L., einem Strauche (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaceae, J.) des südlichen Frankreichs und Spaniens. (Sibthorp Fl. græc. t. 251. Jacq. Coll. II. t. 340. Cavan. Ic. rar. I. t. 60.)

Auch *Convolvulus Brasiliensis* soll eine Art *Scammonium* liefern, das sogenannte *Potatoes slip scammony (Gr.)*.

Ein drastisches Purgirmittel. — Gabe des Pulvers, drei bis fünfzehn Gran.

Diacrydium sulphuratum. (Pal^t. Wir^t. Sar. Taur. T.)

R. Scammonii pulverati . . q. v.
Supra chartam albam sparsum supra cratem, cui carbo urens est subditus, in quem sulphuris uncia successive infundatur, suffumigetur, agitando donec resina liquefieri et chartae adhaerere incipiat.

Diacrydium s. Diagrydium glycyrrhizatum s. Liquiritia edulcoratum. (Wir^t. Sar. Taur.)

R. Scammonii . . . semilibram.
Decocti Liquiritiae . . libram.
Contere, sepe, liquorem vaporando ad siccum redige et residuum pulvera.

Diacrydium rosatum obtines, si loco decocti liquiritiae Infusum Rosarum; *Diagrydium cydoniatum*, si loco infusi Succum Cydoniorum depuratum (Scammonii libram, Succu uncia octo Gr. Succu partem unam, Scammonii duas Re.) adhibes.

Resina Scammonii. (Ful^t. Pal^t. Sax^t. Wir^t. Ams. An. Gal. GalP. R. Br. Gr. T.)

R. Scammonii pulverati partem unam
Alcoholis (0,907) . . partes sex.
Dissolve, filtra liquorem et destillando dimidium abstrahere; resinam e residuo Aquae ope praecipitatum bene ablue et blandissimi caloris ope sicca. (Br^t. Sax^t. Wir^t. Ams. An. Gal. R. Br.)

GalP. ut resinam Jalapae; — Pal^t. tincturam destillando ad perf. siccitatem redigere, et residuum siccatum pulverare; — T. Scammonii uncias sex cum Alcoholis diluti 25° B. per plures vices calide digerere, liquoribus commixtis destillatione ad dimidium redigere et residuum ad extracti consist evaporatum in rotulas formare, quae super charta uncta aëris vel vaporatorii ope siccantur.
Gabe, drei bis zehn Gran.

Pulvis hermodactylatus, s. Scammoneae s. e Scammonio s. Scammonii s. Scammoneae compositus s. catholicus s. caryocostinus s. Diacarthami s. purgans, Species caryocostinar. (AD. Am. An. Ed. Fer. His3. LonN. LPC. Lus. Pm. Sar. C. CG. DB. Gr. Re. Va. Vm.)

R. Scammonii,
Cremoris Tartari, sing. part. aeq.
Misce trititando. (AD. Am. Ed. Lus. C. Gr. Re.)

Fer. Scammonii, Tartari, Sacchari, singulorum grana octo.

R. Scammonii,
Extr. Jalappae sicci, sing.

Zingiberis . . . part. quatuor.
Fiat pulvis. (AD. LonN. LPC. CG. Gr. Re.)

Va Scammonii, Extr. Jalap., sing. grana decem, Zingiberis tres.

R. Scammonii . . . semunciam.
Radice Mechoacananae,
— Jalapae, sing. drachm. sex.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Misce. (H s3.)

R. Scammonii,
Hermodactylorum, sing. unc. duas.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . . . unciam.
Fiat pulvis. (An.)

R. Cinnamomi,
Costi Arabici,
Zingiberis, sing. . . partem unam.
Hermodactylorum,
Scammonii, sing. . . partes duas.
Fiat pulvis. (Vm)

R. Hermodactylorum,
Sacchari albi, sing. drach. decem.
Radice Turpethi,
Scammonii, sing. . . drachmas sex.
Radice Zingiberis drachmas tres.
Fiat pulvis tenuis. (Pm. DE.) (Dj—iv.)

R. Seminum Carthami drachmas sex.
Gummi Tragacanthae,
Hermodactylorum,
Scammonii, sing. . . semunciam.
Cinnamomi,
Liquiritiae, sing. drachmas duas.
Turbit unciam.
Fiat pulvis. (Sar.)

Dieses Pulver hat Aehnlichkeit mit dem pulvis cornachini. — Gabe, zehn bis fünfzehn Gran.

Pulvis antarthriticus s. antarthriticus purgans. (Ca. Sp.)

R. Seminum Cardui benedicti,
— Carthami,
Scammonii.
Radice Sarsaparillae,
— Chinae,
Ligni Guajaci, sing. semunciam.
Cremoris Tartari,
Fol. Sennae, sing. . . . unciam.
Cinnamomi . . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Sp.)

Ca. Seminum, sing. drachmas decem,
Salis et Sennae, sing. semunciam,
Scammonii, Sarsaparillae, Chinae et Guajaci, sing. drachmas duas et Cinnamomi drachmam.

Pulvis e Scammonio cum Aloë (Gr.):
Scammonii drachmas sex, Extr. Jalap.
duri, Aloës Succotr., sing. sesquiun-
ciam, Zingib. semidrachmam.

Pulvis Scammonii et Calomellis (Va. Hosp. Angl.): Scammonii drachmam,
Calomellis, Sacchari, sing. semidrach-
mam. Misce, divide in part. 28. —
Ein oder zwei Stück täglich.

Pulvis purgans. (Va. Hosp. Angl.):
Scammonii grana quinque, Rhei quin-
decim, Subcarb. Ammoniaci sex; misce. — Auf einmal.

Pilulae resolventes. (Ca.)

℞. Extracti Gentianae semunciam.
Fellis Tauri . . . drachmas tres.
Scammonii . . . drachmas duas.

Fiant pilulae centum sexaginta duae.
— Gabe, vier bis sechs Stück täglich nüch-
tern oder vor dem Mittagessen.

Pilulae Extracti catholici s. purgantes.
(Ams)

℞. Extr. Aloës gummi . . . unciam.
— Heliebori nigri drach. duas.
Extr. Colocynthidis . . . drachmam.
Scammonii . . . drachmas tres.
Fiat massa pilularis

Tabellae Diacarthami s. Scammonii et
Sennae purgantes s. de Scammonio et
Senna compositae s. purgantes com-
positae. (Gal. Sar. Pic. Ae. T.)

℞. Pulv. Diacarthami (Sar.) unc. tres.
Sacchari pulverati . . . libram.
Mucilag. G. Tragacanth. . . q. s.
Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Cremoris Tartari . . . semunciam.
Scammonii . . . drachmas tres.
Sacchari albi . . . uncias octo.
Ol. ess. Cinnamomi gutt. quatuor.
Aqua Rosarum . . . q. s.

Fiant tabellae drachmae unius. (Pic.)
℞. Scammonii . . . drachmas tres.
Fol. Sennae drach. quatuor e. dim.
Rhei . . . sesquidrachmam.
Cort. Citri conditi . . . unciam.
Sacchari . . . unc. sex et drach. sex.
Mucilag. G. Tragacanth. c. Aqua

Cinnam. par. q. requiritur.
Fiant tabellae drachmarum sex. (Gal.)

T. tabellae scrupulorum quatuor pa-
rare; — Re. Caryophyll. arom. drach-
mam, Sacchari uncias sex, reliqua ut
Gal.

Gabe, zwei bis sechs Drachmen und mehr.

Electuarium caryocostinum, Caryocosti-
nium (Taur. Gr. Vm.)

℞. Pulv. Scammonii comp.
part. unam.
Mellis albi . . . partes sex.

Misce. — Purgirend. — Gabe, eine
bis sechs Drachmen

Gr. Scammonii, Hermodactyl., Ca-
ryophyll. arom., Zingib., sing. drach-
mas sex, Olei Carvi unam, Mellis li-
bram; — Taur. Costi amari, Cumin,
Zingib., Caryophyll., sing. semunciam,
Hermodactylor., Scammonii sulphura-
ti, sing. unciam, Mellis albi despum.
libram, m. scere, ut f. elect.

Scammonium Smyrnenae factitium
(Gr.): Scamm. Alepp. unc. octo, Rad.
Jalapp. libr. quatuor, Fol. Senn. Ebor.
ust. sing. libram, Zingib. unc. duas,
Manna commun. libr. tres, G. Gutt. libr.
duas, Syr. Spin. cervin. tantidem; vel:
Rad. Jalapp. libr. duas, Fol. Sennae,
Scamm. Alepp., G. Gutt., sing. unc.
octo, Ebor. ust., Zingib., sing. qua-
tuor; vel: Scamm. Alepp. libram, Extr.
Jalapp. quinque, G. Guajac. decem,
Sago tantidem, Ebor. usti quatuor.

Electuarium hydragogum. (Br., Ca.)

℞. Scammonii,
Rad. Jalappae, sing. drach. duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Resinae Jalappae semidrachmam.
Syrupi Rhamni cathart. . . q. s.
Purgirend. — Gabe, bis vier und zwanzig Gran bei sogenannten arthenischen Waf-
ferjudten.

Electuarium Scammonii s. e. Scammo-
nio s. purgans, Confectio Scammoneae
s. Scammonii (AD. Am. Du. Lon.
LonN. LPC. C. CG. Gr. Ra. Re. Sp.
Va. Vm.)

℞. Scammonii,
Zingiberis, sing. unc. (drach. Gr.)
unam.
Olei Caryophyllorum scrupulum.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Misce. (AD. Am. Du. C. Va.)
℞. Scammonii . . . sesquiunciam.
Caryophyllorum,
Zingiberis, sing. . . drachmas sex.
Olei Carvi . . . semidrachmam.
Syrupi Rosarum q. s. (libr. dim.
Gr.)

Fiat electuarium. (Lon. LonN. LPC.
CG. Gr. Re.)

Gr. praete ea sec. Lon. 1745. loco
syrupi rosarum Mellis sem libram, cae-
terum ut antea; vel: Scamm. Alepp.,
Piment., Rad. Glycyrrh., sing. unc.
duodecim, Zingib. libram et unc. octo,
Ol. Carvi sesquiunc., Ol. Caryophyll.
drachm. duas, Mellis libras duodecim;
vel: Rad. Jalapp., Zingib., sing. ses-
quiunc., Scammon. drach. sex, Ol.
Carvi duas, Ol. Caryophyll. gutt. se-
decim, Mellis libram et uncias octo.

R. Coriandri . . . drachmas duas.
 Carvophyllorum,
 Zingiberis, sing. . . drachmas sex.
 Scammonii . . . sesquiunciam.
 Syrupi Rosarum . . . q. s.
 Misce (Vn.)

R. Scammonii . . . semunciam.
 Radicis Jalapae . . . uncias quatuor.
 Amygdalas dulces . . . no. 20.
 Foliorum Sennae . . . uncias duas.
 Anisi,
 Cremoris Tartari, sing. . . unciam.
 Pulvae Prunorum uncias sedecim.
 — Tamarinderum uncias octo.
 Misce. (Sp.) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium Diaphoenix s. Diaphaenicum s. Scammonii et Turpethi compositum. (GalP. Sar. Taur. Re.)

R. Pulvae Dactylorum . . . libram.
 Turpethi . . . uncias quatuor.
 Liquiritiae . . . uncias duas.
 Scammonii . . . sesquiunciam.
 Mellis depur. libr. duas e dimid.
 Coque pulvam cum melle ad consumptionem humidi superflui et adde pulveres. (Sar. Taur.)

R. Pulvae Dactylorum semilibram.
 Amygd. dulc. excoct. unc. tres e dim.
 Sacchari pulverati . . . semilibram.
 Mellis depurati . . . libras duas.
 Pulv. Zingiberis,
 — Piperis,
 — Macidis,
 — Cinnamomi,
 — Foliorum Rutae,
 — Sem. Dauci Cretici,
 — — Foeniculi, sing. . . drach. duas.
 — Rad. Turpethi unc. quatuor.
 — Croci . . . grana sex.
 — Scammonii . . . sesquiunciam.
 Misce bene. (GalP. Re.) — Gabe, von einer halben Drachme bis zur halben Unze.

Pruna praeparata s. purgantia. (Fi.)

Parantur e Prunis perniconis dicti, nucleum eximendo et loco ejus bolum e Scammonii granis decem et Conervae Violarum q. s. paratum ingerendo. — Auf einmal.

Tinctura Scammonii. (Gal. GalP. DB. T.)

R. Scammon. grossiusc. tritur.
 part. unam.
 Alcoholis (22°) . . . part. s. quatuor.
 Digere per tres dies et cola. — Gabe, zwanzig Tropfen bis eine Drachme.
 GalP. ut tinct. Benzoes; — T. DB. Scammonii sesquiunciam, Alcoholis 25°

libram et digestionem per dies decem.
 — Nicht über einen Scrupel und mit einer Emulsion.

Elixir polychrestum Halense. (Wirt. Sp.)

R. Extracti panchymagogi unciam.
 Alcoholis . . . uncias sex.
 Dissolve et solutioni adde
 Acidi sulphurici . . . drachmas tres.
 Filtra. (Wirt. Sp.)

R. Extracti panchymagogi unciam.
 Mixturae simplicis . . . uncias sex.
 Dissolve (Wirt.)
 Purgierend. — Es war lange ein Geheimmittel. Die Kermel ist von Triller.
 — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen und mehr.

Oleum purgans. (Sw. Va.)

R. Scammonii . . . scrupulos quatuor.
 Olei Amygd. dulc. unc. quatuor.
 Dissolve blandi caloris ope. — Mitztes Purgirmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen, in Emulsion oder mit syrupus papaveris.

Syrupus drasticus. (Bo.)

R. Syrupi Limonum uncias quinque.
 Scammonii pulv. drach. quatuor.
 Croci Martis aperientis,
 Antimon. crudi porphy., sing. . . drach. duas.

Misce exacte.

Syrupus de Scammonio s. Scammonii compositus, Syrupus ad arthritidem et hydropem s. antarthriticus vel antihydrops. (Gal. Ca. DB. Fi. T. Vm.)

R. Scammonii pulverati semunciam.
 Sacchari albi . . . uncias quatuor.
 Alcoholis (22°) . . . uncias octo.
 In pelvim argenteamingere. supra ignem collocandam et simulac massa aliquanto est calefacta, cerei flamma admoveatur ut liquor incendatur; agita continue spatula, donec flamma extinguatur, ab igne vase remoto; liquori refrigerato et per pannum colato adde

Syrupi Violarum uncias quatuor.

Serva. (Gal)

Fi. Alcoholem 20° adhibet; — T. Scammonii drachmas sex. Sacchari uncias sex, Alcoholis duodecim, Syrupi Violarum sex; — DB. Sacchari, Syrupi, sing. uncias sedecim. Scammonii duas, Alcoholis 32° B. triginta duas; — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze (bis eine Unze. T.).

R. Scammonii pulv. partem unam.
 Aquae Vitae . . . partes sedecim.
 Dissolve, liquori ignem admove et flammam sponte extincta, per lintem trajice et adde

Syrupi Violarum . . partes octo.
 Serva. (Im.)
 R. Gummi Arabici . . partem unam.
 Scammonii . . . partes duas.
 Misce trititando et cum
 Aquae s. q.
 emulsionem spissam para, cum qua
 commisce
 Syrupi Violarum . . partes viginti.
 Serva. (Vm.)

Potio purgans, Mistura cathartica Arabica. (Ca.)

R. Aquae Florum Aurantiorum,
 Syr. Flor. Persic. e, sing. unciam.
 Spir. Rorismarini . . drachmam.
 Scammonii . . . grana duodecim.
 Misce.

R. Syrupi Limonum . . . unciam.
 Sulphureti Antimon. gr. duodecim.
 Scammonii scrupulum.
 Misce. — Auf ein Mal. — Die zweite
 Formel wurde besonders gegen Wassersucht
 gepriesen.

Emulsio purgans. (Gal. GalP. Re.)

R. Scammonii . . . grana duodecim.
 Sacchari albi . . drachmas duas.
 Vitelli Ovi part. ½.

Tere, sensim addendo
 Emulsionis simpl. uncias quinque.
 Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
 (Gal. Re.)

R. Scammonii . . . grana duodecim.
 Sacchari semunciam.
 Lactis vaccinae . . . uncias quatuor.
 Aquae Laurocerasi drachmas duas.
 Misce. (GalP.)

Emulsio vermifuga. (Sa.)

R. Nucleorum Persicarum,
 Amygd. amar., sing. drach. duas.
 Scammonii . . . semiscrupulum.
 Aquae Absinthii . . . uncias tres.

Scilla.

Scilla maritima, L.; Meerzwiebel,
 Mauszwiebel; Seille, Oignon marin
 (Gal.); Squil, Sea onion (Ang.); Alas-
 chil (Ar.); Merska cybule (B.); Strand-
 laeg (D.); Escilla, Gebolla albarrana
 (His.); Zeaujuin (Bel.); Scilla, Pan-
 crazio, Cipolla marina (I.); Korzen ce-
 bulimorskiey (Pol.); Albarra, Gebolla al-
 barrá, Esquilla (Lus.); Sjælaek (Succ.).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Fu†.
 Han†. Has†. HC†. HN†. O†. Sax2†.
 Wir†. Wür†. WW†. M†. AD. Am.
 Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn.
 Fer. GalM. GalP. Gen. Hi. S. LonN.

LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Succ.
 Taur. he. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par.
 Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.

4 (Hexandria Monogynia, L.; Aspho-
 delea, J.) Eine im südlichen Europa am
 Meeresufer wachsende Pflanze. (Blackw.
 t. 591. Plenck t. 271. Eeri. Bild. VIII.
 17. Düss. off. Pfl. I. t. 2. Fl. méd. VI.
 318.)

Man wendet die Zwiebel (radix Scillae
 s. Scillae marinae s. Squillae s. Sci-
 lae rubrae s. Pancratii veri) an; sie ist
 birnformig, sehr groß und mit mehreren
 trocknen, dünnen, papierartigen Häuten be-
 deckt, unter denen man eirunde, fleischige,
 rotte oder weiße Schuppen findet. Ihr
 Geruch ist heftig, der Geschmack anfangs
 schleimig, wird aber dann bitter, scharf und
 widerlich. Man wendet nur die rotte
 Spielart an.

Die Meerzwiebel enthält, nach Boget,
 außer Schleimbarz, holzigen Bestandtheilen
 etc., einen eigenthümlichen bitteren Stoff,
 Scillitin, (Scillitimum) Scillitine
 (Gal.), welcher den Grund ihrer Wirksam-
 keit enthält. Nach Zilly besteht dieser
 Stoff aus nicht kryallisirbarem Zucker und
 zwei Stoffen, einem sehr bitteren und einem
 außerordentlich scharfen.

In Indien bracht man, nach Kinstle
 (Gr.), statt der Meerzwiebel die Zwiebel
 von

Erythronium Indicum, Rotler; Un-
 sul; Iskil (Ar.); Nurriala (Cy.); Junglie
 piaz (Duk.); Kanda (Hin.); Peyaz
 ideschti (Pe); Nurry vungvum (Tam.);
 Addivitella guddalu (Tel.).

Einige Schriftsteller haben behauptet,
 die Meerzwiebel wachse in Ceylan, allein
 White von Bombay ist der Meinung, daß
 man Amayllis zeylaniä dafür genom-
 men habe.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, bei
 Wassersucht und chronischen Catarrhen in
 Gebrauch. — Gabe des Pulvers, ein bis
 zehn Gran.

§. I. Präparate, welche die Meerzwie-
 bel in Substanz enthalten.

Scilla praeparata, Pulvis Scillae. (His.
 RC. Fi. Re.)

Bulbos Scillae, remotis squamis ex-
 ternis, virgulis penetratos in evapora-
 torio vel forno parum calido sicca,
 contunde in mortario, denuo in eva-
 poratorio calefacto contunde et pul-
 verem per setaceum trajiciens penitus
 siccatum serva (Fi.); — His. squa-
 mas, externo cortice et medulla ab-
 latis, filo trajecto, solis radiis expone-
 re vel transversim in frustula sectas

lenissimo calore exsiccare; — RG. in taleolas transversim sectos leni calore vel balnei aquae vel aestivo soli expositos vel in loco temperate calido exsiccare, ut fiant friabile, tunc in pulverem terantur etc.

Succus Scillae. (Taur.)

Scillae recentes, farina subacta, singulae obducantur et in furno vel sub cineribus calidis coquantur, quas satis assas aestimabis, cum indita festuca facile in eas penetraverit. Hinc dempta omni crusta in pila lapidea molliter tundendae sunt, postea in vase vitreo inclusae tepido loco reponendae, donec fermentescere incipiant, tum praelo succus exprimendus et percolandus.

Pulpa Scillae (GalP. DB. Fi. T.)

R. Bulborum Scillae . . . q. v.
Rad. cibis et tegminibus externis semotis, rel qua inter chartam inclusa coque inter cineres calidos, donec bulbus facile inter manus conteri possit; tunc partibus combustis separatim, medias in mortario marmoreo contunde et per cribrum arct. textum trajiciendo, pulpan para. (Fi.)

Involvi quoque potest bulbus strato tenui pastae farinaceae et sic inter cineres vel in furno coqui. (GalP. DB. T.)

Trochisci de Scilla Damocreatis s. scillitici. (Pal. Wir. His. Sar. Taur. Sp.)

R. Scillae . . . uncias duodecim
Contunde in mortario, addendo
Farinae Orobi vel Lupini . . . unc. octo.

Divide massam in trochiscos drachmarum duarum. (Pal. Wir. Sp.)
His. Sar. Taur. loco farinae Pulverem Radicis Fraxinellae adhibent.

Pulvis Scillae. (Va. Hosp. Angl.)

R. Scillae . . . drachmam.
Tartratis Potassae drachmas novem.
Misce. — 10—30 Gran täglich zwei oder drei Mal, als diureticum. (10 Gran enthalten 1 Gr. Scille.)

Pulvis Scillae compositus s. compositus Stahl i. (BorG. Br. Ful. Pal. Wir. Wür. Au. B. DD. Fenn. Gen. LoP. LP. Sar. Suec. Ca. E2. Pid. Sa. Sm. Sp. Siv. Vm.)

R. Pulveris Scillae,
— Ipecacuanhae, sing. unciam.
Sacchari albi . . . uncias quatuor.
M. f. pulvis. (LoP.)
R. Scillae . . . partes sex.
Radicis Vincetoxici partem unam.
Fiat pulvis. (Ca. Su.)

Br. Pal. Wir. Sar. et Sp. Scillae
partes tres et unam Vincetoxici; — B.
Scillae partes duas et unam Vincetoxici.

R. Scillae . . . partem unam.
Radicis Vincetoxici . . . partes sex.
Nitri depurati . . . partes octo.
Fiat pulvis. (Pid.)

R. Scillae . . . partem unam.
Nitri . . . partes quatuor.
Fiat pulvis. (Sm.)

E. Scillae partem unam et Nitri sex
(E2. quinque), f. pulv. vi.; ein Stück
täglich zwei Mal in Zuckerwasser; — Gen.
Scillae unam et octo Nitri.

R. Scillae . . . drachmam.
Nitri . . . drachmas duas.
Cinnamomi . . . scrupulum.
Fiat pulvis. (Wür.)

LP. Squillae scrupulos duos, Pulveris arom. drachmas duas, Nitri tantidem; — w. Scillae grana decem, Nitri quindecim et Piperis Jamaicae quinque; — w. Scillae, Piperis Jamaicae, sing. decem et Nitri quindecim.

R. Scillae . . . partem unam.
Nitri,
Cremoris Tartari, sing. partes sex.
Fiat pulvis. (Pie.)

Pie. praeterea: Scillae partes sex, Nitri duodecim et Cremoris Tartari viginti.

R. Scillae . . . partem unam.
Nitri . . . partes tres.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Pulveris aromatici . . . partes duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

R. Scillae . . . partem unam.
Crem. Tart. part. viginti quinque.
Elaeosacch. Foenic. part. quinque.
Fiat pulvis. (DD.)

R. Scillae,
Zingiberis, sing. grana duodecim.
Kali sulphurici . . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

R. Scillae . . . partem unam.
Pulveris aromatici . . . partes duas.
Nitri . . . partes tres.
Sulphatis Potassae partes quatuor.
Fiat pulvis. (Vm.)

R. Natri acetici,
Elaeosacch. Junip., sing.
drach. tres.

Scillae . . . grana sex.
Radicis Calami . . . semigranum.
Opii . . . grana tria.
Fiat pulvis in partes sex dividendus.
(BorG.)

R. Scillae . . . grana duo.
Fol. Digitalis purp. . . granum.
Tartari depurati sesquidrachmam.
Fiat pulvis. (B.)

R. Scillae,
Digitalis purp., sing. . . granum.
Olei Juniperi . . . guttas duas.
Tartari boraxati,
Liquiritiae, sing. . . scrupulum.
Cinnamomi . . . grana duo.
Misco. (B*)

Harntreibend. — Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

R. Scillae . . . grana duo.
Bacc. juniperi grana octodecim.
Auf eine Gabe. (Auf.)

R. Scillae . . . grana quindecim.
Iridis Florentinae,
Liquiritiae, sing. . . grana decem.
Sacchari Lactis . . . scrupulos duos.
Olei Anisi . . . guttas tres.
Fiant doses tres. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück (Auf. 1 a.)

R. Acetatis Sodae,
Flaeosacch. Juniperi, sing.
drach. tres.
Scillae . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . grana tria.

Fiant doses sex. — Gabe, drei Stück täglich in Wachholderthee. (Auf.)

Pulvis diureticus. (Va. Par. Hosp. Angl.)

R. Scillae . . . scrupulum.
Opii . . . grana quatuor.
Cinnamomi . . . drachmam.
M. Divide in partes octo. — Zwei Stück täglich bei Wasserflucht (jedes Pulver enthält 3 Gr. Equille)

Par. Cremoris Tartari drachmam,
Scillae grana tria, Zingiberis grana quinque. — Alle 6 Stunden ein Pulver.

Boli scillitici s. ad s. contra oedema pulmonum (Pie. Ra. Va.)

R. Scillae pulveratae . . grana sex.
Sulphatis Potassae . . grana duo.
Oxymellis scillitici . . . q. s.

Fiat bolus. (Ra. Va. Hosp. Mat)

R. Radicis Vincetoxici semunciam.
Salis Absinthii . . . drachmam.
Syrupi Valerianae . . . q. s.

Fiant boli viginti quatuor. (Pie.)

Pilulae e Scilla s. scilliticae s. Scillae ammoniacales s. scillinae s. stimulantia s. Scillae compositae s. Scillae cum Zingibere, Massa Pilularum scilliticarum. (BorCt. Brt. Pul. Hanf. Has. Hnt. Lit. Wir. Wür. Auf. Huf. AD. Am. Ams. An. B* Bel. D. Du. Fer. Gal. GalM. Gen. His LH. LonN. LP. LPC. Lus. RC. Sar. Taur. Br. C. Ca. CG. Fi. Gr. Pid. Pic. Re. Sp. Sw. Va. Vm.)

1) Ohne Geisse.

R. Pulveris Scillae . . sesquunciam.
Gummi Ammoniaci semunciam.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiat massa pilularis (Gal. GalM.)
Fer. Scillae pulv. G. Ammoniaci partes aeq. et Balsami Copaivae q. s.
R. Scillae pulveratae semidrachmam.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Nitri depurati . . . drachmam.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum quatuor (Gen.)

R. Gummi Ammoniaci,
Scillae siccatae, sing. partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiat massa pilularis (Ams.)
Pul. et Lit. Trium substantiarum, sing. partes aequales cum Oxymelle scillitico; — Lus. et Ca. partes aequales cum Syrupu Sacchari; — LP. G. Ammoniaci, Scillae, sing. scrupulos duos, Pulveris aromat. unum, Oxymellis scillitici q. s. ut fiat massa in pilulas ponderis granorum duorum dividenda; — Wür. et Pic. Partes aequales cum Balsamo Copaivae; — Has. et Pid. Partes aequales absque syrupo et balsamo; — Auf. Scillae, G. Ammoniaci, sing. partes duas et unam Cardamomi absque oxymelle syrupo et balsamo.

R. Scillae pulveratae partem unam.
Gummi Ammoniaci,
Cardamomi minoris,
Extr. Liquiritiae, sing. partes tres.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
Fiat massa pilularis. (An. Br. Gr. Sw.)

R. Scillae pulveratae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum, sing. . partes octo.
Cardamomi minoris partes duas.
Balsami Copaivae partem unam.
Fiat massa pilularis. (Brt.)

2) Mit Geisse.

R. Scillae pulveratae . . drachmam.
Saponis albi grana viginti quatuor.
Fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)

R. Saponis albi . . partes septem.
Gummi Ammoniaci . partes tres.
Scillae pulveratae,
Bals. Copaivae, sing. part. unam.
Fiat massa pilularis. (His.)

R. Saponis albi . . partes duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulv., sing. partem unam.
Emuls. spissae Bals. Copaivae q. s.
Fiat massa pilularis. (Vm.)

R. Saponis . . partes duas.
Scillae pulveratae,
Nitri, singulorum partem unam.
Balsami Copaivae . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quatuor.
(Ca.)

R. Saponis Hispanici . partes octo.
Gummi Ammoniaci,
Radice Vincetoxici,
Scillae, singulorum . semunciam.
Balsami Copaivae . . drachmam.
Fiat massa pilularis. (D.)

R. Saponis albi,
G. Ammoniaci, sing. drach. duas.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Scillae siccatae grana duodecim.
Alcoholis q. s.
Fiant pilulae granorum duorum.
(BorCt. Auf.)

AD. LonN. CG. Gr. Re. Va. Saponis,
Zingiberis, sing. partes tres, Gummi,
Ammoniaci duas, Scillae unam et Sy-
rupi Sacchari q. s.; — LPC. Zingibe-
ris partes duas; — Du. C. Gr. Scillae
drachmam, Zingiberis duas, Olei Anisi
gutt. decem et Gelatinae Saponis q. s.;
— Br. Scillae drachmam, Zingiberis,
Saponis, sing. tres, G. Ammoniaci duas
et Syrupi Zingiberis q. s.; — Ca. Sa-
ponis, Zingiberis, sing. drachmas tres,
G. Ammoniaci duas, Scillae unciam et
Syrupi Sacchari q. s.; — Hanf. HNf.
Scillae drachmam, Zingiberis, Saponis,
sing. tres, G. Ammoniaci duas et Mu-
cilag. Gummi Arabici q. s.

R. Scillae siccatae et pulveratae,
Gummi Ammoniaci, vel
Asae foetidae,
Pulveris aromatici, vel
— Zingiberis, vel
— Cardamomi,
Saponis oleosi, sing. . part. aeq.
Tincturae aromaticae, vel
— Guajaci volatilis, vel
Syrupi simplicis q. s.
Fiat massa. (RC.)

R. Scillae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum, sing. . semunciam.
Saponis unciam.
Balsami Copaivae . drachmam.
Fiant pilulae granorum decem. (Wirt.
Huf. B. Sar.)

Taur. Fi. eandem formulam sed Bal-
sami Copaivae q. s. ut fiat massa pi-
lularis.

R. Saponis Veneti drachmas duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
Millepedum, sing. . drachmam.
Olei Anisi guttas septem.
Mellis rosati q. s.
ut fiant pilulae ponderis grani unius.
(B.)

Bel. Pie. et Sp. eandem formulam
sed loco balsami copaivae Oxytel scil-
liticum adhibent.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Die Gabe dieser Pillen ist im Allgemei-
nen sechs bis funfzehn Gran

Pilulae desobstruentes s. diureticae s.
diureticae resolventes. (B. Ca. Gr.
Sw.)

R. Gummi Ammoniaci,
Saponis medic., sing. sesquidrach.
Scillae pulveratae,
Pulveris arom., sing. semidrach.
Olei ess. Junb. gutt. viginti.
Syrupi Cort. Aurant. q. s.

Fiant pilulae quinque granorum. —
Gabe, vier Stück alle drei Tage, bei Bleich-
sucht und chronischen Leberkrankheiten.

R. Saponis medicinalis,
Extr. Taraxaci, sing. drachmam.
Natri sulphurici scrupulos quatuor.
Scillae grana sedecim.
Mellis q. s.

Fiant pilulae quatuor granorum. —
Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (B.)

R. Scillae siccatae . . grana duo.
Pilul. Hydrarg. . grana quinque.
Opium granum dimidium.

F. pil. no. 1. Zur Nacht, drei oder
vier Nächte hinter einander. (Gr.)

Pilulae pectorales. (Sw.)

R. Gummi Ammoniaci,
Sulphat. Potass., sing. drach. sex.
Rad. Iridis Flor. . . semunciam.
Scillae drachmas duas.
Saponis albi uncias duas.
Extracti Rhoeados q. s.

Fiant pilulae quinque granorum. —
Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae phytagogae. (Wirt. B. Sm.
Sw.)

R. Scillae,
Extr. Elaterii, sing. semunciam.
Acidi succinici . . . drachmam.
Sulph. Antimon. aur. . semidrachmam.

Fiant pilulae granorum trium. (W.)

R. Scillae semunciam.
Sulphuris Antimonii aurati,
Acidi succinici, sing. drachmam.
Extracti Elaterii . . semunciam.
Olei Anisi guttas aliquot.
Succi Liquiritiae q. s.

Fiant pilulae centum quinquaginta.
(Wirt. B. Sm.)

Pilulae hydragogae s. scilliticae com-
positae. (Ca. Pid. Pie. Va.)

R. Extr. Colocynthidis
drach. quinque.

Scillae drach. quinque c. dimid.
Fiant pilulae ducentae. (Pie. Va.

Hosp. Monspel)

℞. Scillae pulveratae,
Mercurii dulcis, singulorum drach-
mas duas cum dimidia.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiant pilulae centum. (Pic.)

℞. Scillae,
Extr. Trifolii, sing. sesquidrach.
Digitalis purpureae,
Asae foetidae, sing. . drachmam.
Fiant pilulae centum. (Ca.)

Va. Scillae pulv., Digitalis purp.,
Extracti Trifolii, sing. drachmam. M.
fiant sec. a. pil. no 72. Drei bis neun
Stück täglich bei Wasserfucht. (Jede Pille
enthält 1 Gran Squille.)

℞. Extr. Taraxaci drach. tres c. dim.
Saponis Hispanici sesquidrachmam.
Galbani . . . drachmas duas.
Scillae . . grana viginti quatuor.
Mercurii dulcis . . grana sedecim.
Camphorae . . . scrupulum.

Essentiae Aurantiorum . . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. (Pic.)
Gabe, vier Stück Morgens und Abends

℞. Asae foetidae . . drachmas duas.
Saponis medic. . . drachmam.
Camphorae . . . semidrachmam.
Scillae . . . grana duodecim.
Olei Juniperi . . . guttas viginti.

Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, zehn Stück, Morgens und Abends.
(Auf.)

℞. Asae foetidae,
Extr. Valerianae, sing. drach. duas.
Scillae,
Opii, singulorum . . grana decem.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, wie bei den vorhergehenden. (Auf.)

Pilulae diureticae. (B. Ca. Par. Sm.
Va.)

℞. Cremoris Tartari drachmas quatuor.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Croci pulverati . . scrupulos duos.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiant pilulae sexaginta. (Ca. Sm.)

℞. Scillae . . . grana viginti.
Digitalis purp. grana octodecim.
Roob Juniperi . . . q. s.
Fiant pilulae decem. — Gabe, ein
Stück alle zwei Stunden. (B. Va.)

℞. Scillae siccae . . grana quatuor.
Digitalis . . . semiscrupulum.
Mercurii dulcis . . grana sex.
Myrrhae . . . scrupulum.
Gummi Asae foetid.
semidrachmam.

Extracti Gentianae . . . q. s.
ut F. Pilul. No. 15. — Ein Stück Mor-
gens und Abends. (Par.)

℞. Pulv. Millepedum drachmas duas.
Scillae pulv. . grana triginta sex.

Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Myrrhae . . . drachmam.
Roob Juniperi drachmas quatuor.
Fiant pilulae trium granorum. (Sm.)

Pilulae expectorantes. (E2. Gr. Par.
Va.)

℞. Myrrhae . . . sesquidrachmam.
Scillae . . . semidrachmam.
Extracti Hyoscyami scrupulos duos.
Aqua . . . q. s.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, zwei
Stück Morgens und Abends, bei Phtisis
und Catarrh mit großer Schwäche der Lun-
gen. (E2. Gr. Par. Va.)

E2 Scillae grana triginta, Ammo-
niaci sesquidrachmam, Extracti Conii
grana triginta. F. no. 30. Zwei Stück
täglich zwei Mal, bei Asthma und chroni-
schem Catarrh. (Pil. Squill., Ammon.)

Pilulae incisivae. (Ca. Pic.)

℞. Scillae . . . drachmam.
Kermes mineralis . . grana octo.
Extracti Opii gummosi grana sex.
Butyri Cacao . . . q. s.
Fiant pilulae triginta sex. (Ca.)

℞. Scillae . . . semunciam.
Ipecacuanhae . . drachmas duas.
Extr. Opii gum. gr. quindecim.
Butyri Cacao . . . unciam.
Syrupi Gummi . . . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.)

℞. Scillae . . . grana sex.
Succini . . . grana quindecim.
Ipecacuanhae . . . grana duo.
Conservae Inulae . . . q. s.

Fiant pilulae novem. (Pic.) — Gabe,
zwei oder drei Stück täglich drei Mal.

Trochisci scillitici. (Pic.)

℞. Scillae . . . semidrachmam.
Sacchari . . . uncias duas.
Mucilag. G. Tragacanth. . . q. s.
Fiant trochisci centum et viginti.

Electuarium desobstruens s. aperiens anti-
hydropicum s. stimulans. (LP. Sw.)

℞. Pulveris Scillae compositi (Sw.),
Gummi Ammoniaci,
Tartrat. Potass., sing. drach. duas.
Salis Ammoniaci . . scrupulum.
Syrupi Cinnamomi . . . q. s.

Bei Wasserfucht. — Gabe, zwei Drach-
men drei Mal täglich.

℞. Pulveris Scillae compositi
drachmas sex.
Corticis Salicis . . . unciam.
Acidi tartarosi . . . semunciam.
Syrupi antiscorbutici
uncias quatuor.

Misce exacte. (LP.) — Wie das vorige.
— Gabe, eine bis zwei Drachmen, täglich alle zwei oder drei Stunden.

Looch ad asthma s. de Scilla. (Br†. Pal†. Wir†. Fi. Pic. Sp.)

℞. Succī Scillae,
Mellis depurati, sing. unc. quatuor.
Misce bene. (Pic.)

Fi. Succī et Mellis, sing. unc. sex.
℞. Scillae pulveratae . grana octo.
Gummi Ammoniaci grana viginti.
Syrupi Althaeae,
Oxymellis scill., sing. . unciam.
Aquaе Boraginis . uncias duas.
Misce sedulo. (Pic.)

℞. Scillae siccatae . . semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Marrubi,
Hyssopti, sing. . . . drachmam.
Myrrhae,
Croci, singulorum semidrachmam.
Mellis despumati . . uncias sex.
Misce exacte. (Br†. Pal†. Wir†. Sp.)

Unguentum Scillae. (Huf†. B*. E2)

℞. Scillae (recentis) . uncias tres.
Lixivii caustici q. s.
Coquendo in mucilaginem redactis
adde
Axungiae Porci q. s.
ut fiat unguentum.

E2. Scillae recentis drachmas duas,
Aquaе Potassae purae uncias quatuor,
coquere ad dimidium et addere Mellis
sesquiunciam, Unguenti Cerae flavae
q. s. ut f. unguentum.

Auflösend, in Einreibungen auf schmerz-
lose Geschwülste.

*Unguentum diureticum s. diureticum re-
solvens.* (B. Va.)

℞. Unguenti mercur. . drachmam.
Scillae semidrachmam

In Einreibungen bei Wassersucht auf die
innere Seite der Schenkel, in die Lenden
und auf den Unterleib.

*Linimentum diureticum s. diureticum ga-
stro-scilliticum, Pomata scillito-ga-
strica.* (Taur. B. Va.)

℞. Scillae pulveratae . drachmam.
Succi gastrici vitulini uncias duas.

Taur. Succi gastrici et Axungiae Por-
ci, sing. unciam.

Man reibt in Fällen von Wassersucht das
mit die Lendengegend ein, wenn der Kranke
die passenden Mittel nicht durch den Mund
nehmen kann.

§. II. Präparate, welche nur das
wirksame Princip der Meerzwiebel,
mehr oder weniger rein, enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Extractum Scillae. (A†. Ba†. Bor5†.
Sax2†. Wür†. Bel. Fer. Pm. Taur.
Br DB. T. Vm.)

℞. Squamarum Scillae rec. . q. v.
Contunde in mortario, exprime suc-
cum et de tempore primum leni igne,
deinde in balneo aquae vaporando con-
sume. (A†. DB.)

Bel. contundere Scillam cum Aquaе
q. s., ut massa fere liquida obtineatur,
colare exprimendo, residuum cum
Aquaе pauxillo triturare et cum ex-
pressionem colare, liquores tunc com-
miscere, seponere et decanthatos in
balneo aquae consumere; — Br. Bul-
bos contundere, cum Aqua conterere,
succum exprimere, residuum cum nova
Aquaе quantitate coquere et liquores
commixtos evaporare; — Pm. Squamas
contundere et balneo maris subjicere,
donec liquor limpidus evadat, expri-
mere, clarificare et evaporare; — T.
macerando Radicem siccata in pon-
dere Aquaе quadruplo, ut extractum
Columbo parare; — Fi. Squamarum
rec. partem unam contundere, addere
Aquaе frigidae partes sex, in saccum
ingerere et prelo submittere, residuum
cum nova Aqua per horae circiter qua-
drantem coquere etc. et liquores con-
sumere.

℞. Scillae concisae q. v.
Coque per horam in Aquaе q. s.;
cola exprimendo, sepone, decantha li-
quorem et ad mellis spissi consist. con-
sume. (Wür†. Fer.)

Bor5†. Scillae q. v. cum Aquaе ferv.
decuplo per horas 36 infundere, liquo-
rem exprimendo separare, residuum
iterum cum Aquaе ferv. quintuplo in-
fundere et post refrigerationem expri-
mere, liquores decanthando etc. depu-
ratos primum leni igne ad tertiam par-
tem, tum in balneo vaporis ad justam
extracti spissitudinem consumere.

Sax2†. ut extractum Absinthii; —
Taur. Scillae libram, Aquaе sex, binas
macerationes per biduum et vaporatio-
nem ad extr. consist.

℞. Scillae recentis . partem unam.
Aquaе partes quatuor.
Macerare per horas 24 et cola absque
expressione; liquorem tunc sufficienter
consume. (Ba†. Vm.)

Electuarium resolvens martiale diureticum s. diureticum. (B.)

℞. Saponis Veneti . . . drachmam.
Extracti Cicutae grana duodecim.
— Scillae . . . scrupulum.
Aethiopis mart. . . drachmam.
Oxymellis simplicis . . . q. s.
Allmältig zu nehmen.

Decoctum Scillae. (Am. B. C. Re. Va.)

℞. Scillae . . . drachmas tres.
Juniperi . . . uncias quatuor.
Radici Senegae . . . uncias tres.
Aquae . . . octarios quatuor.
Decoque ad dimidium, cola et adde
Aetheris nitrici . . . uncias quatuor.

Va. Scillae scrupulum. Junip. drachm.
quatuor, Senegae tres, Aquae libram,
Aeth. nitr. semunciam.

Reizend, bei Wasserucht empfohlen —
Gabe, einen halben bis ganzen Löffel.

Decoctum hydragogum. (Sa.)

℞. Rad. Taraxaci integrae unc. duas
— Althaeae . . . drachmas decem.
Aquae . . . q. s.
Coque per horae quadrantem et adde
Scillae . . . sesquunciam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Post horam unam digestionis in vase
tecto, colat. unciis quatuordecim adde
Syrupi Liquiritiae . . . uncias duas
Misce bene.

Apozema pectorale et incisivum. (Bo.)

℞. Radici Taraxaci,
Florum Taraxaci, sing. unc. duas.
Radici Althaeae . . . unciam.
Flor. Chamomillae . . . drach. tres.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Succi Liquiritiae . . . unciam.
Aquae . . . q. s.
ut librae tres colaturae obtineantur,
cui adde
Oxymellis scillitici,
Syrupi Althaeae, sing. drach. sex.
Brustmittel, harntreibend. — Lassen:
weiß, stündlich.

Decoctum diureticum Huselanti. (Ca. Vm.)

℞. Scillae . . . semidrachmam.
Aquae . . . unc. sex.
Liquori postquam semel ebullierit,
ab igne remoto adde
Radici Valerianae drachmas duas.
Cola leviter exprimendo; post refri-
gerationem colaturam contere cum
Gummi Arabici
Resinae Guajaci, sing.
drach. duabus
ut fiat emulsio, cui denuo colatae adde

Tincturae Antimonii acris,
Spir. Nitri dulcis, sing.

drach. duas.

Misce. (Vm.)

Ca. coquere per sexagesimas viginti
Scillae semunciam in Aqua unciis de-
cem, sub finem addere Radici Vale-
rianae pulv. drachmas duas, colare et
colaturam commiscere cum Syrupi Cor-
tici Aurantiorum uncia, Mucilag.
G. Arabici drachmis tribus, Resinae
Guajaci, Tincturae Antimonii acris,
Spiritus Nitri dulcis, sing. drachmis
duabus et Laudani liquidi guttis vi-
ginti.

Gabe, ein Eßlöffel alle zwei Stunden.

Mel scilliticum. (Gal. GalP. Fi. T. Vm.)

℞. Squamarum Scillae uncias duas.
Aquae communis . . . libras tres.
Coque leviter per aliquot sexagesi-
mas, tunc digere per dies duos, cola
exprimendo et colaturae adde
Mellis . . . sesquilibram.
Clarifica et coque ad syrupi consi-
stentiam (Gal.)

T. Mellis 32° B. libras duas, caete-
rum ut Gal.; — F. Squamarum drach-
mas quindecim, Aquae et Mellis, sing.
libras duas cum dimidia; — GalP.
Squamarum Scillae unciam infundere
cum Aquae fervidae libra per horas
duodecim, trahere cum expressione,
seponere, decanthare, addere Mellis
albi uncias duodecim et coquere ad
syrupi consistentiam.

℞. Scillae siccatae . . . partem unam.
Aquae . . . q. s.
ad obtinendas infusi partes duodecim,
quarum colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duodecim.
Coque parumper cola per pannum
et post refrigerationem adde
Mellis . . . partes duodecim.
Misce bene. (Vm.)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

*Syrupus de Scilla s. scilliticus s. Scil-
lae. (Fi. T. Vm.)*

℞. Scillae siccatae . . . partem unam.
Aquae tepidae partes duodecim.
Infunde per horas 12, cola expri-
mendo et adde
Sacchari albi . . . partes sedecim.
Clarifica et coque ad syrupi consist.
Fi. et T. ut mel scilliticum sed loco
mellis cum Sacchari clarificato parare.
*Looch scilliticum s. pectorale. (Ra. Va.
Hosp. Ven.)*

℞. Looch simplicis uncias quatuor.
Mellis scillitici unc. (drachm Va.)
unam.

Mixtura scillina. (RC.)

R. Aquae Menthae pip. unc. quatuor.
Syrupi Scillae, vel
Oxymellis ejusdem . . . uncias duas.
Misce. — Interdum additur Tincturae Opii camph. uncia. — Gabe eine halbe bis ganze Unze täglich vier Mal.

Potio diuretica. (Ka Va. Char)

R. Aquae Valerianae uncias quatuor.
Aquae Menthae pip . . . unciam.
(quatuor Va.)
Aetheris nitrici . . . drachmam.
Laudani liquidi . . . semidrachmam.
Mellis scillitici drachmas quatuor.
Syr. Quinque Radic. . . unciam.
Ist nach dem de octum diureticum Hufelands gemodell.

Mel Scillae s. scilliticum compositum,
Syrupus Scillae compositus. (AD. Am.
B. C. 12)

R. Scillae siccatae et contusae,
Rad. Polygalae Virg., sing.
uncias quatuor.
Aquae . . . octarios quatuor.
Coque blando igne ad dimidiae partis aquae consumptionem. cola et adde Mellis depumati . . . libras duas.
Coque denuo ad octariorum trium remanentiam et in hujus syrupi uncias quatuor dissolve
Tartari stibiati . . . granum.

Reizend, auflösend, harntreibend, bei schleimiger Engbrüstigkeit gerühmt. — Gabe, von zehn Tropfen bis zu einem Kaffeelöffel und mehr, alle Viertel, halbe oder ganze Stunden, je nach Alter des Kranken und nach der Indication. (Coxe's Hive syrup)

Syrupus Scillae compositus. (Ost. Fenn.
Suec. Sp. Vm.)

R. Scillae siccatae . . . unciam.
Zingiberis . . . semunciam.
Herbae siccae Hyssopi uncias duas.
Aquae Menthae pip. libras duas.
Macera per horas 24 in vase clauso, cola exprimendo et liquori sepositione depurato adde

Sacchari albi . . . libras tres.
Coque parumper. (Fenn. Suec. Sp.)
Ost. loco aquae menthae illam Hyssopi indicat; — Vm. Zingiberis partem unam, Scillae duas, Hyssopi quatuor, Aquae viginti, infusionem in balneo aquae et Sacchari partes triginta sex.

B. Auszug durch Wein.

Vinum Scillae s. Scillae maritimae s. scilliticum. (Fult. Hamt. Lit. Würt.
Aut. Ams. B. Gal. GalM. GalP. LH.

Lus. Pm. RC. Sar. Suec. Taur. Ca.
DB. Fi. Gr. Pic. Sa. T. Vm.)

R. Scillae siccatae . . . unciam.
Vini Malacensis . . . 1 bram.
Macera per horas [dies] 12, cola ac filtra. (Gal GalP.)

Lus. Scillae unciam et Vini libras duas; — Pm. Squamarum Scillae semunciam, Vini Malacensis uncias octo et infusionem per triduum; — Sar. Scillae semunciam et Vini libras duas; — Gr. Radicis libram, Vini albi Gallici vetusti congiu, digestionem per dies quatuordecim; — Taur. Vini malvatici partes octo et digestionem per dies quatuordecim.

LH. Scillae recens siccatae unciam, Vini albi viginti duas, Alcoholis 25° duas et sex dies macerationis; — T. Squamarum Scillae unciam, Vini albi generosi sedecim, Spiritus Vini 36° tres, macerationem per octo dies; — DB. Spiritus unciam, Vini uncias quindecim

R. Scillae concisae . . . drachmam.
Cort. Aurant. unciam.
Vini albi libras duas.
Digere per horas 24 et cola. (Hamt.)
Fi. Scillae semunciam, Corticis drachmam, Vini albi uncias novem, infusionem frigidam per triduum.

R. Scillae recentis . . . drachmas sex.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Vini sesquilibram.
Infunde frigide per horas 12 et cola. (Würt.)

Im. Scillae partem unam, Cinnamomi dimidiam, Vini Maderani partes quadraginta octo et octo dies macerationis

R. Scillae recentis . . . semunciam.
Zingiberis drachmam.
Alcoholis (0 931) . . . uncias duas.
Vini albi libras duas.
Post tres dies cola. (Ams.)
Suec. Scillae unciam, Zingiberis drachmam et Vini albi libras duas; — Aut. Scillae drachmam, Calami duas et Vini libram.

R. Scillae unciam.
Corticis Aurantiorum,
Rad. Calami, sing.

drachmas duas.
Vini albi sesquilibram.
Post tres dies digestionis adde
Oxymellis scillitici drachmas duas.
Misce bene. (Ca. Pic)

RC. Corticis et Radicis, sing. drachmam, Vini albi libram, Oxymellis scillitici unciam, caeterum ut antea; — Gr. Vini albi sesquilibram, Oxymellis Squillae uncias duas, Rad. Squillae

unam, Cort. Aurant., Calami, sing. drachmas duas, digere per triduum et adde Oxymellis scill. uncias duas. (*Vinum scilliticum compositum*.)

℞. Scillae siccatae,
Bacc. Juniperi, sing. drachmam.
Radici Calami . drachmas duas.
Vini albi libram.

Post tres dies macerationis cola. (Ful†. B*.)

Li†. Vini albi unciam, Scillae grana quinque, Bacc. Juniperi scrupulos duos et Calami grana decem.

℞. Scillae drachmam.
Baccarum Juniperi unciam.
Cardamomi minoris semidrachmam.

Vini albi semilibram.
Digere blando calore per tres dies. (B*.)

℞. Scillae,
Cardamomi min., sing. part. unam.
Baccarum Juniperi,
Seminum Dauci, sing. part. duas.
Vini Maderani partes triginta duas.

Post plures dies frigidae macerationis cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

℞. Tincturae Scillae grana viginti.
Vini albi unciam.
Misce. (GalM.)

Reizend, zuweilen Ekel, selbst Brechen erregend. — Gabe, zwei oder drei Löffel täglich.

Vinum diureticum. (LH.)

℞. Vini scillitici,
— Digitalis, sing. semunciam.
Acidi nitrici alcoholis semidrachmam.

Gabe, auf drei Mal in 24 Stunden, in einem passenden Behälter.

Vinum diureticum amarum s. amarum scilliticum compositum, Infusum scilliticum vinosum compositum. (GalP. Ca. Ra. Sa.)

℞. Scillae drachmas sex.
Cinnamomi,
Cort. Winteri, sing. drach. quatuor.

Radici Inulae drachmam.
Vini libram.
Post sufficientem extractionem cola. (Sa.)

℞. Squamarum Scillae,
Rad. Vincetoxici, sing. semunciam.

Corticis Chinae,
— Winteri,
— Citri, sing. uncias duas.

Stipit. Angelicae Bohem.

semunciam.

Fol. Absinthii,
— Melissae, sing. unciam.
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum semunciam.
Vini albi generosi libras octo.

Digere cortices, radices, scillam et macidem pulveratos et cribratos et baccas integras in vino, leni calore, per dies quatuor, cola deinde, leviter exprimendo et filtra. (GalP.)

℞. Scillae siccatae,
Radici Vincetoxici,
— Angelicae,
Chinae pulv., sing. unciam.
Corticis Citri,
— Winteri, sing. unc. duas.

Baccarum Juniperi,
Macidis, sing. drachmas duas.
Fol. sicc. Absinthii,
— — Melissae, sing. semidrachmam.

Alcoholis uncias duas.
Vini albi libras quatuor.

Digere in balneo arenae per horas 24, subinde agitando, cola exprimendo ac filtra. (Ca.)

℞. Corticis Winteri,
Chinae,
Cinnamomi, sing. unciam.
Radici Angelicae,
Squamarum Scillae,
Baccarum Juniperi,
Macidis, sing. uncias duas.

Fol. sicc. Absinthii,
— — Melissae, sing. manip. duos.

Vini albi libras duas.
Macera per horas 24. (Ra)

Tonisch, in Gallen, wo Reizung des Magens nöthig ist und bei sogenannten passiven Wasserfluchten empfohlen. — Gabe, eine bis vier Unzen täglich.

Infusum Kali carbonici cum Scilla vinosum, Vinum Scillae alcalinum. (Auf†. T.)

℞. Kali subcarbonici semunciam.
Scillae scrupulum.
Cinnamomi drachmas duas.
Vini albi uncias octo.

Infunde per horas 12 et cola — Gabe, einen oder zwei Löffel alle zwei oder drei Stunden.

T. Zedoariae drachmas duas, Squamarum Scillae, Rhei, Bacc. Juniperi, sing. unam, Cinnamomi tres, Kali subcarbon. sesquidrachmam et Vini albi austeri et vetu ti uncias triginta duas

C. Aufzug durch Alcohol.

Extractum Scillae (alcoholicum.) (HC†. HN†. GalP.)

Ut extractum Angelicae HC†. — Colombo HN†. — Colocythidis GalP.

Tinctura Scillae s. Scillae maritimae. (Han†. HassP†. HC†. HN†. AD. An. B*. D. Du. Ed. Gal. GalM. GalP. LH. Lon. LonN. LPC. RC. Taur. C. CG. DB. Gr. Re. T. Vm.)

R. Squamarum Scillae sicc.

part. unam.

Alcoholis (22°) . partes quatuor.

Digere per dies sex et cola. (Gal. GalM. Taur.)

GalP. ut tincturam Chinae; — LH. Scillae uncias quatuor, Alcoholis 22° libras duas et octo dies digestionis; — AD. B*. Lon. LonN. LPC. CG. Gr. Re. Scillae uncias (drachmas Re.) quatuor (quinque LPC.), Alcoholis (0,930) octarios duos et quatuordecim dies infusionis; — HassP†. Du. Scillae uncias quatuor, Alcoholis (0,930) (Spir. Vini rectificati HassP†.) libras duas et octo dies infusionis (tinctura expressa unciarum viginti pondere par sit HassP.); — Ed. Scillae uncias duas, Alcoholis (0,935) sedecim et octo dies infusionis; — Vm. Scillae partem unam, et sex Aquae Vitae; — D. Scillae uncias sex et duas libras Aquae Vitae; — Han†. HC†. HN†. Scillae uncias quinque et Aquae Vitae (Spir. rectific.) libras duas (digestionem per octiduum et colaturam unciarum viginti, HC† sufficientem extractionem HN†.); — C. Scillae uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — RC. Scillae uncias duas, Alcoholis diluti libram et septem dies digestionis; — DB. T. Scillae unciam, Alcoholis 26° B. octo, digestionem per 12 vel 15 dies.

R. Scillae rec. contusae uncias sex. Alcoholis (36°) . . . uncias octo.

Post quatuor dies digestionis cola exprimendo et residuo infunde

Alcoholis (36°) . . . uncias duas.

Digere iterum blando calore et cola, colaturas mixtas filtra. (An.)

Reizend, harntreibend, besonders bei Wasserfuchtem gebraucht. — Gabe, sechs bis zehn bis zwanzig Tropfen in Emulsion oder in einem schleimigen Wasser.

Mel Scillae. (Gr.): Mellis libr. tres, Tinct. Scillae duas.

Extractum Scillae bulborum alcoholicum. (Taur.)

Ut extr. Cicut. alcohol.

Mixtura anticatorrhialis. (Ca.)

R. Elixir paregorici uncias quinque. Tincturae Scillae . . . unciam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, Morgens und Abends.

Mixtura Spiritus nitri s. diuretica. (E2. Va.)

R. Tincturae Scillae drachmas duas. Aetheris nitrici . . . unciam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, fünf oder sechs Mal täglich, in Wachholderthee (folgenden Aufguss: R. Baec. Junip. contus. unciam, Potassae Supertartritis semunciam, Aquae bull. octarium, eine Theetasse voll. E2.)

Hierher gehört auch die von Auf. sehr unpassend sogenannte *Tinctura Scillae*:

R. Scillae . . . sesquunciam.

Aetheris muriatici,

Spir. Juniperi, sing. semilibram.

Aquae . . . q. s.

Destillent libras sex. — Gabe, zehn bis dreißig Tropfen.

Tinctura Scillae aromatica. (Succ.)

R. Scillae siccatae . . . unciam.

Cinnamomi pulv. drachmas duas.

Alcoholis Aqua diluti semilibram.

Infunde per tres dies ac filtra.

Man könnte statt des Zimmts auch das Gelbe der Pomeranzenschale nehmen und die Tinctur auch auf der Stelle bereiten, indem man zu der einfachen tinct. Scillae eine größere oder geringere Menge tinct. Cort. Aurant. setzt. Die tinct. Scill. aromat. verdient den Vorzug vor der einfachen; sie schmeckt weniger unangenehm und ist vielleicht auch nicht so reizend.

Tinctura Scillae composita. (Vm.)

R. Aceti scillitici . . . partes tres.

Tinct. Cort. Aurant.

part. unam cum dimidia.

Extracti Trifolii . partem unam.

Post plures dies macerationis cola per pannum.

Tinctura Scillae kalina. (Bor5†. Hass†. HC†. Li†. Wir†. Hu†. B*. Fenn. Fer. Sw*. Vm.)

R. Scillae pulveratae,

Kali subcarb., sing. . . unciam.

Tritura simul in mortario et adde

Alcoholis . . . uncias quatuor.

Post horas sex digestionis cola leviter exprimendo. (Hass†.)

Bor5†. HC†. Hu†. et B*. Scillae

uncias tres (duas Bor5†. HC†.), Potassae causticae drachmas duas, Alcoholis libram et digestionem (Bor5†.) per tres dies, colaturam unciarum decem

HC $\frac{1}{2}$; — Li $\frac{1}{2}$. Scillae, Kali subcarb.,
sing. unciam et octo Alcoholis.

R. Scillae siccatæ unciam.
Cinnamomi . . . drachmas duas.
Solut. Potassae causticae

drachmam.
Alcoholis semilibram.
Digere per tres dies et filtra. (Penn.)
Vin. Potassae causticae partem unam,
Cinnamomi duas, Scillae octo et Aquae
Vitae quadraginta octo.

R. Kali subcarbonici . . . semunciam.
Aceti scillitici uncias duodecim
Evaporent leni igne ad mellis consi-
stentiam, tum residuum digere cum
Alcoholis uncis sex.
Post aliquot dies filtra. (Wir $\frac{1}{2}$.)
Siv. Aceti scillitici uncias octodecim
et duodecim Alcoholis.

R. Scillae,
Acetat. Potassae, sing. . . unciam.
Alcoholis uncias sex.
Post tres dies filtra. (Fer.)

Reizend, eins der wirksamsten auflösen-
den und harntreibenden Mittel; bei Bas-
feruchten und Asthma empfohlen. — Man
fangt mit dreißig Tropfen an und steigt
alle zwei oder drei Stunden um fünf, bis
der Kranke hundert und mehr nimmt.

Potio diuretica. (E2)

R. Subcarbonat. Potassae drachmam.
Succi Citri q. s.
ad dissolutionem; adde

Tincturae Scillae . . . semunciam.
— Opii . . . guttas triginta.
Aquae Cinnamomi uncias quatuor.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen
Eßlöffel.

Elixir pectorale Wedelii. (Br $\frac{1}{2}$. Li $\frac{1}{2}$.
HC $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$. Hu $\frac{1}{2}$. B*. Ca. Sp. Vm.)

R. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae, sing. unciam.
— Liquiritiae . . . semunciam.
Ligni Santali rubri . . . unciam.
Herbae Roris Solis sesquiunciam.
Seminum Anisi . . . semunciam.
Benzoës drachmas sex.
Myrrhae semunciam.
G. Ammoniaci . . drachmas duas.
Crocī drachmas tres.
Aquae Vitae libras duas.

Digere seorsim gummi ammoniacum,
myrrham et benzoën et post sufficien-
tem extractionem tincturam cum ea
reliquarum substantiarum commisce.
(Br $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$.)

HC $\frac{1}{2}$ et B*. Rorellam omittunt et
HC $\frac{1}{2}$ digestionem per sex dies indicat;
— Sp. addit Radicis Althaeae unciam
et Benzoës concisae drachmas quatuor.

R. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae, sing. unciam.

Benzoës,
Myrrhae,
Anisi,
Succi Liquiritiae,
G. Ammoniaci, sing. semunciam.
Crocī drachmas tres.
Alcoholis libram.

Post sufficientem digestionem cola.
(Hu $\frac{1}{2}$.)

R. Scillae,
Rad. Inulae,
— Iridis Flor., sing.
unc. tres et drachmam.

Benzoës drachmas duas.
Liquiritiae,
Anisi,
Myrrhae, sing. drachmam et grana

octodecim.
G. Ammoniaci . . scrupulos duos.
Crocī grana septendecim.
Aquae Vitae (12 $\frac{1}{2}$)
libram et unc. sex.

Macera per dies 14, subinde agitan-
do et filtra. (Elix. pectorale Anglicum,
Ca.)

R. Croci concisi . . scrupulos duos.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Infunde per dies duos et adde

Radicis Liquiritiae,
Seminum Anisi, sing. semunciam.
Rad. Inulae,
— Iridis Flor., sing. . . unciam.

G. Ammoniaci . . drachmas duas.
Myrrhae semunciam.
Infunde iterum per dies duos et adde

Scillae unciam.
Benzoës drachmas tres.
Digere per aliquot tempus et filtra.
(Vm.)

R. Radicis Inulae,
— Iridis Florentinae,
— Scillae, sing. . . semunciam.

— Liquiritiae,
Seminum Anisi,
Flor. Rhoeados, sing. drach. duas.

Alcoholis . . uncias quatuordecim.
Digere blando calore per dies qua-
tuor. Praeterea digere in Alcoholis
uncis tribus per eundem temporis de-
cursum.

G. Ammoniaci . . . drachmam.
Myrrhae drachmas duas.
Benzoës drachmas tres.

Cola leviter exprimendo et colatu-
ram utramque commisce (Li $\frac{1}{2}$.)

Reizend, bei Asthma, Catarrhen, Husten
und Heiserkeit empfohlen. — Gabe, vier-
zig bis sechzig Tropfen.

D. Auszug durch Weineßsig.

Acetum Scillae s. Scillae maritimae s. scilliticum, Acidum aceticum scilliticum s. cum Scilla maritima. (A†. Bat. Bor†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sucr. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Scillae praep. et minutim concis. partem unam.

Aceti boni . . partes duodecim.

Digere blando calore per dies septem, cola fortiter exprimendo et filtra. (Bor†. BorG†. Han†. O†. Sax†. D. Suec. Br. Sp.)

Pm. easdem quantitates sed digestionem per dies quindecim; — Br†. Scillae partem unam cum dimidia, Aceti duodecim, et horas 48 infusionis; — Pal†. Scillae unam, Aceti novem et dies 40 infusionis; — Wir†. DD. Sar. et Taur. Scillae unam, Aceti octo et dies 14 infusionis; — A†. Hass†. Li†. R. Gr. et Pid. Scillae unam, Aceti sex et tres dies (per mensem Gr. sec. Lon ante 1745) digestionis; — Bor5†. Sax2†. Scillae siccatae uncias duas, Aceti destillati q. s. ut post macerationem per triduum colatura post lenem expressionem sit unciarum octodecim; — HN†. Radicis uncias duas. Aceti Vini crudi libras duas macerare leni calore et leviter exprimere; — GalP. Squillae uncias octo, Aceti rubri fortiss. libras sex, macerare per dies quatuordecim.

R. Scillae concisae . . partem unam.

Aceti albi ferv. partes undecim.

Acidi acetici . . partem unam.

Macerare per dies octo, cola exprimendo et post tempus aliquot decantha. (Fenn.)

GalM. Scillae partes octo, Aceti rubri nonaginta duas, Acidi acetici (10°) unam et quatuordecim dies infusionis.

R. Scillae concisae . . uncias duas.

Aceti uncias duodecim.

Digere blando calore, per dies octo, in vase tecto, cola exprimendo et colaturae adde

Alcoholis unciam.

Sepone, decantha et serva. (Bat. B. Bel.)

HassP†. HC†. Scillae sicc. et concis. uncias duas, Aceti Vini libras duas, octo dierum macerationem, Spiritus rectificatiss. sesquiunciam (HC†. unciam,

ut post filtrationem colatura sit librae unus cum dimidia); — Ams. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, 24 horas macerationis blando calore et ad colaturam partem duodecimam Alcoholis (0,907); — Wür†. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, quatuor dies digestionis leni calore et tres uncias Alcoholis; — RC. Scillae sicc. et contus. drachmas duas, Aceti libras duas cum dimidia, macerationem per quatrimum et Alcoholis uncias tres; — LH. Lus. Scillae libram, Aceti sex, sex dies macerationis, levem ebullitionem et Alcoholis semilibram (uncias octo 25° LH.); — His3. Scillae libram, Aceti sex, 24 horas digestionis blando calore et tres uncias Alcoholis; — Gal. Scillae sicc. semilibram, Aceti rubri libras sex, Alcoholis (22°) unciam et quatuordecim dies macerationis; — Pol. Scillae unciam, Aceti libram et Alcoholis sesquiunciam; — Sw. Scillae libram, Aceti octo, duos vel tres dies digestionis blando calore et Aquae Vitae uncias octo; — Vm. Scillae partem unam, quatuor Aceti et Aquae Vitae duas; vel: Scillae unam, Aceti duodecim, unam Aquae Vitae et octo dies frigidae macerationis; — AD. Am. Du. et C. Scillae semilibram, Aceti Vini octarios tres et Alcoholis (0,840) uncias quatuor; — AD. Scillae uncias quatuor, Aceti dest. octarios duos, Alcoholis fluidunciam; — LonN. CG. Gr. R. Scillae libram, Acidi acetici diluti octarios (libras) sex, macerationem per horas 24 et Alcoholis (0,930) semioctarium; — LPC. Scillae uncias quindecim; — Ed. 1817 Scillae unciam, Aceti quindecim et Alcoholis (0,835) sesquiunciam; — Gr. Scillae uncias duas, Aceti destill. vel comm. libras duas cum dimidia, Spir. Vin. rect. uncias tres; — Gen. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Aquae Vitae uncias tres; — Ful†. Scillae uncias quatuor, Aceti libras quatuor et Aquae Vitae uncias duas; — LP. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Alcoholis uncias duas, macerationem per dies sex; — Fer. Scillae libram, Aceti sex et Alcoholis uncias tres; — DB. Fi. Scillae uncias sex, Aceti fortis libras quatuor, Alcoholis 24° (36° B. DB.) uncias duas; — T. Squamarum inter. sicc. uncias duodecim, Aceti comm. libras octo. Spiritus Vini 34° B. uncias quatuor, et Aceti radicalis pondus aequale, expone soli vel balnei vaporis calori in vase clauso per dies 14 et filtra.

R. Rad. Scillae rec. . . libram.

Aceti gelu concentr. sesquilibrum.

Digere per septimanam in vase tecto, saepius agitando, cola cum expressione et residuo infunde.

Aceti gelu concentrati semilibram.

Exprime, sepone colaturas ambas commixtas, filtra et adde

Alcoholis (38°) . . . uncias duas.

Misce bene. (An.)

Reizend, besonders bei chronischen sogenannten schleimigen Lungenübeln und bei Wasserfuchten angewendet. Man benutzt diesen Essig auch in Sargelwasser, bei Entzündung der Mandeln und in gewissen Fällen von beschwerlichem Schlingen. — Gabe, von fünf Tropfen bis zu einer Drachme, täglich zwei Mal, in irgend einem aromatischen Wasser oder in einer Emulsion mit Ammoniatgummi.

Haustus s. Mixtura cum Tinctura Jalapae s. diuretica. (E2.)

℞. Tincturae Jalapae drachmas tres.

Aceti Scillae . . . drachmam.

Aquae Menthae pip. . . drachmas octo.

Dreimal täglich.

Syrupus Scillae s. Scillae maritimae s. Scillae acetosus, Oxysaccharum scilliticum. (Br†. Han†. HN†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. B. Ed. Lon. RC. Br. C. Gr. Re. Sw.)*

℞. Aceti scillitici . . . libras duas.

Sacchari contusi . . . libras tres.

Dissolve blandi caloris ope. (B*. Lon.)

AD. Aceti octarium, Sacchari libras duas; — Am. Ed. C. Gr. Re. Aceti partes quatuor et septem Sacchari; — Wür†. Aceti unam cum dimidia, Sacchari tres cum dimidia; — RC. Br. Aceti duas et Sacchari tres cum dimidia.

℞. Aceti scillitici . . . sesquilibram.

Cinnamomi, . . .

Zingiberis, sing. . . unciam.

Digere per tres dies, cola et adde

Sacchari albi . . . uncias triginta.

Ebulliant semel et colentur. (Br†.

Han†. HN†. Wir†.)

℞. Aceti scillitici . . . semilibram.

Syrupi Cinnamomi, . . .

— Zingiberis, sing. . . libram.

Misce. (Sw.)

Mixtura cum Syrupo Scillae, Potio expectorans. (E2.)

℞. Syrupi Scillae . . . semunciam.

Tinct. Opii camph. drach. duas.

Vini stibiat. . . drachmam.

Gummi Arabici . . . semidrachmam.

Aquae . . . uncias duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle Stunden oder zwei Stunden. — Dieser Trank ist besonders für Kinder.

Mel scillae acetatum, Oxymel s. Oxymellitum Scillae s. scilliticum, Mel Aceti scillitici s. Scillae s. Scillae maritimae. (A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar. Suec. Taur. Br. C. CG. DE. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T.)

℞. Aceti scillitici . . . partem unam.

Mellis albi . . . partes duas.

Coque ad consistentiam syrupi. (A†.

Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†.

Hass†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†.

Wir†. An. B. Bel. Fenn. Fer. GalM.

GalP. His3. LH. Pol. R. RC. Sar. Suec.

Taur. Br. Dk. Fi. Pid. Sp. Sw. T.)

Pal†. LP. et Lus. Aceti partes duas

et Mellis tres; — AD. Am. Du. LonN.

C. CG. Gr. Re. Aceti octarios duos et

Mellis libras tres; — LPC. Aceti

sesquioctarium; — Pm. Syrupi Mellis

libras tres, Aceti scill. sesquilibram,

balnei maris ope in syrupum redige;

— Ams et Pm. Aceti partem unam

et tres Mellis; — DD. Aceti et Mel-

lis part. aeq.; — D. Mellis despum.

uncias triginta ad sex vel octo con-

sumptas et Aceti duodecim; — Gen.

HassP†. Aceti partem unam et quatuor

Mellis (HassP†. Acetum adhibitum e

Squamarum Scillae siccata, uncias qua-

tuor cum dimidia et Aceti Vini libris

duabus tepida per dies sex in vitro

clauso maceratione, colando filtrando-

que paratur.)

Im Journal de pharmacie findet sich

von einem Unbekannten folgende Formel:

℞. Scillae sicc. libram et unc. duas.

Aceti rubri . . . libras sex.

Alcoholis (36°) . . . uncias duas.

Macera per mensem, cola ac filtra;

tunc balnei aquae ope in hujus aceti

scillitici libra et uncia solve Mellis albi

libras quatuor.

Löffelweise, aber häufiger in Potionen zu

einer bis vier Drachmen.

Mixtura Scillae. (LoP.)

℞. Oxymellis Scillae, . . .

Syrupi Papaveris albi, sing. . .

fluidunciam.

Aquae . . . fluiduncias quatuor.

Looch pectorale, Linctus expectorans,

oleosus. (Li†. Fi. Gr. Pic. Sw.)

℞. Oxymellis scill. semunciam ad

unciam.

- Syrupi Althaeae . . . unciam.
 Misce. (Sp.)
 R. Oxymellis scillitici,
 Syrupi Althaeae,
 Mucilag. G. Arab., sing. p. aeq.
 Misce. (Li.)
 R. Olei Olivarum,
 Oxymellis scillitici,
 Syrupi Papaveris, sing. unciam.
 Misce. — 1 Drachme bisweilen.
 R. Oxymellis scillitici semunciam.
 Syrupi balsamici . . . unciam.
 Olei Amygdal. dulc. sesquiunciam.
 Misce. (Sw.)
 R. Mellis optimi . . . uncias sex.
 Syrupi Polygalae Virginicae,
 — scillit., sing. . . unciam.
 Florum Sulphuris,
 Acidi benzoici, sing. scrupulum.
 Ipecacuanhae pulveratae grana sex.
 Misce sedulo. (Fi.)
 Rasselöfweise.
 Gargarisma e Scilla s. scilliticum. (Sw. Va.)
 R. Oxymellis scillitici . . . unciam.
 Aquae Cinnamomi uncias decem.
 Potio ad catarrhum s. anticatarrhalis (Sim.)
 R. Rad. Zedoariae . . . drachmam.
 Camphorosmae . . . pugillum.
 Aquae . . . uncias octo.
 Decoque ad unc. quinque remanentiam et colaturae refrigeratae adde
 Salis Ammoniaci . . . grana sex.
 Spiritus Nitri dulcis . . . guttas sex.
 Oxymellis scillitici . . . unciam.
 Auf vier Mal, alle zwei Stunden, zu nehmen.
 Potio scillitica s. scillitica acidula s. acidulata s. diuretica. (Gal. GalM. GalP. B. Ca. Ra. Re. Sa. Va.)
 R. Oxymellis scillitici . . . semunciam.
 Aquae Menthae . . . unciam.
 — trium Nucum unc. quatuor.
 Misce. (Ca.)
 R. Oxymellis scillitici . . . semunciam.
 Aquae Parietariae uncias quatuor.
 — Menthae pip. . . unciam.
 Spir. Nitri dulcis semidrachmam.
 Misce. (Gal. Re.)
 GalP. loco aquae Parietariae Aquae Hyssopi uncias tres.
 R. Oxymellis scillitici . . . semunciam.
 Infusi Hyssopi . . . uncias quatuor.
 Spir. Nitri dulc. semidrachmam.
 Aquae Cinnamomi drachmas sex.
 Spir. Lavandulae . . . drachmam.
 Subcarb. Potassae grana decem.
 Misce sedulo. (Ca.)
 R. Dec. Quinque Radic. uncias tres.
 Aquae Flor. Aurant. semunciam.
 Oxymellis scillitici drachmas duas.
 Syrupi Sacchari . . . unciam.
 Laudani liquidi,
 Tincturae Castorei,
 — Moschi, sing. guttas sex.
 Spiritus Nitri dulcis,
 Aetheris sulph., sing. guttas decem.
 Misce. (Ra. Va.)
 R. Baccarum Juniperi semunciam.
 Aquae bullientis . . . q. s.
 ut octo unciae infusi obtineantur. Colaturae adde
 Aetheris sulphurici guttas viginti.
 Oxymellis scillitici . . . semunciam.
 R. Baccarum Juniperi . . . unciam.
 Aquae . . . q. s.
 ad infusi uncias sex; colaturae adde
 Acetatis Potassae drachmas duas.
 Spiritus Fuliginis guttas triginta.
 Liquor Cornu Cervi succ.
 drach. duas.
 Oxymellis scillitici . . . drachmam.
 Misce. (B.)
 R. Emuls. Amygd. . . . libram.
 Nitri . . . drachmas duas.
 Oxymellis scillitici . . . unciam.
 Misce. (B.)
 R. Decocti Graminis . . . libras duas.
 Liquoris Hoffmanni guttas viginti.
 Oxymellis scillitici . . . unciam.
 Misce. (B.)
 Rasselöfweise.
 Brodium diureticum. (Pic.)
 R. Radicis Taraxaci . . . unciam.
 — Liquiritiae . . . semunciam.
 Millepedes . . . no. 30.
 Fol. Taraxaci manip. dimidium.
 — Polygalae,
 Camphorosmae, sing. . . pugillum.
 Oxymellis scillitici . . . semunciam.
 Kermetis mineralis . . . granum.
 Mixture pectoralis s. expectorans s. Boerhavii. (LH. B. Ca. Sa. Va.)
 R. Oxymellis scillitici,
 Spir. Piper. Jamaic., sing. unciam.
 Aquae Menthae . . . uncias duas.
 Misce. (Sa.)
 R. Decocti Hordei . . . semilibram.
 Aquae Hyssopi . . . uncias quatuor.
 Oxymellis scillitici . . . uncias tres.
 Aceti scillitici . . . drachmas sex.
 Sulphatis Sodae . . . drachmam.
 Misce bene. (Ca. Va.)
 LH. Hyssopi drachmam coquere cum
 Aquae ferv. uncis tribus et refrigerato
 addere Oxymellis scill. unciam, Vini
 Antimonii semidrachmam. (Gabe, drei
 Löffel in 24 Stunden und mehr.)
 R. G. Ammoniaci . . . drachmam.
 Aceti scillitici . . . uncias sex.

Oxymellis scillitici . . . unciam.
Misce. (Ca.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae.
Aqua . . . q. s.
ut decocti unciae sex obtineantur, quorum colaturae adde
Lactis ammoniac. . . drachmam.
Camphorae . . . semidrachmam.
Oxymellis scillitici . . . unciam.
Misce. (B.)

Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.

Liquor antiphlogisticus. (DB.)

℞. Aquae Rosarum . . . uncias quatuor.
Sal Ammoniaci depur.,
Sacchari albi, sing. . . drachmam.
Aceti Vini . . . guttas quindecim.
Oxymellis scillitici . . . semunciam.
Misce.

Julep s. Julapium scilliticum. (Ra. Va. Hosp. St. Ant.)

℞. Specierum bechicarum,
Gummi Arab., sing. grana viginti.
Syrupi Sacchari,
Oxymellis scill., sing. . . unciam.
Aqua . . . uncias quatuor.
Va. Oxymellis scill., drachmam.

Solutio Gummi Ammoniaci etc., Potio incisiva s. gummosa scillitica. (GalM. E2. Ra.)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Oxymellis scillitici . . . semunciam.
Misce. (Ra.)

℞. G. Ammoniaci pulv. part. dimid.
Tere sensim addendo
Aceti scillitici . . . partes triginta.
Infusi Hysopi . . . partes centum.
Misce bene. (GalM.)

℞. G. Ammoniaci . . . drachmam.
Aqua . . . uncias quatuor.
Oxymellis scillitici . . . uncias duas.
Tinct. Opii camph. . . semunciam.
Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden. (E2.)

Syrupus pectoralis. (Ca.)

℞. Oxymellis scillitici sesquiunciam.
Syrupi Ipecacuanhae,
— Diacodion, sing. unc. duas.
— Flor. Aurantior. semunciam.

Misce. — Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel in einer Tasse Brustthee. — Gegen Reuchhusten.

E. Auszug durch Del.

Oleum Bryoniae Radicis compositum s. Agrippae. (His3.)

℞. Rad. rec. Bryoniae,
— — Cucum. asin., sing.
libram.

Rad. rec. Scillae,

— — Iridis Germanicae,

— — Ebul. sing. semilibram.

Olei Olivarum . . . libras quatuor.

Coque lente ad consumptionem humidi et cola.

Unguentum Bryoniae s. (Bryoniae) Agrippae. (Wir7. His3. Sar.)

℞. Succu Bryoniae . . . libras tres.
— Elaterii . . . libras duas.

Scillae,

Rad. Iridis Germanicae,

— Filicis maris, sing. unc. sex

Macera per horas 12, tunc coque, cola exprimendo, et ad extracti consist. evaporatis adde

Cerae albae . . . uncias quindecim.

Olei Mucilaginis . . . libras quatuor.

Misce bene. (Sar.)

℞. Rad. Bryoniae . . . libras duas.

— Cucum. asin. . . libram.

— Ebuli,

— Filicis,

— Iridis Germ., sing. unc. tres.

Scillae . . . semilibram.

Tribulorum aquatic. uncias duas.

Olei Olivarum . . . libras sex.

Post dies octo macerationis coque, exprime et adde

Cerae flavae . . . libram.

Liqua in balneo aquae. (Wir7.)

℞. Olei Bryoniae comp.

libr. quatuor.

Cerae albae . . . libram.

Liqua lente. (His3.)

Ein nicht sehr starkes Reizmittel, jedoch, wie man glaubt, nicht ganz unwirksam; auflösend, schmelzend, gegen Wasser sucht.

Scolopendrium.

Scolopendrium officinale s. officinarum, Sm., Asplenium Scolopendrium, Hirschjunge; Scolopendre, Langue de cerf, Langue de boeuf (Gal.); Hiertongue (Ang.); Gelenj gazyk, Psany trank, Cetarak (B.); Hiertetongue (D.); Lengua de ciervo (His.); Hertstong (Bel.); Lingua di cervo (I.); Jalenj szczaw (Pol.); Lingua cervina (Lus.); Hierttunga (Suec.).

Br7. Wir7. Wür7. M7. Fer. GalM. Gall. Gen. His3. Taur. Be. Br. Gr. Re. Sp. 7.

7 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Europäische Pflanze. (Zorn 1c pl. t. 47. Plenk t. 741.)

Man wendet das Kraut (herba Scolopendrii s. Linguae cervinae s. Phyllitidis s. Lonchitidis, Asplenium Scolopendrium, Blechnum lignifolium) an;

es besteht aus langen, am untern Theile herzförmigen Blättern mit behaarten Stielen. Es hat einen adstringirenden Geschmack.

Scorzonera.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Scorzonera humilis*, L.; Baldscorzonere, Matter nisch; Scorzonere d'Allemagne ou de Bohême (Gal.).

Bor†. Br†. Ful†. Han†. L†. O†. Wirt†. Wür†. M†. Ams. Fer. Gal. Taur. Fi.

4 (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, Cass.) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (Jacq. An-tr. VI. t. 36.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae latifoliae sinuatae s. Serpentinae) an; sie ist geringelt, dick, holzig außen schwarz, inwendig weiß, und enthält, im frischen Zustande, einen Milchsaft. Sie hat einen etwas bitteren und herben Geschmack.

2) *Scorzonera Hispanica*, L.; Gartenscorzonere, Schlangengras, Schwarzwurzel, Blattergras; Scorzonere d'Espagne, Salisifis noir (Gal.); Garden scorzonera (Ang.); Hadj mordowy koren (B.); Skorzonera (D.); Escorzonera (His.); Spanische Skorzonera (Bel.); Scorzonera (I.); Escorzonera (Lus.); Skorzonera (Succ.).

Bor†. Han†. O†. Sax†. Fer. Gal. Hs†. Taur. Be. Br. Fi. Gr. Re. Sp. Z.

4 Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's, welche in Küchengärten gezogen wird. (Blackw. t. 406. Plenck t. 592. Düss. off. Pfl. I. t. 7. Zorn l. c. pl. t. 405.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae s. Viperinae) an; sie ist lang fingerdick, außen schwarz, inwendig weiß, mit ringförmigen Runzeln besetzt, und mit einem Milchsaft angefüllt, welcher ausfließt, wenn man in sie einschneidet. Man verkauft sie, abgeschabt und getrocknet, in länglichen, bräunlichrothgelben Stücken. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist im frischen Zustande süßlich, bitter und mehlig, getrocknet bloß schleimig.

Reizend, harntreibend.

Gr. führt noch *Scorzonera subcaerulea*, purpurea an.

Extractum Scorzonerae. (Br†.)

R. Radicis Scorzonerae . . . libram.
Aque fontanae . . . libras sex.

Mucera per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum.
Bezoardicum Curbi incompletum. (His3.)

R. Radicis Scorzonerae . . . unciam.
Sem n. Citri contus. drach duas.
Aque communis . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam, cola et adde
Pulv. bezoard Chinae semunciam.
Mellis Sambuci . . . uncias tres.
Gabe, vier Unzen.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum solutivum, Bezoardicum completum s. purgans Curbi. (His3.)

R. Dec. Scorzonere bezoard.
libr. quatuor.
Fol. Sennae mundat. semunciam.
Coque lente, cola et adde
Syrupi Rosarum solutivi uncias sex.
Pulv. bezoard. Chinae semunciam.
Purgirend. — Gabe, vier Unzen.

Scrophularia.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Scrophularia aquatica*, L.; Wasserbraunwurz, Wasserfropfwurz; Scrofulaire aquatique (Gal.); Water figwort (Ang.); Escrofularia aquatica (His.); Water speenkruid (Bel.); Scrophularia aquatica (L.); Escrofularia dos rosos (Lus.).

Wirt†. M†. Gal. Gen. Hs3. Gr.

3 (Didynamia Angiospermia, L.; Scrophulariae, J.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa an dem Ufer von Bächen wächst. (Blackw. t. 36. Hayne V. 36. Fl. méd. VI. 321.)

Man wendet das Kraut (herba Scrophulariae aquatica s. Betonicae aquatica s. Ficariae s. Castrangulae) an; es besteht aus einem glatten, vierseitigen, ästigen Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, runden, fast herzförmigen, gestielten grünen, glatten Blättern und hat einen unangenehmen und widerlichen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen, ekelhaften Geschmack.

2) *Scrophularia nodosa*, L.; knotige, gemeine Braunwurz, Feigwarzenwurz, Knollenwurz; Scrofulaire noueuse (Gal.); Knotty rooted figwort (Ang.); Swinsky neb Kytienjkowy koren, Rozchodnjik, Aneb prutznik (B.); Millemorbia, Ferriaria, Castrangola (I); Fredewnik (Pol.).

Br†. Wirt†. Wür†. M†. AD. Du. Fer. Gen. His3. Taur. Be. Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Scrophulariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 37. Plenck

t. 504. Hayne V. t. 85. Zorn Ic. pl. t. 28.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Scrophulariae s. Scrophulariae foetidae s. vulgaris*) ist dick, weiß, knotig, von unangenehmem Geruch und bitterem, etwas scharfem Geschmack, welcher durch Trocknen sich etwas verliert. — Das Kraut (*herba Scrophulariae nodosae*) besteht aus einem knotigen Stängel mit ganzen, eirunden, dreilappigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen bitteren, ekelhaften Geschmack.

Oleum Scrophulariae. (Vin.)

R. Herb. et Rad. Scrophulariae rec.

Olei Olivarum . . . partes tres, partem unam.
Infunde et cola exprimendo.

Unguentum Scrophulariae. (AD. Du.)

L.R. Foliorum Scrophulariae,
Axungiae Porci, sing. libras duas.
Æsevi ovilli libram.
Coque et cola exprimendo.

S e c a l e .

1) *Secale cereale, L.*; Roggen; Seigle commun (*Gal.*); Rye (*Ang.*); Rug (*D.*); Centeno (*His.*); Rog (*Bel.*); Segale (*I.*); Rez (*Pol.*); Sontejo (*Lus.*); Raeg (*Suec.*).

Bat. BorCt. Bor5t. Würt. Mt. Fer. GalP. Gen. His3. RC. Snec. Taur. Be. Er. G. Gr. Re. Sp. Z.

○ (*Triandria Digynia, L.*; *Gramineae, J.*) Eine Pflanze, welche ursprünglich in Creta und an den Ufern des Caspischen Meeres einheimisch seyn soll. (*Plenck t. 46. Lam. Ill. t. 49. Blackw. Herb. t. 424. Bert. Bild. II. 15. f. 2.*)

Man wendet den Saamen (*semen Secalis s. Frumentum*) an; er ist länglich, walzig, etwas spizig und röthlich und wird besonders als Mehl (*Farina Secalis*) benützt.

Hunt's economical Breakfast Powder (Par.): *Secale tostum Coffeae substitutum.*

Farinae resolventes. (Sp.)

R. Farinae secalitae,

— *triticeae,*

— *Hordei,*

— *Fabrarum,*

singularum partes aequales.

Misce exacte.

Pulvis absorbens pro usu externo. (R.)

R. Farinae Secalis . . . uncias quatuor.

— *Lupini uncias octo.*

Bei Rothlauf, Morgens und Abends die ergriffenen Theile damit zu bedecken.

An den Aehren einiger Getreidearten, besonders aber des Roggens, entwickelt sich eine Art Horn oder Sporn, welcher unter dem Namen

2) *Secale cornutum, Secale cornutum immaturum, Semina monstrosa Secalis cerealis, Ergota; Mutterkorn; Ergot (Gal.); Spurred, horned rye (Ang.).*

Bor5t. HassPt. HCt. HNt. Sax2t. AD. Am. GalP. LPC. Taur. C. Gr. Re. Va.)

bekannt ist. Es ist gewöhnlich krumm und langgestreckt, selten rundlich, zeigt meist drei stumpfe Ecken und Längsrünzeln und hat eine violette Farbe mit verschiedenen Schattirungen. Die innere Substanz ist schmutzigweiß und fest, zerbricht glatt und mit Geräusch; der Geruch ist, wenn das Mutterkorn frisch und in großer Menge vorhanden ist, unangenehm, der Geschmack etwas beißend und widerlich. Es wird bis einen und ancerthalb Zoll lang und zwei bis drei Linien dick.

Nach Decandolle ist es eine Art Schwamm, *Sclerotium Clavus, Clavus secalinus, Sphacelia segetum*, (*Düss. off. Pl. Suppl. I. t. 24. Mém. du Mus. 1816 t. XIV. fig. 8.*), nach Andern, und mit größerer Wahrscheinlichkeit, eine bloße krankhafte Ausartung des Ovariums der damit behafteten Grasarten, welche, nach Martin Field, durch den Stich einer Fliege verursacht wird, die darin eine schwärzliche Flüssigkeit zurückläßt, aber ihre Eier nicht in die Stichwunde legt. Dr. Winkler (*Geiger's Mag. 1826 Nov.*) nimmt ebenfalls eine thierische Excretion, z. B. Honigthau, als Ursache an.

Es enthält, nach Bauquelin, einen gelbfärbenden (*Ergotina UB*), einen andern violetten Stoff, ein weißes Del, eine freie Säure, welche Phosphorsäure zu seyn scheint, freies Ammoniak und einen stickstoffhaltigen Stoff.

Ein Reizmittel, dessen Mißbrauch schwere Zufälle, Starrkrampf, Brand der Glieder und den Tod hervorbringt. In kleinen Gaben scheint es Zusammenziehung des Uterus zu bewirken. Auch hat man es bei schweren Niederkünften in Folge der Unthätigkeit dieses Organs, oder bei Mutterblutflüssen von Mangel an Ton desselben empfohlen. Nach Hall (*vergl. v. Frovriep's Notiz. d. Nat. u. Heilk. Nr. 322*) wirkt es durch Einsaugung in die Blutmasse und Langsamermachen der Circula-

S e d u m.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Sedum acre*, L.; Rogenträublein, Mauerpfefter, kleines Hauslauch; Vermiculaire brûlante, Poivre de muraille (Gal.); Wallpeper (Ang.); Netresk, Tucny muzjk neymensj (B.); Helleknop (D.); Siempreviva menor, Uvas de gato (His.); Sherp huislock (Bel.); Sedo acre o minore, Vermicolaria, Erba pignuola (I.); Vermicularia (Lus.); Motodile (R.); Fetknoppar, Haellegraes (Succ.).

Bat. Brt. Saxt. Wirt. Mt. Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. Gen. His. S. Suec. Taur. Be. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

2) (*Decandria Pentagynia*, L.; *Crassuleae*, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. IV. 209 Plenck t. 351.)

Das Kraut (*herba Sedi minoris s. minimi s. Illecebrae s. Illecebræ vermicularis*) besteht aus einem glatten Stängel mit zerstreuten, eirunden, fast dreieckigen, kurzen, saftigen, hellgrünen, nahe an einanderstehenden Blättern, hat keinen Geruch, aber einen scharfen, beißenden, pfefferartigen Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert.

Innerlich reizend, Brechen und Purgiren erregend, äußerlich hautröthend.

2) *Sedum Rhodiola*, L.; Rosenwurz, Rhodiserwurz; Orpin rose (Gal.); Rosewort (Ang.); Rosenrod (D.); Rosenwortel (Bel.); Rodiola (I.); Rosenrot (Succ.).

Br. Wirt. Mt. Gal. Taur. Be. Gr. Re. Sp.

2) (*Dioecia Octandria*, L.; *Crassuleae*, J.) Eine auf hohen Gebirgen Europa's wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 180 Plenck t. 716.)

Man wendet die Wurzel (*radix Rhodiolae s. Rhodiolae roseae s. Rhodiae s. Rosariae*) an; sie ist ästig, weiß, fleischig und knollig, besonders am obern Theile. Sie hat einen sehr angenehmen Rosengeruch und einen etwas scharfen, styptischen Geschmack.

3) *Sempervivum tectorum*, L.; großer Hauslauch, Hauswurzkräut; Joubarbe des toits, grande Joubarbe (Gal.); Great common houseleek (Ang.); Netresk, lukny muzjk wettj (R.); Huuslaeg (D.); Siempreviva de tejados (His.); Donderbaard, Huuslook (Bel.); Siemprevivo, Orchiella, Barba di Giove (I.); Hazi zoeld (M.); Rozahednik wielki (Pol.); Sempreviva (Lus.); Tschesnok dikoi (R.); Huuslaek (Succ.).

tion, wodurch das Blut unfähig wird, den Uterus und Fötus länger zu erhalten. — Gabe, zehn Gran ein oder zwei Mal, oder zehn bis dreißig Gran in sechs Unzen Beihel.

Pulvis Secalis cornuti s. emmenagogus. (E2)

R. Pulveris Secalis cornuti scrupulos duos.

Divide in partes iv. — Ein Stück Morgens und Abends in Zuckerwasser,

Infusum Secalis cornuti. (B*. E2.)

R. Secalis cornuti . semidrachmam. Aquae bullientis uncias quatuor.

Infunde et cola. — Gabe, den dritten Theil, und nöthigenfalls nach vier und zwanzig Stunden diese Gabe zu wiederholen.

E2. Secalis corn. drachm. duas, Aq. bull. unc. sex. — Löffelweise bei lange dauernder Geburt von Mangel an Contraction des Uterus.

Decoctum Secalis cornuti. (HNt. Aut. B*. Va.)

R. Secalis cornuti . . . unciam. Aquae fontanae sesquioctarium.

Decoque ad octarii unius remanentiam.

HNt. Secalis drachma cum Aqua ad colaturam unciarum quatuor (alle 4 Stunden der dritte Theil, oder alle 10 Minuten 1 Löffel); — Va. Aquae libras duas cum dimidia ad unam decoquere. — Von mehreren Practikern dem Aufsaufe vorgezogen. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstunden.

Potio partum accelerans s. ocytica. (Pie. Va.)

R. Secalis cornuti pulv. drachmam. Syrupi Sacchari . . uncias tres. Laudani Liquidi . guttas viginti. Essentiae Bergamottae . . q. s.

Syrupus Secalis cornuti. (DB.)

R. Secalis cornuti pulver. unciam, macera per helidomadem in Vini albi . . . uncias sex.

Filter et decoque bis vel ter residuum; mixtis liquoribus adde

Sacchari albi . . uncias decem, ut fiat syrupus spissus, admisce denique tincturam vinosam et evapora ad aptam consistentiam.

Zur Beförderung der Geburt. Gabe, 12—16 Drachmen.

Br. Ful. Ham. Lit. Of. Wür. M. Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. Gen. His. R. Taur. Be. Br. Fi. G. Gr. Re. Sp. Z.

4 (Dodecandria Dodecagynia, L., Crassuleae, J.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Fl. méd. IV. 208. Plenck t. 372.)

Man wendet das Kraut (herba Sempervivi s. Sedi majoris) an; es besteht aus einer Rose zarter, fleischiger, runder, spitziger, grüner, auf beiden Seiten glatter, an den Rändern behaarter Blätter. Der Geruch ist kaum merklich, der Geschmack wässrig, kühlend, herb, styptisch, wie salzig.

Gabe des Safts, zwei Unzen. — Neuerlich zum Pflaster. (Fi.)

Gr. führt außer diesen noch *Sedum anacampseros* (Plenck t. 353.), *cepaea*, kühlend, adstringierend und harntreibend, und *S. minus, album* (Plenck t. 352.) Taur. an

Succus Sempervivi majoris. (DB.)

Paratur ut succus Cichorii.

Cerevisia antiscorbutica. (B*.)

R. Sedi acris . . . manipulos octo.
Cerevisiae libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam. —
Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

Syrupus Sedi majoris s. Sempervivi.
(Wirt.)

R. Succi Sempervivi decoctione ad dimidium redacti uncias decem.
Sacchari albi . . . uncias decem.
Ebulliant semel et colentur. — Kühlend, beruhigend.

Unguentum leniens, Pomatum sedans.
(Ca. Sm.)

R. Succi Sedi majoris,
Olei Olivarum, sing. . . part. aeq.
Subige. (Sm.)

Ca. Succi, Axungiae, sing. uncias tres et Olei Amygdalarum dulc. quatuor.

Vorteilhaft bei Hautreizung und, wie man behauptet, auch zur Stillung von mit Krebschäden verbundenen Schmerzen.

Oleum Rhodiolae roseae a Gr. indicatur.

Aqua Rhodiae Radicis (Gr.) statt des Rosenwassers verkauft.

S e l i n u m .

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Selinum Cervaria*, Ro.; Hirschwurz, Hirschheil, Hirschkpetersilie, Bergkpetersilie;

Carotte de montagne, *Persil de montagne* (Gal.); Broad leaved spiguel (Ang.); Gekruiste beerwortel (Bel.).

Wirt. Sp.

4 (pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze, welche auf den Gebirgen Europa's wächst. (Jacq. Aust. I. t. 69.)

Man wendet die Wurzel (*radix Cervariae nigrae s. Gentianae nigrae*) an; sie ist lang, dick, geringelt, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen angenehmen und starken Geruch und einen gewürzhaften, beißenden Geschmack.

2) *Selinum palustre*, L.; Sumpfsäfsenich, Milchkpeterling, Sumpfkpetersilie; *Persil des marais* (Gal.); Marsh selinum (Ang.); Wandmerke (D.); *Apio lechal* (His.); Wilde eppe (Bel.); Finsk ingfaera (Suec.).

Br. Wirt. Sp.

4 oder 3 Eine in Europa an sumpfigen Orten häufige Pflanze. (Jacq. Austr. II. t. 152.)

Man wendet die Wurzel (*radix Tyllelini s. Olsnitii*) an; sie ist spindelförmig, ästig, außen gelblich oder schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen starken, gewürzhaften und unangenehmen Geruch und einen starken, etwas bitteren und brennenden Geschmack.

3) *Selinum Oreoselinum*, Ro.; Bergkpetersilie, Grundheil; *Selin de montagne*, *Persil de montagne* (Gal.); Divariated spiguel (Ang.); Wilde quale rodder (D.); *Apio de montana* (His.); Bergselie (Bel.); *Apio de montagna* (I.); *Opich gorny*, *Pietruszka gorna* (Pol.); *Apio di montagna* (Lus.); *Vild morat* (Suec.).

Borf. Br. Hanf. Saxf. Wirt. M. Gal. Pol. Sp.

4 Eine Europäische Pflanze. (Hayne VII. t. 3. Zorn Ic. pl. t. 400.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Oreoselini s. Apii montani*) ist fingerdick, sehr lang, faserig, mit einer schwärzlichen Oberhaut bedeckt, unter derselben weiß und in der Mitte gelblich. Sie hat einen angenehmen, gewürzhaften Geruch und einen gewürzhaften, bitterlichen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem runden, schwach gestreiften, glatten, rötlichbraunen Stängel mit dreifach gefiederten, hellgrünen, glatten, aus lanzettigen Blättchen bestehenden Blättern. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und gewürzhaft. — Der Saame ist eiförmig, platt, auf einer Seite glatt, auf der andern gefurcht, roth und mit einem weißen Rande umgeben. Er hat einen starken Geruch und einen bitteren Geschmack.

Reizend, harntreibend, nervenstärkend.

Gr. führt noch *Selinum carvifolia* und *sylvestre* an.

Tinctura Oreoselini. (Sw*.)

R. Florum recentium Oreoselini
uncias duas.
Seminum Selini . . . unciam.
Aquaë Vitæ uncias quatuordecim.
Post aliquot dies infusionis cola.

Reizend, blähungstreibend; in Fällen empfohlen, wo es passend ist, besonders den Magen zu reizen. — Gabe, eine Unze zweimal täglich nach der Mahlzeit.

Senecio.

Von den Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Senecio vulgaris*, L.; gemeines Kreuzkraut; *Senecion ordinaire* (Gal.); *Commin* grundel (Ang.); *Kuasurt* (D.); *Hierba cuna* (His.); *Gemeen kruiskruid* (Bel.); *Senecione* (I.); *Przymiotow ziele* (Pol.); *Darneirinha*, *Cardo morto* (Lus.); *Krastownik* (R.); *Ston aert* (Succ.).

Br. M. GalP. His. LP. Gr. Re. Sp.

⊙ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, Cass.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (Hayne VIII t. 10. Pl. méd. VI. 324.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Senecionis s. Erigeri*) an; es besteht aus einem röhrigen, fast glatten, ästigen Stängel mit sitzenden, abwechselnden, umfassenden, am Rande behaarten, buchtigen, gezähnelten, unregelmäßigen, glatten Blättern und einen sehr schlaffen, endständigen Strauß bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist krautartig, etwas sauer und salzig.

Nach Pinazzi dient ein Eßlöffel des Safts zur Verhütung hysterischer Zuckungen, wenn man ihn vor dem Eintritt derselben reicht.

2) *Senecio Jacobaea*, L.; Jakobskraut, Jakobskreuzkraut; *Jacobée* (Gal.); *Ragwort* (Ang.); *Jacobskruid* (Bel.).

Gal. Gr. Re. Sp.

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne VIII. t. 11. Oed. Fl. Dan. t. 944.)

Man wendet das Kraut (*herba Jacobae s. Segerum*) an; es besteht aus leyerförmigen, doppeltgelebertspaltigen, gezähnten, glatten Blättern von unangenehmem, scharfem und bitterem Geschmacke.

Tonisch.

Pharmacopoea universalis, II. Bb. 3. Aufl.

Senna.

Senna; *Séné* (Gal.); *Senna* (Ang.); *Suna* (Ar.); *Sena* (B.); *Sana pat* (Beng.); *Nilaverie* (Cy); *Senet* (D.); *Sen* (His.); *Suna mukki* (Hin.); *Senne* (Bel.); *Sena* (I.); *Liscia*, *Senesowe* (Pol.); *Senne* (Lus.); *Amschunatydivandiva*, *Buttallapotaka* (a.); *Nilaveri*, *Nilavaghei* (Tam.); *Nayla tungadu*, *Nela ponna* (Tel.).

A. BorCt. Bor5t. Br. Ful. Hamf. Hanf. HassPt. HGt. HNt. Lit. Ot. Sax2t. Wirt. Würt. WWt. Mt. AD. Am. Ans. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Succ. Taur. A. Be. Br. C CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Z.

Man wendet unter dem Namen Senna in der Medicin Blätter und Früchte (*Folia et Fructus*) an.

A. Folia. Die im Handel vorkommenden Sennesblätter sind eine Mischung von Blättern dreier verschiedener Pflanzen:

1) *Cassia obovata*, Coll., C. Senna (*Decandia Monogyna*, L.; *Leguminosae*, L.), stumpfblättrige Senna-Cassie; *Casse à feuilles obtuses* (Gal.), ein Strauch Syrien's und Aegypten's. (Plenck t. 326. Düss. off. Pl. VII. t. 12. XVIII. t. 8. Hayne IX. t. 43.) C. obusata (Fl. med. VI. 323. Bert. Bild. IV. 32. f. 1.) Diese Pflanze liefert die Senna von Sand, Thebaïs, die stumpfblättrige Senna, die Senna der Armen, von Aleppo, der Barbarei, die Spanische, Italische (*Senna belady*, Ar.), welche aus eirunden, am Grunde verschmälerten, kurz stachelspitzigen, unten schrägen, mit deutlichen Seitenrippen versehenen Blättchen besteht.

2) *Cassia lanceolata*, Forsk.; C. acutifolia; lanztblättrige Senna-Cassie; *Casse lanceolée* (Gal.) ein Halbstrauch Arabien's und Sennaar's (Encycl. méth. t. 33. fig. 3. Düss. off. Pl. XI. t. 6.), welcher die Rubische, Bicharische, spitzblättrige, Alexandrinische, Morgenländische, Aegyptische (*Alexandrina*), Palthische (*de la Palthe*) und, nach Hayne, auch die Tripolitane (*Senna Tripolitana*) (*Senna guebelly*, Mekky, *Li-san ala-four*, Ar.) Senna liefert, deren Blättchen unten behaart, lanzettförmig und kurz stachelspitzig sind. Unter den Blättern von dieser finden sich auch die von *Cassia absus* (Düss. off. Pl. XIV. t. 18.)

3) *Cynanchum Arghel*, Del.; Arghel; Arghel, Arghel (Gal.) h (Pentandria

Monogynia, L.; *Apocynae*, J.), eine Pflanze Oberägyptens (*Nect. Voy. en Haute Egypte* t. 3. Düss. off. Pfl. Suppl. I. t. 13.), welche allein von der Französischen Pharmacopöe aufgenommen ist. Die Blätter, unter dem Namen *Séné de la pique* bekannt, sind eirundlanzettförmig, ganz, ledrig, weißlich, fast sitzend, zwölf bis vierzehn Linien lang und am Grunde regelmäßig, mit einer unten hervorstehenden Mittelrippe ohne Seitenrippen.

Seit dem J. 1821 ist auch eine Sorte Sennesblätter unter dem Namen der Indischen (*folia Sennae indicae* s. de Mokka s. de Mocha, *Senna Arabica*) im Handel vorgekommen, die sich durch größere Länge, blaß gelblichgrüne Farbe u. untercheiden. Sie sollen von *Cassia elongata*, Lemaire, nach Hayne von *Cassia acutifolia*, Delisle (Düss. off. Pfl. XVIII. t. 7.) kommen.

Außerdem findet man noch in der käuflichen Senna Reste von Stielen oder Zweigen, bisweilen auch Balge oder Früchte, Reste von Blättern, Blüten u. fremde Stoffe, und besonders Blätter vom Blasensstrauch (*Colutea arborescens*), auch von *Coriaria myrtifolia* (Düss. off. Pfl. Suppl. I. t. 14.), *Periploca graeca*, *Globularia alypum* und andern Arten *Cassia* und *Colutea*. Ihr Geruch ist ekelerregend, anhaltend, eigenthümlich und sehr widerlich; der Geschmack etwas bitter.

B. Fructus, Folliculi Sennae. Es sind eirunde, längliche, zusammengebrückte, bogenförmig gekrümmte, gelbliche Hülsen oder Balge ohne ihre vier oder sechs herzförmigen Samen.

Die Senna enthält, nach Passaigne und Kenault, Chlorophyll, eine geringe Menge fettes Oel, Eiweiß, einen gelbfärbenden Stoff, Aepfelsäure, Kali- und Kalksalze und endlich einen eigenthümlichen Stoff, welcher den Grund ihrer Wirkung zu enthalten scheint, das Cathartin (*Cathartina*, *Cathartinum*).

Mit starken Säuren, kohlensäuerlichen Alkalien, Kaltwasser, salpetersaurem Silber, essigsaurem Blei, Brechweinstein und dem Aufgusse der gelben China darf man sie nicht verbinden.

Es ist ein sehr kräftiges Purgirmittel, dessen Wirkung auf die Verdauungswege fast immer Ekel und Coliken veranlaßt. Man wendet sie selten in Pulver und dann zu einem Scrupel bis zu einer Drachme an.

§. I. Präparate, welche die Senna in Substanz enthalten.

Species purgantes. (Hu/.)

R. Foliorum Sennae . drachmam.
Natri sulphurici . . . unciam.

Man läßt diese Species in drei Tassen Wasser kochen und nimmt von dieser Abkochung alle Stunden eine halbe Tasse.

Battle's Green Senna Powder. (Gr. Re.)

E. Folii Sennae calefactis donec flavuerint et cum Pulvere Carbonis commixtis.

Pulvis pectoralis. (B*.)

R. Foliorum Sennae,
Semen Anisi,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Sacchari crystall.
unc. duas c. dimid.

Von Krihe gerührt. — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich vier Mal.

Pulvis Glycyrrhizae s. Liquiritiae compositus s. pectoralis s. Sennae cum Sulphure. (BorCt. Bor5t. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Sax2t. Auf. GalM. Pol.)

R. Foliorum Sennae . semunciam.
Florum Sulphuris,
Semen Anisi, sing. . unciam.
Rad. Liquiritiae unc. duas c. dim.
Misce. (BorCt. Auf. GalM.)

R. Foliorum Sennae,
Rad. Liquiritiae, sing. unc. duas,
Semen Foeniculi,
Florum Sulphuris, sing. unciam.
Sacchari albi . . . semilibram.
Misce. (BorCt. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Pol.)

Auf. Sennae, Sulphuris, sing. sesquidrachmam, Foeniculi, Liquiritiae et Sacchari Lactis, sing. drachmam; — Bor5t. Sennae, Glycyrrhizae, sing. uncias sex, Sacchari libras tres, Anisi uncias duas, Florum Sulphuris quatuor; — Sax2t. Anisi drachm. duas, Sulph. sublim. loti semunciam, Rad. Liquirit., Folior. Sennae, sing. drachm. sex, Sacchari albiss. uncias quatuor cum dimidia.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Pulvis Guajaci cum Senna s. antiictericus. (Auf.)

R. Foliorum Sennae,
Rad. Guajaci, sing. . part. aeq.
Gabe, zwei Kaffeelöffel, zwei oder drei Mal täglich. — Soll mit großem Erfolg bei Gelbsucht angewendet worden seyn.

Pulvis laxans s. lenitivus tartarizatus s. Sennae compositus (Of. Wirt. Sw. Vm.)

R. Pulv. Foliorum Sennae,
— Anisi,
— Sacchari albi,

Pulv. Cremor. Tart., sing.

unciam.

Misce bene. (O⁺.)

R. Foliorum Sennae,

Cremoris Tartari, sing.

unciam.

Cinnamomi,

Anisi,

Foeniculi, sing. . drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sw.)

Wirt. Anisi et Foeniculi, singulorum semidrachmam.

R. Foliorum Sennae partes sedecim.

Cremoris Tartari partes quatuor.

Foeniculi . . . partes duas.

Cinnamomi,

Macidis, singulorum partem unam.

Misce. (Vm.)

Species laxantes St. Germain (HC⁺.)

Foliorum Sennae, extractione spirituosa depuratorum unciae quatuor, Florum Sambuci unciae duae cum dimidia, Seminis Foeniculi, Anisi, sing. drachmae decem, Tartari depurati drachmae sex concisa et contusa bene commisceantur.

Pulvis pectoralis viridis (Dulk.): Fol. Senn., Sacch. alb., sing. drachm. sex, Tart. depur. duas, Sem. Foenic. et Anisi, sing. unam.

Pulvis antiarthriticus purgans s. purgativus s. e Senna s. Sennae compositus, Pulvis Diasennae, Pulvis gregorianus. (Wirt. AD. Gal. GalM. Lon. LouN. Sar. Succ. Taur. C. CG. Gr. Re. Va. Vm.)

R. Foliorum Sennae . . . uncias duas.

Scammonii unciam.

Cremoris Tartari uncias quatuor.

Pulverata seorsim deinde misce. (Fenn. Succ.)

R. Foliorum Sennae,

Cremoris Tartari, sing. unc. duas.

Scammonii semunciam.

Zingiberis drachmas duas.

Pulveratis scammonio et reliquis seorsim, pulveres commisce. (Lon. LouN. AD. C. CG. Gr. Re. Va.)

Vm. Sennae, Cremoris Tartari, sing. partes octo, Scammonii duas et unam Zingiberis.

Gr. Fol. Sennae, Cremoris, sing. uncias duas, Caryophyll., Cinnamomi, Galangae, Semin. Ammeos, sing. drachmas duas, Scammonii semunciam; vel: Ammi et galangam omittens, Zingiberis drachmas duas addit.

R. Foliorum Sennae,

Cinnamomi,

Cremoris Tartari,

Gummi Arabici, sing.

part. quatuor.

Ligni Guajaci,

Sarsaparillae,

Scammonii, singulorum partes duas.

Fiat pulvis tenerimus. (GalM.)

Gal. Re. eandem formulam, Chinae tamen partes duas addendo.

R. Foliorum Sennae sesquiunciam.

Cremoris Tartari,

Mechoacannae, sing. semunciam.

Rhei drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sar. Taur.)

R. Sennae scrupulos duos.

Cremor. Tart. gr. viginti quinque.

Zingiberis,

Jalapae,

Bacc. Juniperi, sing. gr. quindecim.

Sacchari semunciam.

Fiat pulvis. (Wirt.)

Pulvis longae vitae s. ad longam vitam. (Bo. Ca.)

R. Fol. Sennae mundat.,

Rasur. Ligni betulini, sing. libram.

Seminum Anisi,

— Portulacae, sing. libras duas.

Ligni Santali albi,

— — rubri, sing. semilibram.

Fiat pulvis. — Gabe, ein Kaffeelöffel auf sechs Tassen kochendes Wasser, welches man mit Zucker vermischt und Morgens nüchtern trinkt. — Ein mildes Laxirmittel.

Pulvis stomachalis Dörflingensis (Dulk.): Rad. Inulae, Calami, Pimpin., Zedoar., Liquir. et Zingib., sing. drachm. duas, Caryophyll., Cardamom. min., Cass. cinn., Piment., Anisi, Cumini, Foenic., Petros-l., Aloës, Rhei, sing. tres, Macid., Nucis mosch., sing. unam, Tart. depur. sesquiunciam, Fol. Senn. unc. duas c. dimid., Veronic., Centaur. min., Card. bened., Bacc. Junip., sing. scrup. quatuor, Conchar. praep. drachm. duas, Sacch. alb. uncias decem, pulv. misce sedulo.

Nodulus purgans. (Sa.)

R. Herb. Trifolii,

— Fumariae, sing. manipulum.

Rad. Pimpinell. alb. drach. tres.

— Gentianae,

Cascarillae, sing. semunciam.

Cort. Aurant. i Curass. drach. sex.

Seminum Dauci

— Anethi, sing. drach. duas.

Rhei semunciam.

Foliorum Sennae drachmas sex.

Salis cathartici amari uncias duas.

Bolus purgans. (Sp.)

R. Pulv. laxantis gr. viginti quatuor.

Mellis q. s.

Fiat bolus.

Pilulae tonicae et purgantes. (Pie)

℞. Foliorum Sennae,
Radicum Scrophulariarum amba-
rum, singularum unciam.
Hermodactylorum,
Radici Angelicae,
Turpethi veget., sing. drach. dua.
Scammonii scrupulos quatuor.
Syr. Rosarum pallid. . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. — Gabe bis
zwei Drachmen, nöthigenfalls mit Zusatz
von zwanzig Gran mercurius dulcis.

Passulae laxativae, Confectio passulata
(Palt. Wirt. D. Sar. Sp. Vm.)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquaе communis libras quatuor.
Sacchari albi,
Passularum min., sing. . libram.
Olei essentialis Citri guttas viginti.
Digere sennam in aqua bulliente et
in colatura coque passulas; pulpam per
cribrum setaceum trajice, illam cum
saccharo ad plumam cocto blando igne
ad electuarii consist. inspissa et refri-
geratae adde oleum cum sacchari pau-
xillo contritum. (Sar.)

Addendo hujus electuarii semunciae
Pulveris Jalapae drachmam: Confectio
passulata cathartica (Sar) obtinetur.

℞. Cinnamomi . . drachmas tres.
Foliorum Sennae . . uncias duas.
Passularum minorum,
Sacchari, sing. . . . libram.
Macerate sennam in Aquaе unciis qua-
tuor; post sufficientem extractionem
adde liquidi uncias octo et passulas
bene mundatas submergendo, cum sac-
charo syrupum spissum para; syrupo
adhuc calido adde passulas et ad re-
frigerationem usque agita. (Vm.)

Wirt. et Sp. Sennae uncias quatuor,
Aquaе decem, Cinnamomi drachmas
duas, Zingiberis albi sesquidrachmam,
Sacchari et Passularum minorum, sing.
uncias duodecim; — Palt. Sennae un-
cias octo, Foeniculi semunciam, Cin-
namomi drachmas dua., Aquaе satis
ut sesquilibra colaturae obtineatur,
Sacchari ad plumam cocti se quilibram
et Passularum minorum mundatarum
tantidem.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquaе communis . . uncias decem.
Coque, sub finem addendo
Cinnamomi . . drachmas tres
Colaturam post expressionem coque
cum
Sacchari albi libra.
Syrupum colatum infunde
Passularum minorum librae uni.
Serva. (D.)

Eodem modo praeparatur Confectio
de Prunis s. Diaprunum (Wirt. Sar. Sp.)
loco passularum Pruna Damascena in
Aqua ad mollitiem usque coct. adhi-
bendo.

*Electuarium Sennae s. e Senna s. Sen-
nae cum Pulpis s. (Foliorum) Sennae
compositum, Electuarium aperiens s. ca-
tholicum commune s. Diaprunum s.
eccoproticum s. lenitivum, Electuarium
Tamarindorum Confectio Sennae. (A+.
Ba+. BorC+. Bor5+. Br+. Ful+. Han+.
HassP+. HC+. HN+. Li+. O+. Palt+.
Sax2+. Wirt+. WW+. AD. Am. Ams.
B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. GalF. GalP.
Gen. HisS. LH. LonN. LoP. LP. Lus.
Pm. Pol. Sar. Suec. Taur. C. CG. DB.
Fi. Gr. Sp. T. Vm.)*

1) Ohne Weinsteinrahm.

℞. Rad Polypodii querni

unc. quatuor.

Fol. Sennae mund. . . uncias duas.

— Mercurialis manipulos tres.

Aquaе communis . . libras octo.

Macerate sennam per horas sex in
Aquaе bull. libris duabus et cola; in-
funde polypodium in reliqua aqua et
coquendo dimidium consume; adde
deinde folia mercurialis; post brevem
ebullitionem exprime et cola; in co-
latura coque

Prunorum du.c. enucl. uncias sex.

Pulpam per cribrum setaceum tra-
jice et tunc recipe

Hujus Pulpae,

Pulpae Tamarindorum,

— Cassiae,

Conserv. Violarum, sing. unc. sex.

Sacchari albi in Tinct. Sennae sol.

et ad syrup. spiss. cocti

libras duas.

Coque pulpae et syrupum igne blan-
dissimo et continue agitando ad hu-
midi superflui consumptionem usque;
adde conservam et tunc pro quaque
libra electuarii refrigerati

Pulv. Sennae mund.

sesqui(semi)unciam.

Misce bene. (Sar. Taur.)

℞. Rad Polypodii querni unc. duas.

— Liquiriti e . . semunciam.

Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,

— Mercurialis, sing. unciam.

Florum Violarum . . semunciam.

Hordei mundati,

Passularum min., sing. unc. duas.

Jujubarum,

Sebestenarum, sing. . . unciam.

Aquaе font. libras duas c. dimid.

Coque ad librae unius liquidi rema-
nentiam et in colatura solve

Pulpae Cassiae,

Pulpa Prunorum,
 — Tamarindorum,
 Sacchari albi, sing. . uncias sex.
 Coque ad consist. electuarii et adde
 Pulv. Fol. Sennae
 unc. tres c. dimid.
 Conservae Violarum . uncias sex.
 Misce exacte. (Br†. Sp.)
 R. Uvarum pass. enucl. uncias duas.
 Adianti nigri,
 Florum Violarum,
 Hordei mund., sing. manipulum.
 Jujubarum,
 Sebestenarum, singularum no. 20.
 Liquiritiae semunciam.
 Prunorum enucleatorum,
 Tamarindorum, sing. drach. sex.
 Foliorum Sennae,
 Polypodii querni, sing. unc. duas.
 Mercurialis semimanipulum.
 Aquae q. s.
 Coque ad consumptionem liquidi tri-
 entium duorum, cola et in colatura
 dissolve
 Sacchari albi uncias sex.
 Coque ad aptam consist. et adde
 Pulpa Cassiae,
 — Prunorum,
 — Tamarindorum,
 Conserv. Viola. um, sing. unc. sex.
 Pulv. Fol. Sennae
 unc. tres c. dimid.
 Misce bene. (Pal†.)
 R. Hordei integri,
 Radicis Polypodii,
 Passularum minorum,
 Tamarindorum, sing. uncias duas.
 Prunorum Damascenorum,
 Jujubarum,
 Fol. rec. Scolopendrii, sing.
 sesquiunciam.
 Liquirit. ras. et contus. unciam.
 Fol. Mercurialis uncias quatuor.
 Coque hordeum, donec dirumpatur,
 tunc polypodium contusum et denique
 reliquas substantias in Aquae q. s.
 coque tidem seorsim
 Foliorum Sennae uncias duas.
 Decocta commixta coque ad uncia-
 rum quinque liquidi remanentiam et
 adde deinde
 Sacchari albi libr. duas c. dimid.
 In syrupo ad apt. consist. cocto
 solve
 Extracti Cassiae,
 Pulpa Tamarind., sing.
 unc. novem.
 et tunc commixtis
 Pulv. Fol. Sennae unc. quinque.
 — Foeniculi contusi,
 — Anisi contusi, sing.
 drach. duas,

Commisce spatulae ligneae ope.
 (GalP.)
 R. Liquiritiae unciam.
 Radicis Polypodii,
 Sennae mund., sing. . unc. duas.
 Succus Mercurialis depur. unc. octo.
 Infunde, cola leviter exprimendo et
 in colatura dilue
 Passularum min. contus.
 unc. quatuor.
 Solve deinde in massa
 Sacchari crudi teneris
 unc. quadraginta.
 Cola syrupum calidissimum per pan-
 num et ad consist. roch inspissato adde
 Pulpa Prunorum uncias quatuor.
 — Cassiae,
 — Tamarind., sing.
 unc. septem.
 Ad electuarii consistentiam consume,
 sub finem, calore diminuto, addendo
 Semin. Anisi,
 — Foeniculi, sing. drach. duas.
 Pulvera et parumper cum una pul-
 parum tere. (Vm.)
 R. Rad. Polypodii contus. uncias sex.
 Aquae libras decem.
 Coque, sub finem addendo
 Foliorum Malvae unciam.
 In colatura dissolve
 Mellis libras novem.
 Fiat syrupus spissus, cui adde
 Pulpa Prunorum . sesquilibram.
 Pulveris Sennae Hispanicae
 libram.
 — Anisi uncias duas.
 Misce. (His3.)
 R. Radicis Polypodii uncias quatuor.
 Aquae libras quatuor.
 Coque ad duorum trientium liquidi
 circiter remanentiam, adde
 Foliorum Sennae uncias duas
 et ab igne remove, post refrigeratio-
 nem cola et in liquido solve
 Sacchari albi libras duas
 et ad syrupi spissi consistentiam con-
 sume; syrupo adde
 Pulpa Prunorum,
 — Tamarindorum,
 — Cassiae, sing. uncias sex.
 Massam, addendo
 Fol. Sennae subtiliss pulv.
 unc. duas
 ad requisitam consistentiam redige. (T.)
 Fi. sub finem addit Foliorum Sen-
 nae uncias duas cum dimidia; — DE.
 Pulpa Cassiae, Pulpa Tamarind., sing.
 libram, Syrupi simplicis libras duas
 cum dimidia, Sennae uncias duas cum
 dimidia.
 R. Caricarum uncias sex.
 Radicis Liquiritiae uncias duas.
 Aquae libras quatuor.

Decoque ad dimidii remanentiam,
cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . . . uncias sedecim.
In syrupo dilue

Pulpae Tamarindorum,
— Prunorum, sing.
unc. quinque.

Pulv. Fol. Sennae
unc. quatuor c. dim.

— Anisi semunciam.
Misce bene. (Bor†. Han†. O†. Pol.)

HN†. Aquae fontanae libras tres co-
quere ad colaturae unciarum sedecim
remanentiam, Pulv. Folior. Sennae un-
cias quatuor et Semin. Coriandri un-
cias duas, caetera ut antea; — Bor5†.
Caricarum uncias octo ex Aquae libris
quatuor ad dimidium coquere, expri-
mere, colare, decoctum ad uncias duo-
decim consumere, dissolvere in eo
Sacchari uncias sedecim et syrupo im-
miscere Pulpae Tamarindorum uncias
octo, Foliorum Sennae et Anisi stellati
ut Bor†. absque liquiritia et pulpa
prunorum.

R. Foliorum Sennae . . . uncias octo.
Coriandri uncias quatuor.
Liquiritiae uncias tres.
Caricarum siccarum . . . libram.
Pulpae Tamarindorum,
Pulpae Cassiae,

— Prunorum, sing. semilibram.
Sacchari albi libr. duas c. dimid.
Tere sennam cum coriandro et cri-
bra, separa pulveris uncias decem; re-
siduum cum caricis et liquiritia in
Aquae libris (octariis) quatuor (tres
LPC.) ad duas (sesquioctarium LPC.)
decoque; cola exprimendo, quartam
colaturae partem consume, adde sac-
charum et syrupo pulpas et tunc pul-
verem immisce. (AD. Am. B. Bel. Ed.
Gen. LonN LPC. C. CG. Gr. Re.)

Sax2†. Caricarum uncias quatuor co-
quere cum Aq. font. q. s. in colatura
unciarum sex solvere Sacchari albi un-
cias decem, Pulpae Cassiae, Prunorum,
Tamarind., sing. duas interere Fol.
Sennae pulv. unc. duas, Coriandri
pulv. unam, Rad. Liquir. pulv. scrup-
ulos sedecim. (Elect. lenitiv. s. e
Senna Londinense s. eccoproticum Lon-
dinense); — Gr. praeterea: Caricarum,
Pulpae Prunorum, sing. libram, reli-
qua ut antea absque pulpa cassiae.
(Elect. Cassiae Sennae.)

R. Pulpae Prunorum . . . libram,
— Tamarindorum uncias duas.

Syrupi Sacchari . . . sesquioctarium.
Coque ad mellis consistentiam et
adde

Pulv. Fol. Sennae uncias quatuor
et post refrigerationem

Olei ess. Carvi . . drachmas duas.
Misce sedulo. (Du.)

Gr. Sennae uncias tres, reliqua ut
antea.

R. Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum, sing. unciam,

Pulv. Fol. Sennae . . drach. duas,
— Foeniculi . . . semunciam,

Misce triturando. (Li†)

R. Pulpae Cassiae recenter paratae,
— Tamarind., sing. libram.

Pulv. Fol. Sennae
unc. duas c. dimid.

Syrupi simplicis . . uncias triginta.

Misce et balneo maris ad necessa-
riam spissitudinem evapora. (Pm.)

R. Pulpae Prunorum . . . libram.
— Cassiae,

— Tamarindorum, singularum
uncias duas cum dimidia.

Pulv. Fol. Sennae unc. quatuor.
— Coriandri . . . semunciam.

Syrupi Sacchari . . . libram.
Misce. (Ans.)

R. Foliorum Sennae pulveratorum
uncias duas.

Seminis Coriandri pulverati
unciam.

Pulpae Tamarindorum,
— Prunorum, sing.
uncias quatuor.

Syrupi Liquiritiae uncias novem.

Misce, leni calore adhibito, et serva.
(HC†.)

R. Pulpae Tamarindorum . . libram,
Pulv. Fol. Sennae unc. quatuor,

— Coriandri . . . semunciam,
Syrupi Sacchari . . . uncias octo.

Misce bene. (Fenn. GalF. Suec.)

R. Pulpae Prunorum . . libras duas,
Pulv. Fol. Sennae . . . unc. octo,

— Coriandri . . . uncias quatuor,
Syrupi Rosarum solutivi . . q. s.

Misce. (Wirt. Lus.)

R. Pulv. Seminum Anisi grana sex,
— Fol. Sennae . . . drachmam,

Pulpae Tamarindorum drach. duas,
Syrupi Althaeae . . drachmas sex,

Misce ex tempore. (HassP†.)

R. Roob Sambuci unciam,
Pulv. Fol. Sennae drachmas duas,

— Anisi semidrachmam,
Misce. (Ful†.)

Gr. praeterea: Senn. parvae libras qua-
tuor, Coriandri duas, Uvarum decem,
Succi Liquirit. libram et uncias octo
Prunor., Tamarind., sing. libr. decem,
Syr. Sacchari viginti octo; vel: Ficuum
libras viginti, Prunor. quatuordecim,
Tamarind. tantidem, Cassiae Fist. viginti,
Sacch. albi quinquaginta, Succ. Liquir.
quatuor et unc. octo, Sennae libras
duodecim, Coriandri octo; vel: Fi-

cuum libr. quadraginta novem, Tamarind. viginti octo, Syr. Sacch. quinquaginta sex, Jalap. unam, Eboris usti duas, Senn. parv. decem, Coriandri septem; vel: Tamarind. rubr., Prunor., sing. libr. quatuor, Syr. Sacch. viginti, coque bene et adde Sennae libras tres, Coriandri duas.

2) Mit Weinsteinrahm.

R. Pulpa Tamarindorum partes octo.
Syrupi Rheii (simplicis Sax2f.) partes sex.

Commisce et adde

Pulveris Foliorum Sennae,

— Cremor. Tart., sing.

part. unam.

Misce. (Sax2f.)

R. Pulpa Prunorum sesquiunciam.
Foliorum Sennae pulveratorum,

Cremor. Tart. sing.

sesquidrachmam.

Syrupi Sacchari q. s.

Misce. (B*. Gr. [Elect. lenit. pro pauperibus Gr.])

Bat. Pulpa Tamarindorum partes octo, Sennae, Cremoris Tartari, sing.

unam, Syrui Sacchari quatuor; —

D. Pulpa Tamarindorum duodecim, Sennae sex, Cremoris Tartari tres et

Syrui Mannae viginti quatuor; —

LH. Pulpa Prunorum vel Pyri uncias sex, Fol. Sennae drachmas sex, Cremoris Tartari uncias duas, Olei Anisi

scrupulum, Syrui comm. quant. s.; —

LP. Pulpa Pyri et loco syrui communis Mel despumatum indicat, caetera ut LH.; —

LoP. Sennae Foliorum, Cremoris Tartari, sing. drachmas quatuor, Jalapae pulveris duas, Syrui

Zingiberis sesquiunciam.

R. Pulp. Prunorum

part. viginti quatuor.

Fol. Sennae pulv. . partes tres.

Cremoris Tartari partem unam.

Mellis puri . . partes duodecim.

Misce (BorCf. WWf.)

Sp. Pulpa Tamarindorum, Prunorum, sing. partes octodecim, Rooh

Sambuci duodecim, Sennae sex, quatuor Cremoris Tartari et Mellis q. s.

Alle diese Präparate sind mehr oder weniger purgirend. Man wendet sie häufiger

in Klystir als auf eine andere Weise an, und in allen Fällen ist die Gabe nach der

verschiedenen Menge der darin enthaltenen Senna verschieden

Electuarii sennae unciam pro Clystere purgante. (LH.)

Electuarium diartareum s. diartarium Castelli. (B*. Taur.)

R. Sennae mundatae,

Tartari albi cribr. sing. sesquiunc.

Mannae electae,

Sacchari albi, sing. . . unciam.

Zingiber s,

Anisi,

Cinnamomi,

Galangae, sing. . . drachmam.

Syr. Rosarum solutivi

unc. quinque.

Taur. Crem. Tart., Sennae, sing.

semunc., Zingib. Anisi, Cinnamomi,

sing. drachm. duas, Sacch. Mann. elect.,

sing. unciam, Mellis rosat. solutivi unc.

quinque.

Gabe, eine Unze vor der Mahlzeit, worauf man vier Unzen Fleischbrühe trinkt.

Man kann es auch auf folgende Weise bereiten:

R. Sennae electae . . . uncias sex.

Zingiberis,

Galangae, sing. . drachmas tres.

Infusi Rosarum pallid. libr. tres.

Infunde per horas 24 in balneo aquae tepido, in vase tecto, et coque; cola, clarifica et colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias octo.

Cremoris Tartari . semunciam.

Olei ess. Anisi . semi-crepulum.

Misce. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Conditum tamarindaceum. (Siv*.)

R. Foliorum Sennae drachmas tres.

Cremoris Tartari sesquidrachmam.

Mannae

Pulp. Tamarind., sing. sesquiunc.

Syrui Sacchari q. s.

Bei Hämorrhoiden und Blutbröchen empfohlen. — Gabe, drei Kaffeelöffel, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Man kann auch zwei Drachmen Schwefel zusetzen, wo dann diese Marmelade sich nicht von der folgenden Catwerge unterscheidet.

Electuarium antihaemorrhoidale, Confectio Sennae composita s. Sulphuris

s. Electuarium Sulphuris s. Sulphuris compositum. (E2, Gr. Vm.)

R. Foliorum Sennae,

Florum Sulphuris,

Cremor. Tartari, sing. part. unam.

Mannae partes sex.

Pulpa Tamarindorum partes octo.

Syrui Sennae q. s.

Tere mannain primò cum Syrui pauxillo, dein cum pulpa parte una,

adde pulveres trititando commixtos, tunc rel quam pulpa et syrui q. s.

Gr. Sulph. sublim., Potass. Superulphat., sing. unciam, Confect. Sennae

quatuor, Zingib. sesquidrachmam, Syrui simpl. q. s.; — Gr. Flor. Sulph.

semunciam, Cremoris Tartari unciam, Confectionis Sennae duas, Confectionis Piperis nigri sesquiunciam, Syrupi Zingiberis unciam. 1—2 Drachmen (L. C.); — E2. Sulphuris loti sesquiunciam, Confectionis Sennae uncias duas, Potassae Nitratis drachmas tres, Syrupi Aurantii q. s. (Gr. Florum Sulphuris semunciam, reliqua ut Gr.) 1 oder 2 (E2), 1—3 (Gr) Drachmen ein oder zwei (E2), zwei bis drei Mal (Gr.) täglich.

Electuarium lenitivum cum Sulphure (Sp.) Electuario lenitivo Sp. addatur Florum Sulphuris uncia. — Zu einer halben Unze täglich mehrmals, gegen Krämpfe empfohlen.

Electuarium mundificans. (Li.)

℞. Pulv. Rad. Patientiae unc. tres.
— — Rhei . . . semunciam.
— Sassafras . . . uncias duas.
— Fol. Sennae . drachmas sex
— Resinae Guajaci,
Flor. Sulphuris lot. . . unciam.
Mellis despumati . . . libras tres.
Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Electuarium e Senna cum Carbone. (Auf.)

℞. Electuarii e Senna uncias quatuor.
Natri subcarbonici,
Carbonis, sing. . drachmas duas
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen, zwei oder drei Mal.

Electuarium purgans. (B.)

℞. Confectionis Sennae,
— Cassiae, sing. unc. duas.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Syrupi Rosarum . . . q. s.
Gabe, einer Muskatnuß groß, stündlich,
bei Verstopfung Schwangerer.
℞. Pulvae Tamarindorum . unciam.
Foliorum Sennae . . drachmam.
Cremoris Tartari . . . unciam.
Mellis despumati . . . q. s.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Electuarium catholicum s. catholicum duplicatum s. de Rhabarbaro s. diacatholicon s. Rhei compositum, Catholicon duplicatum e Rho. (Palt. Wirf. Würf. GalP. R. Br. Ca. Pid. Re. Sp. Vm.)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.
Aquaе font. unc. quadraginta octo.
Coquendo parte quarta liquidi consumpto, in colatura dissolve
Pulvae Cassiae,
— Tamarind., sing.
unc. quatuor.
Sacchari uncias quadraginta octo.
Coque blando igne ad mellis consistentiam; adde sensim

Pulv. Rad. Polypodii,

— — Rhei, sing. unc. duas.
— — Liquirit. drach. duas.
— Fol. Sennae . unc. quatuor.
— Florum Violarum,
— Sem. Anisi, sing. unc. duas.

Misce. (Wirf.)

℞. Radicis Polypodii . uncias octo.
Aquaе font. uncias nonaginta sex.
Decoque ad dimid. et colaturam cum
Quatuor Seminum frigidorum majorum, singulorum . semuncia.
Seminum Violarum uncis duabus
ad emulsionem tere, cola et in liquore dissolve

Sacchari albi

unc. quadraginta octo.

Syrupo, coquendo parato paulatim adde

Pulvae Cassiae,

— Tamarindorum,

Pulv. Rhei,

— Fol. Sennae, sing.

unc. quatuor.

— Anisi . . . uncias duas.

— Liquiritiae . . . unciam.

Misce. (Sp.)

Palt. coquere Polypodii semilibram in Aqua octo ad dimidii remanentiam, in colatura dissolvere Sacchari libras quatuor, cum syrupo cocto commiscere Pulvae Cassiae et Tamarindorum, sing. uncias quatuor, massae denique addere mixturam pulverulentam e Sennae uncis quatuor, Rhei duabus, Violarum et Anisi, sing. tantidem, Polypodii uncis duabus et quatuor Seminum frigid. maj., sing. semuncia.

℞. Radicis Polypodii contusae

semilibram.

— Cichorii . . . uncias duas.

— Liquiritiae . . . unciam.

Foliorum Agrimoniae,

— Scolopendri, sing.

uncias tres.

Aquaе . . . libras sex.

Coque blando igne ad tertiae partis remanentiam; adde

Seminum Foeniculi drachmas sex.

Cola et exprime, colaturam coque cum

Sacchari albi . . libris quatuor
ad syrapi spiss. consistentiam. Ab igne remotis adde

Pulvae Cassiae,

— Tamarindorum,

Pulv. Rhei,

— Sennae, sing. unc. quatuor.

— Sem. Violarum . unc. duas.

— Liquiritiae rasae,

— Quatuor Seminum frigidorum, sing. . . . unciam.

Pulv. Sem. Foeniculi semunciam.
 Misce sedulo. (GalP. Ca. Re.)
 R. Radicis Polypodii . . uncias sex.
 Herbae Malvae,
 — Mercurialis,
 — Parietariae,
 — Violarum, sing. manip. duos.
 Aquae fontanae . . uncias centum
 quadraginta quatuor.
 Coquendo tertia parte consumpta, in
 colatura dissolve

Mellis . . . uncias nonaginta sex.
 Coque ad syrupi consist. et adde
 Pulpae Prunorum . . uncias 24.
 Pulveris Polypodii,
 — Rhei, sing. uncias quatuor.
 — Liquiritiae . . semunciam.
 — Sennae . . . uncias octo.
 — Flor. Violarum . . . unc. quatuor.

— Foeniculi.
 — Quatuor Sem. frigid. maj.,
 sing. unciam.
 — Anisi . . . uncias quatuor.
 Misce bene. (Sp.)

R. Pulv. Rhei,
 — Sennae, sing. . . drach. duas.
 — Foeniculi . . . drach. tres.
 — Liquiritiae . . . semunciam.

Tere cum Syrupi paxillio et adde
 Pulp. Cassiae,
 — Tamarind., sing. unc. duas.
 Syrupi Polypodii . . . q. s.
 Misce. (Vm.)

Br. Commiscere mixturam pulvera-
 tam Rhei, Jalappae, Anisi, Foeniculi,
 sing. unciam et Sennae duas cum Pul-
 pae Cassiae duabus, Pulpae Tamarin-
 dorum tantidem et Syrupi Polypodii
 triginta sex.

R. Foliorum Sennae . . . unciam.
 Rhei . . . semunciam.
 Seminum Anisi . . drachmas duas.
 Pulpae Tamarindorum,
 Roob Sambuci, sing. unc. quatuor.
 Misce. (R.)

R. Pulv. Sennae . . uncias duas.
 — Rhei,
 — Cremor. Tart., sing.
 semunciam.
 — Anisi . . . drachmas tres.
 Pulpae Tamarind. sesquiunciam.
 Mellis despumati . . . libram.
 Misce bene. (Würf.)

Pid. eandem formulam sed absque
 cremore tartari.

Electuarium lenitivum. Würf. R. et
 Pid. unterscheidet sich nur durch den Zu-
 satz der Rhabarber. Es ist, zu einer hal-
 ben bis ganzen Unze genommen, purgirend.
 Auch verordnet man es in Klystir.

Electuarium catharticum (Par.) Con-
 fectionis Sennae uncias duas; Ferri

tartaris scrupulos duos. — Einer Mus-
 catnuß groß zu nehmen.

Clyster purgans. (LP.)

R. Decocti Specierum anodynarum
 semilibram.
 Electuarii lenitivi . . . unciam.
 Misce. —

§. II. Präparate, welche den wirk-
 samen Stoff der Senna ohne das
 zu seiner Ausziehung angewendete
 Vehikel enthalten.

Extractum Sennae s. Foliorum Sennae
 (aquosum). (Würf. Gal. HisS. Sar.
 DE. Gr. T. Vm.)

R. Fol. Sennae mund. . semilibram.
 Aquae fontanae . . . libras tres.

Digere per horas 24 in loco calido,
 cola exprimendo et igne blandissimo
 consume. (Würf. Sar.)

Gal. Macerationes duas succedentes
 frigidis Sennae librae unius in Aquae
 libris quatuor et evaporationem cola-
 turae utriusque commixtae in balneo
 aquae; — GalP. ut extractum Liquiri-
 tiae; — DE. ut extr. Gentianae; —
 HisS. Macerationem per tres dies et
 levem bullitionem Sennae librae unius
 in Aquae libris sedecim et infusionem
 lentam infuso-decocti sepo-itione puri-
 ficati; — T. Foliorum libram cum
 Aquae bull. octo per horas 24 infun-
 dere; colare cum leni expressione, per
 pannum vel melius per chartam empo-
 reticam filtrare et ad extracti consist.
 consumere.

R. Fol. Sennae mund. et concis. q. v.
 Superfunde Aqua frigida et macera
 per horas 12; adde deinde Aquae ferv.
 duplum frigidae, post refrigerationem
 cola absque expressione; residuo in-
 funde dimidium ejusdem copiae Aquae
 ferventis et refrigerata cola; Albumi-
 nis ope clarificata evaporent absque
 ebullitione ad extracti consist. (Vm.)

Sal essentielle Sennae. (Gal.)

R. Foliorum Sennae . . libras duas.
 Aquae frigidae . . libras duodecim.

Macera per horas 24, subinde agi-
 tando, et cola; residuum maceretur
 cum Aquae libris octo et itidem cole-
 tur; colaturae commixtae in balneo
 aquae ad syrupi consist. evaporent,
 quem linearum duarum crassitie supra
 patinas effusum in balneo aquae vel
 in furno ad siccum consume et tunc
 squamas separa.

Extractum Sennae (alcoholicum). (HC†. Würt.)

R. Foliorum Sennae,
Alcoholis, sing. . . . libram.
Aquaе communis . . . libras octo.
Digere blando calore per tres dies,
cola exprimendo, seponere et decantha
liquorem, et alcohole destillando sepa-
rato, residuum ad aptam consist. con-
sume.

HC†. ut extractum Angelicae,

Extractum solutivum. (Br†.)

R. Foliorum Sennae,
Rhei, sing. . . . uncias tres.
Cinnamomi,
Anisi, sing. . . . drachmam.
Tartari tartarisati sesquidrachmam.
Aquaе fontanae . . . libram.
Digere per horas 24 blando calore
in balneo aquae, cola levi cum expres-
sione et liquorem ad extracti consist.
consume.

§. III. Préparate, in denen der wirk-
same Stoff der Senna mit dem
zu seiner Ausziehung angewendeten
Behälter enthalten ist.

*A. Auszug durch Bier.**Cerevisia purgans. (Ca. Vm.)*

R. Allii octarios viginti.
Sennae uncias duas.
Summit. Centaurii minoris,
— Absinthii, sing.
sesquilunciam.
Aloës Socotrinae drachmas duas.
Post sufficientem digestionem cola.
(Ca.)

R. Allii octarios quadraginta quinque.
Polypodii quercini . . . libram.
Rhapontici,
Sennae mundatae, . . . semilibram.
Uvarum pass., sing. . . .
Foliorum Cochleariae,
— Salviae, sing. . . uncias sex.
Rhei,
Raphani, sing. . . uncias tres.
Fructus Aurant. concis. . . no. 4.
Infunde et cola. (Ca.)

R. Rhei partes tres.
Coriandri partem unam.
Rhapontici,
Sennae, sing. . . partes quatuor.
Polypodii partes octo.
Cerevisiae fortis . . . partes 256.
Post pluries dies macerationis cola
absque expressione. (Vm.)

Cerevisia antilicterica. (Vm.)

R. Curcumae,
Rhei, sing. . . . semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Fol. Sennae, sing. . . drachm. sex.
Sem. Dauci sylvest. . . unciam.
Foliorum Absinthii,
— Marrubii,
Flor. Centaurii min., sing.

semimanipulum.
Cerevisiae fortis . . . uncias 64.
Macera per aliquot dies in cerevi-
siae octanibus septem et per pannum
cola; faeces cum reliqua cerevisia ab-
lue et itidem cola; colaturas com-
misce.

*B. Auszug durch Wein.**Vinum s. Elixir Sennae. (Sueo.)*

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Coriandri,
Foeniculi, sing. . . drach. duas.
Vini Hisp. . . libr. duas c. dimid.
Post tres dies digestionis adde
Uvarum pass. enucl. . . unc. tres.
Macera per horas 24 et cola expri-
mendo.

Vinum purgans et tonicum. (Pie.)

R. Fol. Sennae mund. . . unciam.
Rhei drachmas sex.
Caryophyllorum,
Croci, sing. . . . drachmam.
Vini Hispanici . . . octarios duos.
Infunde frigide per dies quinque vel
sex, saepius agitando et supra faeces
relinque.

Bei Krankheiten von Schwäche des Ma-
gens. — Gabe, Morgens nüchtern zwei
bis vier Eßlöffel.

Vinum antiictericum. (Sw. Vm.)*

R. Foliorum Sennae,
Cort. Aurant., sing. . . part. tres.
Rhei,
Curcumae, singulorum partes duas.
Fol. Absinthii,
— Marrubii, sing. . . part. unam.
Vini Rhenani . . . partes 256.
Infunde frigide per dies octo, cola
leviter exprimendo et filtra. — Zo-
nisch, schwach purgirend. — Gabe, zwei
bis vier Unzen täglich drei Mal.

*Vinum amarum et diureticum, Vinum
aperiens et purgans, Vinum purgans.
(Bo. Ca. Pie.)*

R. Fol. Sennae mund. . . unciam.
Agarici albi . . . sesquidrachmam.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Radici Scillae,
— Inulae,

Herbae Marrubii, sing. uncias tres.
Rad. Iridis Flor. . . uncias sex.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Vini . . . libras tres.
Infunde, cola et colaturae adde
Tincturae Gentianae drachmas tres.
Misce. (Ca.)

R. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Agarici albi . . . drachmas duas.
Corticis Sambuci,
— Ebuli, sing. . . unciam.
Rad. Scillae,
— Inulae,
— Iridis Flor., sing. semunciam.
Herbae Marrubii . . . manipulum.
Zingiberis . . . drachmam.
Vini . . . libras quatuor.
Post sufficientem digestionem cola.

(Pie.)

R. Foliorum Sennae,
Agarici albi,
Rad. Jalapae,
— Hellebori nigri,
— Iridis Flor., sing.
drach. duas.
— Inulae,
— Scillae, sing. unc. duas c.
dim.

Corticis Winteri,
— Sambuci,
— Ebuli, sing. . . unciam.
Vini albi . . . libras quatuor.
Post frigidam infusionem cola. (Ca.)
Bo. Iridis, Sennae, sing. uncias duas,
Inulae, Scillae, Sambuci, Ebuli, sing.
unam, Jalapae, Hellebori, Agarici,
sing. drachmas duas, Vini albi libras
sex, horae quadrante ebullitionis et
horas 12 infusionis.

Gabe, eine bis zwei Unzen, Morgens und
Abends.

G. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Sennae. (Hu†. GalP.)

R. Foliorum Sennae . . uncias duas.
Alcoholis . . . libram.
Post tres dies digestionis cola,
GalP. ut tincturam Chinae.

Tinctura Sennae s. Sennae composita
s. aromatica, Elixir salinis, Tinctura
cathartica. (Bo†. Han†. HC†. HN†.
Pal†. Sax†. Wir† AD. Am. Ams. B*.
D. Du. Ed. Gen. LonN. LPC. Lus.
Succ. C. Ca. CG Gr. Re. Sw. Vm)

R. Foliorum Sennae . . partes sex.
Cardamomi minoris partem unam,
Aquaе Vitae . . . partes 48.
Infunde frigida per dies octo, cola
exprimendo et filtra. (Vm.)
R. Foliorum Sennae . . libram.
Seminum Carvi . . sesquiunciam.

Cardamomi minoris semunciam.
Alcoholis (0,930) . octarios octo.
Post quatuor dies digestionis cola.
(B*. Du. Gr.)

Vm. Sennae sesquiunciam, Carvi ses-
quidrachmam, Cardamomi semidrach-
mam et Aquaе Vitae uncias sedecim;
— Gen. Sennae uncias tres, Ani-drach-
mas tres, Cardamomi drachmam et
Aquaе Vitae libras duas.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Carvi . drachmas tres.
Cardamomi min. . . drachmam.
Passularum min. enucl.

unc quatuor.
Aquaе Vitae libr. duas c. dimid.
Mactra et filtra (Han† HN†.)

Bo†. Foliorum uncias tres, Spirit.
Vini fortioris libras tres et maceratio-
nem (quatuordecim dierum Bo†),
caeterum ut HN†; — Sw. Sennae ses-
quidrachmam, Carvi drachmas sex, Carda-
momi duas, Passularum uncias octo et
Alcoholis (0,930) libras quatuor; —
HC†. AD. LonN. CG. Gr. Re. Sennae
uncias tres, Carvi drachmas tres, Carda-
momi unam, Passularum uncias qua-
tuor et Alcoholis (0,930) octarios duos
(libras duas cum dimidia, ut sit cola-
tura unciarum viginti et octo HC†.); —
LPC. Sennae uncias duas cum dimi-
dia, Carvi drachmas tres cum dimi-
dia, Passularum uncias quinque, cae-
terum ut antea et macerationem qua-
tuordecim dierum; — Succ. easdem
ingredientum quantitates et Alcoholis
Aqua diluti uncias triginta duas.

R. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquaе bullientis uncias quinque.
Dissolve et liquori adde
Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Anisi . . . drachmas duas.
Alcoholis . . . uncias quinque.
Digere per dies duos, blando calore,
saepius agitando, et cola. (Sw.)

R. Foliorum Sennae . uncias duas.
Radici Jalapae . . . unciam.
Coriandri . . . semunciam.
Alcoholis (0,935) libr. tres c. dim.
Digere per tres dies, filtra et cola-
turae adde

Sacchari albi . uncias quatuor.
Dissolve. (B*. Ed. Gr.)

Lus. Sennae uncias duas, Jalapae
unam, Anisi stellati drachmas duas,
Aquaе Vitae libras tres cum dimidia,
octo dies macerationis et in colatura
solvere Sacchari uncias quatuor; —
Gr. Re. Jalapae libras tres, Fol. Senn.
uncias duodecim, Coriand., Anisi, Li-
quir., Enul., sing. quatuor, Spir. rect.,
Aq., sing. congiun. (Swinton's Daffy);
vel: Fol. Senn., Rhei, Anisi, sing. li-

bras duas, Rad. Jalap., Carvi, sing. unam, Sant. rubr. uncias octo, Spir. ten. congios decem, Sacch. fusc. libr. quatuor; vel: Rhei libr. quatuordecim, Anisi decem, Senn. parv. octo, Jalapae quatuor, Sant. rubr. tres et unc. octo, Ciner. Russ. duas, Spir. rect. congios triginta octo, Aquae octodecim; vel: Jalap. libras tres, Senn. unam, Anisi unc. sex, Coriand. quatuor, Cort. Aur. sicc. duas, Spir. ten. congios duos; vel: Sennae libras septem, Jalap. quinque, Anisi quatuordecim, Carvi, Foenic., sing. quatuor, Spir. Frum. cong. duos, Spir. rect. viginti sex, Aquae viginti quatuor, stare per tres septimanas, exprimere, partes supremas cum Aquae cong. duobus lavare et adde Molasses libr. viginti octo; — AD. Sennae uncias tres, Jalapae unciam, Coriandri, Carvi, sing. semunciam, Cardamomi drachmas duas, Sacchari albi uncias quatuor, Alcoholis diluti octarios tres, macerare per dies quatuordecim et filtrare per chartam [*Tinctura Sennae et Jalapae*]; — Am. B* et C. Sennae uncias tres, Rhei unam, Coriandri dimidiam, Carvi tantidem, Cardamomi drachmas duas, Alcoholis (0,980) octarios quatuor cum dimidio et Sacchari uncias quatuor; — Vm. Sennae partes quatuor, Jalapae duas, Coriandri unam, Aquae Vitae septuaginti duas et Sacchari octo; — D. Sennae uncias duas, Jalapae semunciam, Alcoholis libras tres, Sacchari albi uncias quatuor absque coriandro.

R. Foliorum Sennae . partes octo.
Rhei . . . partes quatuor.
Coriandri,
Cort. Aurant., sing. part. unam.
Aquae Vitae . . . partes 112.
Infunde frigide per dies octo, exprime et filtra. (Vm.)

R. Foliorum Sennae . uncias duas.
Passularum minorum semilibram.
Radici Inulae,
Coriandri,
Anisi, singulorum . . . unciam.
Aquae Vitae . . . libras tres.
Macerare per dies octo, subinde agitando et cola. (Ams.)

R. Foliorum Sennae . uncias duas.
Radici Inulae,
— Liquiritiae,
— Rhei,
Semin. Anisi,
— Carvi,
— Coriandri, sing. . unciam.
Passularum min. enucl.
unc. quatuor.
Subcarbonat. Potassae drach. duas.

Aquae bullientis . . . libram.
Digere et refrigeratis adde
Alcoholis . . . libras duas.
Stent in digestionem adhuc per dies octo, tunc cum expressione colentur. (Wirt. B* Sw.)

Saxt. infundere Sennae partes tres, Rad. Inulae, Liquiritiae, Rhei, Anisi, Carvi, Coriandri, sing. unam et Subcarbonatis Potassae partem quartam in Aquae bull. duodecim, refrigeratis addere Alcoholis concentrati partes viginti quatuor, digerere blando calore per dies sex, colare exprimendo et filtrare; — Gr. Rhei libras quadraginta, Sennae quindecim, Sant. rubr., Carvi, Anisi, Coriand., sing. quinque, Ciner. Russ. uncias octo, Spir. rectific. congios decem, digere per triduum et addo Spir. ten. octoginta et Molasses libr. quadraginta sex.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Radici Inulae,
— Rhei, sing. . uncias duas.
Subcarb. Potassae sesquidrachm.
Aquae bullientis . . libras tres.
Digere per tres horas in vase tecto, tum recipe

Ligni Guajaci,
Anisi,
Carvi,
Coriandri, singulorum uncias duas.
Aquae Vitae . . . uncias tres.
Infunde frigide per tres dies, cola exprimendo et colaturam cum praemixta commisce. (Palz.)

Ca. Sennae uncias duas, Guajaci unam, Inulae, Anisi, Carvi, Coriandri, Liquiritiae, sing. drachmas sex, Passularum uncias quatuor et Aquae Vitae libras tres; — Gr. Re. Fol. Senn. uncias quatuor, Guaj., Enulae, Anisi, Carvi, Coriand., Liquir., sing. unc. duas, Uvar. pass. enucl. octo, Spir. ten. libras sex. (Daffy's elixir, Dacey's Daffy); vel: Inulae, Ras. Guaj., Coriand., Rhei, Liquir., Anisi, sing. unc. tres, Uvar. pass. libram et uncias octo, Spir. ten. octarios decem.

Alle diese Präparate wirken mehr oder weniger purgirend, je nach der Menge der in ihnen enthaltenen Senna. — Die Gabe ist sehr verschieden, im Allgemeinen von zwei Drachmen bis eine Unze.

Haustus oleosus laxans, Potio laxans oleosa. (Vm.)

R. Tincturae Sennae,
Olei Amygd. dulc., sing. unciam.
Tinctura Sennae amara. (Sw.)

R. Foliorum Sennae partes quatuor.
Radici Gentianae,

Cort. Aurantior., sing. part. unam.
Aquaе Vitae

part. sexaginta quatuor.
Infunde frigide per plures dies, saepius agitando, tunc exprime leviter et filtra.

Tinctura Sennae composita s. Rhei et Sennae, Guttæ cordiales (Gout cordial) Warneri. (AD. Am. B*. C Gr. Par.)

R. Radic. Rhei concis. . . unciam.
Folior. Sennae . . drachmas duas.
Sem. Coriandri,
— Foeniculi, sing. drachmam.
Rasur. lign. Santali rubri

drachmas duas.
Extr. Liquiritiae semidrachmam.
Passularum . . . semilibram.
Croci . . . semidrachmam.
Alcoholis diluti . . octarios tres.

Macera per dies quatuordecim et filtra per chartam. (AD)

R. Foliorum Sennae drachmas duas.
Coriandri,
Foeniculi, sing. . . drachmam.
Coccionellae,
Croci,
Liquiritiae, sing. semidrachmam.
Passularum min. enucl. semilibram.
Aquaе Vitae . . octarios duos.

Infunde per dies sex, saepius agitando et cola; facibus reafunde Aquaе Vitae octarium, post sufficientem extractionem cola et colaturas ambas commisce. (C.)

Am. Rheum omittit; — B*. et Par. Rhei unciam, Sennae semunciam, Croci drachmam, Liquiritiae quatuor, Passularum libram, Aquaе Vitae octarios tres et octo des digestionis; — Gr. Rhe, Fol. Senn., Sem. Coriandri, Sem. Poen., Coccin., sing. uncias duas, Rad. Glycyrrh., Croci, sing. unam, Uvarum libras duas cum dimid., Spir. rectific. congijs duos; — vel: (et Re.) Rhei unciam, Fol. Sennae sesqui. (semi-Re.) unciam, Croci drachmam, Glycyrrhizae quatuor, Uvar. pass. libram, Spir. Vin. Gallic. libras tres (Warner's cordial).

Reizend und berzstärkend, bei den Engländern berühmt. — Gabe, vier oder fünf Löffel in irgend einer Tisane, alle halbe Stunden. Core führt dieses Präparat unter dem Namen *Tinctura Sennae aromatica* an, welchen es auch in der Americanischen Pharmacopoe führt; E2. empfiehlt von der Tinct. Sennae comp. einen Esslöffel mit doppelt so viel Wasser so heiß als möglich zu nehmen bei heftigem Magenschmerz, wo ein cordiale nöthig ist; nach Umständen zu wiederholen. Seine Formel unterscheidet sich kaum von einigen

derer, nach welchen das elixir salutis bereitet ist.

Tinctura s. Elixir Daffyi. (B*. Ca. Sw.)

R. Foliorum Sennae . . uncias duas.
Rhei unciam.
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
Guajaci singulorum semunciam.
Sacchari albi . . uncias quatuor.
Aquaе Vitae . . . libras duas.

Digere per dies octo, saepius agitando et cola. (B*)

Sw. eandem formulam, sed Aquaе Vitae uncias quinque.

R. Foliorum Sennae . . . unciam.
Radicis Jalapae,
Coriandri,
Cremoris Tartari, sing.

semunciam.

Sacchari uncias sex.

Aquaе Vitae semisextarios (demi-setiers) tres.

Digere et filtra. — Gabe, eine bis drei Unzen. (Ca.)

Elixir polychrestum purgativum. (Br†.)

R. Fol. Sennae mund. . . unciam.
Rhei semunciam.
Corticis Citri,
Kali subcarb, sing. drachmas duas.
Alcoholis uncias decem.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde

Resinae Jalapae drachmas decem.

Spiritus Cochleariae . . uncias sex.

Elixir Raulini. (Ca.)

R. Folliculorum Sennae,
Rhei,
Summitatum Absinthii vulgaris,
— Chamaedryos,
Radicis Gentianae,
Cort. Aurant. amari, sing.

unc. duas.

Cascarillae,

Aloës Socotr., sing. . drachmam.

Aquaе Vitae (15^o) libras quatuor.

Infunde frigide per dies octo ad duodecim et filtra — Purgirend, bei Scrophelleiden empfohlen. — Gabe, ein Esslöffel vor der Mahlzeit.

D. Zusatz durch Weinessig.

Acetum laxans s. laxativum. (Pic.)

R. Foliorum Sennae . . unciam.
Cremoris Tartari . . semunciam.
Corticis Citri,
Anisi,

Cinnamomi, sing. semidrachmam.

Aceti octarium dimidium.

Infunde per horas 24. — Purgirend, besonders bei innern Blutflüssen des Darmkanals empfohlen, um das Blut auszuföhren.

E. Auszug durch Mollen.

Serum Lactis Weissii. (Bo. Ca. Pic. Ra. Va.)

R. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis, sing.
semidrachmam.
Summitatum florescentium Hyperici,
— Galii lutei, sing.
scrupulum.

Florum Sambuci . . . q. s.
Infunde per horas duodecim in loco calido et cola. (Pie.)

Bo. et Ca. Galii lutei, Florum Sambuci, Hyperici, Tiliae, singulorum scrupulum, Sulphatis Sodae, Folliculorum Sennae, singulorum drachmam, Seri Lactis bullientis libram et post semihorae vel horae infusionem filtrare; — Ra. Summit. Hyperici, Flor. Sambuci, sing. scrupulum, Sennae, Galii lutei, Salis Epsomensis, sing. drachmam, Seri Lactis libram et horas 12 infusionis; — Va. Follicul., Sulph. Magn., sing. drachm. quatuor, Flor. Samb., Summit. Hyperici, Galii lutei, sing. unam, Seri Lact. clarif. unciam, misce, infunde leni igne per horas duas et cola.

Nach Zanetti ist folgendes die einzige authentische Formel:

R. Radicis Aristolochiae longae,
— Filicis maris,
Calendulae, sing. . unc. quatuor.
Foliorum Betonicae,
— Pervinae,
— Verbenae,
Florum Serpylli,
— Tiliae,
— Galii,
— Primulae veris,
— Daphnes Laureolae,
— Hyperici,
Visci querni,
Rad. Patientiae,
— Scrophulariae, sing.

unc. duas.

Cuncta anni tempore apto collecta, mundata, sedulo siccata atque grossiuscule pulverata exacte commisceantur, tunc adde

Pulv. Fol. Sennae mund. unc. sex et drach. quatuor.

Gabe, zwei Drachmen mit einer Drachme Bittersalz, Abends und Morgens zu zwei Gläsern abgetrübten Mollen gethan; man sieht den Stuhl vorher durch, trinkt ein

Glas und nach zwei Stunden das andere, und in der Zwischenzeit einen Aufguss von Capillus Veneris.

Dieses Präparat galt als ein vorzügliches Mittel zur Vertreibung der Milch; man muß zwanzig und selbst dreißig Tage damit fortfahren; gegen den zehnten oder fünfzehnten Tag verschreibt man ein gewöhnliches Mittel, welches man am Ende der Behandlung wiederholt.

F. Auszug durch Wasser.

Infusum Sennae s. Cassiae s. Sennae simplex (compositum Lon. Gr.) (AD. Am. B*. DD. Du. Ed. Fenn. LonN. LPC. Lus. RC. Suec. Br. C. CG. DB. E2. Fi. Gr. Ra. Re. T. Va.)

R. Fol. Sennae mund. drachmas sex.
Aquaе bullientis . . . semilibram.
Macera per horam et cola. (B*. Fenn. Su. c.)

DD. et Ra. Foliorum unciam et duodecim Aquaе.

R. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Anisi stellati pulv. . drachmam.
Aquaе bullientis uncias sedecim.
Digere per horam in vase clauso et post refrigerationem cola. (Lus.)

RC. Anisi vel Foeniculi semunciam, Cremoris Tartari drachmas duas et Aquaе libram; — Fi. Foliorum uncias sex, Anisi sesquiunciam Cinnamomi drachmas duas, Aquaе bull. libras sex; — T. Sennae unciam, Anisi drachmas duas, Cinnamomi scrupulum, Aquaе bull. uncias sex, infusionem per horas octo; — DB. Sennae semunciam, Aquaе bullientis uncias sex infundere per horas duas, filtrare per telam, addere Anisi drachmam, Cinnamomi, Zingiberis, sing. scrupulum.

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Zingiberis pulverati semidrachmam.
Aquaе bullientis uncias duodecim.
Post unam horam macerationis cola. (Br.)

Am. Lon. LonN. C. CG. Gr. Re. Va. Sennae sesquiunciam (unciam Va.), Zingiberis drachmam et Aquaе octarium (libram); — Ed. Sennae drachmas sex, Zingiberis scrupulum et Aquaе uncias novem; — LPC. Sennae drachmas quindecim, Zingiberis scrupulos quatuor, Aquaе destillat. fervent. octarium; — Am. Cremoris Tartari drachmas duas addit.

R. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cardamomi min. semidrachmam.
Aquaе bullientis . . . q. s.
ut colaturae unciae sex obtineantur.
Stent in digestionem per horam et post refrigerationem colentur. (Du.)

AD. Sennae unciam, Semin. Coriandri drachmam, Aquae bullientis octarium, macerare per horam et colare.

Varierend, in Fällen von hartnäckiger Verstopfung, oder wenn man eine Ableitung auf den Darmcanal machen will.

Misura cathartica ammoniata. (Gr.)

R. Olei Menthae viridis guttas duodecim.

Sacchari purificati drachmas tres. Tritis simul adjice

Infusi Sennae compositi uncias septem.

Sodae Sulphatis . . . unciam. Tincturae Sennae drachmas quinque.

Spiritus Ammoniae aromat. drachmas tres.

Eine bis zwei Unzen

Syrupus Sennae s. Cassiae Sennae. (Bor5†. HassP†. AD. B. Bel. Du. Ed. Fer. LonN. LPC. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. T. Vm.)

R. Fol. Sennae mund. uncias octo. Aquae bullientis libras quatuor. Macera per horas duas, cola exprimendo et colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari albi . . . libras tres. Fiat blando igne syrupus. (B. Bel.)

Du. Sennae semunciam, Aquae ferv. libram, horas 12 macerationis, Sacchari et Mannae, sing. libram.

R. Foliorum Sennae . uncias duas. Aquae bullientis . sesquilibram. Macera per horas quatuor in vase tecto, cola et adde

Sacchari liquidi (melasse) unc. octo.

Coque leni igne ad syrupi consist. (AD. Ed.)

Fi. Sennae unciam, Aquae bull. libram; infusionem per horas 12 et Sacchari libram; — T. Sennae et Aquae eisdem quantitates, infusionem ad ebullitionem usque et Sacchari duplum pondus; — DB. Sennae uncias duas cum dimidia.

R. Foliorum Sennae, Aquae frigidae, sing. part. unam. Macera per tres horas et adde

Aquae bullientis . . partes tres. Post refrigerationem cola, leviter exprimendo, et adde

Sacchari albi . partes quatuor. Inspissa et despuma. (Vm)

R. Foliorum Sennae . semunciam. Aquae bullientis . . octarium.

Macera per horas duodecim et adde Mannae,

Sacchari, singulorum . libram. Fiat syrupus. (C. Gr.)

R. Foliorum Sennae . uncias duas. Foeniculi contusi . . . unciam.

Aquae bullientis . . octarium.

Post horam macerationis, blando calore, cola et adde

Mannae uncias tres.

Sacchari libram.

Coque sufficienter. (AD. LonN. CG. Gr. Re.)

LPG. Sennae uncias duas cum dimidia, Foeniculi drachmas decem, Sacchari uncias quindecim, caeterum ut antea; — Gr. Lon. 1809. Sennae unciam, Foenic. drachmam, Aq. ferv. libram, Mannae, Sacch., sing. libram; — Fer. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bullientis libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari libras duas; — Bor5†. loco foeniculi Anisi semunciam, digestionem per horas aliquot et in liquoris expressi et colati uncias viginti solvere Sacchari libras tres absque manna, caeterum ut Fer.

Infusum Sennae cum Succo Cetri s. citraturum. (Gen. Suec. Va.)

R. Foliorum Sennae drachmas sex. Aquae bullientis . . semilibram.

Macera per horam, cola et colaturae adde

Succi Cetri semunciam.

Misce. (Suec. Va.)

R. Foliorum Sennae sesquiunciam. Corticis recentis Cetri,

Succi Cetri, sing. unciam

Aquae bullientis . . . libram.

Digere et post refrigerationem cola. (Gen)

Decoctum Prunorum cum Senna. (A†.)

R. Foliorum Sennae . . unciam. Prunorum semilibram.

Aquae libras duas.

Digere per noctem inter cineres calidos et cola.

Ein gelindees Purgirmittel, welches von Sieutaud empfohlen wird. Zassenweise.

Syrupus Pomorum s. de Pomis compositus s. solutivus. (Gal. Sar.)

R. Succi Pomor. ferment. libras quatuor.

Fol. Sennae mund. unc. quatuor c. dimidia.

Digere per noctem; altero mane cola exprimendo et adde

Sacchari albi libras tres.

Clarifica et coque ad syrupi consistentiam. (Sar.)

℞. Fol. Sennae mund. semilibram.
 Seminum Foeniculi . . . unciam.
 Caryophyllorum . . . drachmam.
 Succ. Pomor. Renet. depur.
 — — Boraginis, libr. quatuor.
 — — Pomor. Buglossi, sing. libras tres.
 Infunde per horas 24, tunc leviter coque, cola et exprime; residuum iterum coque cum
 Aquae communis libris quatuor.
 Ad dimidium evaporata cola exprimendo, colaturas ambas commisce et in iis solve
 Sacchari albi . . . libras quatuor.
 Coque ad consistentiam syrupi, quem adhuc ferventem supra
 Seminum Foeniculi,
 Caryophyllor., sing. sesquidrachmam
 linteo inclusa infunde et per horas sex digere. (Gal.)
Decoctum antihæmorrhoidale. (Vm.)
 ℞. Foliorum Sennae . . . unciam.
 Aquae . . . uncias duas.
 Post horam infusionis adde
 Aquae . . . uncias sedecim.
 Calefac per temporis momentum, cola et colaturae adde
 Passularum minorum,
 Sacchari crudi, sing. uncias duas.
 Anisi . . . drachmam.
 Post refrigerationem cola et liquori sepositione depurato adde
 Rhei,
 Cremor. Tart., sing. drachmam.
Syrupus Sennae compositus s. de Rhabarbaro s. Rhei cum Senna. (AD. Am. C. Gr. Sw. Vm.)
 ℞. Fol. Sennae mund. uncias duas.
 Rhei . . . semunciam.
 Coriandri . . . drachmas duas.
 Aquae bull. uncias quatuordecim.
 Infunde in vase tecto, post refrigerationem cola et colaturae adde
 Mannae . . . uncias quatuor.
 Sacchari albi . . . uncias viginti.
 Despuma et per cribrum setaceum trajice. (Sw.)
 ℞. Rhei,
 Sennae, singulorum sesquiunciam.
 Cardamomi . . . drachmas tres.
 Aquae bullientis . . . octarium.
 Digere per horas viginti quatuor et evaporatione ad dimidium consumptis adde
 Sacchari . . . libram.
 Fiat syrupus. (Am. C.)
 AD. Sacchari libras duas; — Gr. Rhei, Fol. Senn., sing. uncias duas c.

dimid., Cinnam. sesquiunciam, Zingib. semidrachmam, Aquae calid. libr. quatuor, macera per noctem, cola et cum Sacch. libr. duabus in syrupum coque; vel: Rhei, Fol. Sennae, Uvar. pass., sing. unc. quatuor, Zingib. dr. chim. quatuor, Sacch. alb. libr. novem, Aquae congiuntum.

℞. Syrupi Sennae . partes quatuor.
 — Rhei . . . partes duas.
 — Cinnamomi partem unam.
 Misce. (Vm.)

Infusum Sennae et Tamarindi s. Tamarindi cum Senna s. compositum s. tamarindatum s. tamarindinum s. cum Tamarindo s. cum Tamarindis. (AD. Am. Du. Ed. Suec. C. DB. Fi. Gr. Re. T.)

℞. Foliorum Sennae . drachmam.
 Tamarindorum . . . unciam.
 Coriandri . . . drachmam.
 Sacchari . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . uncias octo.
 Macera, subinde agitando, per horas quatuor. (AD. Am. Du. Ed. C.)

Gr. Coriandri semidrachmam. — Re. Coriandri et Sacch., sing. semidrachmam?

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Aquae bullientis . . . semilibram.
 Macera per horam, cola et colaturae adde

Pulpae Tamarindorum semunciam.
 Dissolve. (Suec.)

DB. Fructuum Tamarindorum semunciam contundere cum Aquae bullientis uncias sex, addere folior. Sennae drachmas tres, post horas duas filtrare per pannum; — Fi. et T. Folia et Pulpam cum Aqua bulliente (omnium copiam eandem ut Suec.) per horam infundere et filtrare.

Selway's prepared Essence of Senna (Parent.) est Infusum Sennae compositum cum Alkali conjunctum.

Aqua s. Potio laxativa s. laxans s. purgans s. Viennensis s. laxativa Viennensis, Infusum laxativum simplex s. Vindobonense s. Viennense, Infusum Sennae compositum s. compositum sine aromatibus s. Foliorum Cassiae Sennae compositum, Decoctum Sennae compositum, laxativum Viennense, Infusum Sennae tartarisatum s. cum Manna s. cum Rheo, Potio Angelica s. regia, Pilsana laxativa s. passulata, Infusum catharticum s. Sennae laxativum s. purgans, Apozema s. Tisana regia s. regalis. (A† Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. Pal†. Sax2†. Am. Au.

D. DD. Fer. Gal Galm. GalP. Gen.
LH. Lus. Pm. RC. Sar. Suec. Taur.
Bo. C. Ca. DB. E2. Fi. Gr. ParC.
Re. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Obne ein Galz.

R. Foliorum Sennae partem unam.
Aque bullientis . . partes octo.
Infunde per semihoram, tunc in in-
fuso dissolve

Mannae . . . partem unam.
Hamf. bis coquere Sennae partes tres
in Aquae triginta sex et colaturis am-
babus addere Mannae partes octo; —
Sax2f. infundere (digerere per hor. 1
Sax2f.) Sennae partem unam in Aquae
octo et addere Mannae partem unam
cum dimidia (post ebullitionem albu-
mine ovi despumare Sax2f.) Si ad di-
midias partes inspissatur, vocari solet
Infusum laxativum duplicatum. Si ad-
das Seminum Coriandri semunciam cum
foliis Sennae coquendam, *Infusum la-
xativum Vindobonense aromaticum* ha-
bes.

R. Foliorum Sennae drachmas tres.
Mannae . . . uncias duas.
Fructum Citri . . . no. 1.
Aque tepidae . . . uncias octo.
Infunde per horas duodecim et co-
la. (Fer. DB.)

Pm. Folior. Sennae drachmas tres,
Mannae selectae uncias tres, Aquae
font. uncias septem, infunde semiam
per horam, mannam lento igne dissol-
ve, solutionem cum Ovi Albumine cla-
rifica et adde Succu Limonis semun-
ciam.

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cardamomi min. drachmas duas.
Aque bullientis . . octarium.
Infunde per semihoram et cola. —
Die Hälfte, und wenn dieß nicht wirkt,
nach zwei oder drei Stunden die andere.
(E2.)

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Mannae . . . unciam.
Rhei,
Cardamomi min., sing.

drachmas duas.
Aque bullientis . . octarium.
Infunde per horam. (E2.)

R. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Aque communis uncias sedecim.
Digere per horam unam, ignem fere
ad bullitionem usque augendo; cola
et in uncis quatuordecim colaturae
dissolve

Mannae . . . uncias quatuor.
Cola, seponere et sedulo decantha.
(An.)

R. Foliorum Sennae drachmas duas.
Passularum minorum semunciam.
Cort. Aurantiorum . scrup. duos.
Aque bullientis . . uncias sex.
Ebulliant semel, tunc per sexagesi-
mas decem digesta leni cum expres-
sione colentur. (Fulf.)

R. Sennae . . . uncias duas.
Mannae . . . uncias quinque.
Aque bull. . uncias viginti octo.
Digere, blando calore, per horas sex,
cola et colaturae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce bene. (Lif.)

R. Foliorum Sennae drachmas duas.
Anisi stellati . . . scrupulum.
Aque fervidae . uncias quatuor.
Digere per horam in vase tecto, co-
la et adde

Mannae electae . . uncias duas.
Solve blando calore, clarifica et
cola.

Gabe, auf ein Mal. (LH.)

2) Mit Weinsteinrahm.

R. Foliorum Sennae . uncias duas.
Cremoris Tartari . semunciam.
Aque bullientis . . libras duas.
Macera per horas sex et cola leviter
exprimendo. (Sar.)
Taur. ut Sar. sed Cremoris drach-
mas tres.

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cremoris Tartari . . drachmam.
Aque bullientis . . uncias sex.
Post horae quadrantem infusionis co-
la exprimendo et in colatura solve
Mannae electae . . . unciam.

Sepone et decantha. (A. DB.)
R. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari . . drachmam.
Anisi stellati . . semidrachmam.
Aque bullientis . . uncias sex.
Digere per horam, cola et colaturae
adde

Mannae . . . uncias duas.
Dissolve blando igne, seponere et de-
cantha. (Lus.)

RC Foliorum sesquiunciam, Anisi
vel Foeniculi semunciam, Cremoris
drachmas duas, Aquae libram, absque
manna; — Fer. Sennae drachmas tres,
Cremoris Tartari unam, Anisi stellati
scrupulum, Aquae uncias sex et Man-
nae unam; — Am. et C. Sennae ses-
quiunciam, Cremoris Tartari drachmas
duas, Zingiberis unam et Aquae bull.
octarium; — Fi. T. Foliorum drach-
mas sex, Cremoris unam, Aquae bull.
uncias sex, post 1, 5 vel 20 sexagesi-
mas infusionis, filtrare, addere Man-
nae unciam, et clarificare Albuminis
ope.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
 Cremoris Tartari . . . drachmam.
 Passularum m. n. drachmas tres.
 Zingiberis albi . . . scrupulum.
 Aquae bullientis uncias quatuor.
 Post horas 24 digestionis cola exprimendo et in colatura solve

Mannae electae . . . unciam.
 Clarifica Albuminis ope. (Wir†.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias tres.
 Passularum minorum sesquiunciam.
 Coriandri . . . drachmas duas.
 Cremoris Tartari . . . semunciam.
 Aquae bull. libr. duas c. dimidia.
 Macera per horam, cola exprimendo et colaturae adde

Mannae electae . . . uncias octo.
 Solutionem iterum cola. (Han†.)

HN†. Aquae de t. tepidae uncias triginta quatuor, caeterum ut antea; — HassP†. Sennae partes sex, Passularum tres, Cremoris unam, Coriandri dimidiam, Aquae fervidae sexaginta octo et Mannae sedecim; — Pal†. Wir†. Ca. Sp. et Pm. eandem indicant formulam, sed Radicis Polypodii drachmas tres addunt

3) Mit Weinsteinkali.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
 Zingiberis,
 Corticis Citri, sing. . . drachmam.
 Aquae communis uncias duodecim.
 Alcoholis tenuis uncias quatuor.
 Macera per dies octo, subinde agitando, cola et singulis uncias tribus adde Mannae unciam, vel Tartratis Potassae sesquidrachmam, vel Electuarii Scammonii drachmam. (Sa.)

℞. Fol. Sennae

drachm. tres ad quatuor.
 Cardamomi min. . . drachmam.
 Tartratis Potassae drachmas sex.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Digere per horas duas et colaturae adde

Syrupi Sacchari . . . unciam.
 Misce bene. (Sw.)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
 Passularum min. . . drachmas sex.
 Coriandri . . . drachmas duas.
 Tartratis Potassae drach. quinque.
 Aquae bull. unc. viginti quatuor.
 Post aliquot horas digestionis coque leviter, cola exprimendo et colaturae uncias quatuordecim adde

Mannae . . . uncias quinque.
 Cola iterum. (D. Suec.)

Br†. Sennae sesquiunciam, Passularum tantidem, Coriandri, Tart. solub., sing. semunciam et Mannae uncias quatuor.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Corticis recentis Citri,
 Tartratis Potassae, sing. drach. tres.
 Succu Citri . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . uncias octo.
 Post refrigerationem cola et colaturae adde

Mannae electae drachmas decem.
 Solutionem iterum cola et adde

Aetheris sulphurici . . . guttas octo.
 Misce bene. (Wür†.)

4) Mit weinsteinfaurem Natron.

℞. Foliorum Sennae . . . semunciam.
 Aquae bullientis uncias quatuor.
 Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve

Tartari natronati drachmas duas.
 Mannae . . . drachmas sex.

Cola iterum. (Hort†.)

HC†. Omnium harum substantiarum triplum; — Sax2†. i Infuso sub 1) indicato Tartari natronati unciam addas, Infusum laxativum Vindobonense cum Sale habes; — Bor5†. Tartari natronati semunciam et Elaeosacchari Citri drachmam, caeterum ut antea.

5) Mit Glaubersalz.

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Aquae bullientis uncias quatuor.
 Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve

Natri sulphurici . . . drachmas sex.

Mellis puri . . . semunciam.

Cola iterum. (BorC†. WW†.)

℞. Foliorum Sennae
 Sulph. Sodae, sing.

drachm. quatuor.

Anisi . . . drachmam.

Infusi calidi Cichorii . . . octarium.

Post horas 12 infusionis cola. (ParC)

℞. Foliorum Sennae,

Sulph. Sodae, sing. . . semunciam,

Anisi,

Coriandri, sing. . . drachmam.

Fol. concis. Cerefolii,

— — Pimpinellae, sing.

semunc.

Aquae frigidae . . . libras duas.

Fruct. Citri in taleolas concis.

no. 1.

Macera per horas 20, subinde agitando; cola leviter exprimendo et filtra. (Gal. Re.)

GalP. Pimpinellam omittit.

℞. Tamariudorum . . . uncias duas.

Foliorum Sennae,

Sulph. Sodae, sing.

drachm. quatuor.

Anisi,

Coriandri,

Cerefolii,

Pimpinellae, sing. . . pugillum.
 Aquae bullientis . . . octarium.
 Infunde per semihoram et cola. (Bo. Ca.)

R. Foliorum Sennae . . . partes quindecim.
 — Cichorii . . . partes decem.

Sulphatis Sodae . . . partes decem vel viginti.

Aquae bullientis . . . q. s.

Post horas aliquot infusionis cola exprimendo et adde

Aquae Citri aromat. part. triguata.

Misce bene. (GalM.)

R. Infusi Fol. Sennae . . . uncias octo.

Sulphatis Sodae vel Magnesiae . . . drachmas tres.

Mellis crudi . . . drachmas duas.

Liqua. (DD.)

6) Mit Bittersalz.

R. Passularum minorum . . . uncias duas.

Foliorum Sennae . . . semunciam.

Aquae . . . q. s.

ut libra una decocti vel infusi obtineatur; colaturae adde

Salis cathartici amari semunciam.

Dissolve. (Gen.)

Alle diese Aufgüsse führen, je nach den verschiedenen Fällen oder der Anwendungsweise, gelinder oder stärker ab. — Die Gabe ist je nach den Formeln verschieden, im Allgemeinen von drei bis sechs Unzen.

Auch die folgenden gehören eigentlich hierher.

Infusum catharticum, Potio purgans s. laxans. (HassP†. Li†. Wür†. Aut.

Huf† Gal. GalM. Bo. Gr. Pic. Ra.

Re. Sa. Sm. Va.)

1) Ohne ein Salz.

R. Foliorum Sennae . . . semunciam.

Aquae bullientis . . . q. s.

ut semilibra colaturae obtineatur. Post

horae quadrantem infusionis adde

Tinct. Aurant., (sesquidrachmam

HassP†.)

Syr Cerasorum, sing. semunciam.

Misce bene. (HassP†.)

R. Foliorum Sennae . . . drachmas sex.

Aquae frigidae . . . q. s.

ad humectanda folia. Post horas duas

adde

Aquae bullientis . . . q. s.

ut exprimendo colaturae unciae sex obtineantur; cola liquorem refrigeratum

et adde

Syrupi Sacchari . . . unciam.

Tinct. Cort. Aurantiorum . . . semunciam.

Misce. (Sw*)

R. Infusi Sennae . . . uncias tres.

Aquae Piperis Jamaicae semunciam.

Syrupi Rhamni . . . unciam.

Misce. (Sa.)

R. Mannae uncias duas cum dimidia.

Folliculorum Sennae drachm. duas.

Tamarindorum . . . semunciam.

Florum Persicae . . . pugillum.

Aquae fontanae . . . vitrum unum.

Infunde (Pic.)

R. Foliorum Sennae . . . drachmam.

Rhei . . . semidrachmam.

Florum Persicae . . . semipugillum.

Dec. Polypodii querni . . . unc. octo.

Coque leviter, cola exprimendo et

colaturae adde

Mannae . . . uncias duas.

Solutionem iterum cola. (Pic.)

R. Mannae uncias duas cum dimidia.

Follicul. Sennae . . . drachmas duas.

Tamarindorum . . . drachmas sex.

Florum Persicae . . . pugillum.

Cort. Aurant. amari . . . semidrachm.

Coffeae Mokkaënsis . . . drachmas duas.

Aquae fontanae . . . q. s.

Fiat infusum. (Pic.)

2) Mit weinstein saurem Kali.

R. Foliorum Sennae . . . semunciam.

Foeniculi . . . drachmam.

Aquae . . . q. s.

ut infusi unciae duae cum dimidia obtineantur; colaturae adde

Mannae . . . unciam.

Cremoris Tartari . . . drachmam.

Dissolve. (Aut.)

R. Sennae mundatae,

Rhei,

Cremor. Tart., sing. . . drachmam.

Aquae . . . q. s.

Coque ad unciam quatuor colaturae

et adde

Mannae . . . sesquiunciam.

Infusi Flor. Persicae . . . unciam.

Misce. (Pic.)

R. Corticis Aurantii siccati,

Fol. Sennae, sing. . . drachmam.

Cremoris Tartari . . . drachmas duas.

Salis Seignetti . . . drachmas sex.

Aquae communis . . . uncias octo.

Digere, blando calore, per horam

et adde

Pulpae Tamarindorum uncias duas.

Cola exprimendo. (Sa.)

R. Sennae,

Tartratis Potassae et Sodae,

singulorum drachmas duas.

Mannae . . . uncias duas.

Aquae . . . uncias quatuor.

Fiat infusum, cujus colaturae, pro re

nata, adde Chinae drachmam, Syrupi

Florum Persicae unciam vel Jalapae

pulveratae grana octo (Ra.)

℞. Rhei drachmam.
 Foliorum Sennae drachmas duas.
 Salis Seignetti . . . semunciam.
 Aquae q. s.
 ut decocti unciae sex obtineantur; co-
 laturae adde
 Mannae uncias duas.
 Dissolve. (Auf.)
 ℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Corticis recentis Citri,
 Tartrat. neutr. Potass., sing.
 drach. tres.
 Succu Citri semunciam.
 Rhei drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . uncias octo.
 Infunde et post refrigerationem co-
 la; colaturae adde
 Mannae drachmas decem.
 Solutionem cola et adde
 Aetheris sulphurici . guttas octo.
 Misce bene. (Wüßf.)
 ℞. Infusi Sennae unciam.
 Tincturae Sennae,
 — Jalappae,
 Potassae Tartratis,
 Syrupi Sennae, sing. drachmam.
 Auf eine Gabe. (Gr.)
 ℞. Infusi Sennae . . . uncias duas.
 Sodae Tartratis uncias (drachmas?)
 sex.
 Aquae Cinnamomi . . semunciam.
 Auf zwei Mal. (Gr.)
 3) Mit Bittersalz.
 ℞. Folliculorum Sennae,
 Sulph. Magnesiae, sing.
 drach. duas.
 Tamarindorum . . . semunciam.
 Mannae uncias duas.
 Aquae q. s.
 ut infusi vitrum unum obtineatur (Bo.)
 ℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . uncias tres.
 Post horam macerationis colaturae
 adde
 Sulphatis Magnesiae drachmas tres.
 Tincturae Sennae . . semunciam.
 Misce bene. (Sw.)
 Sennae drachmas tres.
 Sulphatis Magnesiae semunciam.
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Succu Citri drachmam.
 Aquae uncias octo.
 Fiat infusio. (Ra.)
 ℞. Sennae mundatae drachmas duas.
 Salis Epsomensis drachmas tres.
 Aquae vitrum unum.
 Infunde per semihoram inter cineres
 calidos et sub finem adde
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Essentiae Citri q. s.
 Misce. (Pie.)
 ℞. Infusi Sennae compositi
 uncias quinque.

Aquae Cinnamomi . . . unciam.
 Mannae . . . drachmas quatuor.
 Magnesiae sulphuricae
 drachmas sex.
 Gabe, ein Beinglas voll. (Gr.) (Com-
 mon black Draught.) — Re Infusi un-
 ciam, Magnes. sulph. drachmas duas;
 Tinct. Opii guttae aliquot addi pos-
 sunt.
 ℞. Infusionis Sennae drachmas sex.
 Tincturae Sennae,
 Mannae, sing. . . drachmas duas.
 Magnesiae Sulphatis semunciam.
 Aquae Menthae sativae
 — fluvialis, sing. sesquiunciam.
 Misce. — Die Hälfte und wenn keine
 Wirkung erfolgt, die andre. (Ein sehr ge-
 wöhnliches catharticum John Aberne-
 thy's in London. (t. 2.)
 ℞. Sennae mundatae drachmas duas.
 Rhei drachmam.
 Salis Epsomensis drachmas tres.
 Florum Persicae . pugillos duos.
 Mannae uncias duas.
 Aquae q. s.
 Fiat infusio. (Pie.)
 ℞. Folliculorum Sennae,
 Salis Epsom., sing. drach. duas.
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Tartari stibiati . . . granum.
 Aquae q. s.
 Fiat infusio. (Pie.)
 ℞. Infusi Sennae . . . sesquiunciam.
 Salis Epsomensis . drachmas sex.
 Tincturae Jalappae,
 — Castorei, sing. drachmam.
 — Opii guttas decem.
 Auf eine Gabe. (Gr.)
 4) Mit Glaubersalz.
 ℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Sulphatis Sodae . . . semunciam.
 Syrupi Rhamni . . . unciam.
 Aquae uncias quatuor.
 Fiat infusio. (GalM. Ra. Va. Höt. D.)
 ℞. Sennae mundatae drachmas duas.
 Sulph. Sodae drach. duas c. dimid.
 Mannae uncias duas.
 Infusi vel Dec. Cichorii uncias sex.
 Fiat infusio. (Ra. Va. Hosp. Ven.)
 ℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Aquae uncias quatuor.
 Paullulum coque et colaturae adde
 Sulphatis Sodae unciam.
 Syrupi Ribium . . . uncias duas.
 Misce. (Li.)
 Auf. Sennae drachmas duas, Aquae
 bull. uncias quatuor, horae quadran-
 tem infusionis, Sulphatis Sodae sem-
 unciam et Mannae tantidem.
 ℞. Sennae mundatae,
 Sulph. Sodae, sing. drach. duas.
 Aquae bullientis . . vitrum unum.

Colaturae adde
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syr. Cichorii comp. unciam
et post refrigerationem
Es-sentiae Anisi guttas tres.
Misce. (Sm.)

R. Foliorum Sennae uncias duas.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Aqua uncia quatuor.
Pulv. Jalapae gr. viginti quatuor.
Infunde et colaturae pulverem adde
(Ra.)

Va. Höt. D. Fol. drachm. duas, Sulph.
Sod. quatuor, Aquae unc. quatuor, Ra-
dic. Jalap. pulv. gr. viginti quinque.
— Auf zwei Mal.

R. Sennae mundatae drachmas duas.
Subcarb. Sodae cryst. semidrachmam.

Aqua destillata uncias sex.
Infunde frigide per horas 12, cola
et adde

Acidi sulph. guttas 20—24.
Post effervescentiam adde
Syr. de Cichorio comp. unc. quatuor.

Jalapae pulv. cum duplo Sacchari
contritae grana 12—24.
Aqua Cinnamomi q. s.
Misce. (Pie.)

R. Foliorum Sennae,
Sulph. Sodae, sing. drach. duas.
Rhei semidrachmam.
Mannae sesquiunciam.
Aqua q. s.

Fiat infusum vel decoctum. (Potio
vel Haustus purgans communis deco-
ctione vel infusione paratus) (Gal. Re.)
(Der Aufguss wird bereitet, indem man
die genannten Substanzen acht Stunden
lang in fünf Unzen kochendem oder die selbe
Quantität zwölf Stunden lang in kaltem
Wasser stehen lässt; die Abkochung, indem
man die Rhubarber und Senna mit so viel
Wasser kochen lässt, daß die Colatur fünf
Unzen beträgt, worin man dann das Salz
und die Manna auflöst. Man kann die
Abkochung abklären, daß man sie zwei Mi-
nuten lang mit einem zu Schaum geschla-
genen Eiweiß kochen lässt, indem man der
Flüssigkeit, wenn sie in's Kochen kommen
will, zwei Drachmen Zitronensaft zusetzt,
hierauf sie vom Feuer nimmt und filtrirt.
Auch kann man Pfeffermünze, Pomeranzen-
blüth: und Bimtwasser zusetzen.)

R. Folliculorum Sennae drachmas tres.
Rhei drachmam.
Ipecacuanhae grana decem.
Aqua q. s.
Coque et adde
Mannae,

Sulph. Sodae, sing. drach. duas.
Liquorem cola. (Pie.)
Selway's prepared Essence of Senna
(Re.): Infusum Sennae concentratum
cum Alkali aliquo.

Infusum catharticum s. Decoctum laxa-
tivum pro clystere, Clyster s. Enema
laxans s. purgans. (GalM. Gr. ParC.
Ra.)

R. Sennae uncias duas.
Aqua libram.
Coque et cola. (Ra.) — Addere
potes Sulphatis Sodae semunciam et
Mellis comm. uncias tres vel quatuor.
DB. Sennae semunciam coquere cum
Decocto seminum Lini vel Furfurum
sesquilibram, colare et addere Sulpha-
tis Sodae drachmas duas et Mellis un-
cias quatuor; — ParC. Sennae drach-
mas quatuor, Aqua libram et Mellis
Mercurialis annuae uncias duas

R. Sennae drachmas quatuor.
Sulphatis Sodae drachmas sex.
Aqua q. s.
Fiat decoctum (GalM.) — Adduntur,
si necesse est, Tartari stibiati grana
duo vel tria.

Gr. Foliorum Sennae drachmas tres,
Salis Glauberi unciam, Aqua ferven-
tis libram, exprime

Clyster s. Enema Sennae (Va. Char.):
Sennae drachm. duas, Aqua bullien-
tis libram.

Clyster s. Enema purgans (Va. Hosp.
Ven): Fol. Sennae drachm. quatuor,
Decocti Sem. Lini libram, infunde et
cola.

Enema purgans pictorum (Va. Char.):
Sennae semunciam, Aqua libram, co-
que, cola et adde Sulph. Sodae sem-
unciam, Vini emet. unc. quatuor, misce.

Bei Metallcolik.

Enema laxans (Va. Höt. D.): Follic.
Sennae semunciam, Specier. emollient.
unc. duas, Sulph. Sodae drachm. duas,
Aqua bull. q. s., infunde et cola.

Mixtura Sennae composita. (Va. Hosp.
Angl.)

R. Sennae,
Menthae viridis, sing. unciam.
Aqua bullientis libras duas.
Infunde, cola et adde
Sulphatis Magnesia uncias sex.
Misce. — Zwei bis vier Drachmen.

Potio purgans vermifuga. (Pie. Sm.)

R. Sennae mundatae drachmas duas.
Coffeae tostae pulv. pugillos duos.
Lactis,
Aqua singulorum q. s.
Coque et cola. (Pie.)

R. Sennae mund.

drach. duas ad quatuor.
 Helminthochortos . drachmam.
 Fruct. Citri in taleol. concis. no. 1.
 Mannae uncias duas.
 Aquae bullientis . vitrum unum.
 Post 12 horas infusionis cola. (Sm.)

R. Sennae mund. drach. duas ad tres.

Seminis Contra pugillum.
 Subcarb. Potassae . drachmam.
 Aquae fontanae uncias duodecim.
 Post horas duodecim infusionis inter

cineres calidos adde
 Mannae uncias duas.
 Tartari stibiati grana duo.
 Cola. (Pie.)

Potio purgans camphorata. (DD.)

R. Infusi laxativi (DD.) uncias duas.

Mixturae camph. acid. uncias sex.
 Misce.

Julep diatariaearum. (B*.)

R. Sennae mundatae . uncias sex.

Zingiberis,
 Gaengae. sing. . drachmas tres.
 Infusi Rosarum pallid. libras tres.
 Infunde in balneo aquae tepido, per
 horas 24 in vase tecto, tunc parumper
 coque; cola, clarifica et adde

Sacchari albi uncias octo.
 Cremoris Tartari semunciam.
 Olei Anisi semiscrupulum.
 Gabe eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus vermifugus et purgans. (Ca.)**R. Sennae mundatae . semilibram.**

Semen Cinnae,
 Helminthochortos,
 Rhei, singulorum uncias quatuor.
 Corticis Aurantiorum unciam.
 Cinnamomi uncias duas.
 Sacchari libras viginti sex.
 Gabe, eine bis anderthalb Unzen

Potio purgans et febrifuga. (Bo.)

R. Ch. nae,

Folliculorum Sennae,
 Cremoris Tartari, sing.
 drach. duas.
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Flor. Chamomillae pugillum.
 Aquae vitrum unum.

Infunde et in infuso solve
 Tartari stibiati granum.

Apozema purgans. (Gal. Ca.)

R. Fol. rec. Cichorii,

— — Buglossi,
 — — Boraginis, sing. unciam.
 Sulphatis Sodae semunciam.
 Fol. Sennae mund. drach. duas.
 Aquae bullientis libras duas.

Infunde per horam, cola et colatu-
 rae adde

Syrupi Sennae unciam.

Misce bene. (Gal.)

R. Fol. Cichorii,

— Taraxaci,
 — Parietariae, sing. unciam.
 — Sennae drachmas tres.
 Sulphatis Sodae semunciam.
 Pimpinellae,

Cerefolii,
 Coriandri, sing. pugilum.
 Aquae libras duas.

Coque leviter per horae quadrantem,
 cola et adde

Syrupi Cichorii uncias duas.

Misce bene. (Ca.)

Glasweise des Morgens bis zur erfolg-
 ten Wirkung.

Decoctum pectorale solutivum. (Vm.)

R. Semen Anisi semidrachmam.

Radiceis Liquiritiae,
 Fol. Hyssopi, sing. drachmam.
 — Sennae drachmas tres.
 Aquae uncias sex.

Infunde frigide, cola exprimendo et
 adde

Syrupi Althaeae unciam.

Decoctum anticachecticum. (Sw. Sy.)

R. Rad. et Fol. rec. Cichorii,

— — — Acetosae,
 — — — Fragariae,
 — — — Calcitrapae,
 — — — Violarum,
 Flor. Nymphaeae albae, sing.

unciam.

Petal. Rosarum rubr. unc. duas.

Radiceis Parietariae semunciam.

Aquae libras duodecim.

Decoque ad librarum octo remanen-

tiam et liquori bullienti adde

Foliorum Sennae uncias quatuor.

Anisi,

Nitri, singulorum semunciam.

Post horas infusionis 24 cola.

Einschneidend und blutreinigend, bei
 Dysurie, Hämurie, kalten Geschwülsten,

hartnäckigen venerischen Ueeln, Scropheln
 und chronischen Hautkrankheiten empfohlen.

— Gabe, acht Unzen nüchtern in vier Ta-

gen und dann alle zwei Tage, drei Wo-

chen hintereinander. Ist der Kr. stark, so
 kann man bis auf zehn und selbst zwölf

Unzen steigen.

Sericum.

Sericum crudum, Serici folliculi; Ei-
 denbälglein, rohe Seide; Soie, Cocon de
 soie (Gal.); Capullo de seda (His.).

Wirt. Gal. Hist. G. Gr. Sp.

Ein eirunder Balg von dichten, sehr feinem Seidengewebe, m. ist von schön gelber, bisweilen wäcker Farbe, welchen die Raupe des Seiden spinners (Bombyx Mor., L.), eines Nachtfalters (Nocturna Bombycite, Lur.), welcher ursprünglich in Asien zu Hause ist, webt, um sich darin einzupuppen. (Roes. Ins. III. VII. IX. Bert. Bild. I. 5.)

S e r u m.

Serum Lactis, Serum Lactis vaccini; Mollen: Petit-lait (Gal.); Soro (Lus.).

Gal. LP Va.

Der seröse, wässrige, von dem Käse und Fett geschiedene Theil der Milch.

Serum Lactis depuratum s. clarificatum. (F. Gr. T.)

R. *Seri Lactis vacc. rec.* . libram.

Albumen Ovi no. 1.

Coque in vase cupreo, stanno obducto et post despumationem cola.

T. *Seri uncias viginti, Albumen Ovi* cum seri circiter uncis duabus in spumam conversum, *Cremoris Tartari* grana aliquot vel *Succi Limonum* guttas aliquot coquere per pauca momenta et ab igne remotis immergere *Corticis Citri* vel *Limonum* frustula aliquot; — Gr. *Lactis octarios sex, Casei stom. vitul. q. s.* stent loco caido per horas aliquot, exprime, adde *Albumina Ovi* rum no. 3 et *Cremoris semidrachmam*, coque et filtra per chartam.

Serum Lactis pulveratum. (Br. B*.)

R. *Sacchari Lactis* drachmas duas

— *albi* unciam

Gummi Arabici semidrachmam.

Misce. — Solve, si requiritur, in Aqua.

Serum Lactis dulce Hoffmanni. (Br.)

R. *Lactis vaccini* q. v.

Evaporet ad siccum in pelvi cuprea stanno bene obducta, blando igne et sub continua agitatione; partem o eosam, pulveri plerumque super tantem separa, tunc adde *Aquae bullientis* eandem quantitatem quantum lactis adhibueras; coque parumper, blando igne et filtra.

Serum Lactis s. Lactis praeparatum s.

dulce s. sincerum. (Br. 5. Ful.)

Has. Li. Sax. B. Fer. Gal.

His. Lus. Suec. Gr.)

R. *Lactis bullientis* libram.

Casei stom. hi vitulini, Aqua diluti drachmam.

Coque, cola adde *Albumen Ovi* trium in spumam conversam; ebulliant semel, tunc per linteum trajice. (Ful. Hass. B. Fer.)

Br. 4. *Lactis vacc. rec. libras duas, Stomachi vitulini exsic. et per horas sex Aquae comm. frig. uncis tribus* immersi drachmam, una cum aqua maceratione adhibet, expone leni calori et digere, donec coagulatio facta sit; liquorem decantha et cola; —

Br. 5. *Stomachi vit. exsic. semunciam Aquae comm. frig. uncis sex* infundere et per decem aut duodecim horas seponere hujus liquoris unciam

Lactis vaccini libris novem addere, leni calori exponere et digerere, donec coagulatio facta sit, tum liquorem decantere et coare; —

Sax. 2. *Lactis recentis libras tres, Stomachi vitulini exsiccati in fila tenuia concisi sesquidrachmam* digerere, donec coagulata sint, tunc filtrare et si limpidum desideratur, *Albuminis ope* despumare

R. *Lactis vaccini* . partes bis mille.

Casei stomachi vitul. Aquae pauxillo diluti partes duas c. dimidia.

Supra cineres calidos ponantur et simulac lac coagulare coepit, ignem gradatim auge sed non ad bullitionem usque, ita ut pars caseosa magis magisque concreseat, serum deinde alii vasi infunde, coagulum vero craticulae vimineae imponatur, ut serum penitus exstillet, quod priori admisceatur. (Li. Gal. Lus. Suec.)

Gr. *Lactis octarios duos, Coaguli semidrachmam in Aquae bull. parvam* copiam infusam, mixta et blando calore per aliquot horas exposita, tum expressa; — *His. loco coaguli o stomacho vitulino Flores Scolymi Gynarum Carduaculi* adhibent.

Serum Lactis dulce s. dulcificatum. (HC. Br. 5.)

R. *Lactis vaccini* libras tres.

Coque et sub initio bullitionis adde

Tartari depurati . . . drachmam.

Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola et cum

Album. Ovi. in spumam red. q. s.

ad *albuminis coagulationem* usque coque. Colato adde

Concharum praep. quantum ad neutralis. acidi requiritur et filtra.

HC. *Lactis libras quatuor, Acidi tartarici scrupulos quatuor, Concharum drachmas duas, Albumina Ovi* rum quatuor in spumam conquassata,

iterum coque, ut sero refrigerato, filtrato, librae duae remaneant.

Serum Lactis chalybeatum. (Br†.)

℞. Seri Lactis . . . q. v.
Extingue in illo pluries Ferrum rubro-excandescens et filtra deinde.

Serum Lactis vinosum. (Br†. Ful†. Hass†. Li†. Au†. Lus. Br. E2. Gr. Sa. Sm. Sw.)

℞. Lactis vaccini . . octarios duos.

Vini albi aciduli . . uncias octo.

Coque simul, post coagulationem cola et clarifica. (Br†. Ful†. Hass†. Sm.)

HC†. Lactis libras quatuor, Vini rhenani uncias decem, ut colatura librarum duarum sit; — Li†. Lactis partes tres et unam Vini; — E2. Lactis semiocarium et Vini albi (Madeira) unciam ad duas.

℞. Lactis vaccini,

Aquae singulorum . . libras duas.

Vini Rhenani . . sesquiunciam.

Coque simul, cola et post coagulationem clarifica. (Sw.)

Gr. Lactis libras duas, Aquae font. unam, coque et adde Vini albi semiocarium.

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.

Vini albi . . . uncias octo.

Coque parumper, cola et Albuminis ope clarifica. (Sa.)

Lus. et Sm. Lactis uncias octo et Vini libras duas; — Au†. Seri Lactis libras tres et unam Vini.

Serum Lactis acidum s. clarificatum s. diluens s. tartarisatum. (Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. B*. Gal. GalM. His3. LH. Lus. Suec. Gr. Ra. Sp. Vri.)

℞. Lactis vaccini . . octarios duos.

Cremoris Tartari scrupulos quatuor.

Coque lac et deinde sal supersparge; ab igne remove et spatulae ope hic et illic ac lente liquorem agitando, sepone, et post refrigerationem per pannum laneum (Stanell) trajice, in colatura Albumen Ovi unius in spumam conversum prope ignem repone et simulac ebulliat, faecibus sepositis superinfunde. (Br†. Hass†. B*. GalM. Sp. Vri.)

HC†. Lactis libras quatuor coquere et sub initio ebullitionis addere Tartari depurati unciam dimidiam, coagulatione peracta serum refrigeratum colare et filtrare, ut colatura sit librarum duarum; — HN†. ut serum Lactis c. Aceto Vini; — LH. Lactis libram, coque et dissolve Cremoris semidrachmam; cola. — Gabe, auf zwei Mat;

— Li†. Lactis partes octodecim et unam Cremoris Tartari; — Ful†. Lactis triginta sex et unam Cremoris Tartari; — HassP†. Lactis libras quatuor, Cremoris scrupulos quatuor ad sex, sero colato adde Albumina Ovorum no. 2, ebulliant deinde et filtrantur; — Bor5†. ut serum lactis dulcificatum sed absque conchis; — Gr. Lactis sesquibram, Cremoris sesquiunciam.

Loco cremoris tartari Acetum vel Succus Citri adhiberi potest. (Hau†. Hass†. Ra.)

℞. Seri Lactis . . libras quatuor.

Albumina Ovorum . . . no. 3.

Cremor. Tart. gr. viginti quatuor.

Subige albumina cum seri pauxillo, adde hujus quod restat, coque et simulac bullire incipiant, cremorem tartari sensim adde, liquorem agitando; tunc cola et filtra. (Gal. His. Lus. Suec.)

His3. Seri libram, Cremoris semi-scrupulum, Albumen Ovi unius.

Serum Lactis cum Aceto Vini s. acetosum. (HN†. RC. Sa. Sw.)

Lactis vaccini bene emuncti mensurae duae ebulliant, addetur Aceti Vini q. s. ad coagulandum, liquidum a caseo separatum Albumine trium vel quatuor Ovorum mixtum iterum coquitur, postremo per chartam typographorum filtratur. Obtinetur mensura una seri. (HN†.)

℞. Lactis vaccini,

Aquae fontanae, sing. libras duas.

Coque et adde

Aceti . . . sesquiunciam.

Postquam coagulum ortum est, cola.

RC. Lactis, Aquae, sing. libram, Acidi acetici impuri unciam; — Aceto substitui possunt subinde Cremoris Tartari drachmae duae vel Vini albi aciduli semilibra vel pro re nata inter coquendum: Fructus Amycae Indicae, si praesto est, sesquiuncia vel Succus antiscorbutici unciae duae.

Serum Lactis compositum. (Bo.)

℞. Seri Lactis acidi

libr. duas c. dimid.

Succi recentis Citri . . unciam.

Conserv. Rosar. vitriol. drach. sex. Misce.

Serum antiscorbuticum. (Fi.)

℞. Lactis vaccini rec. . . libram.

Succi antiscorbutici uncias quatuor.

Coque et post coagulationem cola. — Gabe, drei bis sechs Anzen.

Serum Lactis depurans. (LH.)

R. Fumariae recentis,
Sarsaparillae, sing . . . unciam.
Aqua libram.
Coque ad remanentiam
librae dimidia
ultimis bullitionibus adde
Lactis vaccini . . . semilibram.
Dissolve inter fervendum
Cremoris Tartari semidrachmam.
Cola. — Gabe, auf zwei Mal.

Sesamum.

Sesamum orientale, L.; Sesam; Sésame d'Orient (Gal.); Benne (Ang.).
Wirt. Mf. AD. Am Gal. His3. RC.
Taur. A. C. Gr. Re. Sp.
⊙ (Didynamia Angiospermia, L.;
Bignoniaceae, J.) Eine Pflanze Syriens
und Aegyptens. (Burm Zeyl. t. 38.
f. 1)

Man wendet den Saamen, Sesam;
Sesamum; Σησαμω; Sésame (Gal.);
Sesamum (Ang.); Sesam (Bel.); Sum-
sum (Ar.); Ellu (Can.); Tal (Guz.);
Till (Hin.); Kunjid (Pe.); Talla (Sa.);
Yellu (Tam.); Nuwulu (Tel.) an. Er
ist eiförmig, gelb, ölig, von süßem, angeneh-
mem Geschmack. — Auch die Blätter wer-
den verwendet.

Oleum (Seminum) Sesami orientalis.
(Pal. AD. His3. RC. Gr. T.)

R. Seminum Sesami q. v.
Contunde in mortario et exprime.
(His. His3.)

Pal. antequam prelo subiciantur,
semina paullo torrere jubet.

Mit diesem darf ein anderes Oleum
Sesami (Gr.) nicht verwechselt werden,
welches von Myagrum sativum bereitet
und zu Salben benutzt wird.

Seseli.

Unter diesem Namen werden angeführt;
1) *Tordylium officinale*, L.; Cretisches
Seseli; Séséli de Crète (Gal.).

Br. Wirt. Mf. His3. Taur. Be. Gr.
Sp. Z.

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Umbel-
liferae, J.) Eine Pflanze Südeuropas.
(Zorn Ic. pl. t. 278.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Tordylia s. Seseli
Cretici s. montani) ist lang, dünn, faserig
und weiß. — Der Saamen ist lang,
fast platt, rau anzufühlen, mit drei herz-

vorstehenden Linien bezeichnet und mit einem
weißen Rande versehen. Er hat einen ge-
würzhaften Geruch und einen eben solchen
aber schwachen Geschmack.

Reizend.

2) *Seseli toruosum*, L., büschelblättri-
ges Seseli; Séséli de Marseille (Gal.);
Comino de Marsella (Lus.).

Br. Wirt. Mf. GalP. His3. Taur.
G. Gr.

⊙ oder ♀ (Pentandria Digynia, L.;
Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des süd-
lichen Europas. (Reyn. Bot. t. 313.)

Man wendet den Saamen (semen Se-
selios Massiliensis) an; er ist langge-
streckt, gestreift, grünlich, von gewürzha-
ftem Geschmack.

3) *Peucedanum Silaus*, L.; Silau,
Mattensteinbrech; Sé-Éli des prés, Saxi-
frage des Anglais (Gal.); Meadow sul-
phurwort (Ang.); Weld minuin (D.);
Hauir streng (Bel.).

Gal. Gr. Re.

♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbel-
liferae, J.) Eine Pflanze Südeuropas.
(Jacq. Fl. Austr. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Seselios pratensis
s. Saxifragae Anglicae s. vulgari) ist
groß, dick, oft gabelig und unten mit ei-
nem Büschel Haare versehen. — Der
Saamen ist auf der einen Seite platt, auf
der andern gewölbt und mit fünf Streifen
bezeichnet. Geruch und Geschmack sind scharf
und gewürzhaft.

Gr. führt noch mehrere unter diesem
Namen vorkommende Pflanzen an.

Silene.

Von dieser Pflanzengattung finden sich:
1) *Silene Otites*, Cand.; feldliebender
Laubentropf; Silene Otites (Gal.); Field
campion (Ang.).

Br. Wirt.

⊙ (Decandria Trigynia, L.; Caryo-
phyllaeae, J.) Eine Europäische Pflanze.
(Oed. Fl. Dan. t. 518. Plenck t. 348.)

Man wendet das Kraut (herba Viscagi-
nini) an; es besteht aus einem einfachen,
fleischigen Stängel mit wenigen Blättern,
von denen die untern spatelförmig, die
obern lanzett- oder linienförmig sind. Es
hat einen adstringirenden und etwas bits-
tern Geschmack.

2) *Silene Virginica*, L.; Virginischer
Laubentropf; Silene de Virginie (Gal.).
C. Gr.

♀ Eine in Virginien einheimische Pflanze.
Die Wurzel, welche man anwendet, gilt
für ein Barmittel.

Simaruba.

Simaruba amara, Aublet, *Simaruba officinalis*, Dec., *Quassia Simaruba*, L.; *Simarubarinde*, *Ruhrinde*; *Simarouba* (Gal.); *Simaruba* (His. I.); *Cimaruba*, *Simarouba* (Lus.)

Bat. BorCt. Bor5t. Brt. Ful. Hamt. Hant. HassPt. HCt. Hvt. Lt. Ot. Sax2t. Wirt. Wirt. Mt. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. Su. c. Taur. Bc. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Rv. Sp. Va. Z.

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; *Simarubeae*, Cund.) Südamerica's. (Aubl. Guian. 331. 332. Düs. off. Pfl. XVII. t. 13. Lam. III. gen. t. 343. f. 2. Desc. Fl. méd. d. Ant. t. 14. Pl. méd. VI. 327.)

Man wendet die Rinde (cortex *Simarubae*) an: sie besteht in langen, einge- rollten, dünnen, biegsamen, zähen, faseri- gen, äußerlich gleichsam warzigen, bläugel- ben, innen gelblichgrauen, geruchlosen Stücken. Sie hat einen bitteren Geschmack.

Man nimmt fast immer die der Wurzel, selten die des Stängels.

Sie enthält, nach Morin, Quassiafloß, einen harzigen Stoff, ein flüchtiges Del, Aluminium, Aepfelsäure, etwas Gallus- säure und verschiedene Salze.

Tonisch, magenstärkend, bei Wechselfie- bern und Schleimflüssen aller Art. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zu einer halben Drachme.

Extractum Simarubae. (DB.)

Paratur ut *extractum Gentianae*.

Decoctum Simarubae s. *Corticis Simarubae*. (Fult. HNt. B* GalM. Gen. Sa. Sw.)

R. *Corticis Simarubae* . semunciam. Aquae q. s. ut post coctionem librae duae colaturae obtineantur. Coque per horae qua- drantem. (GalM.)

B*. *Corticis drachmas* duas ad sem- unciam, *Aquae libras* duas ad remanentiam unciarum octo; — Sa. *Radi- cis drachmas* duas ad semunciam, *Aquae sesquibram* ad librae unius remanen- tiam; — Sa. *Radicis drachmas* duas, *Aquae libras* duas ad dimidii remanentiam; — Gen. *Rad drachmas* duas et *Aquae libram* ad unciarum duode- cim remanentiam; — Fult. *Corticis semunciam* et *Aquae libram* ad octo unciarum remanentiam; — HNt. un- cia cum *Aqua* ad colaturam librae unius.

Gabe, eine Unze, alle zwei oder drei Stunden, oder vier Unzen täglich drei Mal.

Infusum s. Tisana Simarubae. (AD. B*. GalP. Lon. LonN. LPC. C. CG. Fi. Gr. Re. T.)

R. *Corticis Simarubae semidrachmam*. *Aquae bullientis* . semioctarium. *Macer* per horas duas in vase levi- ter tecto et co'a.

GalP. ut *tisnam Patientiae*; — LPC. *Simarubae drachmas tres*, *Aquae oc- tarium*; — T. *Simarubae semidrach- mam*, *Aquae bullientis uncias* sex. — Bitter, gewürzhaft.

Hausus adstringens, *Potio adstringens*. (B. Va.)

R. *Corticis Simarubae semunciam*. *Aquae q. s.* (unc. duodecim Va.) ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde

Emuls. gummos. (Mucil. G. Ara- b. ci Va.) uncias duas.

Tincturae thebaicae guttas viginti. Allmählig zu nehmen, bei sogenannter ato- nischer Diarrhöe.

R. *Corticis Simarubae semunciam*. *Aquae* q. s. ut decocti unciae octo obtineantur. *Colaturae* adde

Tinct. thebaicae scrupulum.

Alcoholis unciam.

Aquae Cinnamomi semunciam.

Wie den vorhergehenden Trank und in denselben Fällen zu nehmen.

Sinapis.

Man findet in den Pharmacopöen:

1) *Sinapis alba*, L.; weißer Senf; Mo- strich; Moutarde blanche (Gal.).

Bor5t. Hant. HCt. HNt. Lt. Pal. Sax2t. Wirt. AD. D. Du. Ed. GalP. Taur. E. G. Gr. Re. Sp. Va.

⊙ (*Tetradynamia Siliquosa*, L.; *Cruciferae*, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn lc. pl. t. 92. Düs. off. Pfl. VIII. t. 2.)

Man wendet die Saamen (semen *Sinapis* s. *Sinapios albae* s. *Erucae*) an; sie sind klein, rund, gelblich, von flüchti- gem Geruch und scharfem, bitterem Ge- schmacke.

2) *Sinapis nigra*, L.; Senf; Moutar- de noire (Gal.); Mustard (Ang.); Sen- nep (D.); Mostaro (His.); Mosterd (Bel.); Senapa, Senevra (I.); Gorczyca czarna (Lus.); Mostarda (Lus.); Senap (Succ.).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†.
Ham†. Han†. HassP†. HC†. Li†. O†.
Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†. AD.
Am. Ams. An B. Bel. D. Du Fenn. Fer.
GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN.
LP. LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur. Br.
Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re.
Sa. Sp. Va.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze.
(Blackw. t. 416. Plenck t. 524. Hayne
VIII. t. 40. Düss. off. Ph. XIII. 22.
Bert. Bild. II. 77. f. 1. Zorn Ic. pl. t.
152.)

Man wendet den Saamen (samen Sinapis s. Sinapis nigrae s. Erucae nigrae) an; er ist sehr klein, rundlich, schwarz, oder schwärzlichbraun, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmacke.

Beide Arten Saamen sind stark reizend. Man zählt sie zu den antiscorbutischen Mitteln. Einen Theelöffel voll von dem weißen Senfsaamen, ungequetscht, täglich drei oder vier Mal genommen, soll gegen habituelle Verstopfung von einem irritabeln Zustande der Mastelthaut der Därme sich sehr nützlich erweisen. — Henry und Garrot haben in denselben Schwefelsäure gefunden, welche mit der Schwefelsäure Ähnlichkeit hat, aber sich durch ihre Grundbestandtheile unterscheidet.

Gr. führt außer diesen noch Sinapis arvensis, dichotoma, ramosa, Sinensis an.

Die Saamenschalen des schwarzen Senfs geben ein Del (Oleum Sinapis, Gr.), welches gegen Rheumatismen dient. — S. dichotoma, ramosa, glauca, Sinensis und tori geben süßes Del.

Species pro sinapismo. (HC†) Pulvis Sinapis nigrae.

Unguentum Sinapis. (Au†)

R. Seminum Sinapis . . . uncias tres.
Olei Amygdalarum . . . semunciam.
Succi Citri q. s.
Von Frank bei Ecchymosen gerühmt.

Boli ad paralyzin s. stimulantes. (Ca. Sa. Sw. Va.)

R. Seminum Sinapis semidrachmam.
Carvi,
Cinnamomi, sing. grana quatuor.
Zingiberis grana duo.
Syrupi Sacchari q. s.
Fiat bolus. (Va.)

Ca. Sw. Va. omisso zingibere Syrupum Zingiberis loco simplicis.

Zwei Mal täglich, bei Lähmung.

Electuarium Sinapis. (Va. Hosp. Angl.)

R. Semin. Sinapis contus. unciam.

Flor. Sulph. lot. drachmas duas.
Syrupi Cort. Aurant. unciam.

Electuarium antiscorbuticum. (Vm.)

R. Pulveris Cinnamomi,
— Sinapis, sing. partem unam.
Corticis Aurantiorum,
Extracti Trifolii, sing. partes duas.
Conservae Beccabungae,
— Armoraciae,
— Cochleariae,
— Nasturtii, sing. partes tres.
Misce sedulo.

Cataplasma epispasticum s. irritans s. Sinapis s. Sinapis discutiens s. Sinapeos, Linimentum rubefaciens, Sinapismus s. Sinapismus communis s. irritans, Pasta epispastica s. pro uno Sinapismate. (Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. WW†. Au†. AD. DD. Du. Fer. Gal. GalM. GalP. His3. LH. LonN. LoP. LP. LPC. Lus. Pm. RC. Taur. Br. C. Ca. CG. DB. E2. Fi. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sw. T. Va. Vm.)

R. Cataplasmatibus simplicibus libram.
Inspergatur Sinapis Farina. (LoP.)

R. Seminis Sinapis nigrae pulveratae uncias quatuor.

Aquae fervidae q. s.
ut f. cataplasma mollioris consistentiae, quod in vase vitreo etc. servetur. (HC†.)

GalP. Farinae Sinapis uncias octo;
— HN†. Sinapis unciam, caeterum ut HC†.; — Sax2†. Seminum uncias tres,
Aq. ferv. q. s. ad pulcritudinem spissiorum.

R. Seminum Sinapis grossiuscule pulv. (uncias quatuor) q. v.

Aceti q. s.
ut pasta satis spissa fiat. (Han†. DD. Gal. GalM. Ca. E2. ParC. Ra. Va. Hosp. Paris.)

HassP†. Pulveris Sinapis partes quinque, Aceti crudi tres.

Die Quantität des Senfs wechselt von anderthalb bis vier Unzen.

Va. Hosp. Mat. ut maiorem vim attingat, Salis Ammoniaci uncia inspergi potest.

R. Farinae Sinapis,
Micae Panis, sing. . . partes aeq.

Aceti q. s.
ut fiat pasta mediocris consistentiae. (LH. LP. Lus. Br.)

Sim et Vm. Sinapis partem unam, Fermenti duas et Aceti calidi q. s.

R. Fermenti,
Farinae Sinapis, sing. partes aeq.

Aceti simpl. vel scill. q. s.
ut fiat puls spissa. (Sax†.)

Ra. Va. Hosp. Ven. Fermenti partes quatuor et unam Sinapis; — Fi. T. Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Aceti q. s.

*Rx. Fermenti acerrimi . uncias sex.
Semin. Sinapis subtil. pulv.*

*Salis communis . . . semunciam.
Aceti optimi . . . q. s.
ut fiat sinapismus. (Pm.)*

*DB. Aceti loco Aquam substituit.
Rx. Farinae Sinapis,*

*— Sem Lini, sing. . semilibr.
Aceti fervidi . . . q. s.
Commisce. (Loun. LPC CG. Re.)*

AD Ra. Va. Hosp. Inf. et Char. Cataplasmatibus Farinae Lini uncias quatuor et Farinae Sinapis semunciam (Sinapis mitigatus); — AD. Du. et C. Sinapis, Micae Panis, sing. semilibrum, Aceti q. s. et si requiritur Armoraciae uncias duas; — Taur. Farinae secalis sesquiunciam, Sem. Sinapis subtiliss. pulv. uncias tres, Aceti acerrimi q. s.; — WW†. Farinae secalitiae partes quatuor, Sinapis duas et Aceti q. s.; — Bor5†. Farinae Sinapis unciam, Farinae secalis semunciam, Aceti q. s., ut fiat emplastrum mollioris consist; — Sw. Farinae secalitiae partes duas, Sinapis tantidem et Aquae q. s.; — Sa. Farinae triticeae, Farinae Sinapis, sing. partes duas et Aceti q. s.; — RC. Sinapis, Farinae avenaceae, vel triticeae, vel Micae Panis, vel Fermenti, sing. part. aeq., Aceti q. s.

*Rx. Farinae avenaceae uncias quatuor.
Aceti . . . uncias sex.
Coque ad consistentiam cataplasmatibus, sub finem addendo*

*Pulv. Flor. Sambuci uncias tres.
Semin. Sinapis drach. tres.
Misce. (Au†.)*

Rx. Rad. Armoraciae recent, Sinapis, Aquae q. necessarium et sufficiat ut fiat sinapismus. (Gr.)

*Rx. Fermenti,
Radicis Armoraciae rasae,
Sinapis contus, sing. sesquiunciam.
Aceti . . . q. s.
Misce simul. (Han†.)*

GalH. et Sw. Farinae triticeae partes quatuor, Farinae Sinapis tantidem, Armoraciae unam et Aceti q. s.

*Rx. Fermenti,
Sinapis, singulorum . uncias tres.
Piperis nigri contusi . unciam.
Aceti . . . q. s.
ut fiat pasta. (HassP†.)*

HN†. Sinapis nigrae semunciam, Piperis nigri drachmam, Armoraciae, Fermenti Panis, sing. unciam, Aceti concentrati q. s. ut f. cataplasma mol-

lioris consistentiae (Sinapismus fortior); — Han†. Sinapis sesquiunciam, Piperis drachmam, Armoraciae, Fermenti, sing. unciam et Aceti q. s.; — Ca. Sinapis semilibrum, Piperis, Zingiberis, sing. drachmam et Oxymellis q. s.

*Rx. Fermenti . . . uncias duas.
Salis culinaris,
Farinae Sinapis, sing. semunciam.
Aceti . . . q. s.
ut fiat pasta. (Fer.)*

ti Fermenti uncias sex, Farinae Sinapis unam, Salis marini semunciam, Aceti fortis q. s.; — T. Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Salis semunciam, Aceti q. s.

*Rx. Fermenti acris . sesquiunciam.
Farinae Sinapis . uncias quatuor.
Salis Ammoniaci . drachmam.
Herb. Rutae contus. semunciam.
Aceti . . . q. s.*

*ut fiat pasta mollis. (His3)
RC. Farinae avenaceae, vel Micae Panis, Sinapis, sing. uncias duas, Armoraciae sesquiunciam, Salis Ammoniaci semunciam, Aceti q. s.*

*Rx. Fermenti,
Saponis nigri, sing. drach. duas.
Sinapis,
Herb. Rutae contus., sing.*

*semunciam.
Ceparum contusarum . unciam.
Salis culinaris . . semunciam.
Aceti . . . q. s.*

*Fiat pasta mollis. (Br†.)
LP. Sinapis uncias duas, Micae Panis tantidem, Allii contusi semunciam,*

*saponis nigri unciam, Aceti q. requiritur. (Cataplasma Sinapis compositum.)
Mustard embrocation for horses (Re.):
Farinae Sinapis uncias quatuor, Solut. Ammoniae sesquiunciam, Ol. Terebinth. unciam, Aquae q. s. ut f. mistura cremoris consistentiae. — Aeußerlich bei Lungenentzündung.*

Oleum Sinapis destillatum. (HC†. GalP. DB.)

*Rx. Seminis Sinapis nigrae pulv.
libras quinque.*

*Aquae frigidae . libras triginta.
Semen cum aquae frigidae q. s. in pulvem tenuiorem redactum, in vase clauso per horas 24 reponatur, deinde reliqua aqua admixta de-tillando (e vesica dest.) librae tres ad quatuor abstrahentur, quamdiu aqua oleo graviora prodit, oleum separetur et destillatio cum nova quantitate seminis repetetur, donec desiderata quantitas obtenta fuerit*

GalP. Sinapis libras viginti, Aquae q. s.; — DB. ut oleum Rosarum,

Oleum Sinapis nigrae (Rc.) ex epidermide *Sinapis nigrae* Seminum.

Aqua Sinapis. (Würf.)

R. Seminum *Sinapis* partem unam.
Aquae . . . partes octo.
Macerata per horas 24 et destillentur.

Oleum Seminum Sinapis infusum. (B*.)

R. Pulveris *Sinapis* ab oleo expressionis ope liberatae . . . unciam.
Olei ess. Rorismarini unc. octo.
Post tres dies digestionis filtra. —
Zu Einreibungen auf gelähmte Theile.

Oleum Sinapis infusum, Tinctura Sinapis Anglorum. (HC†.)

R. Seminis *Sinapis nigrae* pulverati unciam.
Expressione frigida ab oleo pingui liberatam, cum
Olei Terebinthinae . . . uncis octo
digere per triduum et filtra.

Vinum Sinapis, Collutorium Sinapi. (Würf. Auf†)

R. Semin. *Sinapis* contus. semunciam.
Vini . . . libram.
Post sex horas macerationis decantha. (Würf.)

R. Seminum *Sinapis* . . . unciam.
Vini albi . . . libram.
Post sex horas infusionis cola et co-
laturae adde

Tincturae Cinnamomi uncias duas.
Misce. (Auf†)

Speichelflussförderung befördernd, auch innerlich bei Wassersuchten.

Serum Lactis sinapinum s. cum Sinapi. (Ful† Hass†. Li†. B*. Lus RC. E2. Gr. Sa. Sw)

R. Lactis vaccini . . . libras duas.
Semin. *Sinapis* contus. unc. duas.
Coque, donec coagulum in fundum vasis descendit et filtra. (Hass†. Li†. B*. Gr. Sa.)

Lus. *Sinapis* unciam, Lactis libras duas; — Ful†. *Sinapis* sesquiunciam, Lactis libras duas.

R. Lactis vaccini . . . libram.
Seminum *Sinapis* . . . unciam.
Tritura simul paulatim; adde deinde
Vini Rhenani . . . q. s.
Coque, ut in coagulum abeat et cola. (Sw)

RC. *Sinapis* unciam, Lactis libram, Aceti vel Vini Rhenani q. s.; — E2. Lactis et Seminum quantitatem ut antea ad separationem partis caseosae coquere et addere Vini albi uncias sex.

Reizend, bei Gliederreissen, Sicht und Lähmung, bei Fiebern und schwachem Magen empfohlen. — Gabe, ein oder zwei Pfund, die Nacht über zu verbrauchen.

Cerevisia diuretica. (Ca. Sa. Vm.)

R. Cerevis. Ale dict.
octar. quadraginta.

Seminum *Sinapis*,
Bacc. Juniperi, sing. semilibram.
Seminum Dauci . . . uncias sex.
Post plures dies infusionis cola. (Ca.)
Sa. *Sinapis*, Bacc. Juniperi, sing. unciam, Dauci drachmas tres, Absinthii duas et Cerevisiae octarios octo; —
Vm. Dauci partem unam, *Sinapis* duas, Bacc. Juniperi duas et Cerevisiae fortis sexaginta quatuor.

R. Radicis Armoraciae,
Semin. *Sinapis*, sing. . . unciam.
Baccarum Juniperi,
Subcarb. Potassae, sing.

drachm. sex.
Cerevisiae fortis . . . libras sex.
Macerata frigide per dies quatuor et cola.

Bei Blasenkatarrhen und Wassersuchten.

Cerevisia aperiens s. aperitiva. (Sa. Sw.)

R. *Sinapis nigrae* . . . unciam.
Aristolochiae longae drachmas sex.
Centaurii minoris drachmas duas.
Sabinae . . . drachmam.
Cerevisiae levis . . . octarios octo.
Post quatuor dies macerationis cola.

Cerevisia stimulans s. sinapisata anticholerica. (Sw.)

R. Radicis Valerianae . . . unciam.
Sinapis nigrae . . . drachmas sex.
Serpentariae Virg. . . drach. tres.
Foliorum Rorismarini semunciam.
Cerevisiae levis . . . libras octo.
Macerata frigide per dies duos et cola.

Mit Zucker vermischt Weinglasweise zu nehmen.

Gargarisma sialagogum. (Sp.)

R. Aquae Angelicae,
— Hyssopi, sing. . . uncias sex.
Spiritus Cochleariae semunciam.
— Salis Ammon.

scrup. quatuor.
Pulveris *Sinapis* . . . drachmam.
Mellis rosati . . . uncias quatuor.

Gargarisma adstringens. (Pie.)

R. Seminum *Sinapis* . . . drachmam.
Aceti rosati,
Sacchari albi, sing. . . unciam.
Aquae . . . uncias tres.

Collutorium excitans. (B*.)

R. Pulveris Sinapis se-quidrachmam.
Aceti unciam.
Aquaе fontanae uncias quatuor.

Potio sinapina (Mustard Draught.) (F2.)

R. Pulveris Sinapis . . . drachmam.
Aquaе tepidae . . . semioctarium.
Misce. — Auf ein Mal zu nehmen.

Balneum vel Pediluvium vel Manuluvium sinapinum, irritans. (LH. Va. Hosp. Paris.)

R. Pulveris Sinapis . . . uncias tres.
Aquaе ferventis q. s.
ut fiat pedi-vel manuluvium.

Va. Farinae Sinapis uncias quatuor,
Aquaе tepidae q. s. — Durch lauwarmes Wasser wird die Wirkung anhaltender.

Whitehead's Essence of Mustard (Gr. Par. Re.) constat sec. Brande e Camph., Ol. Tereb. et Spir. Rosin mixta cum Pulv. Sinapis. — *Whitehead's Essence of Mustard Pills* (Par.) e Bals. Tolut et Re-ina absque Sinapi (?)

Fomentatio sinapisata s. sinapina. (Va. Char.)

R. Farinae Sinapis uncias quatuor.
Aquaе fervidae libram.

Statt der Sinapismen, um anhaltender zu wirken.

Unguentum ad perniones. (Va)

R. Amygd. amar. mund.

uncias quatuor.
Mellis uncias tres.
Camphorae in Alcoh. pauxillo col.,
Farinae Sinapis, sing. drach. duas.
Aluminis calcin.,
Olibani pulv., sing. . . drachmam.
Vitellus Ovorum no. 2.

Misce fiat pasta. — Morgens und Abends die Frostbeule sanft damit einzureiben, nach einigen Augenblicken sie mit lauwarmem Wasser abzuwaschen und sie dann gut zu bedecken.

Sison.

Sison Amomum, L.; Deutsches Amomum; Amome faux (Gal.); Field honewort (Ang.); Wssekko korenj (R.).

Wirt. Würf. Gal. Gr. Re. Sp. Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 442.)

Man wendet den Saamen (semen Sisonis Amomi s. Amomi vulgaris) an; er ist klein, grau, gefielt, süß, von gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Reizend, für harntreibend gehalten.

Sison segetum (Gr.) gegen schmerzlose Geschwülste.

Sisymbrium.

Sisymbrium Sophia, L.; Sophienkraut; Sage-se des chirurgiens (Gal.); Flixweed Sisymbrium (Ang.); Barbierforstand (D.); Talictro (His); Fiekruid (Bel.); Talitro (I.); Herva Sophiae (Lus); Stiltfräe (Succ.).

Wirt. M† Gal. Be. Gr. Sp.

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn Icon. pl. t. 383.) Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Sophiae chirurgorum) besteht aus einem runden, ästigen, etwas behaarten Stängel mit abwechselnden, in kleine Köppchen zerfallenden glatten Blättern. — Der Saame ist sehr klein, eiförmig, glatt und rötlichbraun. Er hat ebenso, wie das Kraut, einen scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut, eben so auch *Sis. amphibium*, *Raphanus aquaticus* (Gr.)

Sium.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Sium angustifolium, L.*; schmalblättriger Merf; Berle à feuilles étroites (Gal.); Narrowleaved Water Parsnip (Ang.); Bernera de hoja angusta (His); Smalbladiges wate reppe (Bel.). Gal.

2) (Pentandria Monogynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Jacq. Fl. Austr. t. 67.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit eingeschnittenen, am Grunde fast gedrückten Blättern. Es hat einen bituminösen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, harntreibend.

2) *Sium latifolium, L.*; breitblättriger Merf; Berle à larges feuilles (Gal.). Gal. Gr.

3) Eine Europäische Pflanze. (Moris. Hist. 11. 9. t. 5. f. 1)

Das Kraut (herba Pastinacae aquaticae), welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit gestreckten, auslanztigen, sägezahnigen Blättern bestehenden Blättern.

Diese Pflanze wird fast stets statt der vorigen angewendet.

3) *Sium nodiflorum*, L.; Knotenblumiger Merk, kleiner Eppich; Berle nodiflore (Gal.); Creeping Water Parsnip (Ang.)

Du. C. Gr. Re.

4) Eine Europäische Pflanze. (Moris. Hist. II. 9. t. 5. f. 3.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem hohlen Stängel mit einfach gesiederten Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gezähnt sind.

Harntreibend. — Nach Morison ist der ausgepresste Saft in verschiedenen Hautkrankheiten nützlich. Withering gab davon Erwachsenen Morgens drei oder vier Unzen, und jungen Personen drei Löffel täglich zwei Mal.

4) *Sium Sisarum*, L., *Sisarum*; Zuckermerk; Berle Chervi (Gal.); *Sisara*, *Chirivia de quaresma* (His.)

Hiss. Gr.

4) Eine Pflanze, welche in China zu Hause seyn soll. (Schk. t. 69. Moris. Hist. II. 9. t. 4. f. 8.)

Die Wurzel besteht aus mehreren länglichen, gerunzelten, in ein Bündel vereinigten Knollen. — Der Saame ist eiförmig, glatt und gestreift.

Diese Pflanze soll gegen Mercurialkrankheit von Nutzen seyn.

5) *Sium Ninsi*, L.; Ninsing, Ninsingmerk; Ninsi (Gal.); Ninsiwortel (Bel.); Brt. Wort. Mt. Gal. LP. Taur. G. Gr. Re. v.

4) Eine auf den Gebirgen China's wachsende Pflanze. (Burm. Fl. Ind. t. 29. f. 1. Duss. off. Pl. VII. t. 9.)

Man wendet die Wurzel (*radix Ninsi* s. *Ninsing* s. *Ninsini*) an; sie ist spindeelförmig, geringelt, weißlich, hornartig und halbdurchsichtig, oder gelblichbraun, oder undurchsichtig, je nachdem sie entweder in kochendem Wasser gebleicht und der Oberhaut beraubt ist oder nicht. Die Dicke ist verschieden, wie eine Schreibfeder oder kleinen Fingers dick. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher etwas bitteren Geschmack.

Die Chinesen schreiben dieser Wurzel fast wunderähnliche Kräfte zu; jedoch sind sie sehr beschränkt, und sie würde daher mehr unter die Küchengewächse zu verweisen seyn; übrigens kommt sie auch selten vor.

Sium berula (Gr.) Blätter eröffnend, harntreibend, gegen Scorbut.

Sodium.

Von diesem, an sich selbst in der Medicin ungebrauchlichen, Metalle wendet man folgende Zusammensetzungen an:

Protoxydum Sodii, *Soda caustica* s. *pura*; caustische, reine Soda.

§. I. Im flüssigen Zustande.

Lixivium causticum s. *causticum minerale* s. *Sodae* s. *Sodae purae* s. *saponariorum*, *Soda caustica fluida* s. *liquida*, *Liquor Sodae concentratus*, *Liquor Natri caustici* s. *puri*, *Liquor s. solutio Hydratis natri*, *Oxydum Sodicum aqua solutum*; Seifeniederlange; Lessive des savonniers (Gal.).

Bor5f. HCf. HNf. Sax2f. Fer. GalH. GalM. GalP. Lus. DB. Fi. Gr. Re. Sw. Vm.

R. Subcarbonatis Sodae partes duas. Calcis vivae . . . partem unam.

Coque cum Aquae q. s., cola lixivium et consume, donec vas octo drachmas aquae communis continens drachmas undecim contineat et refrigeratum 36° Ar. indicet.

Bor5f. ut liquorem kali caust. parari; — Fi. Subcarbonatis partes tres, Calcis duas, caeterum ut potassam causticam; — HCf. HNf. Natri carbon. cryst. partes quonque, Calcariae ustae tres, ut kali caust. paratur; p. sp. 1,32 (HCf.); — Sax2f. Salis et Calcis ut HCf. Aq. font. fervidae partes triginta, p. sp. 1,33—1,34; — GalP. Natri partes viginti, Calcis vivae octo, Aquae centum viginti coquere per semihoram in olla ferrea, semper agitando, caeterum ut Potassam causticam; — DB. Sodae partes decem, Calcis duas cum dimidia, Aquae quadraginta octo.

§. II. Im festen Zustande.

An. Fer. Br. Fi. Vm.

R. Lixivii Sodae caust. . . . q. v

Evaporet in tantum, donec olei instar fiat et gatta una, corpori frigido infusa concreseat; infunde deinde supra laminam marmoream vel in fusorium. Die caustische Soda kann ebenso benutzt werden, wie die Potasche.

Sapo Ceræ s. *cereus*. (Vm.)

R. Ceræ flavae . . . partes tres. Liqua et adde

Sodae caust. liq. . . partes duas.

Prope ignem relinque, agitare continuando, donec massa in aqua absque decompositione dissolubilis fiat.

Protoxysulphuretum Sodii, *Deutoxysulphuretum Sodii*, *Sulphuretum Protoxydi Sodii*, *Sulphuretum* s. *Hydrosulphas Sodae*, *Natrium sulphuratum*. (AD. Am. Fer. GalP. Br. C. DB. Fi. Sw. T. Va. Vm.)

R. Florum Sulphuris,
Subcarb. Sodae, sing. . part. aeq.
Liquata simul super igne gradatim
aucto supra tabulam marmoream ef-
funde et post refrigerationem in fru-
stula minora diffrange. (Am. Fer. Br.
C. Fi.)

AD. Sw. Sulphuris partem unam et
duas Alkali mineralis; — **DB.** Sulphu-
ris partes sexaginta quatuor, Sodae
quingenta quatuor.

R. Sulphuris in baculis partes tres.
Sodae caust.

part. septem c. dimidia.
Mixta liqua in retorta balneo arenae
imposita. (Vm.)

T. Florum Sulphuris partes duas,
Sodae caust. vel Carbonatis Sodae par-
tes quatuor, caeter. ut sulphuret. po-
tassae.

Ban Mons nennt dieses *Sulphuretum
simplex Sodae*. Die Formel zu seinem
Sulphuretum Sodae ist folgende:

R. Sulphuris in baculis
partes tres cum quadrante
Sodae caust. fusae part. quatuor.

Liqua in retorta vitrea balneo are-
nae gradatim calefaciendo imposita.

GalP. Sodae causticae q. v. dissol-
vere in aquae s. q., ut solutio indicet
25° areometri, immittere in eam tor-
rentem gasis hydrosulphurati usque ad
saturationem et servare crystallos co-
lore non tinctas et transparentes sepo-
sitas in lagenis exacte obturatis.

Die Eigenschaften des schwefligsauren
Natrons oder der natrischen Schwefelleber
sind dieselben, als die der kalischen. „Der
Practiker, sagen Idt und Chevallier,
sollte dieses Mittel immer der kalischen
Schwefelleber vorziehen, da das kohlensaure
Natron hinsichtlich seiner Reinheit nur we-
nig Veränderung zeigt und man daher sicher
ist, immer ein in seiner Zusammensetzung
sich gleichbleibendes Präparat zu erhalten,
da hingegen die kalische Schwefelleber we-
gen der verschiedenen Reinheit des käufli-
chen Kali's von zwölf bis fünf und zwanzig
Procent Verschiedenheiten unterworfen
ist.“ Man wendet es aber desungeachtet
nur sehr wenig an, vorzüglich zur Berei-
tung einiger Schwefelmineralwasser.

Aqua cum Sulphureto sodico. (GalP.)

R. Sulphureti sodici,
Carbonatis sodici,
Chlorureti sodici, sing.
grana dua cum dimidio,
Aquae aëre orbata uncias viginti.
Solve et serva in lagenis bene obtu-
ratis.

Dieses Wasser ersetzt die meisten Schwefel-
wasser, vorzüglich die der Pyrenäen, und

wird desshalb unter verschiedenen Namen
angeführt, als *Aqua Baretginensis*, *Ca-
teriensis*, *Convenarum*, *Bonnensis* und
Sancti Salvatoris, Mineralwasser von Ba-
règes, Caunteretz, Bagnères de Luchon,
Bonnes und St. Sauveur.

Aqua antipsorica. (Vm.)

R. Sulphureti Sodae . drachmam.
Salis Ammoniaci
scrup. duos c. dimid.

Dissolve sales singulos seorsim in
Aquae uncias sex, filtra et solutiones
commisce.

Lotio ad s. contra tineam. (Bo. Ca.)

R. Sulphureti Sodae . uncias tres.
Saponis medic. sesquidrachmam.
Aquae Calcis

unc septem c. dimidia.
Alcoholis . . . drachmas duas.

Man schlägt alle zwei Tage ein mit die-
ser Flüssigkeit getränktes leinenes Tuch um
den Kopf.

Sapo sulphuratus Sodae. (Vm.)

R. Saponis Medullae partem unam.
Sulphureti Sodae . . partes duas.
Alcoholis . . . partes sex.
Dissolve et solutionem cola.

Unguentum antipsoricum. (Sw.)

R. Sulphureti Sodae drachmas tres.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Misce triturando.

Linimentum sulphuro-saponaceum. (Vm.)

R. Olei Amygdalarum dulcium,
Sulphuris pulv., sing.
part. unam c. dimidia.
Sulphureti Sodae pulv.
partes quatuor cum dimidia.
Axungiae Porci part. sex c. dimid.
Contere pulveres cum axungia et ad-
de sensim oleum — In Einreibungen
gegen Krätze.

*Natrum sulphurato-hydrothionicum
stibiutum. Natrium sulphurato-stibiutum*
Duflos, spießglanzhaltiges Schwefelnatrium.
(Sax2†)

R. Natri sulphurici dilapsi
uncias sex.
Fuliginis unciam.

Liquefiant calore idoneo in cruci-
bulo capaci, donec non amplius spu-
mando turgeant, massa in mortario
ferreo, pulverata in Aq. dest. secuplo
solvatur, solutio per horam $\frac{1}{2}$ coquatur
Sulphuris sublim. loti drachmis septem,
Antim. crudi puri drachmis quatuor c.
dimidia, liquor filtratus ad crystalli-

sandum seponatur, crystalli abluantur et siccentur.

Dient zur Bereitung des Goldschwefels und muß deshalb immer frisch bereitet werden.

Protoxychloruretum Sodii, Chloruretum Protoxydi Sodii, Chloruretum Sodae, Aqua „Eau de javelle“ dicta, Liquor Labarraquii, Hypochloris sodicus aqua solutus, Sodae Chloridum. (AD. GalF. GalH. GalP. DB. Ma.)

R. Subcarbonat. Sodae libr. quinque. Aquae destillatae . libras viginti.

Infunde liquorem, 12° R. indicantem in lagenam, cujus tres quadrantes ab illo solum implentur et torrentem Chlori e mixtura Salis marini libra una, Acidi sulphurici sesquilibra et Aquae tribus librae quadrantibus extricati immitte.

GalP. Chlorureti Calcis partem unam solvere in Aquae partibus triginta, et Carbonatis Sodae crystall. in Aquae partibus quindecim, miscere ambos liquores, filtrare et servare in lagenis bene obturandis.

Die Chlorüre ist stark genug, wenn sie achtzehn Theile schwefelsauren Indigo entfärbt.

Man wendet sie, mit zehn bis fünfzehn Theilen Wasser verdünnt, zum Verbinden bei Hospitalbrand, ausgearteten venösen Geschwüren, brandigen Wunden, welche sie sanell zum Vernarben bringt und bei Krebsgeschwüren an, wo sie den Gestank beseitigt und zu gleicher Zeit die Schmerzen lindert. Alibert benutzte sie mit Vortheil zum Waschen fressender Flechten. Man hat eine tinea favosa damit geheilt; auch ist sie mit Erfolg bei häutiger Bräune in Gurgelwasser gebraucht worden. Außerdem ist sie auch innerlich zu 25 oder 30 Tropfen in einer Pinte Tisane gegeben worden.

Chloruretum s. Chloridum Sodii s. sodicum, Quadrichloruretum Sodii (F.), Chloruretum Natrii, Murias Sodae s. natricus, Murias Sodae fossilis, Hydrochloras Protoxydi Sodii, Protohydrochloras Sodii, Sal commune s. culinare s. culinaris, Sal Gemmae vel marinum s. marinus s. niger s. fossilis, Hydrochloras natricus, Hydrochlorinas natricus, Muria, Natrium muriaticum s. muriaticum crudum, Sal commune s. commune, Soda muriatica (H.); Küchensalz, Rochsalz, Stein-salz, Seesalz, salzsaures Natron; Chlorure de sodium, Quadrichlorure de sodium, Muriate de soude, Hydrochlorate de protoxyde de sodium, Protohydrochlorate de sodium, Hydrochlor-

rate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle, Sel gemme ou marin, Soude muriatée (Gal.); Salt (Ang. D. Succ.); Melh (Ar.); Uyah (Kali); Yen (C.); Luna (Cy.); Nimmuk (Duk.); Sal (His Lus. Pol.); Lun (Hin); Zout (Bel.); Sale (J.); Mit (Mah.); Garam (Ma.); Hemuck (Pe.); Lavana (Sa.); Uppa (Tam.); Lavanum (Tel.).

A†. Ba†. PorC† Por5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. Hass†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wür†. WW†. AD. Am Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His3. LonN. LPC. Lus. Pol. R. RC Suec. R. Taur. A. CG. DE. Fi. G. Par. Pid. Re. Sp. T. Va

His3. ex Acidi muriatici libra una, Aquae communis libris octo instillata, additis Carbonatis Sodae libris duabus vel q. s. ad perfectam saturationem praeparare jubet.

Der häusliche Gebrauch des Rochsalzes ist zu häufig und so allgemein bekannt, daß es nicht nöthig ist, hier darüber Näheres anzugeben. In der Medicin benutzt man es nur wenig. Doch legt man es oft zu Fußbädern, um diese reizender zu machen. Zuweilen hat man es auch innerlich bei Krankheiten, welche man von Schwäche herleitete, so wie äußerlich in verschiedenen Hautkrankheiten, besonders Kopfgrind und Krätze angewendet. Man rühmt es bei Blutspeien, einen Theeleffel bis zwei Eßlöffel voll.

Murias Sodae purificatus s. purus, Natrium muriaticum depuratum, Natrium chloratum, Sal commune depuratum. (HassP†. HC†. An. Bel. Gal. GalP. His3.)

Sal commune in Aq. communis triplo solvitur et liquori fervido instillatur Sal Sodae (Natrium carbon.) depuratae in Aqua solutum, donec non amplius turbetur; sedimento sponteposito, liquorem per chartam bibulam filtra et crystallisationi subijce.

His3. ut Sulphatem Aluminæ purificare.

Murias Sodae exsiccatus s. siccatus, Sal communis decrepitatus. (Du. Ed. His3. C. Gr. Re.)

Sal commune uritur supra ignem in vase ferreo vel vitreo (patina fictili non vitreata His3.) leviter tecto, donec decrepitare cessaverit.

Liquor Natri muriatici s. Salis communis. (Bor4†. HassP†. HC†. HN†.)

R. Acidi Salis q. libet. Saturatur cum

Liquore Salis Sodae puri-simi.

Pharmacopoea universalis, II. Bb. 3. Aufl.

Fluidum filtratum crystallisationi subijciatur; crystallorum pars una in Aquae destill. partibus octo solvatur.

HC† Natri muriatici depurati partem unam, Aquae destillatae partes novem solvere et filtrare; — HN†. Aquae destill. q. s.

Reagens.

Sacculus resolvens. (Sm.)

R. Salis culinaris,
— Gemmae, sing. . . unciam.
— Ammoniaci drach. quatuor.
Misce

Pulvis vermifugus. (E2.)

R. Salis culinaris . . drachmas tres.
Coccionellae . . grana quindecim.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle Morgen. — Ben Ruff empfohlen.

Clyisma s. Clyster ad ascarides, Enema vermifugum. (Sw.)

R. Vini rubri uncias sex.
Salis culinaris q. s.
vel quantum vinum dissolvere potest.

Clyisma s. Clyster s. Enema cum Oleo, Sali etc. s. commune s. purgans s. salinum. (LoP. B. h2. Ra. Va.)

R. Salis culinaris unciam.
Tisanæ emollient. (Lini)
libras duas.

Dissolve. (Ra. Va.)

R. Decocti Hordei uncias quatuor.
Salis culinaris semunciam.
Olei Olivarum uncias quatuor.
Misce. (B.)

R. Decocti Avenae fluiduncias octo.
Sodae Muriatis unciam.
Olei Lini fluiduncias duas.
F. enema. (LoP.)

R. Salis culinaris semunciam.
Olei Ricini,
Syrupi Sacchari, sing. uncias duas.
Dec. Semin. Lini octarium.

Misce. — Die Hälfte, und wenn die nicht wirkt, in einer halben oder ganzen Stunde die andere. (E2.)

Clyster stimulans pro equis (Gr.): Salis communis uncias octo, Olei Lini quatuor, Aquae octarios octo, vel decem, misce. (Veterin.) *Clyster purgans pro equis:* Salis uncias 4 ad 8, Aq. calidae octar. 8 vel 12 dissolve; *pro vacuis:* Salis libram, Aquae octarios 10 vel 12, zur Unterstützung der Expectorante.

Solutio Sodae Muriatis (Re.): Muriatis Sodae drachmam, Aquae destill. q. s. ut modo solvatur. — Bestes Erweichungsmittel des Ohrenschmalzes. (Haygarth.)

Clyisma s. Clyster s. Enema antispasmodico-resolvens s. antispasmodicum. (B.)

R. Salis culinaris drachmas quatuor.
Olei Lini uncias quatuor.
Infusi Chamomillae uncias tres.

Pediluvium salinum s. cum Sale communi. (Va.)

R. Salis communis manipulum.
Aquae fervidae q. s.

Balneum salinum et gelatinosum. (Va.)

R. Salis marini libram.
Aquae suffic. calefact.
libras ducentas.

Adde

Collae Flamant. (in Aq. bull. q. s. sol.) libras duas.

Mi ce. — Bei Strophelkrankheit sehr nützlich

Solutio s. Mixtura citro-muriatica s. excitans. (Bo. Ca. Pie. Sw.)

R. Succu Citri q. v.
Salis culinaris q. s.
vel quantum succus dissolvere potest.
— Broussonet empfiehlt diese Mixtur bei sogenannten adynamischen Fiebern. — Gabe, stündlich 1 Eßlöffel.

Cataplasma Salis communis. (E2.)

R. Pulveris Lini,
Micae Panis, sing. partes aequales.
Aquae, Soda muriatica saturatae
q. s.

ut f. catapl. — Bei unschmerzhaften, tropfartigen Anschwellungen und Verdickungen der Gelenke. Entsteht Reizung und Entzündung, so wird der gemeine Brod- und Milchausschlag aufgelegt und, sobald der Zustand der Haut es erlaubt, das Salzcataplasma.

Unguentum Salis marini. (Sm.)

R. Salis culinaris sesquunciam.
Cerati Galeni uncias tres.
Unguenti rosati unciam.
Morgens und Abends in die von tinea befallenen Stellen einzurieben.

Linimentum ad strumam. (RC.)

R. Fellis Tauri recentis unciam.
Muriatis Sodae semunciam.
Aquae tepidae unciam.

Solutioni adde

Olei Olivarum semunciam vel q. s.
Aqua marina s. marina artificialis s. maris arte paranda s. marina arte facta. (Auf. B. Gen. Pm. RC. Br. Fi. Gr. Sw.)

R. Salis culinaris semunciam.
— cathartici amari,

Syr. Rhamni cathart., sing.

drachmam.

Aquae libras duas.

Misce (Gen.)

R. Salis culinaris . . uncias decem.

Muriat. Magnesiae drach. decem.

— Calcis uncias duas.

Sulphatis Sodae,

— Magnesiae, sing. drach. sex.

Aquae libr. quinquaginta (congiis

quinque Gr.)

Dissolve. (R*. RC. Gr. Sio.)

Br. eandem formulam sed absque murate calcis; — Pm. Fi. Aquae libras quinquaginta, Salis marini uncias novem, Muriatis Magnesiae unam, Muriatis Calcis drachmas quatuordecim, Sulphatis Sodae, Sulphatis Magnesiae, sing. sex; — Aut. Aquae octarios duos, Salis comm. grana viginti quatuor, Sulphatis Magnesiae quatuor, Sulphatis Calcis, Carbonatis Magnesiae, sing. quindecim et torrentem Gasis acidi carbonici in liquorem immittere.

Dieses Wasser ist als ein vortreffliches auflösendes und schmelzendes Mittel empfohlen worden.

Aqua Selterana, (GalP. Suec. Rc.)

R. Salis culinaris . . grana centum.

Subcarb. Sodae gr. viginti quatuor.

— Magnesiae gr. viginti novem.

— Calcis gr. septemdecim.

Aquae uncias octoginta duas.

Satura cum Acido carbonico.

Rc. sec. Gal. Aquae c. Gase acido carb. satur. uncias viginti et dimid., Subcarb. Sodae grana quatuor, Subcarb. Magnes. duo, Muriatis Sodae viginti.

R. Chlorureti Calcis . . grana sex.

— Magnesiae grana quinque.

— Sodae scrupulum.

Carbonatis Sodae grana sedecim.

Phosphatis Sodae granum cum parte

tertia.

Sulphatis Sodae granum.

Aquae purae uncias viginti.

Acidi carbonici volumina quinque.

Misce. (GalP.)

Aqua mineralis acidula. (RC.)

Aquae purae libras quinquaginta, Carbonatis Calcis drachmas duas, Subcarbonatis Magnesiae unciam, Subcarbonatis Sodae drachmas sex, Muriatis Sodae sesquiunciam trajice per solutionem Gasis acidi carbonici pollices cubicos 909 ad 1000.

Aqua Pyramontana. (Suec.)

R. Salis culinaris . . semiscrupulum.

Sulphatis Magnesiae

grana triginta quinque.

Sulphatis Calcis grana triginta sex.

Subcarb. Calcis . . gr. quindecim.

Limaturae Ferri unciam.

Aquae uncias octoginta duas.

Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis sulphurata. (RC.)

R. Aquae purae libras quadraginta.

Carbon. Calcis . . drach. quinque.

Subcarb. Sodae . . drach. decem.

Muriatis Sodae drachmas septem.

Salis acidi carbonici,

— hydrogen. sulphurat., singulorum poll. cub. 900 ad 1000.

Aqua Selterana alia. (Gal. Vin.)

R. Salis culinaris grana viginti duo.

Subcarbonatis Sodae grana quatuor.

— Magnesiae . . grana decem.

Aquae quintuplo voluminae Acidi

carb. satur. unc. viginti c. dimid.

Dissolve. (Gal.)

R. Aquae libras tres.

Infunde in lagenam, in cujus fun-

dum, tubi ope intromitte

Acidi hydrochlor. fum.

gr. septuaginta.

Adde deinde, alterum post alterum

Subcarb. Calcis grana sex.

— Magnesiae gr. decem.

Carbonatis neutri Sodae

grana quinquaginta quatuor.

Lagenam bene claudere. (Vin.)

Aqua Bellilucana (Balaruc). (Gal.)

R. Salis culinaris sesquidrachmam.

Muriat. Calcis grana octodecim.

— Magnesiae

gr. quinquaginta sex.

Subcarb. Magnesiae . . granum.

Aquae duplum volumen Gasis acidi

carb. contin. unc. viginti duas.

Aqua Borvonensis s. Borbonensis Bourbonne les Bains). (Gal. GalP.)

R. Salis culinaris . . drachmas duas.

Muriatis Calcis . . grana decem.

Aquae dupl. volumen Gasis acidi

carb. cont. unc. viginti c. dim.

R. Bromureti Potassii

grani duas trientes.

Chlorureti Sodii

grana quinquaginta quatuor.

— Calcis grana triginta octo.

Sulphatis Sodii grana viginti tria.

Bicarbonatis Sodii . . grana sex.

Aquae purae uncias viginti.

Acidi carbonici volumina quinque.

Misce. (GalP.)

Oxymurias s. Chloras Sodae, Chlorum s. Chloretum Natrii, Natrum chloratum s. chloricum s. chloricum, s. muriaticum oxygenatum s. hyper-

oxygenatum; oxydirt salzsaures Natron, Chlornatron. (HC⁺. Dulk. Re.)
 Paratur, transmittendo torrentem Gas Chlori per Solutionem Muriatis Sodae.

HC⁺. Acidi tart. uncias quinque solvere in Aq. dest. fervid. libris duabus et addere Natri carb. depuratae uncias quatuor cum drachmis quinque et dimidia, tunc solvere Kali chlorici uncias quatuor cum granis quindecim in Aquae destillat. fervidae uncias sexdecim, solutiones adhuc fervidas, invicem commixtas loco frigido seponere, liquorem, praecipitato filtratione separato ad cuticulam vaporare et l. a. in crystallos redigere.

Liquor Natri chlorati s. chlorosi s. oxy-muriatici s. chlorici s. Sodae oxy-muriaticae s. chlorinatae, Subchloruretum Sodae liquidum, Natrum chloratum liquidum, Liquor Labarraque's, (Liquor de Labarraque.) (HassP⁺. HC⁺. HN⁺.)

R^x. Natri carbonici depurati uncias quindecim

Aquae destillatae uncias triginta quinque.

Solutio in apparatu Woulfiano cum Gase Chlori (elicitio leni calore ex Acidi muriatici uncias sex, Mangani uncias duabus).

Liquor loco obscuriori servetur.

HN⁺. Natri libram, Aquae dest. quatuor, Gas Chlori (e Mangani, Natri muriat., sing. uncias duabus, Acidi sulph. tribus, dilutis Aquae font. sesquiuncia); — HassP⁺. Salis Sodae dep. partem unam, Aq. dest. tres, saturantur Acido Salis dephlogist. et liquor obtentus Aquae dest. ea quantitate diluatur, ut sit ponderis spec. 1,0429=70° Ar. Bk. et in vitris pluribus, unciam circiter quatuor capacibus etc. servetur; — LPC. Sodae carbon. libram liqua in Aquae octariis duobus, tum Sodii Chloridi uncias quatuor et Mangani binovdi uncias tres in pulverem contriti in retortam immitte; iisque adice Acidi sulphurici uncias quatuor Aquae uncias tribus prius mixti et frigosacti; calefac et Chlorinium primum per Aquae uncias quinque, de inde per Sodae Carbonatis liquorem supra praescriptum trans mitte.

Subprotocarbonas Sodii, Subcarbonas Protoxydi s. Deutoxydi Sodii, Subdeutocarbonas Sodii impurum, Subcarbonas Sodae, Soda, So-la cretacea, s. impura aë-rata s. effervescens, Mephitis Sodae, Creta Sodae, Sal alcali mineralis, Sal Sodae, Alkali minerale fixum, Natron, Natrum, Alkali minerale, Carbonas So-

dae, Carbonas Sodae impurus, Subcarbonas Sodae impurus s. impura, Hypercarbonas Sodae, Natrum carbonicum s. subcarbonicum crudum, Subcarbonas natricum Carbonas Sodae alcalinus s. incompletus, Hypocarbonas Sodae; kohlensaures Natron oder Natrum, Soda, mineralisches Laugensalz; Sousprotocarbonate de sodium, Souscarbonate de protoxide de sodium, Souscarbonate de soude, Soude crayeuse, aëree ou effervescente, Méphite de Soude, Craie de soude, Alkali fixe minéral (Gal.).

1) Wie man es im Handel findet.

Soda, Soda impura, Barilla, Carbonas natr. cum s. natricus s. solicus s. Sodae impurum s. communis s. venale, Carbonas natricus cum Aqua crudus, Sal Alkali, Sal Sodae s. Sodae crudum, Alkali minerale crudum, Natrum carbonicum crudum s. emitium, Subcarbonas Sodae impurus; rohes, kohlensaures Natron oder Mineralalkali, rohes Sodasalz, rohes mineralisches Laugensalz, Soda, Barille; Soude, Barille (Gal.).

A⁺. Ba⁺. Bor⁺. Br⁺. Ful⁺. Ha⁺. HassP⁺. HC⁺. HN⁺. Li⁺. O⁺. Sax⁺. Wir⁺. Wür⁺. WW⁺. M⁺. AD. Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Galv. GalP. Gen. Hi. S. LonN. LPC. Pm. Pol. Suec. Taur. Be. C. CG. Dr. Fl. G. Gr. Par. Pd. Re. Sp. T.

Man unterscheidet im Handel vier Arten Soda.

A. Natürliche Soda in seinen Naseln oder pulverartigen schneigen Efflorescenzen. Sie ist in Aegypten, in der Wüste von Thoiat, westlich vom Delta und in den Ebenen Derungarn's sehr häufig. (Rochetta Alexandrina.)

B. Die durch Einsäuerung einer großen Anzahl von Seepflanzen, besonders solcher zu der Familie der Atripliceen und der Lauge gehöriger, wie von Sal-ola, Chenopodium, Atriplex, Fucus, gewonnene. Sie ist in dicken, festen, halbgelblichen, feinharten bläulichgrauen Massen von salzigem und laugenartigem Geschmack. Sie enthält kohlensäuerliche Soda in sehr verschiedener Menge, schwefelsaure Soda, Seesalz, kohlensauren Kalk, Alaun, Kiesel-erde und Eisen bisweilen auch schwefelsaures Kali, salzsaures und selbst Jodkali. Hierher Soda Alicantina s. Alonensis.

C. Die durch Zerlegung des Seesalzes mittelst Bleiglätte gewonnene.

D. Die, welche man durch Calcination des schwefelsauren Natrums mit Kohle und Kreide erhält. Sie besteht aus caustischem Natron, kohlensaurem Kalk, Schwefelkalk mit Ueberschuß der Base und Kohle.

2) Reinigung des käuflichen. Sodae Subcarbonas, Sal Sodae, Natrum

carbonicum depuratum s. subcarbonicum, Soda depurata s. Sal Sodae depuratus, Alkali s. Sal Alkali minerale depuratum, Carbonas natrius cum Aqua dep. s. sodicus cum Aqua s. natrius hyalricus dep.

R. Natri venalis . . . quantum vis.

Grossiuscule pulveratum dissolve in Aqua, lixivium vaporando in tantum consume, donec 28 vel 30° Ar. indicet et crystallisationi subijce (solutio filtratur et l. a. in crystallos redigatur (Bor5†.) ad cuticulam et sub agitatione continua in crystallos cogatur, Aqua dest. abludas (Sax2†.); — GalP. Natri partem unam, Aquae fervidae partes quinque.

Das Verfahren ist in allen Pharmacopoen fast gleich

Ri. T. praeterea: Muriatis Sodae libras quinque, Salis Tartari libras tres cum dimidia Aquae comm. q s., solve, filtra, crystallisationi subijce, sales adhuc humidos commixtos lento calori expone, quo facto carbonas sodae liquatur, murias potassae vero intactus erit; liquido decanthato, muriatem abluad separandum omnem carbonatem et totum fluidum ad siccum consume; — HC†. Natri carb. erudi libras duas solvere in Aq. dest. fervid. unciis octo, aqua frigida refrigerare, massam crystallinam pulverulentam secerne, per infundibulum gossypio in fundo munitum colare, crystallos per vices aqua dest. abludere et siccare — LPC. Sodae carbon. impurae libras duas coquere cum Aquae destillat. octaviis quatuor, calidam colare et seponere, ut fiant crystallos.

LH. Gr. Parationem e Sale Glauberi et Creta, sing. part. aeq. et Pulvere Carbonum parte tertia praescribit, praeterea vero e lixiviatione sodarum factitiarum; — Gr. miscere Solutionem Salis Glauberi cum Solutione Calcis in Acido pyrolignoso puro, coque e aliquanto, filtrare, ad siccum vaporare, acetatem obtentum calcinare, denuo in Aqua solvere et crystallisationi subijcere.

Das kohlensaure Natron wird bei Scropheln, sogenannten passiven Wassersüchten, Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Harngrües und Harnsteinen mit harnsaurer Basis angewendet. — Gabe, von zehn bis zwanzig Gran.

Sodae Subcarbonas exsiccata, Natrum carbonicum siccum s. dilapsum s. calcinatum s. depuratum siccum, Soda calcinata, Carbo as sodae siccum s. natrius depuratus, Sal Sodae depuratum

siccum, Soda dilapsa, Sal Alkali minerale dilapsum, Carbonas natrius anhydrous. (Bor5†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. AD. Du. LonN. LPC. CG. Gr. Re.

Sal Sodae depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori (aëri sicciori loco temperato Sax2†.) exponere, donec in pulverem siccum fatiscat etc. (Vergl. vorher das Verfahren von Fi.)

Sal Sodae purissimum (HassP†.): Terra foliata Tartari cryst. in Aquae dest. copia solvitur, solutio Liquoris Baryt. acet. et Arg. nitr. dilutionis ope depurata et filtrata ad siccum inspissatur et residuum in crucibulo platineo comburitur, carbo residuus cum Aqua dest. elutriatur et lixivium vaporando et refrigerando in crystallos cogitur, quae siccatae servantur. — Reagens.

Pulvis Subcarbonatis Sodae s. diureticus. (E2.)

R. Subcarbonatis Sodae semisrupulum.

In einer Flasche Selterswasser täglich drei oder vier Mal zu nehmen.

Pulvis Uvae Ursi et Sodae. (E2.)

R. Pulv. Uvae Ursi sesquidrachmam. Sodae Subcarbonatis drachmam. Misce et divide in chartulas XII. — Drei Mal täglich ein Stück in Zuckerwasser, bei Stein- und andern Blasenkrankheiten.

Pulvis Sodae compositus. (LoP.)

R. Sodae Subcarbonatis exsicc. pulv. unciam.

Pulveris Rhei . . . semunciam.

— Zingiberis . . . scrupulum.

M. f. pulvis.

Aqua Sodae Carbonatis. Liquor Natri carbonici s. Natri carbonici depurati. (Bor5. HC†. HN†. AD. Du.)

R. Natri carbonici depurati partem unam.

Aquae destillatae partes quatuor (HC†.)

HN†. Aquae destill. sufficientem quantitatem; — Bor5. parationem non indicat. — Reagens

AD. Du. Natri carbonici unciam, Aquae destillatae octarium.

Liquor Salis Sodae purissimi (HassP†): Salis drach. tres, Aquae dest. unciam unam. Reagens.

Natrum Succo Citri neutralisatum ut citras kalicus parari potest.

Boli stomachici. (Sw*. Va.)

℞. Subcarb. Sodae semiscrupulum.
Pulveris arom. scrupulos quatuor.
Syrupi Chinae q. s.
ut fiant boli tres

Ein Stück täglich drei Mal.

Pilulae subcarbonatis Sodae s. Soda s. Sodae exsiccatae s. diureticae s. lithontripticae. (Auf. Am. B*. Ed. RC. C. E2.)

℞. Subcarb. Sodae sicci part. quatuor.
Saponis duri . . . partes tres.
Syrupi simplicis q. s.

Fiant pilulae granorum duorum.
Gabe, wenigstens zehn Stück alle zwei Stunden.

Am. C. et E2. Subcarbonatis drachmam unam et Saponis semidrachmam (scrupulos duos, Aquae fluv. q. s. ut fiant pil. no. 30 E2.) ut fiant pilulae quadraginta (3 Stück drei Mal täglich bei Steinfrankheit E2.); — RC. Subcarbonatis semunciam, Saponis oleosi drachmas tres, Syrupi Zingiberis vel simpl. q. s. ut fiant pilulae granorum quinque; — *La.* Subcarbonatis drach. tres, Sapon. unam, Ol. ess. Carvi gutt. decem, Aquae q. s.; — *Par.* Sodae carbon. sicc. drachmam, Saponis duri scrupulos quatuor, Olei Juniperi, Syrupi Zingiberis q. s. fiant pilul. no. 80. (Gabe, zwei bis vier, täglich drei Mal, bei Steinfrankheit, vorzüglich Nierenstein. Beddoes.)

Pilulae absorbentes. (E2. Va.)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Rhei,
Extr. Gentianae, sing. scrupulum.
Mercurii dulcis . . . grana tria.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück auf ein Mal, bei Verdauungsbeschwerden.

Unguentum s. Pomatum alcalinum. (Ra. Va. Hosp. Ven.)

℞. Subcarb. Sodae drachmas duas.
Laudani Sydenh. . . drach. unam.
Axungiae Porci unciam.
Misce. — Gullerier warbte diese Salbe bei verschiedenen Hautkrankheiten an, bei welchen viel Schmerzen vorhanden waren.

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sulphureti Potassae, sing.

drach. tres.
Axungiae Porci . . . uncias tres.
Alibert läßt diese Salbe bei tinea täglich in den Kopf einreiben, nachdem er vorher die Krusten mittelst erweichender Umschläge erweicht und zum Abfallen gebracht hat.

Aqua Calcis s. nephritica s. antinephritica. (Ful†. Ham†. Li†. B*. E2.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.

Aquae Calcis

libras (octarios E2.) duas.

Gabe, zwei oder drei Pössel bis ein Weinglas voll alle zwei Stunden mit eben so viel frischer Milch. (E2.)

Aqua Sodae Carbonatis (Re.): Carbonas Sodae in Aqua destill. soluta et solutio ad sp. gr. 10, 24. evaporata.

Solutio Salis aërata. (E2.)

℞. Supercarbonatis Potassae grana decem vel quindecim.

Aquae Selteranae . . . uncias sex.

Drei oder vier Mal täglich.

Aqua Viciensis, Eau de Vichy. (GalP.)

℞. Carbonatis Sodii drachmam et

grana quinquaginta quatuor.

Chlorureti Calcis grana undecim.

— Sodii,

Sulphatis Ferri, sing.

grani trientem.

— Sodii grana sex.

— Magnesii grana tria.

Aquae aëre orbatæ uncias viginti.

Acidi carbonici volumina

tria cum dimidio.

Aqua Montis Duranii, Eau du Mont-Dore. (GalP.)

℞. Carbonatis Sodii drachmas duas,

Chlorureti Calcis . . . grana octo.

— Magnesii . . . sesquigranum.

— Sodii,

Sulphatis Sodii, sing.

granum cum triente.

— Ferri grana dua.

Aquae aëre orbatæ uncias viginti.

Acidi carbonici volumina quinque.

Potio absorbens, Mixtura antacida. (E2. Sw*. Va.)

℞. Subcarbonatis Sodae,

Sacchari albi, sing. drach. duas.

Vitellus Ovorum no. 2.

Mellis albi . . . drachmas duas.

Misce (Sw)

℞. Subcarb. Sodae scrup. quatuor.

Infusi Gentianae,

Aquae Cinnamomi, sing. unc. tres.

Tincturae Cardamomi semunciam.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Pössel (E2.)

℞. Subcarb. Sodae drachmam unam.

Sacchari albi semunciam.

Mucilag. Gummi Arab. unc. duas.

Aquae uncias triginta.

Tinct. Piperis Jamaic. unc. duas.

Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. (Sw.)

R. Subcarb. Sodae scrupulos duos.
Rhei drachmas duas.
Syrupi Sacchari unciam unam.
Aquaе Menthae crisp. unc. octo.
Gabe, zwei Eßlöffel täglich drei Mal. (Sw. Va.)

Infusum amarum cum Natro, Potio digestiva. (Auf.)

R. Radicis Gentianae drachmas duas.
Fruct. Aurantior. virid. sesquidrachmam.
Cardamomiminoris semidrachmam.
Subcarb. Sodae drachmam unam.
Aquaе bullientis uncias sex.
Fost sex horas infusionis cola. —
Gabe, ein Eßlöffel täglich drei Mal.

Potio antiscrophulosa (Ra. Va. Höt. D.)

R. Subcarb. Sodae semidrachmam.
Tinct. Gentianae semunciam (unciam Va.).

Seit 1816 wendet Peschier eine mehr oder weniger starke Auflösung des kohlensauren Natrums gegen Kropf an, z. B. zwei bis vier Drachmen desselben in acht Unzen Wasser; er giebt davon täglich zwei Mal einen Eßlöffel in einem halben Glase Wein oder gewürzten Zuckerwasser. Auf Befehl verordnet täglich vier Eßlöffel einer Auflösung von zwei Drachmen des Salzes in sechs Unzen Meißnerwasser und einer halben Unze Zimmtwasser.

Tisana ad urinam. (Sin. Va.)

R. Seminum Lini contusorum,
Capilli Veneris Monspelici,
Mesembrianthemi crystallini, sing. manip. unum.

Aquaе octarium unum.
Coque per horae quadrantem et colaturae adde

Subcarb. Sodae scrup. unum.
Va. Mesembrianthemum ommittit.
Den Tag über zu trinken.

Solutio balsamica alkalisata (Sw.)

R. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Balsami Peruviani, semunciam.
— Canad. drachmas decem.
Aquaе sesquilibram.

Man vermischt von dieser Auflösung eine Unze mit einer Pinte Wasser und läßt drei oder vier Mal täglich ein halbes Pfund davon nehmen.

Injectio lithontripica. (Bo. Va. Hosp. Monsp.)

R. Subcarb. Sodae drachmam unam

Saponis uncias duas.

Aquaе communis uncias duodecim.

Zur Auflösung von harnsauren Blasensteinen empfohlen.

Solutio Subcarbonatis Sodae etc.; Potio lithontripica (Ez. Va.)

R. Subcarbonatis Sodae drachmam.
Infusi Quassiae uncias quatuor.
Tincturae Columbo unciam unam.
Vier Mal täglich einen Eßlöffel voll.

Haustus in calculo. (Par.)

R. Mixturae Amygdal. unciam.
Balsami Copaivae (mucilaginis ope mixti) semidrachmam.
Sodae Subcarbon. semiscrupulum.
Tincturae Opii guttas quinque.
Bei Steinschmerzen.

Mixtura s. Potio expectorans. (Ez. Hosp. Amer.)

R. Subcarb. Sodae grana duodecim.
Vini Ipecacuanhae guttas viginti.
Tincturae thebaicae guttas quatuor.
Aquaе unciam unam.
Bei Keuchhusten. — Alle zwei oder drei Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Infusum Quassiae cum Natro, Aqua stonachica. (Au.)

R. Ligni Quassiae sesquidrachmam
Subcarb. Sodae drachm. duas c. dimid.
Aquaе bullientis libram unam.
Infunde p-r horam et cola — Gabe, täglich zwei bis vier Eßlöffel bei Verdauungsbeschwerden.

Protocarbonas Sodii, Carbonas Protoxydi Sodii, Carbonas Sodae s. natrium, Bicarbonas Sodae s. natrium s. natrium cum Aqua, Carbonas neutrum Sodae s. Sodae completum, Sodae Carbonas s. sesquicarbonas, Sal Sodae perfecte saturatum, Natrium carbonicum perfecte saturatum s. neutrale, Deutocarbonas Sodii, Alkali minerale perfecte saturatum, Natrium carbonicum acidulum s. bicarbonicum; gesättigte kohlensaure Soda, gesättigtes kohlensaures Natrium.

1 Im festen Zustande.

Bat. Borst. HassPt. HCt. HNt. Lit. Sax2t. AD. Am. B. Bel. Ed. Fenn. GalP. LonN. LPC. Suec. Taur. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. T.

R. Subcarb. Sodae purif. part. unam.
Aquaе calidae partes duas.
Transmitte per solutionem filtratam et refrigeratam Gasis acidi carbonici torrentem et crystallos exinde sponte enatas serva. (Bat. Am. B. Bel. Ed. Fenn. Suec. C. DB. T.)

GalP. Taur. gas carbonicum e Carbonate Calcis Acidi muriat. ope extricatum in solutionem Subcarbonatis Sodae saturatam immitti jubet; — *Fi.* per solutionem Subcarbonatis in lagena Woulfiana torrentem gasi. transmittit ad saturationem usque etc.; — HassP†. Salis partes duas, Aquae tres, solutioni filtratae torrentem Gas acid carbonici extricati e mixtura Cretae albae s. Lapidis calcarei purioris pulverati parte una et dimidia, Aquae communis partibus quatuor, Acidi Vitrioli diluti partibus affusis duodecim; Bor5†. Sax2†. Natri carbonici depurati sesquunciam, Aquae dest. tres cum dimidia, liquorum immitte in vas librarum decem capax, Gase Acidi carbonici repletum, per tres dies sepone, crystallos Aq. destillatae abluere etc. — HC†. HN†. Natri carb. depurat. cryst. partem unam, cum ejusdem salis, faciscendo in pulverem redacti partibus tribus terendo invicem miscere et in vase idoneo Acido carbonico gasiformi perfecte saturare, sal siccum Aquae dest. pari pondere superfundere et aqua post 12 horas defusa, celeriter siccare; — HC. praeterea praeparatum officinarum chemicarum ut Kali carbonicum parandum e solutione Natri carbon. depurati partibus duabus et Aquae dest. partibus tribus; AD. LonN. CG. Gr. Re. Sodae Subcarbonatis libram, Aquae octarios tres, solutioni Gas ad saturationem completam immitte et ad crystallisandum sepone, crystallos sicca; liquorem reliquum consume cavendo ne calor gradum 120 excedat, ut terum prodeant crystal. — LPC. Sodae libras septem, Aquae destill. congiunt.

Rx. Subcarbonatis Sodae libram unam
Aquae octarium unum.
Solutioni adde
Subcarb. Ammoniaci . . unc. tres.
Misce et per tres horas calori 80°
C. expone, donec omne ammoniacum sit expulsum et liquorem ad crystallisandum sepone. (Am. Lon. C. Fi.)

Gr. praeterea: Subcarbonatem Sodae cum Furfure calcinare.

2) Im flüssigen Zustande.

Aqua Supercarbonatis Sodae s. Carbonatis Sodae acidula Aqua acidula cum Bicarbonate sodico, Soda Water (Ang.) (Han†. HN†. AD. B†. Ed. Fenn. GalP. Pol. R. RC. Suec. Gr. Re. Sm. Vin.)

Rx. Subcarbonatis Sodae uncias duas.
Aquae libras (congiunt Gr., octarios) decem.

Per solutionem transmittit Gas acidum carbon. e mixtura Cretae, Acidi sulph., sing. unc. trium et Aquae trium librarum.

Ejus loco statim solvi possunt Natri carbonici neutralis drachma una et altera in Aquae Selteranae vel similis pure acidulae libra una.

GalP. Bicarbonatis Sodae grana viginti, Aquae purae uncias viginti, Acidi carbonici volumina quinque.

Dieses Salz, welches man heutzutage viel in Gebrauch zieht, unterscheidet sich in therapeutischer Hinsicht nicht viel von dem vorhergehenden.

Liquor Natri carbonici neutralis.
(HN†.)

Paratur e solutione Salis in Aquae destill. quantitate sufficiente. — Reagens.

Aqua Sodae, Aqua alcalina gasosa, Liquor Sodae effervescens. (Am. LPC. C. Ra.)

Rx. Subcarbonatis Sodae drachmas tres.
Aquae octarios octo.
Solutionem volumine Gas acid carbonici decuplo satura. (Am. C.)

LPC. Sodae sesquicarbonat. drachmam in Aquae destillatae octario liquare, ei Acidi carbonici vi compressi immittere plusquam satis sit ad saturationem et liquorem in vase bene obturato servare.

Rx. Subcarb. Sodae grana octodecim.
Acidi hydrochlor. semidrachmam.
Aquae uncias duodecim.
Serva in lagena bene obturata. (Ra)

Hauftus catharticus. (Par.)

Rx. Sodae tartar . . drachmas duas
Sodae carbon. scrupulum.
Aquae purae sesquunciam.
Mit einem Eßlöffel Citronensaft während des Aufbrauens täglich Morgens zu nehmen.

Aqua Carbonatis acidi Sodae mixta s. artificialis Spadana s. Soaiana. (GalP. Gr.)

Rx. Aquae congiis quinque.
Carbonatis Calcis drachmas duas.
— Magnesiae unciam unam.
Subcarbonatis Sodae drachmas sex.
Muratis Sodae . . sesquunciam.
Di-solve et Gas acidum carbon. e Marmoris drachmis duabus transmittit.
Rx. Carbonas Sodii . . grana tria.
— Calcis grani tres quincunces.
— Magnesiae grani quadrantem.

Chlorureti Ferri grani duas trientes.

Sulphatis aluminopotassici

grani partem septimam.

Aquaë aëre orbatæ uncias viginti.

Acidi carbonici volumina quinque.

Misce (GalP.).

Potio febrifuga. (Bo.)

℞. Aquaë destillatæ . uncias octo.

Acidi carbonici quantum sufficit
ut sit volumen duplum Aquaë; solu-
tioni adde

Subcarbonatis . semidrachmam.

Camphoræ . . . grana viginti.

Syrupi Papaveris . drachmas sex.

Man löst die Hälfte davon vier Stun-
den vor dem Anfall und das Uebrige im
Augenblicke des Eintretens desselben neh-
men. Man muß sieben oder acht Tage
damit fortfahren.

Tabellæ s. Trochisci Natri carbonici
aciduli s. Bicarbonatis Sodæ s. alcali-
ni s. digestivi s. alkalini digestivi,
Pastilli alkalini digestivi s. natronati
s. Vichii s. d'Arceti. (HC†. Sax2†.
GalP. GalH. GalP. Taur. DB. Ma. Va.)

℞. B'carb. Sodæ . . . part. 250.

Sacchari albi . . . partes 4750.

Olei ess. Menthae . partes octo.

Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.

Fiant trochisci granorum octodecim.

— Gabe, zwei oder drei Stück vor oder
nach der Mahlzeit bei Stein und Gicht.

HC†. Sacchari albi uncias quin-
que, Natri carbonici aciduli drachmas
tres, Olei Menthae piperitæ guttas
decem miscere et cum Mucilage Tra-
gacanthæ trochiscos parare, qui le-
nissimo calore exsiccentur; — Sax2†.
Natri bicarb. scrupulos quatuor, Tra-
gacanthæ duas, Sacch. albiss. uncias
duas et drachmas septem. F. troch. pond.
granor. quindecim; — Va. B'carb. drach-
mam, Sacch. unc. duas c. dimid. Ol.
Menth. gutt. tres, Mucilag. G. Tra-
gac. q. s., f. pil. no. 72. Loco olei
Balsam. Tolut. recipi potest; — Taur.
Bicarb. Sodæ drachmas quinque, Sac-
chari libram, Mucilag. G. Tra-
gacanth. q. s.; — DB Sodæ drachmas
quatuor, Sacchari uncias novem cum
dimidia, Gummi Mucilag. q. s., fiant
pastilli granorum viginti.

Subprotoboras Sodii, Subboras Prot-
oxydi s. Deutoxydi Sodii, Subboras So-
dæ, Boras supersaturatus Sodæ, Ribo-
ras Sodæ, Boras Sodæ cum baseos ex-
cessu, Soda boraxata (H.), Boras So-
dæ (B.), Borax, Borax crudus s. cru-
da, Natrum boracicum s. subboracicum,
Tincal, Tincal, Tinkar, Boras Sodæ
s. Sodæ alcaliscentis s. alcalinum s. al-
calinus, Boras supersodicus s. natricus

s. sodicus s. natricus cum Aqua, Borax
Venetus s. Veneta s. raffinata, Hypo-
boras Sodæ, Subboras natricum, Chry-
socolla; Borax, natürliches Sedativsalz;
Sousprotoborate de sodium, Sousbo-
rate de protoxide de sodium, Sousbo-
rate de soude, Borate sur saturé de
soude, Borate de soude avec excès de
base, Soude boratée (H.), Borate de
soude (B.), Borax, Borax brut, Tin-
ckal, Tinkar (Gal.); Atinkal (Ang.);
Buruk (Ar.); Piger (Ba. Jav.); Patte-
rie, Piger (Mal.); Boras (Bel.); Lan-
sipusara (Cy.); Sohaga (Duk. Hin.);
Borace, Tinkal (I.); Chaularya (Nep);
Tunkar (Pe.); Borax (Pol. Suec.); Bo-
rax, Tincal (Lus.); Tunkana (Sa);
Velligarum, Vengarum (Tam.)

A†. Ba†. Bo 5†. Br†. Ful†. Ham†.
Han†. HassP. Li†. O†. Sax2†. Wir†.
WW†. Al. Am. Ams. B. Bel. D. DD.
Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GaM. GalP.
Gen. His3. LonV. LPC. Lus. Pm. Pol.
R. RC. Suec. Taur. A. CG. DB. Fi. G.
Gr. Par. Re. Sp. T. Vo.

— In hercædrischen, mehr oder weniger ab-
geplatteten, in dießrische Pyramiden endi-
genden, bald farblosen, bald gelblichen oder
grünlichen, stets mit einem erdigen, fett
anzufühlenden, seifenartig riechenden Ueber-
zug bedeckten Prismen von glasigem Bruch,
mit Ausblühungen überzogen und von
schwach alkalischem Geschmacke.

Borax depurata s. pura, Borax Sodæ
purificatus (HassP.) HC†. HN†. AD.
Borax venalis vel crystallisata vel usta
ut reagens adhibetur; — HC†. crystal-
lisatione depurare jubet; — His3. ut
sulphatem magnesiæ depurari vult.

Species D'aboraci. (Wir†.)

℞. Boracis Veneti . . semunciam.

Cassiae lignæ,

Croci orientalis, sing. drach. unam.

Rasuræ Ligni Sabinæ,

Succini albi præp., sing.

semidrachmani.

Osis Cordis cervini,

Visci querni,

Flor. Cheiri, sing. . scrupulum.

Fiat pulvis. — Mynsicht empfiehlt
diese Species zur Erleichterung der Nieder-
kunft. Gabe, von einem Scrupel bis
zur halben Drachme.

Pulvis ad partum promovendum. (Pal†
Wir†.)

℞. Boracis . . . , semunciam.

Castorei,

Croci, sing. . . sesquidrachmam

Olei Cinnamomi . . guttas octo.

— Succini . . . guttas sex.

Misce ut fiat pulvis. (Wir†.)

℞. Cassiae lignae,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Boracis . . .
Succini albi praep. sing.
drach. unam.
Croci semidrachmam
Olei Cinnamomi . . . guttas tres.
Misce ut fiat pulvis. (Palz.)
Man schrieb diesem Pulver ehemals den
selben Nutzen zu, als dem vorhergehenden
— Gabe, von einem Scrupel bis zur hal-
ben Drachme

Mixtura ad partum. (Sw.)

℞. Boracis drachmas duas.
Aq. Chamomill. Rom.
unc. quatuor.
Syr. Cort. Aurantior. semunciam.
Succinatis Ammon. liq.
drach. duas.
Laudani Sydenh. semidrachmam.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel.
Infusum Salep cum adstringentibus,
Potio adstringens. (Autz.)
℞. Salep drachmam unam.
Aquae bullientis . . . uncias decem.
Colaturae adde
Extr. Chinae,
— Ligni Campech., sing.

drachmam unam.
Boracis semidrachmam.
Syrupi Althaeae . . . unciam unam
Löffelweise zu nehmen, bei chronischer
Diarrhöe, besonders aber bei sogenannten
asthenischen bösartigen Geschwüren und
Schwämmchen.

℞. Salep drachmas duas
Seminum Lini . . . semunciam.
Aquae bullientis . . . uncias decem.
Post sufficientem extractionem cola
et colaturae adde
Boracis semidrachmam.
Extr. Ligni Campechiensis,
— Chinae, sing. drach. unam.
Syrupi Althaeae . . . unciam unam.
Löffelweise, in diesen Fällen, wie das
vorhergehende.

Linimentum de Borate s. ad aphthas,
Mel boracis s. boraxatum s. Subboracis
s. Subboratis Sodae, Linctus Bora-
cis s. de Borace s. ad aphtas, Colluto-
rium boraxatum s. adstringens. (Hamf.
Autz. AD. DD. Ed. GalM. LonN.
LPC. Sa. C. CG. Gr. Pie. Re. Sa. Sw.
Sy. Vm.)

℞. Boracis drachmam unam.
Olei Amygdal. dulc. unc. unam.
Vitellum Ovi no. 1.
Misce trititando. (Sa. Sw.)
℞. Boracis partem unam.
Mellis despumati . . . partes octo

Misce (AD. Ed. Ham. Lon. LonN.
LPC. C. CG. Gr. Re.)

GalM. Boracis partem unam, Mel-
lis decem; — Pic. et Vm. Mellis duo-
decim; — Aut. Boracis et Mellis, sing.
partes aeq.

℞. Boracis drachmam unam vel duas.
Mellis despumati unciam unam.
Extr. Juglandis
drach. unam vel duas.

Misce trititando. (Sw.)
℞. Boracis drachmam unam.
Syr. Mororum unc. unam ad tres.
Misce. (Autz.)

℞. Boracis drachmas duas.
Mellis sesquiunciam.
Liquescant simul lento igne, baculo
idoneo agitando, tunc adde
Syrupi Mori semunciam.
Misce. (LoP.)

℞. Boracis drachmam unam ad duas.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum.
Syr. Mororum, sing. unc. unam.
Misce. (Sw. Sy.)

℞. Boracis sesquidrachmam.
Aquae fontanae,
Mellis, sing. unciam unam.
Misce trititando. (DD. Suec.)

Gargarisma Boracis s. Boracis Sodae
s. e Borace s. ad aphthas s. boraxatum
s. Subboratis Sodae s. commune s. de-
tersivum, Mixtura boraxata, Liqueur ad
aphthas. (DD. Gen. Ham. LoP. RC.
Au. B. Ca. E2. Gr. Pie. Ra. Re. Sa.
Sw. Sy. Va.)

℞. Boracis drachmas duas.
Aquae fluiduncias sex.
Solve ut f. gargarisma. (LoP.)

℞. Boracis semunciam.
Aquae libram unam.
Mellis flavi semunciam.
Interdum additur Alcoholis impuri
uncia una vel sesquiuncia. (RC.)

Gr. Re. Boracis drachmas duas, Mel-
lis unciam, Aquae Rosarum uncias
septem.

℞. Boracis drachmas duas.
Mucilag. Sem. Cydonior.

semilibram.
Mellis rosati . . . unciam unam.
Misce (Gen. Sa.)

Sw. coquere Seminum Cydoniorum
unciam unam in Aquae sedecim ad
duodecim remanentiam et colaturae
addere Boracis drachmas tres et Mel-
lis rosati sesquiunciam.

℞. Boracis drachmas sex.
Infusi Salgiae . . . uncias decem.
Mellis despumati . . . uncias duas.
Misce. (Ham.)

DD. Boracis drachmas duas, Infusi
Salviae uncias octo et Mellis unam;

— B. Boracis scrupulum, Decocti Salviae libram et Aquae Vitae unciam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Aquaе,
Tinct. Myrrhae, sing. unc. unam.
Mellis orsati . . . uncias duas.
Misce. (Ca. Sw.)

Au. et Sy. Boracis unciam, Aquae libram, Tincturae Myrrhae uncias duas et Mellis tantidem; — ℞2. Boracis drachmam, Aquae (Rosarum ℞2.) uncias quatuor, Tincturae Myrrhae semunciam et Mellis unciam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei . . . sesquilibram.
Syrupi Gummi . . . unciam unam.
Misce. (Ra.)

Va. Mais. de S. Decocti libras duas.
℞. Boracis . . . drachmas duas.
Infusi Rosarum . . . uncias decem
Syrupi Mororum . . . semunciam.
Misce. (B.)

℞. Boracis . . . drachmas tres.
Decocti Chinae uncias duodecim.
Mellis . . . ssesquiunciam
Misce. (Ra.)

℞. Boracis drachmas duas ad tres.
Mellis . . . unciam unam.
Extracti Juglandis . . . semunciam.
Alcoholis unciam unam ad duas.
Aquaе bullientis . . . libram unam.
Misce. (Sw.)

℞. Boracis,
Sulphatis Cupri, sing. grana octo
Tinct. Coctionellae drach. unam.
Aquaе . . . unciam unam.
Spiritus Cochleariae uncias duas.
Syrupi Rubi Idaei . . . q. s.
Misce. (Pie.)

℞. Aquaе purae uncias viginti duas.
Subboratis Sodae drachmas decem.
Tincturae Catechu unciam unam.
— Caprici annui drachmas duas
Mellis Rosae . . . sesquiunciam.
Misce. — Interdum loco boracis et
tincturae catechu adde Acidum muriaticum vel sulphuricum. (Gr.)

Collyrium boracicum. (Au. Va.)

℞. Boracis . . . semidrachmam.
Sacchari . . . drachmam unam.
Aquaе Rosarum . . . uncias duas
Aqua cosmetica. (Au.)

℞. Furfuris Amygdalarum unc. duas.
Aquaе Rosarum,
— Flor. Aurant., sing.
unc. octo.

Fiat emulsio, cui adde
Tincturae Benzoës drachmas duas.
Boracis . . . drachmam unam.
Subprotophosphas Sodii, Subphosphas
Protoxydi s. Deutoxydi Sodii, Subphosphas

sphas Sodae, Sal mirabile perlatum,
Phosphas Sodae s. natrium s. natrius
s. natrius cum Aqua s. sodicus cum
Aqua, Soda phosphorata, Natrium phosphoricum s. oxyphosphorodes, Alkali minerale phosphoratum, sal catharticum Pearsoni s. perlatum. (B. †. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. AD. Am. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP. LPC. Pm. Pol. Suec. Taur. Br. C. DB. E2. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.)

℞. Acidi phosphorici partem unam.
Aquaе . . . partes octo.

Mixturae sensim infunde
Solutionis Subcarb. Sodae . . . q. s.
i. e. donec alcali levis excessus adsit; liquor filtratus evaporet, ut crystallos demittat, quas in loco bene sicco serva (Bor†. HC†. HN†. Han†. O†. Sax†. An. B. D. Pol. Br. Gr. Re. Sm.)

Bor5†. Natrium carbonicum crudum mixturae addit, donec aliquantulum praevaleat; — Sax2†. Acidum Natri carbonico saturare et post perfectam saturationem insuper addere Natri carbonici partem trigesimam secundam, liquor evaporet, usque gutta marmori frigido adpersa in crystallos coëat etc.; — Gr. praeterea: Saturare Solutionem Subcarb. Sodae Acido phosphorico liquido evaporare et crystallisationi subijcere (Reagens.)

℞. Supersulphatis Calcis quantum vis.
Subcarbonati Sodae . . . q. s.
ad saturandum acidum; liquor clarus post decantationem evaporet, donec 25° ar. indicet, quo facto crystallisationi subijciatur. (Am. B. Ba. Bel. Fenn. Fer. Gal. Suec. C. DB. Vm.)

GalP. loco Supersulph. Calcis Biphosphatem calcicum substituit.

℞. Ossium ad albedinem calcin. et pulver.

libras decem (quinque Du.)
Acidi sulphurici

libras sex (tres Du.)
Permisce in vase figulino, adde paulatim

Aquaе libras novem (octo AD., quinque Du.);

tunc digere (in Aquaе bullientis vapore E.) per dies tres, quibus elapsis materiam Aquaе bullient. libris novem (octo AD.) dilue; affusa subiinde majore Aquaе quantitate, ut impediatur massa, quominus sicca evadat, atque continua agitationem; per pannum linteum cola, repetitis vicibus Aqua fervente effusa, ut omne acidum abluatur. Liquorem colatum seponere, ut faeces subsidant, a quibus effunde, et evapora ad libras novem (octo AD., di-

midium Du.). Huic liquori adde in vase figulino Subcarbonat. Sodae in Aqua calida solut. (libras tres cum uncis decem Du.), donec cesset effervescencia; cola et sepone, ut fiant crystalli quas in vase bene obturato serva (AD. Du. Ed.).

Rx. Pulv. Cornu Cervi usti albi aut aliorum ossium animalium ad albedinem calcin. libras quinque.

Misce in vase murrhino cum Aquae communis libris quindecim. Deinde sub assidua agitatione sensim adde

Olei Vitrioli Nordhusani libras quatuor cum dimidia.

Post duodecim horas adde

Aquae communis fervidae libras quindecim usque viginti et mixtionem, frequenter agitando, per horas 48 super igne digere, cola fluidum per linteum ac residuum bene elotum in prelo laminis ligneis vel stanneis munito exprime. Liquori obtento in aeno stanneo, capace, calefacto, sensim affunde

Liquorem Salis Sodae depuratae concentratum

ad saturationem usque et donec soda paululum praevaleat, tunc filtretur et residuum eluatur. Filtratam evaporet, donec gutta lapidi instillata, crystallos exhibeat, tunc ad crystallandum seponatur; crystallos inter chartam bibulam siccata statim serva. (HassP.)

Taur. *Fi.* Ossium calcin. libras (tres Taur.) quinque cum Aquae comm. libris (ex Taur.) decem in vas ingerere, et bene commixtis addere Acidi sulph. concentr. libras (quatuor Taur.) tres, per aliquot dies seponere, aliam Aquam addere, colare et filtrare, sedimentum abluere et liquores ad syrupi consist. consumere, novam Aquam affundere, (Sodae subcarbonatae q. s. ad saturationem addere Taur.) filtrare et de novo ad syrupi consist. consumere, ut refrigeratione crystalli enascantur etc.; — vel: Salis Glauberi libras duas, Ossium calcin. libras duas cum dimidia et Aquae comm. libras quatuor coquere per horam circiter unam, decanthare fluidum, residuum abluere, liquores filtrare et consumere ut crystallisent; — *Pm.* Ossium pulv. uncias quindecim, Aquae font. uncias triginta, mixtis adde Acidi sulph. venalis uncias novem, fiat lixivatio, liquorem filtratum Salis Sodae q. s. satura vel ultra, solutionem vapora ut crystallos demittat, quae vaporatio et crystallisatio liquoris repetatur; — *Gr.* Ossa bene usta in Acido nitr. solvere, et solutio-

ni aliam salis mirab. Glaub. aquosam infundere, quamdiu praecipitatum oritur, filtrare, acidum nitr. destillando separare, abluere, evaporare et crystallisationi subicere.

T. Solutionem Subcarbonatis Sodae iteratim Phosphati acido Calcis infundere, mixta per aliquot momenta calori modico exponere, praecipitatum filtrando separare, addere solutionis filtratae Subcarbonatis Sodae parvum excessum, consumere ad pelliculam et in crystallos cogere.

Ein milches Abführmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen in Fleischbrühe.

Mixtura Natri phosphorici, Potio laxans. (Au. Va.)

Rx. Phosphatis Sodae, Syr. Althaeae, sing. semunciam. Aquae . . . uncias quatuor. Portionenweise stündlich zu nehmen.

Natron phosphoricum siccatum. (HC†.)

Paretur uti Natrum carbonicum siccatum.

Phosphas Sodae et Ammoniaci. (Ba.)

Rx. Subphosphatis Sodae partes sex, Liqua, leni igne, in Aquae dest. calidae part. duabus in solutione tenentibus

Salis Ammoniaci . . . partem. Solutionem per horas viginti quatuor in loco frigido relinque et crystallos enatas collige atque sicca.

Superprotosulphas Sodii, Supersulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae acidulus s. acidus. (Sw*. Vm.)

Rx. Acidi sulphurici, Aquae, sing. . . uncias quatuor. Mixturae adde

Subcarbonatis Sodae uncias octo. Filtra et ad crystallandum repone. — Purgierend. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen

Protosulphas Sodii, Sulphas Deutoxyli s. Protoxyli Sodii, Sulphas Sodae s. sodicus, Hydrosulphas Sodae (H.), Soda sulphurica (H.), Soda vitriolata, Alkali minerale sulphuricum s. vitriolatum, Natrum s. Natron sulphuricum s. vitriolatum, Sal catharticum s. mirabile s. mirabilis Glauberi s. Glauberi, Sal Placentinus, Sulphas natricus, Vitriolum Sodae; schwefelsaures Natron, Glaubersalz.

Käufliches, Natrum sulph. crudum s. emittum, Sulphas natricus crudus, Sulphas natricus cum Aqua crudus, Sal mirabile Glauberi crudum, rohes Glauber-

salz, *Sel d'Epsom de Lorraine, Sulfate de Soude.* (Gal.)

A†. Ba†. BorC†. Bor4†. Ful†. HC†. HN†. Han†. HassP. Li†. O†. Sax2†. VW†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. DD. Du. Ed. Fenn. GalP. His3. LonN. Suec. C. CG. D. G. Par. T. Va

In langen, sechsseitigen, in eine zweiseitige Spitze endigenden, durchsichtigen, weißen, ausblühenden Prismen von anfangs kühlem, dann bitterem Geschmacke.

2) Gereinigt. *Natrum sulphuricum depuratum s. sulphuricum dep. crystallisat., Sal mirabile* (Glauberi depuratum, *Sulphas Sodae s. natricus depuratus s. cum Aqua depuratus.*

GalP. His3.

Sulphatis Sodae venalis s. q. solvere caloris ope in Aquae s. q., filtrare, in crystallos per refrigerationem redigere et eas humidas in lagenis bene obturatis servare. (GalP.)

Bor5†. HC†. HN†. Sax2†. Natrum sulphuricum crudum in Aquae (pluvialis HN†. fervida HC†. Sax2†.) s. q. solvere, filtrare et l. a. in crystallos redigere jubent.

Hi-3. läßt es auf ähnliche Weise reinigen wie Sulph. Magnesiae.

3) Im Ganzen bereitet.

A†. Bor4†. Br†. HC†. HN†. Han†. HassP†. O†. Wir†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. LonN. L. PG. Lus. Pm. R. Sar. Br. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.

R. Residui e destillatione acidi hydrochlorici q. vis (libras duas CG.).

Dissolve in Aquae pondere triplo (octariis duobus cum semisse CG.), saturata liquorem Subcarbonate Sodae (vel Calce pulverata Gr.) et filtratum ad crystallisandum seponere (A†. Bor4†. Br†. HN†. Han†. HassP†. O. Wir. AD. Ams. B. D. Du. Ed. Fer. Gen. LonN. Lus. R. Sar. Br. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

LPC. Residui libras duas, Aquae ferventis octarios duos, Sodae carbon. q. s.; — His3. Residuum igne aperto vehementer calcinare, in Aqua solvere, filtrare et vaporando in crystallos cogere.

R. Chlorureti Sodii (Salis marini) libr. duodecim.

Acidi sulphurici venalis libras sex.

Sali in olla fictili, aëre libero, iterationi acidum superaffunde, ollam, effervescentia decreta igni impone, mixturam saepe spatula lignea agita et ignem urge usque acidi muriatici evolutione omnino cesset; massam frige factam Aqua dissolve, filtra, evapora et

in crystallos coge, quas Aqua solutas novae crystallisationi subijce. (Pm.)

R. Subcarbonatis Sodae . . . q. vis.

Dissolve in Aqua et liquori infunde Acidi sulphurici . . . q. sufficit ad neutralisandum alcali; solutionem consume ut crystallos demittat. (Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. Fi.)

Hi-3. Cinerum Sodae Barilla dictae libram urere igne valido, donec omnis odor sulphureus evanuerit, solvere in Aquae libris octo, filtrare ad remanentiam librarum duarum, vaporare, post bidui aut tridui quietem decanthare, liquori affundere Acidi sulph. aquosi q. s. ad perfectam saturationem, filtrare et ut in sulphatis potassae praeparatione procedere; — Gr. Spiritui ammoniacali adde Oleum Vitrioli. sulphatem ammoniae obtentum crystallisationi subijce, cum Sale communi commisc., sal amm. sublimatione separa et sal remanens dissolutum in crystallos coge; — T. praeterea ut Sulphatem Potassae parari iubet.

Gabe, zu einer bis anderthalb Unzen ein gelind reizendes Abführmittel; zu drei bis fünf Scrupel harntreibend. — Man wendet es auch als eröffnend an.

Natrum sulphuricum s. sulphuricum depuratum siccum s. Sal mirabile (Glauberi siccum, *Sulphas natricus depuratus.* (Bor5†. HC†. HN†. HassP†.

Sal mirabile depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expone, donec in pulverem siccum fatiscat et cribra.

Gabe, eine halbe Unze bis sechs Drachmen auf den Tag.

Liquor Natri sulphurici s. Natri sulphurici depurati s. Salis mirabilis (Glauberi. (HN†. HassP†.) Salis depurati drachmas duas, Aquae destillatae unciam unam; — HN†. Aquae dest. q. s. — Reagens.

Potio purgans. (BorC†. Ham†. Au†. B. GalM. Ra. Sa. Va.)

R. Sulphatis Sodae partes sedecim. Aquae . . . partes quingentas. Dissolve. (GalM.)

R. Sulphatis Sodae . . . unciam. Aquae . . . uncias octo. Mellis puri . . . semunciam.

Dissolve. (BorC†.)

R. Sulphatis Sodae . . . semunciam.

Nitri . . . drachmam.

Succi Citri . . . sesquunciam.

Syrupi Rubi Idaei . . . uncias duas.

Aquae Rubi Idaei . . . uncias decem.

Misce. (Sa.)

R. Sulphatis Sodae . . . unciam.

Sacchari . . . semunciam.

Succi Citri semunc. (sesquinc.)
 Decocti Gruti . . . octarium.
 Glasweise stündlich. (Auf. Va.)
 R. Sa is Glauberi . . . unciam.
 Aquae Menthae piperitae,
 Infusi Rhei, sing. . . uncias tres.
 Oxymellis scillitici . . unciam.
 Misce. (Hamf.)
 R. Sennae . . . drachmas tres.
 Sulphatis Sodae . drachmas duas.
 Mannae unciam.
 Aquae bullientis . uncias quatuor.
 Infunde et cola. (Ra.)
 R. Pulvae Tamarind. sesquiunciam.
 Aquae q. s.
 ut unciae quatuor decocti obtineantur,
 quarum colaturae adde
 Sulphatis Sodae . . semunciam.
 Syr. Rosar. solut. . . drach. sex.
 Misce. (Sa.)
 R. Sulphatis Sodae . sesquiunciam.
 Mannae unciam.
 Aquae uncias sex.
 Eßfelweise. (Auf.)
 R. Sulphatis Sodae . drachmas duas.
 — Magnae unciam.
 Infusi Cort. Aurant. . uncias octo.
 Vini rubri . parvam quantitatem.
 Misce. (B*)
 R. Foliorum Sennae . drachmas duas.
 Aquae bullientis . uncias quatuor.
 Infunde per momenta decem, cola
 et adde
 Sulphatis Sodae . . semunciam.
 Syrupi Rhamni . . . unciam.
 Misce. — Auf ein oder zwei Mal. (Va.
 Höt. D.) — Va. Hosp. Ant. Sulphatis
 drachmas tres.
 Clyster s. Enema laxans s. purgans.
 (Lit. LH. Ra. Sa. Sy. Va.)
 R. Sulphatis Sodae . . . unciam.
 Olei Lini uncias duas.
 Decocti Hordei . . . uncias sex.
 Misce. (Sy.)
 R. Specierum emollient. . uncias duas.
 Foliorum Sennae . . semunciam.
 Sulphatis Sodae . drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . libram.
 Infunde et cola. (Ra.)
 Va. Höt. D. Aquae libras duas, co-
 quere et addere Sulphatis dictam co-
 piam, caeterum ut antea.
 Ra. praeterea (Va. Hosp. Mat.): Sen-
 nae drachmas duas, Sulphatis semun-
 ciam et Decocti emollientis (Semin.
 Lini) libras duas; vel (Va. Hosp. Inf.)
 Sennae semunciam, Sulphatis tantidem
 et Aquae libram (Va. Hosp. St. Ant.
 Mellis comm. uncias quatuor addit);
 — Lit. Decocti emollientis uncias
 octo, Oxymellis uncias tres et Sulpha-
 tis unam.

R. Herbae Rutae,
 Florum Chamomillae,
 — Sambuci, sing. . semunciam.
 Aquae libram.
 Coquendo partem tertiam consume
 et colaturae adde
 Salis Glauberi . . . drachmas tres.
 Oxymellis simplicis,
 Olei Chamomill., sing. . unciam.
 Misce. (Sa.)
 I. H. novni quantitate Salis uncia-
 rum duarum pro clystere indicat.
 Apozema depurans et tonicum. (Pie.)
 R. Radicis Patientiae . . unciam.
 — Fragariae . . . semunciam.
 — Inulae drachmam.
 Fol. Cichorii,
 — Cerefoli,
 — Nasturtii, sing. . manipulum.
 Sulphatis Sodae . . drachmam.
 Syr. Cichorii comp. . drachmam.
 Alle Morgen zu nehmen.
 Jus s. Brodium purgans. (Va. Hosp.
 Inf.)
 R. Sulphatis Sodae . . . unciam.
 Brodii Herbarum . . uncias octo.
 Dissolve. Auf zwei Mal, innerhalb
 einer halben Stunde.
 Decoctum Carnis depurans, Erodium de-
 purativum. (Pie.)
 R. Brodii gallinaei . . octarium.
 Radicis Patientiae . . uncias duas.
 Coque per horae semiquadrantem et
 sub finem adde
 Fol. Nasturtii,
 — Melissae,
 — Primulae veris, sing. . manipul.
 Cola et adde
 Sulphatis Sodae . . uncias duas.
 Apozema laxans. (Gal. Ca. Fi.)
 R. Fol. virid. Cichorii,
 — — Buglossi,
 — — Boraginis, sing. . unciam.
 Aquae bullientis . . libras duas.
 Infunde per horae quadrantem, cola
 et colaturae adde
 Sulphatis Sodae . drachmas duas.
 Syrupi Violarum . . . unciam.
 Misce bene (Gal.)
 Fi. Aquae libras duas et uncias octo;
 caeterum ut Gal.
 Lotio ad tinea s. excitans. (Sw. Va.)
 R. Sulphatis Sodae . . uncias sex.
 Saponis albi . . . drachmas tres.
 Aquae Calcis . . uncias octodecim.
 — Vitae . . . drachmas sex.

Solutio salina gelatinosa. (Ca.)

- R. Aquae libram.
 Subcarbonatis Sodae,
 Collae Flamm., sing. unciam.
 Sulphatis Sodae,
 Salis culinaris, sing. semunciam.
 Petrolei guttas viginti.

Pulvis cathartico-diureticus. (Sio)*

- R. Tartari stibiati,
 Opii, sing. granum.
 Sulphatis Sodae uncias duas.
 Gummi Arabici,
 Rad. Liquiritiae, sing.
 drachmas duas.

Drei oder vier Mal täglich in einem Glase Wasser zu nehmen.

Sal Guindre. (B. Ca.)*

- R. Sulphatis Sodae unciam.
 Natri grana duodecim.
 Tartari stibiati semigranum.

Purgirend. — Man löst es in einer Pintе Eisene oder Kräuterkouillon auf, und am Morgen nehmen.

Aqua resolvens. (Ca.)

- R. Sulph. Sodae unc. unam ad duas.
 Natri grana decem.
 Tartari stibiati semigranum.
 Aquae libras duas.

Aqua purgans cum Tartaro emetico, Aqua mineralis. (GalM. Ra.)

- R. Sulphatis Sodae drachmas tres.
 Tartari stibiati grana tria.
 Aquae calidae uncias decem.

Sal Cheltenhamense (Re.): Sulphatis Sodae grana 120, Sulph., Magn. gr. 66. Mur. Sodae gr. 10, Sulphat. Ferri gr. 4 misce trititando.

Thomson's Real Cheltenham Salts (Re.): e Solutione Sulphatis et Subcarbon. Sodae vaporando.

Injectio refrigerans. (DB.)

- R. Sulphatis Sodae drachmam.
 Mellis Rosarum unciam.
 Lactis vaccini libram.

Potio cathartica. (Ca.)

- R. Sulphatis Sodae,
 Mannae in lac., sing. semunciam.
 Tartari stibiati grana duo.
 Aquae uncias quatuor.
 Oxymellis scillitici unciam.

Gabe, alle zwei Stunden ein Pössel.

Sal Theriacum Carolinarum. (Bois†. Sax2†.) Paratur evaporatione Aquae mineralis. Constat e Natro sulphurico et carbonico.

Sulphas Sodae et Magnesia, Sal Astracanensis artificialis (Sio), Sulphas Magnesia et Sodae. (Fi. Gr.)*

- R. Supersulphatis Sodae q. v.
 Aquae tepidae q. s.

ad perfectam salis dissolutionem, quam cum Magnesia calcinata saturatam filtra et ad crystallisandum sepone. — Exsiccand. oder brenntreibend, je nach der Gabe. — Gabe, von einer halben bis zwei Drachmen, täglich mehrmals, bis auf eine oder zwei Unzen auf einmal.

Gr. e Lixivio Salis marini crystallisatione obtinetur; vel: solutione Salis Epsom. in Solutione Salis Glauberi.

Protosulphis Sodii, Sulphis Sodae. (Gr. Vm.)

- R. Subcarb. Sodae partem.
 Aquae partes quatuor.

Dissolve, satura Gase acido sulphuroso, calefac deinde in balneo aquae tepido et liquorem sepone ut crystalli demittat.

Gr. Salis Glaub. sicc. unc. octo, Pulv. Carbon. duas, Sulphuris unam laevigata in crucibulo per semihoram calefac, refrigerata Aqua dissolve, filtra et crystallisatione sulphitem a sulphate separa, vel: Gas acidum sulphurosum per Solutionem Sodae caust. transmittit.

Protohyposulphis Sodii, Hyposulphis Sodae, Sulphites sulphuratus Sodae. (GalP. Vm.)

- R. Subcarbonatis Sodae partes octo.
 Aquae partes sedecim.
 Solutioni adde

Sulphuris sublimati partem.
 In liquorem immitte torrentem Gas acidum sulphurosum, filtra post saturationem, tunc evaporet liquor ut crystalli enascantur. (GalP.)

Vm. transmittit torrentem Gas acidum hydrosulph. in solutionem Sulphitis Sodae vel torrentem Gas acidum sulphurosum in illam Hydrosulphatis Sodae.

Protonitras Sodii, Nitras Protoxydi Sodii, Nitras Sodae s. natrium s. cubicum, Natrium nitricum, Nitrum cubicum, Nitrum rhomboidale. (Bois†. HC†. B. Gr.)*

- R. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
 Acidi nitrici tenuis q. s.
 ad saturandum alkali; solutionem ad crystallisandum sepone; — Bois†. HC†. Solutioni e Natri carbon. depur. crudi (Bois†.) uncia et Aquae destillatae uncis quatuor addere Acidi nitrici q. ad neutralisationem requiri-

tur; — Gr. Solutionem Sodae Subcarbonatis Acido nitr. saturare, evaporare et in crystallos cogere. — Man hat dieses Salz bei Ruhr empfohlen.

Solutio Nitratis Sodae. (B*, E2.)

R. Nitratis Sodae
semunciam (vel. unciam E2.)
Gummi Arabici . . grana decem.
Aqua uncias octo.
Gabe, alle Stunden einen Löffel. Von
Dr. Meyer bei Ruhr empfohlen.

Hydrosulphas Sodae. (Vm.)

R. Sodae caust. calcin. . . partem.
Aqua partes sex.
Post solutionem torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem immitte et sepositione clarificatum serva.

Balneum sulphurosum (Ca.)

R. Hydrosulph. Sodae unc. decem.
Solutionis salin. gelat.
un. quatuor.

Man thut es im Augenblicke des Badens in das Badewasser.

Protoacetis Sodii, Acetas Protoxydi Sodii, Acetas s. Acetis Sodae, Acetas Sodae crystallisatus, Acetis Sodae, Deutoacetis Sodii, Sal Sodae acetatum, Sal acetosum minerale, Acetas natrium, s. natrium cum Aqua s. natrium hydricum s. sodicum, Alkali minerale acetatum, Natrium aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. Tartari crystallisata. (A†, Ba†, Bor5†, Han†, HC†, HN†, HassP†, Li†, O†, Pal† Sax2†, AD, Ams, B, Bel, D, GalP, LPC, R, Sar, Taur, DB, Fi, Gr, Re, Sw, Va, Vm.)

R. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Aceti destillati q. s.
ad saturandum alkali; cola liquorem, qui ad pelliculam evaporatus refrigret, ut crystalli enascantur (quae Aq. dest. abluantur Sax2†.).

Gr. Acidum aceticum Subcarbonate Sodae saturare, filtrare, vaporare etc.
Hautreibend oder cathartisch, je nach der Gabe; letztere von zwei bis vier Drachmen.

Pilulae antilactae s. ad repulsionem lactis. (Bo.)

R. Acetatis Sodae drachmas quinque.
Camphorae,
Nitri, sing. . . . drachmas duas.
Roob Sambuci q. s.
Fiant pilulae centum viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und zwei Abends.

R. Acetatis Sodae,
Pulvis diureticus. (Au†.)
Elaeosacch. Juniperi, sing.
drach. tres.

Scillae grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii grana tria.

Fiant doses sex. — Gabe, täglich drei Stück in Wachholderthee.

Pilulae e Rheo cum Natro acetico s. laxantes. (Au†.)

R. Rhei,
Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspiss., sing. drachm.
Gummi Arabici semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehn bis fünfzehn Stück täglich zwei Mal.

Protoconas Sodii, Meconas Protoxydi Sodii, Meconas Sodae. (Fer.)

R. Acetatis Sodae unciam.
Tinct. Opii alcoh. unc. quatuor.
Digere per dies aliquot, filtra ut crystalli enatae separentur, quae Alcoholis bullientis ope purificentur.
Man hat dieses Salz als ein sicheres Mittel gegen Bandwurm empfohlen; es muß aber mit großer Vorsicht angewendet werden, da es zu einem halben Gran gegeben, schon ein heftiges Gift ist.

Proto-Oleomargaras Sodii.

S. Proto-Oleomargaras Potassii.

Solanum.

Wir führen hier an:

1) *Solanum Lycopersicum*, L.; Fiebesäusel, Goldapfel; Tomate, Pomme d'amour (Gal); Lovapple (Ang.); Elskobæble (D); Tomates (His.); Apletje der liefde (Bel.); Karleksæple (Succ.).

Gal. Taur, Gr.

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Solanaceae, J.) Eine Südamerikanische, in Europa cultivirte Pflanze. (Vumph Amb. V. t. 154. Blackw. t. 133 Planch t. 122.)

Man wendet die Früchte (Mala Lycopersica) an; es sind runde, verschiedentapige, fleischige, saftige, glatte, glänzende, gelbe oder rothe Beeren, welche in einem säuerlichen Fleische eine große Anzahl Samen enthalten.

2) *Solanum Melongena*, L.; Eierfrucht; Aubergine, Melongene (Gal); Eggplant (Ang.); Berinjela (His.); Eierdragende nagtschade (Bel.); Melanzana (I); Beringela (Lus.).

Hi-S. Be. Gr.

⊙ Eine im südlichen Europa cultivirte Pflanze. (Planch t. 123.)

Man wendet die Frucht (pomum Melongenae s. Mala insana) an; sie ist von verschiedener Gestalt und Farbe, bald

weiß und vollkommen eiförmig, bald langgestreckt und violett.

Nährend, lindernd. — Man wendet sie auf schmerzhaftes Hämorrhoidalknoten an.

3) *Solanum nigrum*, L.; schwarzer Nachtschatten; Morelle noire (Gal.); Black nightshade (Ang.); Psy vjno (B.); Svineurt. Soehaer (D.); Hierba moiro (His.); Zwarze nachtschade (Bel.); Solano nero, Solatro, Erba morella (I.); Psinki ziele (Pol.); Herva moira (Lus.); Hansletsgras (Succ.).

Bat. Brt. Wir. Würf. Mt. An. D. Fer. Gal. M. Gal. P. Gen. His. LP. Taur. Re. Br. Fi. G. Gr. Sp. Z.

① Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (Bul. t. 67 Blackw. t. 107. Plenk t. 120. Hayne II. t. 40. Düss. off. Pfl. I. t. 22. Zorn I. c. pl. t. 44.)

Man wendet das Kraut (herba Solani nigri s. vulgaris) an; es besteht aus einem rundlichen, wehrlosen, ästigen, glatten Stängel mit eiförmigen, eckig und spitz gesägten Blättern. Es hat einen angenehmen, betäubenden Geruch und einen Ekel erregenden Geschmack.

Die Beeren enthalten, nach Desfosses, ein eigenthümliches Alkaloid, das Solanin (Solaninum, Solanina).

Reicht schweißtreibend, äußerlich erwärmend und lindernd.

4) *Solanum tuberosum*, L. Solanum hortense; Kartoffel; Pomme de terre (Gal.); Common potatoe (Ang.); Rata inuada (Cy.); Jordeable (D.); Patata de la Mancha (His.); Patata, Pomo di terra (I.); Aardappel (Bel.); Ziennce jablko (Pol.); Batata da terra (Lus.); Jordpaeron (Succ.); Wal arai kilangu (Tam.); Uralay gudda (Tel.)

Mt. Fer. Gal. Gal. P. Taur. A. Fi. G. Gr. Re.

② Eine in America einheimische, von Walter Raleigh im Jahr 1584 nach Europa gebrachte Pflanze. (Bauh. Prodr. t. 39. Plenk t. 121. Bert. Bild. II. 56. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Der Gebrauch der Wurzel (Poma terrestria) in der Küche ist allgemein bekannt.

In der Medicin wendet man das Stärkemehl (*Amylum Solani tuberosi*) an, welches diese Wurzel in großer Menge enthält.

Das Kraut und dessen Saft gilt für krampfstillend. Latham empfiehlt das Extract davon.

Solanum incanum (Gr.) Blätter gegen Krebs.

Decoctum narcoticum. (Ra. Va. M. de Santé).

R. Fol. sicc. Solani nigri unc. duas.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Capita Papaveris albi . . . no. 4.

Aquae . . . libras duas.

Coque et cola. — Lindernd und befeuchtend, in Bähungen, örtlichen Bädern, Einspritzungen und Klystiren anwendbar.

Succus Solani nigri. (DB.)

Paratur ut succus Cicutae.

Extractum Solani nigri. (DB.)

Ut extractum Cicutae.

Oleum Solani nigri. (Gal. P. Hi. His. DB. T.)

R. Herb. Solani nig. c. Sem.

part. unam.

Olei Olivarum . . . partes tres.

Digere per aliquot tempus inter cineres calidos, tunc ad consumptionem humid usque coque. (His.)

His. Herbae libras tres, Olei octo, macerationem solis calore, aut loco calido, per triduum aut quadriduum et caetera ut antea; — Gal. P. Foliorum partem unam et duas Olei; — T. Herbae uncias duodecim, Olei libras quatuor, digestionem per horas 24, filtrationem olei, expressionem faecum, novam cum aequali Summitatum et Florum copia levem coctionem per aliquot momenta, filtrationem et expressionem et denique sepositionem olei ut clarificetur; — DB. Herbae et olei partes aequales.

Unguentum Solani. (DB. Sp.)

R. Extracti Solani cum Aquae guttis nonnullis mollefacti

drachmas quatuor.

Axungiae Porci . . . uncias quatuor.

Misce. (DB.)

R. Succ. Fol. et Bacc. Solani expr.

uncias triginta sex.

Olei Olivar. unc. 54.

Cerussae unc. octodecim.

Lithargyri uncias triginta sex.

Coque et adde

Cerae albae uncias sex.

Pulveris Olibani uncias tres.

(Sp.)

Aqua Solani nigri. (Br. Pal. Gal.)

R. Herbae Solani nigri partem unam.

Aquae partes tres.

Destillent dimidia pars. (Br. Pal.)

Gal. Herbae partes quinque in Aquae

duodecim cum dimidia submersas, de-

stillando partes decem abstrahere, pro-

ductum miscere cum Herbae partibus

quinque et Aquae decem, destillando

iterum partes decem abstrahere et ope-

rationem, si necessarium videtur, ter-

tio repetere.

Pulpa Solani tuberosi. (GalP.)

Paratur ut pulpa Patientiae.

Faecula s. Amylum Solani tuberosi, Farina Potatoes. (B*. Bel. Fer. Gal. Taur. DB. Fi. Gr. Re. T. Vin.)

R. Pomorum terrest. lot. . . q. v.
 Raspa, pulpam commisce cum Aquae tanta quantitate ut per cribrum e crinibus textum possit transmitti; liquorem turbidum exinde profluentem in vase porcellaneo (Fajence) excipe, sive pone, faeculam lotionibus reiteratis purifica et blando calore loco obscuro sicca.

Fi. Poma terrestria rec. rasa in vas Aqua repletum immittere, faeculam ad fundum descendentem pluries lavare et siccare; — T. Poma terrestria rasa vel molita Aqua multa super cribro e crinibus confecto tractare etc.

Catuplasma cum Faecula. (GalP.)

R. Faeculae Solani tuber.

uncias duas.
 Aquae communis . . . libram.
 Aquae bullienti admisce Faeculam in Aquae frigidae uncias duabus vel tribus solutam, ebulliat semel vel bis.

Gelatina ex Amylo Solani tuberosi. (B*.)

R. Faecul. Solani tuber. . . unciam.
 Aquae . . . libram.
 Syrupi Sacchari . . . unciam.
 Coque sufficienter.

Tinctura Solani nigri aetherea (GalP.)
 ut tinct. Cicutae aetherea paratur.

Solanina, Solaninum. (DB. Gr. Ma.)

E Succo Baccarum Solani nigri penitus maturarum, cui filtrato adde Ammoniam, filtra, sedimentum ablue, coque in Alcohole, filtra et spiritum destillando abstrahere, quo facto solanina sub pulveris albi forma remanet.

Acetas Solaninae. (Gr. Re.)

Ut acetum morphinae paratur. — Zu 1 Gran ein kräftiges Brechmittel.

Soldanella.

Calystegia (Convolvulus, L.) *Soldanella*, Röm. et Sch.; Meerfohl, Seefohl, Meerwinde, Meerstrandwinde; Soldanelle, Chou marin (Gal.); Seabindweed (Ang.); Saesnerle (D.); Soldanella (His. I. Lus.); Zeewinde (Bel.); Sjaevinda (Suec.).

Brf. Wirf. Mf. Gal. Taur. Be. Gr. Re. Sp.

4 (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine in Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (Lob. Ic. t. 602. Plenck t. 93)

Man wendet das Kraut (herba Soldanellae s. Brassicae marinae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit runden oder nierörmigen, am Grunde herzformig ausgerandeten, glatten, sehr langgestielten Blättern.

Purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu anderthalb Drachmen.

Sonchus.

Sonchus oleraceus, L.; Kohlgänsedistel, Gemüsehänsenfohl; Laiteron commun (Gal.); Common Sowthistle (Ang.); Svinetistel (D.); Gorrja (His.); Melkdistel (Bel.); Sonco (I.); Mlezne (Pol.); Serrutha (Lus.); Mjaelk tistel (Suec.).

Brf. Mf. Gal. Taur. G. Gr. Sp.

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, Cass.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 148. Blackw. t. 30. 130. Hayne I. t. 45)

Man wendet das Kraut (herba Sonchis s. Cicerbitar laevis et asperi) an; es besteht aus einem ästigen, wulstigen, glatten, hohlen Stängel mit abwechselnden umfassenden, glatten, gewöhnlich schrotsägeförmig, in spitzige, gezähnte Lappen, mit dreieckigen, sehr großen Endlappen getheilten Blättern. Es hat einen schwach bittern Geschmack.

Sorbus.

In den Pharmacopöen werden angeführt:

1) *Sorbus domestica*, L.; Spierlingsbaum, Eschdöleinbaum; Cormier (Gal.); Sorbo officinale (I.)

Wirf. Gal. Taur. Be. Br. Gr. Re.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Europa's. (Jacq. Austr. V. t. 447. Plenck t. 391.)

Man wendet die Frucht (fructus Sorbi) Corne, Sorbe (Ga.) an; es ist ein kleiner birnförmiger Apfel, welcher drei knorpelige längliche Samen enthält. Sie ist anfangs sehr herbe, wird aber bei anfangender weinsäuerlicher Gährung süß, behält jedoch immer etwas Adstringirendes.

2) *Sorbus aucuparia*, L.; Vogelbeersbaum; Sorbier des oiseleurs (Gal); Mountain Ash (Ang.); Fuglebaer (D.); Serbar de cazador (His.); Sorbenboom (Bel.); Sorbo selvatico (I.); Jakszebina (Pol.); Serveira brava (Lus.); Roenn (Suec.).

Bt. Ful. Li. Fer. LP. Snec. Be. Gr. R. Sp.

Ein Baum (*Icoandria Trigynia*, L.; *Rosaceae*, J.), welcher in ganz Europa wächst. (Zorn Ic. pl. t. 440. *Plenck* t. 392. *Düss. off.* Pl. VI. t. 9. *Blackw.* t. 173.)

Man wendet die Früchte (*baccæ s. pomma Sorbi aucupariae s. Fraxini sylvestris* an; es sind kleine, runde, hellrothe, weiche, an der Spitze mit einem Nabel versehene Beeren, welche drei körnelige Saamen enthalten. Ihr Geschmack ist adstringirend, sauer und unangenehm. — Die Vogelbeersäure (*Acidum sorbicum*), von welcher er herrührt, ist, nach *Labbé*, *Larbière* und *Braconnot*, nichts anders als Äpfelsäure.

Adstringirend, harn-, wasserreibend, antiscorbutisch.

Pulpa Baccarum Sorbi. (DB. T.)

Fructus sicci coquantur cum Aquæ bull. q. s. ad mollitiem usque, et nucleis separatim in mortario contendantur; tralice pulpa per crinium.

Conserva Fructuum Sorbi. (DB. Fl. T.)

R. Fruct. Sorbi non matur. . q. v. Coque ad mollitiem, tunc cum Sacchari pondere aequali ad conservæ consistentiam.

T. Pulpæ Sorbium libras quatuor, Syrupi parati cum Liquido Decocti Fructuum et ad plumam evaporati libras sex ad consist. necessariam vaporando redigere; — DB. ut conservam Jujubarum.

Roob Sorbi aucupariae. (Ful. Li.)

R. Bacc. Sorbi auc. contus. libr. octo. Infunde tantam Aquæ quantitatem ut digiti crassitiem tegantur et vase leni igni imposito coque per emthoræ, cola fortiter exprimendo, colaturæ adde Sacchari libram et blando igne ad consist. requiritam consume.

Kühlend, harntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spigelia.

Von dieser Pflanzengattung finden sich:

1) *Spigelia anthelmia*, L.; wurmwidrige *Spigelia*; *Spigelia anthelmintique* (Gal.); *Arapubaca* (Br.); *Espigelia* (Lus.).

Erst. Saxt. Wirt. Würt. Mt. Ams. B. D. Fer. Gal. R. Taur. G. Gr. Re.

© *Pentandria Monogynia*, L.; *Gentianeae*, J. Eine Nordamerikanische Pflanze. (Desc. Fl. Ant. I. 61. *Düss. off.*

Pl. V. t. 2. *Lam.* III. t. 107. *Plenck* t. 88. *Zorn* Ic. pl. t. 469.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Spigeliae anthelmiae*) ist klein und faserig. — Das Kraut besteht aus einem runden Stängel, an dessen Spitze vier große, winkelförmig geklammerte Blätter entspringen.

2) *Spigelia Marylandica*, L.; Marylandsche *Spigelia*; *Spigelia de Maryland* (Gal.); *Carolina pink*, *Indian pink*, *Snake root* (Ang.).

Ful. Li. Saxt. Wirt. Mt. AD. Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. Hist. Lon. LonN. LPC. Lus. R. Suec. Taur. Be. Br. C. CG. Gr. Re.

4 Eine Nordamerikanische Pflanze. (Ca. Carol. 2. p. 7. t. 78. *Plenck* t. 89. *Düss. off.* Pl. Suppl. V. t. 11. *Schk.* t. 37. *Hayne* *Termin. bot.* t. 44. f. 5. *Bigel.* t. 14.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Spigeliae Marylandicae*) ist einfach und faserig. — Das Kraut besteht aus einem vierseitigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, eiförmigen, ganzen, spitzigen, glatten Blättern. Es hat einen häßlichen veräulenden Geruch und einen bitteren, ekelhaften Geschmack.

Reizend, wurmwidrig, laxirend. — Gabe des Pulvers, für Kinder von zwölf Jahren zwölf Gran, für Erwachsene eine Dache.

Pulvis cum Spigelia s. vermifugus. (E2.)

R. *Spigeliae Marylandicae*, gr. sedecim. Mercurii dulcis . . grana octo.

Auf eine Gabe. Man giebt es zwei Morgen hintereinander und den zweiten Tag Nachmittags und darauf Ricinöl oder Senna und Manna. Für Kinder, welche über 4 Jahr alt sind.

Decoctum Spigeliae. (Ful. Würt.)

R. Herb. Spigel. anthelm. manip. duos. Aquæ fontanae . . libras duas.

Coque et colaturæ adde

Succi Citri rec. expr. drach. sex.

Syr Flor. Persicae . . unc. duas.

Aquæ . . libras duas.

Gabe, alle sechs Stunden zwei bis drei Unzen für einen Erwachsenen.

Infusum anthelminticum s. Spigeliae anthelmiae. (Ful. AD. Am. B. C. E2. Sa. Sw.)

R. Herb. Spigel. anthelm. semunciam.

Aquæ bullientis . . uncias sex.

Macerā per horas duas et cola. (Z. Sa. Sw.)

AD. Am. et C. Spigeliae maryland. drachmas duas, Aquae semioctarium, et quatuor horas digestionis; — E2. Radicis unciā, Aquae bull. octarium. — Ein bis zwei Eßlöfel für ein Kind, 1 bis 4 Unzen für einen Erwachsenen.

R. Herbae Spigeliae drachmas tres
Aquae bullientis uncias quatuor.
Adde colaturae

Olei Rutae . . . guttas duas.
Misce bene. (Ful†)

Gabe, Abends anderthalb bis zwei Unzen. — Man kann zwei Drachmen Serpentaria zusetzen.

Infusum Spigeliae compositum s. vermifugum. (F2. Gr.)

R. Spigeliae Marylandicae semunciam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Mannae . . . unciam.
Foeniculi drach. duas ad quatuor.
Aquae bullientis . . . octarium.

Gabe, ein Glas täglich drei oder vier Mal, für ein Kind von zwei Jahren. (E2.)

R. Radicis Spigeliae . . . semunciam
Foliorum Sennae drachmas duas.
Corticis Aurantii,
Seminum Santonici.

— Foeniculi, sing. drachmam.
Aquae ferventis uncias duodecim
Macerā per h. orium. — Morgens nüchtern ein Weinglas voll, gegen Spulwürmer (Gr. Sprague.)

Syrupus Spigeliae. (Ca.)

R. Fol. Spigeliae anthehm unc. duas.
Sem. Anisi contus. semidrachmam.

Aquae . . . uncias sex
Infunde in balneo aquae per horas sex vel septem, cola fortiter exprimendo et adde

Extr. Jalapae gumm. semunciam.
Dissolve, filtra et colaturae adde
Sacchari albi . . . duplum

Gabe, zwei Kaffeelöffel täglich für Kinder; für Erwachsene ein Eßlöfel Morgens und Abends in einer halben Tasse Beihel.

Spinacia.

Spinacia oleracea, L.; Spinat; Epinard commun (Gal.)

Br†. M†. Gal. Taur. Be. Gr.

☉ oder ♂ (Dioecia Pentandria, L.; Atriplicaceae, J.) Eine Pflanze, deren Vaterland nicht bekannt ist, und welche man in Europa in Küchengärten baut. (Encycl. méth. t. 814. Plenck t. 711. Blackw. t. 49. f. 2—4. Schk. t. 324.)

Man wendet das Kraut (herba Spinaciae s. Spinachae) an; es besteht aus einem geraden, etwas ästigen Stängel mit gestielten, pfeilförmigen, dunkelgrünen Blättern. Sein Geschmack ist fade. Erweichend

Spiraea.

Von dieser Pflanzengattung findet man:

1) Spiraea Filipendula, L.; Spierstaude, Filipendelwurzel, rothe Steinbrechwurzel; Filipendule (Gal.); Dropwort, Hardhack (Ing.); Roede steenbreck (D.); Roode steenbreck (Bel.); Filipendula (I.); Kropidelco muicysze (Pol.); Brudbroed (Succ.)

Br†. L†. Wir†. Wür†. M†. Gal. His3 Taur. Be. G. Gr. Sp.

2) Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Europäische Pflanze (Zorn Ic. pl. t. 394. Hayne VIII t. 30. Plenck t. 399)

Man wendet die Wurzel (radix Saxifragae rubrae s. Filipendulae) an; sie besteht aus vielen dünnen, mit fleischigen, rundlichen oder länglichen Höckern besetzten Fasern, ist außen dunkelbraun oder schwärzlich und innen röthlichweiß, hat bloß im Herbst einen Drangengeruch und einen süßlichen Geschmack, welcher bei'm Trocknen abstringirend und bitterlich wird.

In Rußland wird von den Kosaken der Aufguss der Blätter gegen Bandwurm angewendet.

3) Spiraea Ulmaria, L.; Geißartwurzel, Wiesenkönigin, Sumpfspierstaude; Reine des prés (Gal.); Queen of the meadows (Ang.); Mhaedurn (D.); Reyno del prado (His.); Reynette (Bel.); Regina degli prati (I.); Rozia brodka (Pol.); Rainha dos prados (Lus.); Micaaert (Succ.)

Br†. Wir†. M†. Gal. Gen. Hi3 Taur. Be. Gr. Sp.

4) Eine Europäische Pflanze (Zorn Ic. pl. t. 141. Hayne VIII t. 31. Düss. off. fl. V. t. 6. Plenck t. 400.)

Man wendet die Wurzel, die Blätter und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Farbae caprinae s. Barbulae caprinae s. Ulmariae s. Reginae pratensis) ist walsig, ungleich, mit reichlicher Behaarung versehen, außen schwärzlichbraun, innen röthlich oder gelblich, von etwas bitterem und styptischem Geschmack. — Die Blätter sind gesiedert, am Ende mit einem unpaarigen dreilappigen Blättchen, die Blättchen sind abwechselnd groß und klein. — Die Blüthen sind weiß und haben einen schwachen, aber angenehmen Geruch nach bitteren Mandeln, welcher

sich beim Trocknen verliert und einen süßen, etwas adstringirenden Geschmack

Gr. führt noch *Spiraea salicifolia*, Saa-men adstringirend; und *Sp. tomentosa* (AD.) an, wovon die Blätter in Abkochung, eine Unze auf eine Pinte Wasser, oder als Extract zu fünf bis funfzehn Gran gegen Durchfälle und Cholera der Kinder als tonisches und adstringirendes Mittel empfohlen werden.

Aqua Ulnariae a Gr. indicatur.

Spongia.

Spongia marina, officinalis; Badeschwamm, Meereschwamm, Wafschwamm: *Sponge de mer* (Gal.); *Sponge* (Ang.); *Isfenj* (Ar.); *Eponjas* (His.); *Muabidul* (Hia.); *Spons* (B.L.); *Spugna* (I.); *Univatta* (J.); *Abermurdeh* (P.); *Esponja* (Lus.); *Badswamp* (Succ.).

A† B†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir. Wür†. Wv†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. Lus. Pol. R. RC. Succ. Taur. A. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.

Ein faseriges Geflecht oder vielmehr Filz von verschiedenen Seeförnern, welche hinsichtlich ihrer Organisation an den Gränzen des Thierreichs stehen.

Man wendet vorzugsweise den lappigen Seeschwamm, *Spongia lacinulosa*, Lmk. *Acyonium lacinulosum*, Schw. (Esp. Pflzth. II. t. 15—17, *Eponche pluchée* (Gal.), aus dem Mitteländischen, dem rothen Meere und dem Indischen Ocean an. Er ist rundlich, platt, kaum lappig, weich, sitzig, sehr löcherig und auf der Oberfläche mit unzähligen Höpchen bedeckt.

Gyfe hat Tod darin gefunden.

Spongia praeparata. (A† Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. Ams. An. D. Fenn. Fer. GalM. GalP. His3. LH. Lus. Pm. Succ. Taur. Br. DB. Fi. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Ohne Wachs. *Spongia praeparata absque cera, Spongiae compressae*.

R. *Spongiam tener, lotam et mund.*

Humidam (longitudinaliter quadrifariam scissam Taur.) adhuc funiculis circumductis constringe fortiter, gyris funiculi ita contiguos, ut nullus intersit spongiae exitus, nodoque facile solubili retine, sicca sedulo et in loco

bene sicco serva. (Fer. GalM. GalP. LH. Pm. Taur. DB. Fi. Re. Sw.)

Bor5†. *Spongiae in frustula oblonga scissas et Aqua fervida humectatas constringere*; — His3. *Spongiam in longos lobos concisam Albumini Ovi immergere antequam funiculis circumstringatur*; — Vm. *Mucilage Gummi Arabici illam imbibere*.

2) Mit Wachs. *Spongia cerata s. praeparata cum Cera, Spongiae ceratae*.

R. *Spongiam tener, sicca, bene lotam et ab omnibus alienis libera, in Ceram flavam (vel Empl. Cerae Re.) igne liquatam immerge, interpositam deinde laminis duabus stanneis in balneo aquae calefactis (prelo HN†.) comprime et post refrigerationem exime.* (A† Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. Ams. An. D. Fenn. Fer. GalM. GalP. LH. Lus. Succ. Br. DB. Fi. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

Man bedient sich desselben, um Ristgänge und natürliche oder widernatürliche Oeffnungen zu erweitern. In die gehörige Form geschnitten, giebt er die *Turundae intumescens*, Gr., welche zu den eben angegebenen Zwecken benutzt werden.

Spongia dealbata. (AD. Gr.)

Spongiam macerando in Acido muriatico dilutissimo omni materia calcaria liberatam per quinque vel sex dies in Aqua frigida, frequenter alia restituenda et spongiam quaque vice bene premendo, tunc vero per septimanam in Acido sulphureo macera vel actioni Chlorinae expone, acidum saepius mutando ablue et Aquae Rosarum vel Florum Aurantiorum odoriferam redde.

Stachys.

Stachys recta, L.; Berufskraut; Crapaudine (Gal); White stachys (Ang.); *Estaguis recta*, Yerba de feridura (His.). Wir†. His3. Sp.

2) *Didynamia Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Jacq. Austr. IV. t. 359. Plenck t. 470. Düss. off. Pfl. Suppl. II. t. 15. 16.)

Das Kraut (herba Sideritidis hirsutae) besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen, schwach behaarten Stängel mit elliptischen oder lanzettförmigen, herzförmigen, gekerbten, raub anzufühlenden Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften Geschmack.

Reizend, für ein Wundmittel geltend.

S t a n n u m.

Jupiter; Κατιεργος, Σταγγος; Binn; Etain (Gal.); Tin (Ang. Bel. D.); Münster, Resas (Ar.); Redil (Ehr.); Caimathbar (Chald.); Xifilil (Ind.); Pazaz (Arab.); Yang seih (C.); Runga (Dak.); Estanno (His.); Kulai (Hin.); Stagno (I.); Fima (Mal.); Uriz (Pe.); Cyna (Pol.); Estanho (Lus.); Olowo (R.); Trapu, Ranga (Sa.); Tenu (Suec.); Tagarum (Tam.); Galai (Tel.).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wü†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur. A. C. CG. DB. Fi. G. Gr. Par. Sa. Sp. T. Va.

Ein derbes, fast silberweißes, weiches Metall, welches sich in Bleche schlagen läßt, wenig streckbar, bei 210° schmelzbar, nicht flüchtig ist und durch feuchte Luft nur wenig verändert wird. Spec. Gewicht = 7,291. Wenn man es biegt, läßt sich ein eigens Geräusch hören.

Stannum pulveratum s. praeparatum s. granatum s. raspatum, Linatura s. Linaturae Stanni, Oxydulum Stanni, Pulvis Stanni s. Stanni philosophice praeparatus. (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wü†. AD. Am. An. B. Bel. Du. Fer. Gal. GalP. LoP. R. Sar. Suec. Taur. C. Fi. Gr. Re. Sa. Sw.)

B. Stanni Anglici q. v. Limae subtilis ope diminut et pulverem cribratum ad usum serva. (Ba†. Bor5†. Br†. HassP†. Pal†. Sax2†. Am. Du. Fer. GalP. C. Sw.)

Li†. antequam servetur, coquere in Aceto jubet, donec hoc supremum a Subcarbonate Potassae non amplius praecipitatur.

B. Stanni puri q. v. Fusum in pyxidem ligneam interne hispidam et creta detritamingere, quam clausam vehementer agita; pulverem per cribrum trajice. (A†. O†. Pal†. Wü†. B. Gal. Sar. Suec. Taur. Fi. Gr.)

AD. GalP. DB. Gr. praeterea: Stannum in mortario ferreo fusum, dum refrigerat, agitare, ut in pulverem abeat, qui per cribrum trajiciatur.

B. Limaturae Stanni . partes duas. Cretae pulveratae partem unam. Contere in mortario. (R)

Sa. Stanni drachmas tres et Corallii unciam.

B. Stanni foliati,

Sacchari albi, sing. . part. aeq. Contere, per cribrum trajice, coque pulverem in Aquae magna copia et deinde scca. (An.)

Bel. Sa. culinare contundere in mortario cal-facto, illi superfundere deinde stannum fu-am, pistillo celeriter et fortiter agitando, donec massa sit bene pulverata, tunc lotam et siccata per cribrum trajicere.

B. Limaturae Stanni . partes duas. Oculor. Cancrorum part. unam.

Contunde simul (Ful†.)

Gine Anzemit vier Unz. Honig oder Syrup.

Pulvis Stanni facitius (Gr.): Cinerum Stanni libras quatuor, Eboris usti uncias quatuor. Statt der Binnseile, bringt aber bisweilen üble Wirkung hervor.

Pulvis vermifugus. (Ca.)

B. Stanni pulverati unciam.

Aethiops mineralis scrupulos duos. In sechs Gaben in Syrup, Theriak und Honig, zwei Mal täglich zu nehmen.

Pulvis Stanni cum Deutosulphate Ferri s. Stanni mariatus s. ferratus s. vermifugus. (A†. LH. Sa. Sw. Va.)

B. Limaturae Stanni drachmas duas.

Sulphatis Ferri . grana quinque.

Contrita in partes quinque divide. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Bolus e Stanno s. vermifugus. (Sa. Sw.)

B. Pulveris Stanni semi-crupulum.

Con-erv. Cort. Aurant. scrupulum.

Syrupi Sacchari q. s.

Electuarium e Stanno s. vermifugum. (Ca. E2. Pie. Ra.)

B. Stanni pulv. drach. sex ad unciam.

Mellis despumati (Sacchari liquidi E2.) uncias quatuor.

Gabe, Morgens zwei oder drei Löffel. (E2.)

Electuarium anthelminticum (Par.):

Stanni Linat. unc. iij, Confect. Ros.

Gall. unc. β, Syr. q. s. Täglich früh

ein Eßlöffel, und drei Mal zu wiederholen,

worauf der Kr. einen Purgirtrank nimmt.

B. Stanni pulverati unciam.

Extracti Artemisiae,

Pulv. Jalapae, sing. . drachmam.

Syr. Cichorii comp. q. s.

Auf zwölf oder fünfzehn Mal in einer

halben Stunde Zwischenraum, indem man

eine Tasse Kräuterbouillon dazu trinkt.

(Ra. Va. Char.)

B. Stanni pulverati unciam.

Radice Filicis maris drachmas ex.

Seminum Cinac semunciam.

Jalapae,

Sulph. Potassae, sing. drachmam.
Mellis q. s.
Gabe, Morgens alle halbe Stunden ein
nen halben Kaffeelöffel voll. (Aur. Ca.
Pie.)

Amalgama Stanni s. Hydrargyri cum
Stanno s. Jovis, Pasta Jovis (Würf.
Am. His3. C. Sa.)

R. Stanni uncias duas.
Mercurii uncias tres.

Calefac mercurium in crucibulo, do-
nec in vaporem converti coeperit, in-
funde stannum seorsim igne liquatum
et miscellam in mortario marmoreo
agita, Salis comm. paucillum addendo,
ablue deinde bene et in linteo sicca.
(His3.)

Su conjungere simul Mercurii drach-
mas tres et Stanni uncias duas et amal-
gama, trititando in mortario marmo-
reo, in pulverem redigere; — Am. et
C. conjungere simul Stanni partes quin-
que et duas Mercurii et amalgama te-
rere cum Cretae praeparatae parte una,
donec splendorem metallicum penitus
amiserit; — Würf. Stanni et Mercu-
rii, sing. unciam commiscere et mix-
turam refrigeratam simul cum Con-
charum praep. uncia pulverare.

Pulvis vermifugus (Sa.)

R. Amalgamatis Stanni semidrachm.
Rhei pulverati,
Antimon. diaphor. non ablutⁱ, sing.
grana decem.
Zweimal täglich.

Pilulae anthelminticae. (Sw*)

R. Amalgamatis Stanni . . . q. v.
Inter cineres calidos impone ut me-
talla oxydentur, adde
Extracti Absinthii . . . q. s.
Fiant pilulae granorum sex. — Ga-
be, Morgens vier, sechs oder acht Stück.

Electuarium joviale ad taeniam s. ver-
mifugum. (Brf. Würf. Ca. Sp. Vm.)

R. Stanni puri,
Mercurii, sing. unciam.
Fiat amalgama, quod cum
Concharum praep. uncia
in pulverem redige, cui sensim adde
Conservae Absinthii uncias duas,
Syrupi Menthae q. s.
ut fiat electuarium. (Brf. Würf. Ca.
Sp.)

Vm. loco subcarbonatis calcis (con-
char.) Magnesiam calcinatam et loco
syrupi menthae illum Sacchari adhibet.
Gabe, zwei Drachmen täglich zwei Mal.

Unguentum empiricum Tlaki in tumo-
ribus haemorrhoidalibus s. antihae-
morrhoidale. (B.)

R. Limaturae Stanni,
Mercurii, sing. . . drachmas duas.
Fiat amalgama, cui adde
Unguenti rosati unciam.
Praecipitati rubri drachmas duas.
Olei Menthae pip. guttas viginti.
Misce trititando.

Cineres Stanni (Gr.): Scorias a Stan-
no modo liquato usque colorem albi-
dum accipiant, calcina; vel: Stannum
liqua in Plumbi pari pondere vel ses-
quiuncia, ignem ad ruborem mixturae
auge.

Protoxydum Stanni, Suboxydum Stanni,
Stannum suboxydatum s. pulveratum,
Pulvis Stanni. (Pal^t. B*. Gr. Sw.
Vm.)

R. Stanni puri q. v.
In fusione bene aëri aperto exposi-
tum, donec totum in pulverem griseum
sit conversum, quem tritam cribra.
(Pal^t. Gr. Sw. Vm.)

R. Chlorur. Stanni in Aqua soluti

q. v.
Potassae caust. liq. q. s.
ad praecipitandum et dissolvendum oxy-
dum; filtra solutionem et Acidum hy-
drochloricum infunde ut oxydum prae-
cipitetur. (B*)

Burmwidrig, purgirend, besonders gegen
Bandwurm in Gebrauch, aber auch gegen
Lungenwindsucht gerühmt. — Gabe,
fünf bis sechs Gran.

Antihecticum Poterii, Bezoarticum jo-
viale, Cerussa jovialis, Peroxydum
Stanni. (Wurf. Sar. DB. Gr. Sp. Vm.)

R. Stanni unciam.
Nitri uncias tres.
In crucibulum rubro ardens immissa
calcinentur et calx bene abluatur.

R. Reguli Antimonii partes quatuor.
Stanni subtilis

part. quinque c. dimidia.
Liquata igne in laminam metalli fri-
gidam effunde et cum Nitri pulverati
partibus quindecim commisce; in cru-
cibulum incandescensingere et mixta
fusa que prope ignem adhuc per ali-
quot tempus retine, tunc refrigerata
cum Aqua frigida ablue et blando ca-
lore sicca. (Vm.)

Wurf. et Sp. Reguli uncias sex, Stan-
ni duas et Nitri viginti quatuor; —
Sar. Reguli sex, Stanni tantidem et
Nitri triginta sex; — Gr. Reguli, Stan-
ni, sing. partes aeq. mixtae cum Nitri

triplo deflagrant et bene abluantur. — *DB.* Antimonii, Stanni, sing. partem unam, Nitri partes tres.

Ehedem für geeignet gehalten, Blut- und Saamenflüsse zum Stillstand zu bringen und colliquative Schweiß Schwind- süchtiger zu mindern. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends.

Persulphuretum s. Bisulphuretum Stanni, *Oxydum nigrum Stanni s. Stanni hydrosulphuretum*, *Stannum sulphuratum*, *Stannum praeparatum cum Sulphure*, *Protosulphuretum Stanni*, *Sulphuretum Stanni*, *Aurum mosaicum s. musivum*. (*An. B*. Fer GalP. Pm. Taur. Br. Ca. DB. Fi. Gr. Re. Sw*. T. Vm.*)

Rx. Stanni pulverati . . . uncias tres. Sulphuris sublimati . . . unciam.

In crucibulum supra carbonem ardentem ingesta calefac, donec flamma vivacissima appareat, ab igne remove, obtege crucibulum et massam refrigeratam porphyrisa et cribra. (*An. Fer Pm. Br. Ca. Fi. Re. T*)

DB. Stanni uncias tres cum dimidia. Taur. Stanni purissimi uncias novem in crucibulo fusi addere Sulphuris pulver. uncias quatuor, ope spatulae ferreae exacte miscere, ignem sensim adaugere, donec massa liquecat, revolvere, effundere in laminam ferream, cum refrigerit, in pulverem tenuissimum redigere et in phiala vitrea bene clausa servare.

Vm. Calcinare simul Oxydi Stanni partes septem et Sulphuris in baculis quatuor cum dim.

Rx. Chlorureti Stanni . . . q. v. Infunde Hydrosulphatem Potassae liquidum, donec nullum amplius enascatur praecipitatum, quod siccatum ad ruborem usque calefac. (*Sw*. Vm.*)

Gr. Stannum in Acido muriatico dissolve, per Subcarbonatem Sodae praecipita, praecipitatum cum Sulphuris pondere dimidio misce et sublima.

Gr. Limaturae Stanni, Sulphuris, Salis Ammoniaci, sing. partes aequales sublima.

Rx. Stanni . . . partes duodecim. Mercurii . . . partes tres. Florum Sulphuris partes septem. Salis Ammoniaci . . . partes tres.

Tere lenteque calefac, quamdiu Gas acidum sulphuricum evolatur, calcina deinde fortiter, donec massa squamosa splendens flava remaneat. (*B*.*)

GalP. Mercurii et Salis Ammoniaci, sing. partes sex; — *Gr.* Quatuor ingredientium, sing. partes aequales.

Blaine's powder (Re.): Praeparatum e Stanni sulphureto ignotum.

Pulvis vermifugus. (Sw.)*

Rx. Persulphureti Stanni partes tres. Mercurii . . . partem unam. Tritura ad mercurii extinctionem usque. — Besonders bei Bandwurm empfohlen. — Gabe, von zwei Drachmen bis eine halbe Unze, Morgens in Vermuths conserve.

Oxydum Stanni. (Gr.): Stannum in Aqua regia in vase parvo tecto solve, re et protinus in Solutione Potassae Subcarbonatis q. s. ad acidum saturandum effundere, filtrare et lavare.

Chloruretum Stanni, Liqueur fumans Libavii. Butyrum Stanni, Murias superoxygenatus Stanni, Deutomurias Stanni, Deutohydrochloras s. Hydrochloras Stanni, Murias Stanni s. Oxyduli Stanni. (*Ba†. B*. DB. Vm.*)

Rx. Stanni . . . partem unam. Acidi hydrochlor. concentrati partes tres.

Dissolve caloris ope et crystallisationi subijce.

Ein heftiges Purgirmittel. — Gabe, zwei Gran.

Ba†. dilutum cum Aquae partibus novem ut reagens ad detegendum auri praesentiam indicat; — *DB.* Mercurii partem unam, Stanni partes duas, Mercurii sublimati corrosivi septem miscere exacte, destillare leni calore et liquorem in vitro bene obturato servare. (*Liqueur fumans Libavii.*)

Liqueur Stanni muriatici, Murias Oxyduli Stanni liquidus (HassP†. sec Ba†.) Limaturae drachmae tres in Acidi Salis ex calore 30° vel 40° solvantur, liquorem saturatum a reliquo stanno defunde et cum Aquae dest. duplo dilutum, clarum serva. — *HN†.* Stanni purissimi limati uncia digerendo leni calore in Acidi muriat. puri uncias quatuor solvatur et liquor filtratur. — Ut reagens.

Gr. Stanni granulati partem unam, Acidi muriatici 25° B. quatuor dissolvere, vaporando in crystallos cogere, redissolvere, crys† et iterum dissolvere. (*Murias Stanni, Hydrochloras Stanni*) Reagens.

Stillingia.

Stillingia sylvatica, L.; *Waldstillingie; Queen's-root (Ang.).* AD.

2) Eine in den Nadelhölzern Nordamerica's wachsende Pflanze. (*Monoclea Monadelphica*, L.; *Euphorbiaceae*, J.).

Man gebraucht von ihr die Wurzel, welche breit, dick und holzig ist, gegen Lufteusehe, Hautabsz. und ähnliche Krankheiten, wie die Sarsaparille, als ein alterirendes und abführendes Mittel.

Stitzolobium.

Stitzolobium (*Dolichos*, L.) *pruriens*, P., *Mucuna pruriens*, DC.; *Carpopogon pruriens*, Roxb.; *Ruftrage*, juckende Haseln; *Pois à gratter* (*Gal.*); *Cowhage* (*Ang.*); *Kosambilwail*, *Dewipaghura* (*Ly.*); *Klaende haenne* (*D.*); *Kaueh-kauke-nge* (*Duk.*); *Kiwach* (*Hin.*); *Jeukboontjes* (*Bel.*); *Dolico pizzicaule* (*I.*); *Rawe* (*Ja.*); *Atmagupta*, *Kapikachlu* (*Sa.*); *Punaykalie* (*Tam.*); *Pillia dukugaila* (*Tel.*)

Saxt. Wirf. Mf. AD. D. Du. Ed. Fer. LouN. LoP. LPC. Suec. A. Be. C. CG. Gr. Re.

Ein Strauch (*Diadelphia Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.) Südamerica's. (*Desc. Fl. Ant.* t. 49. *Woodv. Med. Bot.* t. 153.)

Man wendet die Frucht (*Legumen Dolichi*, *Siliqua hirsuta*) an, eine zwei bis vier Zoll lange, fast fingerdicke ledrige, gebogene, überall mit steifen, spröden, stehenden, leicht loszumachenden, glänzenden, braunrothen Haaren (*Stitzolobium*, *setae s. lanugo s. pubes Dolichi s. D. pruriens s. Siliquae hirsutae*) besetzte Hülse.

In America betrachtet man es als wurmwidrig. — Gabe, drei bis sechs Gran in einem Syrup.

Electuarium Dolichi s. Dolichos s. verisugum. (LoP. E2. Gr.)

R. Setar. *Siliquae hirs.* drachmam. Mellis q. s. LoP. *Dolichi drachmam*, *Limaturae Stanni grana nonaginta sex*, *Hydrargyri submuriatis quadraginta octo*, *Syrupi nigri q. s.*; — Gr. loco mellis Syrupum adhibet.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll für ein Kind von zwei bis drei Jahren, bei Spulwürmern.

Stoechas.

Unter diesem Namen werden angeführt:
1) *Lavandula Stoechas*, L.; Stöchas; *Stoechas d'Arabie* (*Gal.*); *Stoechas* (*Bel.*); *D. Suec.*; *French lavender* (*Ang.*); *Cantnosa* (*His.*); *Stecade* (*I.*); *Rosmarinho* (*Lux.*).

Brf. Wirf. Mf. Ams. An. B. Fer. GalP. His3. Taux. Be. Br. Fi. G. Gr. Sp.

Ein kleiner Strauch (*Didynamia Gymnospermia*, L.; *Labiatae*, J.) des südlichen Europa's. (*Zorn Ic. pl.* t. 485. *Planck t.* 472.)

Man wendet die Blüthen (*flores Stoechadis purpureae s. Arabicae*) an; sie sind dunkelpurpurroth und bilden eine gedrängte eirundlängliche Kähre, über welcher ein Büschel gefärbter Blätter steht. Sie haben, besonders gerichen, einen angenehmen, kampherartigen Geruch; ihr Geschmack ist gewürzhaft und bitter.

2) *Helichrysum* (*Gnaphalium*) *arenarium*, Gärtm.; gelber Stöchas; *Stoechas citrin* (*Gal.*).

Brf. Wirf. Würf. Mf. Gal. Be. Gr. Sp.

3) oder 2) (*Syngenesia Polygamia Superflua*, L.; *Synanthereae*, Cass.) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn Ic. pl.* t. 352.)

Man wendet die Blüthen (*flores Stoechadis citrinae s. Germanicae s. Amaranthi lutei s. Helichrysi*) an, welche strahlige, eiförmige, citron- oder gelbgelbe Köpfe bilden. Sie haben fast gar keinen Geruch und einen schwach styptischen Geschmack.

3) *Helichrysum* (*Gnaphalium*) *Stoechas*, Cand.; gemeines Ruhrkraut; *Stoechas de Naples* (*Gal.*); *Eternal flower* (*Ang.*).

Gal. Gr. Re.
4) Eine Südamerikanische Pflanze (*Zorn. Hist. pl.* p. 92. t. 279.)

Man wendet die Blüthen (*flores Stoechadis Neapolitanae s. citrinae*) an; sie bilden strahlige, fast walzenförmige, etwa zwei Linien lange Köpfe und sind gelb und geruchlos.

Syrupus de Stoechade. (*Gal. DB. T.*)

R. Spir. *Stoechadis Arab.* unciam.
Aquae dest. Stoechadis libr. duas.
Digere in balneo Aquae per duas horas et colaturae adde
Sacchari albi duplum.
Liqua in balneo aquae et cola per pannum.

Syrupus de Stoechade s. de Stoechade compositus. (*Wirf. Gal. Vm*)

R. *Cinnamomi* partem unam.
Zingiberis,
Calami, singulorum partes duas.
Foliorum recentium Foeniculi,
— — — — — *Rutae*,
— — — — — *Rorismarini*,
— — — — — *Salviae*,
— — — — — *Thymi*,

Stoechadis, singulorum partes octo.
Aquae partes quingentas.

Destillent partes septuaginta, cum quibus et

Sacchari albi . . . partibus 128
syrupum in balneo aquae para. (Vm.)

R. Spicar. sicc. Stoechadis unc. tres.
Summit. floresc. et sicc. Thymi
unc. quatuor c. dimid.

— Salvia,

— Rorismar., sing. drach. sex.

Seminum Rutae,

— Foeniculi, sing. drach. 4½.

Cinnamomi,

Zingiberis,

Calami, singulorum drachmas duas.

Aquae communis . libras octo.

Macera per duos dies in vase tecto.
tunc liquidi distillatione abstracti semi-
librae adde

Sacchari albi . . . libram.

Residuum exprimendo coletur; co-
laturae adde

Sacchari albi . . libras quatuor.

Fiat coquendo syrupus; syrupum
utrumque refrigeratum commisce (Gal.)

R. Stoechadis Arabicae uncias duas.

Flor. Rorismarini drachmas duas.

Calaminthae montanae,

Origani,

Thymi, singulorum drachmas tres.

Betonicae,

Salviae, singul. . drachmas duas.

Sem. Anisi,

— Paeoniae, sing.
drachm. duas c. dim.

Calami,

Zingiberis, sing. . . drachmam.

Aquae bullientis . . . libram

Macera per dies duos in loco calido,
cola exprimendo et colaturae uccis
novem adde

Sacchari albi . . uncias sedecim.

Solve semel bulliendo etc. cola. (Wirt.)

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Oleum Lavandulae Stoechadis s. Spi-
cae verum s. Lavandulae Spicae (Gr.)
e Floribus et Seminibus.

Storax.

Styrax solidus s. *Calamita*, *Styrax Resina*, *Styracis* s. *Styracis officinalis* Bal-
satum, *Styrax in massis* s. *rubra*, *Thus*
Judaeorum; *Storax*, *Judenweibrauch*;
Στόραξ; *Storax*, *Styrax solida* (Gal.);
Storax (An. D. Suec.); *Usteruk* (Ar.);
Estoraque (His. Lus.); *Styrax* (Bel.);
Storace (I.).

A†. Ba†. Bo5†. Br†. Ful†. HassP†.
HC†. O†. Wir†. Wür†. M† AD. Ams.
An. B. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP.
Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. Suec.

Taur. A. B. Br. C. CG. Fi. G. Gr.
Pid. Re. Sp. Va. Z.

Man unterscheidet 1) *Styrax granulata*
s. *in granis*; *Storax* in Körnern oder
Tropfen; *Storax en grains*, en larmes
(Gal.), in kleinen, durchsichtigen, glänzen-
den, etwas fettigen, unter den Zähnen sich
erweichenden Körnern von angenehmem Ge-
ruch und harzigem Geschmack; 2) *Styrax*
in massis; *Storax* in Stücken; *Storax en*
pains (Gal.); in rötlichen, wohlriechenden,
bisweilen erweichten und eine honigartige
Flüssigkeit gebenden Massen von angeneh-
mem Geruch und bitterem, harzigem Ge-
schmack. Die erstere Varietät ist heutzu-
tage sehr selten; den Alten war sie unter
dem Namen *Styrax Calamita* oder *can-*
nulata, *Calamite* vera bekannt, welchen
seitdem auch die zweite führt. Diese nennt
man *Wandelstorax* (*Storax amandae*), wenn
die Stücke die Größe einer Mandel ha-
ben. *Styrax Calamita* s. *in vesicis*, *Scobs*
styracina (Gr.), in schmierigen auf der
Innenseite marmorirten Blasen.

Dieser Balsam soll von *Styrax officina-*
nale, L., kommen, einem Baume (*Decan-*
dria Monogynia L.; *Ebenaceae*, J.)
des südlichen Europa's und des Orient's.
(Plenck t. 341. Diss. off. Pl. VI. t. 1.
Woolville med. Bot. t. 101. Lam. III.
t. 369. Encycl. méth. t. 369. Vielleicht
kommt er von *Liquidambar orientalis*,
Lmk.

Reizend. — Gabe, von zehn Gran bis
zu einer halben Drachme.

Styrax colata s. *purificata* (Gr. Re.),
bis zum Weichwerden erhitzt und zwischen
erhitzten Eisenplatten durchgepreßt.

Storax purificata s. *rectificata* (AD.
Lon. CG. Gr.), in Weingeist aufgelöst,
ausgepreßt und abgedampft.

Styrax artificialis s. *Calamita facti-*
tia (Gr. Re.): Guaj. rasp. libras duas,
G. Benz. unc. sex, Sang. Dracon. drach.
duas. Eboris usti sesquunciam, Spir.
rectif. q. s. et Bals. Peruv. misce.

Styrax colata factitia (Gr.): Bals.
Tolut. libr. sex, Bals. Peruv. unam et
unc. octo; vel: G. Benz. libr. octo,
Styr. liq. sex, Bals. Tol. tres, Bals.
Peruv. duas, Gum. flav. N. S. W. se-
ptem, Spir. rect. cong. sex, stent per
dies quatuordecim, colentur et destill.
ad consist. propriam redigantur; vel:
G. Styr. libr. tres, Benzoës sex, Bals.
Tolut. duas et unc. quatuor, Aloës So-
cotr. unc. duodecim, Spir. rectif. cong.
sex, digere per tres aut quatuor dies
et adde Bals. Peruv. unc. sex, Ol. Oliv.
opt. unc. quatuor.

Strychninum.

Strychnina, Strychna, Strychnia, Strychnium; Strychnin; Strychnine (Gal.).

HC $\frac{1}{2}$. HN $\frac{1}{2}$. Sax2 $\frac{1}{2}$. B*. Fer. GalP. LPC. Taur. Ca. DB. Fi. Gr. Ma. Re. T.

B. Extr. alcohol Nucis vom. q. v. In Aqua dissoluto adde liquori Acetatem Plumbi liquidum, donec nihil amplius praecipitetur; plumbum ope torrentis Gasi- acidi hydrosulph. separa. filtra, coque cum Magnesia, praecipitatum cum Aqua frigida ablue et in Alcohole dissolve; solutionem ad siccum consume. (Re. in Alcoholicis paxillo macera, strychninum pulveris formam prae se ferens in Alcohole rectif. bulliente dissolve et vapore.)

HC $\frac{1}{2}$. Nucum vomic. rasp. libras duas cum Spirit. Vini rectif. libris octo, antea cum Acidi sulph. conc. drachma mixtis per biduum et defuso liquido iterum per biduum cum Spir. Vini rect. libris sex antea mixtis cum Acidi sulph. concent. semidrachma digerere, liquorem expressione a residuo separare, liquores filtratos et commixtos cum Ebore unto. Acido muratico depurato q. s. per aliquot horas digerere iterum filtrare et spiritum abstrahere, donec residuum circiter sit ponderis librae et dimidia, huic affundere sub perpetua agitatione cum bacillo vitreo Solutionem Kali carbonici aciduli saturatam, donec alcali paulisper praevalere incipiat, liquori filtratione separato affunde Liquoris Kali caustici cum duplo Aquae dest. diluti tantum, q. solutionis Kali carbonici aciduli additum fuerat, praecipitatum in filtro collectum, cum Aqua comm. ablutum, siccatum et pulveratum bis cum quadruplo Alcoholicis absoluti in vitro clauso iteratim per nonnullas horas conquassare; defuso liquore spirituosum residuum in Aquae dest. q. s. ebulliat, donec liquidum filtratum Acido nitrico non amplius rubescat; residuum filtratione separatam, calor ope in Spir. Vini rectificatiss. q. s. solvere et refrigeratione et crystallisatione in pulverem crystallinum redigere; — HN $\frac{1}{2}$. Sax2 $\frac{1}{2}$. Nucum libras octo cum Spir. Frumenti sedecim in vesica destill. alembico instructa decoquere, donec dimidia pars fluidi destillata fuerit, nuces colando separare, siccare et pulverare, pulverem bis terve Spir. Frum. q. s. digerere et exprimere, tincturas destillare et residua tincturae et decocti ad libras duodecim vaporare, addere Plumbum acet. de-

purat. in Aq. dest. s. q. solutum, quamdiu praecipitatum efficitur, liquorem separatim et leni igne ad dimid. evaporatum, refrigeratum miscere cum Magnesia ustae uncis duabus, per triduum seponere, sedimentum filtro separatim, lotum et siccatum in pulverem tritum bis terve cum Spir. Vini rectificatiss. sextuplo digerere, tincturas ad unciam aliquot remanentiam destillare et Strychninum, in retorta sub forma pulveris albi conspicuum, filtratione separatim bis terve Spiritu Vini rectif., Aquae dest. quant. aeq. diuti ad separationem lixivii usque lavare, siccare et servare

B. Nucum Vomice. . . libras duas, Spiritus rectificati . . . congios tres, Acidi sulphurici diluti, Liquori Ammoniae, Magnesia sing. . . . q. s.

Nuces Vomicae contusas coque cum Spiritus congio per horam in retorta, cui receptaculum aptatum est; liquorem effunde et quod restat, cum altero Spiritus congio, et Spiritu recens destillato, iterum et tertio coque et liquorem effunde, residuum exprime et ex liquoribus mixtis et colatis destillet Spiritus; quod restat, ad idoneam extracti crassitudinem consume. Hoc in Aqua frigida liqua et cola, liquorem leni calore consume, ut syrupi crassitudinem habeat. Huic adhuc calenti Magnesium ad saturationem usque paulatim adjice, simul agitando; seponere per dies duos, tum liquorem supernatantem effunde et quod restat, linteo involutum exprime, in Spiritu coque, cola et Spiritum destilla. Reliquo adjice aliquantulum Acidi sulphurici diluti aqua mixti, leni calore macera, seponere per nychthemorum, ut in crystallos abeat, quas exprime et liqua. Denique his in aqua liquatis adde Liquorem Ammoniae, subinde agitando, ut demittatur Strychnia, hanc in spiritu fervente postremo liqua et seponere, ut prodeant purae crystallos (LPC.).

T. proponit ad obtinendum strychninum magis album et purum, illud in Aqua cum Acido nitrico leviter acidulata fervida solvere, adhuc bulliens per carbonem animale filtrare, evaporatione et refrigeratione obtentum strychninum nitricum denuo in Aqua solvere et solutioni Ammonium caust. infundere; praecipitatum exentum in Alcohole solvere et vaporando in crystallos redigere; — Gr. Nucem vom. raspatam ter in Aqua coquere, supermo Acidi muriat. aliquantulum ad-

dendo, decoctum ad syrupi consist. evaporare, addere sing. uncias quinque nucis, Calcis vivae rec. unciam, per pannum colare, sedimentum Alcohole 22° abluere, praecipitatum siccare, et addito Alcohole 36° coquere et quatuor circiter partes quintas vaporare, quo facto alcohole refrigerato, crystalli formantur, quae denuo in Aqua solutae, vaporationi et novae crystallisationi subjectae depurentur; — GalP. Nucum partes mille, Calcis vivae centum viginti et octo, Alcoholis 33° Cart. (85 cent.) q. s. et eandem operationem praescribit, sed Acidum muriaticum omittit; — DB. Nucum libras decem, Calcis quatuor, (vel Faba Ignoti libras tres, Calcis sesquilibrium), Aquae octodecim coquere, hanc operationem cum eadem quantitate Aquae repetere, liquores miscere, caeterum ut antea.

Ein heftiges Reizmittel und sehr starkes Gift, von welchem schon ein Viertelgran oft einen heftigen Eindruck auf den Menschen macht. Man wendet es bei Lähmungen an, indem man mit einem Sechszehnteilgran anfängt und allmählig steigt.

Pilulae Strychnini. (B*. Fer. GalF, GalH. R. Bo. Ca. 12. Ma. Pie. Ra. Re. T. Va.)

Rx. Strychnini grana duo.
Conserv. Rosarum semidrachmam.
Fiant pilulae viginti quatuor, argento obducendae. (B*. Fer. GalF. GalH. Bo. Ca. 12. Ma. Pie. Ra. Re. T.)

B. Strychnini semigranum ad grana sex, Micae Panis, Mellis desum. et Pulv. Liquiritiae q. s. ut fiant pilulae quatuor. — Gabe, Morgens alle zwei Stunden ein Stück. Wahrscheinlich ist die Formel falsch.

Alcohol s. Tinctura Strychninae, Tinctura Strychnini. (B*. Fer. GalF. Bo. DB. E2. Gr. Ma. Pie. Ra. Re. T. Va.)

Rx. Strychnini grana tria.
Alcoholis 36° unciam.

Gr. Strychninae grana duo cum dimid., Spir Vini 36° B. unciam; — T. Strychnini purissimi semicrupulum, Alcoholis 36° uncias quatuor.

Gabe, sechs bis zwanzig (T.) bis vier und zwanzig (B2.) bis sechzig Tropfen.

Mistura Strychnini s. Strychninae, Haustus s. Potio cum Strychnino s. stimulans. (GalF. E2. Gr. Ma. Pie. Ra. Re.)

Rx. Strychnini granum.
Aquae destillatae . . . uncias duas.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Acidi acetici . . . guttas duas.

Raffetöffelweise Morgens und Abends.

Re. Acid. acetic. omittit. 2 Unzen täglich zwei Mal; — Va. Sacchari drachm. tres, caet. ut antea.

Pulvis Strychnini. (B. Va.)

Rx. Strychnini part. grani sedecimam.
Aethiopis martialis . . grana sex
Sacchari . . . semidrachmam.
Morgens und Abends zu nehmen.

Va. Strychnini granum, Aethiopis drachm., Sacch. tres f. dos. 6. Morgens und Abends 1 Stück.

Strychninum s. Strychninum aceticum. (HC†. HN†.)

Rx. Strychnii puri . quantum libet.
Solve in

Aceti concentrati q. s. ut perfecte neutralisetur; tunc balneo vaporis ad siccum evaporet.

HN†. Aceti conc., Aquae dest. quantitate aeq. diluti q. s. ad neutralisandum et ad crystallisationis momentum vaporare.

Narcotisch krampfstillend. Gabe 1 Gran.

Strychninum muriaticum (HN†.)

Eodem modo paratur ut Strych. aceticum et nitricum cum Acido muriatico.

Sulphas Strychnicus. (GalP. DB.)

Eodem modo paratur cum Strychninae pulveratae parte una, Aquae fervidae paribus quinque et Acidi sulphurici s. q.

Strychninum s. Strychninum nitricum, Nitras Strychnini s. Strychninae; salpetersaures Strychnin. (Bois†. HC†. HN†. Sax2†. T.)

Rx. Nucum vomicarum . libras octo.
Spiritus Frumenti libras sedecim.

Decoque in vesica destillatoria, donec dimidia pars fluidi destillata fuerit, tum nukes colando separatae siccantur et pulverentur. pulverem bis terve digere cum Spiritus Frumenti q. s., post digestionem semper exprimendo; tincturae destillationi subjiciantur et quod remanet, cum fluido a decocto residuo ad remanentiam librarum duodecim evaporet; adde Plumbum aceticum depuratum in Aquae dest. s. q. solutum, quamdiu praecipitatum efficitur; liquor filtri ope, quantum fieri potest, separatus leni igne ad dimidium evaporet, refrigeratum misce cum Magnesiae ustae uncias duabus et seponere per triduum, sedimentum filtratum edulcoretur, siccetur et in pulverem tritum cum Spiritus Vini alcohol. sextuplo bis terve digeratur, tincturae destillent ad unciam aliquot

remanentiam; strychninum instar pulveris albi conspicuum, filtratione separatum his tēve Spiritu Vini rectif. cum Aquae comm. quantitate aequali diluto ad separationem in lixivii adhærentis usque lava et cum Acidi nitrici dilutionis q. s. neutralisa. Liquorem filtra et blandissimo calore in crystallis redige caute dispensandas.

HC†. HN†. Sax2†. Strychnini puri q. libet solvatur in Acidi nitrici diluti q. s. ad perfectum neutralisationis gradum; solutionem filtratam blandissimo calore evaporando in crystallis redige.

T. Obtinetur, infundendo per vices Acidum nitricum 36° B. cum Aquae pondere quintuplo vel sextuplo dilutum in solutionem Strychnini aquosam, videndo ut sit baseos excessus, evaporare deinde et seponere ut crystalli deiciantur.

Ist noch giftiger, als das Strychnin. Eben so auch die von Va. angeführte

Sulphas Strychninae, welche man bisweilen anwendet, wenn sich der Kranke schon an die einfache Strychnin gewöhnt hat. $\frac{x}{25}$ — $\frac{1}{2}$ Gr. mit Rosenconserve oder in einer Potion.

Strychnos.

Strychnos colubrina, L.; Schlangenhölz; Bois de couleuvre (Gal.); Snake-wood (Ang.); Kuchila luta (Beng.); Mahapenala (Cy.); Wideo-pait (Jav.); Modira caniram (Mal)

Br. Gal. His3. Pal. Taur Wir. A. Br. G. Gr. M. Sp.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Apocynae, J.), welcher auf den Inseln wächst. (Rumph. Amb. 2. c. 46. t. 37. Blackw. t. 403. Plenk t. 118.)

Nach Andern kommt es von *Ophioxylon serpentinum*, einem Strauche (Polygamia Monoecia, L.; Apocynae, J.) Ostindien's (Plenk, t. 732)

Man wendet die Wurzel (Lignum colubrinum) an; sie besitzt, wenn sie alt ist, eine sehr große Bitterkeit. Es sind schwere, etwas gelblichweiße, mit einer bräunlichen, runzligen, höckerigen Rinde bedeckte Stücken, welche gar keinen Geruch haben. Pelletier und Caventou haben Strychnin darin gefunden.

Man hält sie für ein specifisches Mittel gegen den Biß giftiger Thiere; jetzt ist sie in Vergessenheit gekommen, müßte aber ohne Zweifel mit großer Vorsicht angewendet werden. Boerhave rühmte sie gegen Wechselfieber.

Strychnos potatorum (Gr.); Holz und Saamen sehr bitter; Blüten aromatisch, reife Früchte brecheneregend.

Sty r a x.

Styrax Liquidambar, *Styrax liquida*, *Styrax* s. *Storax liquidus*, *Ambra liquida*, *Liquidambar*; flüssiger Storax; *Styrax liquide*, *Liquidambar* (Gal.); *Liquide storax* (Ang.); *Tekaucy sstvrax* (B.); *Estoraque liquido* (His.); *Estyrax liquido* (Lus.); *Loejende storax* (Bel.); *Storax rzadki* (Pol.).

Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Wir†. WW†. M†. Ams. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. GalM. GalP. His3. LH. LPC. Pol. Suec. Taur. Be. Br. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va. Z.

Man unterscheidet zwei Balsame dieses Namens:

1) Den Storax von Louisiana, Copalmbalsam, Copalmöl (Copalme, Baume ou Huile de Copalme, Copalme de la Louisiane), von honigartiger Consistenz, durchsichtig, röthlichgelb, mit der Zeit dunkel; oder schwarzlichroth werdend, von sehr angenehmem Geruch und scharfem, gewürzhaftem Geschmack, und zu einem braunen, schwärzlichen und brüchigen Harz verhärtend. Soll von Liquidambar imberbe kommen (Gr.).

2) Den gemeinen Storax (*Styrax commun*), von der Consistenz einer dicken Salbe, röthlich, graulich oder bräunlich, kaum durchscheinend von starkem, angenehmem Geruch und scharfem und bitterm Geschmack.

Dieser Balsam fließt aus dem *Styrax* baum, *Liquidambar styraciflua*, L., orientale, einem Baume (Monoclea Polyandria, L.; Amentaceae, J.) Mexico's. (Blackw. t. 485. Plenk t. 676. Schk. t. 307. Lam. t. 783. Düss. off. Pl. XVIII. t. 30. Pl. méd. VI. 331). Nach Sax2†. *Styrax officinalis*, L.; oder von Liquidambar Altingiana (Düss. off. Pl. Suppl. II. t. 12.) Auch erhält man ihn durch Kochen der jungen Triebe dieser Pflanze oder von *Altingia excelsa* in Wasser (Gr.).

Bonaistre hat darin einen eigenthümlichen harzigen und kristallisirbaren Stoff, welchen er *Styracin* (*Styracinum*), *Styracine* nennt, entdeckt.

Reizend, fast ausschließlich zum äußern Gebrauche.

Styrax liquida reducia (Gr.): *Styracis liq. unc. unam*, Bal. Tolut. libr. duas, Spir. rectif. q. s.

Syrupus Storacis. (DB.)

Rx. *Styracis liquidi*. . . uncias duas, digere in vase clauso cum

Aquae libris duabus in balneo mariae per horas duodecim, saepius agitando, filtra

per chartam et adde
Sacchari albi . . . libras quatuor.
Gegen weißen Glus täglich zu sechs Thee-
löffeln.

Unguentum de Styrace s. Styracis s. Styracis resinosum s. e Styrace compositum s. stimulans. (HC†. HN†. Han†. HassP†. Wirt†. Wür†. An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. GalP. Gen. LP. Sar. Taur. Ca. Sp. Vm.)

℞. Olei Juglandii . . . partes 350.
Styracis . . . partes octo.
Liqua blande calore, subinde agitan-
do; seponere, cola et adde

Colophonii . . . partes 480.
Elemi,
Cerae flavae, sing. . . part. 192.
Cola per linteum. (Gal. GalM)

GalP. Olei Jugland. uncias duode-
cim, Colophonii sedecim, Elemi, Ce-
rae flavae et Styracis, sing. octo; —
Taur. Olei Jugland. libram, Styracis,
Colophonii, sing. uncias quatuor, Ele-
mi, Cerae citrinae, sing. tres. —

Gen. Sar. et Sp. Olei Juglandis li-
bram, Styracis semilibram, Colopho-
nii libram, Elemi et Cerae, sing. se-
milibrum.

℞. Olei Olivar. libr. duas et dimid.
Styracis,
Elemi,

Cerae flavae, sing. . . unc. 7½.
Colophonii . . . uncias duas.
Liqua simul. (HN†. Han†. Wirt†.

B*. Br.)

HC†. Olei uncias quatuor, Cerae,
Colophonii, Elemi, sing. drachmas tres,
Styracis liquidi uncias tres; — Wür†.
et Vm. Olei, Styracis, Elemi, Cerae,
sing. partem unam et duas Colopho-
nii; — Suec. Olei unam cum dimi-
dia et reliquarum substantiarum, sing.
septem; — HassP†. Elemi, Cerae,
sing. drachmas quindecim, Colophonii
semunciam, Styracis drachmas quindecim,
Olei uncias septem cum dimidia.

℞. Terebinthinae uncias quindecim.
Olei Juglandis . . . uncias undecim.
Elemi,

Cerae flavae, sing. uncias septem.
Liqua leni calore et ab igne remo-
tis adde

Styracis . . . uncias septem.
Evaporet liquidum blando calore.
(An. Bel.)

LP. Unguenti Elemi libram unam,
Styracis depurati uncias quatuor; —
LH. Unguenti Elemi, Styracis, sing.
semunciam, Vitellum Ovi No. 1, Es-
sentiae Terebinthinae drachmas duas.

℞. Axungiae,
Colophonii, sing. . . libram.

Olei Juglandis uncias quindecim.
Elemi,
Cerae flavae, sing. . . uncias sex.
Massae igne liquatae adde
Styracis . . . uncias septem.
Misce sedulo. (Ca.)

*Emplastrum stomachicum s. Styracis sto-
machicum s. de Styrace* (His. His3.)

℞. Cerae flavae,
Olibani, sing. . . libras duas.
Terebinthinae . . . libras tres.

Mixtis et liquatis adde
Styracis,
Mastichis,
Ladani, sing. unc. tres et dimid.
Benzoës uncias duas et drachmas
duas.

Piperis Jamaic. unc. quatuor cum
dimid.

Olei Menthae,
— Absinthii, sing. drach. duas.
Misce exacte

℞. Cerae flavae libras duas c. dimidia.
Terebinthinae . . . libras tres.
Tacamahacae libras duas et dimid.

Styracis,
Mastichis,
Ladani, sing. unc. quatuor et dimid.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis mosch. sing.

drach. octodecim.
Olei Menthae,
— Absinthii, sing. drach. duas.

Styracem mollefactam cum ladano
contunde, cerae paucillim addendo,
liqua cum cera et terebinthina, cola-
tum adde pulveres et olea. (His. His3.
*Emplastrum Styracis stomachicum Phar-
macopoeae Martiensis.*) Si hujus vel
praemoniti emplastri semunciam super
alutam extendis, irrorando, si prae-
scriptum fuerit, guttulis circiter octo
Olei Menthae, *Scutum stomachicum*
habes.

Unguentum digestivum. (Ra. Va. Chai).

℞. Unguenti de Styrace . . . libram.
Olei Olivarum . . . semilibrum.
Misce.

Unguentum antiscorbuticum. (Sm.)

℞. Ungu. de Styrace unc. quinque.
Balsami Fioravanti . . . unciam.
Misce.

*Balsamum ad loricandum cadaver con-
ditum* (GalP. Sp.)

℞. Balsami Peruviani,
Balsami Copaivae,
Styracis, sing. unc. viginti quatuor.
Olei Nucis moschatæ uncias octo.

Olei Lavandulae . . . uncias duas.
— Thymi . . . semunciam.
Liqua blando igne.

Eau d'Ange destillée. (Gr.)

R. Benzoës uncias duas.
Storacis unciam.
Cinnamomi drachmam.
Caryophyllorum drachmas duas.
Calami frustum.
Coriandri integri . . grana aliquot
(Prise).

Aquae octarios duos.

Eau d'Ange destillée et musquée (Gr.):
Benzoës uncias quatuor, Storacis duas,
Cinnamomi semunciam, Caryophyllo-
rum drachmas duas, Calami frustum,
Moschi Folliculi drachmam; destillent;
residuum serva.

Eau de mille fleurs (Gr.): Aquae
Angeli (Eau d'Ange) octarios duos,
Moschi grana duodecim vel viginti,
vel Moschi Folliculi unciam; addi
potest Essentia Ambrae griseae.

Pastilli aromatici. (R.)

R. Storacis . . . librae quadrantem.
Benzoës libram.
Ladani . . . librae quadrantem
Cerae sig. optimae . . libram.

Adde

Mucilaginis G. Arabici spissioris
q. s.

Spiritus Moschi guttas sexaginta.
Misce et in pastillos redige, qui sic-
centur.

Succinum.

Succinum album et citrinum, *Electrum*,
Ambra flava, *Resina Succini*; *Ηλεκτρον*;
Agtslein, *Bernstein*; *Succin*, *Ambre jaune*,
Karabé (Gal.); *Yellow Amber* (Ang.);
Kerulbehr (Ar.); *Hambar* (Ba.); *Am-
bra* (Cy.); *Ambar* (Mal.); *Bernsteen*
(D.); *Karuba* (Duk. Pe.); *Sucino* (His.);
Kepur (Hin.); *Barnsteen* (Bel.); *Am-
bra gialla*, *Succino*, *Carabe* (I.);
Barszyn (Pol.); *Alumbre*, *Ambar*
(Lus.); *Jantar* (R.); *Bernsten* (Succ.);
Umbir (Tam. Tel.)

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Ful†.
Han†. Hass†. HC†. HN†. Li†. O†.
Sax2†. Wir†. Wür†. W†. AD. Am.
Ans. An. B. Bel. Br. D. Du. Ed. Feen.
Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH.
LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC.
Succ. Taur. A. C. CG. Fi. G. Gr. Pid.
Re. Sp. T. Va.)

Ein fester, mehr oder weniger dunkelgel-
ber, weißer, rother, bisweilen roth-bräuner,
fast schwarzer, durchsichtiger, durchscheinender,
oder undurchsichtiger, bisweilen wolli-

ger Körper mit muschelartigem, glänzendem
Bruch, welcher sich poliren läßt, nicht sehr
hart ist, leicht bricht, erwärmt einen schwach-
en Geruch verbreitet, erhitzt electrisch
wird und mit gelber und grünlicher Flama-
me brennt, indem er einen dicken Rauch
und einen starken, durchdringenden, nicht
unangenehmen Geruch verbreitet.

Succinum praeparatum, (His3. Taur.
Fi.)

Succinum pulveratum in mortario
porphyreo cum Aqua laevigatur et in
pastam tenerrimam redigitur inter
chartam siccandam.

His3. in trochiscos redigere, in um-
bra siccandos jubet.

Pulvis fumalis s. ad suffiendum s. pro
suffimigio s. pro suffimento. (BorC†.
Br†. Li†. RC. T.)

R. Olibani,

Succini, sing. . . partes aequales.
Grossiuscule pulvera. (BorC†.)

RC. Substantiarum dict., sing. par-
tes tres, Florum Lavandulae Spicae
unam.

R. Baccarum Juniperi,

Mastichis,

Succini, sing. . . uncias quatuor.

Cascarillae unciam.

Fiat pulvis grossus. (Li†.)

T. Benzoës, Succini, Cascarillae,
Coffeae tostae, Sacchari albi pulv.,
sing. part. aeq.

R. Succini uncias viginti.

Olibani uncias decem.

Mastichis uncias quatuor.

Ladani,

Benzoës,

Storacis,

Ligni Rhodii,

Santali citrini, sing. uncias duas.

Petal. Rosar rubr. unc. quatuor.

Florum Lavandulae . . uncias tres.

Bacc. Juniperi uncias duodecim.

iat pulvis grossus. (Br.)

Tinctura Succini aetherea s. balsamica.
(Sax2†. Wir†. Wür†. B*. GalP. Succ.
DB. Sw. T. Vm.)

R. Succini flavi uncias duas.

Aetheris sulphurici . . libras duas.

Digere per dies quatuor super are-
nae balneo, blando calore, et cola.
(Wür†.)

GalP. ut tincturam Castorei aethe-
ream; DB. T. Succini drachmas
duas, Aetheris sulphurici 56° Ar. un-
ciam macerare per duos (octo DB.)
dies et sepositione clarificata decan-
thare.

℞. Succini pulv. et levit. tosti
uncias duas.

Alcoholis . . . unc. septem. c. dim.
Post aliquot dies digestionis in vase
tecto, filtra et adde

Aetheris sulph. unc. duas c. dim.
Serva. (B*.)

℞. Succini pulv. et levit. tosti
unciam.

Liquoris anod. min. unc. quinque.
Digere per dies quatuor in vase te-
cto et cola. (Sw.)

℞. Succini gross. pulv. . . partem.
Liquoris anod. min. partes tres.

Macera frigide per dies octo, sae-
pius agitando et filtra (Sax†. Vm.)

Sax†. ut tinct. Ambrae Aeth.; —
Succ. Succini unciam unam et Liquo-
ris quatuor; — Wir†. Succini unciam
unam et Liquoris tres sum dimidia; —
Ful†. Succini partem unam et Liquo-
ris sex.

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend,
anticathartisch und auf den Uterus wir-
kend. — Gabe, fünfzehn bis dreißig
Tropfen auf Zucker oder in einem Glase
Wasser.

Spiritus Succini (Gr. Re): E Suc-
cino destillationis ope cf. Acidum Suc-
cini.

Tinctura s. Essentia Succini s. alco-
holica, Alcohol cum Succino. (Bor5†.
Br†. HC†. Han†. Li†. O†. Pal†. Sax2†.
Wir†. Ams. An. Bel. Gal. Gen. His3.
Pol. Taur. Fi. Gr. DP. T. Vm.)

℞. Succini albi pulv. unciam unam.
Alcoholis (38°) . . . uncias sex.

Digere blando calore per tres dies,
decantha et residuo infunde

Alcoholis (38°) . . . uncias duas.
Post duos dies digestionis cola, co-
laturas misce et filtra. (An.)

℞. Succini albi partem.
Alcoholis (32°) . . . partes octo.

Digere frigide per dies decem, cola
exprimendo et filtra. (Bel.)

Ams. Succini partem unam, Alcho-
lis (0.835) octo et octo dies digestio-
nis blando calore; — Wir†. Succini
sesquiunciam, Alcoholis concent. un-
cias sex et aliquot dies frigidae diges-
tionis; — Pal†. Succini unciam unam.

Alcoholis concent. octo et aliquot dies
digestionis blando calore; — Wir†. et
Li†. Succini unciam, Alcoholis libram

et octo dies digestionis leni calore; —
Gal. Taur. Succini unam, Alcoholis

(26°) sedecim et sex dies (decem Taur.)
digestionis, tunc sepositionem per dies

sex; — Gen. Succini unciam unam,
Alcoholis decem et octo dies digestio-
nis; — His3. Succini flavi uncias duas,

Alcoholis Vini uncias duodecim et di-

gestionem sufficientem; — Gr. Suc-
cini uncias quatuor, Spir. rect. f. oc-
todecim.

℞. Succini pulverati et leviter in sar-
tagine ferrea tosti . . . partem.

Alcoholis concent. partes quatuor.

Post aliquot dies digestionis blando
calore in vase clauso et subinde agi-
tando, filtra. (Bor5†. Br†. Han†. O†.
Sax2†. Pol. Vm.)

Bor5† Digestionem leni calore et fil-
trationem; — HC†. Succini tosti semi-
libram, Spirit. rectificatissimi libras

duas digerere per triduum, ut sit tin-
ctura filtrata unciam viginti; — Fi.

T. Succini flavi pulv. uncias tres, Al-
coholis 30° libram digerere in retorta

vitrea foramine parvo instructa, subin-
de agitando et blando calore, et post

sex dies filtrare; — DB. Alcoholis 36°
B libras quatuor.

Schwach reizend, gegen Catarrh, balsa-
misch, nervenstärkend und Wundmittel. —
Gabe, fünfzehn bis dreißig, vierzig bis
sechzig Tropfen

Julep s. Julapium succinatum. (Gen.)

℞. Tincturae Succini drachmas duas.
Sacchari unciam.

Aquae uncias sex.
Misce.

Tinctura s. Essentia Succini alcalisata.
(Br†. Wir†. Sar. Sp.)

℞. Succini pulverati . . . uncias duas
Subcarb. Potassae liq. s. unciam.

Fiat pasta, cui siccatae infunde
Alcoholis uncias octo

vel q. s., ut trium vel quatuor digito-
rum crassitiem tegatur. Post aliquot

dies digestionis super arena tepida fil-
tra. (Br†. Sar.)

℞. Succini uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae uncias sex.

Tritura simul et infunde
Aquae Vitae uncias sedecim.

Post aliquot dies macerat onis destil-
lent liquidi circiter unciae octo; eva-
porent reliqua ad siccum, residuo in-

fundere spiritum primo obtentum et post
sufficientem digestionem liquorem fil-
tra (Wir†).

℞. Pulveris Succini.
Subcarb. Potassae, sing.

unc. duodecim.

Alcohol. concent.
unc. viginti quatuor.

Spiritui destillato per octo dies in
balneo aquae infunde pulverem e

Succini unciis octo.

Olei Tartari per deliquium q. s.
ut fiat pasta quae deinde siccetur.

Filtra (Sp.)

Reizend, nervenstärkend, gegen Catarrh und aufsteigend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Resina Succini. (Li†).

R. Succini libras duas.

Alcoholis libras quatuor.

Post tres dies digestionis in arenae balneo decantha et residuum itidem cum novo Alcohole tracta, donec hic non amplius coloretur; tincturae commixtae destillent, resina abluta lente siccetur.

Oleum Succini crudum. (Bor5†. HC†. HN†. AD.).

R. Succini q v.

Misce cum eadem quantitate arenae in retorta vitrea, destilla in balneo arenae calore gradatim aucto, separa oleum a caeteris substantiis et in vasis bene obturatis serva. (AD.).

In officinis chemicis paratur. Pond. spec. = 0,886.

Oleum Succini aethereum s. empyreumaticum, Oleum Succini rectificatum s. depuratum, Oleum Succini, Aethereoleum s. Pyroleum Succini. (Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His3. LonN. LPC. Lus. Pol. RC. Sar. Br. C. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.).

R. Succini contusi . . . quantum vis.

In retortam arenaceam luto obturatam immitte, quae tubi ope cum vasto recipiente tubulato communicat; tunc destillationem, igne gradatim aucto, continua, donec nihil amplius prodeat, quo facto oleum infundibuli ope separatur.

Man wendet dieses Del nur rectificirt an. Es giebt dazu mehrere Verfahrensweisen.

R. Olei empyreum. Succini . . q vis.

In retortam infunde ad dimidium usque inde replendam, destillent, levi sub bullitione, donec oleum magis colore tinctum prodire coeperit. (Ba. GalH. Pal. Br. Vm.).

LonN. Gr. Re. duas rectificationes successivas; — Pal†. LPC. CG. tres destillationes; — Wir†. Gen. quatuor; — Oleum spissum in rectificatione remanens Balsamum Succini praebeh (Gr. CG.).

R. Olei Succini partem unam.

Cinorum Lignorum partes duas.

Destillent lente. (Br†. Hass†. Pal†.

Wir†. Fer. Li. Pid.).

R. Olei Succini,

Carbon. Lignor. s. veget. sing. part. aeq.

Destillent in retorta vitrea. (Fenn-Ful. HassP. Snc.).

R. Olei Succini,

Carb. Lignorum, sing. part. unam.

Aquae partes sex.

Destillent lente. (O.).

Sar. Cretam puram vel Cornu Cervi calcinatum; — T. Oleum cum mixtura e Pulvere Carbonum et Calcis ad aërem extinctae in globulos redigere, hos cum Aquae quadruplo vel quintuplo olei adhibiti in retortam tubulatam ingerere et in balneo arenae moderato calore destillare.

R. Olei Succini partem unam.

Aquae partes sex.

Destillent partes quatuor et oleum ab aqua separetur (AD. Am. B. Bel. Bor. D. Du. Ed. Han. Sax. C. Sw.).

HC. Oleum crudum cum Aquae sextuplo destilletur, ut pars olei remaneat; — HN. Oleum cum Aquae font. q s. destillare, quamdiu coloris expers prodit; — Bor5†. Oleum Succini crudum cum Aquae font. octuplo destillet, ita ut tertia pars prioris remaneat; — Sax2†. Aquam non adhibet, caeterum ut Bor4.

RC. Oleum a liquore acido separatum e retorta vitrea Aquae sextuplo addito, destillet, donec trientes duo aquae prodierint; — Fi Oleum in paratione Salis volatilis Succini obtentum, separatim pluries cum Aqua calida lavare, donec omnis saporis aciduli expers sit, et iterum destillare, donec dimidia pars ponderis prodierit.

R. Olei Succini libram unam.

Aquae libras sex.

Destillent lente unciae quatuor, quo facto recipiente mutato denuo unciae quinque destillent, quae cum Aqua redestillentur, ita ut unciae tres abstrahantur; commisce productum secundum cum priore ut totum denuo cum Aqua destillet. (Ams)

His3. destillationem Olei cum Aquae partibus duodecim repetere jubent, donec illud perfecte liquidum sit.

Reizend, frampffüllend, nervenstärkend, aufsteigend, schweiß- und harntreibend, Monatsfluß befördernd. — Gabe, fünf bis funfzehn Tropfen mit Zucker oder liq. anod. — Man braucht es nur wenig.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Succini. (Pal†. Wir†.).

R. Sacchari albi unciam.

Olei Succini guttas sedecim.

Misce trititando.

Balsamum Succini. (Wir†).

℞. Olei Succini . . . drachmam.
— Nucis mosch. drach. duas c.
dimid.

Misce. — Außerlich bei Hysterie und Kopfschmerz angewendet.

Moschus artificialis s. fictitius, Resina Succini s. Succini balsamica, Oleum Succini oxydatum, Succinum oxygenatum. (HC†. Li†. O†. Am. B*. RC. Suec. Br. C. Gr. Re. Vm.)

℞. Olei Succini . . . partes duas.
Acidi nitrici . . . partes sex.
Stent in reactione per horas viginti quatuor, tunc cum Aqua frigida lava. (B*. Li.)

HC Olei unciam, Acidi duas cum dimidia, resina oriens cum aqua communi bene abluatur et siccetur; — Am et C. Olei partem unam et duas Acidi; — O† Acidi quinque; — Vm. tres Acidi; — Re. Olei unam, Acidi tres cum dimidia; — Suec. Br. Gr. quatuor Acidi; — RC. Olei rectif. drachmam unam, Acidi nitrico nitrosi tres cum dimidia.

Re. Parari potest quoque digestionem Olei cujuslibet animalis destillatione obtenti part. duarum et Acidi nitrici part. unius per dies octo vel decem, et addendo Spir. Vin. rect. part. triginta duarum, denuo per hebdomadas quatuor digerendo.

Reizend, als Ersatzmittel des wahren Moschus empfohlen.

Tinctura Moschi artificialis s. Resinae Succini s. Succini balsamica. (B*. Li. Suec. Vm.)

℞. Moschi artificialis partem unam, Alcoholis concentrati partes octo. Dissolve blando calore. (B*. Li.)

Suec. Moschi partem unam et septem Alcoholis; — Vm. Moschi unam et Alcoholis sedecim.

Reizend, bei Epilepsie empfohlen. — Gabe vierzig Tropfen.

Tinctura Succini foetida. (Fer.)

℞. Olei Succini rectif. drachm. duas. Subcarbonatis Potassae,

Saponis medic., sing. drach. unam.

Alcoholis . . . uncias quatuor.

Post aliquot dies filtra.

Hujus liquoris guttas aliquot Ammoniaci infundendo, aquam *Aquae Luciae* (Eau de Luce) aliquanto similem obtines.

Embrocation for whooping-cough, Roche's. (Gr. Re.): Ex Oleo Olivarum cum parte dimidia Olei Succini et Caryophyll.

Oleum Succini reductum (C. Gr.): Ol. Succini libr. unam, Petrolei duas.

Mixtura Olei Succini, Potio expectorans. (E2).

℞. Olei Succini . . . guttas octoginta.
Gummi Arabici,
Sacchari, singulorum semunciam.
Tinct. Bals. Tolutani drach. duas.
Aquae . . . uncias quatuor.
Gabe, ein Essel alle zwei oder drei Stunden, bei krampfhaftem Husten.

Liquor succinicum anodynus s. anodynus succinatus. (Sw*)

℞. Spir. Succini oleosi rectif. sesquilibr.

Acidi sulph. concent. semilibram.
Destillet in retorta vitrea libra una.
— Gegen Epilepsie in Deutschland gerühmt. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in Weiruth- oder Münzensyrup.

Linimentum Succini opiatum. (Re.)

℞. Olei Succini rectif.,
Tinct. Opii, sing. . . uncias duas.
Axungiae praeparatae . . . unciam.
Bei Krampf und Verrenkungen.

Sulphur.

Sulphur nativum, Sulphur vivum citrinum et nativum griseum; Sulfur; Schwefel; Soufre (Gal.); Sulphur, Brimstone (Ang.); Kabrit (Ar.); Lew (C.); Gundaka (Cy.); Svolv (D.); Gunduck (Duk.); Azufre (His.); Gundhuk (Hin.); Schwavel (Bel.); Zolfo (I.); Gunduk (Mah.); Blerong (Mal.); Gowgird (Pe.); Siarka (Pol.); Enxofre (Lus.); Sura (R.); Gandhaka (Sa.); Skafvel (Suec.); Gendagum (Tain.); Ghendagum (Tel.)

At. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. Ha-sP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LFC. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. A. C. CG. DB. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Va.

Ein berber, citrongelber, bei'm geringsten Stoß sehr zerreiblicher Körper mit glänzendem Bruch, welcher in Nadeln oder Octaedern cristallisiert, sich schmelzen, verflüchtigen und entzünden läßt, geschmacklos und geruchlos ist, gerieben jedoch einen schwachen Geruch verbreitet. Man findet ihn im Handel unter zwei Formen.

1) Als Stängenschwefel (Sulphur citrinum s. in baculis), Soufre en canon (Gal.); in walzenförmigen, mehr oder weniger schmutzig- oder graulichgelben Stük-

fen, welche fast immer in ihrer Mitte nadelartige Crystalle enthalten.

2) Als Schwefelblüthen (Flores Sulphuris, Sulphur depuratum s. sublimatum), Fleurs de soufre, Soufre sublimé (Gal.), in sehr feinem, schön gelbem Pulver

Sulphur factitium s. citrinum (Gr.), aus Italien durch Sublimation oder Aufschmelzen des Feuersteins und anderer schwefelhaltiger Mineralien erhalten; Sulphur in rotulis s. rotundum (Gr.) ebendaher. S. caballinum s. vivum, Sulphuris vivi Recrementa (Gr. Re.), die beim Reinigen oder Sublimiren des Schwefels bleibende Schlacke, welche nur in der Thierheilkunde gebraucht wird.

Br. Ful. HassP. HC. Pal. Wir. Wür. AD. An. Fer. His. HiS. Pm. Sar. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. et Vm. Flores Sulphuris pharmaceutam ipsum praeparare jubent, sublimando Sulphur venale vel solum, vel antea cum Aënae lotae certa (aequali) quantitate mixtum. Abluere illos deinde bene jubent, ut ab Acido sulphureo forte inhaerenti liberentur. (S. sublimatum depuratum s. sublimatum s. Sulphur purificatum HiS.)

Reliquae pharmacopoeae. (HC. GalP. etc.), quae Flores Sulphuris venales indicant, illos antequam adhibeantur, (Aqua communis pluv. fervida Bor5. HN. Sax2. Taur.) abluere jubent. Nomen deinde accipiunt: Sulphur depuratum s. depuratum lotum s. sublimatum lotum s. lotum, Flores Sulphuris loti s. depurati; Fleurs de Soufre lavées (Gal.)

Bor5. Sax2. Flores Sulphuris crudi, Sulphur sublimatum s. depuratum crudum indicant. Alius, Sulphur purum obtinendi modus, quod praeparatum deinde Sulphur praecipitatum, Lac s. Magisterium Sulphuris, Hydras s. Hydratum Sulphuris; Schwefelmilch; Soufre précipité, Magistère de soufre, Hydrate de soufre (Gal.) nominatur (Ba. Bor. Br. Ful. Han. Li. O. Sax2. Wir. Wür. AD. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. GalP. LonN. Suec. Taur. Kr. C. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.), in eo constat, ut Solutio aquosa Sulphureti Potassae vel Sodae (An. Taur. T.), vel Sulphureti Calcis (Lon. C. CG. Re. Sulph. sublim., libram unam, Calcis recentis duas, Aq. cong. quatuor coquere, filtrare), Aceti destillati vel Acidi hydrochlorici ope decomponatur et praecipitatum sedulo ablutum siccetur; — Gr. Sulphuris libram unam, Calcis vel Subcarbonatis Potassae tres eoque in Aquae q. s. adde Acidum sul-

phuricum dilutum, sedimentum abluere etc. (Lac Sulphuris); Sulphuris libram unam, Calcis recentis ustae duas coque in Aquae congiis quatuor, filtra, adde Acidi muriatici q. s. et sedimentum abluere, donec saporis sit expers; — Bor5. et HassP. Liquorem e Solutione saturata Sulphuris depurati in Liquore Kali caust. cum Aquae calidae triplo mixtum per horas 24 seponere, tum decanthatione et filtratione depurato instillare Acidi sulph. diluti quantum ad praecipitandum sulphur requiritur, praecipitatum Aqua tepida ablutum siccare; — HN. Sax2. in Liquore caust. Sulphuris depur. solvere, quantum solvi potest et tunc ut Bor4. pergere; — HC. Liquori e solutione Sulphuris in Kali caust. cum Aquae triplo mixto et per chartam colato instillare Acidum sulph. dilut., quamdiu praecipitatum Sulphuris producitur, tunc addere Aquae tepidae duplum, et praecipitatum subidendo etc. depuratum modico calore siccare; — GalP. Polysulphureti potassici partem unam solvere in Aquae purae partibus quadraginta, filtrare et cum Acido chlorhydrici diluti s. q. praecipitare, decantare, praecipitatum saepius lavare, filtrare et siccare.

Ein Reizmittel, welches, je nach der Gabe, und besonders nach dem Subjecte, als aufregendes, Auswurf beförderndes, Schweiß und Harn treibendes und als Purgirmittel wirkt. Es ist eins der kräftigsten und schärfsten Agentien der Materia medica; auch wendet man es unter einer großen Anzahl verschiedener Formen und zur Erfüllung mannichfaltiger Indicationen an. — Ob des Pulvers, zwölf bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich, als Reizmittel, eine bis zwei Drachmen und mehr als Purgirmittel.

Gas sulphureum s. sulphuricum, Aër vitriolicus. Defflagratione lenta Sulphuris etc. obtinetur. In Ermangelung oder bei zu großer Kostbarkeit anderer saurer Gasarten als antiasmaticum benützt.

Carburetum Sulphuris.

Carboneum Sulphuris, Alcohol Sulphuris. (HC. Vm.)

R. Sulphureti Ferri pulv. . part. 5. Carbonis . part. unam e. dimid. Misce diu triturando, imple partem quartam retortae et distillationem institue ad incandescentiam usque calefaciendo; liquidum in fundo aquae in recipiente contentae existens seponere.

HC. Praeparatum officinarum chemicarum praemonito modo obtentum indicat.

Man hat mit dieser Substanz einige Versuche gemacht; sie scheinen aber keinen Erfolg gehabt zu haben.

Pulvis dentifricius. (Pie.)

℞. Florum Sulphuris . . . unciam.
Laccae pulveratae . . . q. s.
Fiat pulvis tenerrimus.

Pulvis contra scabiem s. antipsoricus. (Hamf. Würf. Au. Ca. Sw. Va.)

℞. Sulphuris,
Rad. Liquiritiae, sing. drach. sex
Camphorae . . . semidrachmam.
Gabe, eine halbe Drachme zwei Mal täglich. (Au. Va.)

℞. Sulphuris sublimati,
Carbonis Lignorum,
Lateris conusi, sing. . part. aeq.
Fiat pulvis. (Ca.)

℞. Florum Sulphuris,
Animonii crudi, sing. semunciam.
Magnesia . . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Hamf.)

℞. Florum Sulphuris,
Aethiopiae antimoniensis,
— miner., sing. . unciam.
Fiat pulvis tenerrimus. (Würf.)

℞. Nitri,
Sacchari, sing. . drachmas duas.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Florum Sulphuris sesquiunciam.
Fiat pulvis. (Sw.)

Das zweite dieser Pulver dient nur äußerlich, mit etwas Oel vermischt. Die beiden folgenden können sowohl äußerlich, als innerlich angewendet werden. Das letzte wird nur innerlich benutzt.

Pulvis diaphoreticus. (Huf. Sm. Va. Hosp. Lyon.)

℞. Flor. Sulphuris . drach. quatuor.
Camphorae . . . scrupulum.
Fiant doses duodecim. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich in einer Tasse Thee. (Sm. Va.)

℞. Sulphuris puri . drachmas duas.
— aurati Antimonii,
Camphorae, sing. . grana octo.
Sacchari . . . scrupulos duos.
Gabe, eine halbe Drachme, drei oder vier Mal täglich. (Huf.)

Pulvis pleureticus Mynsichti s. antipleureticus. (Wurf.)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Dentium Apri,
Maxillar. Lucii, sing. . unciam.
Florum Papaveris . semunciam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Sulphuris et Supertarritus Potassae laxans. (R2. Ra.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremor. Tartari, sing. unciam.
Sacchari albi . quantum sufficit.
Misce. (Ra.)

℞2. Sulphuris semunciam et Cremoris Tartari unciam.

Man vermischt dieses Pulver mit Honig und giebt Kindern etwa einen Kaffeeöffel voll vier oder fünf Mal täglich.

Empfindliche Magen vertragen eine Mischung von Sulphur praecipitatum und Magnesia, sing. part. aeq. besser; man läßt davon täglich vier oder fünf Mal einen Öffel in Milch nehmen. (Pulvis cum Lacte Sulphuris et Magnesia usta.)

Pulvis Sulphuris sublimati compositus. (R2.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, sing. part. duas.
Pulvis Zingiberis, vel
— aromatici, vel
Elaeosacchari Carvi, vel
— Foeniculi partem unam.

Bei Kräfte, Hautkrankheiten, Verschleimung der Lunge, Hämorrhoiden. — Gabe, eine bis zwei Drachmen bei Schlafengehen, mit Syrup.

Pulvis de Sulphure et Scilla s. antiasthmaticus s. incisivus. (Gal. GalM. Re.)

℞. Sacchari albi . . . partes tres.
Florum Sulphuris . partes duas.
Scillae siccatae . partem unam.

Pulvis antidysentericus. (Vm.)

℞. Florum Sulphuris . partes octo.
Foeniculi . . . partem unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. partes sedecim.

Pulvis catharticus absorbens s. purgans absorbens. (Sw.)

℞. Subcarbonatis Calcis,
Flor. Sulphuris, sing. . unciam.
Gabe, zehn bis zwanzig Gran für Kinder; eine halbe bis ganze Drachme für Erwachsene.

Conchae sulphuratae.

℞. Concharum,
Sulphuris depurati, sing.
partes aequales.

Pulvis sulphureus s. sulphureus s. catarrhalis s. anticatarrhalis. (BorCf. Fulf. Hamf. Ca. Huf. Va.)

℞. Florum Sulphuris,
Liquiritiae pulv., sing. drach. sex.
Camphorae . . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (BorCf.)

℞. Florum Sulphuris,
Nitri purificati,

Radiciſ Liquiritiae,
Foeniculi. ſing. . drachmas duas,
Fiat pulvis. (Fulſ.)
Hamſ eandem formulam, ſed loco
nitri Sal Ammoniacum.
R. Florum Sulphuris drachmas duas.
Cremoris Tartari . drachmas ſex
Sulph. aur. Antimon.
grana quindecim.
Fiat pulvis. (Hamſ. Va.)
R. Sacchari . . . uncias tres.
Rad. Iridis Flor. ſcrup. novem.
Flor. Sulphuris . ſcrup. quatuor.
Croci . . . drachmam.
Gummi Arabici,
Amyli,
Liquiritiae, ſing. . . ſcrupulum.
Fiat pulvis. (Ca.)
R. Florum Sulphuris ſeſquiunciam.
Foeniculi,
Iridis Florentinae,
Liquiritiae, ſing. . . unciam.
Foliorum Sennae drachmas ſex.
Fiat pulvis. (Huſ.)
Gabe, eine oder zwei Drachmen.
*Pulvis pectoralis reſolvens ſ. pectoralis
reſolvens Wedelii.* (Brſ. HCſ. Palſ.
Wirſ.)
R. Specier. Diaereos ſimplic.,
— Diatragacanthae frig. ſing.
ſemunciam.
Liquiritiae,
Althaeae, ſing. . drachmas tres.
Boli Armenae,
Flor. Sulphuris, ſing. drach. duas.
Terrae igillatae ſequidrachmam.
Sacchari cryſt (Sandſ) albi unc. ſex.
Fiat pulvis. (Palſ.)
R. Radiciſ Ari,
— Iridis Florentinae,
Antimonii diaphoretici,
Florum Sulphuris,
Cinnabaris nativi,
Ocul. Cancror., ſing ſemunciam.
Fiat pulvis. (Brſ Wirſ.)
HCſ. Cinnabaris praeparati et ſin-
gulorum omnium ingredientium un-
ciam, Olei Aniſi vero drachmam addit.
Gabe, von einem Scrupel biſ zur hal-
ben Drachme.
*Pulvis pectoralis ſ. pectoralis balaſami-
cus ſ. expectorans.* (Brſ. Wirſ. B.
Bo. Ca. Pie. Sp. Sw.)
R. Rad Liquiritiae . . . unciam.
— Iridis Flor. . drachm. duas.
Florum Sulphuris . ſemunciam.
— Benzoës . . . ſcrupulum.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Olei eſſ. Aniſi,
— — Foeniculi, ſing.
guttas decem,
Fiat pulvis. (Brſ. Wirſ. B.)

Sp. Liquiritiae, Iridis, ſing. drach-
mas ſex, Sulphuris unciam, Acidi
benz. drachmam, Sacchari uncias duas
et Oleorum, ſing. guttas decem; — Ca.
et Sw. Liquiritiae, Iridis, ſing. drach-
mas duas, Sulphuris ſemunciam Acidi
benz. ſcrupulum, Sacchari uncias duas
et Oleorum, ſing. guttas decem.

R. Acidi benzoici . . . grana ſex.
Florum Sulphuris grana decem.
Cascarillae . . . grana duodecim.
Sacchari cryſtallisati grana viginti.

Fiat pulvis. (Pie.)

Daſ leſtere iſt auf eine Gabe.

Pulvis di gambello. (Fi.)

R. Muriatſ Sodae,
Sulphuris,
Ciner. Vegetab. non maritim.,
ſing. partes aequales.
Pulverata ſeorsim cominiſce. — Mit
Waſſer vermiſcht, zum Waſchen der Hände.

Bolus Sulphuris. (GalM. Va.)

R. Sulphuris loti . . . grana octo.
Mellſ . . . quantum ſufficit.
Fiat bolus.

Boli antiſporici. (LH. Va.)

R. Florum Sulphuris lotorum
ſemidrachmam,
Extracti Fumariae quantum ſatis
ut fiant boli duo. — Gabe, ein Stück,
zwei Mal. (LH.)

R. Flor. Sulph. lot. . drachmam.
Saponis medicini ſemidrachmam,
Syrupi Gentianae . . . q. s.
M. f. boli no. 9. Ein Stück Mor-
gens und Abends. (Va.)

Bolus Sulphuris compoſitus. (GalM. Va.)

R. Sulphuris loti,
Aniſi pulv., ſing. . grana octo.
Fol Sennae pulv. grana quatuor.
Mellſ . . . quantum ſufficit,
Fiat bolus.

Boli d'aphoretici. (Ca.)

R. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, ſing. ſcrupulum.
Resinae Guajaci . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum ſufficit.
Fiant boli duo. — Ein Stück Mor-
gens, daſ andere Abends, bei Hautkrankhei-
ten und chroniſchen Rheumatismen.

Boli in cysſtide lenta. (B. Va.)

R. Florum Sulphuris . drachmam.
Terebinth. Venetae ſcrup. duos.
Fiant boli ſex. — Gabe, alle drei
Stunden ein Stück. — Dieſe Wiſſen ſollen
ſich vorzüglich nützlich beweifen, wenn eine
Hautkrankheit entweder als Urſache oder

als Complication der Krankheit vorhanden ist.

Boli antiasthmatici. (Ca.)

℞. Conservae Apii,
Extr. Inulae, sing. . drachmam.
Florum Sulphuris,
G. Ammoniaci, sing. semidrachm.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiant boli granorum decem. — Gabe, ein, zwei oder drei Stück fünf oder sechs Mal täglich.

Boli antihaemorrhoidales. (Ca. Sa. Sm. Va.)

℞. Florum Sulphuris scrup. quatuor.
Electuarii catholici scrupulos octo.
Fiant boli quatuor. (Ca. Sm. Va.)
℞. Florum Sulphuris scrupulos duos.
Electuarii lenitivi drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s.
ut fiant boli duo. (Sa.)
Gabe, Morgens ein Stück.

Rotulae pectorales, Trochisci Sulphuris s. e Sulphure, Tabellae pectorales s. e Sulphure. (Ams. Br. GalP. Au. Ca. DB. Fi. Gr. Pie. Re. Sm. Sw. T. Vm.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . . . partes octo.
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.
ut fiant tabellae granorum octodecim [duodecim DB.] (GalP. DB. Re.) (Tabell. de Sulph. simpl.)

Pie. Sulphuris partem unam, Sacchari sex; — Ams. Pie. et Sm. Sulphuris unam et duas Sacchari; — T. Quantitates non indicat.

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . partes duodecim.
Tere sulphur cum sacchari parte una et admisce saccharo reliquo ad plumam cocto. (Vm.)

℞. Pulv. Iridis Flor. . semunciam.
— Liquiritiae scrupulos octo.
— Angelicae scrupulos duos.
Florum Sulphuris . drachnam.
Extracti Inulae,
— Marrubii, sing. scrup. duas.
— Croci . . . scrupulum.
Sacchari albi . . . uncias sedecim.
Olei ess. Foenic. gutt. quindecim.
Fiant trochisci. (Br.)

℞. Pulveris Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
Flor. Sulphuris, sing. drachmam.
Croci . . . grana decem.
Sacchari albi . . . semunciam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiant trochisci ponderis scrupuli dimidii. (Au.)

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Acidi benzoici . grana duodecim.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Olei Anisi . . . guttas duodecim.
Sacch. albi unc. quinque et dimid.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s.
ut fiant tabellae (Tab. de Sulph. comp.) (Gal. Ca. Re.)

Gr. Flor. Sulph. drachm. sex, Fl. Benz. semidrachm., G. Arab., Radic. Irid. Flor., sing. drachm. tres, Bals. Sulph. anis. unam Sacch. unc. octodecim, Mucil. G. Tragac. q. s.

℞. Pulvae Rad. Althaeae
— — Consolidae maj., sing. unciam.

Florum Sulphuris drachmas duas.
— Benzoes . semidrachmam.
Sacchari in Aqua Liliorum alborum dissoluti . . . uncias octo.
Fiant tabellae. (Pie.)

℞. Sulphuris praecipitati uncias duas.
Acidi benzoici . . . scrupulum.
Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Mucil. G. Arabici . . . q. s.
ut fiant tabellae (290 Fi.) (Sw.)

℞. Acidi oxalici . . . partem unam.
Florum Sulphuris partes sedecim.
Commisce cum
Sacchari lenis caloris ope soluti
partibus centum viginti octo.
Fiant tabellae. (Vm.)

*Morsuli ad scabiem, Tabellae antipso-
ricae. (Sp.)*

℞. Florum Sulphuris . . . unciam.
Antimonii crudi,
Spec. Imperatoris, sing.
drachm. duas.
Amygd. dulc. concis. . unciam.
Sacch. albi ad glob. cocti
uncias octo.
Essentiae Citri . . . guttas decem.
Fiant morsuli.

Opium sulphuratum s. cum Sulphure. (GalM. Ra. Va.)

℞. Florum Sulphuris . . . partes 166.
Mellis albi . . . partes 350.
Misce sedulo (GalH.)
Ra. Va. Hosp. Par Mellis partem unam et tres Sulphuris.

Electuarium Sulphuris cum Borace (Gr.): Flor. Sulph. unciam, Potass. Supertr. sesquunciam Subboracis Sodae semunc., Confect. Sennae uncias duas cum dimid., Syr. Aurant. unciam vel q. s. — $\frac{1}{2}$ — 2 Drachmen. Bei Krankheiten der tiefern Darme und des Uterus.

Electuarium laxans s. purgans. (E2. Par. Va.)

R. Florum Sulphuris . semunciam.
Confectionis Sennae sesquunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Par. Syrup. Rosarum.

Gabe, ein Kaffeelöffel Morgens und Abends (drei oder vier Mal täglich. Va.); bei Hämorrhoiden einer Muskatnuß groß drei oder vier Mal täglich, bis der Stuhl gehörig offen ist.

Electuarium s. Conditum pectorale, Mar-melada pectoralis. (Sm. Sw*.)

R. Florum Sulphuris,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Liquiritiae unciam.
Syrupi Rhoeados quantum sufficit.

Misce secundum (Sw*.)

R. Mellis Narbonensis uncias octo.
Florum Sulphuris,
Radice Inulae,
Extracti Liquiritiae,
Aqua Rosarum, sing. drach. duas,
Misce (Sm.)

R. Florum Sulphuris,
Croci,
Roos Sambuci,
Extr. Liquirit., sing. drach. duas.
Mellis Narbonensis unc. quatuor.
Misce. (Sm.)

Gabe, einer Muskatnuß groß, täglich drei oder vier Mal.

Electuarium antirheumaticum. (B*.)

R. Resinae Guajaci,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Cremoris Tartari unciam.
Florum Sulphuris uncias duas.
Nucem moschatam no. 1.
Mellis despumati libram.

Chelsea Pensioner (Gr. Par. Re):
Guajaci drachmam, Rhei duas, Tartra-tis Potassae, Florum Sulphuris, sing. unciam, Nucem mosch. pulv., Mellis libram, f. Electuar. — Gabe, Abends und Morgens 2 Eßlöffel als purg. und diaphor. Mittel. — Gr. Flor. Sulph. uncias duas, reliqua ut antea.

Opiatum antiphthisicum. (B* Pie.)

R. Cetacei,
Florum Sulphuris,
Ocul. Cancror., sing. drach. duas.
Conservae Rosarum semunciam.
Mellis Narbonensis q. s.

Gabe, eine oder zwei Drachmen den Tag über. — Dufresnoy schlägt vor, drei Drachmen Agaricus piperatus hinzuge-setzen, um es wirksamer zu machen.

Looch expectorans. (Han. Bo. Pie. Sm. Va.)

R. Florum Sulphuris . drachmam.
Sacchari pulverati drachm. duas.
Olei Lini unciam.
Syrupi balsamici (Tolut.)
sesquunciam.

Misce. (Han. Va.)

R. Syrupi Violarum . sesquunciam.
Oxymellis simplicis unciam.
Florum Sulphuris semidrachmam.
— Benzoës . grana quindecim.

Misce. (Bo. Pie.)

R. Mellis Narbonensis,
Pulpae Uvarum, sing. unc. duas.
Flor. Sulphuris,
— Benzoës, sing. . drachmam.
Syrupi Erysimi quantum sufficit.
Misce. (Pie.)

Sm. eandem formulam sed loco pul-pae uvar. illam Pomor. Renet.

Mixtura Sulphuris praecipitati, Potio sulphurata. (Au. Va.)

R. Sulphuris praecip. drachm. duas.
Aqua Foeniculi uncias tres.
— Cinnamomi unciam.
Syrupi Opii semunciam.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßfel, bei zuckerartiger Harnruhr und Mercurial-frankheit.

Lotio Sulphuris, Sulphur Wash. (Re.)

R. Sulphuris praecip. drachm. duas.
Acetatis Plumbi scrupulum.
Aqua Rosarum uncias octo.
Misce. — Bei herpes, Morgens und Abends. (B. Bel.)

Tinctura Sulphuris. (Wirf.)

R. Sulphuris sesquunciam.
Liqua lenti ignis ope in patina fictili et adde sensim.

Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Ignem auge, ut massa magis liques-cat, tunc illam in mortarium calidum effunde et pulverata infunde

Alcoholis concentrati uncias decem.

Post sufficientem digestionem cola. — Reizend; bei Brustkrankheiten, Kräße und scorbutischen Geschwüren empfohlen. — Gabe, fünfzig bis sechzig Tropfen in ei-nem passenden Vehikel.

Balsamum Sulphuris s. Sulphuris sim-plex, Oleum sulphuratum, Oleum Lini sulphuratum, Corpus pro Bal-samo Sulphuris, Linimentum e Sul-phure, Sulphureum oleosum fixum. (Borst. Brt. Fult. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lit. Ot. Pal. Sax2t. Wirf. AD. Ams. An. Bel. D. Ed.)

His3. LonN. LP. Sar. Taur. Br. Ca. CG. DB. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Florum Sulphuris partem unam. Olei Amygd. dulc. . partes sex. Digere in balneo arenae per aliquot dies et decantha. (Wirf. Sar.)

Sp. easdem quantitates, sed loco olei amygd. illud Juglandum; — Bor5†. Han†. HC†. O†. Sax2†. An. Bel. D. Fer. LP. et Vm. Sulphuris partem unam et quatuor Olei Lini (sulphur oleo immitte; e, effervescentiam et combustionem evitando, donec massa spissescat et refrigerata gelatinae instar appareat HC†.); — HN†. Olei Lini uncias sedecim, Sulphuris citrin. pulv. tres coquere in vase vitreato aut ferreo etc ut HC.; — DB. ut oleum Mastiche; — Br†. Sulphuris unam et quatuor Olei Amygdal. dulc.; — Ful. †. Taur. C. Gr. Sulphuris unam et quatuor Olei Olivarum; — Pid. Sulphuris unam et quatuor Olei Juglandis; — Li†. Sulphuris unam et quatuor Olei Lini; — Ca. Sulphuris unam et tres Olei Juglandis; — Br†. Sulphuris unam et Olei Lini duas; — HassP†. Florum Sulphuris uncias tres, Olei Lini sesquibram; — AD. Ams. Ed. Lon. LonN. Br. CG. Gr. Re. Sw. Sulphuris partem unam et octo Olei Olivarum; — Sw. Sulphuris et Olei Olivarum. sing. part. aeq.; — T. Florum uncias tres, Olei Juglandis vel Amygd. dulc. viginti; (Balsamum Rulandi); — Olei octodecim (Fi.)

R. Florum Sulphuris . . uncias duas. Olei Papaveris . . sesquibram. Vini generosi . . . semilibram. Post octo dies digestionis coque ad humidi consumptionem usque (Pal†)

Balsamum Sulphuris anisatum, Oleum Anisi sulphuratum, Sulphuretum Olei volatilissimum anisatum. (Br†. Li†. Pal†. Sax2†. Wir†. An. B* D. Gal. His3. LP. Sar. Taur. Ca. DB. Fi. Gr. Pie. T. Vm.)

R. Florum Sulphuris partem unam. Olei ess. Anisi . partes quatuor. Digere ex arenae balneo. (Br† An. Gal. His3. Taur. Ca. DB. Fi. Pie. T. Vm.)

Pal†. Wir†. et Sar. Sulphuris partem unam et sex Olei; — LP. Sulphuris uncias tres, Olei Anisi decem.

R. Bals. Sulphuris simpl. part. unam. Olei ess. Anisi . partes quinque. Misce seculo. (Li†. B*. D.) Sax2†. Olei Anisi partes tres.

Oleum Nucis Juglandum sulphuratum, Balsamum Sulphuris s. Sulphuris Rulandi. (His3. Taur.)

Simili modo ut oleum Anisi sulphuratum e Sulph. parte una et quatuor Ol. Jugland. paratur.

Emulsio cum Balsamo Sulphuris anisato. (Va. Vm.)

R. Gummi Arabici drachmas duas. Bals. Sulphuris anis. drachmam. Mellis Narbonnensis . . unciam. Aquae Hyssopi . . uncias octo.

Balsamum Sulphuris succinatum, Oleum Sulphuris succinatum s. Succini sulphuratum. (Sax2†. His3. Sar. Taur. Vm.)

R. Olei Succini rectificati partes sex. Florum Sulphuris partem unam. Digere super arena. (Sar. Vm.)

Sax2†. Balsami partem, Olei Succini tres; — His3. Taur. Olei partem et quatuor Sulphuris; — Fi. Florum unciam, Olei quatuor.

Balsamus Vitae Rulandi, Balsamum Sulphuris terebinthinatum s. Rulandi, Oleum Terebinthinae sulphuratum. Bor5†. Br†. Han†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. An. B. Bel. D. Fer. His3. Sar. Suec. Taur. Ca. Gr. Pid. T. Vm.)

R. Florum Sulphuris . . partem. Olei Terebinth. . part. quatuor. Dissolve in balneo arenae. (Fer. His3. Taur. Fi. Gr. Vm.)

Gr. Flor. Sulph. part. unam, Ol. Terebinth. duas; — Br†. Pal†. Wir†. Wür†. Sar. Ca. Sulphuris unam et Essentiae quinque; — T. Florum unam, Olei octo.

R. Florum Sulphuris . . partes duas. Olei Lini . . . partes sex. Dissolve et solutionis part. tribus adde

Ess. Terebinthinae . partes octo. Misce (Suec.)

Bor†. Han†. Am. B. Bel. et C. Balsami Sulphuris simpl. partem unam et tres Essentiae; — Pid. quatuor Essentiae; — D. Essentiae octo; — Li†. Essentiae quinque; — Fer. Balsami tres et Essentiae triginta duas; — Bor5†. HC†. HN†. Sax2†. Olei Lini sulphurati partem unam, Terebinthinae tres

R. Sulphuris . . . uncias duas. Essentiae Terebinthinae uncias tres. Olei Lini . . . libras duas.

Liqua sulphur in oleo, adde essentiam et digere blandissimo calore. (Br†. Wir†.)

Reizend, ehebem für harntreibend gehalten. Bei jauchigen, brandigen Geschwüren. — Gabe, sechs bis zwölf Tropfen.

Balsamum Sulphuris cum Balsamo Copaivae. (Taur.)

℞. Balsami Sulphuris sesquiunciam, Balsami Copaivae . . . uncias sex. Digere et cola.

Tinctura Balsami Sulphuris. (Gr. Re.)

℞. Balsami Sulph. terebinth. in balneo mariae ad siccum cocti . . . uncias duas.

Aquae Vitae . . . libram. Digere. — Brustmittel.

Balsamum aethereum (Auf.)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati, Aetheris sulph., sing. semidrachm. Olei animalis Dippelii guttas sex.

Von Bücking bei colica pituitosa von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zwei bis zehn Tropfen, täglich drei Mal, auf Zucker oder in etwas Wasser.

Ceratum e Sulphure. (GalP. Ra. Sw. Va.)

℞. Florum Sulphuris uncias quatuor. Cerati . . . libram.

Misce. (Ra. Va. Hosp. Inf.)

℞. Sulphuris loti . . . unciam, Cerati Galeni uncias tres cum dimidia,

Olei Amygdalarum dulce. semunciam.

Misce. (GalP.)

℞. Florum Sulphuris, Bacc. Lauri, sing. . . unciam.

Butyri recentis . . . quantum sufficit. Misce triturando. (Sw.)

Unguentum Sulphuris s. e Sulphure s. sulphuratum s. sulphuratum simplex s. ad scabiem, Pomatum Sulphuris s. sulphuratum simplex s. antipsoricum. (Bat. BorCt. Bor5t. Hamt. Hant. HCt. HNt. Sax2t. Aut. AU. Am. Du. Ed. GalP. LonN. LoP (1836). Lus. RC. C. Ca. CG. DB. Gr. Ra. Re. Sw. T.)

℞. Florum Sulphuris partem unam. Axungiae Porci . . . partes duas.

Misce triturando. (BorCt. Bor5t. Hant. HCt. HNt. Sax2t. Ra Sw.)

Bat GalP. Sulphuris partem unam et tres Axungiae; — AD. Am Du. Ed. Lon. RC. C. Gr. Sulphuris unam et quatuor Adipis (adde Ess. Limon. vel Ol. Lavand. semidrachm. Ed. Gr.); — Lon. (1836) CG. Gr. Re. Sulphuris sublimati uncias tres, Adipis praep. semilibram, (Bergamii Olei minima vi-

ginti Lon. 1836.); — Hamt. Sulphuris unam et Axungiae octo; — Aut. Sulphuris unciam et Axungiae q. s.; — T. Florum uncias sex, Axungiae octo, Sebi quatuor; — DB. Sulphuris libram, Axungiae Porci uncias sedecim, Sebi bovini octo.

℞. Sulphuris . . . partem unam. Unguenti rosati . . . partes duas.

Contere. (Lus.)

Gr. Ung. simpl. semilibram, Flor. Sulph. unc. duas, Ess. Limon. scrupulum; vel: sec. Lon. ante 1809: Ung. Adipis suill. semilibram, Flor. Sulph. unc. quatuor.

℞. Olei Juglandis . . . semilibram.

Florum Sulphuris . . . uncias duas.

Dissolve in balneo aquae et adde

Axungiae Porci . . . semilibram.

Cerae flavae . . . unciam.

Alcannae . . . quantum sufficit

ad colorandum. Cola per linteum. (Ca.)

Sulphuretum saponaceum. (LP.)

℞. Olei communis . . . uncias quatuor.

Saponis albi raspati semunciam.

Sulphuris . . . drachmam.

In balneo arenae coque ad spissitudinem et refrigeratum serva. — Auf: lösend, zertheilend; bei verschiedenen Geschwülsten und Verbrennungen. Innerlich bei Vergiftungen, eine halbe bis zwei Drachmen.

Linimentum psoricum, Pomatum s. Unguentum sulphuro-saponaceum s. antipsoricum. (B*. DD. GalH. Au. Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

℞. Florum Sulphuris,

Saponis albi, sing. . . part. unam.

Aquae purae . . . partes tres.

Dissolve saponem in Aqua, per cribrum trajice et adde sulphur, continue agitando. (GalH. Ra. Va.)

℞. Subcarb. Potassae . . . uncias duas.

Aquae bullientis . . . unciam.

Olei Olivarum . . . uncias quatuor.

Fiat sapo, cui continue terendo, sensim adde

Florum Sulphuris uncias quinque.

Misce bene. (Ra.)

℞. Saponis nigri . . . partes duas.

Florum Sulphuris partem unam.

Misce triturando. (DD.)

B*. Sulphuris et Saponis nigri, sing.

part. aeq. cum Aquae s. q.; — HCt.

Sulphuris et Saponis nigri, sing. partem unam, Aquae partes tres.

Lotio sulphuro-saponacea. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.

Aquae . . . libras quindecim.

Solutioni adde

Sulphuris pulverati . uncias tres.

Unguentum sulphuratum s. sulphuratum compositum s. Sulphuris s. Sulphuris cum Zinci Sulphate s. Sulphuris compositum s. antipsoricum s. contra scabiem s. ad scabiem s. ad scabiem cum Sulphure sublimato s. Sulphuris cum Helleboro s. Hellebori sulphuratum s. psoricum Anglicum, Pomatum Sulphuris compositum, Pomatum s. Unguentum antipsoricum Jasseri s. contra scabiem. (A†. Bor5†. Ful†. Han†. HC†. HN†. Li†. Sax2†. WW†. Au†. AD. Am. Am. An. B. Bel. D. Gal. GalM. GalP. His3. LH. LonN. (1836) LoP. LP. Pm. Pol. R. Sar. Taur. Bo. Br. C. Ca. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Pie. Ra. Re. Sa. Sm. Sp. Sw. T. Va Vm.)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.

Subcarb. Potassae partem unam.

Axungiae Porci . . partes octo.

Misce trititando. (Gal. Ca Sw.)

Sa. Sulphuris uncias duas, Subcarbonatis semunciam et Essentiae Citri semiscrupulum; - D. Sulphuris, Bacc. Lauri, sing. unciam, Radicis Inulae duas, Subcarbonatis semunciam et Axungiae uncias decem; - Va. Hosp. St. Lud. Flor. Sulph. unc. quinque, Subcarb. Potass. duas, Aquae unam, Ol. Oliv. drach. quatuor.

℞. Florum Sulphuris,

Sulphatis Zinci, sing. partes sex.

Axungiae Porci . partes sedecim.

Contere (WW†)

D. et R. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et duodecim Axungiae.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.

Oxydi Zinci part. unam c. dimid.

Olei Lauri . . . partes tres.

Axungiae Porci . . . partes sex.

Misce simul. (Vm.)

℞. Florum Sulphuris,

Sulphatis Zinci,

Olei Lauri, sing. . partem unam.

Axungiae Porci . . partes sex.

Contere. (Sax2†.)

His3. Sulphuris partes duas, Sulphatis tantidem, Olei Lauri et Axungiae, sing. quatuor; - B. Bel. et L†. Sulphuris duas, unam sulphatis, Olei Lauri tres et Axungiae sex; - Sw. Sulphuris, Sulphatis et Olei Lauri, sing. part. aeq. absque axungia; - Ful†. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et sex Axungiae absque oleo; - Bor5†. et Pol. Sulphuris, Sulphatis, sing. duas, et octo Axungiae absque oleo; - A†. Sulphuris sesquiunciam, Sulphatis tantidem et Unguenti simpl. libram; -

Re. Sulphuris, Sulphatis, sing. unc. duas, Axungiae et Ol. Lauri q. s.

℞. Florum Sulphuris,

Sulphatis Zinci,

Bacc. Lauri, sing. partem unam.

Unguenti rosati . partes quatuor.

Misce bene. (Han†. HN†)

HC†. Unguenti rosati partes quinque; - DB. Sulphuris uncias octo, Axungiae Porci libras tres, Sevi bovini libram, Salis communis decrepit. uncias sex, Vitriol. albi tres, Olei Lavandulae q. s.; - Sm. Sulphuris, Sulphatis, Bacc. Lauri, sing. unciam et Olei Lini q. s.

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.

Cerussae pulveratae semunciam.

Praecipitati albi drachmas duas.

Axungiae cum Aqua Rosar. ablut.

libram.

Misce bene. (Sar.)

℞. Radicis Lapati aquatici uncias octo.

Pol. Fumariae,

— Lauri,

— Nicotian., sing. semimanip.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque, postea contunde, cola per cribrum et uncis sex pulvae adde

Florum Sulphuris . semunciam.

Salis mar. decrep. drachmas sex

Axungiae Porci . . . uncias tres.

Misce trititando. (Bo.)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.

Salis mar. decrep. partem unam.

Axungiae Porci . . partes octo.

Pulveres cum axungia liquata commisce. (GalM.)

Fi. Florum Sulphuris, Salis marini decrepitati, singulorum uncias quatuor, Adipis suilli praeparati sesquilibram, Sevi bovilli uncias sex, Olei essentialis Lavandulae drachmas duas; - Pm. Ingredientium sing. praemonitorum duplicem quantitatem adhibet; - LP. Florum Sulphuris uncias quatuor, Muratis Sodae subtiliter pulv. duas, Axungiae libram et Olei Lavandulae drachmam; - T. Florum libram, Salis uncias sex, Axungiae libras tres, Sebi unam, Olei Lavandulae semunciam

℞. Florum Sulphuris partes sedecim.

Salis Ammoniaci . partem unam.

Axungiae Porci partes triginta duas.

Commisce bene. (Pid.)

Ams. et B*. Sulphuris partes octo,

Salis Ammon. unam et Axungiae sedecim;

— Ra. Sulphuris uncias duas,

Salis Ammon. drachmam, Axungiae

uncias quatuor et Essentiae Citri scrupulum;

— Pie. Sulphuris uncias duas,

Salis Ammon. drachmas duas, Axun-

giae uncias duas et Olei ess. Flor. An-

rant. q. s.; — *Auf.* Sulphuris uncias tres, Salis Ammon. drachmas duas et Axungiae Porci q. s. ut fiat unguentum; — *Taur.* Sulphuris, Salis Ammoniaci, Salis marini, sing. uncias duas, Axungiae libras tres.

R. Florum Sulphuris partes sexaginta, Salis Ammoniaci, Aluminis, sing. partes quatuor. Misce. (Gal.)

GalP. Sulphuris uncias octo, Sal. Ammon., Alumin., sing. semunciam, Axungiae libram.

R. Florum Sulphuris . . . unciam. Pulv. Hellebori albi drach. duas. Axungiae Porci . . . uncias duas. Commisce. (An.)

R. Florum Sulphuris, Saponis, singulorum semilibram. Rad. Hellebori nigri unc. duas. Axungiae libras duas cum dimidia.

Misce sedulo. (Sax2.)
Re. Sulphuris uncias duas, Hellebori albi semunciam, Saponis mollis unciam, Axungiae vel Olei Palmae uncias tres, Olei Terebinth. vel Picis liquidae drachmas duas. (Mange ointment for dogs.)

R. Florum Sulphuris . . . semilibram. Radicis Hellebori albi uncias duas. Nitri . . . drachmam. Saponis mollis vel nigri semilibram. Axungiae Porci . . . sesquilibram.

Misce. (Hant. HassP. HC. *Auf.* AD. LonN. CG. Gr. Re.)

Lon. 1836. Bergamii Olei minima trīginti addit, caeterum ut antea; — *HN.* Sulphuris unciam, Hellebori albi drachmas duas, Nitri decem, Saponis nigri unciam, Adipis suilli uncias tres (*Ungt. Anglorum contra scabiem*); — *LH.* Sw. Sulphuris libram, Hellebori albi uncias tres, Nitri sesquiunciam, Saponis libram et Axungiae tres; — *Gr.* Adipis praep., Ol. Palmae, Sulph. vivi, Rad. Helleb. albi, sing. part. aeq. (*Jackson's itch Ointment.*)

R. Florum Sulphuris . . . unciam. Praecipitati albi, Acidi benzoici, sing. drachmam. Olei essentialis Citri . . . unciam. Acidi sulphurici . . . grana sedecim. Nitri . . . drachmas duas. Axungiae . . . semilibram.

Axungiae liquatae reliquas substantias, continue ad refrigerationem usque agitando, admisce. (Am. C.)

AD. Olei Citri et Acidi sulphurici sing. drachmam.

R. Axungiae Porci uncias octodecim. Olei rosati . . . uncias sex. Florum Sulphuris uncias novem. Pulv. Caryophyllorum,

Pulv. Granorum Paradisi,
— Zingiberis, sing. sesquiunciam.

Misce bene. (Sp.)
R. Axungiae Porci . . . libram. Extracti Fellis Tauri uncias duas. Florum Sulphuris, Aloës hepaticae, Colocynthidis, sing. semunciam. Olei Absinthii . . . drachmas tres.

Axungiae leni igne liquatae admisce reliqua. (Br.)

R. Succu Elaterii . . . partem. Coagulet blandi caloris ope, tunc faeculam separatam et exstillatam commisce cum

Olei Olivarum . . . parte dimidia. Butyri . . . partis quadrante, et supra ignem relinque, donec humidum consumptum sit; contunde deinde et adde

Cerae . . . partis decimum. Extracti Fellis, Galbani, sing. partis nonagesimum.

Massae semiconcretatae deinde adde Scammonii,

Aloës, Colocynthidis, Cort. Mezerei, sing. . . part. $\frac{1}{30}$.

Euphorbii, Myrrhae, Piperis longi,

Zingiberis, sing. . . part. $\frac{1}{100}$.

Unguenta ad scabiem: 1) Sulph. sublim. part. duas, Potass. Subcarb. unam, Axung. octo. Morgens und Abends auf alle frägige Stellen einzureiben, und dabei eine bittere und leicht tonische oder kühlende Diät, je nach Alter und Constitution des Kranken, und täglich oder alle 2 Tage ein einfaches Bad zu brauchen. Mittlere Dauer der Behandlung 12 Tage. (Hosp. St. Lud.) 2) Acidi sulphur. gramm. 250, Axung. 50, misce.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (Pic.)

R. Florum Sulphuris . . . drachmam. Pulpae Rad. Patientiae . . . unciam. Axungiae Porci . . . uncias duas. Succu Citri . . . cochlearia duo.

Misce sedulo.

R. Florum Sulphuris, Benzoës, singulorum uncias duas. Butyri recentis quantum sufficit.

Misce trititando.

Unguentum stimulans. (LH.)

R. Carbonis pulverati . . . semunciam. Florum Sulphuris . . . unciam.

Gerati simplicis uncias duas cum dimid.

Misce.

Unguentum s. Pomatum contra tineam.
(Bo. Va. Hosp. Monsp.)

R. Florum Sulphuris,
Carbonis pulv., sing. uncias duas.
Fuliginis pulverati,
Chinae pulv., sing. unciam.
Cerati quantum sufficit.
Contere et bene misce.
Emplastrum resinosum sulphuratum
s. Guillermi servitoris s. sulphuratum.
(Hi. S.)

R. Resinae Pini,
Colophonii, sing. libras duas.
Cerae flavae libram.
Terebinthinae uncias octo.
Mixturae liquatae et colatae adde
Pulv. Zingiberis sesquiunciam.
— Baccarum Lauri,
— Sulphuris,
— Anisi,
— Pullegii,
— Olibani,
— Croci,
— Mastichis, sing. unciam.
— Piperis Jamaicae, uncias duas.
Misce exacte.

Swietenia.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:
1) *Swietenia Mahagoni*, L.; *Mahagoni*holz; *Mahogon d'Amérique*, *Acajou à meubles* (Gal.)

D. Br. G. Gr. M. Re.
Ein großer Baum (*Decandria Monogynia*, L.; *Meliaceae*, J.) Südamerica's.

(Plenck t. 336. Hayne I. t. 19. Cat. Carol. II t. 20)

Man wendet die Rinde des Stammes und der Zweige (*cortex ligni Mahagoni*) an; es sind fast platte, fußlange, rauhe, graubraune Stücke; die von den Zweigen ist gerollt handlang und kürzer, außen weißlichgrau, inwendig dunkelrothbraun; sie hat keinen Geruch, aber einen sehr adstringirenden, etwas bittern Geschmack. — Das *Extractum Mahagoni* wird durch Abkochung bereit. (Gr.)

2) *Swietenia febrifuga*, Roxb.; Fieberbaum; *Mahagon febrifuge* (Gal.); *Bark of the red wood tree* (Ang.); *Rohun* (Beng.); *Swamy* (Can.); *Patranga* (Sa.); *Schemmarum*, *Wumamaram* (Tam.); *Soimido* (Tel.).
D. Du. A. C. G. Gr. Re.

Ein Baum der Küste Coromandel. (Roxb. Fl. Corom. I. t. 17. Hayne I. t. 20.)

Man wendet die Rinde (*cortex Soymidae*, *Drymis aromatica*) an; sie kommt in Stücken von verschiedener Größe, vor, meist einem bis zwei Fuß Länge, auf einen bis acht Zoll Breite und von mäßiger Dicke vor, hat eine dünne, rauhe, aschgraue, einigermaßen punctirte Oberhaut und ist feuerroth; bricht leicht, ist aber übrigens hart und der Politur fähig. Sie hat einen angenehmen, schwach gewürzhaften Geruch und einen sehr bittern, adstringirenden und etwas balsamischen Geschmack.

Fiebermittel. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel.

T.

Tacamahaca.

Zwei Harze führen in den Pharmacopöen diesen Namen:

1) *Tacamahaca*; *Hachundack*, *Takamahachary*; *Tacamahaca ordinaire* (Gal.); *Takamahaka* (B.); *Hak og tak* (H.); *Tacamaca* (His. Lus.); *Taccamacca* (I.).

Bor5+. Br+. Pul+. Han+. HassP+. HC+. HN+. O+. Sax2+. W.r+. Wü+. M+. Ams. An. B. D. Fer. Gal. GalM. His. LP. R. Taur. Be. Br. Fr. G. Gr. Re. Sp. T. Z.

In unregelmäßigen Massen, welche aus aneinandert liegenden Stücken zu bestehen scheinen, von gelblicher oder grünllicher Farbe, innerlich halbdurchscheinend, außen mit wellenförmigen, weißlichen, graulichen Binden; sie lassen sich leicht zerrören und

haben einen gewürzhaften, terpeninartigen Geruch und keinen besonders merkbaren, nach einiger Zeit scharf werdenden Geschmack.

Außer dieser Sorte, welche gemeiner *Takamahak* (*Tacamahaca communis* s. in sortis), *Tacamahaca communis* oder *sortis* (Gal.), genannt wird, kennt man noch eine andere, *Tacamahaca sublimis* s. in testa, *Tacamahaca sublime*, angelique oder en coques, in Tropfen oder kleinen Körnern, außen von weißlichgrauer, innen von gelblicher oder röthlicher Farbe.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in die Rinde von *Fagara octandra*, L. *Elaphrium tomentosum*, Jacq. (*Decandria Monogynia*, L.; *Terebinthaceae*, J.), einem Baume Südamerica's und, wie behauptet wird, auch *Madagascaria* (Jacq. Am. t. 71. fig. 1 — 3.