

Contunde in mortario lapideo vel porphyreo, cola per pannum, sepono succum, decantha et in lagena longicollis sub strato olei serva.

Taur. ut succum Ribium; — T. ut succum Myrtillorum. — Angenehm sauer, in allen Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt sind.

Syrupus Omphacii s. Agresti s. Agrestae s. Succo Agrestae s. de Agresta. (Wirtz. Gal. Hisz. Lus. Pm. Sar. Taur. DB. T.)

Rx. Succo Agrestae rec., depur. et filt. libr. duas.

Sacchari libras tres cum dimidia.

Liqua blando calore. (Gal. Taur.)

Wirtz. Succo sesquilibram et Sacchari libras duas; — Pal. succo libras quinque et tres Sacchari; — Pm. Omphacii defaecati libras duas, Sacchari qua-

tuor; — Hisz. Succo libram unam et duas Sacchari; — Suec. Succo et Syrupi communis q. s. ut fiat vaporatone in balneo aquae syrupus; — T. Succo libras quatuor, Sacchari septem et si placet addere Oleosacchari Limonium vel de Cedro pauxillum; — DB. Sacchari uncias viginti duas, Succo libram.

Unguentum s. Pomatum adstringens. (Bo.)

Rx. Omphacii uncias octo.

Unguenti rosati libram.

Cerae flavae uncias quatuor.

Coque ad liquidi aquosi consumptionem, post refrigerationem faeces separa, denuo liquefac et Essentiam Rosarum adde

Extractum Vitis Pampinorum (Bor5+) Ut extractum aconiti, calendulae etc.

X.

Xanthium.

Xanthium strumarium, L. *Dioscoridis*; Kropfklette, Kropfbetterlauch, Klissen; Lampourde, Petit Glouteron, Petite bardane (Gal.); Lesser burdock (Ang.); Gaasesskreppe (D.); Lampazo pequeno (Hisz.); Kleine Klissen (Bel.); Lappola minore (L.); Bardane menor (Lus.); Spetsborre (Suec.)

Brz. Wirtz. Mz. Gal. Lus. Taur. Gr. Sp.

⊙ (Monoecia Pentandria, L.; *Synantherea*, Cass.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 269.) Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Xanthii s. Bardanae s. Lappae minoris) besteht aus einem kantigen, ästigen Stängel, abwechselnden, gestielten, fast rundlichen, herzförmigen, gezähnten, buchtigen, etwas lappigen, behaarten, scharf anzufühlenden, am Grunde drei-

nervigen Blättern. — Der Saame ist klein, länglicheirund, an beiden Enden spitzig, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, rötlich und steckt in einer festen, länglichen, an der Spitze eingeschnittenen, außen mit Spigen besetzten Hülle.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack scharf und bitter.

Ehedem wendete man den Saft zu sechs Unzen gegen Kropf an.

Xanthorrhoea.

Xanthorrhoea hastilis s. *Acarois resinifera*, Palmen aus Neu-Süd-Wales liefern das

Gummi flavum s. Gummi Resinae Acaroidis,

Gr. welches gegen Ruhr und äußerlich zur Vereinigung der Ränder großer und gefährlicher Wunden benutzt wird.

Z.

Zanthorrhiza s. Xanthorrhiza.

Zanthorrhiza fopitolia, L'Her.; Gelbwurz; Zanthorrhize à feuilles d'ache (Gal.); Yellow root, Parsley leaved yellow root, Shrub yellow root (Ang.). AD. Am C. Gr. Re.

Ein kleiner Strauch (Pentandria Polygynia, L.; Ranunculaceae, J.) Virginiens (L'Her. St. nov. p. 79, t. 38.)

Die Wurzel ist länglich, von der Stärke des kleinen Fingers, mit vielen kleinen Fasern besetzt und gelb. Sie hat einen bittern Geschmack.

Zanthoxylum s. Xanthoxylum.

Zanthoxylum clavatum, fraxineum, Clava Herculis, L.; Zahnweibholz; Clavier à feuilles de frêne, Frêne épineux (Gal.); Prickly ash, Toothach-tree (Ang.)

AD. Am. C. Gr. Re.

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) der Antillen.

Die Rinde, welche man anwendet, ist braun und scharf; sie dient gegen Zahnschmerzen. Die Tinctur benutzt man in America bei chronischen Rheumatismen.

Z e a.

Zea Mays, L.; Mais, Türkischer Weizen, Kukuruz; Mais, Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Turquie (Gal.); Indian korn (Ang.); Tyrkisk korn (D.); Mais (His.); Mays (Bel.); Gran turco (I.); Maiz, Milho de Turquia (Lus.); Türkisk korn (Succ.); Török búza, Kukoritza, Málé, Tengeri (Hu.).

Gal. Taur. Gr. Re.

⊙ (Monoclea Triandria, L.; Gramineae, J.) Eine in America einheimische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 547. Düss. off. Pfl. Suppl. IV. t. 1. 2.)

Man wendet den Saamen (semen Mays) an; er ist rundlich, eckig, von der Größe einer gewöhnlichen Erbse, außen goldgelb, innen weiß und glänzend.

Nestlig, nährend.

Z e d o a r i a.

Radix Zedoariae; Bitterwurzel, Bitterweringwer, Bitterwurzel; Zédoaire (Gal.); Zedoary (Ang.); Indwar, Bar (Ar.); Bhuchampa, Junglie huldie, Bun huldie (Beng.); Cycwar (H.); Nagaimio (Ca.); Kaha, Wulkaha (Cy.); Ambie huldie (Duk.); Zedoaria (His. Lus.); Nirbisi (Hin.); Bokzedoar (Bel.); Mantankua (Malab.); Cytwar (Pol.); Bhuchampaka, Nirvischa, Vanaharidra (Sa.); Sittwer (Succ.); Castorie mungel (Tam.); Castorie passapu (Tel.).

Bar. Borst. Brt. Fult. Hamt. Hant. HassPt. HCt. HNT. Lit. Ot. Sax2t. Wirt. Wirt. Mt. Ams. An. B. Bel. Du. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His. LH. LP. Pol. R. Succ. Taur. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Va. 7.

Man unterscheidet zwei Sorten Bitterwurzel.

1) *Zedoaria longa, Z. flava*, langer Bitterwurzel, einige Zoll lang, fingerdick, runzlig, knotig, außen graulich, innen bräunlich.

Pharmacopoea universalis, II Bd. 3. Aufl.

2) *Zedoaria rotunda*, runder Bitterwurzel, einen Zoll lang mit runzlicher, mit Fasern bedeckter Oberfläche.

Der Bitterwurzel kommt in harten, weißlichen, von der Oberhaut entblößten Stücken zu uns. Er ist gewürzhaft, scharf und beißend.

Er enthält viel Zagehl und ein wesentliches kampherartiges Öl.

Der lange Bitterwurzel wird allgemein für die Wurzel von *Amomum Zedoaria*, Willd., *Curcuma Zedoaria*, Roscoe, *Curcuma Zerumbet*, Roxburgh, angesehen, einer Pflanze 4 (Monandria Monogynia, L., Amomeae, J.) Ostindien's (L. med. VI. 349. 1. Was den runden anlangt, so sind einige Schriftsteller, unter andern Kinsie und Guibourt, der Meinung, daß er von *Kaempferia rotunda*, L., (Düss. off. Pfl. Suppl. t. 4) abstamme. Andere, z. B., Mérat, glauben, beide seyen bloße Spielarten der Wurzel einer und derselben Pflanze, durch Dichtigkeit und Art des Wachstums bedingt.

Reizend, tonisch, magenstärkend. Gabe des Pulvers, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Extractum Zedoariae. (Brt. Wirt. Pal. Sar. T.)

R. Radicis Zedoariae . . . libram.

Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; residuum digere, tunc coque parumper cum Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope; liquores commisce et alcohole distillatione separato, residuum lenta vaporazione consume (Brt. Pal. Wirt.).

R. Zedoariae . . . libram.

Vini albi gen. libr. quinque ad sex.

Digere per tres dies super arenae balneo, tunc residuum coque cum novi Vini q. s. ad dimidii remanentiam; liquores commixti lente ad extracti consist. evaporent. (Sar.)

T. Zedoariae libram, Aquae bullientis octo, infunde per horas 24, filtra et consume.

Tinctura s. Essentia Zedoariae. (Brt. Ams. Han.)

R. Radicis Zedoariae partem unam.

Alcoholis (0,907) . . . partes octo.

Digere per dies octo et filtra. (Ams.)

Brt. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — Han. Radici uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Reizend. — Gabe, sechszig Tropfen täglich zwei Mal.

Tinctura Zedoariae composita, Essentia carminativa s. carminativa Wedd.

(Br†. Pal†. Sax2†. Wir†. B*. Han. Ca. Sp.)

R. Rad. Zedoariae uncias quatuor.

— Carlinae,

— Calami,

— Galangae, sing. unc. duas.

Florum Chamomillae Romanae,

Seminum Anisi,

— Carvi, sing. . . unciam.

Caryophyllorum,

Bacc. Lauri, sing. drachmas sex.

Macidis semunciam.

Corticis Aurantiorum . unciam.

Spir. Cort. Citri libr. quatuor et

dim

— Nitri dulcis unc. duas c. dim.

Infunde per dies sex, exprime et filtra. (Br†. Han†. Sax†. Wir†. B*. Sp.)

Sax2†. Zedoariae unciam, Calami,

Galangae, sing. drach. duas, Flor. Chamom. Rom., Cort. Aur. Curass., Citri,

Semin. Anisi, Cumini, sing. grana decem, Caryoph. arom., Bacc. Lauri,

Macis, sing. drachmam, digerere cum

Spir. rectific. uncis quatuordecim per

sex dies, ut fiat tinct. sec. method. pro

tinct. Absinth. indicatam, cui colatae

et refrigeratae addere Spir. nitrico-

aeth. drachm. quinque et filtrare.

R. Rad. Zedoariae . . . unciam.

— Carlinae,

— Galangae, sing. semunciam.

Corticis Aurantiorum,

Seminum Anisi,

— Carvi,

Florum Chamomillae Romanae,

Caryophyllorum,

Baccarum Lauri,

Acori veri, sing. sesquidrachmam.

Macidis drachmam.

Spiritus Corticis Citri libras duas.

Acidi nitrici . . . semunciam.

Post sufficientem digestionem filtra.

(Pal†. B*.)

R. Radi Zedoariae . . . unciam.

— Carlinae,

— Calami aromatibi,

— Galangae, sing. semunciam.

Florum Chamomillae,

Seminum Anisi.

— Carvi,

Cort. sicci Aurant., sing.

drach. duas

Baccarum Lauri,

Caryophyll., sing. sesquidrachmam.

Macidis drachmam.

Spiritus Citri libram.

Acidi nitrici drachmas quinque.

Reizend, magenstärkend, bläungtrei-

bend, Menstruation befördernd und harn-

treibend. — Gabe, eine halbe bis ganze

Drachme.

Tinctura bezcardica. (Pal†. Wir†. Sp.)

R. Radicis Zedoariae,

— Serpentariae Virginicae,

— Angelicae,

— Pimpinellae albae,

Herbae Scordii,

— Dictamni Cretici,

Baccarum Juniperi,

Corticis Citri,

Myrrhae, sing. . . drachmas sex.

Spir. Flor. Sambuci rectific. libram.

Post sufficientem digestionem cola

exprimendo et liquori adde

Spiritus Tartari . . uncias sex.

— Vitrioli . . . uncias duas.

Camphorae semunciam.

Digere, filtra et serva. (Pal†. Wir†.)

R. Rad. Zedoariae . . uncias duas.

— Angelicae,

— Pimpinellae albae,

— Valerianae,

— Vincetoxici,

— Calami arom. sing. unciam.

— Costi Arabici,

Corticis Citri recentis,

Bacc. Juniperi, sing. . unc. duas.

Myrrhae uncias tres.

Herb. Scordii . . sesquiunciam.

— Melissa,

— Millefolii,

— Rutae, sing. . . unc. 72.

Camphorae unciam.

Theriaceae libram.

Alcoholis libras sex.

Post octo dies digestionis adde

Aquae fontanae . . libras duas.

Destillantur; tunc recipe

Hujus Spiritus . . libras duas.

Spiritus Tartari . . semilibram.

Acidi sulphurici . . uncias tres.

Misce, adde Succum Baccarum Pa-

ridis ad colorandum et filtra. (Wir†.

Sp.).

Reizend, ehemals bei fäuligen Fiebern

empfohlen — Gabe, eine halbe Drachme.

Oleum Zedoariae aethereum, Aethereo-

leum Zedoariae. (Br†. Pal†. Wir†. T.)

R. Zedoariae partes sex.

Aquae . . . partes triginta sex.

Salis culinaris . . partem unam.

Post quatuor vel quinque dies mace-

rationis destillatio fiat et oleum in

fundo recipientis subsidens eximatur.

T. ut oleum Valerianae.

Aqua Zedoariae vinosa. (Br† Wir†.)

R. Zedoariae . . . partem unam.

Vini generosi . partes duodecim.

Destillet dimidia pars. (Wir†.)

R. Zedoariae uncias sex.

Vini libras tres.

Alcoholis, . . . sesquibram.
Aqua, sing.
Destillent librae quatuor. (Br+.)

Aqua Zedoariae anisata. (Pal+. Wir+.
Sar. Pid.)

R. Zedoariae uncias sex.
Anisi uncias tres.
Corticis Citri uncias duas.
Alcoholis libras sex.

Destillet dimidia pars. (Pid.)
Pal+. Wir+. et Sar. Zedoariae uncias
sex, Anisi uncias tres, Corticis Citri
unam et Vini albi libras octo; post
octo dies infusionis destillet dimidia
pars.

Zibethum.

Zibetha; Zibeth; Civette (Gal.); Ci-
vet (Ang.); Zibeto (His.); Sivet (Bel.);
Zibetto (I.); Algalia (Lus.).

Br+. Wi+. Gal. His. LP. Taur. Er.
G. Gr. Pid. Re. Sp. T.

Eine halbflüssige, salbenartige, weißliche
oder gelbliche, an der Luft braun und sehr
dick werdende Substanz von sehr starkem
Geruche, welche von Drüsen abgesondert
und in einem zwischen After und Ge-
schlechtsstellen des Zibeththiers, Viverra
Zibetha, L., eines nagenden Säugethiers
Asiens und Africas, befindlichen Beutel
abgesetzt wird.

Reizend, Krampfstillend. — Gabe, fünf
bis sechs Gran.

Tinctura Zibethi, Essence of Civet
(DE. Gr. Re): Zibethi unciam, Spi-
ritus rectif. octarium. — DE. ut tinc-
turam Moschi.

Essence royale (Gr. Re): Ambr.
gris. scrupulos duos, Moschi unum,
Zibethi grana decem, Ol. Cinn. guttas
sex, Ol. Lig. Rhod. tres vel quatuor.
Kali praep. semidrachmam, contere et
adde Spir. Ros., Aq. Flor. Aur.: sing.
sesquiunciam. — Anaesthetisches Aphrodi-
siacum zu einigen Tropfen in syrop. ca-
pill.

Oleum Zibethi (DE) ut oleum Ca-
storei.

Zincum.

Zincum, Stannum indicum; Zink;
Spiauter; Zinc (Gal.); Zinc (Ang.);
Pisyuen C.; Sanguisrie (Duk); Zinco
(I. Lus); Cynk (Pol.); Spiahter (R.);
Tutunagum (Tam.).

At. Bat. Borst+. Br+. Ful+. Ham+.
Han+. HassP. H+. HN+. It. O+.
Sax+. Wir+. AD. Am. Ams. An. B. Bel.
D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen.
His. LonN. LPC. Lus. Pol. R. RC.

Suec. Taur. A. C. CG. DB. Fl. Gr.
Pid. Re. Sp. T.

Ein derbes, bläulichweißes, blättriges,
sehr streckbares, aber eher zu Blechen zu
schlagendes als zu Draht ziebares Me-
tall, welches die Feile fettig macht und da-
her nicht sehr hart, schon bei Rothglühige
schmelzbar ist, sich verflüchtigen läßt, mit
sehr heller Lichtentwicklung brennt und
auf feuchte Luft nur eine sehr schwache
Wirkung ausübt. Specif. Schw. = 6,8
— 7,1.

Bacilli Zinci (HN+), Zinkstäbchen —
Reagens.

Zincum purum; reines Zink. (Hassl +.
His.) — HC+. Zincum Indicum.

Vel laminatum vel fundendo et mo-
duli ferrei aurichalcive canaliculati in-
fusorii ope in cylindros formatum.

His. Zincum liquefacere, quo fluat,
virga ferrea fortiter agitare, alterna-
tim Sulphuris plura frustula, Sebi
pauciora injicere et scorias remove-
re, donec sulphur libere totum combu-
ratur.

Chloruretum Zinci s. zincicum, Hy-
drochloras s. Murias s. Butyrum Zin-
ci. (B*. GalP. DB.)

R. Acidi hydrochlor. puri unc. tres.

Injice sensim Zincum granulatam,
donec nihil amplius dissolvatur, solu-
tionem uncias tribus Aquae dilue, fil-
tra liquorem et ad siccum consume.
(B*. DB.)

GalP. Zinci partes centum solvere
in Acidi muriatici s. q., addere Acidi
nitrici partes quinque, evaporare in
patina porcellaneae ad siccitatem, immi-
tere in aquam, adjicere Cretae partes
quinque per nycthemerum, filtrare et
iterum ad siccitatem evaporare.

Adstringend, Brechen erregend.

Liquor Zinci muriatici s. Muriatis
zincici paratur e Zinco Indico, a ferro
libero et Acido muriat. concentr., ad-
dendo acido in vitro amplo contento
prioris tantum, donec portiuncula po-
strema, vase calefacto non amplius
solvitur. Solutio cum Aquae aequali
quantitate diluta coepletur. — Parari
quoque potest liquor monitus solutio-
ne Zinci chlorici (Butyri Zinci) in
Aqua. — Heilmittel mit 15 Theilen Wasser
noch mehr verdünnt, als Raschwasser oder
Salbe, als Hautreiz zur Erzeugung eines
Auschlages; von Popengeth bei hart-
näckigen scrophulösen Hohlgeschwüren;
Hauke wandte beide Formen, nach Um-
ständen bei veralteten, atonischen, scrophu-
lischen, scrophulösen und herpetischen Ge-
schwüren an.

Aether Zinci, Solutio Murialis s. Hydrochloratis Zinci aetherea. (B*. Vm.)

R. Hydrochlor. Zinci sicci

semunciam.

Alcoholis absoluti . . . unciam.

Aetheris sulphurici uncias duas.

Post aliquot dies decantha. — Krampfstillend. — Gabe, vier bis acht Tropfen, täglich zwei Mal.

Zincum ferrosa-cyanicum s. ferrosi-hydrocyanicum s. hydrocyanicum s. zooticum, Cyanuretum Zinci. Hydrocyanas Zinci. (HC†. HN†. B*. GalP. DB. Ma. Re.)

R. Hydrocyanatis Potassae . q. vis.

Injice solutioni salis hujus Sulphatem Zinci, donec nullum amplius praecipitatum provocetur, quod siccatum ad ruborem usque obscurum calcina.

HC†. Solutioni e Kali ferroso hydrocyanici uncia in Aquae destill. libra addere Solutionem Zinci sulph. drachmarum sex cum Aquae dest. uncis quatuor paratum, praecipitatum abluere et bene exsiccare. — HN†. solutio Kali ferro-cyanici venal. puri addatur solutioni Zinci sulphurici oxydati puri, quamdiu praecipitatum nascitur etc.

Das Product ist ein Gemisch von blau-saurem Zink und Potassium. — Man hat es bei nervöser Cardialgie gerühmt. — Gabe, von einem Viertel bis zu andert-halb Gran in einem Tranke, Löffelweise.

Zincum hydroiodicum oxydatum, Hydriodas zincicus.

E Iodi et Zinci. sing. part. aeq. vel Zinci 20, Iodi 76, 52 paretur.

Collyrium Hydriodatis zincici s. Zinci Iodatis: Hydriodatis grana quindecim, Aq. dest. unc. sex. — Von Proustet bei scrophulösen Augenentzündungen empfohlen. — Re. Iodatis grana quatuor, Aq. dest. eandem copiam.

Unguenti Zinci Ioditis s. ad strumam (Ure.); Ioditis zincici drachmam, Axungiae unciam. — Ein oder zwei Mal täglich einzureiben.

Pulvis Cyanureti Zinci s. antispasmodicus. (Ma. Va.)

R. Cyanureti Zinci granum dimidium.

Magnesiae calcin. grana quatuor.

Cinnamomi . . . grana tria.

Alle vier Stunden zu nehmen.

Va. Cyanureti semidrachmam, Magnes. calcin. scrup. unum, Cinnamomi grana octodecim misce et divide in part. sex. Alle vier Stunden ein Stück, bei nervösen Leiden des Magens.

Protoxydum Zinci, Oxydum s. Oxydes Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

A. Wie man es im Handel findet.

1) Nihil album, Pompholix; weißes Zinkoxyd.

BorC†. Br†. Sax†. Wir†. Wür†. B. Fenn. Suec. Gr. Par. Sp. T.

In wolligen, sehr weißen und leichten, geschmack-, geruchlosen und in Wasser unlöslichen Flocken, welche sich beim Verbrennen des Zinks in freier Luft bilden.

2) Tutia, Tutia, Tutia Alexandrina, Boirytis, Cadmia, Cadmia fornacum, Cadmia facitua, Nihilum griseum, Oxydum zincicum griseum, Oxydum Zinci sublimatum s. semivitrificatum s. impurum praeparatum; Tutie, graues Zinkoxyd, Ofenbruch; Cadmie des fourneaux (Gal.).

Br†. HN†. HassP†. HC†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Am. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. His3. Lon. Lus. Suec. Taur. C. DB. Fi. Gr. Re. Sp. T. Va.

In dicken, dicken, schweren, aschgrauen, harten, schwer brechenden, narkigen und rauhen Schuppen, welche sich in den Rauchfängen der Öfen erzeugen, wo man Bleierze, die Schwefelzink enthalten, schmelzt. Es ist das Protoxyd, mit fremden Stoffen gemischt.

Tutia praeparata, Protoxydum Zinci impurum (DB. Fi.) Tutiam exandescenscentem in Aquam frigidam injice; bis vel ter repetendo, pulvera et cum Aqua laevigata in pastam redige, quum sicca.

His3 fere eandem agendi rationem adhibet; — HC†. ut Conchas praeparatas parari jubet.

3) Calamina, Calaminaris Lapis, Carbonas Zinci impurus s. impura, Carbonas zincicum terrestre s. Oxydi Zinci, Carbonas Zinci aluminosus Oxydum Zinci nativum, Zincum terrestre, Cadmia fossilis, Zincum oxydatum calaminare (H.), Hydrosilicas Zinci (B.); natürliches Zinkoxyd, Salmei, Salmeistein; Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire, Zinc oxyde calaminaire (H.) Hydrosilicate de zinc (B.).

Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. His. LonN. LPC. Lus. Suec. Taur. C. CG. DB. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.

In unregelmäßigen, schweren, weißlichen, graulichen oder rötlichen Stücken. Beudant's Benennung ist sehr bezeichnend, da es, in der That, ein Wasserstoffzinksilicat

ist, welches zufällig Eisenoxyd, Maunerde und kohlensauren Kalk beigemischt enthält.

Oxycarbonas Zincii impuri praeparatus, Lapis calaminaris praeparatus, Calamina praeparata (HC†. AD. LPC. RC. CG. Re.) torrefaciendo Oxycarbonatem impurum, ut carbonas Calcis vel Conchae praeparatae paratur.

Hist. praeparationem ut Tutiae adhibet.

B. Im Ganzen bereitet.

1) Auf trockenem Wege. Flores Zincii, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. Zincii s. Zincii album s. Zincii per se s. Zincii sublimatum, Oxydum Antimonii sublimatum, Ozodes Zincii album, Calx Zincii, Zincum oxydatum album s. calcinatum.

A†. Bat†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. P. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. Hi3. LonN. LP. Lus. Pm. Pol. R. RC. Succ. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pi†. Sp. sw. T. Vm.)

B. Zincii q. v.
In crucibulum amplum et profundum immitte, prunis superponendum, ignem ad fusionem metalli et donec flammam emittat auge; crucibulum deinde alio, obverse imposito, lege et floccos (oxydum album Bor5†) in hoc concrecentes collige (cochleari ferreo exime, quod repetatur, quoties Zincum, amoto crucibulo et superficie ab oxydo liberata in flammam erumpit, oxydum collectum elutriatione in pulverem subtiliss. redactum sicca Bor5†)

HN†. Zincum crucibulo candenti, alio crucibulo tecto injicere, oxydum subinde natum statim exinere, partem album et leviorē per cribrum transmittere, Aquam infundere, agitare et brevi mora interposita in vas aliud aquam adhuc turbidam supernatantem effundere et seponere, ut subsidat pulvis, denique effusa aqua pulverem subtilissimum exsiccare.

2) Auf feuchtem Wege. Magisterium Zincii, Zincum praecipitatum, Zincum oxydatum via humida paratum, Zincum oxydatum album, Flores s. Oxydum Zincii; Binspræcipitat; Magistère de zinc (Gal.).

Bor5†. Han†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Ams. D. Fer. Gal. LPC. Fi. T. Vm.

B. Sulphatis Zincii q. v.
Dissolve in Aquae q. s. et in solutionem sensim infunde Subcarbonatem

Potassae vel Sodae, donec non amplius eliciatur praecipitatum, quod lotum siccetur.

HC†. Zincii sulphurici et Natri carbonici cryst. sing. partes aeq., prius in paribus duodecim, secundum in duabu Aquae destill. solvere, solutiones limpidas frigide commiscere, praecipitatum per manicam linteam separare, in vase figul. no Aqua destill. tepefacta perfecte edulcorare, in manica ab aqua separare, exsiccatum excandescat; — HN†. Solutionem e Zincii sulph. cryst. parte una in Aquae dest. ferv. partibus viginti filtrare et Natri carb. depurati in Aqua dest. s. q. soluti praecipitare, praecipitatum bene ablutum et siccatum in crucibulo tecto ad excandescentiam usque calefacere, donec cum acido quocunque mixtum nullam producat effervescentiam.

Das Product ist Zinksubcarbonat; Gal. spricht zweimal davon als Oxydum Zincii per praecipitationem und Carbonas Zincii. Durch viertelstündiges Calciniren des Präcipitates, welches Sax†. anwendet, wird es gelb und nicht völlig rein.

B. Zincii sulph. sicc. partes novem.
Kali nitrici partem unam.

Mixta in crucibulo ure donec soluti, portiunculae exemptae filtrata additis tinctura gallarum et liquore ammonii caust. praecipitatum album nec tempore in colorem violaceum vergens demittat. Post refrigerationem massam remanentem a crucibulo separatam et tritam cum Aquae fervidae decuplo misce et saepius agitando digere, ut solubile solvatur et ferrum separetur. Filtra et liquori limpidulo adde Natrium carbonicum depuratum in Aquae communis q. s. solum quoadm praecipitatum producit, quod bene edulcoratum et siccatum excandescat in crucibulo tecto, donec portiunculae cum aqua mixtae acidum quodlibet affusum nullam afficiat effervescentiam, tum adhuc calidum in vitrum ingestum serva (Bor5†).

Sax2†. Zincii cylindri ope in laminas extensi q. l. in Acido nitrico solvatur, ut acidum paulisper praevaleat, solutio denuo super Zincum, deinsuper ejus oxydo recens praecipitato digeratur (Plumbum forte exstans Solutionis Natri sulph. ope praecipitatur, Cadmium addito novo acido nitr. et praecipitationis per Gas hydrothionicum ope separetur) et e solutione pura Aquae dest. sextuplo diluta ope Ammonii carb. oxydum praecipitatur, quod ablutum et siccatum igniatur et servetur.

Lapis calaminaris diaphoreticus (Gr.).

R. Lapidis calaminaris uncias quatuor,
Acidi nitrici libram, dissolve, decantha,
destillando ad siccum redige, pulvera
et residuum abluere. — Schweißtreibend
10 bis 50 Gran.

Zinci Oxydum (LonN. LPC. CG. Gr.
Re.): Sulphatis Zinci uncias duodecim,
Aqua destillatae octarium, dissolve,
adde Liquoris Ammoniae octarium vel
q. s. praecipitatum abluere et sicca; —
LPC Zinci Sulphat. libram, Aqua
destill. congijs tres, Ammoniae ses-
quicarbon. uncias sex cum dimidia;
praecipitatum saepius aqua lavare et
igne acri per horas duas urere; —
AD. Sulphat. Zinci libram, Aqua de-
stillatae octarios quatuor, Liquoris
Ammoniae q. s.

*Magisterium Lapis calaminaris,
Oxydum Zinci hydratum (Gr.):* Lapi-
dem calaminarem in Acido muriatico
dissolve et Aqua Ammoniae Subcar-
bonatis praecipita; praecipitatum ab-
lutum sicca. — (Brecherregend, ca-
thartisch. 3 bis 8 Gran.)

Das Zinkoxyd wird äußerlich als adstrin-
girendes, innerlich als krampfstillendes und
Bredmittel angewendet. Man empfiehlt
es bei Epilepsie, Hysterie und Neuralgien.
— Gabe, von einem bis sechs Gran bis
eine halbe Drachme. — Man giebt es
auch in Pillenform.

*Pulvis Zinci oxydati albi s. antispas-
modicus. (Fulz. Auf.)*

R. Florum Zinci . . . grana duodecim.
Sacchari . . . drachmam.

Divide in sex partes. — Gabe, Mor-
gens und Abends ein Stück, bei Keuchhu-
sten und convulsivischen Krankheiten der
Kinder. (Auf.)

R. Florum Zinci . . . granum.
Laudani Sydenhami . . . guttam.
Sacchari . . . scrupulum.

Alle drei Stunden, bei Krämpfen der
Kinder. (Auf.)

R. Florum Zinci . . . drachmam.
Opium . . . grana decem.
Chinae,
Foeniculi, sing. . . unciam.

Divide in partes quinquaginta. —
Gabe, alle zwei Stunden ein Stück bei
Keuchhusten. (Auf.)

R. Florum Zinci . . . grana tria.
Scillae pulveratae,
Sulph. aur. Antimon., sing.

semigranum.
Subcarb. Magnes. . . drachmam.
Divide in partes sex. — Gabe, ein
Stück alle zwei Stunden, bei rheumatischem
krampfhaften Asthma. (Auf.)

R. Florum Zinci . . . grana duodecim.
Opium . . . grana tria.
Extr. Chinae flav. aquosi

drachmam.
Elaeosacchari Anisi drachmas duas.
Pulvera et divide in partes duode-
cim (Fulz.)

Pulvis anticholericus (Kraefowsky):
Zinci oxyd. albi, Cast. Moscov., Extr.
Opium aquos., sing. gr. sex, Extr. Nucis
vom., Rad. Ipecac., sing. gr. dimid.,
Camph. tritae gr. duodecim, Arrow
Root semidrachm. Mische exactissime,
u. f. pulv., dividatur in partes 12 aeq.
Bei Diarrhoe Poltern im Leibe, Angst in
der Herzgrube, Uebelfeiten oder gar Er-
brechen, sogleich 1 Stück mit Wasser oder
Pfeffermünzthee zu nehmen, und 1 oder
mehrere Tassen dieses Thees nachzutrinken
und im Bette den Schweiß abzuwarten;
wird das erste Pulver weggebrochen, so
nimmt man sogleich ein zweites, und wenn
nach 1 Stunde das Uebel noch nicht vor-
über ist, ein drittes. Kinder unter 14
Jahren nehmen $\frac{1}{2}$, Kinder unter 4 Jahren
jedesmal 1 Pulver. Zum Getränk Simmt
und Melken mit heißem Wasser aufgegös-
sen, mit Arrowmehl und Rothwein zuge-
setzt, kalt oder warm zu trinken.

Pulvis stomachicus, (B)

R. Florum Zinci . . . granum.
Magnesiae calcinatae scrupulum.

Alle zwei Stunden, bei Verdauungsbe-
schwerden.

R. Florum Zinci . . . grana quatuor
Colombo . . . grana triginta.
Divide in partes quatuor. — Gabe,
alle drei Stunden ein Stück.

*Collyrium siccum s. adstringens. (LH.
Ca. Ra. Va.)*

R. Tutiae (Oxydi Zinci),
Sacchari cryst., sing.

semidrachmam.
Fiat pulvis tenerrimus. (LH. Höt.
D. et Hosp. Ven. Ra. Va.)

R. Tutiae,
Iridis Florentinae,
Sacchari cryst., sing. part. aeq.
Fiat pulvis tenerrimus. (Ca.)

Pulvis cephalicus niger. (Lit.)

R. Florum Zinci . . . drachmam.
Pulv. Visci,

Carbonis, sing. . . unciam.
Gabe, fünfzehn bis zwanzig Gran für ein
Kind von einem Jahre.

Pulvis Calaminae cum Myrrha. (Re.)

R. Calaminae praepar.,
Myrrhae, sing. . . partes aequales.

Misce. — In schmerzlose Geschwüre zu streuen zur Beförderung der Vernarbung.

Pulvis antistrumousus. (Auf. Sm.)

℞. Oxydi Zinci . . . uncias quatuor.

Ossis Sepiae

Testar. Ovior., sing. uncias duas.

Telae laeae carlatinae (drap d'écarlate) . . . sesquiunciam.

Combure simul in vase clauso et residuum pulvera. (Sm.)

Auf. Oxydi semunciam, Testarum drachmas duas et Telae sesquidrachmam.

Gabe, achtzehn Gran, täglich zwei Mal für einen Erwachsenen. — Dieses Mittel wird von Dehaen empfohlen.

Boli diaphoretici sedantes et antispasmodici. (LH. B.)

℞. Florum Zinci,

Extr. Aconiti, sing. grana quatuor.

Sulph. Antimon. aur. grana duo.

Liquiritiae pulveratae,

Mellis, sing. . . . q. s.

Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Husten, Weistanz, Hysterie, Rheumatismen und chronischer Gicht.

℞. Valerianae,

Foliorum Aurantii, sing.

Oxydi Zinci . . . grana duo.

Syrupi communis . . . q. s. ut fiant boli duo. — Gabe, ein Stück, täglich zwei Mal. (LH.)

Pilulae lenientes s. sedantes. (Gen. B. E2)

℞. Florum Zinci . . . scrupulos duos. Conservae Cynorrhodontis . . . q. s. ut fiant pilulae viginti quatuor. (Gen. E2.)

E2. f. pil. no. 10 (?).

℞. Florum Zinci . . . grana octo.

Extracti Aconiti . . . grana ex

Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. (B)

Diese Pillen werden bei Epilepsie, Weistanz und chronischen Exanthemen empfohlen.

Collyrium alsiringens. (Sw.)

℞. Florum Zinci . . . drachmam.

Mucil. Sem. Cydoniorum c. Aqua

Rosarum praeparati unc. decem.

Contere simul.

Lotio e Zinco et Curo composita s. alsiringens. (Auf. E2. Sp. Sw.)

℞. Florum Zinci . . . grana duodecim.

Sulphat. Cupri gr. tria ad quatuor.

Mellis rosati . . . drachmam.

Aquae Calcis . . . uncias duas.

Zum Verbinden phagedänischer, venerischer Geschwüre empfohlen. (E2. Sp. Sw.)

℞. Florum Zinci unciam.

Aq. Flor. Sambuci sesquiunciam.

Zhuessinf rühmt dieses Präparat bei pustulösem Erysipelas. (Auf.)

Collyrium resolvens. (Pie. Sp. Va.)

℞. Oxydi Zinci granum.

Aquae Plantaginis . . . unciam.

Gut umgeschüttelt anzuwenden. (Va. Hosp. Inf.)

℞. Tutiae semidrachmam.

Aloës drachmam.

Aquae Rosarum,

— Foeniculi,

— Euphrasiae, sing. unciam.

Misce (Pie.)

Sp's folgende Formel, welche er unter dem Namen *Aqua ophthalmica* anführt, enthält sicher kein Atom Zink.

℞. Tutiae praeparatae,

Caryophyllorum,

Sacchari cryst., sing. . . unciam.

Camphorae,

Aloës, sing. . . sesquidrachmam.

Vini Hosp. unc. quadraginta octo.

Aquae Rosar. albar. . . uncias sex.

— Chelidonii,

— Foeniculi,

— Euphrasiae,

— Rutae, sing. . . uncias duas.

Post quatuordecim dies macerationis in sole, decantha.

Aqua ophthalmica usualis. (Bct)

℞. Aquae Rosarum,

— Foeniculi, sing.

uncias quinq.

Tutiae praeparatae drachmas sex.

Acetatis Plumbi sesquidrachmam.

Camphorae . . . drachmam.

Sulphatis Zinci . . . scrupulos duos.

Misce exacte et serva.

Ceratum Calaminae s. calaminare s. Lapidis calaminaris s. Carbonatis Zinci impuri s. epuloticum s. Turneri s. e

Zinco, Collyrium Nihili s. zincicum s. e Zinco, Unguentum calaminare s.

Lapidis calaminaris s. e Lapide calaminari s. Zinci s. Nihili s. Carbonatis Zinci impuri s. Oxycarbonatis Zinci impuri s. Oxydi Zinci s.

Oxydi Zinci impuri s. nativi s. de Nihilo s. Tutiae s. Zinci s. griseum s. Nihili ad oculos s. exsicicans s. ophthalmicum album s. Diapompholigos,

Pomatum Oxydi Zinci. (Bor5†. Ful†.

Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†.

Li†. O†. Pal†. Sax2†. Auf. Haf†.

AD. Am. Ams. B. Du. Ed. Fenn.

GalP. Gen. LonN. (1836) LoP. LP.

LPC. Lus. Pol. RC. Taur. Br. C. Ca. CG.
DB. E2. Fi. Gr. Pie. Re. Sp. T. Sw.).

R. Olei Olivarum . . partes duas.

Cerae flavae . . partem unam

Liquatis et mixtis adde

Calaminae pulv. . . partem unam.

Agita ad refrigerationem usque.

(Han†. HN†. Am B* Lon Lus. C. CG.
Gr. Sw.)

HC†. Cerae uncias tres, Olei Olivarum provinc. quinque, Calaminari lapidis duas; — Ful†. Olei partes duodecim, Cerae sex, et Calaminae quatuor cum dimidia; — Ams. Olei duas, Cerae unam; — Co. Olei sex, Cerae albae unam et unam Calaminae; — LP. Olei libram, Oxydi uncias tres, Cerae albae quatuor; — AD. Calaminae, Cerae, sing. semilibram, Axungiae libras duas; — RC. Adipis suilli semilibram, Cerae flavae, Calaminae, sing. unciam, Olei Napi semunciam; — LonN. LoP. CG. Re. Calaminae, Cerae flavae, sing. semilibram, Olei Olivarum octarium (Turner's cerate); — LPC. Olei uncias sedecim.

R. Axungiae Porci part. triginta duas.

Cerae albae . . partem unam

Liquatis adde

Tutiae . . . partes octo.

Misce exacte. (Lus.)

R. Cerati (Cetacei) [Unguenti cerei HC†] . . . partes octo.

Oxydi Zinci . . partem unam.

Tere et sedulo misce. (Bor†. Han†.

HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. B. Pol.)

Du. Gr. Cerati partes duodecim et Oxydi Zinci unam cum dimidia; — AD. Du. Ed. C. Gr. Re. Cerati quinque et unam Oxydi; — Gen. Cerati duodecim et Oxydi unam; — Au†. Oxydi drachmas duas et Unguenti rosati unciam; — Bor5†. Zinci oxydati via humida parati drachmam, Unguenti simplicis drachmas novem; — Gr. Lon. 1788 Tutiae praep. q. pl., Linim. Cerae alb. q. s.; vel: Flor. Zinci unciam, Linim simpl. sex.

R. Axungiae Porci . . partes sex.

Oxydi (Flor.) Zinci partem unam.

Misce triturando. (AD. Fenn. Lon. (1835) C. CG. Gr. Re.)

Pie. Axungiae partes duas et unam Oxydi; — Pal†. Adipis anserini duas et unam Oxydi; — Ham†. Axungiae tres et unam Oxydi; — Ful†. Butyri tres et unam Oxydi; — Br. et Sw. Axungiae quatuor et unam Oxydi; — Pie. Butyri quatuor et Oxydi unam; — Br†. Am. et C. Axungiae quinque et Butyri unam; — An. et Bel. Axungiae

octo et Oxydi unam; — Li†. Axungiae tres, Butyri recentis sex et unam Oxydi; — Huf†. Axungiae octo et Oxydi unam; — E2. Butyri sex et unam Oxydi; — Gr. 1745. Tutiae quant. placet, Axung. Viper. q. s. vel Lon. ante 1745. Tutiae praep. drachm. duas, Lap. calamin. unciam, Ungt. rosac. sesquilibram; — DB. Unguenti rosati uncias duas, Tutiae drachmas quatuor.

R. Oxydi Zinci . . partem unam.

Butyri in Aqua Rosarum loti,

Unguenti rosati, sing. partes duas.

Misce exacte (GalP.)

R. Axungiae Porci . . partes 24.

Matris Perlarum,

Corallii rubri, sing. part. unam.

Tutiae,

Nihili albi, sing. . partes duas.

Misce sedulo. (Sp.)

Taur. Olei rosati libras duas, Cerae albae uncias sex, Extracti Solani hortens. pauc. Vino diluti tres, Cerussae, Plumbi usti, Tutiae, Olibani, sing. drachmas decem; — Pi. T. Cerae flavae, Olei Rosarum, sing. uncias sex, Cerussae duas, Tutiae porphyr. unam, Sulphureti Plumbi tantidem, Olibani semunciam. (Unguentum Tutiae.) Si loco Tutiae Flores Zinci vel potius Carbonatem Zinci per praecipitationem adhibes, Unguentum vel Ceratum Pompholigos nominatur.

Unguentum Nihili s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum s. Zinci, Pomatum Oxydi Zinci camphoratum. (Br†. Pal†. Wir†. D. Sw. Vm.)

R. Oxydi Zinci . . . unciam.

Camphorae . . . scrupulum.

Axungiae Porci . . . uncias sex.

Misce triturando. (D.)

R. Axungiae . . . uncias sex.

Olei Amygdal. dulc. uncias tres.

Cerae albae . . . uncias duas.

Liquatis adde

Oxydi Zinci . . . uncias tres.

Camphorae c. Oleo trit.

drachm. tres.

Misce exacte. (W*.)

Vm. Olei Amygdalarum dulc. unciam, Axungiae, Cerae, sing. semunciam, Calaminae sesquiunciam, Tutiae drachmas duas et Camphorae semidrachmam.

R. Tutiae praeparatae,

Nihili albi, sing. . . unciam.

Corallii rubri,

Nacrae Perlarum, sing.

semunciam.

Camphorae . . . drachmam.

Axungiae Porci . . . libram.

Misce triturando. (Br†. Pal†. Wir†.)

Unguentum s. Pomatum antihaemorrhoidale, Unguentum desiccativum, Ceratum Hufelandi, Pomatum contra intertriginem. (Auct. B. Ca. Pie. Re.)*

R. Florum Zinci,

Pulv. Lycopodii, sing. drachmam.

Cerati semunciam.

Contere. (Auct. Pie.)

B*. Oxydi, Lycopodii, sing. drachmam et Unguenti rosati uncias quatuor; — Ca. Oxydi, Lycopodii, sing. grana triginta sex et Cerati Cetacei albi unciam.

R. Florum Zinci,

Pulv. Lycopodii, sing.

gr. quindecim.

Axungiae Porci . . . semunciam.

Aquae Rosarum,

— Plantaginis, sing. . . q. s.

Triturando exacte misce. (Pie.)

R. Oxydi Zinci . . drachmas duas.

Subinur. Hydrarg. . drachmam.

Axungiae recent. . . unciam.

Misce. (Re.)

Ceratum s. Unguentum exsiccans s. ophthalmicum s. ad ambusta. (Hant. HN†. B Bo. Ca. Gr.)*

R. Olei Olivarum . . . uncias octo.

Cerae flavae . . . sesquiunciam.

Liquat s adde

Boli Armenae unciam.

Florum Zinci semunciam

Misce bene. (Hant. HN†.)

R. Olei Olivarum . . . uncias quatuor.

Cerae albae,

Calaminae, sing. unciam.

Acetatis Plumbi . . drachmas duas.

Fiat ceratum (Lo.)

R. Tutiae,

Acetatis Plumbi,

Calaminae, sing. . . scrupulos duos.

Camphorae . . . grana quatuor.

Unguenti rosati q. s.

Tritura simul. (B*.)

Gr. Tutiae, Lapid. calamin., sing.

drachm. sex, Plumbiusti, Camph.,

sing. duas, Myrrh., Sarcocoll., Aloës,

Vitriol. alb., sing. unam, Butyri re-

cent. unc. duodecim, Cerae alb. duas.

Unguentum rubrum desiccativum (Gr.):

Ol. comm. libr. duas, Cerae flav. unc.

duodecim, Boli Armen., Colcoth., sing.

unc. sex, Lap. calam. quatuor, Litharg.,

Ceruss., sing. sex c. dimid., Camph.

semunciam.

Unguentum ophthalmicum Sloani s. rubrum. (Sp.)

R. Tutiae unciam.

Haematitis . . . scrupulos duos.

Aloës grana duodecim.

Margaritar. praep. . gr. quatuor.
Axungiae Viperarum . . . q. s.
ut fiat unguentum.

Unguentum oculare Keiseri s. ophthalmicum viride. (Ams.)

R. Tutiae semunciam.

Camphorae drachmam.

Aeruginis . . . grana duodecim.

Axungiae Porci . . . uncias duas.

Misce.

Unguentum oculare album s. ophthalmicum album. (Vm.)

R. Oxydi Zinci . . . drachmas tres.

Mercurii dulcis . . . semidrachmam.

Camphorae scrupulum.

Cerae albae . . . drachmas duas.

Butyri Cacao,

Olei Amygdal. dulc., sing.

unciam.

Misce trititando.

Unguentum ophthalmicum (LH.):

Oxydi Zinci scrupulum, Calomela-

nos semiscrupulum, Axungiae Porci,

Unguenti rosati, singulorum drachmas

duas.

Linimentum Tutiae (Re.): Tutiae drachmam, Mellis Rosar. q. s.

Pommade divine (Re.): Medullae bo-

viniae sesquilibram, Calaminae, Ben-

zoës, Storacis, Rad. Irid. Florent., sing.

unciam, Cinnamomi sesquiunciam, Nu-

cis moschatae drachmam.

Unguentum ad ophthalmias scrophu-

losas (Va. Hosp. Inf.): Oxydi Zinci

gr. quindecim, Calomel. duodecim,

Camph. octo, Butyri rec. drachmas

duas, But. Cacao semidrachm. Bie

ein Stetnabelstopp groß alle 2 oder 3

Tage bei Schlafengehen, auf den Rand

der Augenlider.

Emplastrum griseum s. de Lapide ca-

laminari s. consolidans, Pamphilus

Chirurgorum (Bor5†. Br†. Ful†.

Hant. HN†. Li†. Pal†. Sax†. Wirt†.

Wür†. Ams. B. D. DD. Suec. Sp.*

Vm.)

R. Calaminae libram.

Lithargyri semilibram.

Olei Olivarum . . . sesquilibram.

Coque, continue agitando (Ful†. B*.)

R. Emplastri simplicis sesquilibram.

Cerae flavae,

Olei Olivarum, sing. unc. novem.

Liquatis adde

Calaminae pulveratae sesquilibram.

Misce bene. (Ams.)

R. Emplastri simplicis,

Calaminae pulv., sing.

sesquilibram.

Cerae flavae uncias sex.

Sevi hircini,
Terebinthinae, sing.
sesquiunciam
Liquet et misce exacte, (D.)
Succ. et Vm. Emplastri simpl., Calaminæ, sing. libras duas, Cerae uncias quinque, Sevi sesquiunciam et Terebinthinae tantidem.
R. Emplastri simplicis . . . uncias sex.
Liqua et adde
Calaminæ pulveratae uncias duas.
Pulv. Mastichis,
— Olibani, sing. . . drachmam.
Misce bene. (Saxt.)
R. Emplastri simplicis . . . libram.
Olei Olivarum . . . uncias quinque.
Liquatis adde
Pulv. Calaminæ uncias quatuor.
— Myrrhae (Mastiches HNt.)
— Olibani, sing. drach. duas.
Misce exacte. (Hant. HNt.)
Lit. Emplastri simpl. uncias decem,
Olei Olivarum octo, Calaminæ sex, Mastichis unam et Olibani dimidiam
R. Olei Napi . . . uncias octodecim.
Calaminæ . . . uncias duodecim.
Lithargyri . . . uncias sex.
Cerae flavae . . . unciam.
Liqua et exacte misce. (DD.)
R. Calaminæ,
Lithargyri,
Cerussae, singulorum semilibram.
Olibani . . . semunciam.
Mastichis . . . unciam.
Olei Olivarum . . . q. s.
Fiat emplastrum. (Wirt.)
R. 5t Empl. Cerussae, Empl. Lithargyri simpl. sing. uncias duodecim,
Lapidis calaminaris, Olibani, Mastichis, sing. semunciam.
R. Cerae . . . uncias tres.
Sevi cervini . . . uncias quatuor.
Terebinthinae . . . sesquiunciam.
Liqua et adde
Pulv. Calaminæ,
— Lithargyri, sing. sesquiunc.
— Tutiae,
— Mastichis,
— Olibani, sing. . . semunciam.
Campher. c. Olei pauxillo tritae drachmam.
Misce sedulo. (Sp.)
Br. et Wirt. Cerae uncias tres, Sevi quatuor, Terebinthinae unam cum dimidia, Calaminæ unam, duas Lithargyri, Tutiae, Mastichis, Olibani, sing. dimidiam, Myrrhae drachmas duas et Camphorae unam cum dimidia; — Pal. Cerae, Sevi, sing. uncias octo, Terebinthinae sex, Calaminæ quatuor, Lithargyri, Cerussae, sing. tres, Tutiae, Mastichis, Olibani, Myrrhae et Camphorae, sing. semunciam.

Emplastrum Diapompholigos s. zincico-plumbicum. (Br. Hant. Saxt. Wirt. Ams. B. Fenn. Suec. Sp. Vm.)

R. Emplastri grisei partes sedecim.
Plumbi usti . . . partem unam.
Liqua et misce bene. (Saxt.)
R. Olei Solani partes triginta quatuor.
Cerussae . . . partes decem.
Coque et adde
Cerae . . . partes triginta quatuor.
Plumbi usti . . . partes sex.
Pompholigos,
Olibani, singulorum
partes quatuor.
Misce exacte (Sp.)

Br. et Wirt. Olei Solani libras duas cum dimidia, Cerussae sesquiunciam, Cerae albae uncias triginta, Plumbi usti sesquiunciam, Pompholigos et Olibani, sing. quatuor; — Vm. Olei Olivarum partes sex, Cerussae decem, Cerae octo, Resinae Pini unam, Plumbi usti duas, Pompholigos et Tutiae, sing. tantidem.

R. Olei Olivarum . . . semilibram.
Cerae flavae . . . libram.
Liqua et adde
Plumbi usti . . . semilibram.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Pompholigos . . . uncias tres.
Olibani . . . sesquiunciam.
Misce sedulo. (Fenn. Suec.)

B. Olei partes septem, Cerae duodecim, Plumbi usti sex, Cerussae quatuor, tres Pompholigos et Olibani unam cum dimidia; — Ams. Olei triginta, Cerae triginta sex, Plumbi usti duodecim, Cerussae octo, Pompholigos sex et Olibani duas cum dimidia; — Hant. Olei quindecim, Cerae sedecim, Plumbi usti, Cerussae, sing. tres, Pompholigos, Olibani, sing. duas.

Emplastrum saturninum, Emplastrum saturninum Mynsichti. (Pal. Wirt.)

R. Sevi vervecini,
Cerae albae, sing. sesquiunciam.
Terebinthinae . . . drachmas sex.
Liqua et adde
Pulv. Plumbi usti . . . uncias duas.
— Calaminæ,
— Cerussae, sing. semunciam.
— Nihili albi,
— Tutiae, sing. . . drach. duas.
— Myrrhae,
— Mastichis,
— Olibani, sing. . . drachmam.
— Aloës,
— Camphorae,
— Nitri, sing. semidrachmam.
Misce. (Pal.)

Wirt. Sevi, Cerae flavae, sing. uncias quinque, Terebinthinae, Plumbi usti, sing. duas, Calaminae, Cerussae, sing. semunciam, Pompholigis, Tutiae, sing. drachmas duas, Myrrhae, Mastichis, Olibani, Aloës, Niri, sing. drachmam et Camphorae semidrachmam.

Unguentum Diapompholigos s. Pompholigos s. exsicicans s. ad embusta s. Lapidis calaminaris s. Lapidis calaminarissaturinam. (Brjt. Ojt. Paljt. Wirt. Sar. Gr. Sp. T. Vm.)

R. Unguenti nutriti unc. triginta duas.
Calaminae pulv. uncias quatuor.
Misce exacte. (Ojt.)
Gr. Cerati Calamin. unciam, Extr. Saturni drachmam.

R. Camphorae drachmam.
Cerussae semunciam.
Cerae flavae,
Calaminae, singulorum uncias duas.

Olei Olivarum uncias quinque.
Tere cerussam et calaminam cum olei pauxillo, adde reliquum olei ceram in solutione tenens, tunc camphoram cum olei pauxillo tritam et ad refrigerationem usque agita. (Vm.)

R. Olei Solani uncias sedecim.
Cerae uncias quinque.
Liqua lente et adde
Pulv. Cerussae uncias duas.
— Pompholigis,
— Plumbi usti,
— Olibani, sing. unciam.
Misce. (Sp.)

T. Cerae flavae, Olei rosati, sing. uncias sex, Cerussae duas, Florum vel Carbonatis Zinci unam, Plumbi usti unam, Olibani dimidiam.

R. Olei rosati libras duas.
Succi Bacc. Solani unc. quatuor.
Coque ad humidam consumptionem et adde

Cerae albae uncias sex.
Pulv. Cerussae uncias duas.
— Plumbi usti,
— Tutiae,
— Olibani, sing. unciam.
Misce exacte. (Sar.)

Brjt. et Wirt. Olei rosati uncias sex, Succi Solani, Cerae, sing. quatuor, Plumbi usti, Pompholigis, Olibani, sing. unam; — Paljt. eandem quantitatem, sed Cerae uncias tres et loco plumbi usti Cerussae uncias duas.

Ceratum Lapidis Calaminaris (L.P.): Lapidis calaminaris libram, Olei Olivarum duas, Cerae flavae unam, Minii drachmas sex, Camphorae tres.

Unguent. exsicicans (Dulk.): Olei Olivarum libras tres, Cerae flavae unam, Boli Armenae, Calaminae, sing. semilibram, Lithargyri, Cerussae sing. uncias sex, Camphorae drachmas sex, fiat s. a. ung.

Unguentum Calaminae compositum s. exsicicans rubrum Acrelii. (Penn. Suec.)

R. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singulorum semilibram.
Minii,
Acetatis Plumbi, sing. uncias tres.
Sevi hircini libram.
Olei Lini uncias octo.
Liqua se. un, adde ol. un, tunc pulveres et massae refrigeratae
Camphorae pulv. drachmas tres.

Ammoniuretum Zinci. (Vm.)

R. Acetatis Zinci liquidi . . . q. v.
Infunde sensim Ammoniacum liquidum, donec nullum amplius provocatur praecipitatum, quod lotum et siccatum in Ammoniaci quam minima quantitate solve, filtra, lente consume et crystallisationi subijce.

Vitriolum album s. Goslariense s. Zinci, Sulphas Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum sulphuricum s. sulphuricum s. vitriolatum, Gilla Vitrioli s. Theophrasti, Sal vomitorium Vitrioli, Chalcantum album; weißer Vitriol, Zinkvitriol, Galligenstein; Couperose blanche (Gal.)

1) Wie man ihn im Handel findet.

Vitriolum album s. Zincum sulphuricum s. vitriolatum venale, Sulphas zincicus s. zincicus venalis.

BojCjt. Boj5jt. Brjt. Fuljt. Hamjt. HassPjt. HCjt. Lit. Wirt. Würt. WWjt. Am. Ams. B. Bel. D. DD. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. HisS. Lus. R. Suec. Taur. C. Fi. Gr. Par. Pid. Sa. Sp. T.

2) Reinigung des käuflichen.
Vitriolum album depuratum.

R. Vitrioli albi q. vis.
Calcinationem in Aquae bullientis dupla quantitate dissolve et pluribus crystallisationibus subijce. (Gal.)

GalP. Taur. Unam solummodo crystallisationem jubent; — Wirt. eundem agendi modum indicat, calcinationem tamen omittens; — Fuljt. Lit. Würt. Gr. dissolvere Salis libram unam in duabus Aquae bull., liquorem in digestionem relinquere per sex horas cum Zinci granulati drachmis sex, tunc consumere et crystallisationi subijcere; — HisS. ut sulphateum Aluminae.

3) *Bereitung.* *Zincum sulphuricum purum s. factitium, Vitriolum album s. Zinci purum s. factitium, Sulphas Zinci purus s. zincicus cum Aqua.*

A†. Ba†. Bor5†. Hauf†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. AD. An. B. Bel Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. His3. LouN. LoP. LPC. Pm. Pol. RC. Suec. Br. C. CG DB. Fr. Re. Sw. T. Vm.

R. Acidi sulphurici (20°) . q. vis.

In capsula vitrea balneo arenae immitte, calefac leviter, adde sensim *Zincum granulatum*, liquorem *Aquae pauxillo dilue*, satura, consume et in *crystallos coe*.

HC†. *Zinci purioris libras duas in Acidi sulphurici diluti octodecim solvere, ut solutione peracta pars Zinci insoluta remaneat, loco temperato sub aeris accessu per mensem seponere filtrare et liquori filtrato sensim instillare Liquoris Natri chlorati q. s., ut Ferrum adhuc solutum praecipitetur et pars exempta solutionis filtratae liquore Natri admixto solummodo praecipitatum albidissimum demittat, tunc per aliquot dies seponere, filtrando a praecipitato separare et evaporando l. a. in crystallos redigere, lixivio ultimo, parum Acidi muriat. continente, rejecto, crystallosque siccare; — L.P.C. Zinci uncias quinque cum Acidi sulphurici diluti octariis duobus paulatim superinfundere, finita effervescentia liquorem colare, decoquere, donec pellicula subnascat, et denique seponere, ut fiant crystalli; — Bor5†. Pm. Acidum sulph. crudum Aquae comm. partibus quinque dilutum indicant; — Fiet T. Acidi concentrati partem unam et Aquae sex vel septem; — AD. LouN. LoP. Gr. Re. Zinci uncias quatuor, Acidi uncias sex, Aq. dest. octarios quatuor; misce, finita effervescentia cola, coque ad pelliculam et seponere ut fiant crystalli; — HassP†. Zinci Indici in frustula comminuti vel granulati libram unam in Acidi Vitrioli q. s. dissolvere, liquorem saturatum filtrare et vaporationi subicere, donec vitriolum album secerni incipiat, addere deinde Acidi Nitri uncias duas, et post aliquot ebullitiones admiscere Florum Zinci sesquiunciam. liquorem tunc cum Aquae dest. partibus quatuor diluere, denuo per semihoram coquere, filtrare, ad pelliculam consumere et in crystallos coagere, quod toties repetendum est, quoties crystalli formantur, quas loco tepido cito siccatas serva; — HN†. Acidum sulphuricum crudum cum Aquae pluvialis partibus quinque dilutum et*

post secundam per horam dimidiam coctionem liquoris dilationem Aqua destillata indicat, reliqua ut HassP†. — Sax† ut Ferrum sulphuricum.

Man wendet dieses Salz theils äußerlich als adstringirendes, theils innerlich als tonisches und adstringirendes Mittel zu einem bis fünf Gran. zwei oder drei Mal täglich, und als Brechmittel zu zehen bis zwanzig Gran in destillirtem Wasser an.

Pulvis Sulphatis Zinci. (E2.)

R. Sulphatis Zinci

grana decem vel semidrachmam.

In Molasse zu nehmen und warmes Wasser nachzutrinken, wirkt sehr rasch, bei Vergiftungen, auch als Ekel erregend bei Phthisis.

Pilulae Sulphatis Zinci et Myrrhae stimulantibus z. expectorantes s. adsirringentes. (E2. Gr. Par. Va.)

R. Sulphatis Zinci semiscrupulum.

Conservae Rosarum . . . q. s.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal, bei Keuchhusten und Lungenwindsucht (E2.)

R. Sulphatis Zinci . grana decem.
Myrrhae . . sesqui. (semi-Va.)
drachmam.

Confectionis Rosarum . . . q. s.

Fiant pilulae viginti — Zwei Stück täglich zwei Mal, oder besser 1 Stück alle zwei Stunden, bei Keuchhusten von Augen. (E2. Par. Va.)

Pilulae Zinci (Re.): Sulphatis Zinci drachmas duas, Terebinth. comm. q. s. ut fiant pil. no. 60. — Bei Gonorrhoe und Leucorrhoe.

Solutio Sulphatis Zinci aquosa simplex. (Auf. Am. B. RC. C.)*

1) Zum innern Gebrauche.

R. Sulphatis Zinci . . grana duo.

Aquae Chamomillae uncias tres.

Dissolve. — Gabe, ein Eßfel täglich zwei oder drei Mal.

Wyltie wendet bei bössartigen Fiebern alle zwei oder drei Stunden einen Eßfel einer Auflösung von neun Gran schwefelsaurem Zink in sechs Unzen Aqua Sambuco an. Mosely empfiehlt ebenfalls gegen chronische fieberlose Ruhr eine Auflösung von drei Drachmen schwefelsaurem Zink und zwei Drachmen Maun in einer halben Unze Lavendelgeist und einer Pinte Wasser, zu vier bis sechs Drachmen in Wasser gegeben, und dieses selbst bisweilen nach drei Stunden wiederholt.

Am. und C. haben eine ähnliche Formel:

R. Ligni Quassiae . . drachmam.

Sulphatis Zinci . . grana octo.

Aquae . . . semioctarium.

Post duodecim horas macerationis cola.

2) Zum äußern Gebrauche.

A. In Gestalt von Collutorium.

℞. Sulphatis Zinci . . drachmam.

Aquae destillatae . . uncias sex.

Solutioni adde

Mellis crudi unciam.

Misce. (B*.)

℞. Sulphatis Zinci grana quindecim.

Infusi Salviae uncias sex.

Dissolve. (Auf.)

RC. Sulphatis scrupulum unum, Aquae ferventis sesquiunciam.

B. In Gestalt von Collyrium.

Aqua ophthalmica s. ophthalmica adstringens s. ophthalmica Boylii s. vitriolica s. Sulphatis Zinci s. e Vitriolo Zinci s. vitriolica camphorata s. Zinci vitriolata cum Camphora, Aqua Vitrioli albi, Solutio Sulphatis Zinci s. zinci, Mixtura Zinci Sulphatis, Collyrium vitriolicum s. e Zinci sulphurico s. Vitrioli albi s. Zinci Sulphatis s. e Vitriolo albo s. Zinci, Collyrium cum Zinci Sulphate s. adstringens s. detergens s. deterium. (BorC†. Ham†. HC†. Sart†. WW†. Auf†. AD. Am. B*. DD. Ed. Gal. GalM. GalP. LH. Lus. RC. Suec. Ro. C. Ca DB. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. T. Va.)

℞. Sulphatis Zinci . . partem unam.

Aquae partes ducentas quadraginta.

Dissolve. (BorC†. WW†. B*. DD.)

GalM. Salis partem unam et Aquae ducentas; — Lus. Suec. Re. Sp. Va. Char. Aquae nonaginta sex; — DD. Aquae sexaginta quatuor; — Am. et C. Sulphatis grana duodecim et Aquae semioctarium; — ParC. Sulphatis grana quatuor ad sex et Aquae uncias sex; — Va. Sulphatis granum unum ad quinq., Aq. unciam; — GalP. Sulphatis grana octodecim, Aquae Rosarum uncias quatuor.

Man kann das Doppelte Wasser nehmen und nöthigenfalls zwei Drachmen Quittenscheim zusetzen.

Ham†. Salis partem unam et Aquae trecentas viginti; — Ra. Va. Aquae centum viginti; — Ra. et Sw. Salis partem unam et Aquae nonaginta sex; — Gr. Vitrioli albi grana decem, Aquae Rosarum uncias octo; — Sa. et Sw. Salis partem unam et Aquae quadraginta octo; — Auf†. Salis granum, Aquae Rosarum unciam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum drachmam; — LH. Aquae destillatae uncias sex, Sulphatis grana tria, Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.

℞. Sulphatis Zinci . . scrupulum.

Infusi Sambuci libram.

Dissolve. (Ra.)

Ba. praeterea: Sulphatis granum et Aquae Plantaginis unciam; — Va. Hosp. Inf. Sulphatis grana quinque, Infusi Sambuci uncias quatuor; — Am. et C. Sulphatis drachmas duas, Spiritus Lavandulae uncias duas et Aquae uncias sex (Mixtura Zinci Sulphatis (C)); — Sar. Vitellum Ovi coctione concretum eximere, Sulphatem Zinci ingerere et liquorem post aliquot tempus profluentem commiscere cum Aquae Rosarum et Plantaginis, sing. uncias sex; — Auf†. Sulphatis grana tria dissolvere in Aquae Rosarum cum Albumine Ovi unius subactae sesquiuncia; Gr. Vitrioli albi semidrachmam, Albumen Ovi unius, Aquae Rosarum uncias quatuor.

℞. Sulphatis Zinci grana quinque.

Aquae Plantaginis uncias quatuor.

Mucil. Sem. Cydonior. semunciam.

Dissolve. (Ca. DB. [Collyrium Janini])

℞. Sulphatis Zinci grana sedecim.

Aquae uncias octo

Acidi sulphurici Aqua diluti

guttas sedecim.

Dissolve sal in aqua et adde acidum. (AD. Ed. RC. C. Re.)

LP. Sulphatis grana sex, Aquae uncias octo, Acidi diluti guttas duodecim; interdum Camphorae in Alcohole sol. grana aliquot addere convenit.

℞. Sulphatis Zinci . . . drachmam.

Aquae Rosarum . . . libras duas.

Alcoholis 22° unciam.

Dissolve. (Gal.)

DB. T. Sulphatis, Sacchari raff., sing. scrupulum unum, Aquae Rosarum uncias quatuor, Spiritus Vini guttas quatuor vel sex.

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.

Camphorae . . . grana quatuor.

Aquae Euphrasiae,

— Rosarum,

— Plantaginis, sing. unciam.

Dissolve (Bo.)

℞. Sulphatis Zinci . grana viginti.

Alcohol. camph. unciam.

Aquae destill. unc. octo.

(Va. Gny's Hosp.)

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.

Aquae destillatae . . uncias sex.

Mucil. Cydoniorum . . unciam.

Aquae Vitae camph.

gutt. duodecim.

Misce. (Sw.)

℞. Vitrioli albi . . semidrachmam.

Camphorae uncias duas.

Aquae bullientis . . libras duas.

Dissolve et filtra. (Gr.)

Praeterea loco camphorae Spiritus camphorati semidrachmam caeterum ut antea; vel: Vitrioli albi semidrachmam, Spiritus Camphorae sesquidrachmam, Aquae ferventis uncias duas, Aquae Rosarum uncias quatuor; — Re. Sulphatis grana quindecim, Camphorae oecem, Aquae bullientis uncias sex (Collyrium Zinci Sulphatis camphoratum).

R. Aloës lucidae pulveratae scrupulos quatuor.

Zinci sulphurici, Stibii oxydati fuscii, sing. drachmas duas.

Aquae destillatae . . . uncias sex.
Olei Rorismarini . . . guttas sex.
Digere leni calore per mensem et filtra. (H.C. Aqua ophthalmica Boylii.)
C. In Gestalt von Bähung oder Waschung (Lotion, Fomentatio Zinci Sulphatis). (Aut. B*. LoP. Re. Sw. Sy. Va.)

R. Sulphatis Zinci . . . grana duo.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Dissolve. (Sy.)

R. Sulphatis drachmam et Aquae unciam; — LoP. Sulphatis drachmam, Aquae octarium; — Aut. Sulphatis drachmas tres et Aquae unciam; — Re. Sulphatis semidrachmam, Aquae octarium; praeterea: Sulphatis libras duas, Aquae bull. octarios sex (Art. Veterin.). — Va. Sulphatis drach. unam ad duas, Aq. destill. libr. duas.

R. Sulphatis Zinci, Aquae Vitae camph., sing. semunciam.
— bullientis . . . libras duas.
Dissolve. (Sw. Sp.)

D. In Einspritzung. *Injectio Sulphatis Zinci s. adstringens.* (B*. DD. His. Sw. Sy.)

R. Sulphatis Zinci . . . granum.
Aquae . . . unciam.
Dissolve. (B*. His. Re.)

Re. Interdum Acetas Plumbi additur et loco aq. dest. Aq. Rosar. adhibetur; — B*. praeterea: Salis grana triginta quinque et Aquae uncias quatuor; vel Salis scrupulum unum ad semidrachmam et Aquae unciam.

R. Sulphatis Zinci . . . drachmam.
Aquae camphoratae uncias duas.
— purae . . . libras duas.
Dissolve. (Sw. Sy.)

Injectio adstringens. (B. t2.)

R. Aquae Plantaginis . . . uncias sex.
Laudani Sydenhami guttas triginta.
Sulphatis Zinci . . . scrupulum.
Mucil. Gummi Arab. . . unciam.
Bei Hämorrhöde. (B.)

R. Sulphatis Zinci . . . scrupulum.
Boli Armenae . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici . . . drachmas duas.
Aqua . . . uncias octo.
Bei Gonorrhöde. (E2.)
R. Sulphatis Zinci . . . grana decem.
Gummi Arabici drachmas duas.
Tincturae Opii . . . drachmam.
Aquae . . . uncias octo.
Bei Gonorrhöde. (E2.)

Injectio Pringlii. (DB.)

R. Aquae destillatae . . . libras tres.
Sulphatis Zinci, Aluminis calcinati, sing. unc. quatuor.

Injectio adstringens anodyna. (LH.)

R. Aquae Rosarum . . . uncias sex.
Sulphatis Zinci, Acetatis Plumbi, singulorum

grana sex,
Opii . . . grana quatuor.
Mucil. Gummi Arab. . . unciam.
Häufig wird das Opium auch wegge-
lassen.

Gargarisma Sulphatis Zinci s. adstringens. (E2.)

R. Sulphatis Zinci . . . drachmam.
Mellis . . . semunciam.
Tincturae Myrrhae,
Aquae Vitae, sing. . . unciam,
— Rosarum . . . uncias quatuor.

Bei schwärendem Zahnfleische von über-
mäßigem Speichelflusse, kann, wenn es zu-
fiert, mit Wasser verdünnt werden.

Fomentatio adstringens, Fomentum tonico-adstringens. (K. Va.)

R. Dec. Cort. Granati libras quatuor.
— Chinae . . . libras duas.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Tinct. Opii . . . unc. (drachm. Va.)
unam.

Bei äußern Hämorrhoiden und Hämorrhöde der Scheide.

Collyrium resolvens, Liquor ophthalmicus deterisivus. (Palt. Ca Sm.)

R. Rad. Iridis Flor. pulv. drach. tres.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Aq. Rosarum,

— Plantaginis, sing. sesquilibram.
Digere per dies duos et cola. (Pol)

R. Iridis Florentinae,
Sulph. Zinci, sing. semidrachmam.
Sacchari crystall. . . scrup. duos.

Aquae Rosarum . . . libram.
Digere per tres dies et cola. (Ca Sm)

R. Vitellos Ovorum recentium no 2.
Aquae Rosarum . . . libram.

Tritura simul et adde

Sulphatis Zinci . . grana 12—24.
Dissolve. (Sn.)

Injectio sedativa adstringens. (Ca. Sy.)

Rx. Sulphatis Zinci . . . grana sex.
Oxydi Plumbi grisei . . . grana viginti.

Aquae Rosarum . . . uncias quatuor.
Misce agitando. (Ca.)

Sy. Sulphatis grana octodecim, Pulveris Cerussae compositi grana sexaginta et Aquae Tiliae vel Rosarum uncias duodecim.

Lotio Zinci composita. (LoP.)

Rx. Lotionis Zinci,
Liquoris Plumbi Acetatis diluti,
partes aeq.

Misce.

Collyrium adstringens. (Auf. B. C. Gr. Pie. Va.)

Rx. Sulphatis Zinci . . grana viginti.
Tutiae . . . semidrachmam.

Aquae Rosarum,
— Plantaginis, sing. unc. tres.

Misce. (Pie.)

Rx. Aquae Rosarum . . . uncias tres.
Sulphatis Zinci . . . grana tria.

Landani Sydenh. . . scrup. unum.
Misce. (B. Va.)

Va. loco landani Extracti Opii grana duo; — Gr. Vini Opii drachmas duas, Zinci Sulphatis semiscrupulum, Aquae Rosarum, Aquae purae, sing. uncias sex.

Rx. Sulphatis Zinci,
Boli Armenae, sing. uncias duas.
Camphorae . . . semunciam.

Man vermischt eine Drachme dieses Pulvers mit vier Unzen Rosenwasser. (Auf. C.)

Aqua ophthalmica. (Sp.)

Rx. Sacchari cryst. albi . . unciam.

Rad. Iridis Flor . . drachmas tres.
Tutiae praeparatae,

Sarcocollae,
Sulphatis Zinci,

A'oes, sing. . . . drachmam.
Caryophyllorum . . . scrup.

Aquae Euphrasiae,
— Foeniculi,

— Rosarum, sing. uncias octo.
Vini Hispanici . . . uncias 24.

Post quatuordecim dies infusionis solis calore, decantha.

Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. Sulphatis Zinci aluminosa, Liquor Aluminis compositus, Solutio Sulphatis Zinci s. Zinci aluminosa, Injectio ad leucorrhoeam, Aqua aluminosa

Bateana s. Batiana, Solutio vitriolica s. Supersulphatis Aluminiae et Potassae composita, Aqua styptica, Errhinum haemastaticum. (Auf. AD DD Fer. HisS. LH. Lon. LonN. LP. Lus. RC. B. Ca. DB, E2. Pie. Re. Sa. Sw.)*

Rx. Sulphatis Zinci,
Aluminis calcin., sing.

semunciam.

Aquae purae libras (octarios) duas.
Dissolve (Auf. AD DD. Lon. LonN.

LP. RC. C. Ca. Re. Sw*.)

LH. DB. Aluminis, Sulphatis, sing.

ut antea, Aquae ferv. libras duas cum

dimidia; — Ca. praeterea: Salium,

sing. quantitatis antea dictae dimidium;

— Fer. et Lus. Salium, cujusque semunciam et Aquae bull. libras duas cum

dimidia; — Sa. Salium, sing. drachmam et Aquae libram; — E2. Sulphatis sesquidrachmam, Aluminis semidrachmam et Aquae bull. semioctarium.

Rx. Sulphatis Zinci,
Aluminis, sing. . . . semunciam.

Aquae Rosarum . . . libram.

Solutionem filtra. (HisS.)

Rx. Sulphatis Zinci,
Aluminis, sing. . . . drachmam.

Succi Urticae . . . uncias quatuor.

Dissolve. (Pie.)

Rx. Sulphatis Zinci semidrachmam.

Aluminis drachmam.

Boracis grana quatuor.

Aquae Rosarum . . . uncias sex.

Dissolve (Pie)

Rx. Dec. Cort. Quercus unc. decem.

— Cynorrhodontis uncias sex.

Sulphatis Zinci . . drachmam.

Aluminis . . . sesquidrachmam.

Solutioni adde

Alcoholis . . . drachmas duas.

Tinct. Opii aquos. semidrachmam.

Misce. (B.)

Abstringierend, äußerlich gegen Ektymosen, Geschwüre, Hautübel, leichte Blutflüsse und chronische Speichelflüsse. — Gabe, ein Löffel für einen Erwachsenen, ein Theelöffel für ein Kind von sechs Monaten (E2.), Morgens nüchtern.

Lotio Aluminis. (Gr.)

Rx. Aluminis,
Aceti destillati,

Vitrioli albi, sing. . . semunciam.

Bei Frostbeulen.

Collyrium tonicum. (Bo.)

Rx. Rutae recentis,

Flor. Arnicae, sing. manip. dimid.

Baccarum Juniperi drachmas duas,

Ipecacuanhae . . . grana triginta.

Vini albi . . . uncias duodecim.

Stent in infusione per horas 24 inter cineres calidos; tunc adde colaturae.

Sulphatis Zinci . . grana viginti.
Salis Ammoniaci guttas triginta.

Aqua d'Alibour. (Ca. Sm. Vm.)

℞. Sulphatis Zinci uncias duas et drachmam unam c. dimidia.
Sulphatis Cupri drachmas quinque.
Camphorae drachm. duas c. dim.
Croci drachmam.

Post horas 24 digestionis filtra (Ca.)

Ca. DB. praeterea sub titulo: *Aquae ad oculos d'Yvel*: Sulphatis Zinci drachmas tres, Sulphatis Cupri unam, Camphorae scrupulos duos, Croci grana viginti et Aquae octarium unum; — DB. Camphorae scrupulum, Aquae libras tres leni igne per nycthemerum exponere, saepius agitando et filtrare.

℞. Aquae octarios duos.
Sulphatis Zinci uncias duas.
— Cupri drachmas quatuor.
Camphorae drachmam.
Dissolve. (Sm.)

℞. Foliorum Rutae . . . partes sex.
Aquae ferv. partes quatuordecim.
Post semihoram infusionis colaturae adde

Sulphatis Zinci. partes quatuor.
— Cupri partem unam.

Aq. Vitae camph. partis quadrant.

Dissolve. (Vm.)

Vm. hanc formulam sub titulo: *Collyrium de Sanit-Jerneron* ind. cat.

Collyrium Stierncronense s. Decoctum Rutae zincatum s. Aqua ophthalmica Ohdelii. (B et Suec.)* Rutae partes duas, Aquae triginta sex, ad dimidium redigendas et Colaturae unciis duodecim addere Sulphatis Zinci unciam, Sulphatis Cupri drachmas tres et Aquae Vitae camph. semidrachmam.

Aqua ophthalmica Bateana. (DB.)

℞. Protosulphat. Ferri . . . unciam.
— Zinci semunciam.
Camphorae pulver. drachmas duas.

Gummi Arabici semunciam.

Aquae destillatae uncias sex.

Misce exacte, expone per horas nonnullas leni igne et filtra per chartam.

Lapis vulnerarius externus. (Ful†.)

℞. Aluminis,
Sulphatis Zinci, sing. . . uncias sex.
Acetatis Cupri,
Salis Ammoniaci, sing. . . drachmam.

Misce triturando, liqua, prope ignem relinque ad perfectam desiccationem usque et sub finem adde

Croci semidrachmam.

Dieses Präparat ist zum Reinigen, Austrocknen und Kräftigen von Geschwüren empfohlen worden.

Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhales ex relaxatione, Collyrium molle. (Br†. Ful†. Pie.)

℞. Sulphatis Zinci . . . partem unam.
Butyri recentis . . . partes septem.
Contere simul. (Ful†.)

Br† Sulphatis partem unam et Butyri sex; — Pie. Sulphatis unam et quatuor Butyri.

Unguentum s. Pomatum virginalae, Pomatum Comitissae. (Ca.)

℞. Sulphatis Zinci drachmas quatuor.
Foliorum Myrti,
Rhois, sing. drachmas tres.
Gallarum.
Nucum Cupressi,
Cort. Granat, sing. . . drach. duas.
Unguenti rosati q. s.
Misce triturando.

Linimentum Zinci Sulphatis. (Re.)
Zinci Sulphatis scrupulum, Axungiae praep. semunciam. — Bei schmerzloser Augenentzündung auf die Augenlider.

Pulvis ad s. contra maculas corneae. (Pie.)

℞. Tutiae praeparatae,
Sacchari crystallisati,
Sulphatis Zinci,
— Cupri,
Acetatis Cupri,
Mercurii dulc., sing. . . drachmam.
Fiat pulvis.

Pulvis Nucum Cupressi restrictivus s. adstringens. (Hi-3.)

℞. Boli Armenae . . . drachmas duas.
Radici Bistortae,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Baccarum Myrti,
Nucum Cupressi,
Sulphatis Zinci,
Thuris, sing. unciam.
Fiat pulvis tenerrimus.

Bolus emeticus. (Par.)

℞. Zinci sulph scrupulum.
Confect. Rosar. q. s.
Mit etwas Chamillenthee zu nehmen und nach jedesmaligem Erbrechen einige Tassen lauwarm zu trinken.

Pilulae emeticae. (Gr. Re.)

℞. Sulphatis Zinci . . . scrupulum.
Conservae Rosarum q. s.
ut f. pil. pond. gran. quinque. — Als

Volus, auf eine Gabe, mit Chamillenthee bei phthisis etc.

Antipertussis (Par.): Remedium Sulphat. Zinci maxime continens.

Acetas s. Acetis Zinci, Zincum aceticum s. aceticum.

1) In fester Gestalt.

R. Florum Zinci q. vis.
Aceti destillati q. s.
ad solvendum caloris ope oxydum.
Filtrata et vaporatiori subijce ut crystalli demittat.

HC† Zinci oxydati albi q. placet in Aceti concentrati q. s. cum Aquae destillatae parte dimidia diluta solvere, liquorem filtrare et vaporatiori in crystallis redigere; — *AD.* Sulphatis Zinci uncias sex in Aquae destillatae octariis quatuor, et Acetatis Plumbi uncias octo in eadem Aquae quantitate solvere, solutiones commiscere, per chartam filtrare et evaporando in crystallis redigere.

2) In flüssiger Gestalt. (Liquor s. Solutio Zinci Acetatis, Solutio Acetitis Zinci.)

AD. Am. B*. D. Ed. Br*. C. E2. Gr. Re. Sw. Sy. Vm.

R. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi, sing. drachmam.
Misce in mortario vitreo et adde
Aquae bullientis . . . uncias tres.
Post refrigerationem filtra. (Sw.)

*Br** commiscere solutiones duas, unam e Sulphatis Zinci granis viginti in Aquae uncias tribus, alteram Acetatis Plumbi granorum viginti in Aquae praemonita quantitate et filtrare; — *Am.* et *B** Sulphatis Zinci grana duodecim, Acetatis Plumbi grana sedecim et Aquae semioctarium (auch als *Collyrium Zinci Acetatis Am.*); — *AD.* B*. Ed. C. Gr. Re. Sulphatis Zinci drachmam, Acetatis Plumbi scrupulos quatuor, Aquae uncias viginti, solve seorsim sales quemque in Aquae uncias decem, commisce solutiones et praecipitato deponito filtra; — *Gr.* Zinci sulph. grana viginti quatuor, Plumbi Superacetatis tringintaduo, solve seorsim quodque in Aquae dest. uncias quatuor, misce solutionem et post aliquot tempus filtra.

R. Oxydi Zinci q. vis.
Acidi acetici q. s.
ad solutionem oxydi, Solutionis guttis viginti adde Aquae uncias quatuor. (Sy)

Man wendet die essigsaure Zinkflüssigkeit in Gestalt von Collyrien oder Einspritzungen gegen Menorrhoe an.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Vm. conterere proponit Sulphatis Zinci grana duodecim et Acetatis Plumbi semidrachmam et addere Aquae Rosarum uncias sex (*Aqua ophthalmica*); — *E2.* Re. *Collyrium adstringens s. Zinci Sulphatis cum Plumbi Acetate:* Sulphatis Zinci, Subacetatis Plumbi, sing. grana sex, solve in Aquae Rosarum uncias quatuor. — *Re.* Salium grana octo et Aquam destillatam.

Besser würde es fern, das trockne essigsaure Salz unmittelbar in Rosenwasser, z. B. einem Scrupel von demselben in acht Unzen Wasser aufzulösen, wie

Collyrium Zinci Acetatis (Re.): Acetatis semidrachmam, Aquae dest. unc. duodecim.

Man findet bei Ellis (h2.) eine *Injectio Zinci Acetatis s. adstringens* gegen Gonorrhoe, welche aus acht Gran essigsaurem Zink und vier Unzen Rosenwasser besteht. Augustin (*Auf.*) führt eine ähnliche Einspritzung an, welche er, nach den Engländern, in demselben Falle rühmt; sie besteht aus einer Aufsüßung von acht bis zehn Gran essigsaurem Zink in vier bis sechs Unzen destillirtem Wasser: — *Re.* eine *Injectio Zinci Acetatis*; Acetatis grana decem, Aq. dest. uncias sex. — Bei Gonorrhoe.

Pie. ein *Collyrium* aus anderthalb Drachmen schwefelsaurem Zink, zwei Scrupel essigsaurem Blei, vier Unzen Aqua Plantaginis und eben so viel Rosenwasser.

Aqua ophthalmica alba Danica s. anti-ophthalmica. (Auf. Sp.)

R. Sulphatis Zinci . . . drachm m.
Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae . . . scrupulum.
Aquae Rosarum unc. duodecim.
Dissolve et filtra (Sp.)

Auf. Sulphatis Zinci scrupulum, Subacetatis Plumbi semidrachmam, Aquae Vitae camph. drachmas duas et Aquae dest. uncias duodecim.

Collutorium adstringens s. e Zinco compositum. (Sp. Sw.)

R. Trochisc. albor. Rhazis . . . drachmam.
Sulphatis Zinci . . . semidrachmam.
Acetatis Plumbi semiscrupulum.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce (Sp.)

R. Sulphatis Zinci . . . grana octo.
Acetatis Plumbi liquidi . . . guttas octo.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce et adde, si requiritur, Aquae camphoratae unciam unam (Sw.)

Injectio ad blennorrhoeam s. adstringens.
(Bo. Sy.)

℞. Sulphatis Zinci drachmas duas.
Acetatis Plumbi scrupulos quatuor.
Camphorae . . sesqui-scrupulum.
Extr. Opii aquosi . scrup. unum.
Aqua Rosarum . libras 2 ad 4
Dissolve. (γ.)

℞. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi,
Aluminis, sing . . drachmam
Camphorae . . . grana decem
Aqua Rosarum,
— comm, sing. uncias octo.
Dissolve. (Bo.)

Zwei- oder dreimal täglich einzuspritzen.

Tinctura Acetatis Zinci, Acetas Zinci dilutus. (AD. B*. Du. C. Re)

℞. Sulphatis Zinci,
Acetat. Potassae, sing. unciam
Contere et adde
Alcoholis libram (octarium) unam.
Macerate per hebdomadem, subinde
agitando et filtra.

In Collyrien und Einspritzungen bei
Blennorrhöe anzuwenden.

Zingiber.

Amomum Zingiber, L., Zingiber officinarum s. officinale, Roscoe, Z. albus; Zeyherius Ingwer, Imber, Ingber: Gingembre (Gal.); Siwe (Amb.); Ginger (Ang.); Zingibil, Zingibil ruth (Ar.); Zazzor (H.); Jahetuh (Ka); Sohi (Band.); Ada (Beng.); Sonty (Can.); Inghuru, Ammu Inghuru (Cy.); Ingwer (D.); Gengibre (His.); Sont, Udruck (Hin.); Gember (Bel.); Zen zero (I.); Jai aking, Dschey (Jav.); Alia (Mal.); Zungehil, Zungehil tur (Pe.); Jembier (Pal.); Gengibre (Lus.); Sunthi, Ardraka (Sa); Ingefaera (Succ.); Sukku, Injia (Tam); Sonti, Ullum (Tel.); Wuraka (Ternat.); Gora (Tidor.).

A†. Ba†. BorC† Por5†. Pr†. Fu†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. i†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Succ. Taur. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Z.

2 (Monandria Monogynia, L.; Scitamineae, J) Eine Pflanze Ostindiens, welche man auch in America baut. (Jacq. Hort. Vind. Vol. 1. t. 75. Rheede Hort. Malab. XI. t. 12. Plenck. t. I. Dict. d. Sc. nat. cah. VI. Düss. off. Pfl. VII. t. 6. Rumph. Amb. V. t. 66 f. 1.)

Die Wurzel (*radix Zingiberis s. Zingiberis*) erscheint unter zwei Varietäten im Handel:

1) Als schwarzer oder gemeiner Ingber (*Zingiber commune, nigrum s. vulgare*). *Gingembre noir ou commun (Ga.)*; er ist etwa zwei Zoll lang, dick, fest, hornartig, äußerlich gelblichgrau oder weißlich, innerlich rötlichgelb oder bräunlich.

2) Als weißer Ingber (*Zingiber album*), *Gingembre blanc (Gal.)*; er hat ein mehr holziges Ansehen, ist höckerig und dornig und hat äußerlich eine gelblich-weiße oder weißlichgraue, inwendig eine rötlichgelbe Farbe. Diese Verschiedenheiten hängen von der Bereitungsart ab; die erste Sorte wird in kochendem Wasser weiß gefotten und dann am Feuer oder in der Sonne getrocknet; die zweite wird, nach Abziehung der Oberhaut, bloß an der Luft getrocknet. Der Geruch ist durchdringend, angenehm und kampferartig, der Geschmack gewürzhaft, scharf und brennend.

Der Ingwer enthält ein flüchtiges Öl, einen stickstoffhaltigen Stoff, eine thierische, mit dem Osmazum verwandte Substanz, Essigsäure, essigsaures Kali, Sagemehl, Schleimharz etc.

Reizend, magenstärkend, blähungtreibend, Speichelabsonderung befördernd. — Gabe des Pulvers. von fünf Gran bis zu einer halben Drachme.

Radix Zingiberis trita reducta (Gr.): Zingib. libr. 56. Fohar. libr. 28. Arenae (box dust) tantidem, Capsici libr. 1.

Radix Zingiberis condita (Re.) kommt aus Ostindien.

Pulvis Zingiberis (Re.) Radix pulverata.

species Diamargaritae calidae. (Wir†.)

℞. Rad. Zingiberis . . semunciam.
— Doronici,
— Zedoariae,
— Behen albi,
— — rubri, sing. drach. tres.
— Pyrethri . . . drachmam.

Seminum Apii,
Cardamomi majoris et minoris,
Nucis moschatae,
Macidis,
Piperis longi,
— nigri, sing. . . drach. tres.
Cinnamomi . . drachmas quinque.
Mastichis,
Margaritar. orient., sing. semunciam.

Fiat pulvis. — Gabe. von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep pectorale. (Pie.)

℞. Mellis purif. cochlear majus (Efl.).

Zingib. pulv. cochlear minus (Raf-
feelöffel.)

Commisce cum
Aquaе cochlearibus 2 vel 3.

*Electuarium pectorale, Marmelada sti-
mulans s. pectoralis. (Sm. Va)*

R. Zingiberis pulv. cochlear min.

Mellis Narbonnensis uncias sex.

Misce. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei
oder drei Mal täglich, bei Husten mit reich-
lichem Auswurfe.

Confectio aromatica. (Vm.)

R. Zingiberis conditi . partes sex.
Cort. Aurantior. condit.

part. quatuor.

Nucis moschatae . partem unam.

Syr. Caryophyll. rubr. . . q. s.

Opiatum stomachicum. (Ca. Pie.)

R. Zingiberis conditi . uncias duas.

Linonum conditorum,

Caryophyll. condit., sing. unciam.

Opiati Salomonis . semunciam.

Nucum moschatarum conditarum,

Cinnamomi, sing. drachmas tres.

Cascarillae . . . semidrachmam.

Olei ess. Caryophyll. scrup. duos.

— Cinnamomi gutt. decem.

Syr. Caryophyllor. rubr. . . q. s.

Aphrodisiacum. — Gabe, einen bis drei
Scrupel.

Morsuli stimulant. (Sm. Sp.)

R. Zingiberis . . drachmas duas.

Croci orientalis . . drachmam.

Moschi,

Caryophyll., sing. semidrachmam.

Mastichis . . . drachmas tres.

Ambrae griseae grana duodecim.

Sacchari semilibram.

Fiant morsuli drachmae unius. (Sm.)

R. Cinnamomi . . drachmas duas.

Nucis moschatae . . drachmam.

Caryophyllorum scrupulos duos.

Macidis scrupulum

Zingiberis . . . drachmas sex.

Sacchari . . . uncias sedecim.

Fiant morsuli. (Sp.)

Syrupus Zingiberis s. Amomi Zingi-

beris. (Bor5†. Ful†. Han†. HN†. Li†.

Wür†. AD. Am. Ams. B. Bel. Du. Ed.

Fenn. Gen. LonN. LPC. Lus. RC.

Succ. C. CG. DB. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

R. Zingiberis pulverati uncias duas.

Aquaе bullientis . . . libras tres.

Digere per horas 24 in vase tecto.

Cola et adde

Sacchari albi . . . libras sex.

Ad syrupi consistentiam redige. (B.)

Das Verfahren ist überall ganz oder
doch fast dasselbe; jedoch wechseln die Men-
genverhältnisse unendlich, nämlich:

Lus. Zingiberis uncias quatuor,
Aquaе libras quatuor, horas sex infu-
sionis et Sacchari q. s. — Bor5†. Han†
HN†. Zingiberis uncias duas. Aquaе
sedecim, horas quatuor digestionis et
Sacchari libras duas; — Wür†. Zing-
iberis uncias tres. Aquaе libras tres et
Sacchari libras septem cum dimidia;
— Fenn. Succ. Zingiberis unciam,
Aquaе libram, horas sex infusionis et
Sacchari q. s.; — Ed. Zingiberis drach-
mas sex, Aquaе libram, 24 horas infu-
sionis et Sacchari uncias viginti duas;
— Du. Zingiberis uncias quatuor, Aquaе
octarios tres, 24 horas infusionis et
Sacchari uncias viginti novem; —
LonN. C. CG. Gr. Re. Va. Zingiberis
uncias duas, Aquaе octarium, 24 (4)
horas infusionis et Sacchari libras duas;
— LPC. Zingiberis uncias duas cum di-
midia, Sacchari libras duas cum dimi-
dia; — Gr. Zingiberis uncias tres,
Aquaе bull. libras quatuor, Sacchari
septem cum dimidia; — Ams. Zing-
iberis uncias tres, Aquaе libras quatuor,
24 horas infusionis et pro colaturae
libris quatuor Sacchari libras quindecim;
— Gen. Zingiberis uncias qua-
tuor, Aquaе libras duas cum dimidia,
24 horas infusionis et Sacchari libras
quinque; — Sw. Zingiberis uncias tres,
Aquaе libras quatuor, 24 horas infu-
sionis et Sacchari libras septem cum di-
midia; — Vm. Zingiberis partem unam,
Aquaе tepidae octo et Sacchari duo-
decim; — Ful†. et Li†. Zingiberis un-
ciam, Aquaе bullientis libram et Sac-
chari tantidem; — Am. Zingiberis un-
cias tres, Aquaе bull. uncias quatuor
et Sacchari libras septem cum dimidia;
— RC. Zingiberis sesquiunciam, Aquaе
bull. libras duas, Sacchari puri libras
tres cum dimidia et 24 horas macera-
tionis; — T. Zingiberis uncias octo,
Aquaе bull. libras duas, infusionem
per horas 12 et Sacchari libras qua-
tuor; — DB. Zingiberis uncias tres; —
AD. Tincturae Zingiberis uncias duas,
Syrupi congium, evaporare in balneo
aquaе Alcoholis.

Gabe, von einer Drachme bis zur halben
Unze.

*Syrupus Zingiberis (vinosus) (Lon.
ante 1745. Gr.):* Zingib. unc. tres, Vi-
ni albi libram, infund. calide per dies
tres, cola et adde Sacch. sesquilibram.

Candied Ginger (Re.): Radicis subt.
rasae unciam, Sacchari subt. pulv. li-
bram, Aquaе q. s. ad liquandum, igni
lento impone, ut paene bulliat, tunc

adde Sacchari libram, agita ut spissescat, ab igne remove etc

Tinctura Zingiberis s. Amomi Zingiberis. (Hant. HC†. AD. B* Du. Ed. GalP. Lon. LonN. LPC. C. CG. Gr. Re. Sw. Vm.)

R. Zingiberis . . . uncias duas
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Post dies octo vel quatuordecim infusionis cola. (B*. Du. Lon. LonN. CG. Re.)

LPC. Zingiberis uncias duas cum dimidia; — Re. Zingiberis uncias quatuor suadet; — Ed. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — C. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,930) libras duas; — Gr. sec. Lon. ante 1824 Sw. Radicis unciam et Alcoholis (0,935 Spir. ten.) libram; loco spir. ten. Spiritum rectif. adhibendo, *Oxley's concentrated Essence of Jamaica ginger* habes; — Vm. Radicis partem unam et Spiritus Sacchari octo; — Hant. HC†. Radicis uncias quinque et Spiritus rectificati libras duas (dies octo digestionis et colaturam unciarum viginti HC†.); — GalP. ut tinct. Cinnamomi; — AD. Zingiberis uncias octo, Alcoholis octarios duos macerare per dies quatuordecim.

Reizend, gewürzhaltig — Gabe. sechzig Tropfen täglich zwei Mal. — Auch soll diese Tinctur die Zahnschmerzen lindern, wenn man damit getränkte Baumwolle in die hohlen Zähne bringt.

Elisir de Mittié. (Ca.)

R. Zingiberis . . . semunciam.
Cinnamomi,
Piperis longi,
Galangae min., sing. drach. duas.
Nucis moschatae,

Caryophyllor., sing. . drachmam.
Cardamomi minoris . scrupulum.

Alcoholis uncias sex.

Reizend, magenstärkend — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Oleum Zingiberis aethereum, Aethereoleum Zingiberis. (Br†. Wir†.)

R. Zingiberis partes sex.
Aquae purae partes triginta sex.
Salis culinaris . . . partem unam.

Digere per dies quatuor vel quinque, distillationem institue et oleum in fundo subsidens collige.

Acetum Zingiberis (Gr.): Zing. unciam, Aceti octarium per dies quatuordecim macerare et exprimere; mehr in der Küche.

Z i r c o n i u m.

Eine Substanz, welche man als ein Metastoff betrachtet und wovon man in der Medicin nur folgende Zusammensetzung angewendet hat:

Silicas Zirconii, Hyacinthus; Hyacinth; Hyacinthe (Gal.); Jacintho orientale (His).

Wir†. His G. Sp.

Ein sehr harter, glasartiger, nicht schmelzbarer Stein von orangengelber Farbe.

Quinque Lapides pretiosi. (Wir†.)

R. Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Carneoli,

Smaragdi, sing. partes aequales.

Misce et pulvera. — Eine ganz wirkungslose Mischung, welche man schon seit lange aus allen rationellen Vorschriften verbannt hat.