

Corallum nigrum, *C. B. Pin.* 366. *Rar. Mus.* *Best.* T. xxviii. Keratophyton arboreum, nigrum, *Boerb. Ind. A.* 6. Lithophyton nigrum, arboreum, *Tourn. Inst.* 574. Lithophyton nigrum, majus, & crassius, *Elem. Bot.* 446. Pseudocorallium nigrum, *Boet.* 319. **Black Coral.** In mari Italico, sed rarius, Oceano Americano frequentius reperitur. *Vires.* Cum reliquis convenit viribus, *Diosc.*

A. 4. Astroites Stellaris, & Stellæ Lapis, *Mont. Exot.* 7. Astroites distinctissimè Stellas emulas, *Mus. Swam.* 6. Astroites, *Gesn. de Fig. Lap.* 35. *Worm. Mus.* 68. *Plot. Hist. Oxon.* 87. *Tab. ii.* f. 6, 7. Lapidis Astroitidis, sive Stellaris primum genus, *Boet.* 298. *Cat. Jamaic.* 2. *Hist. Vol. I.* pag. 54. *Tab. xxi.* Stellatus Lapis, *Aldrov. Mus. Metall.* 872. *Fig.* 877, 878, 879. Stellarius Lapis, *Laet. de Gemm.* 97. **Star Stone.** In mare prope Jamaicæ Insulam reperitur. *Vires.* Cum Coralliis viribus convenit.

II. De Musco marino lapideo, seu Corallina.

A. **C**orallina, *Offic. J. B.* iii. 810. *Raii Hist.* i. 65. *Chab.* 577. *Tourn. Inst.* 570. *El. Bot.* 444. Corallina Anglica, *Ger.* 1379. *Emac.* 1571. Muscus maritimus, sive Corallina Officinarum, *C. B.* 363. Muscus marinus, sive Corallina alba Officinarum, *Park.* 1295. **Sea Coralline, White Coral Seed.** Rupibus marinis, petris, & etiam conchis accrescit, ubique ferè apud nos. *Vires.* In pulverem crassiusculum contrita, ad interaneorum vermes necandos, atque etiam expellendos, non immeritò celebratur.

CLASSIS SECUNDA,

SEU

BOTANOLOGIÆ

SECTIO PRIMÆ.

De Plantis Imperfectis.

Plantas imperfectas voco, quæ flore & semine carere videntur.

Aquaticas; quæ vel

Marinæ consistentiæ tenerioris & herbaceæ referentes

Herbas

§ Majores, & latifoliæ: *Fucus.*

§ Minores, & graminifoliæ: *Alga.*

Muscum

§ Majorem: *Lichen marinus.*

§ Minorem: *Muscus marinus.*

Fungum, substantia vel

§ Molliore: *Spongia.*

§ Duriore: *Alcyonia.*

Aquarum dulcium alumnæ, foliis trifidis:

Len. Palustris.

Extra aquas nascentes; quæ vel sunt substantiæ

Crassioris ad carnes, aut ligna accedentis:

§ Lamellati, & pileati: *Fungi.*

§ Lamellis carentes,

Arborei,

§ Solidi: *Agaricus.*

§ Membranacei: *Auricula Judæ.*

Terrestres,

§ Capitati: *Phalloides.*

§ Globosi: *Crepitus Lupi.*

§ Subterranei: *Tubera Terræ.*

Tenuioris, & siccioris, ad herbæ naturam propius accedentis. Hæ vel sunt

§ Cauliferae, & ramosæ: *Musci.*

§ Caule carentes, crustæ modo in arboribus reptantes: *Lichen Arboreus.*

I. De Alga graminea.

NO TÆ sunt: planta submarina consistentiæ herbaceæ foliis graminis in foliorum sinu semina continentes, *R. Meth. Auct.* p. 4.

A. Alga, *Offic. Ger. Emac.* 1569. Alga, & Ulva, *Chab.* 569. Alga anguifolia vitrariorum, *C. B.* 364. *J. B.* iii. 794. *Raii Hist.* i. 75. Fucus marinus, sive Alga marina graminea, *Park.* 1292. *Hist. Oxon.* iii. 647. *Raii Synop.* 7. **Grass Crack.** In litoribus marinis ubique reperitur. *Usu.* Herba. *Vires.* Vim habet refrigeratorem, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus utilem, *Diosc.*

II. De Fuco.

Plantæ sunt submarinæ, consistentiæ mollioris, folliculaceæ, plerumque dichotomi, seminiferi duplicis generis folliculos habens, alios ventosos & aëre

duntaxat plenos, alios seminibus factos. Raii Meth. Auct. p. 4.

A. 1. Quercus marina, Offic. Ger. 1378. Emac. 1567. Park. Theat. 1294. Aldrov. Dendr. 160. Fucus maritimus, vel Quercus maritima vesiculas habens, Pin. 365. Tourn. Inst. 566. Boerb. Ind. A. 9. Fucus, sive Alga marina latifolia vulgarissima, Raii Hist. i. 70. Synop. iii. 40. Fucus marinus vulgarissimus latifolius, foliis Quercinis vesiculis donatis, Hist. Oxon. iii. 647. **Common Sea-Track.** Usu. Herba. Vires. Cum priore viribus convenit.

Descriptio, quam Quercus suæ marinæ Theophrastus tradit, adeo brevis est, & imperfecta, ut Botanicis inter se altercandi occasionem præbuerit. Clusius, & Cæsalpinus, Corallinæ fruticose speciem quandam esse volunt, quibuscum consentire non possum; sed huc potius referendam censeo, quod Theophrastus Quercum suam marinam, folium oblongum, crassum, & carnosum habere prodiderit.

A. 2. Fucus, Offic. tertius, Diosc. Fucus marinus, Rocella tinctorum dictus Alga tinctoria, J. B. iii. 797. Raii Hist. i. 74. Tourn. Inst. 566. Fucus marinus, Rocella tinctorum, C. B. 365. Alga cornu cervi divisura, ejusd. 364. Alga tinctoria, Hist. Oxon. iii. 646. An Fucus, sive Alga membranacea purpurea parva, R. Synop. iii. ? **Purple Sea-Track.** In Mari Mediterraneo reperitur. Usu. Herba. Vires. Adversus serpentes dedit Nicander. Hoc fucus quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula ejusdem nominis, qua sese fucant, Diosc.

A. 3. Vitis marina, & Lenticula marina, Offic. Lenticula marina, Calc. Mus. 19. Lenticula marina serratis foliis, Ger. Emac. 1615. Park. Theat. 1281. Fucus folliculaceus ferrato folio, C. B. Pin. 365. Tourn. Inst. 568. Raii Hist. i. 72. Hist. Oxon. iii. 647. Fucus folliculaceus, ferratus, Sargazo, Mont. Exot. 7. Sargazo, Pif. **Sea-Lentils.** In rupibus maritimis invenitur. Usu. Herba. Vires. Contra difficultates urinandi utuntur Lusitani & Batavi. Pifon.

III. De Musco Marino.

A. 1. **L**ichen marinus, Offic. Ger. 1377. Emac. 1566. Raii Hist. i. 77. Synop. x. Marinus platyphyllos, Pluk. Almag. 216. Fucus marinus; Lactuca marina dictus, Park. 1293. Fucus primus, Diosc. Fucus marinus Lactucæ folio, Hist. Oxon. iii. 645. Fucus Lactucæ folio, El. Bot.

443. Tourn. Inst. 568. Muscus marinus Lactucæ folio, C. B. 364. Lactuca marina; Bryon Theophrasti, Dioscoridis, & Plinii, Chab. 572. Bryon marinum Lactucæ foliis, Calc. Mus. 19. Lactuca marina, sive Intybacea, J. B. iii. 801. **Differ-green.** Petris, scopulis, ipsisque testis adnascitur. Usu. Herba. Vires. Cum Alga viribus convenit.

A. 2. Muscus marinus, Offic. Muscus marinus capillaceus Dioscoridis, Parkinson. 1288. Hist. Oxon. iii. 649. Muscus marinus capillaceus Dioscoridis, & Donati, R. H. 79. Muscus marinus verus Dioscoridis, Donat. pag. 61. **Sea-Moss.** In Mari Adriatico invenitur, in scopulis, testaceisque. Planta est gracilis, capillacea, caulis exers. Usu. Tota planta. Vires. Præcipua est spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras; quas refrigerare opus sit, Diosc. Hæc planta Constantino pro Musco marino Dioscoridis accipitur; cum quo potius consentio, quam cum iis qui pro Musco illo Corallinam Officin. habent. Parkinsonus noster pro Fucus capillaceo folio Theophrasti habet.

IV. De Spongia.

A. **S**pongia globosa, C. B. 368. Imp. 635. Tourn. Inst. 575. J. B. iii. 816. Raii Hist. i. 80. Hist. Oxon. iii. 653. Spongia marina alba, Ger. 1383. Emac. 1577. Spongia maris a usualis, Park. 1303. **Sponge.** Est substantia mollis, laxa, rara, porosa, levis coloris, spadicei, albicantis, vel flavescentis saporis, & odoris nullius evidentis. Saxi, conchis, aliisque marinis adnascitur. In Usu est integra planta. Vires. Usus ejus internus, vel nullus, vel rarus est, quia non solvit ventriculo, unde, ob intumescen-tiam, rursus ejicitur vel supra vel infra, ac ideo pro veneno habetur: Potius in usu est Chirurgico ad sanguinem sistendum. Vide Imperatum & Archigenis Fragmenta apud Ætium de Spongiæ Usu, Cap. clxx.

V. De Alcyonio.

Quænam sint corpora illa Alcyonia Græcis dicta, & unde originem habeant, inter Botanicos controversitur, & adhuc dubium manet. Plinius nidos quarundam avium in mari extruere esse tradit. Imperatus, minuta palea & pilorum frustula, in massas agitatione maris conglobata, tradit. Schrochius arundinem cum foliis suis pregeniem esse, quodque in pluribus, quæ dissecuit, & aperuit, plantam ipsam evolutam

obvolutam in medio invenerit, affirmat. Dioscorides quinque species enumerat. Harum quatuor in hoc capite exhibemus; quintam, Lib. iii. in Capite vel Ostreorum, vel Myrtillorum; quorum scilicet progenies est. Eorum autem utrumvis secundum Dioscoridis censeretur potest, notis scilicet nullis in textu propositis reclamantibus.

A. 1. Alcyonium durum, *Offic.* Alcyonium durum sive primum Dioscoridis Imperato, C. B. 368. *Tourn. Inst.* 576. Alcyonium spongiosum Officinarum, J. B. iii. 816. *Chab.* 579. *Raii Hist.* i. 82. *Hist. Oxon.* iii. 654. Alcyonium spongiosum Dioscoridis, flavum marinum quorundam, *Donat.* 11. Alcyonium primum Dioscoridis, *Calc. Mus.* 21. Alcyonium, seu eorum ruscum, *Worm.* 48. **Hard-Bastard-Sponge.** *Usu.* Tota planta. In seminarum smegmata assumuntur contra lentigines, lichenes, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquoque corpore, *Diosc.*

A. 2. Alcyonium vermiculatum, *Offic.* Alcyonium vermiculare Imperati, C. B. 368. Alcyonium vermiculare, *Imperat.* 639. *Hist. Oxon.* iii. 654. Alcyonium tertium Dioscoridis, *Cæsalpin.* 608. Alcyonium vermiculatum purpureum candidum & flavescens, *Tourn. Inst.* 576. **Vermiculate Bastard-Sponge.** *Usu.* Planta integra. *Vires.* Iis qui difficili urinâ vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est; item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni, *Diosc.*

A. 3. Alcyonium stuppofum, *Offic.* Alcyonium stuppofum Imperati, J. B. iii. 817. *Raii Hist.* i. 82. Alcyonium stuppofum, *Imp.* 640. *Tourn. Inst.* 576. Alcyonium stuppofum dictum, *Chab.* 579. Alcyonium stuppofum vel quartum Dioscoridis & Imperati, C. B. 368. *Hist. Oxon.* iii. 654. **Thready Bastard-Sponge.** *Usu.* Planta. *Vires.* Eiusdem cum præcedenti vires obtinet, verum haud parum imbecilliores, *Galen.*

A. 4. Alcyonium tuberosum, *Offic.* J. B. iii. 817. *Raii Hist.* i. 82. *Hist. Oxon.* iii. 654. Alcyonium tuberosum ficus formâ, *Imp.* 641. *Tourn. Inst.* 576. Alcyonium formâ fructûs alijus ficus, C. B. 368. **Tuberos Bastard-Sponge.** *Usu.* Integra Planta. *Vires.* Dealbandis dentibus aptum est: In aliâ smegmata, Psilothraque, assumitur cum sale mistum, *Diosc.*

VI. De Fungo.

Fungi nihil ferè habent commune cum plantis perfectioribus; nec enim color iis herbaceus, nec textura analoga, neque flos ullus, aut folium propriè dictum. Brevissimo temporis spatio plerique oriuntur, & brevis pariter ævi sunt, *Raii Synop.* pag. 8.

A. 1. Fungus, *Offic.* Fungus esculentus, 12 *Park.* 1317. Fungus pileolo lato & rotundo, C. B. 370. *Tourn. Inst.* 556. Fungus pileolo lato & rotundo livido, *Hist. Oxon.* iii. 636. Fungus campestris albus supernè, infernè rubens, J. B. iii. 824. *Raii Hist.* i. 87. *Synop.* 11. *Buxb.* 119. *Chab.* 581. Fungus parùm rubens infernè, pileo albo plano, quandoque umbilicato, *Sterb.* p. 28. *Tab. F.* Amanita campestris alba supernè, infernè rubens, *Dill. Cat.* 177. **The Mushrome or Champignon.** In pascuis sterilioribus in autumnno reperitur. *Usu.* Integra planta in culinis aceto condita; in Officinis autem rarò aut nunquam usurpatur.

A. 2. Crepitus Lupi, *Offic.* Lupi Crepitus, sive Fungus ovatus, *Park.* 1323. Fungus rotundus orbicularis, C. B. 374. *Hist. Oxon.* iii. 641. Fungus orbicularis, seu Lupi Crepitus, *Ger.* 1385. *Emac.* 1582. Fungus pulverulentus dictus Crepitus Lupi, J. B. iii. 848. *Chab.* 591. *Raii Hist.* i. 104. *Synop.* 16. Fungorum noxiorum 26 generis 1 Species, *Sterb.* 273. *Tab.* 29. F. Lycoperdon vulgare, *El. Bot.* 441. *Tourn. Inst.* 563. *Buxb.* 201. Bovista Officinarum, *Dill. Cat.* 196. **Puff-balls, Bull-fists, Polli-puffs.** In pascuis ubique ferè in Autumnno invenitur. *Usu.* Integræ plantæ. *Vires.* Siccat & astringit, unde vulneribus inspersus sanguinem sistit, ulcera inveterata desiccatur, hæmorrhoidum fluxum cohibet: Oculis tamen inimicus censetur, *R. H.* p. 105. Pulvis est summum remedium contra Hæmorrhagiam, *Boerb.*

A. 3. Lycoperdon maximum, *Offic.* Lycoperdon Alpinum maximum, *El. Bot.* 441. Lycoperdon Alpinum maximum, cortice lacero, *Tourn. Inst.* 563. Fungus maximus rotundus, pulverulentus dictus, Germanis **Pfo-fist**, J. B. iii. 848. *Raii Hist.* i. 105. *Synop.* 16. *Hist. Oxon.* iii. 641. Fungi rotundi orbicularis secundum genus, C. B. 375. Fungorum noxiorum 26 generis 2 species, *Sterb.* 270. *Tab.* 28. C. Bovista maxima alba, *Dill. Cat.* 196. **Great-dunp-Pushrome.** In pinguioribus pascuis, & ad fimeta reperitur.

Ufu. Planta integra. Caput humanum magnitudine interdum æquat. *Vires.* Ad compescendas sanguinis eruptiones etiam periculosissimas commendatur: in quem usum tonsores eos adservare multis Germaniæ in locis observavit *Clusius*.

A. 4. Boletus, *Offic.* Tubera Cervina, *C. B.* 376. *Park.* 1320. *Hist. Oxon.* iii. 638. Tubera perniciofa terrestria five cervina, *Sterb.* 315. *Tab.* 32. B. Tuberum genus quibusdam Cervi Boletus, *J. B.* iii. 851. *Raii Hist.* i. 111. Cervi Boletus, *Chab.* 591. **Deersballs.** E terra effodiuntur. *Ufu.* Integra planta magnitudine Juglandis, inæqualis, externè cineraceo colore, internè ex albo purpurascens, gustu grato. *Vires.* Rari usûs est, nec adhibetur, nisi quod nonnulli ad libidinis stimulum, lactisque incrementum eum commendent. Extrinsecus commendatur ad uterinas ascensiones compescendas, & partûs difficultatem, *Schrod.*

A. 5. Auricula Judæ, & Fungi Sambuci, *Offic.* Fungus membranaceus auriculam referens, five Sambucinus, *C. B.* 372. *Raii Hist.* i. 106. *Synop.* 18. Fungus membranaceus auriculam referens, *Hist. Oxon.* iii. 642. Fungus Auriculæ Judæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambuci caudice nascens, *J. B.* iii. 840. Fungus Auriculæ Judæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, *Chab.* 588. Fungus Sambucinus, five Auricula Judæ, *Ger. Emac.* 1481. Fungus Sambuci, vel Auricula Judæ, *Sterb.* 256. *Tab.* 27. H. Fungus Sambucinus, *Park.* 1320. Agaricus Auriculæ formâ, *El. Bot.* 441. *Tourn. Inst.* 562. *Boerb. Ind. A.* 14. *Buxb.* 7. Agaricum Auriculæ formâ, *Mich. Nov. Gen.* 124. *Tab.* 66. 1. *Peziza* auriculam referens, *Dill. Cat.* 195. **Jew's Ear.** Est imi trunci veteris excrefcentia spongiosa, lævis, coriacea, & membranacea, auriculæ instar, subtus incana & cinerea, supra nigricans, saporis terrei, & aquei, odoris nullius. *Ufus* est integræ plantæ. *Vires.* In lacte decoctus, aut aceto maceratus, in Angina, aliisque oris aut gutturis tumoribus aut inflammationibus exhiberi solet ad gargarisandum, aut guttur eluendum. *R. Cat.* pag. 22. Inhibet motum sanguinis, ergo astringit.

A. 6. Agaricus, *Ger.* 1183. *Emac.* 1366. *Sterb.* 245. *Tab.* 27. C. Agaricus, five Fungus Laricis, *C. B.* 375. *Elem. Bot.* 441. *Tourn. Inst.* 562. Agaricus ex Larice, *Park.* 249. Agaricum, *J. B.* i. 268. *Raii Hist.* i. 107. **Agarick.** Est trunci Laricis excrefcentia fungosa, ex rotundo an-

gulosa, inæqualis, pugni magnitudine, substantia internè candidissima, levissima, friabili, paucis fibris intertexta, ex cortice calloso, cinereo subrufo, cui inclusa exempta. Vel Notæ optimi Agarici hoc disticho continentur:

*Res frangi præsto pretiosus Agaricus esto,
Candidus & splendent, bonus in libra leve pendens.*

Optimus habetur hodie qui in sylvis Tridentinis & Noricis oritur. Non, ut reliqui Fungi, nocte unâ prodit, sed annum integrum ad sui perfectionem requirit. *Ufu* est integra planta. *Vires.* Purgat pituitam, præcipuè crassam & lentam, & bilem utramque. Corrigitur cum Zingib. Caryophyll. Sal. Gemm. Crystall. Tart. &c. *Præp.* Agaric. Troch. Pil. de Agarico. Vide plura apud *Bellonium de Arbor. Conif. & Campegium in Gall. Pentapharm.*

A. 7. Fungus typhoides coccineus, *Offic.* Fungus typhoides coccineus Melitenfis, *Bocc. Plant. rar.* 80. *Raii Hist.* ii. 1851. Fungus Melitenfis ejusd. *Mus. di Fisica* 56. *Tab.* 4. Fungus typhoides coccineus tuberosus Melitenfis, *Ejusd.* 69. Fungus typhoides Lubernensis, *Filli Hort. Pisan.* 64. *Cynomorion* purpureum *Officinarum, Mich. Nov. Gen.* 17. *Tab.* 12. **Scarlet Mushrome.** In scopulo Melitæ Insulæ adjacentē invenitur. Astringit maxime, unde ei præcipua laus in cohibendo sanguinis profluvio; cujus in pulverem soluti scrupulum aut amplius in vino aut jusculo dilutum hauriunt, *Bocc.*

A. 8. Phalloides, *Offic.* Fungus phalloides, *J. B.* iii. 843. *Chab.* 388. *Raii Hist.* i. 103. *Synop.* 15. Fungus virilis penis effigie, *Ger. Emac.* 1583. Fungus foetidus, penis imaginem referens, *C. B.* 374. *Hist. Oxon.* iii. 640. Phallus Hollandicus, *Park.* 1322. Phallus Adriani Junii, *Sterb.* 277. *Tab.* 30. A. Boletus phalloides, *Tourn. Inst.* 562. *Buxb.* 41. *Vires.* Magnæ esse utilitatis in serventi & intolerabili artuum cruciatu refert *Adrian Jun.* A Rusticis in Saxonia externè applicatur in artuum cruciatibus, *Buxb.* 41.

A. 9. Tubera, *Offic.* *C. B.* 376. *J. B.* iii. 849. *Chab.* 591. *Raii Hist.* i. 110. *Synop.* 20. *Sterb.* 308. *Tab.* 32. A. *Hist. Oxon.* iii. 638. Tubera Matthioli, *El. Bot.* 442. *Tourn. Inst.* 565. Tubera terræ, *Ger.* 1385. *Emac.* 1583. Tubera terre edibilia, *Park.* 1319. **Truffles or Trubs.** E terra effodiuntur. *Ufu.* Integra Planta magnitudine varia, tuberculis extantibus inæqualis, externâ

ternâ facie rugosâ, nigrâ, internâ substantia alba, gustu sativo, odore nonnihil gravi, *Vires*. Venerem stimulant, cocta & pro Emplastro imposita Anginosis profunt. Vascula seminalia in Tuberibus Terræ observavit D. *Tancredus Robinson*, M.D. viginti abhinc annis. Vid. *Transact. Phil.* In iusculis & acetariis frequens eorum usus.

In Italia Tubera terræ quærendi & colligendi modo ridiculo utuntur. Porcellum scilicet in pascua, ubi eorum proventus est, agunt, qui odore inventa rostro eruit; eumque insequitur quidam, qui aruta colligit.

VII. De Musco.

Musculus autem, quamvis res notissima sit, ejusque species ab unoquoque primo statim aspectu agnoscantur, non tamen ita facile est eam definire, aut generalem aliquam descriptionem cudere, quæ omnibus Muscis & solis conveniat. Solent autem Musci censeari aridiores illæ & exsuccæ, plerumque decolores, substantiæ, quæ oriuntur vel in epacis, vel in muris, tectis, arboribus, petris, aliisque locis sterilibus, immodice frigore aut calore perussis, aut etiam siccis, & squalidis, in quibus plantæ perfectæ non provenire, nec durare possunt; aut saltem plantis perfectioribus minus commoda & propitia sunt, R. H. p. 112.

A. 1. Muscus, *Offic.* Muscus Ufnea, *Chab.* 559. Muscus arboreus: Ufnea Officinarum, C. B. 361. *Raii Hist.* i. 114. *Synop.* iii. 64. Muscus arboreus villosus, J. B. iii. 763. *Synop.* 22. Muscus arboreus vulgaris & Quercinus, *Park.* 1372. Muscus Quernus, *Ger.* 1369. *emac.* 1558. Conserva arborea cinerea vulgaris longa, *Dill. Cat.* 200. Musco fungus arboreus vulgaris comosus cinereus, *Hist. Oxon.* iii. 635. Lichen arboreus villosus, *Buxb.* 189. **Hairy Tree-Moss.** Ex arboribus adultis villi dependent incani, lignosi, tenuibus contexti filis, gustu adstringente. In Anglia rarior est. *Usu.* Integra planta. *Vires.* Muscus omnis astringit, *Schred.*

A. 2. Muscus pulmonarius *Offic.* C. B. 361. Muscus arboreus pulmonarius, *Raii Hist.* i. 116. *Synop.* 22. Muscus pulmonarius sive Lichen arborum, *Park.* 1313. Lichen arborum, *Ger.* 1377. *Emac.* 1566. Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea, J. B. iii. 759. *Mich. Nov. Gen.* 86. *Tourn. Inst.* 549. *Boerb. Ind. A.* 17. *Buxb.* 188. Lichen arboreus sive Impetigo Morbus, & Mentagra quædam, atque Pulmonaria arborea fungosa, *Aldrov. Dendr.* 176. Pulmonaria, Lichen arbo-

reus, *Chab.* 558. Lichenoides peltatum arboreum maximum platyphyllum, *Dill. Cat. Giff.* 208. *Raii Synop.* iii. 76. Musco-fungus arboreus platyphyllus ramosus è viridi fuscus, *Hist. Oxon.* iii. 634. **Tree Lungwort, Oak Lungs.** Est planta imperfecta, muscosa, conflata quasi ex foliis latis coriaceis, rugosis invicem incumbentibus, supernâ parte viridantibus, internâ albicantibus, saporis terrestris & astringentis. Arboribus, præsertim Quercui, adnascitur. *Usu.* Integra planta. *Vires.* Siccatur & astringit, unde sanguinem profluentem compefcit, vulnera recentia glutinat, alvum ac menses sistit. Utuntur eâ vulgò ad Pulmonum affectiones, &c. Vide plura apud *Fallopium de Musco*, & *Ephem. German.*

A. 3. Muscus pyxidatus, *Offic. Ger.* 1371. *Emac.* 1560. *Rand. Ind.* 59. *Park.* 1308. J. B. iii. 767. *Raii Hist.* i. 113. Muscus pyxoides, C. B. 361. *Prod.* 152. Musco-fungus pyxidatus vulgarior minor, *Hist. Oxon.* iii. 632. Lichen pyxidatus major, *Tourn. Inst.* 549. *Mich. Nov. Gen.* 82. *Boerb. Ind. A.* 18. *Buxb.* 190. Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum, *Dill. Cat.* 204. *Raii Synop.* iii. 68. **Cup-Moss.** In aridioribus. *Usu.* Integra Herba. *Vires.* In Tussi convulsivo puerorum specifica æstimatur.

A. 4. Lichen cinereus, *Offic.* Lichen cinereus terrestris, *Raii Cat. Angl.* 185. *Hist.* i. 117. *Synop.* ii. 23. *Buxb.* 188. *Ind. Med.* lxvii. *Pluk. Almag.* 216. *Vaill. Plant. Explicat. Tab.* xxi. Fig. 16. Lichen Pulmonarius maximus, a cinereo rufescens, inferne subrufus, receptaculis florum rubris, plano-orbiculatis, *Mich. Plant. Gen.* 84. Lichen Pulmonarius, saxatilis, rufescens, superne planus, inferne reticulatus, *Tourn. Inst.* 549. *Hist. Par.* 483. Lichen Pulmonarius saxatilis digitatus, *Vaill. Bot. Par.* 116. Lichen pulmonarius, saxatilis digitatus major cinereus, *Rup. Fer. Jen.* 297. Lichen maritimus, *Boerb. Ind. A.* 16. Lichenoides peltatum terrestre cinereum majus, foliis divisis, *Dillen. Cat. Giff.* 208. *Raii Synop.* iii. 76. *Mart. Edit.* ii. 77. Musco-fungus terrestris latifolius cinereus Hepaticæ facie, *Hist. Oxon.* iii. 632. Muscus terrestris Hepaticæ facie vulgò **Ground-Liverwort.** In pascuis siccioribus non infrequens reperitur. *Usu.* Tota planta. *Vires.* Adversus morsum Canis rabidi egregium est medicamentum.

A. 5. Lichen arboreus pullus, *Offic.* Lichen crustæ modo arboribus adcrefcens pullus, *Tourn. Inst.* 548. *Boerb. Ind. A.* 16. Lichenoides crusta foliosa scutellata, pullus, *Dillen. Cat. Giff.* 206.

Raii Synop. iii. 72. Muscus crustæ aut Lichenis modo arboribus adnascens, *Ejusd. Synop.* i. 14. ii. 23. *Hist.* i. 16. Musco-fungus, lichenoides minor vulgaris pullus, *Hist. Oxon.* iii. 634. **Tree-Liverwort.** Ad arbores. *Usu.* Tota planta. *Vires.* Hæc pro specie Pulmonariâ arboreâ usurpatur. Omnes hæc plantæ habent vim calefacientem, roborantem, & paulo adstringentem; hinc ubi roborantia requiruntur, hæc data in Hæmorrhagiis conveniunt; dicitur esse optimum remedium in Asthmate & tussi inveterata, *Boerh. Hist. Plant.*

VIII. De Lenticularia.

Nativitas in aqua, atque in ejus superficie sedes; habitus totus simplex foliaceus: Radiculae tenues, capillares, pellucidæ, Boerh. Ind. A. 19.

A. Lens palustris, *Offic. Ger.* 680. *Emac.* 829. *Rand. Ind.* 51. *Raii Synop.* iii. 129. *J. B.* iii. 784. *Chab.* 566. *Raii Hist.* i. 117. Lens palustris vulgaris, *Hist. Oxon.* iii. 619. Lens palustris sive aquatica vulgaris, *Park.* 1262. Lenticula palustris vulgaris, *C. B.* 362. *Boerh. Ind. A.* 19. *Dill. Cat.* 105. *Buxb.* 184. Lenticularia minor monorrhiza foliis subrotundis utrinque viridibus, *Mich. Nov. Gen.* 16. **Ducks-Weat.** In aquosis frequens. *Usu.* Integra planta. *Vires.* Vis ei refrigerans, unde inflammationibus, Podagræ, & Ignibus sacris convenit. Agglutinat etiam in pueris Hernias intestinorum, *Matth.* De flore & semine hujus plantulæ, vide *Dill. Append.* p. 118.

SECTIO SECUNDA.

Herbæ semine minutissimo & nudis oculis vix conspicuo.

Herbæ semine minutissimo sunt vel eodem

Caulibus ipsis aut pediculis privatis innascente infidentibus: Hujus generis sunt vel

- Imperfectiores superficie perenni,
 - Caulis carentes, foliis in superficie terræ repatricibus latè se diffundentes, pediculis semina sustinentibus è foliis enatis: *Lichen*
- Cauliferæ,
 - Majores, semina in spicis clavas referentibus producentes: *Licopodium.*
 - Minores vasculi feminalibus.

a b

a b

Caulis terminantibus: *Polytrichum aureum.*

E lateribus caulium egredientibus: *Muscus.*

Perfectiores, superficie annua

Monophyllæ,

Spicatæ, folio integro simplici: *Ophioglossum.*

Paniculatæ, folio è multis segmentis composito: *Lunaria.*

Polyphyllæ, foliis teretibus, caules ad nodos in orbem ambientibus multis, radiorum in modum; foliis & caulibus pyxidatim articulatis: *Equisetum.*

Foliis averfis adnascente; foliis

Integris & indivisis, oblongis,

Nullis ad basin folii sinu *Phyllitis.*

Sinu in basi uniuscujusque ad pediculum fuscato: *Hemionites.*

Pinnatis aut laciniatis, simplici divisurâ,

Majores, folio

Breviore & latiore, radice purgatrice:

Polypodium.

Longiore & angustiore: *Lonchitis.*

Minores, folio

Crassiore laciniato dentato: *Scolopendria.*

Tenuiore pinnato: *Trichomanes.*

Surculosis aut semel duntaxat subdivisis

Majores, pinnis brevibus dentatis: *Filix Mas.*

Minores, pinnis

Densus dispositis angustioribus, pediculis brevibus aut nullis infidentibus, filici mari similis: *Dryopteris.*

Rarius dispositis, latioribus, & obtusioribus pediculis longiusculis

Tenuibus, nigris, foliis tenuioribus:

Capillus Veneris.

Crassioribus & viridioribus: *Adiantum album.*

Ramosis aut bis subdivisis

Majores; pinnulis non dentatis, seminibus

Averfæ foliorum parti adnascantibus: *Filix Fœmina.*

In furculis in summitatibus foliorum congestis, palustrium alumnæ: *Ofmunda Regalis.*

Minores; pinnulis crassioribus, longioribus, & angustioribus: *Adiantum Nigrum.*

I. De