

licula fontana major five Adiantum album folio Filicis, C. B. Pin. 358. Chomel. 83. Tourn. Inst. 542. Elem. Bot. 432. Boerb. Ind. A. 26. Rupp. Flor. Jen. 278. Buxb. 113. Dryopteris alba, Ger. Emac. 1135. Park. Theat. 1041. **White Daks Fern.** In rupibus & montosis. Ufu. Herba. Vires. Cum reliquis Adianthis convenit virtutibus, quibus pro succedaneo est.

XIII. De Agno Scythico.

Agnus Scythicus, Offic. Agnus Scythica Borometz, J. B. i. 406. Chab. Append. 598. Agnus Tartaricus, Art. Philos. Lond. N. 247. p. 461. Agnus Scythicus vegetabilis Boramitz dictus ex Museo Breyniano, Ejusd. N. 390. Frutex Tartaricus, C. B. 512. Planta-Animal seu Borometz, Agnus Scythicus, Park. Theat. 1618. **The Scythian or Tartarian Lamb.** Ex China & Tartaria allata est. Ufu. Lanugo Poco Sempie Offic. Golden Hops. Mus. Reg. Soc. p. 386. Colore est lutescente obscuro, unam circiter quartam unciae longa, serici instar splendens. Vires. Adversus Haemoptysin usurpatur. Dos. Sex grana. Tres autem doses curationem perficere traduntur. D. Brown apud Chineses in frequenti usu esse refert ad sanguinem è vulneribus recentibus fluentem sistendum, quemadmodum apud nos Araneorum telae.

Non opus est ut hic repetam mirabilem & fabulosam historiam hujus plantae, quae à Dureto, Scaligero, aliisque eorum sequacibus traditur. Sufficiat dixisse, quod in arcula rariorum Chinesum ad Regiam Societatem Londin. missa inerat, quod plus pedem longa erat, carpum humanum crassa, protuberantiis variis inaequalis, & propè extremum pediculos quosdam emittens 3 aut 4 uncias longos filicino cauli exactè similes, lanugine praedicta obtectos. Similitudo, quam obtinet cum Filicibus quibusdam arboreis Jamaicensibus fecit, ut hic tantisper eam collocem, donec pleniorum ejus cognitionem & historiam consequar; qui plura desiderat, adeat Dissertatiunculam de Agno vegetabili Scythico, &c. Trans. Philos. Lond. N° 390. p. 353.

SECTIO TERTIA.

De Herbis flore imperfecto seu stamineo.

Florem imperfectum voco, quicumque foliis illis tennellis, fugacibus, coloratis caret, quae nos petala dicimus, adeoque solo calyce & staminibus componitur. Sub staminibus etiam stylum comprehendimus, quo paucissimi flores carent, R. H. p. 154.

Herbae flore imperfecto seu stamineo sunt vel

Sexu distinctae vulgò dictae, hoc est, in quibus ab ejusdem plantae semine editis, aliae flores absque semine producant, aliae semine foecundae sunt; suntque vel

Scandens, fructibus squamosis, in racemos congestis amaris: *Lupulus*.

Erectae; feminibus

Solitariis, h. e. ad singulos flosculos singulis foliis

Ex adverso binis

Integris spinulis urentibus minax: *Urtica*.

Digitatis, è cujus corticibus linteamina fiunt: *Cannabis*.

Alternatim nascentibus, feminibus nunc muricatis, nunc laevibus: *Spinachia*.

Binis cohaerentibus testiculorum fere in modum: *Mercurialis*.

Sexu carentes, in quibus ab eodem specie semine editis nulla ejusmodi diversitas observatur; suntque vel semine

Flori conjuncto seu contiguo

Rotundo aut paululum compresso aliisque cujuscunque figurae praeter triquetrum; hae vel sunt flore florisque calyce

Sedi seu basi feminis fructusve cohaerente, semine vel

Nudo, nullo scilicet praeter calycem vasculo clauso,

Quinquifido: *Chenopodium*.

Trifido: *Blitum*.

Flosculo à Perianthio distincto incluso, herba in parietinis & rudibus nascente: *Parietaria*.

Vasculo à flore distincto protecto, eoque vel

a b c

Bivalvi,

a b c

Bivalvi, è duobus laminis seu valvulis
corniventibus tantum, non cohæ-
rentibus composito: *Atriplex*.

Subrotundo, membranaceo, undique
clauso, quod per maturitatem hori-
zontaliter rumpitur, feminibus in
singulis vasculis singulis; comâ spe-
ciosâ & immarcescibilis: *Amaran-
thus*.

Summo femini aut fructui innascente, vel

Vasculo incluso

Verrucoso, osseo, in spicis prælongis,
angustis, folio lato, glabro, radice
esculenta: *Beta*.

Molliore & Membranaceo, nullis ver-
ruculis scabro

In sex loculamenta diviso, foliis
rotundis crassis, duris Hederæ:
Asarum.

Simplici, nec diviso in cellulas,
striato, flosculis & feminibus

In summis caulibus & ramulis
foliis subrotundis eleganter cre-
natis: *Alchymilla*.

Ad latera caulium è foliorum
alis exeuntibus feminibus

Cochleatis: *Kali*.

Oblongis: *Campborata*.

Ovato-acuminatis: foliis vel

Integris: *Herniaria*.

Dissectis: *Percevier*.

Nudo, foliis angustis: *Knawell*.

Triquetro, vel

Lucido seu splendente; lateribus atque etiam
angulis

Æqualibus, florum calycibus

Hexaphyllis; foliis mollibus: *Lapa-
thum*.

Pentaphyllis; in spicas dispositis

E foliorum alis egressas: *Fegopyrum*.

In summis caulibus radice intorta:
Bistorta.

Quadriphyllis, in aquosis nascens: *Po-
tamogiton*.

Inæqualibus, foliis Perficæ, flosculis tetra-
phyllis in spicas congestis: *Perficaria*.

Non splendente

Minor floribus pentaphyllis in foliorum sinibus,
cauliculis, crebris geniculis interceptis, foliis
parvis angustis: *Polygonum*.

a

In eadem planta à flore aliquantulum remoto
fructu echinato aut aspero

Monospermo, foliis laciniatis: *Ambrosia*.

Bina intus femina claudente foliis subrotundis:
Xanthicum.

Tricocco, foliis

Apetalis: *Ricinus*.

Rosaceis: *Ricinoides*.

I. De Lupulo Salictario.

NOTÆ Lupuli characteristicæ sunt caules volu-
biles, fructus squamosi in racemis laxis, Raii
Synop. p. 28.

A. Lupulus, Offic. Lupulus mas & femina, C.
B. 298. J. B. ii. 151. Chab. 121. Raii Hist. i.
156. Synop. 52. Tourn. Infl. 535. Boerb.
Ind. A. ii. 104. Dill. Cat. 152. Buxb. 198.
Lupulus sativus & sylvestris, Park. 176. Lupus
Salictarius, Ger. 737. Emac. 884. Convolvulus peren-
nis heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliace-
is, strobili instar, Hist. Oxon. ii. 37. Vops. In
sepibus. Floret Julio vel Augusto. Ufu. Folia,
flores, & turiones. Vires. Flores amari saporis,
anodynique sunt, & discutunt. Usus præcipue in
obstructione Lienis ac Hepatis, & inde in Ictero,
in hypochondriacis affectibus, &c. Ciet Menfes
& Urinam. Extrinsicus sedat dolores, auxilia-
tur contusionibus, luxationibus, tumoribus. Tu-
riones mundificant sanguinem, adeoque à Scabie
præservant, Schrod.

II. De Cannabe.

NOTÆ bujus characteristicæ sunt folia digitata,
corticis filamenta valida & tenacia, ad funes
& linteamina texenda idonea, R. Synop. p. 28.

A. Cannabis, Offic. Chab. 478. Ger. 512.
Cannabis sativa, C. B. 320. Hist. Oxon. iii. 433.
Park. 597. Raii Hist. i. 158. Synop. 53. Boerb.
Ind. A. ii. 104. Tourn. Infl. 535. Buxb. 53.
Cannabis, mas & femina, J. B. iii. 447. Ger.
Emac. 708. Hemp. Seritur in agris. Ufu. Se-
mina subrotunda, parva, quæ sub tenui cortice
ex cinereo spadiceo lucido includunt medullam
albidam, sapore subdulci. Vires. Semen genitale
imminuit, usu continuato; Tussi opitulatur,
Ictero subvenit; & caput vaporibus replet,
Schrod.

A. 2. Bangué, *Offic. Park.* 1624. *Garz. ab Hort.* 233. *C. à Costa* 290. *Raii Hist.* i. 159. Bangué Cannabi simile, *J. B.* iii. 440. Cannabis Indica trifoliata, sive Bangué Indorum, *Pluk. Almag.* 80. *Phytog.* 273. Cannabis peregrina gemmis fructuum longioribus Bangué dicta, *Hist. Oxon.* iii. 433. Cannabi similis exotica, *C. B.* 330. *Com. Flor. Mal.* 68. Althææ alia species foliis Cannabinis à Garzia ab Horto Bangué dicta, *Herm. Hort. L. Bat.* 26. Kalengi Cansjava, *H. M. Tom.* x. 119. Tab. 60. Tsyeru-Cansjava, *ejusd.* 121. Tab. 61. **Bang.** In Insula Zeilania succrevit. *Ufu.* Fragmenta foliorum cum pediculis suis, & semina splendentia cinerei coloris, magnitudine & forma Cannabis feminum. *Vires.* Infatuat, ut Opium, somnum conciliat; multi autem affirmant, ad libidinem ciendam, & Venerem stimulant magnæ esse efficacæ. Verum enimverò, nostrâ sententiâ, perniciofa est planta, & non sine periculo sumenda.

Qui plura desiderat de hac Indica Cannabe, adeat Tomum decimum *Hort. Malab.*

III. De Urtica.

Folia integra, spinulis urentibus minax, *R. Method.* p. 65.

A. 1. Urtica, *Offic.* Urtica vulgaris, *Chab.* 478. Urtica racemifera major perennis, *Raii Synop.* 54. Urtica major vulgaris, *J. B.* iii. 445. *Raii Hist.* i. 160. *Dill. Cat.* 91. *Buxb.* 341. Urtica major vulgaris & media sylvestris, *Park.* 440. Urtica urens, *Ger.* 570. *Emac.* 706. Urtica urens maxima, *C. B.* 232. *Hist. Oxon.* iii. 434. *Tourn. Inst.* 534. *Boerb. Ind. A.* 2. 105. **Common Stinging Nettles.** Ad sepes, & in locis ruderatis. In *Ufu* sunt Radix longa lutea, folia, & semina parva compressa, spadicea, quibus sapor subacris & tenuis. *Vires.* Diuretica & Lithontriptica est; Sanguinem depurat, Hæmoptys, Hæmorrhag. & Menses sistit: peculiariter Cicuta adversatur, ut & Hyoscyamo.

A. 2. Urtica Romana, *Offic.* Urtica pilulifera, folio profundius Urticæ majoris, in modum ferrato, semine magno Lini, *Raii Synop.* 54. Urtica pilulifera facie Urticæ vulgaris, semine Lini, *Hist. Oxon.* iii. 435. Urtica Romana, *Ger.* 570. *Emac.* 706. *Park.* 440. *Raii Hist.* i. 161. Urtica urens, pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine Lini, *C. B.* 232. *Tourn. Inst.* 534. *Boerb. Ind. A.* 2. 105. *Buxb.* 341. Urtica Romana sive mas

cum globulis, *J. B.* iii. 445. *Chab.* 478. **Roman Nettles.** In arenosis. *Ufus.* Semina ferè orbicularia, compressa, lævia, splendentia, è spadiceo nigricantia, saporis subacris, cum quadam tenuitate. *Vires.* *Ufus* crebri est in Pulmonum affectibus, Asthmate, Tussi contumace, Pleuritide, Peripneumonia, *Schrod.*

IV. De Spinachia.

NOTÆ genericæ sunt: Planta tota glabra, & immoxia, foliis singulatim alterno ordine positis, seminibus in nonnullis plantis muricatis, *R. H.* pag. 162.

A. Spinachia, *Offic. Ger.* 260. *Emac.* 330. *Raii Hist.* i. 162. Spinachia sive Spinacia, *Chab.* 330. Spinachia sive Olus Hispanicum, *Park. Parad.* 496. Spinachia vulgaris capsula seminis aculeata & sterilis, *El. Bot.* 425. *Tourn. Inst.* 533. *Boerb. Ind. A.* i. 103. *Buxb.* 311. Spinachia mas & femina, *J. B.* ii. 963. Spinachia femine spinoso, & non spinoso, *Hist. Oxon.* ii. 598. Lapathum hortense, seu Spinachia femine spinoso, *C. B.* 114. **Spinache.** In hortis feritur. In *Ufu* sunt folia seu herba: culinaris potissimum est. *Vires.* Laxat alvum, lenit asperitatem Pulmonum, refrigerat Ventriculum, ac Hepar. Continuus usus melancholicum generat sanguinem, *Schrod.* Febricitantibus & Senibus astrictione alvi commendatur *S. Pauli.* In omni penè ægritudine pro cibo deligi potest. Extrinsecus Ventriculo & Hepati imposita Cataplasmatibus instar, eorum inflammationes, doloremque tollere creditur, *Raii Hist.*

V. De Mercuriale.

Ujus notæ, Folia in caule bina opposita, per margines crenata, Florum calices triphylli, Fructus in semina didymi, i. e. bini conjuncti, singuli singula semina continentes. Calices triphylli etiam in semina fructui subsunt, *R. Meth.* p. 20.

A. 1. Mercurialis, *Offic. Schrod.* iv. 102. Mercurialis mas, *Pharm. Edinb.* 12. Mercurialis mas & femina, *Ger.* 262. *Emac.* 332. *Park.* 295. *J. B.* ii. 977. *Chab.* 307. *Raii Hist.* 163. Mercurialis annua glabra vulgaris, *R. Synop.* 54. Mercurialis testiculata sive mas Dioscoridis & Plinii, *C. B.* 121. *Hist. Oxon.* ii. 612. *Tourn. Inst.* 534. *Boerb. Ind. A.* 2. 106. *Buxb.* 215. Mercurialis spicata sive femina Dioscoridis & Plinii, *ejusd.* **French Mercury.** In hortis & locis incultis reperitur. Æstate floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Cal-

Calfacit, & siccit, abstergit, alvum movet, bilem ac aquas purgat. Extrinsecus vulvæ adhibita Menses & Secundinas trahit; tumores emollit; creberrimi usus est in clysteribus, *Schrod.* Hæc à *Knanthio* male cum sequenti confunditur.

A. 2. *Cynocrambe*, *Offic. Ger.* 263. *Emac.* 333. *Cynocrambe* mas & femina, five *Mercurialis repens*, *J. B.* ii. 979. *Cynocrambe* five *Mercurialis repens*, *Chab.* 308. *Cynocrambe* mas & femina, *Raii Hist.* 163. *Mercurialis perennis repens* *Cynocrambe dicta*, *Synop.* 53. *Mercurialis sylvestris* *Cynocrambe dicta vulgaris*, *Park.* 295. *Mercurialis sylvestris perennis* *Cynocrambe dicta*, *Hist. Oxon.* ii. 613. *Mercurialis montana testiculata & spicata*, *C. B.* 112. *Dill. Cat.* 37. *Tourn. Inst.* 534. *Boerb. Ind. A.* 2. 106. *Buxb.* 215. **Dog's Mercury.** In sylvis & sepibus. Vere floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Hæc quamvis *Prævio*, *Morisono*, aliisque, eandem cum præcedente vires obtinere dicatur; effectus tamen, quos in nonnullis propè *Salopiam* eam comedentibus produxit, eam soporiferæ & malignæ qualitatis participem esse convincunt. Planta est venenata; male itaque pro *Officinarum Mercuriali* hanc offert *Rahfeld* in *Hodego suo Botanico*, p. 23. *Buxb.*

Quænam planta sit *Cynia* seu *Cynocrambe Dioscoridi dicta*, *Botanici certant*, & adhuc sub iudice lis est. *Cæsalpinus* *Atriplicis* speciem esse vult. *C. Bauhinus* *Parietariæ*. *Lonicerus* ad *Apocynum* eam refert. *Matthiæ* ad plantas quas hic exhibeo, quæ quidem cum *Dioscoridis* descriptione aliquid conveniunt, præsertim semina.

A. 3. *Phyllon*, *Offic.* *Phyllon Arrhenogonon* & *Thelygonon*, *Chab.* 308. *Phyllon Arrhenogonon* & *Thelygonon* folio incano *Monspessulana*, *J. B.* ii. 981. *Phyllon Thelygonon*, *Ger.* 263. *Phyllon Arrhenogonon* five *marificum*, & *Thelygonon* five *feminificum*, *Ger. Emac.* 333. *Phyllon marificum* & *feminificum*, *Park.* 296. *Raii Hist.* i. 164. *Phyllon testiculatum* & *spicatum*, *C. B.* 122. *Mercurialis perennis maritima incana* *Phyllon dicta*, *Hist. Oxon.* ii. 613. *Phyllon fruticosum incana testiculata & spicata*, *El. Bot.* 425. *Tourn. Inst.* 534. *Boerb. Ind. A.* 2. 106. **Childrens Mercury.** In hortis curiosorum apud nos reperitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Mauritanis ad muliebres morbos magno in usu est, *Clus.* Illius decoctum demorsis à cane rabido commendant aliqui, *Mag-nel.*

VI. De Ambrosia.

FRUËTU echinato monospermo, à flore remoto, foliis laciniatis à reliquis differt.

Ambrosia, *Offic. Ger.* 950. *Emac.* 1108. *Raii Hist.* i. 164. *Chab.* 376. *Ambrosia hortensis*, *Park.* 88. *Ambrosia hortensis lanuginosa*, *Hist. Oxon.* iii. 4. *Ambrosia maritima*, *C. B.* 138. *Tourn. Inst.* 438. *Boerb. Ind. A.* 2. 102. *Ambrosia quibusdam*, *J. B.* iii. 190. *Ambrosia foliis Absynthii odoratis humilior*, *Herm. Hort. L. Bat.* 32. **Dak of Cappadocia.** Apud nos in hortis colitur. *Usu.* Herba. *Vires.* Repellendi & reprimendi facultatem obtinet, *H. Ox.* Vim habet astringentem, inquit *Galenus*. Planta est odoratissima, viribus calidis & aromaticis pollens: hinc inter *Cardiacas* & *Cephalicas* refertur, *Boerb. Hist. Plant.* 569.

Ambrosia à *Dioscoride* in hunc modum describitur: *Puillus frutex est, ramosus, trium palmarum altitudine: foliis Rutæ, circa inum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis, gravidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso suavi: radice tenui sesquipedali.* Cujus descriptionis brevis non levis controversiæ & dissensionis inter Autores occasio fuit. *Nicander*, referente *Anguillara*, pro *Lilii* specie eam habet; *Cordus* ad *Tanaceum* refert; *Lonicerus*, *Lacuna*, aliique ad *Abrotonum*: *Tabernæmontanus* ad *Artemisiam*; *Matthiæ* ad *Nasturtii* genus; *C. Bauhinus*, & sequaces ad plantam hic traditam; quibus & nos potiùs consentimus. *N. B.* *Catalogus Pharmacopœiæ Londinensi* præfixus *Ambrosiam* à *Botrye* non distinguit, sed utramque unius plantæ synonymam facit.

VII. De Xanthio.

CHARACTERISTICÆ sunt flores staminei, inutiles, nec fructui contigui: fructus durus, echinatus, binis intus cellulis bina semina, h. e. in singulis singula continens, *R. H.* p. 165.

A. *Bardana*, *Offic.* *Bardana minor*, *Ger.* 664. *Emac.* 809. *Schrod.* iv. 25. *Schw.* 28. *Lappa minor*, *Xanthium Dioscoridis*, *C. B.* 198. *Xanthium*, *Elem. Bot.* 348. *Tourn. Inst.* 439. *Boerb. Ind. A.* 2. 103. *Xanthium*, five *Lappa minor*, *J. B.* iii. 572. *Raii Hist.* 165. *Synop.* 55. *Chab.* 514. *Hist. Oxon.* iii. 604. *Park.* 1223. *Buxb.* 342. *Marrallumetee Malab. Act. Philo-soph.*

Joseph. Lond. N° 224. p. 318. *Louise-Burr.* Ad rivulos viget Julio & Augusto. *Ufu.* Radix, Lappulæ & Herbar. *Vires.* Gustu est amaro & subacri. Usus præcipuus (secundum *Matthiolum*) in minera lepræ educenda (cum Rhabbarbo exhibetur radix) in Lipothymia. Extrinsecus in Struma, & Tumoribus discutendis (epithema) in capillis luteo colore tingendis. Herba Cancro- rum ardori efficax est extinguendo, *Schrod.*

VIII. De Ricino.

NOtæ sunt caudex lignosus, fructus tricocci muricati, in surculo peculiari racematim ferè dispositi: semen Ricino animalculo simile, *R. H.* p. 166.

A. 1. Cataputia major, Ricinus, *Offic.* Grana- dilla Peruviana, *Pharmacop.* Ricinus, *Ger.* 399. *Emac.* 496. Palma Christi, *Cod. Med.* lxxxviii. Ricinus vulgaris, *C. B.* 432. *J. B.* iii. 642. *Raii Hist.* i. 166. *Hist. Oxon.* iii. 347. *Tourn. Inst.* 532. *Boerb. Ind. A.* 253. Ricinus, Palma Christi, *Chab.* 529. Ricinus sive Cataputia major vulgarior, *Park. Theat.* 182. Nhambu-Guacù Brasiliensibus, *Mar.* 77. Nhambu-Guacù sive Ricinus Americanus, *Pif.* 180. **Mexico Seeds.** Seritur apud Germanos & Gallos. *Ufu.* Nuclei, seu Semen: Fructus oblongi sunt, ova- les, fabâ equinâ minores, includentes sub pelliculâ corticosâ, lividâ, & maculosâ glabrâ nucleum bi- partitum, album, pinguem, saporis subdul. a- cris, nauseosi. *Vires.* Potenter bilem & pituitam, *Linn. & xatro* pellit. Ad necandos vermes in cor- pore humano insigne est remedium. Rarissimi iti- dem usus est. *Harlow in Med. Curios. sub titulo Mexico-seeds.*

IX. De Ricinoide.

FLOS Rosaceus è pluribus petalis in orbem po- sitis constans, calice multifolio insidente, fru- ctus in tres capsulas fissilis, *Tourn. Inst.* pag. 655.

A. 1. Heliotropium tricoccum, *Offic.* *C. B.* 253. *Raii Hist.* i. 165. *J. B.* iii. 606. *Ger.* 265. *Emac.* 335. *Park.* 439. Heliotropium minus quorundam, Heliotropium tricoccum Plinii, verru- caria, *Chab.* 521. Heliotropium tinctorium tri- coccum, *Pluk. Almag.* 182. Ricinus humilis Al- thææ folio, fructu verrucoso rotundo, *Hist. Oxon.* iii. 349. Ricinoides ex qua paratur *Tourn. fol Gal-*

lorum, *Tourn. Inst.* 655. **Turn-sole.** In Gallia Narbonensi Julio & Augusto. *Ufu.* Panno succi intinctus. Ad nos adfertur, & in Officinis Pharma- copolarum ad usum Tinctorum, &c. venditur; in usu Medico occurrit, estque adversus Carcinoma- ta & Ulcera gangrænosa efficacissima, strumososque tumores, *Matth.*

A. 2. Nuces è Barbadoes, *Offic.* Ricinus Ame- ricanus, *Ger.* 399. *Emac.* 496. *Park.* 183. *Raii Hist.* i. 166. Ricinus Americanus major semine nigro, *C. B.* 432. *Hist. Oxon.* iii. 348. Ricinus major Americanus *Curcas* dictus, & Faba purgatrix Indiæ Occiduae, *J. B.* iii. 643. *Chab.* 529. Ricinoides Americana Gossypii folio, *Tourn. Inst.* 656. *Boerb. Ind. A.* 253. Ricinoi- des, seu Pincus purgans, vel Pinhões Indici, *Cod. Med.* xcvi. *Munduy-Guacù*, sive Nux Cathar- tica Americana, *Pif.* 169. *Mundubi Guacù* Bra- siliensibus, Pinhões Lusitanis, mihi Nux Cathar- tica, *Marcg.* 96. *Quauhay-ohuatli* 1. *Avella- na Cathartica*, *Hernand.* 87. **Barbadoes Nuts.** In Insula Barbadoes, & alibi Indiæ Oc- cidentalis crescit. *Ufu.* Fructus est oblongus, o- valis, Fabæ minoris magnitudine, unâ parte con- vexâ, alterâ depressâ, includens sub pellicula corti- cosa duriuscula nigra nucleum candidum saporis præcedentis. *Vires.* Cum Ricino ut facie, ita & viribus convenit.

A. 3. Palma Christi, *Tourn. Mat. Med.* 75. Ricinus Americanus tenuiter diviso folio, *Breyn. Cent.* 116. *Raii Hist.* i. 167. Ricinoides arbor Americana folio multifido, *Tourn. Inst.* 566. *Boerb. Ind. A.* 253. *Avellana purgatrix*, *C. B.* Pin. 418. *Raii Hist.* ii. 1386. *Avellana pur- gatrix Novi Orbis*, *J. B.* i. 322. *Chab.* 22. *Avellanæ purgatrices*, *Park. Theat.* 1621. Nuces purgantes, *Ger.* 1362. *Emac.* 1546. **Purging Nuts.** Americæ incola est. *Ufu.* Nuces colore ex albido. *Vires.* Vehementer purgat.

A. 4. Grana Tiglia & Lignum Moluccense, *Offic.* Lignum Moluccense, foliis Malvæ, fructu Avellanæ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis, *C. B.* 393. Lignum Moluccense Pavana dictum, fructu Avellanæ, *J. B.* i. 342. Lignum Moluccense, *Park.* 1664. Pavana Mo- luccensis, *Jans. Dendr.* 458. Guajapala, Lignum Moluccense seu Pavana, *Herm. Mus. Zayl.* 30. Guajapala, Nepalam, Wajapali. Ricinus arbor Indica caustica purgans, *ejusd.* 15. Pinus Indica nucleo purgante, *C. B.* 492. Pinei nuclei Ma- luccanni sive purgatorii, *J. B.* i. 322. Nuclei Ma-

Maluccani, *Park.* 1641. Quauhayohautli 111. seu semina arboris cucurbitinæ, nuclei Pinus formâ purgante, *Hernand.* 87. Ricinus arbor fructu glabro, Grana Tiglia Officinis dicto, *P. B. P.* 370. Palma Christi Indica, *Tourn. Mat. Med.* 75. Cadel avanacu, *H. M.* ii. 61. *Tab.* 33. *Raii Hist.* ii. 1855. **Purging Puts.** In Malabar & alibi colitur. *Usu.* Lignum spongiosum, leve, rarum, atque pallidum, tenui cortice cinereo obductum, saporis acris, mordacis, & caustici, nauseosi, odoris nullius. Fructus est oblongus, ovalis, Ricini vulgaris magnitudine, unâ parte gibbus, alterâ depressus, colore nigricante, saporis acris, exurentis, & nauseosi. *Vires* utriusque. Calfaciunt, incidunt, attenuant, causticæ sunt naturæ, ergo in Officinis nostris raro in usu occurrunt.

X. De Lapatbo.

NOta, semen triquetrum splendens, flos Hexaphyllos, i. e. sex foliis compositus, quorum tria semen obtegunt, *R. H.* p. 169.

A. 1. Rhaponticum, *Offic. Alpin. Exot.* 187. Rhaponticum Thracicum, *Boec. Mus.* 127. Rhaponticum folio Lapatii majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis, *C. B. Pin.* 116. Rha verum antiquorum, *Ger. Emac.* 393. Rhabarbarum, *Raii Hist.* i. 170. Rhabarbarum Officinarum, *Elem. Bot.* 75. Rhabarbarum fortè Dioscoridis & antiquorum, *Tourn. Inst.* 89. Rhabarbarum rotundifolium verum five Lapathum fativum rotundifolium amplissimum flore albo, vel Rheum antiquorum, *Munt. Herb. Brit.* 192. Rhabarbarum Moscoviticum, *Mont. Plant. Gen.* p. 6. Rhabarbarum Witsoniarum, *Ogilb. Chin.* ii. 680. quoad fig. Lapathum præstantissimum Rhabarbarum Officinarum dictum, *Hist. Oxon.* ii. 577. *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 352. *Boerb. Ind. A.* ii. 84. *Pluk. Almag.* 204. Lapathum exoticum, folio amplissimo instar foliorum Brassicæ, *Rupp. Flor. Jen.* 44. Hippolapathum maximum rotundifolium exoticum, five Rha-ponticum Thracicum, sed veriùs Rhabarbarum verum, *Park. Theat.* 154. **True Rhapontick.** In hortis Botanicis non infrequens. Maio floret. *Nat. Offic. Usu.* Radix, sed rarius. Radix hujus plantæ crassa est, oblonga, ramosa, foris fusca, intus crocea, laxa, & rara, per transversum secta, spiras ostendens, saporis amaricantis, & subastringentis, odoris non ingrati. *Vires.* Vix differt à Rhabarbaro vero, nisi quod hoc acrius sit, minus solidum, magisque cro-

ceum. Respectu facultatum purgantium, Rhabarbaro debilius, astringentium fortior est hæc radix. Vulnerarium, ac Anodynum est. Usus in Diarrhœis, Dysenteriis, Convulsis, Ruptis, Orthopnoicis, ad febres periodicas atque ad morsus venenatos. *Dof.* in pulvere ʒiii. Infusione ʒvi.

An *Rhaponticum* antiquorum & *Rhabarbarum* modernorum sit una & eadem species planta a Botanicis controvertitur (ut rectè observat clarissimus & eruditissimus D. *Raius*) aliis eandem esse affirmantibus, aliis negantibus: Nonnulli etiam sibi non constant, & nunc eandem, nunc diversam affirmant; quorum sententias & rationes vide apud *J. Baubinum* in *Appendice*, Tom. ii. *Hist. Plantarum*, p. 1069. Id tamen hoc in loco cum *Alpino* observabo: Plantam hanc verum esse *Dioscoridis* *Rhaponticum*, à *Rhabarbaro* autem *Officinarum* omnino distinctum.

A. 2. Rhabarbarum, *Offic. J. B.* 11, 989, 1075. *Chab.* 311. *Mont. Exot.* 7. *Ind. Med.* xcvi. *Ger.* 316. *Ogilb. Chin.* i. 212. Rhabarbarum Officinarum, *C. B. Pin.* 116. Rhabarbarum genuinum Officinarum, *Park. Theat.* 156. Rhabarbarum siccatum, *Ger. Emac.* 393. Rhabarbarum lanuginosum five Lapathum Chinense longifolium, *Munt. Herb. Brit.* 196. *Raii Hist.* ii. 1077. Lapathum Bardanæ folio undulato glabro pro Rhabarbaro vero missum, *Rand.* Rhabarbarum seu Rheum Officinarum, *Geoff. Tract.* 296. **True Rhabarb.** Duplex venale prostat: Unum Orientale, ex regno *Chinensi* adfertur, quod ponderosum est, aureis ac rufis venulis præditum, amaricans & adstringens, odoratum, flavo magis colore, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingit, præstantioribus viribus insignitum: Alterum ex *Moscovia*, quod ponderosum est, ac obscurius flavescit, & vilius censetur. Nuper ex *Moscovia* præcipue importatur, & melius est curatum. *Vires.* Purgat benigne bilem flavam, pituitamque viscosam, ac tartaream in Ventriculo, primaque regione stabulantem. Hepati specificè confert, curat Icterus, & quia vim quoque adstringentiam obtinet, in omnibus morbis dissolutis, Dysenteria, Diarrhœa, &c. præ aliis commendatur. In Pueris contra Vermes, & in Morbis Chronicis multum laudatur.

Radix hæc *Dioscoridi* & *Galeno* ignota fuit, unde male quidam *Rheum* eorum cum nostro *Rhabarbaro* confundunt: Nam *Rheum Dioscoridis* minus habet vim purgatricem, & notis veri *Rhabarbari* caret. *Rhabarbarum* enim substantiâ compactum est, ponderosum & aridum, sapore amarum, odore acri,

acri, colore exterius rufefcente, intus ex rufo flavefcente [cum veris aliquot intensioribus] ac mace-
ratum vel manducatum tingens croceo colore. *Rha-*
ponticum non est compactum, sed rarium, non ponde-
rosum, sed leve, non odoratum similiter *Rhabarbaro*,
J. Le Brun.

A. 3. *Hippolapathum*, *Offic.* *Hippolapathum*
rotundifolium, *Ger.* 313. *Emac.* 389. *Hippola-*
pathum rotundifolium vulgare, *Park.* 154. *La-*
pathum hortense rotundifolium five montanum, *C.*
B. 115. *Lapathum* folio rotundo Alpinum, *J.*
B. ii. 987. *Tourn. Inst.* 504. *Lapathum* Alpi-
num folio subrotundo, *Hist. Oxon.* ii. 578. *La-*
pathum domesticum rotundifolium, *Schw.* 289.
An *Rhabarbarum* rotundifolium fimbriatum, *Munt.*
Herb. Brit. 194? **Bastard Monks Rubarb.** In
Hortis. In *Ufu* sunt Radix & Folia. Radix
crassa, oblonga, foris fusca, intus intense flava.
Folia subrotunda, glabra, venosa, saporis subastrin-
gentis. *Vires.* Cum priore convenit. *Mulier-*
culis Botanopolis Londinensibus pro *Rhabarbaro*
Monachorum venditur.

A. 4. *Rhabarbarum Monachorum*, *Offic.* *Hip-*
polapathum sativum, *Ger.* 313. *Emac.* 389. *Raii*
Hist. i. 171. *Lapathum* hortense latifolium, *C.*
B. Pin. 115. *Cod. Med.* lxx. *Boerb. Ind.* A. 2.
85. *Tourn. Inst.* 504. *Lapathum* majus five
Rhabarbarum Monachorum, *J. B.* ii. 985. *La-*
pathum majus five *Rhabarbarum*, *Chab.* 309. *La-*
pathum domesticum, *Schw.* 289. *Lapathum* sa-
tivum five *Patientia*, *Park. Theat.* 154. *Lapa-*
thum sativum antiquorum aut longifolium five *Pati-*
entia, *Munt. Herb. Brit.* 198. **Monks Rubarb.**
In hortis nutritur. *Ufu.* Radix longa, crassa, ra-
mosa, foris rufa, intus crocea. *Vires.* Radix
Rhabarbari Monachorum eandem purgandi facul-
tatem cum vero *Rhabarbaro* habere creditur, modo
in duplo usurpetur.

A. 5. *Lapathum* hortense, five secundum *Diof-*
coridis, *Cod. Med.* lxx. *Lapathum* hortense folio
oblongo five secundum *Dioscoridis*, *C. B. Pin.*
114. *Tourn. Inst.* 504. *Elem. Bot.* 404. *Boerb.*
Ind. A. ii. 84. *Lapathum* sativum lapas, *J. B.* ii.
985.

Eandem cum præcedente suspicat *D. Raius*.

A. 6. *Hydrolapathum*, *Offic.* *Hydrolapathum*
magnum, *Ger.* 312. *Emac.* 389. *Hydrolapathum*
majus, *Park.* 1225. *Lapathum* aquaticum folio
cubitali, *C. B.* 116. *Hist. Oxon.* ii. 579. *Tourn.*
Inst. 504. *Boerb. Ind.* A. ii. 85. *Dill. Cat.* 111.
Buxb. 178. *Lapathum* palustre maximum, *Schw.*

218. *Lapathum* maximum aquaticum five *Hy-*
drolapathum, *J. B.* ii. 986. *Raii Hist.* i. 171.
Synop. 55. *Lapathum* maximum aquaticum, *Chab.*
309. Britannica antiquorum vera five *Lapathum*
longifolium nigrum palustre, *Munt. Herb. Brit.*
150. **Great Water-Dock.** In aquis oritur.
Ufu. Tota planta, sed præcipue radices. *Vires.*
Ictericam discutit, omnia putrescentia, ut *Erysipe-*
lata ulcerata & integra, *Herpetes*, *Phagadenica*,
Gangrænas, &c. inhibet & sanat: *Hæmorrhoidas*
& *Menses* sistit, *Nervis* eorumque incommodis me-
detur. *Venena* ac *Serpentes* abigit. *Omnes An-*
ginæ species depellit, variaque *rheumata* aufert.

Hanc plantam veram & genuinam *Dioscoridis*
Britannicam esse contendit *Muntingius*, siquidem
descriptionibus ejus, inquit doctissimus *D. Raius*,
quæ apud veteres extant, tum facie tum viribus per
omnia respondeat.

A. 7. *Lapathum acutum Oxylapathum*, *Offic.*
Lapathum acutum, *Ger.* 311. *Emac.* 388. *Raii*
Hist. i. 175. *Synop.* 56. *Schw.* 118. *Hist. Ox-*
on. ii. 578. *Lapathum* sylvestre angustifolium,
Schrod. iv. 90. *Lapathum acutum majus*, *Park.*
1214. *Lapathum* folio acuto plano, *C. B. Pin.*
115. *Tourn. Inst.* 504. *Boerb. Ind.* A. 2. 85.
Cod. Med. lxx. *Lapathum acutum* five *Oxylapa-*
thum, *J. B.* ii. 983. *Dill. Cat.* 108. *Munt.*
Herb. Brit. 209. *Buxb.* 177. *Lapathum rumex*,
Lapathum acutum, *Chab.* 508. **Sharp-pointed**
Dock. In humidioribus. *Ufu.* Radix simplex,
crassa, exterius fusca, interius lutea, saporis suba-
stringentis, semina, triquetra & spadicea, saporis
astringentis. *Vires.* Radix usus crebri & præcipui
est in scabie extergenda ac siccanda, sanguine despu-
mando. Internè in *Scorbuto* & *Ictero* commen-
datur. Pulvis feminis hepar roborat, & fluxus alvi
sistit, *Buxb.*

A. 8. *Lapathum sanguineum*, *Offic. Park.* 1226.
Schw. 289. *Lapathum sativum sanguineum*, *Ger.*
313. *Emac.* 390. *Lapathum sanguineum* five
sanguis Draconis herba, *J. B.* ii. 988. *Chab.* 310.
Munt. Herb. Brit. 211. *Lapathum* folio acuto
rubente, *C. B.* 115. *Raii Hist.* i. 174. *Synop.*
56. *Hist. Oxon.* ii. 579. *Boerb. Ind.* A. ii. 85.
Tourn. Inst. 504. *Buxb.* 178. *Cod. Med.* lxx.
Blood-wort. In hortis colitur. Junio floret.
Ufu. Folia, Semen. *Vires.* Folia alvum cient
in jussulo. Semen pulverizatum & in aliquo de-
cocto astringente potum singularem habet effica-
ciam in sistendis nimis mensibus & similibus fluxi-
bus, *Cam.*

At perperam eos omnino facere, qui succum huius Lapathi Sanguinem Draconis Officinarum vel nuncupant vel suspicentur, *Chab.*

XI. De Acetosa.

*S*emen triquetrum splens, flos hexaphyllos, quorum tria semen obtegunt, foliis acidis, *R. H. p.* 169.

A. 1. Acetosa vulgaris, *Oxalis*, *Offic.* Acetosa vulgaris, *Park.* 742. *Raii Hist.* i. 178. Acetosa pratensis, *C. B.* 114. *Hist. Oxon.* ii. 582. *Tourn. Inst.* 502. *Boerb. Ind. A.* ii. 85. *Dill. Cat.* 67. *Buxb.* 4. Acetosa major vulgarissima, *Schw.* 5. Acetosa vulgaris five Rumex camposerinus, *Munt. Herb. Brit.* 221. *Oxalis* seu Acetosa, *Ger.* 319. *Emac.* 396. *Park. Parad.* 486. *Chab.* 311. *Oxalis* vulgaris folio longo, *J. B.* ii. 989. Lapathum acetosum vulgare, *Raii Synop.* iii. 56. **Common Sorrel.** In pratis & pascuis. Æstate floret. *Usu.* Folia succulenta, glabra, acuminata, colore atrovirenti, sapore acido; Radix fibrosa, lutea, sapore astringente; Semina, triquetra, spadicea. *Vires.* Cardiacæ imprimis est & hepatica, resistit putredini, appetitum excitat, choleram reprimat, sitim sedat, unde in febribus simplicibus ac pestilentibus usitatissima est, *Schrod.*

A. 2. Acetosa arvensis, *Offic.* Acetosa minor seu Lujula, *Ind. Med.* 111. Acetosa arvensis lanceolata, *C. B.* 114. *Raii Hist.* i. 180. *Dill. Cat.* 52. *Hist. Oxon.* ii. 584. *Boerb. Ind. A.* ii. 86. *Tourn. Inst.* 503. *Buxb.* 4. Acetosa minor lanceolata, *Park. Theat.* 744. *Munt. Herb. Brit.* 222. Acetosa lanceolata major, *Schw.* 8. *Oxalis* parva auriculata repens, *J. B.* ii. 992. *Chab.* 312. *Oxalis* tenuifolia, *Ger.* 320. *Emac.* 397. Lapathum acetosum repens lanceolatum, *Raii Synop.* 56. **Sheeps Sorrel.** In arvis. *Usu.* Folia. *Vires.* Palato gratior est quam vulgaris, belleque omnia præstat, que illa, *Chab.*

A. 3. Acetosa Romana rotundifolia, *Offic.* *Munt. Herb. Brit.* 224. Acetosa rotundifolia hortensis, *C. B.* 114. *Raii Hist.* i. 180. *Hist. Oxon.* ii. 583. *Boerb. Ind. A.* ii. 86. *Tourn. Inst.* 503. *Buxb.* 4. Acetosa Sabaudica, *Schw.* 214. *Oxalis* Franca seu Romana, *Ger.* 320. *Emac.* 397. *Oxalis* fativa Franca five Romana rotundifolia, *Park.* 743. *Oxalis* folio rotundiore repens, *J. B.* ii. 991. *Chab.* 311. **French Sorrel.** In hortis. *Usu.* Folia. *Vires.* Eadem cum reliquis.

XII. De Fagopyro.

*N*otæ sunt flosculi pentaphylli speciosi, in spiciis è foliorum alis egressis, Semine triquetra cum congeneribus convenit, ejus tamen colore sordidiore & farinâ esculentâ ab iisdem differt, *R. Synop.* p. 58.

A. Fagopyrum, *Offic.* *Raii Hist.* i. 182. *Synop.* 57. *Schw.* 273. Fagopyrum, *Hist. Oxon.* ii. 590. *Volck.* 160. Fagopyrum vulgare erectum, *Elem. Bot.* 412. *Tourn. Inst.* 511. *Boerb. Ind. A.* 2. 88. *Buxb.* 108. Fagotriticum, *J. B.* ii. 993. *Chab.* 312. Tragopyron, *Ger.* 82. *Emac.* 89. *Park.* 1141. Frumentum Saracenicum, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 263. Erysimum Theophrasti folio hederaceo, *C. B.* 27. **Buck-wheat or Blank.** Seritur in agris, Julio floret. *Usu.* Semen triangulum colore sordidum. *Vires.* Minus nutrit quam Hordeum aut Secale, plus tamen quam Panicum & Milium. Pulticulæ ex Psifana & farina facile digeruntur, gignuntque mediocrem sanguinem; Tussibus & difficulter mingentibus profunt, *Schw.*

XIII. De Persicaria.

*F*losculis tetraphyllis in spiciis summos caules terminantibus, à reliquis hujus familiæ distinguitur, *R. Synop.* p. 33.

A. 1. Persicaria non maculata, *Hydropiper*, *Offic.* Persicaria acris five Hydropiper, *J. B.* iii. 780. *Chab.* 564. *Hist. Oxon.* ii. 589. *Dill. Cat.* 166. *Buxb.* 256. Persicaria vulgaris acris five Hydropiper, *Raii Hist.* i. 182. *Synop.* 58. Persicaria urens five Hydropiper, *C. B.* 101. Persicaria vulgaris acris five minor, *Park.* 856. Persicaria minor acris, *Schw.* 154. Hydropiper, *Ger.* 361. *Emac.* 445. Hydropiper Lusitanis crva pulgera, *Marceg.* 25. Potincoba Lusitanis pulgera, *Pisf.* 221. An Schovanna-modela-muccu, *H. M.* xii. 147. *Tab.* 76? **Lakeweed, Arimart, or Water-pepper.** In aquosis. *Usu.* Folia. *Vires.* Extrinsecus in Vulneribus, Tumoribus induratis. Ulceribus inveteratis, *Schrod.* Inter diuretica potentissima est. *Nob. Boylens* Aquam distillatam in calculo laudat. Ad ulcera sordida mundificanda maximè commendat *Theophr.*

A. 2. Persicaria maculata, *Offic.* Persicaria, *Chab.* 564. Persicaria maculosa, *Ger.* 361. *Emac.* 445. *Raii Hist.* i. 183. *Synop.* 58. Persicaria mitis, *J. B.* iii. 779. *Dill. Cat.* 112. Persicaria mitis

mitis maculosa, & non maculosa, *C. B.* 101. *Hist. Oxon.* ii. 588. *Tourn. Inst.* 509. *Boerb. Ind. A.* ii. 87. *Perficaria major mitis*, *Schw.* 154. *Perficaria mitis vulgaris seu maculosa*, *Park.* 856. **Spotted Arsmart.** In aquosis & humidis. Floret Julio & Augusto. *Ufu.* Folia. *Vires.* Subastringens & acerbus est gustu. Inflammationibus incipientibus & recentibus vulneribus prodest imposita, *Schw.*

XIV. De Polygono.

Planta est exigua, caule provoluto, & crebris geniculis nodofo, semine triquetra in foliorum alis, *R. Synop.* p. 33.

A. Centinodium, Polygonum, Offic. Polygonum mas vulgare, *Ger.* 451. *Emac.* 565. *Raii Hist.* i. 184. *Synop.* 59. Polygonum majus, *Schw.* 163. Polygonum mas vulgare majus, *Park.* 443. Polygonum latifolium, *C. B.* 281. *Hist. Oxon.* ii. 591. *Dill. Cat.* 158. *Tourn. Inst.* 510. *Boerb. Ind. A.* ii. 88. Polygonum vulgare latifolium, *Buxb.* 265. Polygonum five Centinodia, *J. B.* iii. 374. *Chab.* 453. **Common Knot-grass.** In locis glareosis. *Ufu.* Herba. *Vires.* Siccatur & astringit, vulnerarium est. *Ufus* præcipue in sistendis fluxibus quibuscunque, *Schrod.*

XV. De Bistorta.

Flores pentaphylli, semina triquetra, angulis acutis; radices intortæ, *R. Synop.* p. 34.

A. Bistorta, Offic. Bistorta, Serpentina, *Chab.* 507. Bistorta major, *Ger.* 322. *Emac.* 399. *Raii Hist.* i. 186. *Synop.* 59. Bistorta major vulgaris, *Park.* 391. Bistorta major rugosioribus foliis, *J. B.* iii. 538. *Dill. Cat.* 89. Bistorta radice minus intorta, *C. B.* 192. *Hist. Oxon.* ii. 585. *Tourn. Inst.* 511. *Boerb. Ind. A.* ii. 86. *Buxb.* 39. **Bistort or Snake-weed.** In humidioribus. Floret Junio. *Ufu.* Radix oblonga, crassa, foris ex spadiceo nigricans, intus rufescens, saporis astringentis, odoris nullius; folia oblonga acuminate, glauca. *Vires.* Refrigerat, siccatur, & valide astringit. *Ufus* præcipue in sistendis fluxibus quibuscunque; Abortum prohibet, & Veneno resistit.

XVI. De Potamogetone.

Potamogetonis notæ sunt, in aquis nasci; flores spicati, quadrifolii, quorum singulis quaterna

continentur semina; florum spica pediculis oblongis insidentes, *R. Synop.* p. 62.

A. Potamogeton, Offic. Potamogeton fontalis, fluvialis, *Chab.* 562. Potamogeton rotundifolium, *C. B.* 193. *Raii Hist.* i. 188. *Synop.* 60. *Dill. Cat.* 112. *Tourn. Inst.* 233. *Boerb. Ind. A.* 196. *Buxb.* 269. Potamogeton rotundior folio, *J. B.* iii. 776. Potamogeton latifolium, *Ger.* 675. *Emac.* 821. Potamogeton majus rotundifolium, *Hist. Oxon.* ii. 586. Fontalis major latifolia vulgaris, *Park.* 1254. **Pond-weed.** In aquis stagnantibus & piscinis frequens. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra vetera ulcera & nomas, *Diosc.* Refrigerandi vim habet, *Buxb.*

XVII. De Atriplice.

Notæ sunt, vasculis à duabus valvulis conniventibus compositis semina inclusa habere & quidem singula in singulis, *R. Hist.* p. 191.

A. 1. Atriplex, Offic. *Chab.* 305. Atriplex alba hortenensis, *J. B.* ii. 970. *Raii Hist.* i. 191. Atriplex five Olus aureum, *Park. Parad.* 488. Atriplex hortenensis alba, five pallide virens, *C. B.* 119. *Hist. Oxon.* ii. 606. *Tourn. Inst.* 505. *Boerb. Ind. A.* ii. 89. Atriplex sativa alba, *Ger.* 256. *Emac.* 325. Atriplex spuria hortenensis candida, *Volck.* 53. **White Drache.** In hortis. *Ufu.* Folia triangula. Semina rotunda, compressa. *Vires.* Refrigerat & humectat, cocta estur ut olus; in alvo solvenda celebris est. *Ufus* Officialis præcipue externus est in Clysteribus & Epithematibus paregoricis, *R. H.* De vi seminis purgante, vide *Matth.*

A. 2. Halimus, Offic. *Chab.* 67. Halimus Clusii, *J. B.* i. 227. Halimus latifolius, *Ger. Emac.* 523. Halimus latifolius five fruticosus, *C. B.* 120. Halimus latifolius, five Portulaca marina incana major, *Park.* 724. Atriplex Halimus dicta latifolia, *Raii Hist.* i. 194. Atriplex latifolia, seu Halimus fruticosus latifolius, *Hist. Oxon.* ii. 607. *Tourn. Inst.* 505. *Boerb. Ind. A.* ii. 89. Atriplex maritima fruticosa, Halimus dicta latifolia, *Pluk. Almag.* 61. **Tree-Sea-Purflane.** In sepibus mari proximis, regionibus calidioribus, floret æstate. *Ufu.* Radix. Folia. *Vires.* Radix convulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsâ pota: eadem lactis ubertatem facit. Folia decoquantur ciborum gratiâ, *Diosc.*

A. 3. Portulaca maritima, Offic. Portulaca marina nostras, *Park.* 724. Halimus five Portulaca

lica marina, C. B. 120. *Raii Hist.* i. 195. Halimus vulgaris five Portulaca marina, *Ger. Emac.* 523. Atriplex maritima angustissimo folio, *Hist. Oxon.* ii. 608. *Tourn. Inst.* 505. Atriplex maritima Halimus dicta, surrector & vulgaris, *Pluk. Almag.* 61. Atriplex maritima fruticosa, Halimus & Portulaca marina dicta, angustifolia, *Raii Synop.* 63. **Common Sea-Purflane.** In palustribus maritimis frequens. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Hujus foliis & tenellis ramulis chrithmi modo muria conditis, hyberno tempore ad excitandum appetitum in acetariis utuntur non Batavi tantum, sed & Britanni, *Raii Cat. Angl.* Calida est planta, *Magnol. Bot. Monsp.* Pro Cosmetico commendat *D. Stubbs.*

XVIII. De Chenopodio.

NOtæ sunt semina rotunda in nonnullis speciebus paululum compressa, in aliis ad sphaericam figuram accedentia, semina solitaria, quibus perianthia pro vasculis sunt, interdum arēdē, interdum laxius ea amplectentia, plerumque quinquedida, *Raii Meth.* A. 23.

A. 1. Atriplex sylvestris, *Offic.* *J. B.* ii. 972. *Raii Hist.* i. 197. *Chab.* 305. Atriplex sylvestris altera, C. B. 119. *Ger. Emac.* 326. Atriplex sylvestris folio sinuato, saturatē virente, spicā rubrā, *Hist. Oxon.* ii. 604. Atriplex sylvestris vulgatiore sinuata, *Park.* 747. Blitum Atriplex sylvestris dictum, *Raii Synop.* 63. Chenopodium folio laciniato comā purpurascēte, *Tourn. Inst.* 506. *Boerb. Ind.* A. ii. 90. *Buxb.* 69. Chenopodium folio sinuato candicante, *Dill. Cat.* 106. **Wild Orache.** In fimetis. Æstate floret. *Ufu.* Herba, semina parva, compressa, rotunda, nigra, splendentia. *Vires.* Alvum mollit. Panas discutit five crudum five coctum illinatur. Semen cum aqua mulsa potum Regium morbum sanat, *Diosc.*

A. 2. Atriplex olida, *Offic.* *Ger.* 258. *Emac.* 327. *Raii Hist.* i. 198. Atriplex foetida, C. B. *Pin.* 119. *Cod. Med.* xvi. *J. B.* ii. 974. *Hist. Oxon.* ii. 605. Atriplex foetida & vulvaria, *Chab.* 307. Atriplex olida five sylvestris foetida, *Park. Theat.* 749. Blitum foetidum Vulvaria dictum, *R. Synop.* 64. Chenopodium foetidum, *El. Bot.* 406. *Tourn. Inst.* 506. *Boerb. Ind.* A. ii. 90. *Dill. Cat.* 106. *Buxb.* 68. Atriplex-Chenopodia foetida, *Hort. Monsp.* 29. **Sinking Orache.** In locis rudertis & in fimetis. Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Uterina est, menses provocat, fo-

tum mortuum secundinamque expellit, in Hysterici multum prodest.

A. 3. Pes anserinus, *Offic.* *Ger.* 258. Atriplex dicta Pes anserinus, *J. B.* ii. 975. *Chab.* 306. Atriplex sylvestris latifolia, C. B. 119. *Raii Hist.* i. 198. *Hist. Oxon.* ii. 604. Atriplex sylvestris latifolia, five Pes anserinus, *Ger. Emac.* 328. *Park.* 749. Blitum Pes anserinus dictum, *R. Synop.* 64. Chenopodium Pes anserinus primum Tabernæmontani, *Elem. Bot.* 406. *Tourn. Inst.* 506. *Boerb. Ind.* A. ii. 90. *Dill. Cat.* 168. *Buxb.* 68. Atriplex-Chenopodia latifolia, *Hort. Monsp.* 28. **Goose-foot.** In fimetis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Viribus præstat, quibus & præcedentes.

A. 4. Bonus Henricus, Tota bona, Mercurialis, *Offic.* Bonus Henricus, *J. B.* ii. 965. *Ger.* 259. *Emac.* 329. Bonus Henricus, Tota bona, *Chab.* 303. Bonus Henricus Officinarum, *Volck.* 67. Bonus Henricus falso Mercurialis, *Pharm. Edenb.* 4. Blitum Bonus Henricus dictum, *Raii Hist.* i. 195. Blitum perenne Bonus Henricus dictum, *Synop.* 64. Blitum perenne Spinachie facie, *Hist. Oxon.* ii. 599. Atriplex Chenopodia folio triangulo, *Hort. Monsp.* 29. Chenopodium folio triangulo, *El. Bot.* 406. *Tourn. Inst.* 506. *Dill. Cat.* 67. *Buxb.* 70. Lapathum unctuosum folio triangulo, C. B. 115. Lapathum unctuosum five Bonus Henricus, *Park.* 1226. *Munt. Herb. Brit.* 207. **English Mercury.** In locis rudertis ad semitas. Floret Aprili & Maio. *Ufu.* Folia. *Vires.* Refrigerat & humectat, cocta estur ut olus, alvum solvit, ad ulcera sordida purganda & glutinanda confert, est etiam anodyna, & dolores Podagræ mitigat. Usus externus in Clysteribus præcipuè.

A. 5. Botrys, *Offic.* *Ger.* 950. *Emac.* 1108. *Pharm. Edenb.* 4. *Raii Hist.* i. 196. Botrys vulgaris, *Park.* 89. Botrys plerisque Botanicis, *J. B.* iii. 198. Botrys Ambrosiodes vulgaris, C. B. 138. Botrys five Ambrosia, *Cod. Med.* xxii. Atriplex odora seu suaveolens, *Hist. Oxon.* ii. 605. Atriplex Chenopodia Ambrosioides folio sinuato, *Hort. Monsp.* 29. Chenopodium Ambrosioides folio sinuato, *El. Bot.* 406. *Tourn. Inst.* 506. *Boerb. Ind.* A. ii. 90. **Dak of Jerusalem.** In hortis. *Ufu.* Herba integra, foliis profundius laciniatis, saporis subacris, aromatici, odoris fragrantis & grati. *Vires.* Planta est Thoracica & Uterina. Specificum est ad pulmonum & uteri affectus; in torminibus infantum remedium est.

A. 6. Botrys Mexicana, *Cod. Med.* xxii. Botrys Ambrosioides Mexicana, *C. B. Pin.* 136. *Raii Hist.* i. 196. Botrys Americana, *Park. Theat.* 89. Atriplex odorata suaveolens Americana, Mexicanave, *Hist. Oxon.* ii. 605. Chenopodium Ambrosioides Mexicanum, *Tourn. Inst.* 529. *Elem. Bot.* 406. *Boerb. Ind. A.* ii. 90. Epazoth, Atriplex odorata Mexicana, *Hern.* 159. **Mexico Thea.** In hortis Botanicis reperitur. *Ufu.* Herba, radix. *Vires.* Stomachum corroborat, Asthmaticis & obstructis confert: decoctum radicum dysenterias coerces, dissipat inflammationes, & noxia venenis pellit Animalia, *Hern.*

XIX. De Blito.

Semina rotunda seu compressa, singularia seu solitaria, quibus flosculi ipsi pro vasculis sunt, *R. H.* p. 195.

A. 1. Blitum album, *Offic. Park. Parad.* 488. Blitum album majus, *Ger.* 252. *Emac.* 320. *C. B.* 118. *Tourn. Inst.* 507. *Hist. Oxon.* ii. 599. *Boerb. Ind. A.* ii. 91. *Dill. Cat.* 164. *Buxb.* 40. Blitum pulchrum album magnum, *J. B.* ii. 967. *Raii Hist.* i. 200. **Great White Blite.** In hortis. *Ufu.* Folia. *Vires.* Refrigerat & humectat, estur oleris modo, alvo utile est, *Disc.*

A. 2. Blitum rubrum, *Offic. Park. Parad.* 489. Blitum rubrum majus, *Ger.* 252. *Emac.* 320. *Raii Hist.* i. 200. *C. B. Pin.* 118. *Tourn. Inst.* 507. *Elem. Bot.* 407. *Boerb. Ind. A.* ii. 91. *Hist. Oxon.* ii. 599. Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum, *J. B.* ii. 966. *Buxb.* 40. Blitum, *Chab.* 304. **Red Blites.** In hortis colitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore convenit.

A. 3. Blitum, *Cod. Med.* xxi. Blitum sylvestre spicatum, *Tourn. Inst.* 507. *Herb. Par.* 399. *Mart. Hist.* 106. *Vaill. Bot. Par.* 21. Blitum minus album, *C. B. Pin.* 118. *Hist. Ox.* ii. 599. *J. B.* ii. 967. *Raii Hist.* i. 200. *Boerb. Ind. A.* ii. 91. *Ger.* 252. *Emac.* 321. Blitum album sylvestre minus, *Park. Theat.* 752. **Small White Blite.** In hortis. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrigerat, humectat, & emollit, &c. *Cam. Epit.* 235.

XX. De Parietaria.

Calyculum & totius comæ hirsutia, aspera & vestium tenaci; seminibus splendentibus, quibus flosculi sunt pro vasculis, à reliquis differt, *R. H.* p. 205.

A. Helxine, Parietaria, *Offic.* Parietaria, Helxine, Perdicaria, *Chab.* 307. Parietaria, *Ger.* 261. *Emac.* 331. *J. B.* i. 976. *Raii Hist.* i. 206. *Synop.* 66. Parietaria vulgaris, *Park.* 436. Parietaria Officinaria & Dioscoridis, *C. B.* 121. *Hist. Oxon.* ii. 600. *Tourn. Inst.* 509. *Boerb. Ind. A.* 2. 92. **Pellitory of the Wall.** In muris. *Ufu.* Folia. *Vires.* Abstergit, & leniter astringit, refrigeratque. Usus internus rarior est; tamen prodest in morbis pectoris, in Stranguria, & Calculo. Usus in enematis ad ventris, uteri, & renum dolores. Extrinsecus in Tumoribus, Erysipelate, ambustis, & vulneribus conducit, *Schrod.*

XXI. De Alchimilla.

Hujus Notæ sunt, flosculi in summis caulibus umbellatim congesti, octo foliis herbaceis compositi, vasculis seminalibus singulis bina semina continentibus insidentes, *Raii Synop.* p. 39.

A. Alchimilla, *Offic. Ger.* 802. *Emac.* 949. *Raii Hist.* i. 208. *Synop.* 66. Alchimilla vulgaris, *C. B.* 319. *Tourn. Inst.* 508. *Boerb. Ind. A.* 2. 92. *Dill. Cat.* 67. Alchimilla major vulgaris, *Park.* 538. Alchimilla perennis viridis major, foliis ex luteo virentibus, *Hist. Oxon.* ii. 195. Pes leonis five Alchimilla, *J. B.* ii. 3981. *Chab.* 172. **Lady's Mantle.** In pratis & pascuis. Floret Maio. *Ufu.* Folia subrotunda, plicata, angulosa, crenata, saporis astringentis. *Vires.* Vulneraria est, consolidat, astringit, extergit, sanguinem incrassat; sistit menses & alba mulierum profluvia, *Schrod. R. H.* pag. 209.

XXII. De Percepier.

SITU florum in foliorum alis, calicibus quadripartitis, seminibus in singulis utriculis singulis ab Alchimilla differt, ut omnino genere distinctum sit, *R. Meth. A.* pag. 23.

A. Percepier, *Offic.* Percepier Anglorum, *Ger. Emac.* 1594. *Raii Hist.* i. 209. *Synop.* 67. *Dill. Cat.* 60. Percepier Anglorum quibusdam, *J. B.* iii. 74. *Chab.* 392. *Boerb. Ind. A.* 2. 93. Polygonum Selinoides, *Park.* 448. Chærophyllo nonnihil similis, *C. B.* 152. Alchimilla annua minima hirsuta foliis infernè albicantibus, *Hist. Oxon.* ii. 195. *Buxb.* 11. Alchimilla montana minima, *Tourn. Inst.* 508. **Parley pierr.** Inter fegetes, & in solo restibili steriliore. Æstate floret.

floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vehementer & repente urinas ciere, & calculum comminuere creditur, *Raii Synop.*

XXIII. De Knavel.

NOTÆ sunt, florum calices stellati, in quinque acuta segmenta divisi, singuli singulis seminibus insidentes, in caulium & ramulorum divaricationibus, inque summis ramulis, *Raii Method.* A. 24.

A. 1. *Knavel*, *Offic.* *Dill. Cat. Giff.* 87. *Boerb. Ind. A.* 2. 93. *Knavel* folio & flore viridi, *Rupp. Flor. Jen.* 76. *Buxb.* 174. *Polygonum Selenoides* sive *Knavel*, *Ger.* 453. *Emac.* 566. *Polygonum Germanicum* vel *Knavel Germanorum*, *Park.* 447. *Raii Hist.* i. 213. *Synop.* 68. *Polygonum Germanis Knavel*, *Hist. Oxon.* ii. 594. *Polygonum* 3. *Dodonei* sive tenuifolium, *J. B.* 377. *Polygonum angustissimum* & acuto vel gramineo folio, minus repens, *C. B.* 231. *Herniaria angustissimum folio minor repens*, *Hort. Monsp.* 97. *Alchimilla supina gramineo folio, minore flore*, *Tourn. Inst.* 508. *German Knot-grass.* In agris arenosis. *Ufu.* Herba. *Vires.* Eadem vires cum *Polygono* vulgari habet, *Buxb.* *Lithontriptica* herba æstimatur, *Ger.*

A. 2. *Polygonum cocciferum*, *Offic.* *C. B. Pin.* 281. *Polygonum Polonicum cocciferum*, *J. B.* iii. 378. *Chab.* 454. *Polygonum cocciferum Polonicum*, *Breyn. Hist. cocc. rad.* 11. *Knavel incanum*, flore majore perenne, *Raii Hist.* i. 213. *Synop.* iii. 160. *Dill. Cat. Giff.* 61. *Knavel folio & flore albicante*, *Rupp. Flor. Jen.* 76. *Buxb.* 174. *Polygonum Germanicum incanum flore majore perenne*, *Pluk. Almag.* 302. *Polygonum angustissimum & acuto vel gramineo folio montanum*, *Sch. Bot.* 120. *Alchimilla gramineo folio, majore flore*, *Tourn. Inst.* 508. *Elem. Bot.* 409. *Polonian Knavel.* In arenosis locis, sed rarius. *Coccum tinctorium* seu *Polonicum*, hujus radicibus adnascens, nihil aliud est quam nidus seu ovulum cujusdam Insecti extra purpurei, intra sanguineo succo turgens, ad tingendum chermesinum colorem utile. *Vires.* Eadem vires cum *polygono* vulgari habet, *Buxb.* De *Cocco* vid. *Breynius de Hist. Nat. Cocci radicem.*

XXIV. De Camphorata.

Vasculum habet herbaceum, ex quo quatuor stamina parva prodeunt, quorum quilibet apicem rubrum, vel potius roseum in medio sulcatum sustinet: Succedit flori semen nigrum oblongum, *Magnol. Bot. Monsp.* 47.

Camphorata, *Offic.* *Camphorata hirsuta*, *C. B.* 486. *Raii Hist.* i. 210. *Hist. Oxon.* iii. 614. *Camphorata Monspeliensium*, *J. B.* iii. 379. *Chab.* 454. *Camphorata major Monspeliensium*, *Park.* 568. *Sinking Ground-pine.* In hortis Botanicis nonnunquam reperitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Siccat & attrahit, nervosum genus roborat, confert in doloribus Arthriticis, Spasmodicis, Paralytici, defluxionibus oculorum, Catarrhis, Cephalica est planta, *Park.* Ad vulnera efficacem esse dicit *Leb.* In *Hydropis* curatione exhibent alii, *Magnol.*

XXV. De Kali.

NOTÆ sunt, fructus ad singulos flores singuli, alius aculeati, alias læves, semina vel potius nucleos continentes cochleatos, seu serpentis adinstar in spiram convolutos, *Raii Meth. A.* 24.

A. 1. *Kali*, *Offic.* *Kali cochleatum majus*, *Park. Theat.* 279. *Kali majus cochleato semine*, *C. B. Pin.* 289. *Raii Hist.* i. 212. *Hist. Oxon.* ii. 209. *Ger. Emac.* 535. *Tourn. Inst.* 247. *Boerb. Ind. A.* 2. 93. *Kali vulgare*, *J. B.* iii. 702. *Salicornia altera*, *Ger.* 428. *Glasswort.* In Salsis maritimis. *Ufu.* Herba.

Varia hujus plantæ præparata in usu sunt
1. *Alumen Catinum*, *Offic.* *Soda* quibusdam, alijs *Cineres Clavellati.* *Pot. Ales.* Fit ex cineribus hujus herbæ, magnâ quantitate ustæ, in massam nigro-cineream concretescentibus. *Vires.* Acre est, mordax, & causticum, herbæque, è qua fit, vires obtinet, sed validiores. 2. *Axungia vitri*, *Offic.* *Sal vitri*, nonnullis. *Salt of Glass or Sandiver.* Salis genus est, colore cinereo, seu griseo, ut vocant, gustu pariter acri & mordaci, qui dum vitrum in fornace funditur ollarum marginibus adhærescit; ad hunc autem locum pertinet, quia vitrum nihil aliud est quam cineres clavellati, & arena vel lapides simul fusa & vi ignis unita. *Vires.* *Sodæ* vires obtinet, & in usu est apud Veterinarios ad emundandos equorum oculos. Utile etiam est ad dentes repurgandos, Ul-

Ulcera manantia, Herpetes, Impetigines exsicandos, quin & Scabiei conducit. Aurifabri ad aurum ferruminandum eo utuntur. 3. *Lixivium*, Offic. *Sope-Lye*. Cinerum prædictorum in aqua solutio est; acris est, erodentis & causticæ naturæ. *Vires*. Utile est ad cutem emaculandam, ad Alphos, Lentigines, Ephelides, aliaque ejus vitia extergenda; verum in ejus usu cauto opus est, nè cutem ipsam violet & erodat. Ex hoc Lixivio efficitur celebre illud causticum Officinis *Lapis Infernalis* dictum. *Sapo*, Offic. *Sope*. Qui ex lixivio prædicto fit, estque trium generum. 1. *Sapo Communis*. *Common Sope*. Fit ex oleo villiori, sevo, & lixivio ana ad consistentiam coctis, è quo, addita fuligine, fit *Sapo Niger*. 2. *Sapo Castiliensis*. *Castile Sope*. Eodem quo præcedens modo fit; verum pro oleo communi adhibetur oleum Olivarum, Indico aliòve simili medicamine cæruleo colore tingitur, & ad consistentiam coctus in laterculos scinditur. 3. *Sapo Venetus* vel *Albus*. *White or Venice Sope*. Hujus parandi modum vide in Topographiis, &c. Observationibus amici & vicini nostri clarissimi D. J. Raii. *Vires*. Sapo aperit, digerit, & extergit, Urinam ciet, obstructions Hepatis & Lienis referat, arenulas pellit. Extrinsecus adhibitum attrahit, ambustis cute non exulcerata medetur, præsertim niger, omne genus pediculorum interimit, imprimis feros. N. B. *Lixivium*, Offic. *Non ex Soda tantum fit, sed ex cineribus cujuscunque generis ligni concremati*. 4. *Sal Alkali*, Offic. Propriè & strictè loquendo pro sale duntaxat ex cineribus clavellatis extract. accipitur, verum sensu latiori & generali ad duo significanda extenditur: nimirum, 1. *Sal Volatile*, quod ex animalium partibus vel excrementis elicatur, cujuscumque sunt *Sal Cornu Cervi*, *Urinae*, &c. 2. *Fixum*, quod ex cineribus plantarum elicatur, ut *Sal Kali*, *Abinthii*, &c. At neque ex hac herba sola conficitur Soda, sed nonnullis in locis Fucos aliasque plantas marinas urunt ad eum usum. Item ad cineres clavellatos pro Sapone communi efficiendo silicem feminam urunt una cum stramine, in lixivio cinerum ligni prius macerato. *Harvici* insuper mihi narratum est, quod lixivium, quo ibi utuntur ad linteamina mundanda, è Lupuli viminum exsiccatum cineribus paratum esse.

2. *Kali Hispanicum*, *Cod. Med.* lxiii. *Kali Hispanicum* supinum annuum, sedi folliis brevibus, *Alt. Reg. Par. Anº* 1717. p. 93. *Fig.* p. 98.

Alicant Glass-woyt. *Ufu*. Cineres Sode de Alcantia dict.

XXVI. De Herniaria.

Notæ sunt folia adversa; Serpylli minora; cauliculi humi sparsi, flosculis herbaceis & seminibus numerosissimis onusti, Raii Synop. 69.

A. 1. *Herniaria*, Offic. *Ger.* 454. *Emac.* 569. *Dill. Cat.* 88. *Raii Synop.* 69. *Hist.* i. 214. *Herniaria glabra*, J. B. iii. 378. *Tourn. Inst.* 507. *Boerb. Ind.* A. 2. 96. *Buxb.* 155. *Millegrana major*, five *Herniaria vulgaris*, *Park. Theat.* 446. *Polygonum minus*, five *Millegrana major*, *C. B.* 281. *Polygonum minus* five *Millegrana major*, *Herniaria glabra*, *Hist. Oxon.* ii. 593. *Rupture-woyt*. In arenosis & glareosis. Floret Junio & Julio. *Ufu*. Herba, five planta integra. *Vires*. Refrigerat, & fccat. *Ufus* præcipue est in Hernia curanda, Urina cienda, Renum & Vesicæ calculo atterendo, Ventriculi ac aliarum partium mucilagine incidendâ, educendâ, Bile ac aqua expellenda, adeoque in Ictero curando, *Schrod.*

A. 2. *Arenaria*, Offic. *Herniaria Alfine* folio, *Tourn. Inst.* 507. *Elem. Bot.* 408. *Boerb. Ind.* A. 11. 96. *Paronychia*, *Alfine* folio incana, J. B. iii. 366. *Chab.* 448. *Raii Hist.* ii. 1026. *Polygonum maritimum* folio *Alfine*, *Hist. Oxon.* ii. 594. *Anthyllis maritima* *Alfine* folio, *C. B.* Pin. 282. *Anthyllis maritima incana*, *Park. Theat.* 281. *Anthyllis altera*, *Ger.* 497. *Anthyllis marina incana* *Alfine*-folio, *Ger. Emac.* 622. *Alfine maritima* centumgrana Cæsalpino dicta, *Pluk. Almag.* 20. *Sea-Chickweed*. In maritimis & vineis. Æstate floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Illita *Paronychiis* atque favis remedio est, *Diosc.*

XXVII. De Amaranto.

Coma speciosa & immarcescibili, semina capsulis membranaceis oblongis per maturitatem transversim seu horizontaliter diffilientibus, Raii Method. A. 25.

Amaranthus, *Flos Amoris*, Offic. *Amaranthus maximus*, *C. B.* 120. *Raii Hist.* i. 201. *Boerb. Ind.* A. 2. 97. *Tourn. Inst.* 234. *Amaranthus paniculâ sparsâ*, *Ger.* 254. *Emac.* 322. *Amaranthus pupureus major* paniculis sparsis, *Park. Parad.* 371. *Amaranthus paniculis procumbentibus*

tibus semine albo, seu Quinva, *Hist. Oxon.* ii. 602. Blitum maximum sive Amaranthus major, semine albo, *J. B.* ii. 968. *Chab.* 304. **Flowers gentle.** In hortis colitur. *Ufu.* Flores. Augusto floret. *Vires.* Refrigerat, & ficcatur, modice astringit. Hinc usus in Fluxionibus cunctis, ut expuitione sanguinis, Diarrhoea, Dysenteria, fluxu uterino, &c. *Schrod.*

XXVIII. De Beta.

Fruetu verrucoso osseo, cui flos insidet, à reliquis differt, *R. H.* p. 204.

A. 1. Beta alba, *Offic. Ger. Emac.* 318. *Raii Hist.* i. 204. Beta, *Chab.* 302. Beta alba vel pallescens, quæ Sicula & Cicla Officinarum, *Hist. Oxon.* ii. 596. *Boerb. Ind. A.* 2. 94. Beta communis alba, *Park. Parad.* 489. *Ger.* 251. Beta candida, *J. B.* ii. 961. Beta alba vel pallescens, quæ Cicla Officinarum, *C. B.* 118. *Tourn. Inst.* 502. **White Beet.** *Ufu.* Radix, folia, & semina. Radix est lignosa, crassa, longa, & candida. Folia sunt crassa & succulenta, sapore nitroso. Semina rotunda & aspera, fusca. *Vires.* Laxat alvum, ob nitrositatem, Errhinum est. Usus internus ejus potissimus culinaris est, in acetariis, &c. Externus in Errhinis, & Clysteribus. Ex V. *Herb.* emollientibus est.

A. 2. Beta rubra, *Offic. Ger.* 251. *Emac.* 318. *Raii Hist.* i. 204. *Chab.* 302. *J. B.* ii. 961. Beta rubra vulgaris, *C. B.* 118. *Hist. Oxon.* ii. 596. *Tourn. Inst.* 502. Beta communis rubra, *Park. Parad.* 489. **Red Beet.** Cum priore. *Ufu.* Radix, folia. Radix crassa est & alba. Folia rubentia, breviora quam præcedentis. *Vires.* Easdem habet cum præcedente. Coquitur cum lenticula, ut ventrem sistat: quod magis radice ejus præstatur, *Disf.*

N. B. Quæ folio est obscuriore Beta nigra *Offic.* dicitur.

XXIX. De Asaro.

Notæ sunt Cytini in sex lacinias divisi: laciniae sunt Calyx floris, cui subest fructus hexacoccus: Folia crassa, splendentia.

A. 1. Asarum, *Offic. Ger.* 688. *Emac.* 836. *C. B.* 197. *J. B.* iii. 548. *Chab.* 510. *Raii Hist.* i. 207. *Tourn. Inst.* 501. *Boerb. Ind. A.*

2. 95. *Dill. Cat.* 36. *Buxb.* 28. Asarum vulgare, *Park.* 266. Asarum vulgare rotundifolium, *Hist. Oxon.* iii. 511. Nardus rustica, *Hoff. Flo. Altorff.* **Asarabacca.** In hortis colitur. Vere floret. *Ufu.* Radix & folia. Radices tenues, fibrosæ, spadiceæ, saporis acris, purgativi, nauseabundi, cum levi quadam astringentia, odoris non ingrati. Folia sunt subrotunda, splendentia. *Vires.* Crassam pituitam, bilemque utramque per vomitum, ac nonnunquam per secessum violentè expurgat. Diureticum est, ac emmenagogum insigne, Hepar, Lienem, Vesicamque fellis aperit: Hinc utile in Arthritide, Hydrope, Febribus, præcipuè tertiana & quartana, in Ictero, &c. *Schrod.* Radix pro Ipecacoanna venditur, & etiam non multum abest, quoad virtutes, *Boerb. Hist. Plant.* 558.

A. 2. Asarum Virginianum, Serpentina nigra, *Offic.* Asarum Virginianum folio cordato Cyclaminis more maculato, *Hist. Oxon.* iii. 511. Asarum Virginianum Piftolochiæ foliis subrotundis Cyclamini more maculatis, *Pluk. Almag.* 53. *Phytog.* 78. *Raii Hist.* iii. 129. Asarum Cyclaminis folio Virginianum, *Banif. MSS. Cat.* Serpentina major Officinarum, *Bobart.* **Black Snakeweed.** Ex Virginia ad nos delata est, & Botanopolis nostris pro vero venditur, quod sapore & odore refert.

SECTIO QUARTA.

De Herbis flore aggregato, planifolio.

FLOS aggregatus nobis dicitur, qui ex pluribus flosculis in unum totalem florem coeuntibus constat; quorum unusquisque non tantum folio seu bracteâ coloratâ, verum insuper vel staminibus, vel stylo saltem constat, & singuli singulis seminibus coherent, *R. H.* p. 217.