

S E C T I O S E X T A.

De Herbis Corymbiferis.

Hæ sunt vel

Vere

- Disco radiato,
 { Spinosa, foliis marginalibus, ficcioribus : *Carlina*.
 { Laeves, floris totalis foliis marginalibus, frontatis, fronte
 { Crenata, disco medio concolore iisd. floribus
 { Integra & æquali, lata & subrotunda, Tanaceti foliis : *Othonna*.
 Floribus
 { Sparfis aut solitariis, colore flavo, foliis
 { { Integris ;
 { { Elatiores & majores : *Flos Solis*.
 { { Humiliores & minores seminibus incurvis : *Calendula*.
 { { Laciniatis : *Chrysanthemum*.
 { { Tenuiter dissectis : *Bupthalmum*.
 { In umbellæ formam dispositis, foliis
 { { Integris angustis ferratis : *Ptarmica*.
 { { Tenuissime dissectis : *Millefolium*.
 { Diversi ab iisdem coloris flavi, sc. cum folia marginalia alba sint ; suntque floribus vel
 { Sparfis, foliis
 { { Integris, ad margines crenatis, caule
 { { { Nudo, flore in fastigio singulari minore : *Bellis Minor*.
 { { { Folioso, elatior, floribus majoribus : *Bellis Major*.
 { { Multifariam in segmenta tenuissima divisus,
 Radice
 { { Non fervido : *Chamæmelum*.
 { { Fervido : *Pyrethrum*.
 { In umbellæ formam dispositis, foliis laciniatis pallidis, odore vehementiore : *Parthenium*.
 { Nudo, seu non radiato, caule
 { { Determinato, flosculis sc. cum finientibus Singularibus,
 { { { Frutescens, superficie perenni, foliis in caule sigillatim positis, odoratis : *Chamæcyparissus*.

- a c { Herbacea superficie annua foliis in caule
 { bijugis, semine cornuto : *Bidens*.
 { Pluribus velut in umbellam dispositis ; foliis
 { { Integris,
 { { { Latis, elatior & major : *Costus horticorum*.
 { { { Angustis, per margines incis, humilior & minor : *Ageratum*.
 { { { Dissectis & velut alatis : *Tanacetum*.
 { Indeterminato, floribus cum non finientibus, verum secundum ejus longitudinem velut in spicas dispositis ; foliis
 { { Integris, longis, angustis : *Draco Herba*.
 { { Dissectis,
 { { Frutescens, caulibus perennibus, lignosis, foliorum segmentis tenuissimis : *Abrotanum*.
 { { Superficie annua,
 { { { Amaro insignis, odore vehementiore, folio incano : *Abfinthium*.
 { { { Minus amaro, odore remissione, folio subtus incano, supernè virente : *Artemisia*.
 Anomale sunt vel
 { { Flore composito propriè dicto, singulis florem totalem componentibus, flosculis singulis seminibus infidentibus, suisque privatis calycibus donatis : *Scabiosa*.
 { { Flore compositum imitante, seu potius capitulo vel spica flosculorum densa, & congesta florum compositum exprimente ; foliis
 { { Perianthiorum æmulis capitulorum bases cingentibus, majores & elatiores,
 { Radice non vivaci, foliis ad margines non spinosis, in caule adversis ; caulibus concavis, iisdemque & foliorum costis spinis brevibus, horridis ; capitulis è squamis, sinibus suis semina amplexis in mucrones oblongos exeuntibus, compositis ; foliorum adversorum basibus conjunctis seu continuis : *Dipsacus*.
 { Ad capitulorum bases nullis ; foliis laciniatis, capitulis in sphaericam rotunditatem coactis : *Echinops*.

I. De Carlina.

NOTÆ sunt, Flores discoides radiati, in capitulis squamosis & spinosis, Cardui facie ; seminibus.

minibus foliis canaliculatis à se mutuo separatis, pilorum penicillo coronatis, petalis marginalibus nullis seminibus insidentibus, Raii Meth. A. 36.

A. 1. Chamæleon albus, *Carlina*, *Offic.* *Carlina* sive Chamæleon albus Dioscoridis, *Ger.* 995. *Emac.* 1157. *Carlina humilis*, *Park. Theat.* 968. *Raii Hist.* i. 288. *Carlina acaulos* magno flore, *C. B.* 380. *Tourn. Inst.* 500. *Boerb. Ind. A.* 101. *Carlina caulifera* vel acaulis, *J. B.* iii. 64. *Carlina*, *Carolina*, *Chab.* 353. *Carlina major*, *Schw.* 39. *Carduus Xeranthemos* flore albo ampliore acaulis, *Hist. Oxon.* iii. 162. **Carlina Thistle.** In pascuis sterilibus Germaniæ & Italiæ. Junio floret. *Ufu.* Radix oblonga, crassa, foris rufa, intus albida, saporis acris, gravis, aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Alexipharmaca est & sudorifica, Pestis contagia arcet, curatque, si tempestivè propinetur. Diuretica quoque est & emmenagoga; Hydropicis confert, tinea ventris necat, *Schrad.*

A. 2. *Carlina caulescens* flore magno albente, *Cod. Med.* xxviii. *Tourn. Inst.* 500. *Boerb. Ind. A.* 101. *Carlina caulescens* magno flore, *C. B.* Pin. 380. *Elem. Bot.* 401. *Rupp. Flor. Jen.* 172. *Volck. Flor. Nor.* 87. *Buxb.* 57. *Carlina caulifera*, *J. B.* iii. 64. *Raii Hist.* i. 288. *Carlina caulescens*, *Park. Theat.* 968. *Carduus Xeranthemos*, flore albo caulescens, *Hist. Oxon.* iii. 162. **Carlina Thistle with a Stalk.** In hortis. *Ufu.* Radix. *Vires.* Eisdem viribus pollet ut præcedens, cujus varietas æstimatur. Hujus pariter atque præcedentis radices quotannis à rhizotomis copiosa eruuntur, & Lipsiam deportantur venales, *Rupp.*

A. 3. *Carlina sylvestris*, *Offic.* *Raii Hist.* i. 288. *Carlina sylvestris* major, *Ger.* 997. *Emac.* 1159. *Park. Theat.* 969. *Mer. Pin.* 22. *Carlina sylvestris vulgaris*, *Clus. Hist.* clvi. *Tourn. Inst.* 500. *Elem. Bot.* 401. *Dill. Cat. Giff.* 167. *Boerb. Ind. A.* 101. *Carlina sylvestris* quibusdam, aliis *Atractylis*, *J. B.* iii. 81. *Chab.* 353. *Raii Synop.* iii. 175. *Buxb.* 58. *Carlina scandens*, *Wedd.* 175. *Cnicus sylvestris* spinosior, *C. B.* Pin. 378. *Heracantha*, *Rupp. Flor. Jen.* 172. *Carduus vulgaris*, *Merc. Bot.* i. 27. *Phyt. Brit.* 23. *Carduus Xeranthemos* vulgaris annuus, *Hist. Oxon.* iii. 162. **Common wild Carlina Thistle.** In pascuis siccioribus. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Eandem proprietatem cum præcedente ei attribuit *Camerarius* in *Epit. Germanica*, p. 220. Contra *Sodam* commendat *Wedelius* in *Amænit. Materiae Medicæ*, p. 175.

II. De Flore Solis.

NOTÆ sunt, *Barbulæ* medium discum cingentes flavæ & cuspidatæ, flores & semina foliolis canaliculatis separata, hæc etiam summa parte duobus foliolis ornata, Raii Meth. A. 36.

A. 1. Flos Solis, *Offic.* *Raii Hist.* i. 314. Flos Solis major, *Ger.* 612. *Emac.* 751. *Chrysanthemum Peruvianum* sive Flos Solis, *Park. Parad.* 295. *Chrysanthemum Indicum*, Flore & Semine maximis annuum, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 142. *Pluk. Almag.* 98. *Chrysanthemum Indicum* maximum annuum, non ramosum, *Hist. Oxon.* iii. 19. *Helenium Indicum* maximum, *C. B.* 276. Herba maxima, *J. B.* iii. 107. Herba maxima, Sol Indianus, *Chab.* 360. *Chimalath Peruviana*, Flos Solis, *Hern.* 228. *Corona Solis Tabernæmontani*, *Elem. Bot.* 391. *Tourn.* 489. *Boerb. Ind. A.* 102. **Sun-Flower.** In hortis colitur. Augusto floret. *Ufu.* Germina Floris, Semina oblonga, tumidiuscula, & nonnihil compressa, nigra. *Vires.* Germina cocta Venerem stimulant. Semina pectus leniunt, & ardorem extinguunt, liberalius autem devorata capitis dolorem excitant. Traumatica est planta.

A. 2. *Battata Canadensis*, *Offic.* *Battatas* de Canada, *Park.* 1383. *Parad.* 516. Flos Solis pyramidalis, parvo Flore, tuberosa Radice, *Heliotropium Indicum* quorundam, *Ger. Emac.* 753. *Raii Hist.* i. 335. Flos Solis tuberosus, *Indicus*, sive *Adenes Canadensis*, *Grisl. virid. Lusitan.* *Corona Solis* parvo Flore, tuberosa Radice, *Elem. Bot.* 391. *Tourn. Inst.* 489. *Boerb. Ind. A.* 102. *Helianthemum Indicum* tuberosum, *C. B.* 277. *Helenium Indicum* tuberosum, *H. R. P.* 85. *Chrysanthemum Indicum* Radice tuberosa, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 142. *Pluk. Almag.* 99. *Chrysanthemum* perenne majus foliis integris Americanum tuberosum, *Hist. Oxon.* iii. 23. *Chrysanthemum Canadense* strumosum, *Florent. Schw. Cat. Leyd.* 22. Flos Solis Farnesianus sive Aster Peruvianus tuberosus, *Col. Ecyb.* ii. 11. Flos Solis tuberosus seu Flos Farnesianus, *Aldin.* 91. **Jerusalem Artichoke.** In hortis apud nos colitur. *Ufu.* Radix in culinis.

III. De Calendula.

NOTÆ sunt, Flores discoides radiati, flavi aurei petalis frontatis & crenatis, semina incurva

curva & aspera, externis longioribus, internis brevioribus, folia oblonga integra, Raii Meth. A. 36.

A. 1. *Calendula*, Offic. *Calendula sativa*, Raii Hist. i. 337. Hort. Monsp. 28. *Calendula simplex*, Ger. 601. Emac. 739. *Calendula simplex*, Park. Parad. 298. *Caltha flore simplici* J. B. iii. 101. Cod. Med. xxv. Hist. Oxon. iii. 13. *Caltha vulgaris*, C. B. 275. Tourn. Inst. 498. Boerb. Ind. A. 113. *Chrysanthemum*, *Caltha*, *Calendula*, Chab. 358. **Parigold**. In hortis frequens. Florere Maio incipit. Ufu. Folia & flores. Vires. Flores cardiaci censentur, hinc & Hepatici & Alexipharmaci; sudores movent, Variolas expellunt, Ictero medentur, Menses cient, Partum promovent (fumus subditus parturienti) Aqua distillata, oculis instillata, eorum rubori & inflammationi medetur, R. H. p. 338. Præp. Aq. Cmf.

A. 2. *Calendula* five *Caltha*, Cod. Med. xxv. *Calendula minor arvensis*, Rupp. Flor. Jen. 138. *Caltha arvensis*, C. B. Pin. 276. Raii Hist. i. 338. Tourn. Inst. 499. Elem. Bot. 399. Herb. Par. 182. Vaill. Bot. Par. 26. Boerb. Ind. A. 113. Hist. Oxon. iii. 14. Mart. Hist. i. 135. *Caltha minima*, J. B. iii. 103. *Caltha* five *Calendula minima*, Chab. 359. *Calendula arvensis*, Ger. 603. *Calendula sylvestris*, Ger. Emac. 741. **Waldo Parigold**. In arvis variis locis. Ufu. Herba. Vires. Cum hortensi viribus convenit.

IV. De Chrysanthemo.

NOTÆ, Flos flavus aureusve, semina striata nuda, absque capitulo five corolla foliolorum, Raii Meth. A. 36.

A. 1. *Chrysanthemum*, Offic. *Chrysanthemum foliis Matricariæ*, C. B. 134. Raii Hist. i. 340. Tourn. Inst. 491. Elem. Bot. 393. Boerb. Ind. A. 105. *Chrysanthemum veterum* seu majus folio valde laciniato, Chab. 359. *Chrysanthemum majus* folio valde laciniato flore croceo, J. B. iii. 104. **Dioscorides** his **Corn Parygold**. In hortis colitur, sed rarius. Æstate floret. Ufu. Flores. Vires. Cum cerato triti steatomata discutere produntur, Diosc.

A. 2. *Chrysanthemum segetum*, Ger. descript. 604. Emac. 743. Raii Synop. iii. 182. Hist. i. 339. *Chrysanthemum segetum* vulgare glaucum, Hist. Oxon. iii. 15. *Chrysanthemum segetum nostras*, Park. Theat. 1370. *Chrysanthemum folio minus secto glauco*, J. B. iii. 105. Tourn.

Inst. 492. *Chrysanthemum arvense* folio glauco dentato, Rupp. Flor. Jen. 136. *Bellis lutea* foliis profunde incisus majus, C. B. Pin. 262. **Corn Parygold**. Inter segetes frequens. Ufu. Flores. Vires. A Germanis contra icterum extollitur, Rupp.

V. De Leucanthemo.

NON ulla alia in re à *Chrysanthemo* differt quam colore flosculorum, Raii Meth. A. 36.

A. 1. *Bellis major*, Offic. J. B. iii. 114. Chab. 362. Ger. 509. Emac. 634. Schw. 28. Raii Hist. i. 350. Synop. 91. *Bellis major vulgaris* five *sylvestris*, Park. 528. *Bellis sylvestris* caule folioso major, C. B. 261. *Bellis polyclonos sylvestris* major caule folioso, Hist. Oxon. iii. 28. *Leucanthemum vulgare*, Elem. Bot. 393. Tourn. Inst. 492. Boerb. Ind. A. 107. Dill. Cat. 82. *Bellidoides vulgaris*, Aët. Reg. Par. An. 1720. 281. **Dr. Eye Dassel**. In pascuis & inter segetes. Maio floret. Ufu. Folia & flores. Vires. Herba integra in Zythogalo decocta & pota adversus Asthma, Phthisin, Orthopneam singulare remedium censetur. Utilis est in vulneribus & rupturis, R. H. Flores a mulierculis Botanopolis Londinensibus pro Buphthalmi floribus venduntur.

A. 2. *Bupthalmum Germanicum*, Offic. *Bupthalmum vulgare*, Raii Hist. i. 341. Synop. iii. 18. Ger. Emac. 747. *Bupthalmum Tanacetii minoris folio*, C. B. Pin. 134. Chomel. ii. 692. Boerb. Ind. A. 106. Tourn. Inst. 49. Elem. Bot. 396. Rupp. Flor. Jen. 136. Dill. Cat. Giff. 159. Buxb. 47. *Bupthalmum Matthioli* five vulgare *Millefolii foliis*, Park. Theat. 1370. *Chamaemelum Chrysanthemum quorundam*, J. B. iii. 122. *Chamaemelum Chrysanthemum* perenne brevioribus & incanis foliis, Tanacetii instar alatis, Hist. Oxon. iii. 20. **Common Dr. Eye**. Ad sepes & vias. Augusto floret. Ufu. Herba. Vires. Aperit, Icterem curat, & virtutem habet vulnerariam. In Officinis nostris raro invenitur.

VI. De Asterisco.

Calix stellatus, radiis foliosis, florum superantibus, succingit florem, semina plana, marginata plerumque, non papposa, nec cristata, Boerb. Ind. A. 104.

A. Ingui-

A. Inguinalis, Aster Atticus, *Offic.* Aster Atticus, *Ger.* 392. *Emac.* 486. *Raii Hist.* i. 338. Aster Atticus luteus verus, *Park.* 128. Aster luteus foliolis ad florem rigidis, *C. B.* 266. Chrysanthemum conyzoides foliis circa florem rigidis, *Hist. Oxon.* iii. 18. Chrysanthemum Alteris facie, foliis ad florem rigidis, *Herm. Cat.* Asteriscus annuus foliis ad florem rigidis, *El. Bot.* 398. *Tourn. Inst.* 497. *Boerb. Ind. A.* 104. *Aet. Reg. Par.* An. 1720. 332. **Golden Star-wort.** In hortis Botanicorum. Maio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Vulneraria est, sed in usu raro occurrit. Folia seu Herba ferventi stomacho, oculorum inflammationibus, prociidua sedi, ac inguinum tumoribus auxiliantur. Aqua Florum, si bibatur, anginae & puerorum comitiali malo opitulatur, *Diosc.*

VII. De Othonna.

HUjus Notæ sunt, Floris calyx integer oblongus, petala lata, semina longa compressa: folia laciniata Tanacetis æmula, *Raii Hist.* i. 342.

A. Othonna, *Offic.* Othonna; Tagetes Indicus; Flos Africanus, *Chab.* 358. Tagetes Indicus minor simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus, *J. B.* iii. 98. *Raii Hist.* i. 343. *Boerb. Ind. A.* 114. *Tourn. Inst.* 488. *Elem. Bot.* 390. Flos Aphricanus minor simplici flore, *Ger.* 611. *Emac.* 750. Flos Africanus minor simplex, *Park.* 304. Tanacetum Africanum sive flos Africanus minor, *C. B.* 133. Chrysanthemum Africanum Tanacetis folio procumbens, sive minus flore simplici, *Hist. Oxon.* iii. 16. Tlapalcotatl Coaxochitl, Caryophyllus Mexicanus V. *Hern.* 156. Tagetes minor flore luteo-rubefcente, *Aet. Reg. Par.* An. 1720. 315. **African Marygold.** In hortis seritur. Æstate floret. *Usu.* Succus inspissatus. *Vires.* Oculorum medicamentis adjicitur, ubi expurgare est opus: abstergit enim omnem caliginem, *Diosc.*

VIII. De Ptarmica.

NOTÆ sunt, Flores in umbella, barbulis disco medio concoloribus; folia integra ad margines serrata, *Raii Hist.* i. 344.

A. Ptarmica, *Offic.* *Ger.* 483. *Emac.* 606. *Raii Hist.* i. 344. *Synop.* 91. Ptarmica vulgaris, *Park.* 858. Ptarmica vulgaris folio longo, serrato, flore albo, *J. B.* iii. 147. *Boerb. Ind. A.* 111.

Tourn. Inst. 496. *Dill. Cat.* 122. Ptarmica; Pyrethrom sylvestre, *Chab.* 368. Dracunculus serrato folio pratensis, *C. B.* 98. Dracunculus pratensis viridis sive Ptarmica vulgaris folio serrato, *Hist. Oxon.* iii. 40. Achillea foliis integris minutissime serratis, *Aet. Reg. Par.* An. 1720. 321. **Greenwort, Wastard Pellitory.** In pratis. Julio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Gustu acri est & servido. Pulvis naribus inditus sternutamenta movet. Cruda additur acetariis ad frigiditatem eorum temperandam & corrigendam, *R. H.*

IX. De Millefolio.

Flores in umbellæ formam dispositi barbulis medio disco concoloribus; folia tenuissime dissecta, *R. Synop.* p. 56.

A. 1. Millefolium, *Offic.* Millefolium vulgare, *Park.* 693. *Raii Hist.* i. 345. *Synop.* 91. Millefolium vulgare album, *C. B.* 140. *Tourn. Inst.* 496. *Dill. Cat.* 140. *Boerb. Ind. A.* 112. *Hist. Oxon.* iii. 38. *Buxb.* 217. Millefolium terrestre vulgare, *Ger.* 914. *Emac.* 1072. Millefolium Stratiotes pennatum terrestre, *J. B.* iii. 136. Millefolium terrestre album, *Schw.* 137. Achillea vulgaris flore albo, *Aet. Reg. Par.* An. 1720. 320. **Narrow.** In pascuis. Junio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Medetur Ulceribus, Tumoribus, ac Inflammationibus, sine repulsione. Usu interno convenit in Hæmorrhagiis ac fluxionibus omnis generis; extrinsecus adhibetur in Cephalalgia, vulneribus consolidandis, tumoribus Herniæ, & penis, i&ibus venenatis, *Schred.*

A. 2. Achillea, *Offic.* Achillea sive Millefolium nobile, *Ger.* 915. *Emac.* 1073. *Aet. Reg. Par.* An. 1720. 320. *Raii Hist.* i. 346. Achillea fideritis sive nobilis odorata, *Park.* 695. Achillea Millefolia odorata, *J. B.* iii. 140. *Chab.* 367. Millefolium majus album odore Camphoræ, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 427. *Pluk. Almag.* 250. Millefolium nobile, *Elem. Bot.* 397. *Tourn. Inst.* 496. *Dill. Cat.* 122. Millefolium nobile Tragi, *Boerb. Ind. A.* 112. Millefolium nobile & Stratiotes vera, *Hist. Oxon.* iii. 38. Tanacetum minus album odore Camphoræ, sive Achillea Dioscoridis, *C. B.* 132. **Achilles his Iron-wort.** In Germania, Italia, & Gallia provenit. Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Sanguinis fluxus seu profluvia ubicunque sistit. Extrinsecus Vulneraria est insignis.

X. De

X. De Bellide.

NOtæ sunt, *Florum barbulae diversi à medio disco coloris: caules nudi monanthes*, Raii Synop. 91.

A. Bellis minor, Symphytum minimum, Consolidæ minima, Offic. Bellis sylvestris minor, C. B. 261. *Æt. Reg. Par. An. 1720. 278. Raii Hist. i. 349. Synop. 91. Tourn. Inst. 491. Elem. Bot. 392. Dill. Cat. 46. Boerb. Ind. A. 108. Bellis minor sylvestris simplex, Park. 531. Bellis minor sylvestris, Ger. 510. Emac. 636. Bellis minor sylvestris spontanea, J. B. iii. 111. Chab. 361. Bellis minor pratensis seu vulgaris, Hist. Oxon. iii. 31. **Common Daisie.** In pratis & pascuis. *Usu.* Radix, Folia & Flores. *Vires.* Vulneraria est insignis: exterius in emplastris & fomentis adhibetur: interius succus ejus vulnerariis potionibus admiscetur, R. H. Mulierculis nostris usitatum est, herbam cum floribus Infantibus ad alvum laxandam exhibere, Schrod. Radices exterius usurpantur ad Scrophulas & Strumas, Needham. Extractum sive essentia sanguinem coagulatum resolvit, S. Pauli.*

XI. De Pyrethro.

FLore majore & radicis acri fervidæque sapore à Chamæmelo differt, R. H. p. 353.

A. Pyrethrum, Offic. Pyrethrum Officinarum, Ger. 618. Emac. 758. Pyrethrum vulgare Officinarum, Park. Theat. 858. Pyrethrum flore Bellidis, C. B. Pin. 148. Chomel. 140. Pyrethrum corymbiferum flore Bellidis, Hist. Oxon. iii. 33. Bellis montana frutescens acris, H. Monsp. 31. An Bupthalmum Canariense Leucanthemum, Pluk. Almag. 73. Phytog. 272. 6? **Pellitory of Spain.** Ex Orientis partibus infertur. *Usu.* Radix longa, crassa, foris subrufo colore nigricans, intus albida, sapore acri & admodum fervido. *Vires.* Optimum remedium habetur in Paralyfi linguæ cum vocis amissione. Ad dentium dolorem radix masticata in usu est, R. H. Ad Venerem stimulat, quartanam curat, in Hemisrania juvat, Schrod.

Hoc esse legitimum Pyrethrum affirmant Morisonus vel Robertus, nam quod verum à nonnullis existimatur, est planta Umbellifera. Imposuit auctoribus corrupta Dioscoridis lectio, in floribus siquidem descriptionem exemplaria pro ἀνθήμων perperam substitutam habent vocem ἀνθήων, Hist. Oxon. iii. 34.

XII. De Chamæmelo.

NOtæ sunt, *Folia tenuissimè dissecta; flores sparsi, satis grandes, foliis marginalibus albis discum flavum cingentibus*, R. H. p. 353.

A. 1. Chamæmelum, Offic. Ger. 616. Emac. 755. Mer. Pin. 25. Park. Parad. 289. Chamæmelum vulgare, Mer. Bot. i. 28. Phyt. Brit. 26. Park. Theat. 85. Pharm. Edinb. 6. Chamæmelum Officinarum, Æt. Reg. Par. An. 1720. p. 317. Chamæmelum nobile seu Leucanthemum oderatius, C. B. Pin. 135. Tourn. Inst. 494. Elem. Bot. 395. Boerb. Ind. A. 109. Dill. Cat. Giff. 78. Rupp. Flor. Jen. 139. Chamæmelum nobile, Buxb. 65. Chamæmelum odoratissimum repens flore simplici, J. B. iii. 118. Raii Hist. i. 353. Synop. iii. 185. Hist. Oxon. iii. 35. Chamæmelum Romanum seu Chamæmelum odoratissimum repens flore simplici, Chab. 362. Chamæmelum vulgare odoratum, Schw. 47. Chamomilla Romana Officinarum, Buxb. 65. **Camomile.** In pascuis uliginosis. Junio floret. *Usu.* Folia, seu Herba & Flores. *Vires.* Digerit, laxat, mollit, mitigat dolorem, Menses & Urinam ciet; eapropter usus insignis est in dolore Colico, in cruciatibus spasmi flatulenti, & convulsionibus. Extrinsecus ejus usus est in paregoricis, emollientibus, maturantibus cataplasmatibus, clysteribus, &c. Schrod. Inter omnes plantas quotquot in Balnea contra calculum recipiuntur nihil floribus Chamæmeli efficacius, R. Cat. Angl. p. 65.

A. 2. Chamæmelum flore pleno, Park. Theat. 85. Parad. 290. Chamæmelum Anglicum flore multiplici, Ger. 616. Emac. 755. Chamæmelum nobile flore multiplici, C. B. 135. Chamæmelum repens odoratissimum perenne flore multiplici, J. B. iii. 119. Raii Hist. i. 353. Chamæmelum Romanum, Volck. 101. Chamæmelum Romanum sive nobile, flore multiplici, Chab. 362. **Double Camomile.** In hortis colitur, & eadem specie cum præcedente esse videtur.

A. 3. Chamæmelum vulgare, Offic. Park. Theat. 85. quoad iconatem, Buxb. 65. Chamæmelum, Ger. 615. quoad etiam iconatem, & Emac. 753. Raii Synop. iii. 189. Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis, C. B. Pin. 135. Cod. Med. xxxiv. Tourn. Inst. 494. Elem. Bot. 395. Boerb. Ind. A. 109. Hist. Oxon. iii. 35. Dill. Cat. Giff. 78. Rupp. Flor. Jen. 139. Vaill. Bot. Par. 34. Chamæmelum vulgare amarum, J. B. iii. 116. Raii Hist. i. 355. Chamæmelum

lum majus foliis tenuissimis, caule rubente, *Hort. Monsp.* Chamæmelum elatius, foliis obscure virentibus, semine nigro, *Pluk. Almag.* 97. Anthemis sive Chamæmelum, *Chab.* 362. Chamomilla Officinarum, *Voelk. Flo. Nor.* 100. **Wild or Dogs-Camomile.** In locis incultis & inter segetes. Junio floret. *Ufu.* Herba, flores. *Vires.* Cum prima viribus convenire creditur.

A. 4. Cotula foetida, *Offic. Ger.* 617. *Emac.* 757. *Park. Theat.* 86. *Raii Hist.* i. 355. Chamæmelum foetidum, *C. B.* 135. *Tourn. Inst.* 494. *Boerh. Ind. A.* 109. *Dill. Cat. Giff.* 122. *Raii Synop.* 92. *Rupp. Flor. Jen.* 139. Chamæmelum caninum foetidum, *Schw.* 47. Chamæmelum foetidum, sive Cotula foetida, *J. B.* iii. 120. *Chab.* 363. Chamæmelum annuum præcox foetidum semine aureo, *Hist. Oxon.* iii. 36. **May-weed.** Inter segetes. *Ufu.* Folia. *Vires.* Decoctio non aliter quam Castoreum contra præfocationem Uteri infessu, fomentationibus ac odoratu saluberrima est, *Trag.* Decoctum hujus aut Succus expressus à nonnullis ad Scrophulas cum successu propinari solet, *Cat. Angl.* p. 81.

XIII. De Parthenio.

Notæ sunt, Flores velut in umbella, barbulis albis discum medium luteum ambientibus: odor gravis, *R. Synop.* p. 93.

A. Matricaria, Parthenium, *Offic. Matricaria Ger.* 526. *Emac.* 652. *Raii Hist.* i. 357. *Synop.* 93. *Pharm. Edinb.* 12. *Schw.* 133. Matricaria vulgaris simplex, *Park.* 83. Matricaria vulgaris sive fativa, *C. B.* 133. *Hist. Oxon.* iii. 32. *Tourn. Inst.* 493. *Boerh. Ind. A.* 110. *Dill. Cat.* 140. Matricaria vulgò minus Parthenium, *J. B.* iii. 129. Parthenium, Matricaria, *Chab.* 364. Matricaria Officinarum, *Act. Reg. Par. A.* 1720. p. 283. **Feverfew.** Ad Sepes. Junio floret. *Ufu.* Folia cum floribus. *Vires.* Usus præcipuus in affectibus Uteri frigidis ac flatulentis, in obstructione Mensium, in impotentia Veneris, in Hydrope; purgat per Urinam, nonnunquam & per alvum, &c. In Febribus putridis, in calculo Renum, in Vertigine, & in Arthritide valet, *Schrod.*

XIV. De Bidente.

Notæ sunt, Semen cornutum seu bidens, folia in caule bijuga, flores interdum radiati, aliàs nudæ, *R. Meth. A.* 37.

A. 1. Acnella, *Offic. Akmella, Ahamella, Herm. Mus. Zeyl.* 17. Chrysanthemum bidens Zeylanicum Acnella dictum, *Breyn. Dissert. Bot.* 12. Chrysanthemum Bidens seu Bidens Zeylanicum, flore luteo, Lamii folio, Acnella dictum, *Ejusd.* 20. Cannabina aut Bidens Urticæfolia Indica lithontripica, *D. Hotton, Act. Philos. Lond.* N. 257. p. 365. Senecio Indiæ Orientalis Ocymii majoris folio profundè crenato, *Pluk. Almag.* 343. *Phytog.* 315. Ceratocephalus Ballotes foliis Acnella dictus, *Act. Reg. Par. A.* 1720. p. 326. **Acnella, Achmella, and Admella.** In Insula Zeylanica sat copiosè reperitur, unde in Europam transportatur. *Ufu.* Folia, semen. *Vires.* Diaphoretica est & anodyna, humores viscidos tenaces attenuat, obstructions referat, materiam tartaream in renibus vel vesicâ concretam resolvit, calculosque aliquomodo frangit. Semen in Cholica, Febribus, & Pleuritide optimum est remedium, *Breyn. Dissert.* p. 14.

A. 2. Bidens, *Offic. Bidens, Verbasina, Mont.* 38. Bidens foliis tripartito divisus, *Tourn. Inst.* 462. *Elem. Bot.* 367. *Herb. Par.* 60. *Boerh. Ind. A.* 122. *Buxb.* 39. Verbasina, *Dill. Cat.* 166. Verbasina sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens, *J. B.* ii. 1073. Cannabina aquatica folio tripartito diviso, *C. B.* 321. Eupatorium aquaticum foemina, *Ger. Emac.* 711. *Raii Hist.* i. 360. *Synop.* 93. Eupatorium aquaticum alterum, *Park.* 596. Chrysanthemum Cannabinum Bidens, folio quinque partito, sive vulgare, *Hist. Oxon.* iii. 17. Chrysanthemum aquaticum folio tripartito diviso, *Herm. Flor.* ii. 47. Ceratocephalus vulgaris tripteris & pentapteris folio, *Act. Reg. Par. A.* 1720. p. 327. **Water-Hemp Agrimony.** In aquosis. Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Hepaticum est & vulnerarium, *Buxb.*

De Corymbiferis floribus non radiatis.

XV. De Chamæcyparisso.

Notæ sunt, Superficies fruticosa, perennis, folia odorata; flores solitarii ramulos terminantes, *R. H.* p. 358.

A. Abrotanum foemina, Chamæcyparissus, *Offic. Abrotanum foemina, Pharm. Edinb.* 1. *Schw.*

223. Abrotanum scemina vulgare, *Park.* 95. *Raii Hist.* i. 359. Abrotanum scemina foliis teretibus, *C. B.* 136. *Hist. Oxon.* iii. 11. Abrotanum scemina five Santolina, *Park. Parad.* 449. Chamæcyparissus, *J. B.* iii. 133. *Ger. desc.* 951. *Emac.* 1109. Chamæcyparissus; Santolina, *Chab.* 366. Santolina foliis teretibus, *Elem. Bot.* 365. *Tourn. Inst.* 460. *Boerb. Ind. A.* 123. *Aët. Reg. Par. An.* 1719. 311. **Lavender-Cotton.** In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Convenit qualitatibus cum Abrotano mare, usufque præcipui est in obstructionibus Hepatis, Renum, & Ureterum; Icterus curat; Ventris Lumbricos interimit, tum semen, tum herba ipsa in lacte cocta, & pota, *R. H.* Folia sicca ad sistenda alba sceminarum profluvia conferre scribit *Matthiolus*.

XVI. De Costo hortorum.

NOtæ sunt, Flores lutei nudi in umbellam aggesti, folia integra, lata, in ambitu crenata, odor validus, *R. H.* p. 363.

A. Balsamita mas, Costus hortorum, *Offic.* Balsamita mas, *Ger.* 523. *Emac.* 648. Balsamita mas, five Costus hortorum major, *Park. Parad.* 482. Balsamita major, *Boerb. Ind. A.* 125. *Hist. Oxon.* iii. 3. *Aët. Reg. Par. An.* 1719. 280. Costus hortorum major, *Park.* 78. Mentha hortensis corymbifera, *C. B.* 226. Mentha corymbifera five Costus hortensis, *J. B.* iii. 144. *Raii Hist.* i. 363. Mentha corymbifera Græca, Romana, Sarracenica, five Costus hortensis, *Chab.* 368. Tanacetum foliis & odore Menthæ, *Herm. Cat.* 697. *Tourn. Inst.* 461. Tanacetum hortense Lepidii foliis ferratis, Ageratum intense redolens, *Pluk. Almag.* 361. Tanacetum hortense foliis & odore Menthæ, *Hort. Lugd. Bat.* 697. Ageratum latifolium ferratum, *Hort. Monsp.* 7. Mentha Sarracenica, *Offic. Germ. Costmary.* In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Sanat cruditates Stomachi, rictus, vomitus, foetores oris, tormina, cardialgias ex Stomacho, dolores capitis ex eodem, *Hofman.*

Prodest etiam in Cachexia, ad uterinos frigidos affectus utiliter adhiberi solet, mensesque provocat. Semen lumbricos expellit, *Hist. Oxon.* Sanat vulnera. Specificæ Opio aliisque venenis assumptis resistere creditur, *Buxb.*

XVII. De Agerato.

NOtæ sunt, Flores lutei, nudi, in umbellæ formam dispositi, folia integra profundè serrata, *R. H.* p. 364.

A. Ageratum, Eupatorium Mesues, *Offic.* Ageratum foliis serratis, *C. B.* 221. *Boerb. Ind. A.* 125. Ageratum plerisque, Herba Julia quibusdam, *J. B.* iii. 142. Ageratum, Herba Julia, *Chab.* 367. Ageratum vulgare five Costus hortorum minor, *Park.* 78. *Raii Hist.* i. 364. Achillea lutea Agerati folio longiore, *Aët. Reg. Par. An.* 1720. 322. Balsamita scemina, *Ger.* 523. Balsamita scemina, five Ageratum, *Ger. Emac.* 648. Ptarmica lutea suaveolens, *Elem. Bot.* 398. *Tourn. Inst.* 497. **Daublin.** In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Planta cum foliis & floribus. *Vires.* Temperamento & viribus cum præcedente convenit, *R. H.*

XVIII. De Tanaceto.

Characteristicæ sunt, Flores nudi, flavi, in umbellæ formam digesti, folia laciniata, *R. Synop.* p. 58.

A. Tanacetum, *Offic.* *Ger.* 525. *Emac.* 650. *Chab.* 365. *Raii Hist.* i. 365. *Synop.* 93. Tanacetum vulgare, *Park.* 80. *Parad.* 482. Tanacetum vulgare luteum, *C. B.* 132. *Tourn. Inst.* 461. *Hist. Oxon.* iii. 2. Tanacetum vulgare flore luteo, *J. B.* iii. 131. **Tausse.** In agrorum marginibus, Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Temperamento & viribus cum Parthenio convenit. Vulnerarium, Uterinum, ac Nephriticum est. Usus præcipuus in Lumbricis, torminibus Ventris, Calculo Renum & Vesicæ, Mensibus obstructis, Flatibus & Hydrop. *Schrod.* Aqua distillata Vermes necat.

XIX. De Bupthalamo.

NOtæ sunt, Folia tenuia, Chamæmeli flos radiatus, calyx squamosus.

Bupthalmum, *Offic.* *Chab.* 364. Bupthalmum Cotulæ folio, *C. B.* 134. *Raii Hist.* i. 341. Bupthalmum peregrinum, *Alp. Exot.* 321. Bupthalmum alterum Cotulæ folio, *Park.* 1371. Bupthalmum peregrinum Alpino, *ijusd.* 1371. Bupthalmum verum, *Ger.* 607. *Emac.* 746. Bupthalmum tenuifolium folio Millefolii ferè, *J. B.*

J. B. iii. 124. *Hist. Oxon.* iii. 16. Chrysanthemum Cotulæ folio, *Her. Cat.* 145. Chrysanthemum folio Cotulæ, *Flor.* ii. 46. Chrysanthemum alterum Cotulæ latiori folio, *P. Al.* Cotula flore luteo radiato, *Elem. Bot.* 396. *Tourn. Inst.* 495. *Dr. Cyp.* In locis orientalibus sponte oritur; apud nos in hortis curiosorum nutritur. Junio floret. *Ufu.* Herba, flos. *Vires.* Herba vulneraria est. Flores cum cerato triti tumorum duritias discutunt, *Diosc.*

Bupthalmi nomine variae donantur plantæ; *Imperatus* hoc legitimum esse statuit, cui & nos subscribimus; *Bupthalmum* enim sceniculi folia habere affirmat ipse *Dioscorides*.

XX. De Absinthio.

Notæ sunt, Flores nudi, caulis indeterminatus, folia incana, amaror insignis, Raii Synop. pag. 58.

A. 1. Absinthium vulgare, *Offic. Park.* 98. *Raii Hist.* i. 366. *Synop.* iii. 188. Absinthium vulgare majus, *J. B.* iii. 168. *Hist. Oxon.* iii. 7. Absinthium latifolium five Ponticum, *Ger.* 937. *Emac.* 1096. Absinthium Ponticum seu Romanum Officinatum, seu *Dioscoridis*, *C. B.* 135. *Tourn. Inst.* 457. *Boerb. Ind. A.* 126. *Wormwood.* In incultis, floret Julio. *Ufu.* Folia & summitates. *Vires.* Stomachicum, Hepaticum, & Splenicum imprimis est. Ventriculum & Hepar roborat, appetentiam ad cibum excitat, obstructions referat, & inde natos affectus tollit, ut Icterus, Hydropem, &c. Febribus putridis etiam diuturnis confert; vitiosos humores per urinam expurgat; pellit præterea interterraneorum vermes, tandemque à tineis conservat, *R. Cat. Angl.* p. 2.

Cum *Gerardo, G. Bauhino*, aliisque, hanc speciem Absinthium Ponticum *Dioscoridis* esse existimo: Vulgare enim Romanum est, sic olim dictum, quod fuerit Plebi Romanæ sacrum, & quod in agro Romano, antiquisque rudibus passim iaveniatur; Ponticum verò, à Ponto, in quo plurimum nasci traditur: Unde falluntur, qui Vulgare aliud à Romano & Pontico existimant.

A. 2. Absinthium Romanum, *Offic.* Absinthium Ponticum five Romanum vulgare, *Park.* 98. *Raii Hist.* 367. Absinthium tenuifolium Ponticum *Galenii*, *Ger.* 937. *Emac.* 1096. Absinthium Ponticum tenuifolium incanum, *C. B.* 138. *Tourn. Inst.* 457. *Boerb. Ind. A.* 126. Absinthium

Ponticum vulgare, folio inferius albo, *J. B.* iii. 175. *Hist. Oxon.* iii. 8. Roman Wormwood. In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Folia ac summitates. *Vires.* Cum priore convenit. Sed mitiori, palato etiam magis grato. Ex longo usu comorum hujus, quæ Saccharo adservate fuerant, Hydropicos quosdam quasi deploratos sanitati restitutos se novisse, scribit *Matth.*

A. 3. Absinthium Alpinum, *Cod. Med.* ii. Absinthium Alpinum candidum humile, *C. B. Pin.* 339. *Prod. 71.* *Tourn. Inst.* 458. Mountain Wormwood. In Alpibus Sabaudorum. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenire videtur.

A. 4. Absinthium Ponticum Antiquorum; an Absinthium Orientale fruticosum, incanum, amplo folio tenuissimo divisum, *Tourn. Cor.* 33? *Boerb. Ind.* 126? Pontick Wormwood. Videtur mihi id genus esse Absinthii, cujus meminit *Tournefortius* in Itinerariis, quodque Absinthium Ponticum Antiquorum putat; hoc recentioribus, illo teste, ignotum est, etiam si plus viginti jam annis in Regiis apud Parisios hortis viguerit.

A. 5. Absinthium Seriphium, *Offic.* Absinthium marinum album, *Ger.* 940. *Emac.* 1099. *Raii Hist.* i. 370. *Synop.* iii. 188. *Boerb. Ind. A.* 126. Absinthium Seriphium five marinum Anglicum, *Park.* 102. Absinthium Seriphium Belgicum, *C. B.* 139. *J. B.* iii. 178. *Hist. Oxon.* iii. 9. *Tourn. Inst.* 458. Sea Wormwood. In locis maritimis, Julio floret. *Ufu.* Folia ac summitates. *Vires* eadem cum reliquis. Mulierculæ Botanopolæ Londinenses Absinthium Romanum vocant.

A. 6. Absinthium Seriphium Gallicum, *Offic. C. B. Pin.* 139. *Tourn. Inst.* 458. *Elem. Bot.* 363. *Hist. Oxon.* iii. 9. *Magnol. Bot.* 1. *Chomel.* 431. Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonense, *J. B.* iii. 177. *Chab.* 373. *Raii Synop.* iii. 189. Absinthium Seriphium Narbonense, *Park. Theat.* 102. *Raii Hist.* i. 370. Absinthium minus tenuifolium altè incisus foliis, cinereum, falsum, Hispanicum, *Barr. Obs.* 1008. *Icon.* 460. French Sea Wormwood. In maritimis Narbonen. & Anglicanis. *Ufu.* Herba. *Vires* eadem cum reliquis maritimis.

A. 7. Absinthium Santonicum, *Offic.* Absinthium Santonicum Gallicum, *C. B.* 139. *Tourn. Inst.* 458. *Magnol. Bot. App.* 289. *Hort. Monsp.* 2. French Wormseed. In Gallia Narbonensi

reperitur cum Seriphio Gallico permixtum. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Seriphio viribus convenit, *Diosc.*

A. 8. Santonicum & Semen Sanctum, *Offic.* Sementina, *Ger.* 941. *Emac.* 1100. Absinthium Santonicum Alexandrinum, *C. B.* 139. *Raii Hist.* i. 368. *Hist. Oxon.* iii. 7. Absinthium Santonicum Alexandrinum, five Smentina, & Semen Sanctum, *Park.* 102. Lumbricorum Semen vulgare & Matthioli, *J. B.* iii. 180. **Wormseed.** Ex Alexandria adfertur. *Ufu.* Semina parva, oblonga, quasi ex squamosis tuniculis compacta, flavescentia, amara sunt cum acrimonia, & odore graviusculo. *Vires.* In Lumbricis cujuscunque generis enecandis, fugiendis, & expellendis, *Schrod.* V. plura apud *Februm in Histor. Absinthii.*

A. 9. Absinthium Santonicum Judaicum, *C. B.* Pin. 139. *Raii Hist.* i. 369. *Ghemel.* 445. *Hist. Oxon.* iii. 8. Lumbricorum Semen Rauwolfio, *J. B.* iii. 180. Lumbricorum Semen, five Absinthium Santonicum Rauwolfii, *Chab.* 375. Scheha Arabum. **Arabian Wormseed.** Ex Judæa ad Alexandriam transportatur.

Non levis est controversia inter Botanicos de Lumbricorum seminibus Officinarum: aliis Zedoariæ semina esse affirmantibus, aliis Absinthii. Zedoariæ semina non esse audacter affirmare audent, quia hæc rotunda sunt & fusca, & vasculo tricapsulari contenta; quæ notæ Lumbricorum femini *Offic.* nostratibus superius descripto nullatenus conveniunt. Alii idcirco, ut dixi, Absinthii cujusdam semina esse opinantur, cujus *C. Baubinus* in *Pinace*, pag. 139. non pauciores quatuor species producit; quarum primam & secundam, non tantum unam & eandem plantam esse credo, verum illam ipsam quæ nostra Lumbricorum semina profert. *Rauwolfius* eam in *Palestina* ubique provenire scribit. Utrum ad caput de Absinthio propriè pertineat, an ad illud de Abrotano potiùs referenda, impræsentiarum determinare non libet.

A. 10. Santonicum viride, *Offic.* Chouan, *Pomet.* **Green Wormseed.** Semini Lumbricorum superius descripto simile est, majus duntaxat, & coloris luteo-viridis. *Vires.* Cum priori viribus convenit.

Huic simile, si non idem, me vidisse aliquando memini apud Pharmacopolas Londinenses. *Pometus* ad Parisios è Turcia primò allatum esse affirmat.

A. 11. Heliochrysum, *Offic.* *Chab.* 369. Heliochryson, *Park. Parad.* 374. Heliochryson quorundam, foliis Abrotani, *J. B.* iii. 150. Heliochryson foliis Abrotani, *C. B.* 264. Coma aurea, five Heliochryson, *Ger.* 520. *Emac.* 645. Absinthium tenuifolium corymbis æqualibus seu compactis, *Hist. Oxon.* iii. 8. Absinthium corymbiferum annuum, *Elem. Bot.* 363. *Tourn. Inst.* 458. **Golden Cudweed.** In hortis apud nos colitur. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Contra serpentum ictus, coxendicum dolores, urinæ stillicidia, ruptaque commendatur; ciet menses, & sanguinem concretum dissolvit, distillationes sistit, *Diosc.*

XXI. De Abrotano.

EST Herba, caule indeterminato, flore nudo, fruticosa, foliorum laciniis angustioribus, longioribus, minusque incanis quàm Absinthii, *R. Synop.* p. 58.

A. 1. Abrotanum mas, *Offic.* *Ger.* 947. *Emac.* 1105. *Raii Hist.* i. 371. Abrotanum vulgare, *J. B.* iii. 192. Abrotanum, *Chab.* 376. Abrotanum mas vulgare, *Park.* 92. Abrotanum mas angustifolium majus, *C. B.* 136. *Tourn. Inst.* 459. *Boerb. Ind. A.* 127. Abrotanum mas vulgare Fuchii, *Hist. Oxon.* iii. 11. **Southernwood.** In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Folia ac summitates. *Vires.* Substringit, & validè discutit; resistit putredini ac veneno; moribus venenatorum animalium medetur; vermes necat; urinam movet; impetus hystericos discutit; regium morbum solvit. Extrinsecus usus est in ossibus exsiccandis, roborandisque; ad Alopeciam etiam tollendam commendatur, *Schrod.*

A. 2. Artemisia tenuifolia, *Offic.* *Hist. Oxon.* iii. 6. Artemisia tenuifolia seu Leptophyllos, aliis Abrotanum, *J. B.* iii. 194. Artemisia tenuifolia seu Leptophyllos, quibusdam Abrotanum sylvestre, *Chab.* 375. Abrotanum campestre, *Ger.* 948. *Emac.* 1106. *Raii Hist.* i. 371. *Synop.* iii. 190. *C. B.* Pin. 136. *Park. Theat.* 94. *Tourn. Inst.* 459. *Boerb. Ind. A.* 127. Abrotanum inodorum, *Schwenck.* 5. **Fine-leaved Bugwort.** In locis arenosis reperitur. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Dolorem ventriculi & nervorum mitigat. Pro Artemisia vendi Pharmacopœis Germanicis à vetulis aliquoties vidit *Buxbaum.* Præcedentis loco substituitur, *Ind. Med.* i.

XXII. De

XXII. De Artemisia.

NOtæ sunt, Caulis indeterminatus, folia dissecta, subtus incana, superne viridia; odor & sapor remissior quàm Absinthio, flores purpurascētes, non deorsum nutantes, Raii Synop. p. 59.

A. 1. Artemisia, Offic. Chab. 375. Artemisia vulgaris, J. B. iii. 184. Raii Hist. i. 372. Synop. iii. 190. Park. 90. Artemisia vulgaris major, C. B. Pin. 137. Artemisia latifolia vulgaris major, Hist. Oxon. iii. 5. Artemisia vulgaris major, caule & flore purpurascētib; & albicante, Tourn. Inst. 460. Boerb. Ind. A. 127. Artemisia mater herbarum, Ger. 945. Emac. 1103. **Dugwort.** Ad agrorum margines. Floret Julio. *Ufu.* Summitates. Mollugo foliorum est *Moxa* Germanorum. *Vires.* Uterina est; Menses, Fœtum, Secundinas pellit; fordes abstergit, Schrod.

A. 2. Artemisia Chinenfis, cujus mollugo *Moxa* dicitur, Pluk. Phytog. Tab. 15. Almag. 50. Hist. Oxon. iii. 5. Artemisia orientalis vulgaris facie, Act. Philosoph. Lond. N° 276. p. 1020. Musia pattree, Malab. *Moxa* Kempf. Ed. Angl. App. 27. Amanit. Exot. 589, 600. An Ytze-cuinpatli, Hern? **Dugwort of China.** In China oritur. *Ufu.* Mollugo foliorum *Moxa* dicta hoc modo præparata: Recipientur folia exsiccata probè, & caule suo decerpta, conterantur manibus eousque donec excusso pulvisculo viridi lanuginosæ interiores fibræ velut subtegmen substratæ remaneant. Sin madesiant sudore manus, repetendum opus est ad desideratam teneritudinem. *Vires.* Celebre est remedium in curatione Podagræ per ustionem apud Gentes Orientales, & etiam inter Europæos. V. Busclough, & D. Gul. Temple, Eq. Aurat. de *Moxa*.

XXIII. De Dracone Herba.

Flosculis in spicis dispositis, foliis integris, longis, & angustis, à reliquis distinguitur.

A. Dracunculus, Offic. Dracunculus hortensis, C. B. 98. Dracunculus hortensis five Tarchon, J. B. iii. 148. Chab. 168. Draco Herba, Ger. 193. Emac. 249. Hist. Oxon. iii. 33. Boerb. Ind. A. 127. Raii Hist. i. 373. Draco Herba, five Tarchon, & Dracunculus hortensis, Park. Parad. 500. Abrotanum Lini folio acriori & odorato, Tourn. Inst. 459. Abrotanum mas Lini folio acriori & odorato, Elem. Bot. 364. **Taragon.** In hortis apud nos colitur. Julio floret.

Ufu. Herba. *Vires.* Excalfacit, incidit, digerit, aperit, menses provocat, status dissipat, appetentiam excitat, pituitam educit, & cerebrum humidum purgat.

XXIV. De Gnaphalio.

NOtæ sunt, Folia tomentosa, calix hæmisphæricus, squamosus; flosculi tubulosi, quinquefidi, foliolis interstincti: Semina solida calyptra munita, Boerb. Ind. A. 119.

A. Gnaphalium, Cod. Med. iv. Gnaphalium maritimum, C. B. Pin. 263. Raii Hist. i. 294. Synop. iii. 180. Tourn. Inst. 461. Elem. Bot. 366. Boerb. Ind. A. 119. Gnaphalium maritimum multis, J. B. iii. 157. Gnaphalium, Centunculus, Chab. 370. Gnaphalium legitimum, Pluk. Almag. 171. Gnaphalium marinum, Ger. 516. Emac. 640. Merc. Bot. ii. 22. Phyt. Brit. 48. Mer. Pin. 47. Gnaphalium marinum seu Cotonaria, Park. Theat. 687. Chrysanthemum perenne Gnaphaloides maritimum, Hist. Oxon. iii. 21. Polium Gnaphaloides, Alp. Exot. 146. Tourn. Voy. i. 21. **Sea-Cudweed, or Cotton-weed.** *Ufu.* Herba. *Vires.* De ejus virtute nil commemoratur, ut dicit Boerhavius.

De Herbis Corymbiferis affinis.

I. De Scabiosa.

QUOD flosculi florem componentēs, suis singulis calycibus, à flore delapsis residuis donantur, à reliquis differt, R. Synop. p. 59.

A. 1. Scabiosa, Offic. Scabiosa major vulgaris, Ger. 582. Emac. 719. Scabiosa vulgaris pratensis, Park. 484. Scabiosa pratensis hirsuta quæ Officinarum, C. B. 269. Tourn. Inst. 464. Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato, J. B. iii. 2. Raii Hist. i. 374. Synop. iii. 191. Hist. Oxon. iii. 45. Boerb. Ind. A. 129. **Scabious.** In pascuis. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Alexipharmaca ac Pulmonica est. *Ufus præcip.* in Apostematibus, Pleurisi, Angina, Tussi, Asthmate, Peste, fistulosis ulceribus. Extrinsecus in Scabie, Pruritu, Impetigine, &c. Schrod.

A. 2. Mor-

A. 2. *Morsus Diaboli*, & *Succisa*, *Offic.* *Morsus Diaboli*, *Ger.* 587. *Emac.* 726. *Morsus Diaboli vulgaris flore purpureo*, *Park.* 491. *Succisa glabra*, *C. B.* 269. *Succisa five Morsus Diaboli*, *J. B.* iii. 11. *Chab.* 338. *Raii Hist.* i. 380. *Succisa five Morsus Diaboli Officinatum*, *Volck.* 374. *Scabiosa pratensis nostras præmorsâ radice*, *Hist. Oxon.* iii. 45. *Scabiosa radice succisâ, flore globofo*, *Raii Synop.* iii. 191. *Scabiosa integrifolia glabra radice præmorsâ*, *Herm. Cat.* 538. *Scabiosa folio integro*, *Hort. Monsp.* 180. *Elem. Bot.* 370. *Scabiosa folio integro glabro, flore cœruleo*, *Tourn. Inst.* 466. **Devil's bit.** In pratis & pascuis, Augusto floret. *Usu.* Folia, flores, & radix. *Vires.* Alexipharmaca & vulneraria est, ut *Scabiosa*; cum qua & reliquis facultatibus convenit, &c. *Schrod.*

II. De *Dipsaco*.

Notæ sunt, caules spinosi, flosculi squamis distincti, singuli singulis seminibus insidentes, in capitula congesti, *R. H.* p. 381.

A. 1. *Dipsacus fativus*, *Carduus Fullonum*, *Offic.* *Dipsacus fativus*, *C. B.* 385. *J. B.* iii. 73. *Ger.* 1005. *Emac.* 1167. *Park.* 983. *Raii Hist.* i. 382. *Synop.* iii. 192. *Hist. Oxon.* iii. 168. *Dipsacus, Carduus Fullonum*, *Chab.* 352. **Panured Teasel.** Seritur in agris. Junio floret. *Ufus præcip.* ad pannos depectendos. *Vires.* Radix commendatur in verrucis abigendis, & in Rhagadibus ani sanandis, si in vino decoquitur, *Buxb.* Scrophulas sanat; coctus in vino purgat per urinam non secus ac *Asparagus*, *Raii Hist.*

A. 2. *Dipsacus sylvestris*, five *Labrum Veneris*, *Offic.* *J. B.* iii. 74. *Raii Hist.* i. 382. *Synop.* iii. 192. *Dipsacus sylvestris*, *Ger.* 1005. *Emac.* 1167. *Park.* 984. *Dipsacus sylvestris*, aut *Virga pastoris major*, *C. B.* 385. *Hist. Oxon.* iii. 168. *Boerb. Ind. A.* 233. *Tourn. Inst.* 466. *Dipsacus*, five *Carduus Fullonum sylvestris*, *Chab.* 352. *Dipsacus, Labrum Veneris* ad agrorum margines, *P. B.* 35. *Merc. Bot.* i. 32. **Wild Teasel.** In incultis, Junio floret. *Usu.* Vermiculi in echinis reperti. Hos impari numero pennâ anserinâ inclusos, Febre quartanâ laborantium collis amuleti aut remedii loco appendere vulgus nostratum solet, *R. H.* pag. 382.

A. 3. *Virga Pastoris*, *Offic.* *Park.* 984. *Virga Pastoris vulgaris*, *J. B.* iii. 74. *Chab.* 352.

Dipsacus minor, five *Virga Pastoris*, *Ger. Emac.* 1168. *Merc. Bot.* i. 32. *Raii Hist.* i. 382. *Synop.* iii. 192. *Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Virga Pastoris minor*, *C. B.* 385. *Hist. Oxon.* iii. 168. *Boerb. Ind. A.* 133. **Shepherd's rod.** Ad sepes in humidis & aquosis, Julio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Aquam foliorum in appetitu depravato mulierum laudat *Eginet.* Pulvis commendatur in *Hæmoptysi* ad 3i. *Prax. Mayern.* 167.

III. De *Echinopo*.

Insigni Capitis in sphaericam figuram conglobati notâ ab aliis plantis facile dignoscitur, *R. H.* p. 383.

A. 1. *Crocodilion*, *Offic.* *Echinopus*, *Chab.* 351. *Echinopus major*, *J. B.* iii. 69. *Tourn. Inst.* 463. *Boerb. Ind. A.* 135. *Scabiosa Cardui folio, Sphaerocephala elatior*, *Herm. Cat.* 539. *Carduus globosus*, *Ger.* 990. *Emac.* 1151. *Carduus Sphaerocephalus latifolius vulgaris*, *C. B.* 381. *Raii Hist.* i. 383. *Hist. Oxon.* iii. 163. *Carduus Sphaerocephalus five globosus major*, *Park. Parad.* 332. **Globe Thistle.** In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix, semen. *Vires.* Radix pota sanguinem copiosum per nares pellit: datur lienosis, eos evidenter adjuvans. Semen urinam ciet, *Diosc.*

Crocodilion à *Dioscoride* ita describitur: *Chamaeleontis nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice longâ, lævi, aliquantulum latâ, odore ut Nasturtii acri.* Sed quænam planta sit, quamvis variæ eo nomine à Botanicis Scriptoribus appellentur, non ita facile est determinare. Nonnulli *Carlinam* esse volunt; alii *Eryngium maritimum*. Utraque opinio à *Matthiolo* solidè refutatur, cujus rationes apud Auctorem requirendas omitto. *Andreas Lucana, Adversariorum auctores, & Lobelius in Observationibus*, plantam, quam hic exhibeo, *Crocodilii* nomine donant; quorum auctoritati impræsentiarum sententiam meam submitto, ut quæ descriptioni superius datæ præcipuè convenire videatur.

A. 2. *Spina alba*, *Offic.* *Spina alba* quibusdam capite echinato, *J. B.* iii. 71. *Acantha Caucas, five Spina alba*, *Chab.* 351. *Carduus globosus acutus*, *Ger. Emac.* 1151. *Carduus Sphaerocephalus acutus minor*, *Park.* 977. *Carduus Sphaerocephalus capitulo longis spinis armato*, *C. B.* 382. *Hist. Oxon.* iii. 163. *Raii Hist.* i. 383. *Echinopus folio Acanthi aculeati tenuiter laciniato, flo-*

re albo, Boerb. Ind. A. 135. Echinopus Creticus capite magno aculeato, T. Coroll. 34. Scabiosa acanthoides conglobato capite longis spinis munito, Pluk. Almag. 333. **Prickly Globe-Thistle.** In hortis curiosorum apud nos colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix, Semen. *Vires.* Radix coeliacis efficax est, urinam ciet, decocta dentium dolori prodest. Semen convulsis Infantibus, & à Serpente demorsis auxiliatur, Diosc.

Spina alba Dioscoridis, quam his verbis describit: *Folia fert albi Chamæleontis, angustiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albican-tem, intus cavum: in cacumine capitulum ineft spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: Flores purpurei, in quibus semen, ceu enicum, sed rotundius.* Est etiam planta controversa, quæque eruditorum nonnullorum ingenia vexavit, eo-que in partes distraxit. Anguillarius aliique eam esse, quam hic damus, affirmant, quorum opinio maximè verisimilis videtur, Auctorisque descriptioni præ aliis convenire, ideoque eam ita appellavi.

A. 3. Spina Arabica, *Offic.* Carduus spinosissimus Sphærocephalus rigidis aculeis armata, C. B. 385. Carduus spinosissimus Sphærocephalus, Cardui Arabici nomine missus, Park. Theat. 978. **Arabian Thistle.** In hortis facillè assuescit. Æstate floret. *Usu.* Radix, folia. *Vires.* Folia ad Sanguinis rejectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet, Diosc.

Spina Arabica Dioscoridis est etiam alia planta ambigua; nec mirum, cum nihil aliud de eo dicat, quàm quod naturâ Spinæ albæ similem esse constet. Quod adeò obscurum est, ut nodum hunc Gordianum solvere serè impossibile fuerit. C. Baubinus, eumque secutus Parkinsonus, Plantam, de qua hic agimus, eo nomine missum affirmantes, ut huc referrem mihi auctores fuerunt; quamvis Casalpini & Anguillari. ad aliam plantam, nimirum ad Carduum tomentosum Adversariorum Spinam Arabicam Dioscoridis retulerunt.

A. 4. Ritro, *Offic.* Echinopus minor, J. B. iii. 72. Chab. 351. Tourn. Inst. 463. Carduus globosus minor, Ger. 990. Emac. 1151. Park. Parad. 332. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor, C. B. 381. Raii Hist. i. 383. Hist. Oxon. iii. 163. Scabiosa Cardui folio Sphærocephala humilior, Herm. Cat. 539. Pluk. Almag. 333. **Little Globe-Thistle.** In hortis etiam colitur, Julio florens. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum prima viribus convenit.

Ritra, Tetralicis & Chalceios plantarum meminit Theophrastus, posteriorum duarum etiam Plinius; nullis descriptionibus additis; unde quænam plantæ sint Botanicorum nemo certò determinare potest. Lobelius in iconibus Echinopum, Chab. pro Ritro, Tetralice & Chalceio ejusdem Auctoris accipit. Anguillar. & Lobelius Ritro nomine hanc plantam appellantes, ut eam hic collocarem me induxerunt. Huc etiam transcribam quicquid de iis C. Baubinus in Pinace, pag. 381. habet.

Ῥίτρος Theophrastus 6. Hist. 3. hæc solum habet: alia supernè cacumine tantum ramos spargunt quemadmodum Ruthrum. Sunt tamen qui velint mendose pro ἰσχυρὸν apud Theophrastum legi, quod ex Pliniana, lib. 21. cap. 16. loci illius Theophrasti interpretatione colligitur, cum ibi non Ruthrum, sed Eryngium legatur.

Hæc libuit aspergere, cum huic & sequentibus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: Ut verborum brevis obstat quo minus certi quid statui possit.

Τετραλίξ (quam cum reliquis aculeatis plantis enumerat Theophrastus 6. Hist. 3.) inquit, à quibusdam vocata, æstate floret: Et Plinius, lib. 21. cap. 16. quædam æstate florent, ut Tetralix. Sed non est confundenda cum Erica, quam Athenienses Tetralicen vocant, eodem, lib. 11. cap. 16. auctore.

Χαλκεός (Ærariam Gaza vertit) apud Theophrastum & Plinium esse volunt, cum tamen ejus historia apud neutrum extet: Sic Theophrastus 6. Hist. 3. inter natura spinosas Chalceios, quæ tamen non aculeatis foliis constat: Et Plinius, lib. 21. cap. 16. Item Acarna, Leucacanthos, Chalceos, &c. in foliis non habent aculeos.

IV. De Globularia.

Flosculi in globulum coacti, quorum unusquisque calice privato sustinetur, semen unicum, à flore delapso, residuum continente, Raii Meth. A. 43.

A. Globularia, *Offic.* Mont. Ind. 43. Globularia vulgaris, Tourn. Inst. 467. Elem. Bot. 371. Boerb. Ind. A. 131. Globularia Monspeliensium Bellis cærulea, Park. Theat. 529. Bellis cærulea Monspeliaca, Ger. 512. Emac. 637. Raii Hist. i. 381. Bellis cærulea caule folioso, C. B. Pin. 262. Scabiosa, Bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioso, Hist. Oxon. iii. 51. Aphyllanthus Anguillar. five Globularia bellidi similis, J. B. iii. 13. Chab. 338. **French Daisie.** In hortis curiosorum. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est planta, Ment.

SECTIO