

XI. De Bardana.

NOtæ sunt, Capitula squamata, lappacea, ob squamarum sc. mucrones aduncos, folia amplissima, R. Synop. pag. 54.

A. 1. Bardana major, Lappa, Offic. Bardana major, Ger. 665. Emac. 809. Raii Hist. i. 332. Synop. 88. Schw. 27. Bardana vulgaris major, Park. 1222. Lappa major, Arcium Diolecoridis, C. B. 198. Hist. Oxon. iii. 146. Tourn. Inst. 450. Boerb. Ind. A. 146. Dill. Cat. 168. Buxb. 179. Personata five Lappa major aut Bardana, J. B. iii. 570. Personata, Lappa major, Bardana, Chab. 514. **Woolly-headed Burdock.** Ad vias publicas, &c. Junio floret. *Ufu.* Radix, folia, & semina. Radix oblonga, crassa, foris nigra, intus alba, saporis subdulcis, odoris grati. Semina oblonga, striata, fusca, crassiuscula, sapore subamaro. *Vires.* Siccat, est pulmonica, diuretica, diaphoretica, extergens, subastringens: Hinc convenit in asthma, calculo, expuitione sanguinis, in vulneribus inveteratis, tumore lienis, aliarumque partium, in arthriticis morbis. Semen insignè censeatur Lithontripticum. Folia imponuntur vulneribus inveteratis, articulis luxatis, ambustis, &c. *Schrod.* In febribus & passionibus hysterice plantis pedum applicantur non sine successu.

A. 2. Arctium, Offic. Lappa major montana capitulis tomentosis seu Arctium, C. B. 198. Tourn. Inst. 450. Boerb. Ind. A. 146. Dill. Cat. 162. Buxb. 174. Hist. Oxon. iii. 147. Bardana major altera, Ger. Emac. 810. Raii Hist. i. 332. Bardana major lanuginosis capitulis, Park. 1222. Bardana montana, Schw. 28. Personata seu Lappa altera cum capitulis villosis, Chab. 514. Personata altera cum capitulis villosis, J. B. iii. 571. Personata montana capitulis magis tomentosis, Raii Synop. 88. **Woolly-headed Burdock.** In locis ruderatis, & ad vias, Julio floret. *Ufu.* Radix, semen. *Vires.* Cum priore viribus pollet. Decocta cum semine radix in vino dentium dolores mulcet, si contineatur in ore decoctum: ambusta perniciosaque fovetur eodem: bibitur adversus coxendicum dolores & stranguriam è vino, Diosc.

SECTIO OCTAVA.

De Herbis Monospermis.

Herbæ Monospermæ semine nudo Notæ sunt, Flos petalodes; Semina nuda, ad singulos flores singula.

Herbæ Monospermæ sunt vel feminibus

Pappo innascente alatis, flosculis in summis caulibus exiguis, velut in umbella, caule tereti & inani, foliis per intervalla binis vestito: *Valeriana.*

Pappo carentibus, foliis simplicibus,

Terrestres, caule

Dichotomo, seu in binos ramos divaricato, & utroque ramo in alios binos, &c. *Valerianella.*

Ramoso, floribus

Speciosis, in foliorum alis alternatim exantibus: *Mirabilis Peruviana.*

In spicas congesti: *Dentillaria.*

Maritimæ, caulibus nudis, flosculis in summitate: *Limonium.*

Varie & tenuiter dissectis, glaucis, floribus ad papilionaceos accedentibus: *Fumaria.*

Triangulatis, umbellatarum in modum, floribus staminosis, seminibus striatis: *Thalictrum.*

Pinnatis, cauli simplici, rectè assurgente, vel non ramoso, vel ramos è lateribus emittente, floribus in spicas congestis.

Crassiores & habitiores, seminibus densius stipatis, tetragonis: *Pimpinella.*

Tenuiores & productiores, flosculis rariùs dispositis, seminibus echinatis, floribus hexaphyllis flavis: *Agrimonia.*

I. De Valeriana.

NOtæ sunt, Folia in caule bina adversa, flores monopetali velut in umbella, semina ad singulos flores singula, R. Synop. p. 60.

A. 1. Phu majus, five Valeriana major, Offic. Park. 119. Valeriana hortensis, Ger. 917. Emac. 1075. Valeriana hortensis flore albo, Rivin. Mon. irr. Tab. 3. Valeriana hortensis, Phu Olusatris folio

folio Dioscoridis, *C. B.* 164. *Hist. Oxon.* iii. 101. *Tourn. Inst.* 132. Valeriana major hortensis, *Mor. Umb.* 52. *Boerb. Ind. A.* 74. Valeriana major odorata radice, *J. B.* iii. 209. *Raii Hist.* i. 388. **Garden Valerian.** Junio floret. *Usu.* Radix & folia. Radix oblonga, rugosa, digitum crassa, subtus fibrosa, foris ex cinereo fusca, intus pallida, sapore & odore aromatico ad Nardum accedenti. *Vires.* Alexipharmaca, Sudorifica, ac Diuretica est. *Ufus* præcip. in imbecillitate Visus, Peste, Asthmate, Tussi, Pleuritide, obstructione Hepatis, Lienis, Ureterum, Hernia, Ictero, &c. *Schrod.* Vulneraria est.

A. 2. Valeriana sylvestris, *Offic.* Valeriana, *Riv. Mon. irr. Tab.* 2. Valeriana sylvestris major, *Ger.* 917. *Emac.* 1075. *Park.* 122. *C. B.* 164. *Raii Hist.* i. 388. *Synop.* iii. 200. *Hist. Oxon.* iii. 101. *Tourn. Inst.* *Boerb. Ind. A.* 74. Valeriana major sylvestris, foliis latioribus, *Mor. Umb.* 50. Valeriana sylvestris magna aquatica, *J. B.* iii. 209. *Chab.* 411. Valeriana five Phu majus sylvestre, *Phyt. Brit.* 127. Phu, Dioscoridis, *Col. Phytob.* 113. Phu Dioscoridis verior, *Col. Eph.* i. 210. Phu & Valeriana Officinarum Germanorum, *Volck.* 39. **Great Wild Valerian.** In sylvis & dumetis, præsertim humidis, & ad aquas. Maio, Junio, & Julio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Pulvis ad coch. semiss. in vino aut quovis liquore exhibitus, certum est remedium contra Epilepsiam. Pueris tamen minore dosi exhibetur in lacte, *Column.* Ruptis, convulsis, & ex alto præcipitatis utilis. Ad oris & gingivarum inflammationes, exulcerationes, & aphthas prodest, *H. Ox.* Contra febres tertianas valet, *Schwab.*

A. 3. Phu minus, & Valeriana minor, *Offic.* Valeriana minor, *Ger.* 916. *Emac.* 1075. *Riv. Mon. irr. Tab.* 3. *Raii Hist.* i. 388. Valeriana sylvestris minor, *Park.* 122. *Raii Synop.* iii. 200. Valeriana palustris minor, *C. B.* 164. *Hist. Oxon.* iii. 101. *Tourn. Inst.* 132. *Boerb. Ind. A.* 74. Valeriana minor pratensis vel aquatica, *J. B.* iii. 211. *Chab.* 411. Valeriana minor perennis palustris, *Mor. Umb.* 50. **Small Valerian.** In pratis humidis, Maio floret. *Usu.* Radix, & folia. *Vires.* Ut in externa facie cum sylvestre, ita in viribus convenire creditur, sed mitiori.

A. 4. Nardus Celtica, *Offic.* *J. B.* iii. 205. *Chab.* 410. *Ger.* 919. *Emac.* 1079. *Raii Hist.* i. 391. Nardus Celtica Dioscoridis, *C. B.* 165.

Nardus five Spica Celtica, *Park.* 117. **Celtick Spikenard.** *Usu.* Radix cum foliis. Radices fibrosæ sunt, capillares, nigricantes, cum foliis parvis ex viridi flavescentibus, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, graviusculi. *Vires.* Ut genere & facie externa cum Valeriana, ita & viribus convenire videtur, *R. H.* pag. 391. Calfacit, & siccatur; viriūque earundem est cum Spica Indica, majore tamen utilitate adhibetur in urina cienda, ventriculo roborando, flatibus discutiendis. Extrinsecus additur Malagmatis, Unguentisque calfacientibus, *Schrod.*

A. 5. Nardus montana, *Offic.* *Ger.* 920. *Emac.* 1079. *Chab.* 410. Nardus montana tuberosa, *Park.* 116. Nardus montana radice olivari, *C. B.* 165. *Raii Hist.* i. 392. Valeriana Nardus dicta radice olivari, *Hist. Oxon.* iii. 103. **Poumcaïn Spikenard.** In montibus Neapolitanis. Æstate floret. *Usu.* Radix cum foliis. *Vires.* Ad eadem ad quæ Celticum efficax, *Diosc.*

II. De Valerianella.

Seminibus pappo destitutis à Valeriana differt, caulibus dichotomis ab aliis ferè omnibus plantis, Raii Meth. A. p. 44.

A. Lactuca agnina, *Offic.* *Ger.* 242. *Emac.* 310. *Park.* 812. *Phyt. Brit.* 64. *Mer. Pin.* 68. Valeriana campestris inodora major, *C. B.* 165. *Raii Hist.* i. 392. Valerianella arvensis præcox humilior, semine depresso, *Mor. Umb.* 53. *Raii Synop.* iii. 201. *Tourn. Inst.* 132. *Boerb. Ind. A.* 75. *Herm. Cat.* 617. *Dill. Cat.* 47. Pseudovaleriana annua arvensis præcox, humilis, semine compresso rotundo, *Hist. Oxon.* iii. 104. Locusta Herba prior, *J. B.* iii. 323. Locusta Herba, Pes Locustæ, *Chab.* 437. **Lamb's Lettuce, or Corn-Sallet.** Inter segetes, & in hortis, Vere floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Refrigerat, & humectat; facultatēque & temperamento haud dissimilis Lactucæ, cujus loco hybernus & primis Veris mensibus inter olerum obtinet locum.

III. De Dentellaria.

Hujus notæ sunt, Fructus oblongi, hirti, villis armati; flores è tubo oblongo in quinque segmenta expansi, & in spicas congesti, folia alterna, R. Meth. A.

A. Den-

A. Dentellaria, *Offic. Ind. Med.* lxx. Plumbago, Molybdena, Dentillaria, *Mont.* 50. Plumbago Plinii, *Ger.* 1069. *Emac.* 1254. *Raii Hist.* i. 394. *Hist. Oxon.* iii. 599. Plumbago quorundam, *Tourn. Inst.* 140. *Elem. Bot.* 117. Dentellaria Rondeletii, *J. B.* ii. 941. *Chab.* 294. Lepidium Dentellaria dictum, *C. B. Pin.* 97. Lepidium Monspelicum Dentellaria dictum, *Park. Theat.* 885. **Leadwort.** In Gallia & Italia nascitur. Augusto floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Caustica est planta. Dolores dentium mitigat carpis applicata, aliis vero manu tantum retenta.

IV. De Limonio.

A Congeneribus distinguitur loco natali, & caulibus nudis, ramosis, *Raii Synop.* p. 62.

A. Limonium & Behen rubrum, *Offic.* Limonium, *Ger.* 332. *Emac.* 411. *Raii Hist.* i. 395. *Synop.* iii. 201. *Chab.* 508. Limonium majus vulgatius, *Park.* 1234. Limonium maritimum majus, *C. B.* 192. *Hist. Oxon.* iii. 600. *Boerb. Ind. A.* 76. *Tourn. Inst.* 342. Limonium majus, multis, aliis Behen rubrum, *J. B.* iii. 876. **Sea-Labender.** In maritimis, Junio floret. *Usu.* Radix & folia. *Vires.* Astringit; proinde Diarrhoeæ, Dysenteriae, Hæmorrhagiæ, & nimio Mensium fluxui medetur, *R. H.* p. 395. In Officinis Pharmacopolarum radices duæ nomine Behen albi & rubri ostenduntur, sed quid sint non ausim determinare; inter Auctores enim controversatur. *C. Bauhinus* utrumque Serratulæ affinis capitulo squamoso, luteo, ut & flore, titulo comprehendit. Behen aut Arabibus, ut *Seraphioni*, sunt radices Pastinacæ radicibus similes; scribit *Haly-Abbas*, Behen & Pastinacæ sylvestris radices nullum inter se discrimen habere: Hinc *Johannes Costa* super *Mesuem* pro Behen albo & rubro Carotæ albæ & rubræ radices substituit, ut nos monuit eximius ille Botanicus *Leonard. Plukenet*, M. D. Nec Veteribus tantum, sed etiam Modernis, quid sint hæ radices inter se minimè convenit; alii enim Behen rubrum Limonii maritimi, alii Valerianæ rubræ, alii Bistortæ, alii Tormentillæ, alii Caryophyllatæ speciem esse autumant. Nos verò, cum Neotericis radicem Limonii, vel ipsum Behen rubrum esse, vel pro succedaneo ejus haud temerè usurpari posse opinamur. Quod ad Behen album attinet, ejus tractationem ad caput de Lychnide rejicimus.

V. De Mirabilia Peruviana.

NOtæ sunt, Semina oblongo-rotunda, sulcata, pentagona, umbilicata, nucleum farrinaceum continentia, flores è tubo pentagonum orbem dispositos, folia, & ramos conjugatos, *Raii Meth. A.* p. 45.

A. Mirabilia Peruviana, *Ger.* 272. *Emac.* 343. *Park. Parad.* 364. *Raii Hist.* i. 398. Mirabile Peruvianum, *Hist. Oxon.* iii. 598. Solanum Mexiocanum flore magno, *C. B. Pin.* 168. Jesminum Mexicanum sive Flos Mexicanus multis, *J. B.* ii. 814. Jesminum Mexicanum, Flos Mexicanus, *Chab.* 268. Haquilin, Mirabili Pervana, *Hern.* 279. Jalapa flore purpureo, *Tourn. Inst.* 129. *Boerb. Ind. A.* 78. *Chom.* 58. Jalapa flore vario eleganti, *Elem. Bot.* 705. **Warvel of Peru.** In hortis colitur. Augusto floret. *Usu.* Folia, radix. *Vires.* Folia contusa tumores frigidus dissipant; radix recens ad unciam unam vel duas (in aqua cocta) epota egregiè purgat Hydropicos, *Boerb. Hist. Plant.* p. 123. Duas drachmas radices intus sumptas egregiè aquas educere, scripsit *Cortusius* ad *Clusium*, *Hist. Pan.* 395.

VI. De Fumaria.

NOtæ sunt, Folia Umbellatarum in modum divisa; flores spicati ad papilionaceos accedentes, in calcar quoddam retorsum producti, pediculo è media parte egresso hærentes, *R. Synop.* p. 62.

A. Fumaria, *Offic.* *Chab.* 377. Fumaria purpurea, *Ger.* 927. *Emac.* 1088. Fumaria vulgaris, *Park.* 287. *J. B.* iii. 201. *Raii Hist.* i. 405. *Synop.* iii. 204. Fumaria Officinarum & Dioscoridis, *C. B.* 143. *Tourn. Inst.* 422. *Boerb. Ind. A.* 308. Fumaria vulgaris latifolia, filiquis curtis, non bivalvibus, *Hist. Oxon.* ii. 261. Herba Melancholifuga, *Cat. Altd.* **Fumitorij.** In fatis & aggeribus, Maio floret. *Usu.* Planta integra. *Vires.* Splenetica est, ac hepatica; attenuat; serofos, biliosos, ac adustos humores sensim expurgat, viscera reserat, reserata roborat, sanguinem purificat. Hinc usus præcip. in Scorbuto, aliisque morbis Mesenterii, & Lienis, in Ictero, in Scabie omnis generis, & sim. *Schrod.*

VII. De

VII. De Agrimonia.

NOtæ sunt, Folia pinnata, flores hexapetali, fructus lappaceo infidentes, cui bini intus nuclei, R. Synop. p. 61.

A. Agrimonia, Eupatorium Græcorum, Offic. Agrimonia, Ger. 575. Emac. 712. Raii Hist. i. 400. Synop. iii. 202. Agrimonia vulgaris, Park. Theat. 594. Agrimonia Officinarum, Tourn. Inst. 301. Boerb. Ind. A. 79. Agrimonia seu Eupatorium, J. B. ii. 398. Chab. 172. Eupatorium Veterum five Agrimonia, C. B. Pin. 321. Eupatorium Veterum five Agrimonia inodora, vel minus odora, Hist. Oxon. ii. 614. **Agrimony.** In agrorum marginibus, Junio floret. Ufu. Folia. Vires. Hepatica nobilissima imprimis est, vulnerariaque, & splenetica; ideoque usu creberrimo venit in morbis ac Hepatis imbecillitate ortis, uti sunt Hydrops, Cachexia, Icterus. In usu etiam est in Catarrhis, Tussi, Menstruisque retentis. Extrinsicus adhibetur sæpissimè in Balneis, & Lotionibus, Schrod.

VIII. De Pimpinella.

Folia pinnata, flores spicati, semina quadrata, quibus infident flores tetrapetali, staminosi, R. Synop. p. 62.

A. 1. Pimpinella & Sanguisorba, Offic. Pimpinella hortensis, Ger. 889. Emac. 1045. Mer. Pin. 94. Pimpinella vulgaris five minor, Park. Theat. 582. Raii Hist. i. 401. Pimpinella, Sanguisorba minor hirsuta lævis, C. B. Pin. 160. Hist. Oxon. iii. 263. Tourn. Inst. 157. Elem. Bot. 129. Boerb. Ind. A. ii. 99. Pimpinella, Sanguisorba minor, Merc. Bot. i. 59. Phyt. Brit. 92. Chab. 398. Sanguisorba minor, J. B. iii. 113. Raii Synop. iii. 203. Dill. Cat. Giff. 55. Buxb. 293. Sanguisorba minor montana lævis hirsuta, Rupp. Flor. Jen. 50. **Burnet.** In montosis pascuis, Junio floret. Ufu. Folia. Vires. Alexipharmaca, vulneraria, ac pulmonica est. Ufus præcipuus in Catarrhis, affectibus Pulmonum, Phthisi ex erosione, in morbis malignis, in fluxu alvi, Hæmorrhoidum; præcavet Abortum, corroborat. Extrinsecus in Hæmorrhagia quacunquè utiliter adhibetur, Schrod.

A. 2. Cuminum sylvestre, Offic. Ger. 908. Emac. 1067. Park. Theat. 372. Raii Hist. i. 402. Chab. 384. Cuminum sylvestre capitulis globosis, C. B. Pin. 146. Cuminum sylvestre

primum valde odoratum, globosum, J. B. iii. 23. Cuminoides vulgare, Tourn. Inst. 300. Elem. Bot. 250. Boerb. Ind. A. 132. Pastinaca tenuifolia Cretica capitulis globosis, Mor. Umb. Tab. 4. Daucus odoratus Creticus Sanguisorbæ capitulis villosis, Pluk. Almag. 130. Umbelliferis affinis capitulis globosis & villosis, Hist. Oxon. iii. 265. **Cumina.** In Insula Creta, &c. locis glareosis. Ufu. Semen. Vires. Adversus tormina, inflationesque commendatur; singultus sedat, fugillata tollit, testium inflammationes repellit.

IX. De Thaliactro.

Characteristicae sunt, Folia umbellatarum in modum divisa, flores staminosi, semina ut in umbelliferis striata, R. Synop. p. 101.

A. 1. Thaliactrum, Offic. Thaliactrum seu Thaliactrum, Merc. Bot. 72. Phyt. Brit. 120. Thaliactrum seu Thaliactrum majus, Ger. 1060. Emac. 1251. Raii Hist. i. 403. Synop. iii. 203. Mer. Pin. 117. Thaliactrum majus vulgare, Parkinson. Theat. 263. Hist. Oxon. iii. 324. Thaliactrum majus filiqua angulosa aut striata, C. B. Pin. 336. Mor. Umb. 61. Boerb. Ind. A. 44. Tourn. Inst. 270. Elem. Bot. 234. Dill. Cat. Giff. 130. Rupp. Flor. Jen. 55. Buxb. 315. Thaliactrum nigrius caule & semine striato, J. B. iii. 486. Chab. 489. **Meadow Rue.** In pratis & locis humidis, Junio floret. Ufu. Herba, radix. Vires. Ulcera antiqua ad cicatricem perducit, Diosc. Aperit, incidit, alvum movet, urinam ciēt, icterum sanat, pesti resistit. Radix optimum Rhabbarbari substitutum esse creditur: Si sumatur ad unciam unam vel duas purgat ut Rhabbarbarum; unde in Germania Rhabbarbarum Pauperum, aliis Pseudo-rhabbarbarum dicitur. Quibusdam in locis in Italia testante Camerario, utuntur contra Pestem, in Saxonia contra Icterus.

A. 2. Pseudo-Rhabbarbarum, Offic. Thaliactrum majus flavum, staminibus luteis vel glauco folio, C. B. Pin. 336. Boerb. Ind. A. 44. Hist. Oxon. iii. 324. Mor. Umb. 61. Tourn. Inst. 270. Rupp. Flor. Jen. 55. Buxb. 316. Thaliactrum speciosissimum glaucum semine & caule striato, J. B. iii. 486. Chab. 489. Raii Hist. i. 403. Thaliactrum majus album Hispanicum, Park. Theat. 264. Thaliactrum majus Hispanicum, Ger. Emac. 1252. Thaliactrum flore luteo, caule anguloso, folio minore, Boerb. Ind. 7. **Spanish Meadow Rue.** In pratis, & hortis curiosorum. Æstate floret. Ufu. Radix flava, amara. Vires.

Vires. Priore viribus convenit. Hujus radicem quidem Rhizopolæ innepte pro Rhabbarbo venditant, *Ruppius*.

X. De Pareira Brava.

A. *Pareira brava*, *Offic. Mont. Exot.* 7. *Dale Differt. Med.* Pareira brava, *Cod. Med.* lxxxix. *Chomel.* 261. *Caapeba*, Pareira brava, *Lochn. Sched.* p. 29. *Caapeba Brasiliensis*, *Worm. Mus.* 158. *Caapeba*, *Pis.* i. 94. *Caapeba* five *Convolvulus Colubrinus*, *Ejusd.* ii. 312. *Caapeba Brasiliensis*, *Lusitanis Erva de Noffa senhora* aut *Cipo de Cobras Marcg.* 25. *Raiz & Erva de Noffa senhora Worm. Mus.* 157. *Convolvulus Brasiliensis* flore octopetalo monococcus, *Raii Hist.* ii. 1331. An *Convolvulus Americanus* sub *Jalapix* nomine receptus, *Pluk. Almag.* 114? *Phytog.* 25?

SECTION NONA.

De Herbis Umbelliferis.

Umbelliferae dicuntur hoc genus plantæ, quia earum pleræque flores gestant in Umbella; hujus quidem generis species omnes flores in caulis & ramorum fastigiis coacervatos gestant, non tamen semper in Umbellæ formam dispositos. Notæ ergo Umbellatarum certiores & characteristicae, quæ omnibus in universum & solis conveniunt, sunt Flores pentapetali, & ad singulos bina semina nuda simul juncta, *R. H.* p. 406.

Herbæ Umbelliferae sunt vel folio

Composito, pinnato, aut triangulato; semine, vel
 Lato, plano, & compresso, seu foliaceo; foliis
 Latissimis; flore
 Albo, petalis cordatis, radice lignosiore: *Sphondylium*.
 Pallidè luteo, foliis
 Minus ramosis & propemodum pinnatis, semine minore, radice carnosâ, esculenta: *Elaphoglossum*.
 Ramosioribus, radice minus carnosâ, succifera: *Panax*.

a b c

a b c

In lacinias angustas divisis, succo limpidio: *Seseli Creticum*.

In tenues lacinias divisis; semine

Minore, foliis foeniculaceis

In segmenta longiora & capillacea divisis radice annua: *Anethum*.

In segmenta paulò latiora tripartito divisis & subdivisis, radice perenni: *Peucedanum*.

Magno oblongo;

In medio tumidiore, alâ foliaceâ sinuosâ in summo bifidâ cincto, colore albente, sapore acri: *Thapsia*.

Compressiore, per maturitatem nigro, caulis medullâ fungosâ, igni concipiendo idonea: *Ferula*.

Tumidiore, & teretiufculo aut rotundo,

Longo, quibusdam rostrato dicto,

Glabro, minor annua odorata: *Ceressium*.

Striato, foliis

Latioribus major, semine maximo, odorata, radice perenni, foliis Filicis æmulis: *Myrrhis*.

In tenues lacinias dissectis; foliorum segmentis

Crebrioribus, capillaceis, radice perenni: *Meum*.

Paucioribus majoribus radice annua, semine odorato, incurvo: *Cuminum*.

Breviore

Striato,

Glabro,

Majore,

Per maturitatem nigro tumido & fere rotundo, foliis latis: *Smyrnum*.

Per maturitatem albente aut minus colorato; foliis

Latissimis

Ramosioribus odoratis: *Angelica*.

Tripartito divisis & subdivisis, radice perpetua, acri: *Imperatoria*.

Minus latis

Apii, magna & elata, radice perpetua, odore valido nec ingrato: *Levisticum*.

Seselios; summis segmentis tripartitis: *Seseli*.

Minore, radicibus

a b c

Q

Tube