

SECTIO DUODECIMA.

De Herbis Verticillatis.

Verticillatæ dicuntur hæ plantæ, quia stipe caulem articulatum velut verticilli amplectuntur, foliis interspersis. Notæ sunt folia in caule ex ad-versa bina, flores monopetali, labiati plurimum aut galeati, semina ad singulos flores quaterna, quibus floris calyx pro vasculo inservit, R. H. p. 508.

Plantæ Verticillatæ sunt vel

- Fruticose, hoc est, quarum Superficies perennat, flore
 - Galeato & labiato, seu utrinque labiato,
 - Grandi, in spicis laxis è verticillis aliquan-tulum distantibus compositis, foliis latis obtusis.
 - Minore, foliis
 - Oblongis & angustis, florum verticillis
 - In spicas digestis
 - Breviores, floribus densius stipatis, Habitores, cum foliis in summa Spica: *Stachys*.
 - Minores & tenuiores seu gracilio-res, longis insidentes pediculis Spicæ triticeæ æmulas: *Laven-dula*.
 - Longiores, è verticillis rarioribus compositas, foliis virentibus: *Hysso-pus*.
 - Ad caulium nodos, foliis intermissis
 - Major, in magnum fruticem ado-lescens: *Rosmarinus*.
 - Minor & humilior: *Satureia*.
 - Brevibus & latiusculis, florum verticillis in spicas breves & habitiores digestis, Villosas, odore suavi sed vehementi: *Marum*.
 - Non villosas, foliis
 - Latoribus brevibus & viridioribus: *Thymum*.
 - Oblongis incanis & ad margines cre-natis: *Polium*.
 - Galea carente, foliis latoribus radice
 - Reptatrice foliis quernis: *Chamædrys*.
 - Non repente foliis subtus incanis

- Elatior & lignosior: *Taucrium*.
 - Humilior & odorator: *Marum Syriacum*.
- Herbaceæ, hoc est, quarum caules non perennant, floribus
 - Quadrupartitis aut quinquepartitis, vix labiatis, tubo brevi; foliis
 - Integris, odore
 - Suavi, radice reptatrice florum verticillis
 - Nullo manifesto aquatica: *Lycopus*.
 - In spicas digestis: *Mentha*.
 - Ad caulium nodos, foliis intermissis: *Pulegium*.
 - Laciniatis,
 - Seu circumscriptione
 - Subrotundis: *Cardiaca*.
 - Longioribus: *Verbena*.
 - Galeatis & labiatis, seu utrinque labiatis, tubo productiore
 - In capitula squamosa congestis in summis caulibus & ramulis, squamis
 - Majoribus, glabris: *Dictamnus*.
 - Minoribus,
 - In Spicas excurrentibus: *Origanum*.
 - Humilior & minor odoratissima: *Majorana*.
 - In Spicas dispositis
 - Rariores, è verticillis paulo à se invicem remotioribus compositas, odore
 - Suavi, foliis Majoranæ: *Ocimum*.
 - Minus grato, foliis rugosis, Floribus hiantibus
 - Majoribus: *Sclarea*.
 - Minoribus: *Horminum*.
 - Urticæ odore foetido: *Galeopsis*.
 - Densiores & habitiores, verticillis proxime admotis foliis
 - Incans, Urticæ foliorum æmulis, odore
 - Menthæ: *Nepeta*.
 - Virentibus,
 - Elatior, folio Crenato: *Betonica*.
 - Humilior, folio circum oras æquali: *Prunella*.
 - Ad caulium nodos è foliorum alis exeuntibus
 - Sessilibus, pediculis brevibus aut nullis, verticillis
 - Dense stipatis, multis floribus congestis
 - Elatior odore gravi, foliis incanis acutis: *Stachys*.
 - Humiliores foliis

T :

Incans

- a b c
- Incanis ferratis odore vehementiore: *Marrubium*.
 - Viridioribus Origani odore remissione: *Clynopodium*.
 - Minoribus & minus densis
 - Foliis Urticæ odore foetido: *Lamium*.
 - Flagellis reptatricibus, foliis subrotundis, crenatis, florum galeis reflexis: *Chamæcissus*.
 - Pediculis innitentibus
 - Oblongis, flosculos plures sparsos sustentibus, foliis & odore Menthae: *Calamintha*.
 - Brevibus, flores multos confertos gestantibus, foliis
 - Atrovirentibus & latioribus odore citri: *Melissa*.
 - Serpylli: *Acinos*.
 - Et odore Lamii: *Ballote*.
 - A Lamio differentibus: *Sideritis*.
 - Galea carentibus, labiatis, foliis
 - Integris
 - Odoratis, Allium spirantibus
 - Elatior, Salvifolia, floribus Spicatis, sylvatica: *Scorodonia*.
 - Humilior, reptatrix, palustris, foliis Chamædryos: *Scordium*.
 - Inodori duorum generum caulibus aliis erectis, qui flores sustent; aliis supinis & repentibus, floribus Spicatis: *Bugula*.
 - Trifidis, facie & odore Pinus: *Chamæpitys*.

De Herbis Verticillatis fruticosis.

I. De Salvia.

NOtæ sunt, Flores magni, hiantes, in spicis laxis à verticillis aliquantulum distantibus compositis, folia lata, obtusa, rugosa, odor validus & vehementior, R. H. p. 509.

A. 1. Salvia hortensis major, *Offic.* Salvia, *Chab.* 432. Salvia major, *Ger.* 623. *Emac.* 764. Salvia major vulgaris, *Park. Theat.* 49. *Hist. Oxon.* iii. 399. Salvia major, an Sphacelus Theophrasti? *C. B. Pin.* 237. *Tourn. Inst.* 180. *Boerb. Ind.* A. 166. *Rupp. Flor. Jen.* 179. Sal-

via latifolia, *J. B.* iii. 304. *Raii Hist.* i. 509. *Buxb.* 292. **Common Sage.** In hortis. Junio floret. *Usu.* Folia & Flores. *Vires.* Diuretica est; Menfes ob crassitiem remoratas ciet, nimios emendat. Prodest in Paralyfi, Vertigine, Tremore, Catarrhis. Extrinsecus Aphthas oris abstergit, *Schrod.*

A. 2. Salvia hortensis minor, *Offic.* Salvia minor, *Ger.* 623. *Emac.* 764. *Raii Hist.* i. 510. Salvia minor aurita & non aurita, *C. B. Pin.* 237. *Hist. Oxon.* iii. 400. *Tourn. Inst.* 181. *Boerb. Ind.* A. 166. *Rupp. Flor. Jen.* 180. Salvia minor auriculata, *J. B.* iii. 305. *Chab.* 432. Salvia minor five pinnata, *Park. Theat.* 50. **Sage of Vertue.** In hortis. Junio floret. *Usu.* Folia & Flores. *Vires.* Cum priore convenit, sed mitior.

A. 3. Salvia folio tenuiore, *Cod. Med.* ciii. *C. B. Pin.* 237. *Tourn. Inst.* 181. *Elem. Bot.* 149. *Raii Hist.* i. 510. Salvia Indica, *Ger.* 623. *Emac.* 765. Salvia minor aurita odoratissima Hispanica, *Park. Theat.* 50. Salvia tenuifolia, *J. B.* iii. 306. Salvia minor tenuifolia, *Chab.* 432. *Hist. Oxon.* iii. 400. **Spanish Sage.** In hortis colitur. *Usu.* Folia. *Vires.* Cum prioribus convenit.

II. De Phlomide.

NOtæ sunt, Flos tubulosus, superne in duo labia fissus, quorum superius in inferius procumbit; calix è quinque planis compositus, *Raii Meth.* A. 58.

A. Phlomis, *Offic.* Phlomis, Verbascum Salvifolium, *Mont. Plant. Ind.* 50. Phlomis fruticosa Salviae folio latiora, & rotundiora, *Tourn. Inst.* 177. *Boerb. Ind.* A. 160. Phlomis fruticosa Salviae folio, flore luteo, *Elem. Bot.* 147. Salvia fruticosa lutea latifolia, five Verbascum sylvestre quartum Matthioli, *Park. Theat.* 51. *Raii Hist.* i. 511. Salvia sylvestris Verbasci latis foliis, *Cupan. Hort. Cath.* 199. Pseudo-salvia major lutea vulgarior latifolia, *Hist. Oxon.* iii. 397. Verbascum latis Salviae foliis, *C. B. Pin.* 240. Verbascum Matthioli, *Ger.* 625. *Emac.* 767. **Yellow Sage.** In hortis. Junio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Adstringit, & inter Plantas vulnerarias enumeratur, *Mont.*

III. De

III. De Lavendula.

NOtæ sunt, Flores in Spicas tenuiores, triticearum æmulas, longis pediculis insidentes congesti, R. H. p. 512.

A. 1. Lavendula, Offic. Lavendula major sive vulgaris, Park. Theat. 72. Hist. Oxon. iii. 352. Raii Hist. i. 512. Lavendula flore cæruleo & albo, Ger. 467. Emac. 583. Lavendula latifolia, C. B. Pin. 216. Tourn. Inst. 198. Boerb. Ind. A. 152. Rupp. Flor. Jen. 190. Buxb. 181. Pseudo-nardus, quæ vulgò Spica, J. B. iii. 281. Spica Officinarum German. Greater Lavender. In hortis colitur. Julio floret. Ufu. Herba & flores. Vires. Partium est tenuium, cephalica, & nervina. Usus præcipuus in Catarrhis, Paralyfi, Spasmo, Vertigine, Lethargo, Tremore artuum. In Urina, menibus, ac Fœtu pellendo, in torminibus ventris flatulentis. Extrinsecus in lixivii capitis ac artuum, in Masticatoriis, Schrod.

A. 2. Spica Lavendula vulgaris, Offic. Lavendula angustifolia, C. B. Pin. 216. Tourn. Inst. 198. Boerb. Ind. A. 152. Buxb. 181. Rupp. Flor. Jen. 191. Lavendula minor sive Spica, Ger. 468. Emac. 584. Raii Hist. i. 513. Hist. Oxon. iii. 552. Park. Theat. 73. Pseudo-nardus quæ Lavendula vulgò, J. B. iii. 282. Pseudo-nardus foemina sive Lavendula, Chab. 425. Common Lavender, or Spike. In Hispania & Gallia provenit. Junio & Julio floret. Ufu. Herba. Vires. Eadem cum priore. Præp. Ol. Spicæ. Uteri motus ac dolores compefcit umbilico illitum, Schrod.

IV. De Stœchade.

SPicis habitioribus pilosis, squamulis imbricatis ab aliis differt, R. H. p. 513.

A. 1. Stœchas Arabica, Offic. Stœchas Arabica vulgò dicta, J. B. iii. 277. Raii Hist. i. 514. Stœchas purpurea, C. B. Pin. 216. Rupp. Flor. Jen. 190. Tourn. Inst. 201. Boerb. Ind. A. 153. Stœchas vulgaris, Park. Theat. 67. Stœchas sive Spica hortulana, Ger. 469. Emac. 585. Stœchas brevioribus ligulis, Hist. Oxon. iii. 353. Stœchas sive Stichas, Chab. 434. French Lavender. In Hispania & Gallia provenit. Maio floret. Ufu. Flores sunt capitula oblonga, squamata, ornata flosculis oblongis galeatis, & labiatis, saporis subacris, amaricantis, odoris fragrantis & gratiusculi. Eligendæ spicæ re-

centes odoratæ & subamaræ. Vires. Abstergit, attenuat, & aperit. Usus præcipuus in affectibus capitis & nervorum, scilicet in Vertigine, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo: In morbis pectoris idem præstat quod Hyssopus; insuper Urinam & Menses ciet, Venenis resistit, affectibus Hypochondriacis succurrit. Extrinsecus in Lotionibus capitis, suffitu, &c. Schrod.

A. 2. Tragium alterum, Offic. Tragium alterum Dioscoridis quibusdam, foliis Trichomanis, J. B. iii. 279. Tragium alterum Dioscoridis, secus Arabum & Halepensem, Chab. 425. Stœchadi ferratæ affinis, C. B. Pin. 216. Hist. Oxon. iii. 354. Raii Hist. i. 514. Secus vel Sucus Avicennæ, Rauwolf. Bastard Dittany. Circa Halepum invenit Rauwolfius, adis presertim locis. Ufu. Herba, Radix. Vires. Tam crudam quam coctam Dysentericis prodesse dicit, Diosc.

Tragium alterum à Dioscoride in hunc modum describitur: Folia Scolopendrii habet, & radicem sylvestris Raphani tenuem, candidam. Folia autem Autumno hirci virus olent; exinde sibi Tragii nomen adoptavit. Provenit in montibus & præcipitiis, unde non immerito à Rauwolfio pro vero supponitur.

V. De Rosmarino.

Magnitudine sua & statura insigni, floribus ad caulium nodos foliis intermixtis, foliis oblongis, angustis, prona parte candidis, supinâ obscurius virentibus, à congeneribus differt, R. H. p. 515.

A. Rosmarinus, Offic. Rosmarinum coronarium, Ger. 1109. Emac. 1292. Rosmarinus coronarius fruticosus, J. B. ii. 25. Raii Hist. i. 515. Rosmarinus hortensis angustiore folio, C. B. Pin. 217. Hist. Oxon. iii. 214. Tourn. Inst. 195. Boerb. Ind. A. 179. Rupp. Flor. Jen. 189. Libanotis sive Rosmarinus coronarius, Chab. 104. Libanotis coronaria sive Rosmarinum vulgare, Park. Theat. 71. Rosemary. In hortis. Vere floret. Ufu. Folia, Flores (Anthos dicti) & Semen. Vires. Cephalica sunt è præcipuis, Nervina ac etiam Uterina. Usus præcipuus in affectibus Capitis ac Nervorum, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, Caro, &c. Visum acuum, foetorem anhelitus emendant, Hepatis, Lienis, ac Uteri obstructions resolvunt, Ictero ac fluori albo mulierum medentur, Corque confortant, Schrod.

VI. De

VI. De Hyssopo.

Spicis florum longis, è verticillis rarioribus compositis, floribus versus unam partem spectantibus, segmento supremo, quod pro galea est, bifido, & sursum reflexo, foliis virentibus à reliquis distinguitur, R. H. p. 516.

A. Hyssopus, *Offic.* Hyssopus vulgaris, *Park. Theat.* 1. *Hist. Oxon.* iii. 361. Hyssopus *Officinarum* caerulea sive spicata, *C. B. Pin.* 217. *Tourn. Inst.* 200. *Boerb. Ind. A.* 160. *Rupp. Flor. Jen.* 191. *Buxb.* 164. Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius, *J. B. iii.* 274. *Raii Hist.* i. 579. Hyssopus Arabum, *Ger.* 464. *Emac.* 576. Hyssopum sive Hyssopus, *Chab.* 423. **Hyssop.** In hortis seritur. Julio ac Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Attenuat, aperit, & abstergit. Usus præcipuus in affectibus Pulmonum tartareis, Tussi, Asthmate. Extrinsecus adhibetur crebro ad sugillationes oculorum, ad uterum mundificandum, auriumque tinnitus tollendos, ad oris absterfionem *Schrod.* Pro Hyssopo, *Vid. Epistolas Salmafii & Beverovicii.*

VII. De Satureia.

Notæ ejus sunt, Flores galeati & labiati, in spicam digesti ad caulium nodos foliis intermixtis, statura minse & humilior, R. Meth. p. 96.

A. 1. Satureia, *Offic.* *Chab.* 423. Satureia hortensis, *Park. Theat.* 4. *Raii Hist.* i. 518. Satureia Æstiva hortensis, *Ger.* 461. *Emac.* 575. Satureia fativa, *J. B. iii.* 272. *Boerb. Ind. A.* 161. *Tourn. Inst.* 197. *Buxb.* 293. *Rupp. Flor. Jen.* 189. Satureia hortensis sive Cunila fativa *Plinii, C. B. Pin.* 218. Satureia annua *Cunilla dicta vulgaris, Hist. Oxon.* iii. 411. **Summer Savoy.** In hortis seritur. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Est inter herbas calidas, & acres quæ Urinam & Menses movent: facultatibus cum Thymo, Serpyllo, & Hyssopo convenire aiunt, *R. H.* p. 518.

A. 2. Thymbra, *Offic.* Satureia hortensis, *Ger.* 461. *Emac.* 575. Satureia vulgaris, *Park. Theat.* 4. Satureia montana, *C. B. Pin.* 218. Satureia perennis hortensis vulgaris, *Hist. Oxon.* iii. 411. Satureia durior, *J. B. iii.* 272. *Raii Hist.* i. 518. Satureia durior sive Thymbra, *Chab.* 423. Satureia montana durior flore in pediculis ramosis ex alis foliorum, *Boerb. Ind. A.* 161. Satureia hortensis sive Thymbra legitima *Dioscoridis, Griseb.*

I

V. Lufit. Calamintha frutescens, Satureie folio, facie & odore, *Tourn. Inst.* 194. **Winter Savoy.** In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 3. Thymbra vera, *Offic.* Thymbra legitima, *Tourn. Cor.* 13. Thymbra Græca, *J. B. iii.* 373. Thymbra sive Satureia Cretica legitima, *Park. Theat.* 4. Satureia Cretica, *C. B. Pin.* 218. *Ger. Emac.* 576. *Raii Hist.* i. 519. Satureia Cretica latiore folio, *Hist. Oxon.* iii. 412. Satureia frutescens Arabica, folio fimbriato, hirsuto, *Breyn. P.* ii. 88. Satureia Cretica folio rigido, brevi, crasso, *Boerb. Ind. A.* 161. Tragoriganum *Alpin. Exot.* 78. An Hyssopum montanum Cilicium quibusdam, *J. B. iii.* 277? **True Savoy.** In Insula Creta reperitur. *Ufu.* Herba, sed in Officinis nostris advena est. *Vires.* Urinam & menses provocat, tussientibus cum melle valet.

A. 4. Satureia Spicata, *Offic.* *C. B. Pin.* 218. *Boerb. Ind. A.* 161. Satureia Sti. Juliani, *Ger.* 461. *Emac.* 576. *Raii Hist.* i. 518. Satureia Spicata Sti. Juliani, *Park. Theat.* 4. Satureia foliis tenuibus sive tenuifolia Sti. Juliani quorundam, *J. B. iii.* 273. Satureia tenuifolia Sti. Juliani quorundam: Thymbra vera sive genuina aliis, *Chab.* 423. Thymbra Sti. Juliani, sive Satureia vera *Lobelio, Elem. Bot.* 166. *Tourn. Inst.* 198. **Rock Savoy.** In collibus & muris. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit.

Saxifragam primam *Matthioli* pro hac planta *C. Bauhinus* habet, *Parkinsonus* autem diversam facit, quem consule.

VIII. De Thymo.

Differt à Satureia, cui aliàs similis est, odoris fragrantia, & floribus in oblonga capitula congestis, R. H. p. 519.

A. Thymum verum, *Offic.* Thymum Creticum, *Ger.* 459. *Emac.* 574. Thymum Creticum sive Antiquorum, *J. B. iii.* 262. Thymum legitimum capitatum, *Park. Theat.* 6. Thymus capitatus, qui *Dioscoridis, C. B. Pin.* 219. *Raii Hist.* i. 519. *Tourn. Inst.* 196. *Boerb. Ind. A.* 155. Hyssopus capitata minor, Thymi odore, *Hist. Oxon.* iii. 360. **True Thyme.** In Creta sponte oritur, in hortis apud nos reperitur. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Attenuat, incidit, aperit, usus præcipue in vitiis Pulmonum anhelosis & orthopnoicis; Menses & urinas ciet, partus & secundinas expellit. Vermes necat, pituitam per alvum

alvum trahit, tumores discutit, concretum sanguinem dissolvit. Ischiadicis subvenit.

IX. De Maro.

Foliis Thymi majoribus, capitulis & verticillis lanuginosis, odoris fragrantia, ab omnibus Verticillatis distinguitur, R. H. p. 520.

A. Marum, Offic. Ger. 544. Emac. 670. Raii Hist. i. 520. Marum vulgare, Park. Theat. 12. Hist. Oxon. iii. 372. Mastichina, Boerb. Ind. A. 156. Sampfuchus five Marum Mastichen redolens, C. B. Pin. 244. Clinopodium quibuscum, Mastichina Gallorum, J. B. iii. 243. Chab. 419. Thymbra Hispanica, Majoranae folio, Tourn. Inst. 197. Rupp. Flor. Jen. 190. Elem. Bot. 166. Clinopodium Thymi majore folio, verticillis lanuginosis Mastichen olens, Pluk. Almag. 110. **Verb. Pastic.** In hortis colitur. Junio floret. Usu. Herba. Vires. Planta est Sudorifica, cephalica, & aperiens. In moribus animalium venenatorum conducit, uti & in halitu cada-veroso, Boerb. Hist. Plant. p. 22.

X. De Serpyllo.

Notae sunt, Folia breviora & latiuscula, flores in capitula in summis ramulis habitiora & laxa congesti, R. H. p. 520.

A. 1. Thymus, Offic. Thymus vulgaris folio tenuiore, C. B. Pin. 219. Tourn. Inst. 196. Boerb. Ind. A. 155. Thymum durius, Ger. 458. Emac. 573. Raii Hist. i. 521. Thymum durius vulgare, Park. Theat. 7. Thymum vulgare durius, Hist. Oxon. iii. 401. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo, J. B. iii. 263. Thymus vel Thymum, Chab. 411. **Thyme.** In hortis colitur. Junio & Julio floret. Usu. Herba. Vires. In affectibus tartareis Pulmonum, ac Artuum, omnia viscera referat, appetitum excitat, Schrad.

A. 2. Thymus sylvestris, Offic. Thymus Narbonensis Zygis dictus, Hist. Oxon. iii. 402. Narbonensis Zygis dictus Serpyllum Creticum, Ger. 456. Emac. 571. Serpyllum Narbonense, Park. Theat. 7. Serpyllum folio Thymi, C. B. Pin. 220. Raii Hist. i. 523. Serpyllum sylvestre, Zygis Clusio, Thymo vulgari rigidiori simile, J. B. iii. 271. Thymbra Hispanica Coridis folio, Tourn. Inst. 117. Elem. Bot. 166. **Wild Thyme.** In hortis curiosorum colitur.

Aestate floret. Usu. Herba. Vires. Cum Thymo viribus convenit.

A. 3. Serpyllum verum, Offic. Serpyllum majus, Park. Theat. 8. Raii Hist. i. 522. Serpyllum vulgare majus, C. B. Pin. 200. Hist. Oxon. iii. 403. Raii Synop. iii. 231. Boerb. Ind. A. 135. Tourn. Inst. 197. Elem. Bot. 165. Serpyllum majus flore purpureo & albo, Ger. 456. Emac. 570. Serpyllum latifolium, Pet. Herb. Brit. 31. **Great Mother of Thyme.** In hortis colitur. Aestate floret. Usu. Herba. Vires. Menses & Urinam ciet; torminibus, ruptis, vullis & jecorinis inflammationibus auxiliatur, capitis dolores mulcet, maxime vero Phreneticis & Lethargicis convenit, cruentos vomitus sedat, adversus Serpentes prodest, Diosc.

A. 4. Serpyllum citratum, Offic. Ger. 458. Emac. 573. Park. Theat. 6. Raii Hist. i. 522. Synop. iii. 231. Mer. Pin. 112. Dill. Cat. Giff. 134. Rupp. Flor. Jen. 189. Buxb. 301. Rivin. Irr. Mon. Serpyllum alterum citratum, Phyt. Brit. 112. Serpyllum foliis citri odore, C. B. Pin. 220. Tourn. Inst. 197. Elem. Bot. 165. Boerb. Ind. A. 155. Hist. Oxon. iii. 403. Serpyllum citri odore, J. B. iii. 270. **Lemon Thyme.** In montosis. Augusto floret. Usu. Herba. Vires. Cum reliquis viribus convenit.

A. 5. Serpyllum, Offic. Serpyllum vulgare, Ger. 455. Emac. 570. Hist. Oxon. iii. 403. Raii Hist. i. 521. Synop. iii. 230. J. B. iii. 269. Serpyllum vulgare minus, C. B. Pin. 220. Park. Theat. 8. Tourn. Inst. 197. Elem. Bot. 165. Boerb. Ind. A. 155. Rupp. Flor. Jen. 189. Buxb. 300. Serpylli vulgaris primum genus, Mer. Pin. 112. Serpyllum, Rivin. Irr. M. Dill. Cat. Giff. 134. Serpyllum vulgare, Saxifraga, Merc. Bot. i. 68. Phyt. Brit. 112. Serpyllus vel Serpyllum, Chab. 412. **Mother of Thyme.** In pascuis siccioribus. Junio & Julio floret. Usu. Herba. Vires. Cum Thymo convenire videtur, Urinam & Menses movet.

A. 6. Saxifraga Dioscoridis, Matth. fol. 976. Saxifraga vera Dioscoridis, C. B. Meth. 693. Lugd. iv. Saxifraga, Matth. Comp. 642. Cam. Epit. 716. Saxifraga vera Dioscoridis Matthioli, Park. Theat. 426. **The true Saxifrage of Dioscorides according to Matthioli.** In petris & asperis. Usu. Herba. Vires. Coacta in Vino febricitantibus opitulatur. Stranguriae prodest, singultum sedat, calculos vesicae frangit, & urinam ciet, Diosc.

Hæ sunt vires Saxifragæ suæ à *Dioscoride* attributæ, verum huic plantæ non rectè ex sententia nostra adscribuntur, in eo *Matthiolum* tantum secutus. Quænam sit vera Antiquorum Saxifraga in capite de *Lychnide* ostendere conatus sum, & plantæ illi vires hæc convenire existimo: Quænam planta hæc sit aliis multis præter illum Botanici non apparet adeoque à nonnullis suspecta est.

XI. De *Tragorigan*.

Verticillis densis à Thymo & Serpyllo differt.

A. 1. *Tragoriganum*, *Offic.* *Tragoriganum* Creticum, *C. B. Pin.* 223. *Park. Theat.* 16. *Raii Hist.* i. 523. *Hist. Oxon.* iii. 373. *Tragoriganum* Cretense, *Ger. Emac.* 668. *Tragoriganum* quibusdam nigrius, folio duro, flore purpureo, *J. B.* iii. 261. *Tragoriganum* foliis *Thymbre* majoribus, duris, nigricantibus, punctatis, flore purpureo minore, *Pluk. Almag.* 374. **Goats Marjoram.** In Creta Insula invenitur. Martio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Calfacit, Urinam ciet, Menses provocat, Stomachum imbecillum corroborat.

A. 2. *Tragoriganum* alterum, *Offic.* *Tragoriganum* Clusii, *Ger.* 543. *Emac.* 668. *Tragoriganum* Hispanicum, *Park. Theat.* 16. *Tragoriganum* angustifolium, *C. B. Pin.* 223. *Raii Hist.* i. 523. *Hist. Oxon.* 373. *Tragoriganum* tenuioribus foliis, flore candido, *J. B.* iii. 261. *Chab.* 411. *Tragoriganum* Creticum minus & tenuius, *Alp. Exot.* 79. **Spanish Goats Marjoram.** In regno Valentino reperitur. Martio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

XII. De *Polio*.

Notæ sunt, Folia oblonga circa margines crenata,
R. H. p. 524.

A. 1. *Polium montanum*, *Offic.* *Polium montanum* album, *C. B. Pin.* 221. *Ger.* 528. *Emac.* 653. *Raii Hist.* i. 524. *Hist. Oxon.* iii. 355. *Tourn. Inst.* 206. *Mat. Med.* 264. *Elem. Bot.* 175. *Chom. Plan. Ufu* 367. *Polium montanum* Monspelicum, *Park. Theat.* 24. **White Poley Mountain.** In Italia & Gallia provenit. Floret æstate. *Ufu.* Herba. Eligendæ recentes odoratæ. *Vires.* Urinam & Menses ciet; Hydropicos & Ictericos juvat; venenatis moribus auxiliatur, *R. H.* Incidit, aperit.

Polium duplex facit Dioscorides, montanum & alterum: de Polio autem montano sic scribit: Tenuis frutex est, candidus, dodrantalis, semine repletus; capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, parvo, cano hominis capillo simili, graviter olente, non sine quadam suavitate. Alterum fruticosius, non usque adeo valens odore, & viribus infirmius. Polii montani descriptio, quam supra citavimus adeo brevis est, ut Medici locis in diversis alias aliasque plantas pro eo acceperint. Tournesortius, uti & Chomelius, montanum tam album quam luteum, C. B. Pin. in suam Materiam Medicam retulit. Horum prius Hermannus & Kokerus Officinale esse putant, uti etiam alterum Commelinus & Phillipus Millerus. Rupp. vero Polium Lavendulæ folio Pinacis pro eo accipit, & Josephus Millerus Raudusque Polium maritimum erectum Monspelicum ejusdem Auctoris. De posteriore ita scribit Magnolius: Multo minus, nec tam grati odoris est, quod Polium montanum album, à C. B. in Pin. dicitur; quam ob causam et si album in Officinis præferri debeat, cætera tamen non omiserim.

Præter modo dictum in Officinis etiam habemus alium quoddam, sed rarius, eo quod est *Cretæ* incolæ quodque sit longè gratioris odoris, efficacius est, & prioribus antefendum.

A. 2. *Polium alterum, Offic.* *Polium montanum, Offic.* *Rupp. Flor. Jen.* 178. *Polium Lavendulæ folio, C. B. Pin.* 220. *Tourn. Inst.* 206. *Boerb. Ind. A.* 183. *Hist. Oxon.* iii. 356. *Polium montanum Lavendulæ folio, Park. Theat.* 25. *Raii Hist.* i. 525. *Polium Lavendulæ folio flore albo, Ger. Emac.* 655. *Ajuga folio integro, Rivin. Irr. M.* **Poley Mountain with Lavender Leaves.** In hortis Botanicorum. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, sed minus efficacius.

A. 3. *Polium montanum, Offic.* *Chom. Pl. Ufu* 92. *Polium montanum luteum, C. B. Pin.* 220. *Chom. Pl. Ufu* 367. *Raii Hist.* i. 525. *Ger.* 528. *Emac.* 653. *Hist. Oxon.* iii. 355. *Tourn. Inst.* 206. *Mat. Med.* 264. *Elem. Bot.* 175. *Boerb. Ind. A.* 183. *Polium montanum vulgare, Park. Theat.* 24. **Yellow Poley Mountain.** In Hispania & Gallia Narbonensi provenit. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum albo viribus convenire dicitur.

A. 4. *Polium montanum, Offic.* *Mill. Bot. Offic.* 352. *Rand. Ind. Plant. Offic.* 69. *Polium maritimum erectum Monspelicum, C. B. Pin.* 221. *Raii*

Raii Hist. i. 524. *Tourn. Inst.* 206. *Elem. Bot.* 175. *Hist. Oxon.* iii. 355. *Polium Monspessulanum*, *J. B.* iii. 299. *Chab.* 431. *Polium montanum minus*, *Park. Theat.* 23. **Cretæ or Mount Poley.** In locis maritimis, & collibus arenosis Galliae Narbonensis. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum prioribus convenit.

XIII. De Teucrio.

STaturâ suâ, & magnitudine, foliis latioribus à Chamædry differt, quacum floribus galeâ carentibus convenit, R. H. p. 526.

A. 1. *Teucrium*, *Offic.* C. B. Pin. 247. *Raii Hist.* i. 526. *Teucrium multis*, *J. B.* iii. 290. *Teucrium latifolium*, *Ger.* 532. *Emac.* 654. *Teucrium majus vulgare*, *Park. Theat.* 103. *Teucrium five Teucris*, *Chab.* 419. *Teucrium calice tubulato, flore pallide luteolo*, *Boerb. Ind. A.* 181. *Chamædrys fruticifolia five Teucrium vulgare flore ochroleuco*, *Hist. Oxon.* iii. 421. *Chamædrys frutescens, Teucrium vulgò*, *Elem. Bot.* 174. *Tourn. Inst.* 205. **Tree-Germander.** In Italia & Sicilia provenit. Æstate floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Calfacit, & ficit. Hepatica, ac splenetica est; confert in serpentium ictibus. Ut in externa facie chamædryn refert, ita iisdem viribus pollet.

A. 2. *Polium Creticum*, *Offic.* *Polium angustifolium Creticum*, C. B. Pin. 221. *Park.* 25. *Raii Hist.* i. 525. *Hist. Oxon.* iii. 356. *Teucrium frutescens, Stæchadis Arabicæ folio & facie*, *Tourn. Cor.* 14. *Teucrium calice campanulato, Stæchados facie*, *Boerb. Ind. A.* 181. *Rosmarinum Stæchados facie*, *Alp. Exot.* 103. **Poley of Candia.** In Insula Creta abundat. *Ufu.* Summitates. *Vires.* Cum Polio albo viribus convenit, quocum in Officinis Pharmacopolarum confunditur, & pro eo venditur.

XIV. De Chamædry.

Radice repente, foliis parvis Quercui simili divisa ab aliis distinguitur.

A. *Chamædrys*, *Triffago*, *Offic.* *Chamædrys*, *Chab.* 427. *Chamædrys vulgaris*, *Park. Theat.* 104. *Raii Hist.* i. 527. *Chamædrys minor*, *Ger.* 530. *Emac.* 656. *Chamædrys minor repens*, C. B. Pin. 148. *Hist. Oxon.* iii. 422. *Tourn. Inst.* 205. *Boerb. Ind. A.* 182. *Chamædrys vulgò vera existimata*, *J. B.* iii. 288. *Elem.*

Bot. 173. **Germander.** In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Tenuium est partium. Potenter urinam ac sudores movet; confert in febribus, Scorbuto, sanguine coagulato, & imprimis in arthritide, ictero, & urina suppressa, *Schrod.* Addit *Matthiolum* in pestilentia, lumbicis, capitis morbis frigidis, *Buxb.*

XV. De Maro Syriaco.

Marum Cortusi vel Syriacum floribus in singulis foliorum alis singulis à Chamædry differt, cum Scorodonia convenit, à qua, texturâ & facie externa abundè distinguitur, Raii Meth. A. 61.

Marum Syriacum, *Offic.* *Ger.* 544. *Emac.* 670. *Marum Syriacum vel Creticum*, *Parkin.* *Theat.* 13. *Hort. Lugd. Bat.* 409. *Boerb. Ind. A.* 182. *Marum Syriacum vulgò*, *Herm. Flor.* ii. 84. *Marum Cortusi*, *J. B.* iii. 242. *Raii Hist.* i. 527. *Hist. Oxon.* iii. 420. *Rupp. Flor. Jen.* 177. *Marum Creticum*, *Alp. Exot.* 288. *Marum Veterum*, *Marum Cortusi*, *Chab.* 418. *Majorana Syriaca vel Cretica*, C. B. Pin. 224. *Chamædrys incana, maritima, frutescens, foliis lanceolatis*, *Tourn. Inst.* 205. *Elem. Bot.* 174. *Tragoriganum Thymi latioribus foliis, subtus incanis, flore magno suave-rubente*, *Pluk. Almag.* 374. *Thymum Creticum frutescens*; *Marum fortè odoratissimum, foliis Serpylli incanis*, *Bræyn. Prod.* ii. 99. **Syrian Herb Pastick.** In hortis apud nos colitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Planta est egregia in Phlegmate à stomacho, Hydrope, Anasarca, in Vitiis Uterinis; conducit etiam in Morbis venenatis, & halitu foetido, spiritus ejus longè superans Aquam Reginae Hungariae, *Boerb. Hist. Plant.*

De Plantis Verticillatis, Herbaceis.

XVI. De Mentha.

Notæ sunt, Flos spicatus, quadripartitus, galeâ, & labello à segmentis lateralibus vix discernendis; odor suavis; radices reptatrices, R. Synop. p. 78.

A. 1. *Mentha*, *Offic.* *Mentha angustifolia spicata*, C. B. Pin. 226. *Raii Hist.* i. 532. *Tourn. Inst.* 189. *Elem. Bot.* 158. *Boerb. Ind. A.* 185. *Mentha*

Mentha Romana, *Ger. Emac.* 680. Mentha Romana angustifolia five Cardiaca, *Park. Theat.* 31. Mentha Romana five præstantior angustifolia, *Hist. Oxon.* iii. 367. **Spear-Mint.** In hortis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Tenuium est partium. Usus præcip. in ventriculi imbecillitate, cruditate, singultu, vomitu, flatibus, ardore, hepatis obstructione, intestinorum dolore, capitis vertigine, &c. *Schrod.*

N. B. Mentha sativa *Ger.* easdem vires habet, adeoque in defectu substitui poterit.

A. 2. Mentastrum, *Offic. Ger. Emac.* 684. *Merc. Bot.* i. 50. *Phyt. Brit.* 74. *Mer. Pin.* 77. *Riv. Irr. M.* Mentastrum spicatum folio longiore candicante, *J. B.* iii. 221. *Raii Hist.* i. 532. *Synop.* iii. 234. Mentastrum spicatum, *Chab.* 414. Mentha sylvestris folio longiore, *C. B. Pin.* 227. *Tourn. Inst.* 189. *Elem. Bot.* 158. *Hist. Oxon.* iii. 368. **Hoyle-Mint.** In pratis humidis, sed rarius. Julio floret. *Ufu.* Herba. Easdem vires cum priore habet.

A. 3. Mentha sylvestris, *Offic.* Mentha sylvestris rotundior folio, *C. B. Pin.* 227. *Tourn. Inst.* 189. *Chemel.* 177. *Buxb.* 213. Mentastrum, *Ger. Emac.* 683. quoad descript. *Mer. Pin.* 77. Mentastrum folio rugoso rotundior, Spontanæum flore spicato, odore gravi, *J. B.* iii. 219. *Raii Hist.* i. 532. *Synop.* iii. 234. *Hist. Oxon.* iii. 368. *Rupp. Flor. Jen.* 184. Mentha Scorodonæ foliis, **Round-leaved Hoyle-Mint.** In aquosis variis in locis. *Ufu.* Herba. *Vires.* Stomachica & Hyfterica est, *Chemel.*

A. 4. Mentha Piperis sapore, *Offic.* Mentha Saxifraga angustior folio spicata sapore acri servido, *Pluk. Mant.* 129. Mentha spicis brevibus & habitioribus foliis Menthe fusce, sapore servido Piperis, *R. Synop.* iii. 134. Mentha palustris spicis brevioribus & habitioribus, foliis oblongis, sapore Piperis, *Raii Hist.* iii. 284. Mentha piperata acuta, *Pet. Herb. Brit.* 31. **Pepper-Mint.** In aquosis, & ad fossas nonnunquam reperitur. Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* In calculo renum, & vesicæ remedium specificum æstimatur. Aq. destillata Aqua Colica à quibusdam dicitur.

A. 5. Mentha aquatica, Sisybrium, *Offic.* Mentha rubra, *Offic. Velck. Flo. Nor.* 287. Mentha aquatica rubra, *Park. Theat.* 1243. Mentha aquatica five Mentastrum, *Cod. Med.* lxxvi. Mentha aquatica five Sisybrium, *J. B.* iii. 223. *Chab.* 415. *Ger. Emac.* 684. *Raii Hist.* i. 533. *Synop.* iii. 233. *Merc. Bot.* i. 50. *Phyt. Brit.*

77. *Mer. Pin.* 76. Mentha palustris spicata, *Riv. Irr. M. Dill. Cat. Giff.* 168. Mentha aquatica, *Ger.* 555. Mentha rotundifolia palustris five aquatica major, *C. B. Pin.* 227. *Tourn. Inst.* 189. *Boerb. Ind. A.* 185. *Hist. Oxon.* iii. 370. *Rupp. Flor. Jen.* 185. **Water-Mint.** In humidioribus. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis convenit.

Hæc planta ab illiterato quodam medicastro Londinensi pro magno adversus calculum arcano habebatur: quæ ne detegi posset, adeo cautus erat, ut quoties eâ uti occasionem habuit, se in conclave quoddam seu cameram inclusit, usquedum eam in particulas adeo minutas discidisset, ut quænam planta esset invenire ferè impossibile foret: Tandem minuto ejus frustulo ad D. D. *Watson* allato, in horto suo illud deposuit, quo germinante, secretum revelatum est. Non immeritò laudatur etiam in dolore ventriculi; unde Aqua distillata à quibusdam Aqua Colica nuncupatur.

A. 6. Auricularia, *Offic.* Auricularia Indorum ad surditatem efficax, **Car. wort**, vulgò **Parlow**. Mentastrum minus, *Ger. Emac.* 685. Mentastrum hirsutum, *Park. Theat.* 34. Mentastrum aquatici genus hirsutum spicâ latiore, *J. B.* iii. 222. *Chab.* 415. *Raii Hist.* i. 533. *Synop.* iii. 234. Mentha palustris folio oblongo, *C. B. Pin.* *Hist. Oxon.* iii. 369. *Tourn. Inst.* 189. *Rupp. Flor. Jen.* 185. *Buxb.* 214. **Cylonian Plant.** In aquosis, & ad ripas fluviorum non infrequens. Augusto & Septembri floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Efficacissimum in surditate est remedium.

D. *Marlow* in observationibus suis cujusdam plantæ meminit *Plantæ Zeylanicæ* nomine, absque alia descriptione aut nota, qua possit dignosci, & beneficia ejus ad posteros derivari; unde inter eruditos Botánicos dubium exortum est, quænam species plantæ esset, quam hac appellatione intelligit. Omnes quidem consentiunt Menthe quandam speciem fuisse, quænam verò, adhuc dubium manet. Ingeniosus vir D. *Pluckenet* Menthe cujusdam verticillatæ in *Marilandia* nascentis, cujus nomen in *Mantissa*, p. 129. exhibet, esse opinatur. Dignissimus vir D. *Sloane* Menthe aquaticæ speciem quandam esse existimat; neque rejicienda est ejus conjectura, quoniam in minutis quibusdam ejus fragmentis, à D. *Finchio* Pharmacopœo Londinensi, viro ingenioso D. *Marlow* prædicti successore, apud quem omnium ejus Arcanorum specimina, variorum etiam præparationes inveniuntur, Menthe aquaticæ odorem exquisitum

quisitum observavi. Idemque candidus vir D. *Finchius* hanc herbam, non obstante exotico nomine ei à D. *Marlow* imposito, Anglicanæ originis esse mihi affirmavit: quin & fragmenta à prædicto D. *Finchio* mihi donata cum plantâ ipsâ, cujus Synonyma è C. B. *Pin.* aliisque dedi, conveniunt, sententiâ confirmor, nimirum eas rectè à me collatas esse.

XVII. De *Pulegio*.

Florum densis verticillis, sapore & odore acriore à *Mentha* differt, R. Synop. p. 79.

A. 1. *Pulegium*, *Offic.* *J. B.* iii. 256. *Chab.* 420. *Buxb.* 273. *Raii Hist.* i. 533. *Synop.* iii. 235. *Pulegium regium*, *Ger.* 545. *Emac.* 671. *Hist. Oxon.* iii. 371. *Pulegium latifolium*, C. B. *Pin.* 222. *Boerb. Ind. A.* 186. *Rupp. Flor. Jen.* 185. *Pulegium vulgare*, *Park. Theat.* 29. *Pulegium vulgare* sive mas, *Merc. Bot.* i. 62. *Phyt. Brit.* 92. *Mentha aquatica* seu *Pulegium vulgare*, *Tourn. Inst.* 189. *Mentha palustris*, sive *Pulegium*, *Cod. Med.* lxxvi. **Penny-Royal.** In aquosis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Ufus præcip. in Mensibus ciendis, Fluore albo, Foetu ejiciendo; nausea ac tormina Ventris discutit; Calculum, & Urinam pellit, Ictero, ac Hydropi medetur, *Schrod.*

A. 2. *Pulegium erectum*, *Offic.* An. *Pulegium latifolium alterum*, C. B. *Pin.* 222? **Upright Penny-Royal.** In aquosis. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente convenit.

A. 3. *Pulegium cervinum*, *Offic.* *Pulegium angustifolium*, *Ger.* 546. *Emac.* 672. *Raii Hist.* i. 534. C. B. *Pin.* 222. *Boerb. Ind. A.* 186. *Hist. Oxon.* iii. 371. *Rupp. Flor. Jen.* 186. *Pulegium angustifolium* sive *cervinum*, *Park. Theat.* 30. *Pulegium cervinum angustifolium*, *J. B.* iii. 257. *Pulegium cervinum angustifolium* *Montpelianum* odoratius, *Chab.* 420. *Mentha aquatica Satureiæ folio*, *Tourn. Inst.* 190. **Wart Penny-Royal.** In hortis, sed rarius. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Easdem vires habet cum priore, sed efficaciores.

A. 4. *Mentha crispa*, *Offic.* *Park. Theat.* 31. *Mentha crispa verticillata*, C. B. *Pin.* 227. *Raii Hist.* i. 531. *Tourn. Inst.* 189. *Boerb. Ind. A.* 185. *Mentha verticillata*, *Rivin. Irr. Mon. Raii Synop.* iii. 232. *Mentha crispa verticillata folio rotundiore*, *J. B.* iii. 215. *Mentha rotundiore folio glabro Pulegii flore*, *Hist. Oxon.* iii. 369.

Mentha sativa rubra, *Ger.* 552. *Emac.* 680. **Crisped or Curled Mint.** In aquosis reperitur. Augusto floret. *Usu.* Herba. *Vires.* In imbecillitate ventriculi pulvis quotidie sumptus commendatur, *Stockerus.* In vomitu laudat *Etmullerus.*

A. 5. *Calamintha palustris*, *Offic.* *Calamintha aquatica*, *Ger.* *Emac.* 684. *Merc. Bot.* i. 25. *Phyt. Brit.* 18. *Mer. Pin.* 18. *Raii Hist.* i. 530. *Calamintha arvensis verticillata*, C. B. *Pin.* 229. *Calamintha arvensis verticillata sive aquatica Belgarum*, *Lobelio, Park. Theat.* 36. *Mentha seu Calamintha aquatica*, *Raii Synop.* iii. 232. *Mentha arvensis verticillata hirsuta*, *J. B.* iii. 217. *Chab.* 413. *Hist. Oxon.* iii. 369. *Tourn. Inst.* 189. *Boerb. Ind. A.* 185. *Dill. Cat. Giff.* 145. *Rupp. Flor. Jen.* 185. *Buxb.* 213. *Mentha alba Officinarum*, *Volck. Flo. Nor.* 287. **Water-Calamint.** In locis humidis. Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

Quenam planta sit *Polycnemon Dioscoridis* inter Botánicos etiamnum controvertitur, aliis ad aliam eam referentibus. Nos, cum *Lobelio*, ad hanc potius quam ad *Bugulam* vel *Prunellam* reducendam censuimus, quod *Dioscoridis boni odoris & acris* esse scribat, quod de earum neutra dici potest.

A. 6. *Mentha fusca*, *Offic.* *Mentha fusca* sive vulgaris, *Park. Theat.* 31. *Raii Synop.* iii. 232. *Mentha cardiaca*, *Ger.* 553. *Emac.* 680. *Mentha hortensis verticillata Ocymi odore*, C. B. *Pin.* 227. *Chomel.* 436. *Hist. Oxon.* iii. 369. *Mentha verticillata minor acuta*, non crispa, odore *Ocymi*, *J. B.* iii. 216. **Red Mint.** In hortis, & aquosis. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis *Menthæ* speciebus convenit.

XVIII. De *Lycopside*.

Foliis rugosis ad basin laciniatis, & odore carentibus à *Mentha* differt, R. Synop. p. 125.

A. *Lycopus*, *Offic.* *Lycopus palustris*, glaber, *Elem. Bot.* 159. *Tourn. Inst.* 191. *Boerb. Ind. A.* 186. *Raii Synop.* iii. 236. *Dill. Cat. Giff.* 135. *Rupp. Flor. Jen.* 186. *Buxb.* 205. *Marrubium aquaticum*, *Ger.* 565. *Emac.* 700. *Raii Hist.* i. 535. *Marrubium aquaticum vulgare*, *Park. Theat.* 1230. *Marrubium aquaticum quorundam*, *J. B.* iii. 318. *Chab.* 436. *Marrubium palustre glabrum*, C. B. *Pin.* 230. *Pseudo-marrubium aquaticum vulgare*, *Hist. Oxon.* iii.

378. Pseudo-marrubium palustre, Rivin. *Water-Hoiehound*. In aquosis, & ad rivulos. Julio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. In classe Plantarum astringentium numerat Mont.

XIX. De Verbena.

A Congeneribus differt foliis rugosis, laciniatis, & floribus in spicis longissimis angustis, nullis intermixtis foliis, R. Synop. p. 79.

A. Verbena, *Offic.* Verbena communis, Ger. 580. *Emac.* 718. *Merc. Bot.* i. 76. *Phyt. Brit.* 128. *Mer. Pin.* 124. Verbena communis flore cæruleo, C. B. *Pin.* 269. *Boerb. Ind.* A. 187. *Hist. Oxon.* iii. 408. *Tourn. Inst.* 200. Verbena vulgaris, J. B. iii. 443. *Raii Hist.* i. 535. *Synop.* iii. 236. Verbena mas, five recta & vulgaris, *Park. Theat.* 678. *Urbain*. In areis, & compitis. Æstate floret. *Ufu*. Radix, Herba. *Vires*. Cephalica, alexipharmaca, & vulneraria est. Usus præcipue in dolore, aliisque affectibus capitis, in tussi inveterata, in obstructionibus Hepatis, ac Lienis, Ictero, Dysenteria; Calculum atterit, & expellit; Febrem Tertianam fugat, &c. *Schrod.*

Amuletice strumam Verbenæ radicem curare sunt qui statuunt, modum Marcellus Empericus edocet. Ab anicula quadam pro Amuleto usurpatur collo alligata.

XX. De Dictamno.

Foliis valde tomentosis & incanis, atque capitulorum squamis majoribus à reliquis differt, R. H. p. 537.

Dictamnus Creticus, *Offic.* C. B. *Pin.* 222. *Park. Theat.* 27. *Raii Hist.* i. 537. *Hist. Oxon.* iii. 357. *Boerb. Ind.* A. 178. *Rupp. Flor. Jen.* 191. Dictamnus Creticus five vera, J. B. iii. 253. Dictamnus vel Dictamnium, *Chab.* 420. Dictamnium Creticum, Ger. 651. *Emac.* 795. Origanum Creticum latifolium, tomentosum seu Dictamnus Creticus, *Elem. Bot.* 167. *Tourn. Inst.* 199. *Ditany of Crete, or Candy*. In Creta crescit. Julio floret. *Ufu*. Folia eligenda valde tomentosa, recentia, odorata. *Vires*. Uterina imprimis est herba ac alexipharmaca. Usus præcip. in obstructis mensibus, in partu accelerando, in ictibus venenatis, in spiculis extrahendis, *Schrod.*

XXI. De Majorana.

Notæ sunt, Flores in capitula squamosa congesti in summis caulibus & ramulis, capitulis & squamis minoribus quàm in Dictamno, foliaque minus tomentosa & incana, R. H. p. 538.

A. 1. Majorana, Amaracus, Sampsucum, *Offic.* Majorana vulgaris, C. B. *Pin.* 224. *Raii Hist.* i. 538. *Tourn. Inst.* 199. *Elem. Bot.* 168. *Boerb. Ind.* A. 178. *Rupp. Flor. Jen.* 190. Majorana vulgaris æstiva, *Park. Theat.* 11. *Hist. Oxon.* iii. 358. Majorana major, Ger. 538. *Emac.* 664. Majorana majori folio & femine nota, J. B. iii. 241. Sampsucum, Amaracus, Majorana, *Chab.* 419. *Sweet Marjoram*. In hortis. Julio floret. *Ufu*. Herba, semen. *Vires*. Cephalica, & uterina est. Usus præcip. in affectibus capitis, ac nervorum; hinc & uteri, & ventriculi: ciet menses (in pessario) confortat cerebrum, ejusque status discutit, *Schrod.*

A. 2. Majorana tenuifolia, *Cod. Med.* lxxi. C. B. *Pin.* 224. *Raii Hist.* i. 538. Ger. 539. *Emac.* 664. *Park. Theat.* 11. *Tourn. Inst.* 200. *Elem. Bot.* 168. Majorana tenuior & lignosior, J. B. iii. 241. Majorana hortensis odorata perennis, *Hist. Oxon.* iii. 359. *Marjoram gentile* or *perennial*. In hortis. *Ufu*. Herba. *Vires*. Cum præcedente convenit.

A. 3. Origanum, *Offic.* Rivin. irr. Mon. *Dill. Cat. Giff.* 133. Origanum vulgare spontaneum, J. B. iii. 236. *Raii Hist.* i. 539. *Synop.* iii. 236. *Elem. Bot.* 167. *Buxb.* 245. Origanum vulgare, *Merc. Bot.* i. 55. *Phyt. Brit.* 85. Origanum Anglicum, Ger. 541. *Emac.* 666. Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii, C. B. *Pin.* 223. *Tourn. Inst.* 199. *Boerb. Ind.* A. 179. *Rupp. Flor. Jen.* 191. Origanum sylvestre vulgare Tragi, *Hist. Oxon.* iii. 359. Origanum five Origanum, *Chab.* 418. Majorana sylvestris, *Park. Theat.* 12. *Wild Marjoram*. In dumetis. Julio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Aperit, abstergit. Usus præcip. in obstructione pulmonum, hepatis, ac uteri; & in tussi, asthmate, & ictero. Augēt lac, &c. *Schrod.*

A. 4. Majorana oleracea, *Offic.* Majorana major, Anglica, Ger. 538. *Emac.* 664. *Raii Hist.* i. 539. Majorana latifolia five major Anglica, *Park. Theat.* 12. Majorana hortensis viridis tenuior, *Hist. Oxon.* iii. 359. Origanum Onites, C. B. *Pin.* 223. *Raii Synop.* iii. 296. *Tourn. Inst.* 199. *Pot-Marjoram*. In hortis, inter ole-

ra feritur. Æstate floret. *Ufu.* Herba in culinis pro olere. *Vires.* Iisdem cum Origano vulgari viribus pollet.

XXII. De Origano.

A Majorana capitulis squamosis, longioribus, in spicas excurrentibus, præcipue differt, Raii Meth. A. 61.

A. 1. Origanum Creticum, *Offic.* Ger. 541. *Emac.* 666. Raii *Hist.* i. 540. *J. B.* iii. 238. *Chab.* 418. C. B. Pin. 223. Boerh. Ind. A. 119. *Hist. Oxon.* iii. 360. Origanum sylvestre five vulgare, *Park. Theat.* 15. Origanum minus Chium odoratissimum flore albo ex Triumfetti, *Hort. Maur.* 133. *Origanum of Cret.* In Creta Insula. Junio floret. *Ufu.* Flores sunt capitula squamata, oblonga, colore fusco, sapore acerrimo, odore aromatico, jucundo. Eligendæ spicæ recentes, odoratæ. *Vires.* Usus præcip. in obstructione Pulmonum, Hepatis, ac Uteri.

N. B. In *Officinis nostris* epitheta Origani Cretici & vulgaris non distinguuntur: ergo ubi Medici præscribunt Flor. Origani, intellige Origani Cretici; & quando præscribunt Herbam, intellige Vulgaris; nam folia, seu herba Origani Cretici nunquam in *Officinis* reperiuntur.

A. 2. Origanum Heracleoticum, *Offic.* Ger. 541. *Emac.* 666. Raii *Hist.* i. 539. Origanum Heracleoticum verius, *Park. Theat.* 15. Origanum Heracleoticum Matthioli, aliis fortè Creticum, *J. B.* iii. 237. Origanum Heracleoticum Matthioli, Origanum, Creticum quibusdam, *Chab.* 418. Origanum Heracleoticum, Cuncta gallinacea Plinii, C. B. Pin. 223. *Tourn. Inst.* 199. *Hist. Oxon.* iii. 360. *Rupp. Flor. Jen.* 191. *Baltard-Parjozam.* Reperitur in hortis. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Excalfacit; demorsis à serpente convenit; ruptis, convulsis, & hydropicis datur, *Diosc.*

XXIII. De Ocymo.

*N*Otæ sunt, Folia Majoranæ, odor suavis Citri, vel Caryophylli; flores in spicas laxas & verticillis rarioribus compositas digesti, R. H. p. 540.

A. 1. Ocimum, Basilicum, *Offic.* Ocimum medium citratum, Ger. 547. *Emac.* 673. Ocimum vulgatius, C. B. Pin. 226. Raii *Hist.* i. 547. *Tourn. Inst.* 204. Boerh. Ind. A. 170. *Rupp. Flor. Jen.* 178. Ocimum medium vulgatius & nigrum, *J. B.* iii. 247. *Chab.* 419. O-

cimum vulgare majus, *Park. Theat.* 18. Basilicum seu Ocimum medium vulgatius, *Hist. Oxon.* iii. 406. **Common Basil.** In hortis feritur. Junio floret. *Ufu.* Herba, semen. *Vires.* Expurgat Pulmones, Menfes movet.

A. 2. Ocimum caryophyllatum, *Offic.* Ocimum minimum, C. B. Pin. 226. *J. B.* iii. 247. *Chab.* 419. Raii *Hist.* i. 541. *Tourn. Inst.* 204. Boerh. Ind. A. 170. *Hist. Oxon.* iii. 407. Ocimum vulgare minus, *Park. Theat.* 18. Ocimum minus caryophyllatum, Ger. 547. *Emac.* 673. **Bush-Basil.** In hortis. Junio floret. *Ufu.* Semen.

XXIV. De Hormino.

*N*Otæ sunt, Floris labium superius reverà galeam refert, Raii Meth. A. 62.

A. 1. Horminum sativum, *Offic.* C. B. Pin. 238. Raii *Hist.* i. 542. Boerh. Ind. A. 166. Horminum sativum genuinum Dioscoridis, *Park. Theat.* 56. Horminum sylvestre foliis purpureis, Ger. 628. *Emac.* 771. Horminum comā purpuro-violaceā, *J. B.* iii. 309. *Hist. Oxon.* iii. 393. *Rupp. Flor. Jen.* 178. *T. Inst.* 178. *El. Bot.* 147. Horminum, *Chab.* 433. **Purple-Spiked-Clary.** In hortis curiosorum apud nos feritur. Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Ad Venerem stimulamdam cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: extrahuntur etiam aculei ex corpore, *Diosc.* Nervos excitat; homines inebriat; in Hydrope optimè convenit; vim habet califacientem, Boerh. *Hist. Plant.*

A. 2. Ocultus Christi, *Offic.* Horminum sylvestre, Ger. 628. *Emac.* 771. Horminum sylvestre Lavendulæ flore, C. B. Pin. 239. *Park. Theat.* 57. Raii *Hist.* i. 545. *Synop.* iii. 237. *Tourn. Inst.* 178. *Elem. Bot.* 147. Boerh. Ind. A. 165. *Hist. Oxon.* iii. 395. Gallitrichis affine Maru, si non genus aliquod, Sclarea Hispanica, *J. B.* iii. 313. **Wild Clary.** In glareosis. Junio floret. *Ufu.* Semen rotundum, nigrum. *Vires.* Oculis inditum utile est ad excutendam eorum caliginem, & deducendum corpuscula, quæ in illos inciderunt.

A. 3. Horminum sylvestre, *Offic.* Horminum sylvestre latifolium, Ger. *Emac.* 771. Raii *Hist.* i. 546. Horminum sylvestre latifolium verticillatum, C. B. Pin. 238. *Tourn. Inst.* 178. *Elem. Bot.* 147. *Hist. Oxon.* iii. 395. Horminum Germanicum humile, *Park. Theat.* 56. Horminum

num Gallitricho affinis planta, Horminum sylvestre latifolium Clusio, *J. B.* iii. 314. *Chab.* 435. **Wild Clary.** In Germania frequenter occurrit. Æstate floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Viribus magis pollet quàm Sativum.

XXV. De Sclarea.

NOtæ sunt, Floris galea labio multò major, & falcata, labium tripartitum, mediâ positione bifida, & excavata, *Raii Meth.* A. 62.

A. 1. Horminum, Sclarea, *Offic.* Horminum sativum vulgare, sive Sclarea, *Park. Theat.* 55. *Hist. Oxon.* iii. 392. Horminum Sclarea dictum, *C. B. Pin.* 234. *Raii Hist.* i. 543. Sclarea, *Tab. Icon.* 373. *Tourn. Inst.* 179. *Elem. Bot.* 148. *Boerb. Ind. A.* 163. Gallitrichum, *Chab.* 433. *Ger.* 668. Gallitrichum sativum, *J. B.* iii. 309. Gallitrichum sive Horminum, *Ger. Emac.* 768. **Clary.** In hortis. Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Calfacit, & ficit; abstergit, & attenuat. Si succus hauriatur, reddit hominem temulentum. Est planta antihysterica; in partu difficili, & menstruis obstructis convenit, uti & in fluore albo, & Venere stimulanda singulariter prodest, &c. *Boerb. Hist. Plant.*

A. 2. Æthiopis, *Offic.* *Ger.* 634. *Emac.* 779. *Chab.* 435. *Raii Hist.* i. 543. Æthiopis multis, *J. B.* iii. 315. Æthiopis foliis sinuosis, *C. B. Pin.* 241. Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio, *Tourn. Inst.* 179. *Elem. Bot.* 148. Sclarea Æthiopica sive Æthiopis, laciniatis, & non laciniatis foliis, *Park. Theat.* 57. Horminum Æthiopicum incanum foliis sinuosis Æthiopis dictum, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 318. *Volck. Flor. Nor.* 214. Horminum Æthiopicum foliis sinuosis, *Hist. Oxon.* iii. 392. **Æthiopian Clary.** In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Ischiadicis, Pleuriticis, Arteriæ Scabritici auxiliatur, *Diosc.*

A. 3. Sclarea pratensis, *Offic.* Sclarea pratensis foliis ferratis, flore suave-rubente, *Cod. Med.* lix. *Tourn. Inst.* 179. *Boerb. Ind. A.* 165. Sclarea foliis ferratis, *Elem. Bot.* 148. Horminum pratense foliis ferratis, flore suave-rubente, *Hort. Reg. Par.* Gallitricum sylvestre vulgò sive sylvestris Sclarea flore purpureo magno, *J. B.* iii. 311. **Meadow Clary.** In pratis. Varietas est *Hormini pratensis foliis ferratis*, *C. B. Pin.* 234. *Buxb.* 161.

XXVI. De Galeopsi.

NOtæ sunt, Folia Urticæ; odor foetidus; semina parva, per maturitatem nigra: floris labium superius in cochlearis formam excavatum, inferius tripartitum, medio segmento obtuso, longo lato utrinque reflexo, lateralibus, parvis, brevibus, *R. Meth.* A. p. 62.

A. 1. Galeopsis, *Offic.* Galeopsis vera, *Ger. Emac.* 704. *Mer. Pin.* 44. Galeopsis legitima Dioscoridis, *Park. Theat.* 908. *Raii Hist.* i. 548. *Synop.* iii. 237. Galeopsis Dioscoridis, *Merc. Bot.* i. 37. *Phyt. Brit.* 45. Galeopsis sive Urtica iners magna foetidissima, *J. B.* iii. 853. Galeopsis procerior foetida spicata, *Tourn. Inst.* 185. *Elem. Bot.* 154. *Boerb. Ind. A.* 162. *Rupp. Flor. Jen.* 182. *Dill. Cat. Giff.* 97. Lamium maximum sylvaticum foetidum, *C. B. Pin.* 134. Stachys sylvatica, *Riv. Irr. Buxb.* 312. Stachys foetida sepium flagellis reptatricibus, *Hist. Oxon.* iii. 382. **Hedge-nettle.** Ad sepes. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Folia, semen. *Vires.* Duritias & carcinomata dissipant; strumas, panos, & parotides discutiunt; ad putrescentia, gangrænas, & nomas commendatur, *Diosc.* Ad suffocationes uterinas optima est planta, *Boerb.*

A. 2. Panax coloni, *Offic.* *Ger.* 858. *Emac.* 1005. Marrubium aquaticum acutum, *Ger.* 565. Galeopsis angustifolia foetida, *J. B.* iii. 804. Galeopsis palustris, Betonicæ folio, flore variegato, *Tourn. Inst.* 185. *Dill. Cat. Giff.* 109. *Boerb. Ind. A.* 162. *Rupp. Flor. Jen.* 183. Stachys palustris foetida, *C. B. Pin.* 216. *Hist. Oxon.* iii. 383. Stachys palustris, *Riv. Irr. Mon. Buxb.* 312. Sideritis Anglica, strumosa radice, *Park. Theat.* 587. *Raii Hist.* i. 563. *Synop.* iii. 242. *Mer. Pin.* 113. Sideritis 1. gravis odoris, *Merc. Bot.* i. 68. *Phyt. Brit.* 113. **Clowns All-heal.** In aquosis, & ad fluvios. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria herba est insignis. Cum Lamio etiam in viribus convenit.

XXVII. De Nepeta.

Foliis Urticæ incanis, odore Menthæ graviore, floribus in spicas habitiores digestis à congeneribus differt, *Raii Synop.* p. 80.

A. Nepeta, Mentha Cataria, *Offic.* Nepeta major vulgaris, *Park. Theat.* 38. *Raii Synop.* iii. 237. Nepeta, *Riv. Irr. Mon. Dill. Cat. Giff.*

126. *Buxb.* 233. *Rupp. Flor. Jen.* 191. *Mentha* Cattaria, *J. B.* iii. 225. *Raii Hist.* i. 548. *Mentha* Cattaria five *Nepeta*, *Chab.* 415. *Mentha* Cattaria vulgaris & major, *C. B. Pin.* 228. *Hist. Oxon.* iii. 414. *Mentha* felina five *Cattaria*, *Ger.* 554. *Emac.* 682. *Mer. Pin.* 77. *Mentha* felina, vel *Cattaria*, *Merc. Bot.* i. 50. *Phyt. Brit.* 74. *Cattaria* major vulgaris, *Tourn. Inst.* 202. *Elem. Bot.* 171. *Boerb. Ind. A.* 174. *Rep.* Ad sepes non raro. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Partium est tenuium. *Ufus* præcip. in Morbis Uterinis (scil. obstructionibus) sterilitate, foetu pellendo, tum quoque in tartaro Pulmonum incidendo, &c. *Schrad.*

XXVIII. De Betonica.

Notæ sunt, Flores in spicas habitiores digesti; caules non ramosi, folia crenata, *R. Synop.* p. 80.

A. Betonica, Offic. *Ger.* 557. *Emac.* 714. *Raii Hist.* i. 550. *Synop.* iii. 238. *Mer. Pin.* 15. *Rivini. Irr. Mon. Dill. Cat. Giff.* 126. *Betonica* vulgaris, *Merc. Bot.* i. 23. *Phyt. Brit.* 15. *Betonica* purpurea, *C. B. Pin.* 235. *Tourn. Inst.* 202. *Elem. Bot.* 172. *Boerb. Ind. A.* 154. *Rupp. Flor. Jen.* 186. *Buxb.* 37. *Betonica* vulgaris purpurea, *J. B.* iii. 301. *Betonica* vulgarior flore purpureo, *Park. Theat.* 614. *Betonica* five *Vetonica*, *Chab.* 431. **Wood Betony.** In sylvis & dumetis. Julio floret. *Usu.* Folia, & Flores. *Vires.* Cephalica, Hepatica, Splenetica, Thoracica, Uterina, necnon Vulneraria, Arthritica, & demum Diuretica est. *Schrad. Præp. Aqu. Conf. Syr. Vid.* Plura apud *Humelbergium* in *Commentar. Anton. Musæ de Herbâ Betonicâ*, *Boerb. Hist. Plant.*

XXIX. De Prunella.

Spicis brevibus habitioribus cum *Betonica* convenit, parvitate & humilitate sua, foliisque circum oras æqualibus & non crenatis ab eadem differt, *R. Synop.* p. 81.

A. Prunella, Offic. *Ger.* 577. *Emac.* 632. *Raii Hist.* i. 551. *Synop.* iii. 238. *Mer. Pin.* 98. *Prunella* vulgaris, *Park. Theat.* 526. *Mer. Bot.* i. 61. *Phyt. Brit.* 98. *Hist. Oxon.* iii. 363. *Prunella* flore minore vulgaris, *J. B.* iii. 428. *Prunella* five *Brunella*, *Chab.* 473. *Prunella* major folio non dissecto, *C. B. Pin.* 260. *Tourn. Inst.* 182. *Elem. Bot.* 151. *Boerb. Ind. A.* 169.

Buxb. 43. *Rupp. Flor. Jen.* 180. *Prunella*, *Rivini. Irr. Mon. Dill. Cat. Giff.* 91. **Self-heal.** In pascuis. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba, Flores. *Vires.* Abstergit & consolidat. *Ufus* præcipuus in vulneribus imprimis Pulmonum, in sanguine coagulato. Extrinsecus in Vulneribus & creberrime in Angina aliisque affectibus oris & faucium usurpatur *Buxb.* Planta est amantissima in omni morbo inflammatorio, in omnibus hæmorrhagiis & Dysenterii, ut & in sputo & mictu cruento convenit, *Boerb. Hist. Plant.*

XXX. De Acino.

Notæ sunt, Folia *Serpilli* aut *Ocymii* minoris, florum cauliculi oblongi, striati, collo angusto, ventre turgidiore. Flores secundum caules ex alis foliorum exeuntes, non in capitula congesti in summis caulibus, quo à *Serpillo* differt, *R. Meth. A.* p. 64.

A. Acinos, Offic. *Dill. Cat. Giff.* 125. *Rivini. Irr. Mon. Acinos Rivini, Rupp. Flor. Jen.* 188. *Acinos* Anglica, *Merc. Bot.* i. 16. *Phyt. Brit.* 2. *Acinos* multis, *J. B.* iii. 259. *Raii Hist.* i. 553. *Synop.* iii. 238. *Chab.* 411. *Buxb.* 5. *Boerb. Ind. A.* 176. *Acinos* five *Ocymum* sylvestre, *Hist. Oxon.* iii. 404. *Acinos* *Ocymum* sylvestre, *Ger.* 548. *Emac.* 675. *Acinos* *Clinopodium* arvense *Ocymii* facie, *C. B. Pin.* 225. *Tourn. Inst.* 195. *Elem. Bot.* 163. *Acinos* minus seu vulgare, *Park. Theat.* 21. **Wild Basil.** In montosis cretaceis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Menfes & alvum sistit. Illita panos ignemque facrum sanat, *Diosc.* Ad *Calaminthas* accedit, sed paulo minores, *Boerb.*

N. B. Mulierculis Botanopolis Londinensibus pro Polio montano hæc planta venditur.

XXXI. De Stachy.

*V*erticillis densis, foliorum canitie & lanugine à reliquis differt. Adde, floris labium superius elatum, bifidum & cochlearis modo concavum, inferius tripartitum, lateralibus segmentis adco parvis, ut crenæ potius videantur, *R. Meth. A.* p. 63.

A. Stachys, Offic. *Ger.* 563. *Emac.* 695. *Raii Hist.* i. 554. *Stachys* *Dioscoridis*, *Park. Theat.* 47. *Stachys* minor Italica, *C. B. Pin.* 236. *Tourn. Inst.* 186. *Elem. Bot.* 155. *Boerb. Ind. A.* 154. *Stachys* folio candicante, densiore, non serrato, minor, *Hist. Oxon.* iii. 381. **Wale Dore Wound.** In hortis colitur. Junio floret. *Usu.*

Ufu. Folia. *Vires.* Vim habet excalfactoriam, & acrem, menses & secundas pellit, *Diosc.* Valde foetet & graveolet, hinc planta est Antihysterica, Antiapoplectica, & Antepileptica, *Boerb.*

XXXII. De Marrubio.

Notæ sunt, Flores in verticillis densis è calycibus striatis segmentis acutis seu spinosis circa caulium nodos totius plantæ canities, odor vehemens & gravis; folia obtusa, serrata, rugosa, *R. Synop.* p. 81.

A. 1. Marrubium album, *Prassium*, *Offic.* *Phyt. Brit.* 73. *Merc. Bot.* i. 51. Marrubium, *Chab.* 436. Marrubium album, *Ger.* 561. *Emac.* 693. *Mer. Pin.* 75. *Raii Hist.* i. 556. *Synop.* 239. *Buxb.* 209. *J. B.* iii. 316. Marrubium album vulgare, *C. B. Pin.* 230. *Hist. Oxon.* iii. 376. *Park. Theat.* 44. *Tourn. Inst.* 192. *Elem. Bot.* 161. *Boerb. Ind. A.* 156. *Rupp. Flor. Jen.* 187. **White Doze-bound.** Ad vias publicas. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Calfacit & ficit. Usus præcipuus in obstructione Pulmonum, Hepatis, Lienis, Uteri, adeoque in Phthisi, in ex- punctione sanguinolenta, in partu difficili, Lochiis- que remoratis, in Ictero, *Schrod. Præp. Syr.*

A. 2. Alyssum Galeni, *Offic.* *Ger.* 379. *Emac.* 465. Alyssum Galeni Clusio, *Park. Theat.* 590. Alyssum, *Mont.* 36. Alyssum verticillatum foliis profundè incis, *C. B. Pin.* 232. Marrubium Alyssum dictum, *Raii Hist.* i. 557. Marrubium Alyssum dictum, foliis profundè incis, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 409. *Pluk. Almag.* 242. Mar- rubium verticillatum foliis profundè incis, *Ejusd. Flor.* ii. 67. *Boerb. Ind. A.* 156. Marrubium album foliis profundè incis, Flore cœruleo, *Hist. Oxon.* iii. 377. Marrubium, Hispanicum, Supi- num, calyce stellato & aculeato, *Elem. Bot.* 161. *Tourn. Inst.* 192. **Galen's Mad-wort.** In hor- tis curiosorum colitur. Junio floret. *Ufu.* Her- ba. *Vires.* Cum Marrubio albo viribus conve- nire creditur.

A. 3. Pseudo-dictamnus, *Offic.* *Park. Theat.* 27. Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus, *C. B. Pin.* 222. *Tourn. Inst.* 188. *Elem. Bot.* 157. *Boerb. Ind. A.* 173. *Hist. Oxon.* iii. 379. *Rupp. Flor. Jen.* 184. *Schol. Bot.* 61. Pseudo-dictamnus acetabulis minoribus, *Herm. Flor.* ii. 67. Pseudo- dictamnus, *Ger.* 651. *Emac.* 797. Dictam- num adulterinum, quibusdam Verticillatum, vel po- tius Gnaphalium veterum, *J. B.* iii. 255. Di- ctamnus spurius inodorus acetabulis Moluccæ mi-

noribus, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 220. Marru- bium pseudo-dictamnus dictum, *Raii Hist.* i. 557. Marrubio congener sive Prasio dictamnus major inodorus, *Pluk. Almag.* 242. Gnaphalium vete- rum, Centunculus, Dictamnus adulterinum qui- busdam, *Chab.* 410. **Bastard Dictamn.** In hor- tis colitur. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Marrubio ut in externa facie, ita & viribus convenit.

XXXIII. De Cardiaca.

Notæ sunt, Folia circumscriptione subrotunda & profundè laciniata: floris labium superius in canalem inflexum, & inferiore multo longius, infe- rius tripartitum; calix valde brevis, & seminibus ad summitatem usque repletus, *R. Meth. A.* p. 64.

A. Cardiaca, *Offic.* *J. B.* iii. 320. *Raii Hist.* i. 571. *Synop.* iii. 239. *Park. Theat.* 41. *Tourn. Inst.* 186. *Elem. Bot.* 155. *Ger.* 569. *Emac.* 705. *Boerb. Ind. A.* 180. *Dill. Cat. Giff.* 122. *Buxb.* 55. *Phyt. Brit.* 21. *Mer. Pin.* 20. *Rivin. Irr. Mon.* Cardiaca Lycopus Ruellii, *Chab.* 437. Marrubium Cardiaca dictum, *Hist. Oxon.* iii. 378. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theo- phrasti, *C. B. Pin.* 230. **Pother-wort.** In hor- tis & in fimetis. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Urinam & menses ciet, pectus à pituita detergit, lumbricos necat, palpitationem cordis, & cardialgiam in infantibus javat, in lienis morbis, & affectibus hystericis utilis æstimatur.

XXXIV. De Clinopodio.

Folia fert Majoranæ sylvestris, flores in verti- cillis densis circa caulium nodos, quorum tubi quam in Marrubio longiores; labia superiora rotun- data, elata & plerumque bifida, inferiora tripartita, segmento medio latissimo, R. Meth. A. p. 64.

A. Clinopodium, *Offic.* *Dill. Cat. Giff.* 132. *Rivin. Irr. Mon.* Clinopodium majus, *Raii Hist.* i. 558. *Phyt. Brit.* 28. Clinopodium vulgare, *Merc. Bot.* i. 29. Clinopodium quorundam Ori- gani facie, *J. B.* iii. 250. Clinopodium Origano simile, *C. B. Pin.* 224. *Cat. Monsp.* 71. *Hist. Oxon.* iii. 374. *Tourn. Inst.* 195. *Elem. Bot.* 163. *Boerb. Ind. A.* 158. *Rupp. Flor. Jen.* 188. *Buxb.* 75. Clinopodium, Acinos, *Ger.* 548. *Emac.* 675. *Mer. Pin.* Acinos sive Clinopodium majus, *Park. Theat.* 22. **Great Wild Basil.** Ad sepes passim. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Bi-
bitur

bitur ad convulsa, rupta, strangurias, Serpantium ictus: Menses & partus pellit. Alvim sistit, *Diosc.*

XXXV. De Lamio.

Floribus in verticillis ad caulium nodos, foliis Urticæ; Seminibus majusculis & calycibus brevibus, maturitate illico decedentibus, & odore fœtido ab aliis differt, R. Synop. p. 82.

A. 1. Lamium album, Urtica mortua, *Offic.* Lamium album, *Ger.* 568. *Emac.* 702. *Raii Hist.* i. 559. *Synop.* iii. 240. *Mer. Pin.* 69. Lamium album, non fœtens, folio oblongo, C. B. *Pin.* 231. *Boerb. Ind. A.* 157. Lamium vulgare flore albo, *Merc. Bot.* i. 46. *Phyt. Brit.* 66. Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo, *Park. Theat.* 604. *Tourn. Inst.* 183. *Elem. Bot.* 152. *Dill. Cat. Giff.* 38. *Hist. Oxon.* iii. 384. *Rupp. Flor. Jen.* 181. Galeopsis sive Urtica iners, floribus albis, *J. B.* iii. 322. *Buxb.* 133. **White Archangel.** Ad sepes. Aprilis & Maio floret. *Usu.* Herba, Flores. *Vires.* Ad fluorem album & ad Scrophulas specificè celebratur. Planta est aperiens (ut affirmat *Boerhaavius*) emolliens, incidens, diuretica & lithontriptica; in suffocationes uterinas valet: Radix ad Icterus commendatur.

A. 2. Lamium rubrum, *Offic.* *Ger.* 568. *Emac.* 703. *Raii Hist.* i. 559. *Synop.* iii. 240. *Mer. Pin.* 69. *Merc. Bot.* i. 46. *Phyt. Brit.* 65. Lamium annuum vulgare rubrum, *Hist. Oxon.* iii. 385. Lamium vulgare folio subrotundo, flore rubro, *Park. Theat.* 604. Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo, sive Galeopsis *Dioscoridis*, C. B. *Pin.* 230. *Dill. Cat. Giff.* 38. *Tourn. Inst.* 183. *Elem. Bot.* 152. *Rupp. Flor. Jen.* 181. *Boerb. Ind. A.* 157. Galeopsis sive Urtica iners, folio & flore minore, *J. B.* iii. 323. *Buxb.* 133. **Red Archangel.** Ad sepes. Primo vere floret. *Usu.* Flores. *Vires.* Ad Dysenteriam commendatur, ad Sanguinem in vulneribus sistendum valet. Herba tusa & imposita valere creditur ad tumores quoscunque discutiendos, necnon ad inflammationes, plagas, ulcera putrida, & vulnera, *Buxb.*

A. 3. Leucas montana, *Offic.* Lamium luteum, *Ger.* 567. *Emac.* 702. *Park. Theat.* 606. *Raii Hist.* i. 560. *Synop.* iii. 240. *Mer. Pin.* 69. Lamium folio oblongo luteum, C. B. *Pin.* 231. *Hist. Oxon.* iii. 385. Lamium flore luteo, *Merc. Bot.* i. 46. *Phyt. Brit.* 65. *Riv. Irr. Mon.* Lamium spurium flore luteo, *Velch. Flor.*

Nor. 239. Galeopsis, *Chab.* 435. Galeopsis sive Urtica iners flore luteo, *J. B.* iii. 323. *Rupp. Flor. Jen.* 183. *Tourn. Inst.* 181. *Elem. Bot.* 154. *Boerb. Ind. A.* 162. Galeobdolon, *Dill. Cat. Giff.* 49. **Yellow Archangel.** In sylvis & dumetis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Contra animalium venena, præcipuè marinorum opitulatur, *Diosc.*

A. 4. Milzadella, Lamium maculatum, Urtica lactea, *Offic. Mont. Ind.* 48. Lamium luteum foliis maculatis, *Sath. Hort. Ed.* Lamium maculatum, C. B. *Pin.* 231. *Raii Hist.* i. 560. *Hist. Oxon.* iii. 385. Galeopsis lutea, amplioribus foliis maculatis, *Tourn. Inst.* 186. *Elem. Bot.* 154. *Boerb. Ind. A.* 162. **Spotted Archangel.** In hortis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum Lamio albo convenit, *Mont.*

XXXVI. De Sideritide.

Odore gravi & fœtido cum Lamio convenit, sed foliorum figurâ differt, R. Meth. A.

A. 1. Sideritis, *Offic.* Sideritis hirsuta procumbens, C. B. *Pin.* 233. *Raii Hist.* i. 564. *Tourn. Inst.* 191. *Vaill. Bot. Par.* 184. *Hist. Oxon.* iii. 388. *Buxb.* 302. Sideritis Clusio Hispanica, hirsuta, *J. B.* iii. 426. Sideritis prima herba Judaica, *Park. Theat.* 584. Sideritis herba Judaica, *Ger.* 559. Sideritis Judaica Lobelii, *Ger. Emac.* 690. **Ironwort.** In petrosis Italiae, Hispaniae, &c. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Illita solia suapte vi vulnera sine inflammationis periculo jungunt, *Diosc.*

De Sideritide agentes multum inter se dissentiunt Botanici, & plures plantæ sunt, quibus id nominis ab eis attribuitur. *Dioscorides* tres Sideritidis species describit; quarum primam stirpem à me hoc in loco exhibitam esse existimo, ut quæ judicio nostro melius conveniat cum brevi *Dioscoridis* descriptione, lib. iv. cap. 29. quam quævis alia. *Sideritin* (inquit loco citato) aliqui *Heracleam* vocant: Folia habet *Marrubii*, sed longiora, satis ad frondem *Quercus* aut *Salviæ* accedentia, minus tamen & aspera: Caules edit quadratos, adstantem altos, aut etiam majores, non injucundi gustus, aliquantumque subastringentis; in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, ut in *Marrubio* spectantur: & semen in iis nigrum: nascitur in petrosis. Secundam Sideritidem *Pimpinellam sanguisorbam*, *Offic.* P. 190. *Pharmacolog. nost.* esse, cum nuperis Botanicis consentio. Tertiã, *Geranium Robertianum* seu *Gratiam Dei*, *Offic.* p. 342. ejusd. *Pharmacolog.*

A. 2. Side-

A. 2. Sideritis, *Offic. Chab.* 472. *Schrod.* 158. Sideritis vulgaris, *Ger. Emac.* 697. *Raii Hist.* i. 563. Sideritis vulgaris hirsuta, *J. B.* iii. 425. *Hist. Oxon.* iii. 387. Sideritis vulgaris Clusii, *Park. Theat.* 585. Sideritis vulgaris hirsuta erecta, *C. B. Pin.* 233. *Boerb. Ind. A.* 171. **The other Iron-wozt.** In Germania, Italia, & Francia frequens reperitur. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Ad Vulnere & Hernias commendatur, vehementer exsiccat, ideo ad alba menstrua sistenda convenit, *Magnol.* A priore non specificè differre à quibusdam videtur, sed ejusdem esse varietas.

A. 3. Sideritis flore luteolo & Officinarum, *Rivini. Irr. Mon.* Sideritis pratensis vulgarissima, *Rupp. Flor. Jen.* 187. Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis, *C. B. Pin.* 233. *Tourn. Inst.* 191. *Elem. Bot.* 160. *Hist. Oxon.* iii. 388. Sideritis Monspeliensis Lobelii, *Park. Theat.* 585. **German Iron-wozt.** In pratis. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum præcedentibus convenit, & in Officinis Germanorum in usum venit.

A. 4. Sideritis arvensis latifolia glabra, *C. B. Pin.* 233. *Raii Hist.* i. 566. *Park. Theat.* 587. *Ger. Emac.* 699. *Hist. Oxon.* iii. 389. *Boerb. Ind. A.* 171. Sideritis glabra arvensis, *J. B.* iii. 427. *Chab.* 473. Sideritis flore albo, barba luteola, *Rivini. Irr. Mon. Dill. Cat. Giff.* 154. *Rupp. Flor. Jen.* 186. *Betonica arvensis annua flore ex albo flavescente, Tourn. Inst.* 203. **Iron-wozt with smooth leaves.** Inter segetes. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit. A *Dillenio* Sideritis esse Officinarum existimatur.

XXXVII. De Chamæcisso.

Foliis subrotundis, flagellis reptatricibus, odore foetido, florum labio superiore bifido & reflexo ab aliis distinguitur, *R. Synop.* p. 83.

A. Hedera terrestris, Chamæcissus, *Offic. Merc. Bot.* i. 41. *Phyt. Brit.* 57. Hedera terrestris, *Ger.* 705. *Emac.* 856. *Raii Hist.* i. 567. *Mer. Pin.* 60. Hedera terrestris vulgaris, *C. B. Pin.* 306. *Park. Theat.* 676. *Hist. Oxon.* iii. 409. Chamæcissus five Hedera terrestris, *J. B.* iii. 855. *Chab.* 649. *Buxb.* 64. Chamæcissus, *Rivini. Rupp. Flor. Jen.* 188. Chamæclema vulgaris, *Boerb. Ind. A.* 172. Calamintha humilior folio rotundiori, *Tourn. Inst.* 194. *Elem. Bot.* 163. *Dill. Cat. Giff.* 45. *Raii Synop.* iii. 243. **Ground Ivy.** Ad sepes. Aprili floret. *Usu.* Herba.

Vires. Vulneraria est. Usus creberrimi in tartaro, tam Pulmonum quam Renum, aliarumque partium, incidendo, resolvendo, adeoque confert obstructionibus inde natis, & Ictero, &c. *Schrod.*

Syrupus ex hac planta factus valet ad tussim convulsivam, maximè ad sputum & mictum sanguinis conveniens, *Boerb.*

XXXVIII. De Calamintha.

Notæ sunt, Flores plures simul pediculis oblongis ramosis è foliorum sinubus egressis insidentes, rari & sparsi, è tubo oblongo in duo labia hiantes, quorum superius bifidum rotundatum, alatum, inferius tripartitum, *R. Meth. A.* p. 65.

A. 1. Calamintha montana, *Offic. Calamintha, Chab.* 417. Calamintha vulgaris, *Park. Theat.* 36. *Raii Hist.* i. 569. *Synop.* iii. 243. Calamintha vulgaris Officinarum, *Ger. Emac.* 687. *Mer. Pin.* 18. Calamintha vulgaris vel Officinarum Germanæ, *C. B. Pin.* 228. *Tourn. Inst.* 194. *Elem. Bot.* 169. *Boerb. Ind. A.* 175. *Rupp. Flor. Jen.* 187. *Volck. Flor. Nor.* 75. Calamintha montana vulgaris, *Hist. Oxon.* iii. 413. *Merc. Bot.* i. 25. *Phyt. Brit.* 19. Calamintha flore magno vulgaris, *J. B.* iii. 228. **Calamint.** In viis publicis, sed rarius. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Stomachica ac Uterina est imprimis: Menfes ciet, Foetum ejicit, Urinam movet. Tussi medetur, Hepar reserat, *Schrod.*

A. 2. Calamintha, *Offic. Calamintha odore Pulegii, Ger. Emac.* 687. *Raii Hist.* i. 569. *Synop.* iii. 243. *Mer. Pin.* 18. Calamintha flore minore odore Pulegii, *J. B.* iii. 229. *Chab.* 416. *Hist. Oxon.* iii. 413. Calamintha altera odore Pulegii foliis maculosis, *Park. Theat.* 36. Calamintha Pulegii odore seu Nepeta, *C. B. Pin.* 228. *Tourn. Inst.* 194. *Elem. Bot.* 169. *Boerb. Ind. A.* 175. *Rupp. Flor. Jen.* 188. Calamintha Pulegii odore Nepeta vera Antiquorum, *Merc. Bot.* i. 25. *Phyt. Brit.* 19. **Field Calamint.** In aggeribus sepium & agrorum marginibus. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, cui succedaneum est, & pro ea *Mulierculis Botanopolis Londinensibus* non infrequens venditur.

A. 3. Calamintha magno flore, *Cod. Med.* xxiv. *Hist. Oxon.* iii. 412. *C. B. Pin.* 229. *Tourn. Inst.* 194. *Elem. Bot.* 165. *Boerb. Ind. A.* 175. Calamintha montana præstantior, *Ger.* 556. *Emac.* 687. *Park. Theat.* 37. *Raii Hist.* i. 569. Calamintha montana flore magno ex calice longo, *J. B.*

B. iii. 229. Calamintha montana flore magno ex calyce magno, Chab. 416. Mountain Calamint. In hortis. Julio floret. Usu. Herba. Vires. Cum prioribus convenit. Tres illae species fumantur indiscriminatim, Cod. Med.

XXXIX. De Melissa.

Foliis atrovirentibus, odore Citri, floribus in uno pediculo à cujusque folii sinu egresso pluribus confertis, à reliquis distinguitur, R. H. p. 570.

A. 1. Melissa, Offic. Ger. 558. Emac. 689. Phyt. Brit. 74. Raii Hist. i. 570. Melissa vulgaris, Park. Theat. 40. Melissa hortensis, C. B. Pin. 229. Tourn. Inst. 193. Elem. Bot. 164. Boerb. Ind. A. 167. Rupp. Flor. Jen. 187. Melissa vulgaris odore Citri, J. B. iii. 232. Hist. Oxon. iii. 408. Melissa, Apiastrum, Chab. 417. Baulm. In hortis colitur. Junio floret. Usu. Herba, Flores. Vires. Usus magni est in affectibus Cephalicis, Cardiacis, Uterinis, Stomachicis, adeoque in Melancholia, in somnis turbulentis, Paralyfi, Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lipothymia, cruditate ventriculi, remoratis Mensibus, ac Lochiis puerperarum, suffocationeque Uteri; emendat insuper foetorem anhelitus, &c. Schrad.

A. 2. Pseudo-melissa, Offic. Melissophyllum, Rivin. M. Irr. Knaut. Meth. 93. Rupp. Flor. Jen. 187. Melissophyllum Fuchsi, Park. Theat. 40. Melissa Tragi, Chom. 692. Melissa Fuchsi, Lob. Icon. 515. Mer. Pin. 76. Raii Synop. iii. 242. Ger. Emac. 690. Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascens, Tourn. Inst. 193. Boerb. Ind. A. 167. Melissa adulterina quorundam amplis foliis & floribus non grati odoris, J. B. iii. 233. Chab. 417. Lamium montanum Melissa folio, C. B. Pin. 331. Raii Hist. i. 561. Hist. Oxon. iii. 385. Bastard Baulm. In sylvis. Usu. Herba. Vires. Vulneraria à quibusdam existimatur. In suppressione Urinae multum laudatur; Aperitiva est planta, Chomel.

XL. De Ballote.

Odore foetido Lamium refert, à quo differt, floribus in singulis pediculis à singulis foliorum egressis pluribus confertis, calycibus minus patulis & longioribus, R. Synop. p. 84.

A. Marrubium nigrum, Ballote, Offic. Marrubium nigrum, Ger. 566. Emac. 701. Raii Hist. i. 571. Mer. Pin. 75. Marrubium nigrum sive Ballote, J. B. iii. 318. Chab. 436.

Marrubium nigrum foetidum Ballote dictum, Park. Theat. 1230. Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis, C. B. Pin. 230. Hist. Oxon. iii. 377. Marrubiastrum, Rivin. Irr. Mon. Ballote, Tourn. Inst. 185. Elem. Bot. 153. Raii Synop. iii. 244. Boerb. Ind. A. 175. Rupp. Flor. Jen. 183. Dill. Cat. Giff. 135. Buxb. 35. Ballote, Marrubium nigrum foetidum, Merc. Bot. i. 23. Phyt. Brit. 14. Black Horehound. Ad sepes. Junio floret. Usu. Herba, sed rarius. Vires. Remedium est in Hypochondriacis & Hysterics affectibus, D. Bowle.

Vis ejus efficax adversus canis morsus, foliis ex sale illitis. Ferventi cinere flaccescunt folia, & condylomata reprimunt, purgant & sordida ulcera cum melle, Diosc.

Planta est optimae virtutis, estque, inquit Boerhaavius, Castoreum rusticorum, inter uterina habetur, & contra insultus Epilepticos, Apoplecticos, & Hystericos optimus est.

XLI. De Cassida.

NOtae sunt, Flosculi oblongi in singulis foliorum alis singuli, calyx clausus seu operculatus, crepidae aut calceamenti calcantium referens, R. Synop. iii. 244.

A. Scutellaria, Offic. Buxb. 298. Rivin. Irr. Mon. Scutellaria aquatica, vulgò Tertianaria dicta, Herm. Hort. Lugd. Bat. 546. Velck. Flo. Nor. 344. Scutellaria aquatica, angustifolia vulgaris, Herm. Flor. ii. 77. Scutellaria palustris repens caerulea, Hist. Oxon. iii. 416. Cassida palustris vulgatiores flore caeruleo, Tourn. Inst. 182. Elem. Bot. 150. Boerb. Ind. A. 177. Dill. Cat. Giff. 117. Rupp. Flor. Jen. 180. Raii Synop. iii. 244. Tertianaria aliis Lyfimachia galericulata, J. B. iii. 435. Lyfimachia galericulata, Ger. 387. n. 6. Emac. 477. Mer. Pin. 74. Lyfimachia caerulea galericulata, Merc. Bot. i. 49. Phyt. Brit. 71. Lyfimachia caerulea galericulata seu Gratiola caerulea, C. B. Pin. 246. Raii Hist. i. 572. Hooded Willow-herb. In palustribus. Julio & Augusto floret. Usu. Herba. Vires. Insigni amarore est praedita hinc in febribus tertianis utilis esse praedicatur, Buxb.

XLII. De Chamæpity.

Foliis Pineorum æmulis, odore resinoso, floribus galeae seu labio superiore carentibus, à reliquis differt, R. Synop. p. 84.

X 2

A. 1. Cha-

A. 1. *Chamaepitys*, Iva arthritica, *Offic.* *Chamaepitys* five Iva Moschata, *Chab.* 430. *Chamaepitys* mas, *Ger.* 421. *Emac.* 525. *Mer. Pin.* 26. *Chamaepitys*, Iva arthritica five Moschata, *Merc. Bot.* i. 28. *Phyt. Brit.* 27. *Chamaepitys* Officinarium, *Rupp. Flor. Jen.* 178. *Chamaepitys* vulgaris, *Park. Theat.* 283. *Raii Hist.* i. 573. *Synop.* iii. 244. *Chamaepitys* lutea vulgaris seu folio trifido, *C. B. Pin.* 249. *Tourn. Inst.* 208. *Elem. Bot.* 177. *Hist. Oxon.* iii. 424. *Boerb. Ind. A.* 183. *Buxb.* 67. *Chamaepitys* vulgaris odorata flore luteo, *J. B. iii.* 295. **Ground Pine.** In agris arenosis, sed rarius. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Nervosum genus roborat, Diuretica est & emmenagoga, confert in Arthriticis doloribus, *Schrod.*

Vulnera glutinat, nomas cohibet, menses movet, foetum pellit, abortum provocat. In urinæ difficultate, & in mictura sanguinis multum commendatur, *Hist. Ox.* Ictero medetur si septem diebus in vino potetur, *Diosc.*

A. 2. *Chamaepitys* altera, *Offic.* *Chamaepitys* Moschata, *Cod. Med.* xxxiv. *Chamaepitys* Moschata foliis ferratis, an prima *Dioscoridis*, *C. B. Pin.* 244. *Tourn. Inst.* 208. *Elem. Bot.* 177. *Boerb. Ind. A.* 183. *Raii Hist.* i. 574. *Chamaepitys* five Iva Moschata Monspeliensium, *J. B. iii.* 425. *Chamaepitys* five Iva Moschata Monspeliensium, *Chab.* 420. *Chamaepitys*, Iva Moschata Monspeliaca, *Ger.* 422. *Emac.* 525. *Chamaepitys*, Anthyllis altera herbariorum, *Park. Theat.* 282. **French Ground Pine.** In Gallia frequens reperitur. Junio floret. *Ufu.* Herba.

A. 3. *Chamaepitys* tertia seu mas, *Offic.* *Chamaepitys* odorator, *Park. Theat.* 283. *Chamaepitys* Incana exiguo folio, *C. B. Pin.* 249. *Chamaepitys* folio non laciniato, *J. B. iii.* 297. *Chamaepitys* folio non laciniato seu tertia *Dioscoridis* Matthiolo, *Chab.* 431. *Raii Hist.* i. 574. *Chamaepitys* tertia *Dodonzei*, *Ger. Emac.* 532. **Italian Ground Pine.** In Italia non infrequens. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Hæ duæ vim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem, *Diosc.*

XLIII. De Bugula.

NOtæ sunt, Flores galeæ carentes, caules duæm generum, alii teretes & repentes, alii quadrati & erecti, flores sustinentes in spicam laxam dispositos, *R. Synop.* p. 84.

A. Bugula, *Consolida media*, *Offic.* Bugula, *Ger.* 500. *Emac.* 631. *Merc. Bot.* i. 24. *Phyt. Brit.* 17. *Raii Hist.* i. 575. *Synop.* iii. 245. *Mer. Pin.* 17. *Dill. Cat. Giff.* 49. *Buxb.* 46. *Rupp. Flor. Jen.* 187. *Tourn. Inst.* 208. *Elem. Bot.* 177. *Boerb. Ind. A.* 184. *Rivini. Irr. Mon.* Bugula vulgaris sylvatica cærulea, *Hist. Oxon.* iii. 391. Bugula vulgaris flore cæruleo, *Park. Theat.* 525. Bugula *Consolida media* pratensis cærulea, *C. B. Pin.* 260. *Consolida media*, quibusdam Bugula, *J. B. iii.* 430. *Consolida media*, symphytum medium, Bugula, *Chab.* 474. **Bugle.** In sylvis & pratis humidis. Maio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est insignis.

Tam intrinsecus quam extrinsecus adhibita: confert & ictero, hepatis obstructioni, urinæ retentioni, herniis, &c. *Schrod.*

XLIV. De Scorodonia.

ODore Allii & *Salviæ* foliis, quodque flos galeæ careat, ab aliis distinguitur, *R. Synop.* p. 85.

A. Scorodonia, *Salvia sylvestris*, *Offic.* Scorodonia, *Dill. Cat. Giff.* 156. *Rupp. Flor. Jen.* 177. *Buxb.* 296. *Rivini. Irr. Mon.* Scorodonia five *Salvia agrestis*, *Ger.* 536. *Emac.* 662. *Raii Hist.* i. 576. *Synop.* iii. 247. Scorodonia five *Scordium alterum* quibusdam, & *Salvia agrestis*, *Park. Theat.* 111. *Scordotis* five *Scordium* foliis *Salviæ*, *J. B. iii.* 293. *Chab.* 430. *Salvia agrestis*, *Salvia bosci*, Scorodonia, *Merc. Bot.* i. 66. *Phyt. Brit.* 108. *Salvia agrestis* five Scorodonia, *Mer. Pin.* 108. *Scordium alterum* five *Salvia agrestis*, *C. B. Pin.* 247. *Boerb. Ind. A.* 183. *Chamaedrys* elatior *Salviæ* folio, flore ochroleuco, *Hist. Oxon.* iii. 423. *Chamaedrys* fruticosa sylvestris *Melissæ* folio, *Tourn. Inst.* 205. *Elem. Bot.* 173. **Wood Sage.** In sylvis & dumetis. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est è præcipuis, Menses & Urinam ciet. Lui Venereæ prodesse creditur. Ut odore, sic viribus cum *Scordio* convenit.

Gefnero in remediis *Scordio* præfertur. In ulceribus gangrænosus claudendis celebravit *Hildanus*. Vide *R. Hist.* loc. supracitato.

XLV. De Scordio.

ODore Allii, Foliis & facie *Chamaedrys*, loco palustri & reptatu suo, quodque flos galea careat, ab aliis distinguitur, *R. Synop.* p. 85.

A. *Scordium*,

A. Scordium, *Offic. Ger.* 534. *Emac.* 661. *Raii Hist.* i. 576. *Synop.* iii. 246. *Mer. Pin.* 110. *Merc. Bot.* ii. 32. *Phyt. Brit.* 110. *Boerb. Ind. A.* 183. *Dill. Cat. Giff.* 125. *C. B. Pin.* 247. *J. B.* iii. 292. *Chab.* 419. *Rupp. Flor.* *Jen.* 177. *Buxb.* 296. *Volck. Flor. Nor.* 341. *Riv. Irr. Mon.* Scordium legitimum, *Park. Theat.* 111. *Chamaedrys palustris*, *Allium redolens*, *Hist. Oxon.* iii. 423. *Chamaedrys palustris canescens*, seu *Scordium Officinarum*, *Tourn. Inst.* 205. *Elem. Bot.* 172. *Water-Germander*. In palustribus, sed rarius. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Alexipharmacum, ac fudorificum est. *Usus* præcip. in peste, pestilentialibusque morbis; febribus malignis (tam præservando quam curando) in obstructionibus hepatis, ac lienis; in pulmonibus purulentis ac mucilagine refertis: lumbricos necat. Extrinsicus mundificat vulnera, & ulcera; lenit dolores podagricos, *Schrod.*

a { Caudatis, aut plumosis; foliis pennatis; radice aromatica: *Caryophyllata*.
Nudis, absque ullis appendicibus; foliis venosis.
Digitatis, in eodem pediculo
Ternis; seminibus pulpæ molli esculentæ innascentibus: *Fragaria*.
Quinis, aut septenis; flore
Pentapetalo: *Pentaphyllum*.
Tetrapetalo: *Tormentilla*.
Pinnatis, incanis, aut tomentosis, reptatrix: *Argentina*.
Absque perianthio aut nudo, polyphillo, caule indeterminato, foliato, speciosum florum thyrsum proferente; foliis pinnatis; radicibus
Tuberosis, bulbillis ab extremis fibrarum filamentis dependentibus, seminibus in circulum dispositis: *Filipendula*.
Fibrosis, seminibus incurvis, in globulum congestis: *Ulmaria*.

SECTIO DECIMA TERTIA.

De Herbis semine nudo Polyspermis, Hoc est, in quibus singulis floribus plura quatuor succedunt semina, nullo certo aut definito numero.

PRO Seminibus nudis, cum reverendissimo & doctissimo D. Raio, habeo quæcunque folliculos aut tegmina privata sponte non exuunt.

Herbæ semine nudo Polyspermæ sunt vel flore

Perianthio tecto,
Triphylo; flore
Tripetalo, aquaticæ foliis Plantaginis: *Plantago aquatica*.
Polypetalo, calyce
Cum flore deciduo; foliis integris, subrotundis; radicibus tuberosis, perennibus, flore flavo: *Chelidonium minus*.
A flore superstiti, foliis tripartito divisis, floribus cæruleis: *Hepatica nobilis*.
Pentaphyllo, una cum flore deciduo; seminibus in globulum congestis, flore pentapetalo: *Ranunculus*.
Decaphyllo seu in decem segmenta diviso, seminibus

I. De Chelidonio.

Calyce triphylo cum flore polypetalo, luteo, deciduo, & foliis integris, subrotundis à congeneribus differt. *R. Synop.* p. 86.

A. Chelidonium minus, *Offic. Ger.* 669. *Emac.* 816. *Chab.* 484. *Park. Theat.* 617. *Raii Hist.* 579. *Synop.* iii. 246. *Mer. Pin.* 26. *Boerb. Ind. A.* 29. Chelidonium minus, sive Scrophularia minor, *Merc. Bot.* i. 28. *Phyt. Brit.* 27. Chelidonia rotundifolia minor, *C. B. Pin.* 309. Scrophularia minor sive Chelidonium minus vulgò dictum, *J. B.* iii. 468. *Ficaria*, *Dill. Cat. Giff.* 39. *Ficaria vulgaris*, *Rupp. Flor.* *Jen.* 127. *Buxb.* 110. *Ranunculus vernus rotundifolius minor*, *Tourn. Inst.* 286. *Ranunculus præcox rotundifolius radice granulosa*, *Hist. Oxon.* ii. 446. *Ranunculus Chelidonides rotundifolius præcox radice granulata*, *Pluk. Almag.* 314. *Ranunculus rotundifolius minor*, *Hort. Monsp.* 169. *Pile-wort*. In pratis. Martio, & Aprili floret. *Usu.* Radix, herba. *Vires.* Spleneticum est. *Usus* præcipui est in Ictero, Scorbuto, Hæmorrhoidum fluore, Scrophulis, & Strumis. Extrinsicus specificè mariscas seu ficos ani curat, dentiumque putredini maximo perè subvenit, *Schrod.*

Habita est, inquit *Boerhavius*, pro summo arcano in Hæmorrhoidibus, vel in decocto sumpta, vel extra applicata. Infantibus, quibus intestina in Hernia procubuerunt prodest.

II. De