

SECTIO DECIMA SEXTA.

De Herbis Multifiliis, seu Corniculatis.

Plantas multifiliis voco, quæ ad singulos flores plures producunt filiquas, seu cornicula disjuncta, R. Hist. p. 686.

Herbæ multifiliæ sunt vel foliis

- Crassis, succulentis
 - Majores latifoliæ, foliis
 - Ad radicem multis
 - In globulos sine pediculis congestis; floribus in furculis reflexis in summis caulibus: *Sempervivum*.
 - Pediculis infidentibus; floribus cylindraceis, non deciduis, in spicas digestis; *Umbilicus Veneris*.
 - Ad radicem nullis, radice inodorâ tuberosâ: *Telephium*.
 - Minores: *Illecebra*.
- Texturæ rarioris & minus succulentis, quibus
 - Folia
 - Digitata; flores non decidui; radices cathartica: *Helleborus Niger*.
 - Pinnata, Fraxini familia; flores in spicas digesti; semina nigra, majuscula, splendentia: *Fraxinella*.
 - Flores
 - Cucullati; folia circumscriptione subrotunda, laciniata; semina rugosa: *Aconitum*.
 - Corniculati.
 - Unico cornu seu calcaris retrorsum extenso; semina triquetra,
 - Nigra; minora folia in tenues lacinas dissecta: *Delphinium*.
 - Fusca, majuscula, rugosa, folia vitiginea, Ricini familia: *Staphis agria*.
 - Pluribus corniculis recurvis, penduli, semina nigra, lucida; folia umbelliferarum modo divisa: *Aquilegia*.
 - Expansi majores, rosei; semina majuscula, rotunda, per maturitatem nigra; radices tuberosæ: *Pæonia*.

I. De Sempervivo.

Notæ sunt, Folia in globulos oculi bovini æmulos congesta, lata, & succulenta; flores in furculis reflexis in summis caulibus stellati, Raii Synop. pag. 98.

A. *Sedum majus*, *Sempervivum majus*, Offic. *Sedum majus vulgare*, C. B. Pin. 289. Raii Hist. i. 687. J. B. iii. 687. Hist. Oxon. iii. 474. Tourn. Inst. 262. Elem. Bot. 228. Boerb. Ind. A. 286. Park. Theat. 730. *Sedum*, seu *Sempervivum majus*, Mer. Pin. 110. *Sedum*; *Aizoon*; *sempervivum majus vulgare*, Merc. Bot. i. 67. Phyt. Brit. 110. *Sedum*, five *Aizoon majus vulgare*, Chab. 538. *Sempervivum tectorum majus*, Rupp. Flor. Jen. 132. *Sempervivum majus*, Ger. 411. Emac. 510. Raii Synop. iii. 269. Buxb. 300. Dill. Cat. Giff. 142. *Houzeletk*. In domorum tectis. Junio floret. Usus. Herba. Vires. Refrigerat, & validè astringit. Usus præcip. intrinsecus in febribus biliosis. Sedat sitim, & compescit ardorem, Schrod.

II. De Telephio.

Folia non conglobantur in capitula; flores velut in umbella pentapetali.

A. 1. *Telephium*, *Crassula*, *Fabaria*, Offic. *Telephium*, five *Fabaria*, vel *Anacampteros*, Cod. Med. cxv. *Telephium vulgare*, C. B. Pin. 287. Raii Hist. i. 689. Hist. Oxon. iii. 467. Buxb. 315. *Telephium*, five *Crassula major vulgaris*, Park. Theat. 726. Mer. Pin. 117. *Telephium vulgare*, *Fabaria*, Merc. Bot. i. 72. Phyt. Brit. 120. *Fabaria Officinarum*, Rupp. Flor. Jen. 103. *Anacampteros*, vulgò *Faba crassa*, J. B. iii. 681. Tourn. Inst. 264. Elem. Bot. 230. Boerb. Ind. A. 288. Dill. Cat. Giff. 168. Raii Synop. iii. 269. *Dypine*. In agris. Junio floret. Usus. Herba. Vires. Vulneraria est, & astringens. Usus præcip. in consolidanda intestinorum erosione per dysenteriam introducta; in curanda hernia; in ambustis medendis, Schrod.

A. 2. *Rhodia radix*, Offic. Ger. 426. Emac. 532. Raii Hist. i. 690. Park. Theat. 729. Mer. Pin. 104. C. B. Pin. 286. J. B. iii. 683. Chab. 536. *Rhodia* (vel *Rosea*) radix, Merc. Bot. ii. 31. Phyt. Brit. 105. *Rosea Rivini & Officinarum*, Rupp. Flor. Jen. 72. *Telephium radice Rosam spirante*, majus, Herm. Hort. Lugd. Bat. 589. *Telephium luteum minus*, radice

dice Rosam redolente, *Hist. Oxon.* iii. 468. Anacamperos radice Rosam spirante, *Elem. Bot.* 230. Anacamperos radice Rosam spirante major, *Tourn. Inst.* 264. *Boerb. Ind. A.* 269. *Raii Synop.* iii. 269. **Rosewort.** In montosis reperitur. Vere floret. *Ufu.* Radix tuberosa, fragilis, foris fusca, intus alba, odore & sapore roseo. *Vires.* Calfacit & siccat, Cephalica est. Usus præcipuus in dolore capitis.

III. De Cepæa.

Nota sunt, Folia succulenta Portulacæ similia; flores stellati in caulibus à medio summum tenus.

A. Cepæa, *Offic. Ger. Emac.* 621. C. B. *Pin.* 238. *J. B.* iii. 679. *Chab.* 536. *Raii Hist.* i. 690. Cepæa Matthioli, *Park. Theat.* 727. Sedum Cepæa dictum, *Herm. Hort. Lugd. Bat.* 555. *Tourn. Inst.* 263. *Boerb. Ind. A.* 287. *Buxb.* 300. Sedum annuum album, oblongo Portulacæ minoris folio, *Hist. Oxon.* iii. 473. **Wale Dypine.** In hortis feritur. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Folia in vino pota Urinæ stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus opitulatur, *Diosc.*

IV. De Illecebra.

Folia parva teretiuscula, sapore acri, flores pro parvitate plantulæ speciosi, lutei.

A. Illecebra, *Offic.* Illecebra minor seu Sedum tertium Dioscoridis, *Park. Theat.* 733. Vermicularis seu Illecebra minor acris, *Ger. Emac.* 517. Sempervivum minus vermiculatum, acre, C. B. *Pin.* 283. Sedum parvum acre flore luteo, *J. B.* iii. 695. *Raii Hist.* ii. 1041. *Synop.* iii. 270. *Hist. Oxon.* iii. 471. *Tourn. Inst.* 263. *Elem. Bot.* 229. *Boerb. Ind. A.* 286. *Rupp. Flor. Jen.* 102. *Dill. Cat. Giff.* 88. *Buxb.* 299. Sedum tertium Dioscoridis sive Illecebra minor, *Mer. Pin.* iii. Sedum minimum flore luteo, Dioscoridis Aizoon tertium, *Chab.* 541. Sedum sive Sempervivum minimum acre, *Merc. Bot.* i. 68. *Phyt. Brit.* iii. **Wall Pepper.** In muris & tectis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Strumas discutit. Acris est planta, ac vehementer excalesciens. Intrinsicus succus aliquo liquore extractus vomitum movet, crassos, pituitososque ac biliosos humores potenter educit, unde in febribus quartanis mirè confert. Inter antiscorbutica recensetur.

Extrinsicus rubificat, vesicas excitat, ac tandem exulcerat, *Diosc.*

V. De Umbilico Veneris.

Folia rotundis crenatis, floribus cylindraceis, non deciduis, à reliquis differt.

A. 1. Umbilicus Veneris, *Offic. Ger.* 423. *Emac.* 528. *Mer. Pin.* 126. *Merc. Bot.* i. 77. *Phyt. Brit.* 131. Umbilicus Veneris vulgaris, *Park. Theat.* 740. Cotyledon major, C. B. *Pin.* 285. *Tourn. Inst.* 90. *Elem. Bot.* 76. *Boerb. Ind. A.* 287. Cotyledon vera, radice tuberosa, *J. B.* iii. 683. *Raii Hist.* ii. 1878. *Synop.* iii. 271. Cotyledon, Umbilicus Veneris, *Chab.* 537. Cotyledon Dioscoridis, Umbilicus Veneris vulgaris, *Rupp. Flor. Jen.* 31. Sedum luteum murale Spicatum, folio umbilicato rotundo, *Hist. Oxon.* iii. 470. **Ravelwort.** In faxis & muris. Aprili floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrig. cum Sempervivo viribus convenit.

Leviter astringere, refrigerare, percutere & abstergere asserit *Gal.* Succus inflammationibus, ignibus sacris, strumis & pernionibus illitu auxiliatur; stomachi ardorem mitigat, &c. Folia cum radice comosa calculosis profunt, & Urinam cient, *Diosc.*

A. 2. Cotyledon, *Offic.* Cotyledon radice tuberosa longa repente, *Mer. Hort. Blef.* 257. *Chomel.* 807. *Tourn. Inst.* 90. *Elem. Bot.* 76. *Raii Hist.* ii. 1878. Cotyledon flore luteo radice repente, *Dodart. Mem.* 73. Cotyledon flore luteo maxima, *Hort. Lugd. Bat.* 191. Sedum luteum umbilicatum spicatum radice repente majus, *Hist. Oxon.* iii. 471. **Creeping Ravelwort.** In hortis, sed rarius. Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VI. De Pæonia.

Nota sunt, Flores rosei maximi, semina majuscula rotunda, per maturitatem nigra, radices tuberosæ; folia composita, R. H. p. 693.

A. 1. Pæonia mas, *Offic. Ger.* 830. *Emac.* 980. *Boerb. Ind. A.* 292. *Park. Theat.* 1381. *Parad.* 341. *Raii Hist.* i. 693. *Merc. Pin.* 96. Pæonia mas præcocior, *J. B.* iii. 492. *Chab.* 490. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas, C. B. *Pin.* 323. *Tourn. Inst.* 273. *Elem. Bot.* 238. Pæonia simplex latiore folio trifido, *Hist. Oxon.* iii. 454. **Pale Peionp.** In hortis. Maio floret.

floret. *Ufu.* Radix, Semen. Radix crassa, tuberosa, foris fusca, intus pallida est, saporis subdulcis, odoris nullius. Semina sunt grana subrotunda, nigra, lucida, sub cortice crassiusculo membranaceo includentia pulpam albicantem, saporis subdulcis, odoris nullius. *Vires.* Ufus præcipuus est in affectibus Cephalicis, Epilepsiâ, Incubo, &c. Uterinis, Mensibus obstructis, Lochiis purgandis, doloreque post partum mitigando, Hepatis obstructione, *Schrod.*

A. 2. *Pæonia scemina, Offic. Ger.* 830. *Emac.* 981. *Mer. Pin.* 96. *Raii Hist.* i. 694. *Pæonia scemina vulgaris, flore simplici, Park. Theat.* 1380. *Parad.* 490. *Pæonia communis vel scemina, C. B. Pin.* 323. *Hist. Oxon.* iii. 454. *Tourn. Inst.* 274. *Elem. Bot.* 238. *Boerb. Ind. A.* 294. *Pæonia scemina vulgatiore, J. B. iii.* 492. *Chab.* 490. **Female Peony.** In hortis. Maio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum priore convenit viribus.

A. 3. *Pæonia, Offic. Pæonia scemina multiplex, Ger.* 831. *Emac.* 981. *Pæonia scemina vulgaris, flore pleno, rubro, Park. Theat.* 1380. *Parad.* 341. *Pæonia scemina, flore pleno, rubro, majore, C. B. Pin.* 324. *Tourn. Inst.* 274. *Boerb. Ind. A.* 295. *Hist. Oxon.* iii. 455. *Pæonia flore pleno, rubro, J. B. iii.* 493. *Pæonia scemina polyanthos, Chab.* 490. **Common Peony.** In hortis frequens. Maio floret. *Ufu.* Flores. *Vires.* Cum mare viribus convenit. Vide plura de *Pæoniæ* historiâ & qualitatibus apud *Hunerswolfium in Anatomia Pæon.*

A. 4. *Pæonia flore albicante, Offic. Pæonia flore pleno albicante, Park. Parad.* 342. *Pæonia flore ex albido pleno major, C. B. Pin.* 323. *Raii Hist.* i. 695. *Tourn. Inst.* 274. *Boerb. Ind. A.* 295. *Pæonia scemina polyanthos flore albo, Ger.* 831. *Emac.* 982. *Pæonia albo flore pleno, five polyanthos alba scemina, J. B. iii.* 494. **White flowered Female Peony.** In hortis reperitur. Maio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VII. De Helleboro alba.

Flore sex foliolis constructo, semine triquetro, foliis nervosis, tenuioribus, lirate striatis, radice fibrosa, purgatrice, emetica & sternutatoria vi prædita ab aliis distinguitur, R. H. p. 168.

A. *Helleborus albus, Elleborus, Offic. Helleborus albus, Ger.* 356. *Emac.* 440. *Raii Hist.* i. 168. *Helleborus albus flore subviridi, C. B. Pin.*

186. *Hist. Oxon.* iii. 485. *Helleborus albus flore ex viridi albescente, J. B. iii.* 634. *Helleborus, Veratrum, Chab.* 527. *Helleborus albus vulgaris, Park. Theat.* 217. *Parad.* 346. *Veratrum flore subviridi, Tourn. Inst.* 272. *Elem. Bot.* 237. *Boerb. Ind. A.* 296. **White Hellebore.** Montanis & asperis gaudet inter Germanos. In *Ufu* est Radix oblonga, aliquando pollice crassior, foris fusca, intus alba, numerosis albicantibus fibris stipata, saporis acris, paulum amaricantis, subastringentis, ingrati & nauseosi. *Vires.* Ob violentiam purgationis, quam per superiora & inferiora exercet, usum purgandi internum soli ferè Helleboro nigro relinquit. Extrinsecus sternutationes movet, scabies, impetigines, & serpigines sanat, *Schrod.*

Planta est, inquit *Boerhaavius*, equis magis quam hominibus idonea.

VIII. De Helleboro nigro.

Notæ sunt, Folia digitata, flores non decidui, radices cathartice, R. H. p. 697.

A. 1. *Helleborus niger, Offic. Helleborus, five Elleborus, Cod. Med. lviii. Helleborus niger verus, Ger.* 825. *Emac.* 976. *Park. Theat.* 211. *Parad.* 344. *Raii Hist.* i. 697. *Helleborus niger flore roseo, C. B. Pin.* 186. *Boerb. Ind. A.* 297. *Hist. Oxon.* iii. 359. *Helleborus niger flore albo, J. B. iii.* 634. *Chab.* 527. *Helleborus niger angustioribus foliis, Elem. Bot.* 235. *Tourn. Inst.* 272. *Rupp. Flor. Jen.* 130. *Melampodium, Pharm. Bat. p.* 71. **Black Hellebore.** In hortis botanicis. Januario floret. *Ufu.* Radices, quæ sunt tenues, fibrosæ, nigricantes, ex imo capite propendentes, saporis acris, pungitivi, amari, ingrati & nauseosi. *Vires.* Purgat potenter humores melancholicos. Utilis est in Mania, Insania, Hypochondriaca passione, Elephantiasi, Herpete, Cancro, Quartana, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Scabie, *Schrod.* In passione Hysterica, & affectione Hypochondriaca remedium specificum & efficacissimum existimatur, *Purcel.*

A. 2. *Helleboraster, Offic. Helleboraster minor flore viridante, Park. Theat.* 212. *Helleboraster minor, Park. Parad.* 344. *Helleborastrum, Ger.* 825. *Emac.* 976. *Mer. Pin.* 61. *Helleborus niger hortensis flore viridi, C. B. Pin.* 185. *Merc. Bot.* ii. 23. *Phyt. Brit.* 57. *Raii Hist.* i. 697. *Synop.* iii. 271. *Boerb. Ind. A.* 296. *Tourn. Inst.* 272. *Elem. Bot.* 235. *Rupp. Flor. Jen.*

Jen. 131. *Helleborus niger sylvestris*, ramosus, latiore folio deciduo, *Hist. Oxon.* iii. 359. *Helleborus niger vulgaris* flore viridi vel herbaceo, radice diuturna, *J. B.* iii. 636. *Chab.* 527. **Beet's Foot.** In locis montosis. Martio & Aprili floret. *Ufu.* Radix, Folia. *Vires.* Folia adversus variolas aliosque morbos contagiosos (in cerevisia pota) mire commendat D. *Jobson.* Radix easdem facultates cum genuino habet, & fumantur indiscriminatim. Purgat inferiorem ventrem, pituitam & flavam bilem ducens, *J. B.* Hippitriaci & Pecuarii in lue jumentorum huic plurimum confidunt, scilicet boum palearia, equorum cutem infra cervicem, pecudum aures stylo pertundunt, dein fibras radicum hujus per vulnus transfadigunt, unde **Peg-Roots** dicuntur.

A. 3. *Helleborastrum*, *Offic.* *Cod. Med.* lviii. *Pharm. Bat.* 57. *Mer. Pin.* 61. *Helleboraster*, *Rupp. Flor. Jen.* 131. *Helleboraster maximus*, *Ger.* 826. *Emac.* 976. *Raii Hist.* i. 698. *Synop.* iii. 271. *Helleboraster maximus* sive *Confiligo*, *Park. Theat.* 212. *Helleborus niger foetidus*, *C. B. Pin.* 185. *Tourn. Inst.* 272. *Elem. Bot.* 235. *Boerb. Ind. A.* 296. *Merc. Bot.* ii. 24. *Phyt. Brit.* 57. *Helleboraster niger* ramosus angustifolius semper virens elatior, *Hist. Oxon.* iii. 359. *Helleborus niger sylvestris*, adulterinus etiam, hyeme virens, *J. B.* iii. 880. *Helleborus sylvestris adulterinus* etiam hyeme virens, *Chab.* 528. **Setterwort.** In sylvis, sed rarius. Februario & Martio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Pulvis foliorum exsiccatum pauca quantitate verminantibus pueris exhibetur, optimumque & certissimum remedium vulgè æstimatur. Adnotat autem bene *Tragus* internis corporis partibus adhiberi non debere, sed ab illo cavendum tanquam à pestilentissima herba.

IX. De Fraxinella.

Foliis *Fraxini*, floribus in spica speciosis, seminibus magnis, nigris, splendidibus ab aliis differt, *R. H.* p. 698.

A. 1. *Dictamnus albus*, *Fraxinella*, *Offic.* *Dictamnus albus* vulgo, sive *Fraxinella*, *C. B. Pin.* 222. *Fraxinella*, *Ger.* 1056. *Emac.* 1245. *Tourn. Inst.* 430. *Elem. Bot.* 341. *Boerb. Ind. A.* 299. *Hist. Oxon.* iii. 456. *Fraxinella vulgaris*, *Park. Theat.* 417. *Fraxinella* flore purpureo & albo, *Park. Parad.* 333. *Fraxinella* officinis *Dictamnus*, *J. B.* iii. 494. *Buxb.* 217. *Raii Hist.* i. 698. *Fraxinella*, *Dictamnus albus*, *Chab.* *Fraxi-*

nella & *Dictamnus albus* *Officinarum*, *Rupp. Flor. Jen.* 235. **Wastard Dittany.** In hortis. Julio floret. *Ufu.* Radices sive radicum cortices, crassiusculæ, albicantes, Cannulæ in modum convolutæ, saporis amariusculi, odoris nullius. *Vires.* Cordialis est, Alexipharmaca, Uterina, Cephalica, Vermes necat. *Ufus* præcipui in morbis malignis, in Epilepsia, aliisque affectibus capitis, in obstru-
ctione Uteri, &c. *Schrad.*

Duas *Tragii* species *Dioscorides* memorat, verum adeo obscure de iis scripsit, ut non leves controversiæ inter Botanicos de earum prima inde exportæ sint, varias plantas eo nomine appellantes. *Gesnerus* *Polygonum bacciferum* pro eo habet, *De-doneus*, in *Historia Gallica*, Atriplicem olidam quam *Tragium Germanicum* vocat; *Pona* & *Bellus* *Androsæmum foetidum*, *Tragium Creticum* *Bellonio* dictum, *Lobelius* *Tragium Dioscoridis* *Fraxinellam* nostram esse arbitratur, in cuius opinionem & ipse propendeo, quod nulla alia ex prædictis planta, *Lentisco semine folio & ramis similis*, singulis tamen minoribus, dici potest.

Alterum *Dioscoridis* *Tragium Rauwolfius* *Stæchadis* speciem fuisse credidit, ut suo loco ostendi.

A. 2. *Anisum Indicum*, *Offic.* *Anisum stellatum* seu *Sinense* & *Philippense*, *Cod. Med.* x. *Anisum Indicum stellatum*, *Ger. Emac.* 1035. *Anisum peregrinum*, *C. B. Pin.* 159. *Anisum exoticum* *Philippinarum Insularum*, *Park. Theat.* 1569. *Zingi fructus stellatus* sive *Anisum Indicum*, *J. B.* i. 586. *Chab.* 36. *Raii Hist.* ii. 1835. *Fœniculum Sinense*, *Redi Exper. Nat.* 172. *Cardamomum Siberiense Patavinorum*, *Hort. Besiam.* *Euonymo* ad *Philippinarum Insularum*, *Anisum spirans*, nuculas in capsulis stelliformiter congestis, proferens, *Pluk. Almag.* 140. **Indian Anise** à similitudine seminum *Anisi* quoad odorem, & **Stellate Anise** à figura capsulæ seminum stellam referente. Ex India Orientali ad nos transportatur. *Ufu.* *Theculæ*, quæ fusci coloris sunt, singulæ singula semine coloris fusci splendentis, *Lenticulæ* circiter magnitudine continent *Vires*.

X. De Caliba Palustri.

Notæ sunt, *Flos Ranunculi*, sed nudus absque perianthio, *siliquæ radiatim dispositæ*, *folia integra subrotunda*, *R. Meth. A.* p. 78.

A. *Populago*, *Offic.* *Raii Synop.* iii. 272. *Dill. Cat. Giff.* 52. *Elem. Bot.* 237. *Populago* flore majore, *Tourn. Inst.* 273. *Boerb. Ind. A.* 298. *Caltha palustris*, *J. B.* iii. 479. *Chab.* 485. *Raii Hist.*

Hist. i. 700. *Merc. Bot.* i. 25. *Phyt. Brit.* 19. *Caltha palustris* major, *Ger.* 670. *Emac.* 817. *Mer. Pin.* 18. *Caltha palustris* vulgaris simplex, *Park. Theat.* 1213. *Caltha palustris* flore simplici, *C. B. Pin.* 276. *Rupp. Flor. Jen.* 105. *Buxb.* 50. *Pseudo-Helleborus ranunculoides* pratensis rotundifolius simplex, *Hist. Oxon.* iii. 461. **Marsh Marigold.** In aquosis. Maio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Lumborum doloribus propitia est, *Diosc.* Herba est caustica seu valde acris, & Helleboro similis, *Boerb. Hist.* 378.

XI. De Butomo.

Hujus notæ sunt, Folia graminea triangula; caules nudi in summo florum umbellæ sustinentes; in aquis nasci, *Raii Meth. A.* 78.

A. Butomus, *Offic. Mont. Ind.* 65. *Cæs.* 553. *Raii Synop.* iii. 273. *Elem. Bot.* 235. Butomus flore roseo, *Tourn. Inst.* 271. *Boerb. Ind. A.* 299. *Buxb.* 49. *Rupp. Flor. Jen.* 124. *Dill. Cat. Giff.* 97. *Juncus floridus*, *J. B. ii.* 524. *Park. Theat.* 1197. *Raii Hist. i.* 701. *Juncus floridus* paludosus, *Chab.* 198. *Gladiolus palustris* Cordi, *Ger.* 27. *Emac.* 29. *Mer. Pin.* 46. *Gladiolus aquaticus* sive palustris Cordi, *Merc. Bot. i.* 38. *Phyt. Brit.* 47. Sedo affinis juncoides umbellata palustris, *Hist. Oxon.* iii. 468. **Water Gladiol.** In aquosis frequens. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Aperiens seu deobstruens est planta, *Mont.*

XII. De Apocyno.

Cujus notæ siliquæ ad singulos flores geminæ, unicapulares, univalves, ab interiori latere per longitudinem debiscentes, & in his semina cum propendente lanugine imbricum modo stylo nutritivo incumbentia; Succum lacteum fundere; folia in caulibus bina adversa, *R. Meth. A. p.* 78.

A. 1. Apocynon Syriacum, *Offic. Mont.* 37. Apocynum Ægyptiacum, lactescens siliquâ Asclepiadis, *C. B. Pin.* 303. Apocynum erectum incanum latifolium Ægyptiacum floribus croceis, *Par. Bat.* 27. *Tourn. Inst.* 91. Apocynum erectum majus latifolium Ægyptiacum flore luteo spicato, *Breyn. Prod.* ii. 14. *Pluk. Almag.* 34. *Hist. Oxon.* iii. 609. Apocynum Ægyptiacum floribus spicatis, *Elem. Bot.* 78. Apocynum Syriacum Clusii, *Raii Hist. ii.* 1088. Beidelsar ossar, *Alpin. Egypt.* 85. Beidelsar Alpini sive Apocynum Syriacum, *J. B. ii.* 136. Apocynum Syriacum & Ægyptiacum Beidelsar Alexandrinum

Alpini, *Chab.* 119. Ossar, *Hon. Belli Epist. ad Clusium* cccvi. **Dogs Bane.** In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. Autumno floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Cum adipe in panis cocta; canes, lupos, vulpes, &c. enecat in cibo data, *Diosc.*

A. 2. Pseudo-Ipocacuanna fusca, *Offic.* Apocynum erectum folio oblongo flore umbellato petalis reflexis coccineo, *Cat. Jam.* 89. *Hist. i.* 206. *Tab.* 129. *Raii Hist. iii.* 537. Apocynum Curassavicum fibrosa radice, floribus Aurantiis, Chamænerii foliis angustioribus, *Herm. Parad. Bat. Prod.* 213. *Parad. Bat.* 36. *Pluk. Phytog.* lxxvi. 6. *Almag.* 36. Apocynum erectum Salicis latiori folio umbellatum, floribus Aurantiis, *Ejusd. Phytog.* 138. *Almag.* 36. Apocynum Novæ Angliæ subhirsutum radice tuberosa floribus Aurantiis, *Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat.* 646. Apocynum Canadense angustifolium, flore Aurantio, *Mer. Hort. Blaf.* 232. Apocynum erectum minus latifolium Americanum flore umbellato Aurantio, petalis reflexis, radice tuberosa, *Breyn. Prod.* ii. 15. **Bastard Ipocacuanna.** Ex America importatur nomine Ipocacuanna. Radix est fusca & venenosa facultate prædita.

XIII. De Perisloca.

Notæ sunt, Flos ad basin usque in quinque laciniis, stellæ in modum dispositas sectus, *R. Meth. A.* 78.

A. Scammonia Monspeliaca, *Offic.* Scammonia Monspeliaca foliis rotundioribus, *C. B. Pin.* 294. *Chamel.* 58. Scammonia Monspeliaca dicta, *Park. Theat.* 164. Scammonea Monspeliaca flore parvo, *J. B. ii.* 136. Scammonia Monspeliaca sive Valentina, *Chab.* 119. Scammonia Valentina, *Clus. Hist. Hisp.* 126. Scammonia Valentina, *Ger.* 716. *Emac.* 866. Scammonei Monspeliaci varietas, *Lob. Obs.* 341. *Hist. Oxon.* iii. 611. Apocynum latifolium Scammonea Valentina, *Raii Hist. ii.* 1088. Apocynum scandens Monspeliacum Scammonei foliis rotundioribus, *Par. Bat.* 54. Periplo-Monspeliaca foliis rotundioribus, *Tourn. Inst.* 93. *Elem. Bot.* 79. *Boerb. Ind. A.* 315. **Italian or French Scammony.** In hortis botanicis. Augusto floret. *Usu.* Succus concretus. *Vires.* Succos concretos purgationes moliebantur majori Dosi quam veri Scammonei, & minori affectu, *Magnol.*

XIV. D.

XIV. De Asclepiade.

Ucco limpido, siliquis singularibus Ciconiæ restrum referentibus ab aliis differt, R. H. p. 1090.

A. Asclepias, Vincetoxicum, Hirundinaria, *Offic.* Chab. 119. Asclepias flore albo, *Ger.* 751. *Emac.* 898. *Park. Theat.* 387. C. B. Pin. 303. *Raii Hist.* ii. 1091. *Hist. Oxon.* iii. 611. *Tourn. Inst.* 94. *Elem. Bot.* 80. *Boerb. Ind. A.* 312. Asclepias five Vincetoxicum multis, floribus albican- tibus, *J. B.* ii. 138. Apocynum Asclepias dictum, *Par. Bat.* 43. Vincetoxicon, *Rupp. Flor. Jen.* 20. *Buxb.* 336. *Swallow-wort*. In hortis. Julio floret. *Ufu* est Radix. *Vires.* Alexiphar- maca ac Sudorifica est insignis. *Ufus* præcipui in Peste, aliisque venenosis affectibus, in obstructio- nibus Mensium, in Palpitatione Cordis, ac Lipo- thymia, in Hydrope, &c. *Schrod.*

XV. De Vinca Pervinca.

Notæ sunt, Sarmenta longa, repentia; folia gla- bra, colore & consistentiâ Hederaceorum; Flo- res ampli; siliquæ ad singulos flores geminæ, non lanigeræ, R. Synop. p. 159.

A. 1. Vinca pervinca, *Offic.* *Ger.* 747. Vinca pervinca minor, *Ger.* *Emac.* 894. *Raii Synop.* iii. 268. Vinca pervinca vulgaris, *Park. Theat.* 340. Pervinca vulgaris angustifolia, *Elem. Bot.* 99. Pervinca vulgaris angustifolia flore cæruleo, *Tourn. Inst.* 120. *Dill. Cat. Giff.* 39. *Boerb. Ind. A.* 311. C. B. Pin. 301. *Raii Hist.* ii. 1691. *Hist. Oxon.* iii. 613. *J. B.* ii. 130. Clematis Daphnoides minor, seu Vinca pervinca minor, *Mer. Pin.* 27. Clematis Daphnoides, Vinca per- vinca, Chab. 118. *Periwinkle*. Ad sepes. Maio floret. *Ufu* est Herba. *Vires.* Vulnera- ria est insignis. *Ufus* præcip. in fluxionibus alvi, Dysenteria, Hæmorrhoidibus, eruptione Sanguinis, Hæmorrhagia narium, profluvio Mensium, ac vul- neribus seroso liquore manantibus, *Schrod.*

A. 2. Vinca, *Rivin.* Vinca pervinca *Offici- narum*, *Rupp. Flor. Jen.* 21. *Buxb.* 336. Vinca, pervinca five Clematis Daphnoides, *Cod. Med.* cxx. Pervinca vulgaris latifolia, *Elem. Bot.* 99. Pervinca vulgaris latifolia flore cæruleo, *Tourn. Inst.* 119. *Boerb. Ind. A.* 311. Cle- matis Daphnoides major, C. B. Pin. 302. *Raii Hist.* ii. 1091. *Synop.* iii. 268. *Hist. Oxon.* iii.

613. Clematis Daphnoides major flore cæruleo, *J. B.* ii. 132. Clematis Daphnoides five Per- vinca major flore cæruleo, Chab. 118. Clematis Daphnoides latifolia five Vinca pervinca major, *Park. Theat.* 380. Clematis Daphnoides, *Ger.* 747. Clematis Daphnoides five pervinca major, *Emac.* 894. *The Greater Periwinkle*. In aggeribus fossarum, sed rarius. Aprili floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, & indiscriminatim usurpantur.

XVI. De Staphide agria.

Folius & siliquis atque etiam viribus cum Aconitis convenit, flore cum Delphinio, R. H. p. 705.

A. Staphis agria, *Offic.* *Ger.* 398. *Emac.* 495. *Raii Hist.* i. 705. *Park. Theat.* 222. *J. B.* iii. 641. C. B. Pin. 324. *Hist. Oxon.* iii. 461. Staphis agria, Pedicularia, Chab. 528. Delphi- nium Platani folio, Staphis agria dictum, *Tourn. Inst.* 428. *Elem. Bot.* 379. *Boerb. Ind. A.* 301. Aconitum urens Ricini fere foliis, flore cæruleo magno, Staphis agria dicta, *Pluk. Almag.* 357. *Staves-acre*. In hortis curiosorum. *Ufu.* Se- mina sunt rugosa, nigricantia, triquetra, saporis acris & fervidi, exurentis, ingrati & nauseosi odo- ris. *Vires.* Extrinsecus ejus usus est apophlegma- tisans in masticatoriis, gargarismis, odontalgicis ac abstergentibus, in ulceribus ac papulis, &c. *Schrod.*

XVII. De Delphinio.

Notæ sunt, Folia in tenuissimas lacinias dissecta, flores unico corniculo retrorsum extenso seu cal- cari donati, semina nigra triquetra, R. Hist. p. 708.

A. Consolida regalis, Delphinium, *Offic.* Con- solida regalis sativa, *Ger.* 922. *Emac.* 1082. Consolida regalis hortensis flore majore simplici, C. B. Pin. 142. *Hist. Oxon.* iii. 456. Consolida regalis erectior flore majore, *J. B.* iii. 211. Chab. 379. Delphinium majus five vulgare, *Park. Pa- rad.* 276. *Raii Hist.* i. 708. Delphinium hor- tensis, flore majore & simplici, *Elem. Bot.* 339. *Tourn. Inst.* 427. *Boerb. Ind. A.* 302. *Larks- spur.* In hortis. Julio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Vulneraria est; consolidat enim & glu- tinat. Visum acuit & roborat.

XVIII. De Aquilegia.

NOtæ sunt, Folia Umbelliferarum modo divisa, flores penduli cum pluribus corniculis recurvis, semina nigra, lucida, R. Synop. p. 101.

A. Aquilegia, Offic. Aquilegia cærulea, Ger. 935. Emac. 1093. Mer. Pin. 9. Aquilegia sylvestris, C. B. Pin. 144. Tourn. Inst. 428. Elem. Bot. 340. Dill. Cat. Giff. 82. Rupp. Flor. Jen. 131. Aquilegia sylvestris flore simplici, Buxb. 25. Aquilegia flore simplici, J. B. iii. 484. Raii Hist. i. 706. Synop. iii. 273. Aquilegia, Chab. Aquilegia vulgaris flore simplici, Park. Theat. 1367. Aquilegia flore cæruleo, Merc. Bot. ii. 16. Phyt. Brit. 9. **Columbines.** In sylvis, sed rarius. Junio floret. Ufu. Herba, Flores, Semen. Vires. Aperit hepar & Lienem, ac imprimis meatum biliarium, unde regio medetur morbo; ciet urinam & menses, vulnera consolidat. Extrinsecus frequens ejus usus est in Gargarismis, Schrod.

XIX. De Aconito.

NOtæ sunt, Folia circumscriptione subrotunda, laciniata, flores cucullati, semina rugosa, R. Hist. p. 702.

A. 1. Napellus, Offic. Napellus verus cæruleus, Ger. 823. Emac. 972. Napellus verus, Park. Theat. 318. Napellus verus flore cæruleo, Park. Parad. 215. Buxb. 233. Napellus flore cæruleo, Rivin. Rupp. Flor. Jen. 234. Aconitum cæruleum seu Napellus primus, C. B. Pin. 183. Tourn. Inst. 425. Elem. Bot. 337. Boerb. Ind. A. 300. Hist. Oxon. iii. 463. Aconitum magnum Napellus, Chab. 531. Aconitum magnum purpureo flore, vulgò Napellus, J. B. iii. 655. Raii Hist. i. 702. **Monks Wood.** In hortis reperitur. Julio floret. Vires. Facultate est hominibus aliisque animalibus exitiali & perniciofa, R. H.

A. 2. Aconitum Ponticum, Offic. Aconitum luteum Ponticum, Ger. 821. Emac. 970. Aconitum lycoctonum, Chab. 531. Aconitum lycoctonum luteum, C. B. Pin. 183. Hist. Oxon. iii. 462. Tourn. Inst. 425. Elem. Bot. 337. Boerb. Ind. A. 300. Aconitum luteum Ponticum serotinum flore albo, Park. Theat. 310. Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente, J. B. iii. 652. Raii Hist. i. 704. Dill. Cat. Giff. 97. Napellus flore luteo, Rivin. Irr. P. Buxb. 233. Rupp. Flor. Jen. 234. **Wolfsbane.** In hortis

colitur. Julio floret. Vires. Maligna est planta, hominibus aliisque animalibus perniciofa, R. Hist.

Hoc est Aconitum alterum Dioscoridis, Lycoctonum & Cynoctonum dictum: cujus cum tres faciat species, hoc ad tertiam refertur, quam Ponticum vocari ait, Foliaque habere Platani, sed longiora, nigriora, & crebriore divisura: caulem filicis pediculo similem, nudum, cubitali altitudine: Semen verò in siliquis oblongis recondere, ac radicibus tandem esse in Squilla marinae modum nigrescentibus, Chab.

A. 3. Anthora Antithora, Offic. Anthora, Park. Parad. 215. Anthora five Antithora, Chab. 530. Anthora five Aconitum salutarium, Ger. 820. Emac. 969. Antithora flore luteo Aconiti, J. B. iii. 660. Raii Hist. i. 705. Aconitum salutarium five Anthora, C. B. Pin. 184. Tourn. Inst. 425. Elem. Bot. 338. Boerb. Ind. A. 300. Aconitum salutarium luteum tenuifolium five Anthora, Hist. Oxon. iii. 463. **Healful Wolfsbane.** In hortis botanicis. Junio floret. Ufu. Radix parva, crassa, brachiata, foris fusca, intus albida, saporis acris, odoris ingrati. Vires. Cardiacæ est. Usus præcipui in morbis ac iectibus venenatis, ait Schrod. Sed credat qui vclit. Istius radices in compositione celebris Antidoti Orvietani dicti usurpantur, Magnol. H. Monsp.

SECTIO DECIMA SEPTIMA.

De Herbis flore Monopetalo vasculiferis.

Herbæ flore monopetalo sunt vel flore

Uniformi, vasculo diviso in loculamenta

Bina, foliis in caulibus

Alternis; vasculo

Operculo tecto, quod per maturitatem abscedit, vi narcotica & virofa: *Hyoscyamus*.

Bivalvi, foliis pinguibus, flore è tubo longo in latitudinem expanso, margine integro & anguloso, colore rubente; vasculo oblongo conoide: *Nicotiana*.

Ex adverso binis, nervosis; sapore amaro: *Gentiana*.

a b

Terna;