

stringit, & glutinat; præcipue ad hernias, & vulnera conglutinanda commendatur.

XVII. De Aro, & Dracontio.

NOtæ sunt, Pistillus in medio flore pro stylo nudus; flos monopetalos, sed fructui imo cohærens; pro fructu baccæ multæ palpa humidâ semina ambiente, constantes; radix acerrimo sapore prædita, R. Synop. p. 169.

A. 1. Dracontium, Offic. Dracontium majus, Ger. 682. Emac. 831. R. Hist. ii. 1211. Dracunculus major vulgaris, J. B. ii. 789. Dracunculus polyphyllus, C. B. Pin. 195. Tourn. Inst. 160. Elem. Bot. 130. Boerh. Ind. A. ii. 75. Dracunculus hortensis, sive Serpentaria, Park. Parad. 529. Arum polyphyllon, Rivin. Irr. Hex. Rupp. Flor. Jen. 203. Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule maculato, majus & elatius, Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 62. Arum polyphyllum, sive Dracunculus polyphyllus, Hist. Oxon. iii. 548. Serpentaria, Dracunculus, Chab. 259. Erva de Sancta Maria, sive Dracunculus major, Pison. 240. **Dragons.** In hortis nutritur. Ufu. Radix, herba. Vires. Alexipharmaca, ac sudorifica est. Ufus præcip. in peste, febribus malignis, & icribus serpentinis, & aliis venenatis.

A. 2. Dracunculus major, Offic. Dracunculus Bistorti folio, C. B. Pin. 194. Dracunculus major Matthioli, Ger. 683. Emac. 832. Arum caulescens Rumicis agrestis foliis sibi invicem implicatis Virginianum, Pluk. Phytog. Tab. 271. Fig. 1. Almag. 50. Arum major caulescens Lapathi foliis, Hist. Oxon. iii. 545. **Great Dragons.** In Virginia sponte oritur. Ufu. Radix. Vires. Calfacit, & siccatur; prodest contra orthopnceas, rupta, convulsa, tussim, & destillationes, Diosc.

A. 2. Arum, Offic. J. B. ii. 783. Chab. 258. Raii Hist. ii. 1208. Synop. iii. 266. Dill. Cat. Giff. 56. Arum vulgare, Ger. Emac. 834. Merc. Bot. 21. Phyt. Brit. 11. Arum vulgare maculatum & non maculatum, Park. Theat. 372. Arum vulgare maculatum & sine maculis, Mer. Pin. 11. Arum maculatum, maculis candidis vel nigris, & non maculatum, C. B. Pin. 195. Tourn. Inst. 158. Elem. Bot. 130. Hist. Oxon. iii. 542. Rupp. Flor. Jen. 203. Boerh. Ind. A. ii. 74. Buxb. 26. **Cuckow-pint.** Ad sepes, & in umbrosis, Ufu. Radix. Vires. Calfacit, & siccatur;

Tartarum, præcipue primæ regionis, tum quoque pectoris, & pulmonum peculiariter incidit, resolvit, discutit. Proin usus ejus creber est in cachexia, asthmate, &c. hernias curat; urinam ciet; obstructions viscerum resolvit, Schrod. Aq. destillata ex foliis recens specificum est in Mania & Melancholia.

XVIII. De Arisaro.

AB Aro differt floris formâ, qui tubus est ima parte clausus, summa apertus, & in caputii modum incurvatus, Raii Meth. A. p. 75.

A. Arisarum, Offic. Arisarum angustifolium Dioscoridis fortè, C. B. Pin. 196. Boerh. Ind. A. ii. 73. Hist. Oxon. iii. 545. Arisarum angustifolium, Ger. 686. Emac. 835. J. B. ii. 787. Chab. 258. Raii Hist. ii. 1211. Arisarum longifolium, Park. Theat. 375. Arum humile angustifolium pistillo longissimo, tenui, inflexo, mucronato, Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 60. Arum Scorzoneræ folio, Elem. Bot. 130. Tourn. Inst. 160. **Friars Coul.** In Italia ac Dalmatia reperitur. Ufu. Radix. Vires Illitu nomas sistit, Diosc. Calfacit, siccatur, incidit, aperit, abstergit, digerit, Galen.

SECTIO VIGESIMA QUINTA.

De Herbis Graminifoliis non Culmiferis, flore stamineo.

NOtæ sunt, Folia graminea; flores imperfecti, seu staminei; caules vel sarçti vel enodes, Raii Method.

Hærbæ graminifoliz non culmiferæ, flore stamineo, sunt vel foliis

Teretibus, medullâ sarçtis: *Juncus.*
Tenuioribus cum aliqua latitudine, ut superficies folii interna ab externa differat,

Graminis

Graminis modo sitis, hoc est, latitudine sua cauli obversa; caule

Triquetro, floribus minus speciosis: *Cyperus*.

Tereti, floribus & seminibus in paniculis papposa lanugine obfita; caulibus medulla fungosa farctis, tota planta jucundi odoris: *Schaenanthus*.

Iridis modo sitis, hoc est, acie folii cauli obversa, odoratis flosculis, & seminibus in julum seu nucamentum coactis: *Calamus Aromaticus*.

I. De Cypero.

NOtae sunt, Folia graminea, & flores flaminei, caules triquetri, R. Synop. p. 194.

A. 1. *Cyperus longus*, Offic. Ger. 28. Emac. 30. *Raii Hist.* ii. 1299. Synop. iii. 425. *Cyperus longus odoratus*, Park. Theat. 146. *Cyperus odoratus radice longa*, five *Cyperus Officinarum*, C. B. Pin. 14. Theat. 216. Boerb. Ind. A. ii. 165. *Tourn. Inst.* 527. Elem. Bot. 419. *Cyperus longus odoratus*, Hist. Oxon. iii. 237. *Cyperus paniculata sparsa speciosa*, J. B. ii. 501. *Cyperus*, Chab. 194. **Long-rooted Cyperus**. In palustribus, sed rarius. Usu. Radix longa, tenuis, nodosa, & geniculata, contorta, foris subnigra, intus albicans, saporis suavis, subacris, & aromatici, odoris fragrantis. Vires. Stomachica ac uterina est. Usus praecipuus in urina ac mensibus eiendis, cruditate ventriculi consumenda, Hydrope inchoata praeservanda, colica ac vertigine discutienda, intellectu roborando. Masticata oris scetorem emendat, &c. Schrod.

A. 2. *Cyperus rotundus*, Offic. *Cyperus rotundus Orientalis major*, C. B. Pin. 13. Theat. 208. *Raii Hist.* ii. 1299. Hist. Oxon. iii. 236. *Cyperus rotundus Syriacus*, Ger. Emac. 31. N^o 3. *Cyperus rotundus, odoratus, Syriacus*, Park. Theat. 145. *Cyperus Syriacus & Creticus rotundior*, J. B. ii. 502. Chab. 194. **Round-rooted Cyperus**. Ex Aegypto ad nos transfertur. Usu. Radix rotunda, Olivae magnitudinis ac figurae, foris rufa, scabra, intus alba, pluribus ex uno capite quasi filis dependentibus, saporis & odoris fragrantis. Vires. Eisdem viribus cum Longo pollet.

A. 3. *Trafi*, Offic. J. B. 505. *Tarsi*, Malinathalle Theophrasti, Chab. 195. *Cyperus esculentus*, Raii Hist. ii. 1301. *Cyperus rotundus, esculentus, angustifolius*, C. B. Pin. 14. Theat. 222. Hist. Oxon. iii. 236. *Tourn. Inst.* 527. Elem.

Bot. 419. Boerb. Ind. A. ii. 166. *Cyperus esculentus* five *Trafi* Italorum, Ger. Emac. 32. *Cyperus dulcis rotundus*, *Trafi* dulce vocatus, Park. Theat. 146. **Sweet Cyperus**, or **Mush-nut**. In Italia & alibi nascitur. Usu. Radix. Vires. Cum prioribus viribus convenit.

A. 4. *Papyrus*, Offic. *Papyrus Nilotica*, J. B. ii. 506. Ger. 37. Emac. 40. *Raii Hist.* ii. 1302. *Papyrus Nilotica Alpina*, Berd. Aegypti dicta; *Biblos* Syriaca quorundam, Chab. 195. *Papyrus Nilotica* five *Aegyptiaca*, C. B. Pin. 19. Theat. 334. *Papyrus Antiquorum Nilotica*, Park. Theat. 1207. *Papyrus*, Vessing. Obs. 49. *Papyrus Burdi*, Alpin. Egypt. 111. *Cyperus Niloticus* vel *Syriacus*, maximus, papyraceus, Hist. Oxon. iii. 239. **The Paper-reed**. In Aegypto & Syria nascitur. Usu. Caules. Vires. Ad laxandas fistulas utilis est. Aqua ex scapis recentibus destillata ad oculorum suffusiones, caligines, atque obscuritates proficua est.

Ex Papyro olim chartae fiebant ad scribendi usum: conficiendi modum vide apud Plinium, lib. 13. cap. 11, 12. Chartae ex Papyro in desuetudinem obierunt, novo chartarum artificio, Anno 1470. invento; conficiendi cujus modum videlicet apud clarissimum Rarium, p. 1302. Ante chartarum usum in palmarum foliis primo scriptitarunt, ut recte observat Plinius, deinde in quorundam arborum libris. Et adhuc hodie ex Palma, Lantar dicta, Indos suam chartam parare ad scriptionem, scribit Linschottanus. Larius in provincia Mangi arborem esse scribit, Cal nomine, folio grandi, quod chartae usum praebeat in tota India. Petrus Martyrus Chaldaeos literarum primos repertoires in arboris Copeiae dictae foliis primo scriptitasse refert. M. Fumée praeter arborem Copei, esse aliam Guajabara dictam, in cujus foliis stylo vel acicula scriptitent Indi. Praeter supradictas, varias arbores meminit C. Baubinus in Pinace, p. 19. quae pro Papyro usurpantur. Attalus (uti creditur) Pergamenus animalium coria arefacta huic usui adaptanda invenit.

A. 5. *Nardus Indica*, & *Spica Nardi*, Offic. *Nardus Indica*, Ger. 921. Emac. 1080. *Raii Hist.* ii. 1910. *Nardus Indica vulgaris*, J. B. iii. *Nardus Indica*, Chab. 409. *Nardus Indica*, five *Spica Nardi*, Parkinson. Theat. 1595. *Nardus Indica*, quae *Spica*, *Spica Nardi*, & *Spica Indica* Officinarum, C. B. Pin. 13. Theat. 194. Hist. Oxon. iii. 236. *Gramen cyperoides aromaticum Indicum*, Breyn. Prod. ii. 53. **Indian Spikenard**. Usu. Radix longa, fungosa, digiti

crassitie, & longitudine comosa, ex marcidorum foliorum nervis, aut nervosis filamentis convoluta & congesta, colore ex fusco rufescente, saporis amari, acris, aromatici, odoris grati. Ex India Orientali, Alexandria, & aliunde ad nos transportatur. Eligenda recens, levis, longam comam habens, aliquantulum redolens Cyperum, sapore amaro. *Vires.* Calfacit, ficit, attenuat, astringit; Nephritica, & stomachica est. *Ufus* præcip. in urina & mensibus ciendis, in ventriculi rosione, inflatione, in ictero, &c. *Schrod.* Vermes necat. Vide plura apud *Johannem Fabrum de Nardo*, adversus *Josephum Scaligerum*.

II. De Juncis.

Caulibus teretibus, fungosis, paniculâ ex latere caulibus exeunte, & multis seminibus majusculis compositâ à reliquis differt, *Raii Hist.* pag. 1302.

A. 1. Juncus vulgaris, *Offic.* Juncus lævis, *Ger. Emac.* 39. Juncus lævis paniculâ sparsâ major, *C. B. Pin.* 12. *Theat.* 182. *Park. Theat.* 1191. *Boerb. Ind. A. ii.* 163. *Rupp. Flor. Jen.* 116. *Buxb.* 169. *Tourn. Inst.* 246. *Elem. Bot.* 212. *Hist. Oxon.* iii. 232. Juncus lævis vulgaris, paniculâ sparsâ nostras, *Raii Hist.* ii. 1304. *Synop.* iii. 432. *Dill. Cat. Giff.* 99. Juncus lævis vulgaris, paniculâ sparsâ, *Merc. Bot.* i. 44. Juncus lævis vulgatiore, paniculis sparsâ, *Mer. Pin.* 66. Juncus lævis medullâ solidiore, *ejusd.* 67. *Merc. Bot.* i. 45. *Phyt. Brit.* 63. Juncus paniculâ arundinaceâ, *J. B. ii.* 520. *Chab.* 196. **Common soft Rush.** In aquis vadosis. *Ufu.* Integra planta. De usu ejus medico nihil invenio inter Auctores.

A. 2. Oxyschcenos, *Offic.* Juncus acutus capitulis Sorgi, *C. B. Pin.* 11. *Theat.* 173. *Raii Hist.* ii. 1302. *Synop.* iii. 431. *Tourn. Inst.* 247. *Elem. Bot.* 212. *Boerb. Ind. A. ii.* 163. Juncus pungens, sive Juncus acutus capitulis Sorgi, *J. B. ii.* 520. *Hist. Oxon.* iii. 232. *Chab.* 196. Juncus maritimus capitulis Sorgi, *Park. Theat.* 1192. *Mer. Pin.* 67. Juncus maritimus acutus, sive capitulis Sorgi, *Merc. Bot.* ii. 24. *Phyt. Brit.* 63. Juncus adinstar sp. n. acutus rigidusque, *Mer. Pin.* 67. **Picking large Sea-Rush.** In maritimis. *Ufu.* Integra herba, semen.

A. 3. Holoschcenos, *Offic.* Juncus aquaticus maximus, *Ger.* 31. *Emac.* 35. *Raii Hist.* ii. 1304. *Mer. Pin.* 66. *Merc. Bot.* i. 44. *Phyt.*

Brit. 63. *Boerb. Ind. A. ii.* 164. Juncus lævis maximus, *Park. Theat.* 1191. Juncus maximus, Holoschcenos, *J. B. ii.* 525. *Chab.* 197. Juncus maximus, sive Scirpus, *C. B. Pin.* 12. *Theat.* 178. *Hist. Oxon.* iii. 231. Scirpus palustris altissimus, *Tourn. Inst.* 528. *Dill. Cat. Giff.* 105. *Rupp. Flor. Jen.* 256. *Buxb.* 295. Scirpus altissimus, *Elem. Bot.* **Bull-Rush.** In fluminibus & piscinis majoribus. *Ufu.* Integra planta. *Vires.* Semen utriusque tostum sistit alvum, rubra foeminarumque profluvia; urinam ciet; somnum conciliat. Planta tenera convenienter illinitur adversus phalangiorum morsus, *Diosc.*

III. De Schœnantho.

Caule tereti medullâ fungosâ sarcto; seminibus in paniculis papposâ lanugine obsitis à reliquis differt.

A. Schœnanthus, Juncus odoratus, *Offic.* Schœnanthus, *Ger.* 39. *Emac.* 43. Schœnanthus, sive Juncus odoratus, *J. B. ii.* 515. *Chab.* 196. *Raii Hist.* ii. 1310. Juncus odoratus sive aromaticus, *C. B. Pin.* 11. Juncus rotundus aromaticus, *C. B. Theat.* 163. Juncus odoratus tenuior, *Park. Theat.* 144. Gramen dactylon aromaticum, multiplici paniculâ, spicis brevibus, tomento candicantibus ex eodem pediculo binis, *Pluk. Phytog. Tab.* 190. *Fig.* 1. *Almag.* 175. Gramen ad Juncum accedens aromaticum majus Syriacum, *Hist. Oxon.* iii. 229. **Camels-hay.** Affertur ex Arabia. *Ufu.* Culmus, cum foliis, saporis acris, amaricantis, & suavis, odoris fragrantissimi. *Vires.* Calfacit, subastringit, tenuium est partium, discutit. *Ufus* præcip. in obstructis mensibus, hepate, liene, in ventriculi inflatione, vomitu, ac singultu, in urinae difficultate, renum, vesicæ, ac uteri dolore, *Schrod.*

IV. De Sparganio.

Pillulis suis echinatis, sphaericis, Platani pilulis æmulantibus, à reliquis suis generis abundè distinguitur, *R. Synop.* p. 277.

A. Sparganium, *Offic.* *Chab.* 198. Sparganium ramosum, *Ger. Emac.* 45. *C. B. Pin.* 15. *Theat.* 228. *Park. Theat.* 1205. *Raii Hist.* ii. 1311. *Synop.* iii. 437. *Hist. Oxon.* iii. 247. *Tourn. Inst.* 531. *Elem. Bot.* 422. *Boerb. Ind. A. ii.*

A. ii. 168. *Merc. Bot.* 71. *Phyt. Brit.* 117. *Mer. Pin.* 115. *Dill. Cat. Giff.* 130. *Rupp. Flor. Jen.* 160. *Buxb.* 308. Sparganium quibusdam, *J. B.* ii. 541. Butumos dissecta panicula, vulgo Platanaria, quia pilulas habet Platani pilulis similes, *Bod. in Theoph. Hist.* 462. **Branched Bur-reed.** Ad fluviorum ripas, inque palustribus frequens. Julio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Contra serpentis venena cum vino datur, *Diosc.*

V. De Typha.

Nota est florum effigies turbinata, & in clavem composita, *R. Synop.* p. 278.

A. Typha, *Offic. Ger.* 42. *Emac.* 46. *Raii Hist.* ii. 1312. *Synop.* iii. 436. *Mer. Pin.* 122. Typha palustris, *Merc. Bot.* i. 75. *Phyt. Brit.* 126. Typha palustris major, *C. B. Pin.* 20. *Theat.* 337. *J. B.* ii. 539. *Hist. Oxon.* iii. 246. *Tourn. Inst.* 540. *Elem. Bot.* 422. *Boerb. Ind.* A. ii. 167. *Rupp. Flor. Jen.* 260. *Dill. Cat. Giff.* 154. *Buxb.* 328. Typha palustris, Typha major, *Chab.* 198. Typha palustris maxima, *Park. Theat.* 1204. **Cat's Tail, or Reed-Mace.** In stagnis, & ad rivulorum ripas. *Usu.* Flos. *Vires.* Hujus herbæ flos suillo adipe eloto exceptus ambustis medetur.

VI. De Acoro.

Acorum spica quam profert simplicem elegantem, *Juli specie, folia Iridis aromatica, odorata, ab aliis discriminant, R. Synop.* p. 205.

A. Acorus verus, Calamus aromaticus, *Offic.* Acorus verus, sive Calamus Officinarum, *Park. Theat.* 140. *Raii Hist.* ii. 1313. *Synop.* iii. 437. *Mer. Pin.* 2. Acorus verus, sive Calamus aromaticus Officinarum, *C. B. Pin.* 34. *Theat.* 626. *Boerb. Ind.* A. ii. 167. *Dill. Cat. Giff.* 110. *Buxb.* 5. Acorus verus, sive Calamus aromaticus. *C. Commel. Plant. Usu.* 18. Acorus verus, Officinis falso Calamus, *Ger. Emac.* 62. Acorum legitimum, *Rupp. Flor. Jen.* 261. Acorus vel Acorum, Calamus aromaticus, *Chab.* 244. Typha aromatica clavâ rugosâ, *Hist. Oxon.* iii. 246. **Sweet Flag, or Calamus.** In aquosis, sed rarius. Julio julum producit. *Usu.* Radix oblonga, nonnihil compressa, in superficie geniculata, foris ex flavo rubescens, intus alba, atque

fungosa, saporis acris, & amaricantis, cum odore aromatico. *Vires.* Stomachicus est; calfacit & siccatur, partium tenuium est, attenuat, aperit. *U-* sus præcipuus in obstructionibus mensium, lienis, ac hepatis, in dolore Colico, &c. *Schrod. N. B.* Plantam hanc non esse verum Calamum odoratum Antiquorum, sed Acorum verum *Dioscoridis, Botani eruditiores consentiunt.* Calamus Aromaticus veterum est Plantæ Ægyptiacæ (*Alpin. Exot. Casabel Darrira* dictæ, quæ tetrapetala est, filiculis oblongis, acuminatis, in basi caliculatis, seminibus nigris minutissimis refertis) cauliculi tenues, geniculati, foris pallide flavescentes, intus candidi, includentes medullam fungosam, levem, similem telis aranearum in se collapsis & convolutis, saporis acris, suaviter amaricantis, odoris aromatici, & fragrantissimi, *Ex Prælect. Manuscriptis Hermannii.*

A. 2. Acorus Asiaticus, *Offic.* Acorus verus, sive Calamus aromaticus Asiaticus, radice tenuiore, *Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat.* 9. *C. Commel. Flor. Mal.* 3. *Boerb. Ind.* A. ii. 167. Acorus Asiaticus radice tenuiore *Hermannii, Raii Hist.* ii. 1910. *Hist. Oxon.* iii. 246. Acorus Brasiliensis aromaticus minor, Capitatinga, aliis Jacareatinga Pisonis, *ejusd.* Acorus verus Asiaticus, radice tenuiore, vel Calamus aromaticus Garziæ, *Pluk. Almag.* Calamus aromaticus, *Garz. ab Hort.* 200. Calamus aromaticus Orientalis, folio & radice tenuiore, *Aët. Philosoph. Lond. N° 274. p. 943.* Capicatinga, aliis Jacareatinga Acori species, *Pis.* 241. *Va embu, Hort. Mal.* xi. 99. *Tab. Vazambu, Vazum* 60. *Herm. Mus. Zelan.* 56. **Atlastick Sweet Flag.** Utriusque Indiæ incolæ est. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.