

SECTIO VIGESIMA SEPTIMA.

De Herbis anomalis seu incertæ sedis.

Hæ sunt vel

Aquaticæ, floribus perfectis seu bracteatis, foliis angulosis, fructu magno muricato: *Tribulus aquaticus*.

Terrestres, foliosæ, quibus

Siliquæ breves, quadrangulæ, erectæ: *Sesamum*.
 Florum folia rictum quodammodo exprimentia, thyrsus oblongus; vascula feminalia oblonga, Cardui æmula planta, facie externa: *Acanthus*.

I. De Tribulo aquatiko.

*F*oliis angulosis, fructu magno, muricato, & loco natali à reliquis differt.

A. *Tribulus aquaticus*, Offic. Ger. 676. Emac. 874. C. B. Pin. 194. J. B. iii. 775. Chab. 562. Raii Hist. ii. 1321. *Tribulus aquaticus* major, Park. Theat. 1248. Hist. Oxon. iii. 619. *Tribuloides* Tournefortii, Rupp. Flor. Jen. 49. *Tribuloides* vulgare aquis innascens, Tourn. Inst. 655. *Water Caltrop*. In aquosis. Junio floret. Usu. Nuces, Herba. Vires. Nuces dum recentes sunt, calculis juvant. Herba refrigerat & inspissat, inflammationes sedat, ulcera oris & gingivas sanat.

II. De Stratiote.

*N*ullo innatat Aizoi arborecentis foliis, pro radice tenuissima fibrarum filamenta in aquas demittens; Flores nulli vel nondum observati, R. Meth. A. p. 129.

A. *Stratiotes*, Offic. *Stratiotes Ægyptia*, J. B. iii. 787. Raii Hist. ii. 1384. Hist. Oxon. iii. 619. *Stratiotes Ægyptia* Dioscoridis, Vessing. Obs. 45. *Stratiotes Ægyptia*, *Stratiotes Antiquorum*, Chab. 567. *Stratiotes aquatica* vera Dioscoridis, & *Ægyptiaca*, Park. Theat. 1249. *Lenticula palustris* Ægyptiaca, sive *Stratiotes aquatica* foliis Sedo majore latioribus, C. B. Pin. 362. *Hayhalem elmaovi*, i. e. *Stratiotes*, Alpin. Ægypt.

108. *Water Seagreen*. In Nilo oritur. Usu. Folia. Vires. Refrigerat, Sanguinem fistit, inflammationes sedat.

III. De Leontopetalo.

*H*UIC radix tuberosa; Flores Ranunculi, stellati, pentapetali, R. Meth. A. p. 129.

A. 1. *Leontopetalon*, Offic. Ger. 182. Emac. 236. C. B. Pin. 324. Boerb. Ind. A. 208. Chab. 489. Raii Hist. ii. 1326. Hist. Oxon. ii. 285. Park. Theat. 682. *Leontopetalon* quorundam, J. B. iii. 489. *Leontopetalon* foliis costæ ramosæ innascentibus, Tourn. Corol. 49. *Black Turnep*. In Apulia nascitur. Serius floret. Usu. Radix. Vires. Serpantium ictibus auxiliatur, Digesc. Digerendi facultatem & exsiccandi excalefaciendique possidet, Galen.

A. 2. *Chrysogonum*, Offic. Park. Theat. 683. Raii Hist. ii. 1326. Hist. Oxon. ii. 285. *Chrysogonum* Dioscoridis quibusdam, J. B. iii. 489. Chab. 486. *Chrysogono* di Dioscoride, Pen. Ital. Bald. 141. *Leontopetalo* affinis foliis Quernis, C. B. Pin. 324. *Leontopetalon* foliis costæ simplici innascentibus, Tourn. Coroll. 49. *Red Turnep*. In Syria oritur. Usu. Radix. Vires. Cum priore viribus convenit.

IV. De Sesamo.

*N*OTÆ sunt, siliquæ breves, quadrangulæ, erectæ.

A. *Sesamum*, Offic. J. B. ii. 896. C. B. Pin. 27. Raii Hist. ii. 1327. J. Commel. Fle. Mal. 243. Vessing. Obs. 36. Hist. Oxon. ii. 282. Park. Theat. 254. *Sesamum* vel *Sisamum*, Chab. 284. Ger. 1054. Emac. 1232. *Sesamum* semine fusco & albo, Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 559. *Sesamum sempsem*, Alpin. Ægypt. 98. *Digitalis Orientalis* *Sesam* dicta, Tourn. Inst. 164. Elem. Bot. 135. *Sesamum* congenitibus Gangya, Lusitanis Gurgilim, Marcg. 21. *Gangila* sive *Sesamum Africanum*, Pison. 111. Schit-Elu, Hort. Mal. ix. 105. Tab. liv. Tala, Herm. Mus. Zeyl. 58. *Oily Purging Grain*. Usu. Semen. Vires. Calfacit, modicè humectat, emollit, paregoricum, viscosum, pingue, adeoque & emplasticum est; Nervorum duritiem illitu discutit, Colicis doloribus medetur, Schroder. Vide etiam Hoffmannum in Schroder.

V. De Persicaria Siliquosa.

CAulis flavicans, pellucidus; folia Mercurialis; flores flavi, penduli, calcari donati; siliquæ breves per maturitatem dissilientes, & semina projicientes.

A. Persicaria filiquosa, *Offic. Ger.* 361. *Emac.* 446. *Raii Hist.* ii. 1328. *Merc. Bot.* ii. 28. *Phyt. Brit.* 90. *Mer. Pin.* 92. Balsamina lutea, sive Noli me tangere, *C. B. Pin.* 306. *Tourn. Inst.* 419. *Elem. Bot.* 332. *Boerb. Ind.* A. 320. *Raii Synop.* iii. 316. Balsamina, Herba impatiens, seu Noli me tangere, Floris petalo luteo, *Hist. Oxon.* ii. 282. Noli me tangere, *J. B.* ii. 908. *Chab.* 287. Mercurialis sylvestris, Noli me tangere dicta, sive Persicaria filiquosa, *Parkinson. Theat.* 296. **Quick-in-hand, Touch-me-not.** In hortis reperitur. *Usu.* Herba. *Vires.* Vi diuretica insigni pollet, ut Diabete inducat. Facultate fertur esse perniciofa & deleteria, *Dod.*

VI. De Hypocoo.

Cujus notæ, Folia tenuiter dissecta; Siliquæ longæ, planæ, articulatae, in singulis internodiis singula semina longiuscula continentes, *R. Meth. A. p.* 129.

A. 1. Hypocoon, *Offic. C. B. Pin.* 172. *Chab.* 285. Hypocoon filiquosum, *J. B.* ii. 899. *Elem. Bot.* 197. Hypocoon filiquis erectis, articulatis, incurvis, *Hist. Oxon.* ii. 579. Hypocoon legitimum Clusii, *Park. Theat.* 371. *Raii Hist.* ii. 1328. Hypocoon latiore folio, *Tourn. Inst.* 230. *Boerb. Ind.* A. 307. Cuminum corniculatum, sive Hypocoon Clusii, *Ger.* 909. *Emac.* 1067. **Horned Wild Cumin.** In Gallia Narbonensi sponte oritur. Maio floret. *Usu.* Herba, succus. *Vires.* Natura eadem quæ Papaveris succo, *Diosc.* Ejus succus instar Opii somnum inducit, *D. Herm.*

A. 2. Cuminum filiquosum, *Offic. Ger.* 908. *Emac.* 1067. Hypocoi altera species, *C. B. Pin.* 172. Hypocoum alterum, *Parkins. Theat.* 372. *Raii Hist.* ii. 1328. Hypocoon filiquis propendentibus, non articulatis, bivalvibus, incurvis, *Hist. Oxon.* ii. 579. Hypocoon tenuiore folio, *Tourn. Inst.* 230. *Elem. Bot.* 197. **Coddled Wild Cumin.** In Hispania reperitur. Maio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VII. De Epimedio.

Cujus notæ sunt, Cauliculi in ternos ramulos, ramuli in ternos pediculos folia sustinentes, Hederaeorum fere figurâ divisi; flores tetrapetali geminati, aut potius octopetali; siliquæ bivalves, tenues; semina compressa rotunda, *Raii. Method. A. pag.* 129.

A. Epimedium, *Offic. Ger.* 389. *Emac.* 480. *Raii Hist.* ii. 1330. *C. B. Pin.* 323. *Hist. Oxon.* ii. 196. *Park. Theat.* 1365. *Tourn. Inst.* 232. *Elem. Bot.* 199. *Boerb. Ind.* A. 307. Epimedium quorundam, *J. B.* ii. 395. Epimedium quorundam floribus purpureis cum apicibus luteis, *Chab.* 165. **Warrenwort.** In hortis apud nos reperitur. *Usu.* Radix, folia. *Vires.* Utraque conceptum adimit.

VIII. De Tribulo Terrestris.

Folia huic Lenticulæ aut Ciceris; flores pentapetali; fructus muricati, & quinque velut triangularibus partibus compositi, quarum cuspides in centro concurrunt, reliqui anguli in longam & acutam spinam exeunt, *R. Meth. A. p.* 130.

A. Tribulus terrestris, *Offic. Ger.* 1066. *Emac.* 1246. *Park. Theat.* 1097. *Raii Hist.* ii. 1344. *J. B.* ii. 352. *Chab.* 156. Tribulus terrestris Ciceris folio, fructu aculeato, *C. B. Pin.* 350. *Boerb. Ind.* A. 298. *Elem. Bot.* 232. Tribulus terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato, *Hist. Oxon.* ii. 102. **Caltrop.** In Italia reperitur. Julio floret. *Usu.* Herba, semen. *Vires.* Refrigerat, inspissat; inflammationes juvat; ulcera oris putredinesque gingivarum sanat. Semen contra venena commendatur; ictos à serpentibus recreat.