

SECTION IV.

APOZÈMES.

ILs forment souvent en partie la boisson principale des malades. C'est de l'eau qui, à l'aide de l'infusion, et plus souvent encore de la décoction, s'est chargée des matériaux immédiats qu'elle a pu extraire des végétaux prescrits par le médecin.

Les règles pour préparer un apozème, sont de faire bouillir successivement,

1°. Les matières dures, sèches, inodores, peu altérables, comme les bois, les racines sèches, ligneuses, et en général toutes celles dont la texture est serrée.

2°. Les racines fraîches, coupées menu ;

3°. Les fruits ouverts et mondés ;

4°. Les herbes fraîches non odorantes, brisées ;

5°. Celles qui sont fraîches, et qu'on a hachées ;

6°. Les semences inodores concassées ;

7°. De retirer du feu, et de verser la décoction bouillante sur les bois, racines, herbes, fleurs et semences aromatiques, toutes ces substances écrasées et concassées ;

8°. De fermer le vaisseau, de laisser refroidir la liqueur, de la passer avec expression, de la mettre reposer, de ne l'administrer enfin qu'après l'avoir bien fait décanter.

Mais les apozèmes, souvent troubles, épais et toujours d'une répugnance invincible, pourroient être remplacés par une boisson plus simple, moins désagréable, prise par-dessus des pilules faites avec les extraits des substances qui entrent dans ces médicamens. En attendant que cette observation soit reconnue juste, nous allons indiquer les apozèmes les plus généralement usités.

Apozème anti-scorbutique.

Prenez infusion amère..... 1 ^l^m [2 livres.]

teinturealkoolique de raifort 52 ^g^m [1 once.]

Pour diviser en quatre fois, et n'ajouter la teinture qu'au moment d'administrer l'apozème.

Apozème apéritif.

Prenez espèces apéritives..... 64 ^g^m [2 onces.]

Faites bouillir dans une suffisante

quantité d'eau, réduite par une

ébullition modérée à..... 2 litres [2 pintes.]

Ajoutez à chaque dose la quantité

d'acétate de potasse liquide qui

aura été prescrite.

Apozème diurétique.

Prenez espèces diurétiques..... 32 g^{mes} [1 once.]

Faites bouillir légèrement dans
suffisante quantité d'eau réduite
à 3 k^{mes} [6 livres.]

Vers la fin de l'ébullition, ajoutez

pariétaire.....	} De chaque
turquette.....	

Laissez infuser un moment, passez et mêlez
la quantité d'oxymel simple ou d'oxymel scilli-
tique qui aura été prescrite.

Apozème fébrifuge.

Prenez quinquina concassé..... 96 g^{mes} [3 onces]

Faites bouillir dans eau..... 3 k^{mes} $\frac{1}{2}$ [7 livres.]
que vous réduirez à..... 3 k^{mes} [6 livres.]

Passez la décoction. La dose sera
de..... 192 g^{mes} [6 onces.]
deux à trois fois par jour. Ajoutez les sels prescrits.

Une trop longue ébullition des différentes
substances dans un vaisseau ouvert, et notam-
ment du quinquina, est toujours préjudiciable
à l'effet du médicament, il facilite l'oxigénation
et la précipitation de l'extractif; ainsi, quelle
que soit la texture du végétal, qui est l'objet
de la décoction, il convient toujours de le diviser
et de le soumettre à une macération préalable.

Apozème purgatif.

Prenez décoction bien bouillante
de feuilles de chicorée sauvage. . . 1 litre [1 pinte.]

Laissez-y infuser pendant la nuit,

séné. 24 g^{mes} [6 gros.]

tartrite acidule de po-

tasse. 12 déc^{mes} [24 grains.]

sulfate de soude. . . . 24 g^{mes} [6 gros.]

anis et coriandre, de cha-

que 2 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ gros.]

Passez le lendemain matin, sans expression.

Eau fondante et purgative.

Prenez sulfate de soude 32 g^{mes} [1 once.]

tartrite antimoné de po-

tasse 3 cent^{sr.} [$\frac{1}{2}$ grain.]

nitrate de potasse. . . . 6 déc^{mes} [12 grains.]

Faites fondre le tout dans eau, 1 k^{me} (2 livres),
à prendre par verres à distance convenable.

Eau de Goudron.

Prenez goudron. 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]

Versez dessus eau commune. . . 1 k^{me} [2 livres.]

Agitez souvent pendant trois jours; passez la
liqueur, et conservez-la pour l'usage. La dose
est de 192 g^{mes} [6 onces], une ou deux fois par
jour: cette eau peut être coupée avec le lait,

Eau martiale.

Prenez boules de mars, environ 6 à 7 d^{mes} [10 à 12 grains.]
 Triturez l'espace de temps nécessaire avec eau tiède. $\frac{1}{2}$ k^{me} [1 livre.]

Ensuite filtrez, ou laissez reposer; puis décantez.

Cette eau se divisera en trois doses, à prendre de demi-heure en demi-heure.

Eau anti-siphilitique.

Prenez muriate suroxigéné de
 mercure 4 d^cmes [8 grains.]
 eau distillée. $\frac{1}{2}$ k^{me} [1 livre.]

La dissolution se fera toujours dans des vaisseaux de verre ou de faïence, et sera administrée aux malades dans des gobelets de même nature.

Nota. Chaque once de cette solution contient 3 cent. [$\frac{1}{2}$ grain] de muriate suroxigéné de mercure [sublimé corrosif] : les premières prises ne devront être par jour que de huit grammes [deux gros]; puis de douze et de seize grammes [trois et quatre gros], en augmentant successivement, de trois jours en trois jours, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à trente-deux grammes [une once]. Le véhicule dans lequel cette solution devra être administrée, sera d'un demi-kilogramme [une livre] de décoction légère de racine de guimauve, ou une dissolution de quatre grammes [un gros] de gomme arabique dans un demi-kilogramme [une livre] d'eau,

en observant que le mélange n'ait lieu qu'au moment de le faire prendre.

On doit préférer l'eau gommée au lait et à tous autres excipients ; il est reconnu que la gomme est de toutes les substances , celle qui altère le moins le muriate suroxigéné de mercure.

SECTION V.

POTIONS.

MÉDICAMENS internes, liquides, peu volumineux , plus ou moins composés, et ayant des vertus très-actives : les eaux distillées, les infusions, les décoctions, les huiles y servent d'excipient à des poudres, à des substances salines, à des teintures, à des électuaires, à des sirops. Une potion se prend en une ou plusieurs fois, ou même par cuillerées.

En général, toutes les fois qu'il entre dans ce médicament une poudre ou une teinture alcoolique, il est nécessaire qu'il s'y trouve en même temps un sirop, et que ce dernier serve à les délayer avant de réunir le tout aux fluides aqueux.

Potion purgative ordinaire.

Prenez séné. 8 gmes [2 gros.]
 sulfate de soude 12 gmes [3 gros.]
 Faites bouillir légèrement dans