

en observant que le mélange n'ait lieu qu'au moment de le faire prendre.

On doit préférer l'eau gommée au lait et à tous autres excipients ; il est reconnu que la gomme est de toutes les substances , celle qui altère le moins le muriate suroxigéné de mercure.

SECTION V.

POTIONS.

MÉDICAMENS internes, liquides, peu volumineux , plus ou moins composés, et ayant des vertus très-actives : les eaux distillées, les infusions, les décoctions, les huiles y servent d'excipient à des poudres, à des substances salines, à des teintures, à des électuaires, à des sirops. Une potion se prend en une ou plusieurs fois, ou même par cuillerées.

En général, toutes les fois qu'il entre dans ce médicament une poudre ou une teinture alcoolique, il est nécessaire qu'il s'y trouve en même temps un sirop, et que ce dernier serve à les délayer avant de réunir le tout aux fluides aqueux.

Potion purgative ordinaire.

Prenez séné.	8 g ^{mes} [2 gros.]
sulfate de soude	12 g ^{mes} [3 gros.]
Faites bouillir légèrement dans	

262 MÉDICAMENS MAGISTRAUX,

eau commune. 192 g^{mes} [6 onces.]
Ajoutez sirop d'enerprun. . . . 32 g^{mes} [1 once.]
Pour une dose.

Potion purgative majeure.

Ajoutez à la potion purgative ,
poudre cathartique, depuis . 12 déc^{mes} [24 grains.]
jusqu'à 18 déc^{mes} [36 grains.]

Potion purgative avec la Manne.

Prenez la potion purgative ordi-
naire, dont on supprime le si-
rop.
Dissolvez manne grasse. 64 g^{mes} [2 onces.]

Portion purgative avec le Catholicum.

Prenez manne grasse 64 g^{mes} [2 onces.]
Dissolvez dans eau. 160 g^{mes} [5 onces.]
Délayez dans la colature, catho-
licum double. 32 g^{mes} [1 once.]
Pour une dose.

Potion pour les Enfants nouveaux-nés.

Prenez huile d'olive ou d'amande
douce 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
sirop de chicorée composé. . . . 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
A faire prendre en une seule fois.

Potion vermifuge pour les Enfants.

Prenez huile de ricin. ou de	} De chaque 16 ^{gmes} jusqu'à	
palma christi		48 [4 gros à une once et
sirop tartareux. . . .		demie.]

L'huile de palma christi est du nombre des huiles qu'on ne prépare pas dans les pharmacies; elle y est apportée par la voie du commerce, très-souvent ayant un caractère de rancidité qui dépend de sa vétusté, ou de ce qu'elle a été extraite sans soin; il paroît même que la cupidité est parvenue à la sophistiquer: dans l'un et l'autre cas, il faut éviter de l'employer, car ses effets seroient fort équivoques. La meilleure huile de ricin doit être un peu fluide, sans odeur, d'une saveur douce; elle est suspecte dès qu'elle a une odeur forte, un goût âcre et brûlant. Il faut que les vases qui la contiennent soient toujours exactement bouchés, placés dans un endroit frais, et que jamais ils ne restent en vidange. Pour prévenir ce dernier inconvénient, on ne sauroit trop recommander de ne se servir que de bouteilles de cinq décilitres au plus, et de s'assurer, par la dégustation, de la qualité de l'huile qu'elles renferment.

264 MÉDICAMENS MAGISTRAUX,

Potion vomitive avec l'Émétique.

Prenez tartrite de potasse antimo-

nié. 15 cent^{gr.} [3 grains.]

Dissolvez dans eau de rivière . 360 g^{mes} [12 onces.]

Divisez en trois parties égales, à prendre de quart-d'heure en quart-d'heure, avec les précautions connues.

Potion vomitive avec l'Ipécacuanha.

Prenez ipécacuanha en poudre. . 1 g^{me} [18 grains.]

Délayez dans eau commune. . . 120 g^{mes} [4 onces.]

Pour une dose; lorsqu'on veut augmenter l'effet, on y ajoute tartrite de potasse antimonie, depuis 5 centigrammes jusqu'à 12 centigrammes [$\frac{1}{2}$ grain jusqu'à 2 grains.].

Lorsque par une circonstance majeure on se trouve dépourvu d'ipécacuanha, on peut le remplacer par un mélange de rhubarbe et de tartre antimonie de potasse dans la proportion d'un grain de ce dernier sur douze de rhubarbe. Ce substitut proposé par Bayen, et approuvé par le conseil de santé des armées, a été fort utile dans les hôpitaux militaires au moment où il y avoit disette de cet émétique végétal.

Potion cordiale.

Prenez vin rouge. 120 g^{mes} [4 onces.]
 teinture de canelle. . . . 8 g^{mes} [2 gros.]
 sirop de sucre 64 g^{mes} [2 onces.]

Mélez pour une potion à prendre par cuillerée.

Potion de Rivière.

Prenez carbonate de potasse. . 12 déc^{mes} [1 scrupule.]
 Mélez dans eau commune. . . 96 g^{mes} [3 onces.]
 sirop tartareux. 32 g^{mes} [1 once.]

Ce mélange se fera au chevet du lit du malade qui prendra la potion à l'instant où le gaz acide carbonique se dégage.

L'effervescence est plus tardive avec le sirop tartareux qu'avec le suc de limon ou le vinaigre blanc ; mais l'effet de la potion n'en est que plus certain.

Potion avec le Quinquina.

Prenez quinquina en poudre. . 8 g^{mes} [2 gros.]
 muriate d'ammoniaque. 3 déc^{mes} [6 grains.]
 vin rouge ou blanc. . . 128 g^{mes} [4 onces.]

Mélez pour une dose à prendre sur-le-champ. Cette potion peut être réitérée deux, trois et quatre fois par jour.

Potion anti-spasmodique.

Prenez infusion de fleurs de tilleul. . 128 g^{mes} [4 onces.]
 sirop de sucre. 32 g^{mes} [1 once.]
 eau de fleur d'orange. . . . 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
 éther sulfurique alkooli-
 sé. } De chaque 2 g^{mes}
 } [un demi-gros.]
 vin d'opium composé . . .

Mélez pour prendre par cuillerée.

Potion anti-histérique.

Ajoutez à la potion précédente,
 teinture de succin. . . } De chaque
 de castoréum. . . } 1 g^{me} [18 grains.]

On observe que les teintures doivent être toujours mêlées avec le sirop, avant d'ajouter les autres fluides qui composent la potion.

Potion anti-septique.

Prenez décoction de quinquina. . 128 g^{mes} [4 onces.]
 teinture alkoolique de
 cannelle. 8 g^{mes} [2 gros.]
 acétate d'ammoniaque [es-
 prit de mindédérés] . . . 8 g^{mes} [2 gros.]
 sirop d'œillet. 32 g^{mes} [1 once.]

Mélez.

Potion anti-septique camphrée.

A la potion précédente, ajoutez
 camphre. de 3 à 7 déc^{mes} [6 à 14 grains.]
 Divisez dans un peu de jaune d'œuf.