

SECTION VI.

LOOCHS.

Médicamens liquides, plus ou moins épais, composés d'une solution de sirop dans de l'eau gommée, ou d'un mélange d'huile et de sirop obtenu par la simple agitation, ou uni à l'aide d'un mucilage.

L'excipient des loochs est l'eau, l'émulsion, de légères infusions ou même des décoctions de substances appropriées, mais toujours pectorales. Ainsi tous les ingrédiens âcres, salés, désagréables, y conviennent peu.

On les administre toujours par cuillerée.

Looch gommeux.

Prenez gomme arabique 8 g^{mes} [2 gros.]
 infusion pectorale 128 g^{mes} [4 onces.]
 sirop de guimauve 48 g^{mes} [1 once.]
 A donner par cuillerée.

Looch gommeux incisif.

Prenez gomme arabique 4 g^{mes} [1 gros.]
 infusion béchique 128 g^{mes} [4 onces.]
 sirop de guimauve 32 g^{mes} [1 once.]
 Hydro-sulfure rouge d'an-
 timoine (kermès miné-
 ral.) 1 déc^{me} $\frac{1}{2}$ [3 grai s.]

268 MÉDICAMENS MAGISTRAUX,

On commence par triturer l'hydro-sulfure rouge d'antimoine ou kermès, avec la gomme et le sirop; on y ajoute peu à peu l'infusion.

A prendre par cuillerée, en agitant vivement chaque fois.

Looch huileux.

Prenez huile d'amandes douces. . . 64 g^{mes} [2 onces.]
sirop de sucre. 32 g^{mes} [1 once.]
infusion pectorale. 64 g^{mes} [2 onces.]

A prendre par cuillerée en agitant chaque fois.

Looch huileux incisif.

Le précédent avec addition de la quantité prescrite d'hydro-sulfure rouge d'antimoine ou kermès minéral. Mêlez l'hydro-sulfure avec l'huile dans un mortier de marbre : à prendre par cuillerée, en agitant chaque fois.

SECTION VII.

JULEPS.

MÉDICAMENS liquides, transparens, agréables, résultant du mélange de sirops et d'eau commune ou aromatique, auxquels on ajoute quelquefois des acides purs ou dulcifiés; mais jamais de poudres, dans la crainte de troubler leur limpidité. On les prend en deux ou trois fois.