

SECTION X.

BOLS.

Ils sont, comme les électuaires, composés de poudres, d'extraits, de pulpes, de conserves, de miels et de sirops, mais moins consistans que les pilules : on les administre sous des volumes plus ou moins considérables, enveloppés dans du pain azyme.

Bol stomachique.

Prenez safran en poudre. 3 décimes [6 grains.]
 canelle *idem*. 1 décime $\frac{1}{2}$ [3 grains.]
 magnésie pure. 4 décimes [8 grains.]
 sirop de sucre. quantité suffisante.

Mélez, et faites un bol ou un électuaire qui peut suppléer avec avantage la confection d'hya-cinthe.

Bol purgatif.

Prenez poudre cathartique. . . 12 décimes [24 grains.]

Mélez avec suffisante quantité de miel, pour faire prendre sous forme de bol.

Bol anthelmintique.

Prenez poudre anthelmintique 24 déc^{mes} [48 grains.]
 mercure doux porphy-
 risé. 2 déc^{mes} [4 grains.]
 miel. quantité suffisante.
 Divisez en bols pour une seule dose.

Bol thériacal.

Prenez rhubarbe en poudre. . . 3 déc^{mes} [6 grains.]
 thériaque 6 déc^{mes} [12 grains.]
 Faites un bol.

Bol astringent.

Prenez cachou en poudre. . . . 6 déc^{mes} [12 grains.]
 conserve de roses. . . . quantité suffisante.
 Pour former un bol.

Bol calmant.

Prenez extrait aqueux d'opium $\frac{7}{2}$ déc^{me} [1 grain.]
 poudre de réglisse . . . 5 déc^{mes} [10 grains.]
 conserve de roses. . . . quantité suffisante.

Faites un bol, qu'on répètera trois ou quatre fois par jour.

Bol camphré.

Prenez camphre. 1 déc^{me} [2 grains.]
 nitrate de potasse en
 poudre. 1 déc^{me} [2 grains.]
 farine, amidon ou gomme 5 déc^{mes} [6 grains.]

Mêlez avec suffisante quantité de conserve de roses, pour former un bol, qu'on réitérera plusieurs fois dans le jour.

Remède contre le tœnia.

Le malade prendra pour boisson la tisane suivante :

Prenez racine de fougère mâle

sèche. 132 g^{mes} [4 onces.]
 eau ordinaire. 1 litre $\frac{1}{2}$ [1 pinte $\frac{1}{2}$.]
 réduite par l'ébulli-
 tion à 1 litre [1 pinte.]
 sirop de coralline. . . . 64 g^{mes} [2 onces.]

Trois heures après le repas, le bol suivant.

Mercure doux. } de chaque
 Corne de cerf ou os calcinés et } 12 centigrammes
 préparés. } [2 grains.]

Mêlez avec un peu de conserve de roses.

Le soir à sept heures,

Huile d'amande douce. 32 g^{mes} [1 once.]

Le lendemain matin, le malade prendra le purgatif suivant :

Scammonée en poudre. 1 g^{me} [18 grains.]
 Racine de fougère mâle en poudre 32 g^{mes} [1 once.]
 Gomme-gutte. } de chaque 65 centigram.
 Mercure doux. } [12 grains.]

Le tout divisé en trois doses.

Nota. Si le malade vomit le ver solitaire après les deux premières prises, il faut s'abstenir de donner la troisième.

280 MÉDICAMENS MAGISTRAUX,

On emploie quelquefois ensemble l'éther sulfurique et l'huile de ricin, dans les proportions d'un gros d'éther et d'une once d'huile ; quelquefois on donne l'éther en lavement. Ce traitement a réussi chez plusieurs individus.

D'autres enfin emploient le remède suivant sous forme de bol contre le ver solitaire.

Prenez étain fin en poudre. . . 15 déc^{mes} [30 grains.]

Mélez avec un peu de conserve de roses.

On le prendra autant de fois qu'on le jugera à propos.

SECTION XI.

GARGARISMES.

MÉDICAMENS liquides qu'on promène dans la bouche et dans la gorge enflammées ou ulcérées, qu'on y garde un moment, qu'on rejette ensuite sans rien avaler, parce qu'ils peuvent contenir des substances qui ne manqueroient pas de préjudicier aux malades si elles parvenaient jusques dans l'estomac.

Gargarisme adoucissant.

Prenez décoction de racine de

guimauve. 256 g^{mes} [8 onces.]

sirop de miel. 32 g^{mes} [1 once.]

Mélez.