

Gargarisme anti-septique.

Prenez décoction de quinquina. 256 g^{mes} [8 onces.]
 Ajoutez miel rosat. 64 g^{mes} [2 onces.]
 Mêlez selon la prescription et les
 circonstances,
 Alkool camphré. 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
 Muriate d'ammoniaque 6 déc^{mes} [12 grains.]

SECTION XII.

COLLYRE.

ON comprend sous ce nom tous les médicaments externes destinés pour les maladies des yeux ; infusions, décoctions, eaux distillées, mixtures, solutions de sels, mucilages, poudres, pulpes de fruits, onguens, &c.

Collyre détersif simple.

Prenez sulfate de zinc. 12 déc^{mes} [24 grains.]
 Faites dissoudre dans eau
 commune. 192 g^{mes} [6 onces.]

Collyre détersif composé.

Prenez eau de rose }
 distillée } de chaque 128 g^{mes} [4 onces.]
 de plantain. . }
 sulfate de zinc. 12 déc^{mes} [24 grains.]

racine d'iris de Flo-

rence. 6 déc^{mes} [12 grains.]sucre blanc. 4 déc^{mes} [8 grains.]*Collyre résolutif.*

Prenez infusion de fleurs de

sureau 128 g^{mes} [4 onces.]

acétate de plomb cristal-

lisé. 6 gouttes [6 grains.]

teinture alcoolique vul-

néraire. 8 g^{mes} [2 gros.]

Mêlez.

Collyre sec.

Sucre blanc. .	} de chaque . . .	4 g ^{mes} [6 gros.]
Oxide de zinc.		

Réduisez en poudre fine.

Mêlez.

On s'abstient d'ajouter ici un plus grand nombre de collyres ; le besoin et les circonstances détermineront mieux la prescription des autres.

SECTION XIII.

LOTIONS, FOMENTATIONS, INJECTIONS,
BAINS, &c.

LOTIONS.

CE sont des infusions ou des décoctions de plantes, animées quelquefois par des solutions