

## I. Pteridophyta. Farnpflanzen.

### 1. Familie: Ophioglossaceen. Natterzungengewächse.

#### 1. Botrychium, Mondraute.

1. B. Lunaria Sw., gemeine Mondraute, Allermannsharnisch V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. z. B. Auf der Heide nordw. v. Wilhelmshorst, zwischen Schöndthal und Sandkrug, an der Chaussee zw. Stranz und Neuprenßendorf, im Kronerfier.
2. B. rutaceum Wil., mutterkrautblättrige Mondraute. V<sup>1</sup>Z<sup>1</sup>. An der Chaussee bei Ruchendorf und bei Freudenfier.

#### 2. Ophioglossum, Natterzunge.

1. O. vulgatum L., gem. Natterzunge. V<sup>1</sup>Z<sup>1</sup>. Nur bei Seemühle bei Saftrow.

### 2. Familie: Polypodiaceen. Tüpfelfarne.

#### 1. Polypodium, Tüpfelfarn.

1. P. vulgare L., gem. Tüpfelfarn, Engelsüßwurz, V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. Klausdorfer Forst nördl. v. Stadtmühl, Sagemühler Fichten (Nordabhang nach der Döberitz), bei Marienhof.

#### 2. Phegopteris, Buchenfarn.

1. Ph. Dryopteris Fée., Eichenfarn. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. Klausdorfer Forst nördl. v. Stadtmühl, Rateler Berge, am Schwanensee.
2. Ph. polypodioides Fée., echter Buchenfarn. V<sup>3</sup>Z<sup>4</sup>, z. B. Koppelwerder, Rateler Berge.
3. Ph. Robertiana A. Br., Storchschnabelfarn. V<sup>1</sup>Z<sup>2</sup>. Bei Salm.

#### 3. Polystichum, Punttfarn.

1. P. Thelypteris R., Sumpf-Punttfarn. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.
2. P. Filix mas R., Wurmfarn. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.

3. *P. spinulosum* DC., dorniger Punktfar.  $V^3Z^3$ .
4. *P. cristatum* R., kammförmiger Punktfar.  $V^1Z^2$ . In einem Torfbruch bei Tütz.

#### 4. *Cystopteris*, Blasenfar.

1. *C. fragilis* Bernh., zerbrechl. Blasenfar.  $V^2Z^2$ . Im Döberitztal zwischen Haugsdorf und Schönhölzig, bei Alt-Prochnow bei Gredenbruch.

#### 5. *Asplenium*, Milzfarn.

1. *Asplenium Filix femina* Bernh., weibl. Milzfarn.  $V^4Z^3$ .

#### 6. *Pteridium*, Saumfar.

1. *Pt. aquilinum* K., Adler-Saumfar.  $V^5Z^5$ .

### 3. Familie: Equisetaceen, Schachtelhalme.

#### 1. *Equisetum*, Schachtelhalm.

1. *E. arvense* L., Acker-Schachtelhalm.  $V^5Z^5$ .
2. *E. pratense* Ehrh., Wiesen-Schachtelhalm.  $V^3Z^3$ . z. B. Fahles Bruch, Satanssprind, bei Theerosen.
3. *E. silvaticum* L., Wald-Schachtelhalm.  $V^4Z^5$ .
4. *E. palustre* L., Sumpfschachtelhalm.  $V^4Z^4$ .
5. *E. limosum* L., Schlamm-Schachtelhalm.  $V^5Z^5$ .
6. *E. hiemale* L., Winter-Schachtelhalm.  $V^3Z^3$ , z. B. Buchwald und Klogow an den Abhängen nach dem Stadtsee zu, Forst am Schwanensee, Kronerfier.

### 4. Familie: Lycopodiaceen, Bärlappgewächse.

#### 1. *Lycopodium*, Bärlapp.

1. *L. Selago* L., Tannen-Bärlapp, Semust.  $V^2Z^2$ , im Klogow, bei Zippnow, Nafeler Berge.
2. *L. annotinum* L., sprossender Bärlapp.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klogow am Wege nach Kl. Nafel, Döberitztal bei Schönhölzig, Satanssprind.
3. *L. inundatum* L., Sumpfbärlapp.  $V^2Z^3$ . In Sümpfen des Klogow, am Tützsee.
4. *L. clavatum* L., keulenförmiger Bärlapp.  $V^4Z^4$ .
5. *L. complanatum* L., flacher Bärlapp.  $V^3Z^2$ . Am Schwanensee, bei Mehlgast, zwischen Niederitz und Ballbruch, Schöenthaler Forst.

## II. Gymnospermae, Nactsamige.

### 1. Familie: Coniferen, Zapfenfrüchtler.

#### 1. Juniperus, Wachholder.

1. *J. communis* L., gem. Wachholder. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

#### 2. Pinus, Kiefer, Föhre.

1. *P. silvestris* L., Kiefer, Föhre. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

#### 3. Picea, Fichte.

1. *P. excelsa* Link., gem. Fichte, Kottanne. Als Waldbaum gepflanzt.

#### 4. Larix, Lärche.

1. *Larix decidua* Mil., Als Waldbaum vereinzelt gepflanzt.

## III. Monocotyledones, Einfeimblättler.

### 1. Familie: Typhaceen, Rohrkolbengewächse.

#### 1. Typha, Rohrkolben.

1. *T. latifolia* L., breitblättr. Rohrkolben. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.  
2. *T. angustifolia* L., schmalblättr. Rohrkolben. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>, 3. B. im großen Böhinsee am Koppelwerder, im Pinnowsee, im Tüßsee.

### 2. Familie: Sparganiaceen, Sgelfkolbengewächse.

#### 1. Sparganium, Sgelfolben.

1. *S. ramosum* Hud., aufrechter Sgelfolben. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.  
2. *S. simplex* Hud., einfacher Sgelfolben. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.  
3. *S. minimum* Fr., kleinster Sgelfolben. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Am Ufer der Döberitz nördl. der Sagemühler Fichten, Trebeskese, in einem Torfbruche zw. Zippnow u. Briesenitz.

### 3. Familie: Potameen, Saifkrautgewächse.

#### 1. Potamogeton, Saifkraut.

1. *P. natans* L., schwimmend. Saifkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.  
2. *P. perfoliatus* L., durchwachsenes Saifkraut. In der Döberitz, im Pilowfließ, im großen Böhinsee.  
3. *P. lucens* L., spiegelndes Saifkraut. Im Bruch am Pinnowsee

4. *P. Zizzii* Cham. et Schldl. Im großen Radunsee.
5. *P. gramineus* L., grasartiges Laichkraut. In der Döberitz oberhalb Sagemühl, in der Pilow zwischen Freudenfier und Hoppemühl.
6. *P. crispus* L., krauses Laichkraut. An vielen Stellen der Döberitz, im Roglinsee, im fl. Krampejee.
7. *P. pectinatus* L., fadenblättriges Laichkraut. Im flachen Hundskopffee, im Süptowsee.
8. *P. pusillus* L., Im Köpenicksee.
9. *P. rutilus* W., rötliches Laichkraut. Im Stabitzsee.

#### 4. Familie: Naiadaceen, Nixkrautgewächse.

##### 1. Naias, Nixkraut.

1. *N. maior* All., großes Nixkraut. Beim Entwässerungsversuch des flachen Hundskopffees (1903) in größerer Menge.

#### 5. Familie: Juncaginaceen, Blumenbinjengewächse.

##### 1. Scheuchzeria, Blasenbinje.

1. *Sch. palustris* L., Sumpf-Blasenbinje. Im Ziegenfließ.

##### 2. Triglochin, Dreizack.

1. *T. palustris* L., Sumpf-Dreizack.  $V^3Z^3$ , 3. B. auf den Wiesen nördl. vom Stadtsee, an der Nakeler und Stibber Lanke, am Schulzsee bei Machlin.

#### 6. Familie: Alismaceen, Froschlöffelgewächse.

##### 1. Alisma, Froschlöffel.

1. *A. Plantago* L., gem. Froschlöffel.  $V^4Z^4$ .
2. *A. natans* L., schwimmender Froschlöffel.  $V^1Z^2$ . Im Linowbruch bei Ulrichsfelde.

#### 7. Familie: Butomaceen, Schwanenblumengewächse.

##### 1. Butomus, Wasserliesch.

1. *B. umbellatus* L., dolbenblütiger Wasserliesch.  $V^1Z^2$ . Am großen Zückersee.

#### 8. Familie: Hydrocharitaceen, Froschbißgewächse.

##### 1. Elodea, Wasserpest.

1. *E. canadensis* R. et M., gem. Wasserpest.  $V^5Z^5$ .

## 2. *Stratiotes*, Krebsſcheere.

1. *St. aloides* L., aloeblättrige Krebsſcheere.  $V^3Z^4$ , z. B. im Karauschenpfuhl und blauen Waſſer (Sagemühler Fichten), im langen Mehlgäſſee.

## 3. *Hydrocharis*, Froſchbiß.

1. *H. Morsus ranae* L., gem. Froſchbiß.  $V^3Z^3$ . Im Gladenſee, in Wieſengräben nördl. vom großen Radunſee.

## 9. Familie: Gramineen, Gräſer.

### 1. *Oryza*, Reiſ.

1. *O. clandestina* A. Br., wilder Reiſ.  $V^2Z^3$ . Sagemühler Fichten, Prellwitz, am Rüchensee bei Salm.

### 2. *Phalaris*, Glanzgras.

1. *Ph. canariensis* L., Kanarienhirſe, Spißſaat. Auf einem Schutthaufen in Klausdorf.
2. *Ph. arundinacea* L., rohrartiges Glanzgras.  $V^4Z^4$ .

### 3. *Anthoxanthum*, Ruchgras.

1. *A. odoratum* L., gem. Ruchgras.  $V^5Z^5$ .

### 4. *Hierochloë*, Mariengras.

1. *H. odorata* Wahl., wohlriech. Mariengras.  $V^1Z^2$ . In einem Torfbruch bei Emilienthal.
2. *H. australis* R. et Schult., ſüdliches Mariengras.  $V^1Z^3$ . Schönthaler Forſt bei Freudenſter.

### 5. *Panicum*, Hirſe.

1. *P. lineare* Kr., linienförmige Hirſe.  $V^3Z^4$ .
2. *P. Crus galli* L., Hühnerhirſe.  $V^4Z^4$ .

### 6. *Setaria*, Fennich.

1. *S. viridis* P. B., grüner Fennich.  $V^5Z^4$ .
2. *S. glauca* P. B., gelbhäutiger Fennich.  $V^3Z^3$ , z. B. auf Ackerland in der näheren Umgebung von Dt. Krone und Ortschaften.

### 7. *Milium*, Flattergras.

1. *M. effusum* L., gem. Flattergras.  $V^3Z^5$ . In den Laubholzswaldungen.

### 8. *Nardus*, Borſtengras.

1. *N. stricta* L., ſteifes Borſtengras.  $V^3Z^4$ , z. B. lichte Waldſtellen der Dycker Forſt, der Sagemühler Fichten und der Schlopper Forſt.

### 9. Phleum, Fieschgras.

1. Ph. pratense L., Timotheegras.  $V^4Z^4$ . Auf vielen Wiesen und Begrändern.
2. Ph. Boehmeri Wib., Böhmers Fieschgras.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Arnstfelde, Fiermühl, Wittkow.

### 10. Alopecurus, Fuchsschwanz.

1. A. pratensis L., Wiesenfuchsschwanz.  $V^5Z^5$ .
2. A. geniculatus L., geknieter Fuchsschwanz.  $V^3Z^4$ , z. B. am Rande einiger Tümpel der Chausseestrecke zwischen Dairam und Arnstfelde, am Tützsee, Wiesen nördl. vom Stadtsee.
3. A. fulvus Sm., rotgelber Fuchsschwanz.  $V^3Z^4$ . Meist dort, wo die vorige Art.

### 11. Agrostis, Straußgras.

1. A. alba L., weißes Straußgras.  $V^4Z^4$ . Auf den Wiesen der Flußläufe.
2. A. vulgaris With., gem. Straußgras.  $V^5Z^5$ .
3. A. spica venti L., Windhalm.  $V^4Z^4$ . Im Roggen stellenweise in großer Menge.
4. A. canina L., Hundes-Straußgras.  $V^3Z^4$ , z. B. auf den Dreigroschenwiesen, auf den Wiesen am Koppelwerder, am kleinen Rameelsee.

### 12. Calamagrostis, Schilf.

1. C. lanceolata Rth., lanzettliches Schilf.  $V^3Z^4$ , z. B. auf den Wiesen nördl. vom Stadtsee, am Gr. Böhlinsee.
2. C. epigeios Rth., Sandschilf.  $V^4Z^4$ . An den Böschungen vieler Seen.

### 13. Amophila, Sandgras.

1. A. arenaria Link., Sandgras.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Stadt- und Schloßmühl, bei Machlin, bei Tütz am Lüptowsee.

### 14. Holcus, Honiggras.

1. H. mollis L., weiches Honiggras.  $V^2Z^2$ . Im Walde an der Rafeler und Stibber Lanke.
2. H. lanatus L., wolliges Honiggras.  $V^5Z^5$ .

### 15. Avena, Hafer.

1. A. elatior L., Wiesenhafer.  $V^5Z^5$ .

### 16. Aira, Schmiele.

1. Aira caespitosa L., rasenförmige Schmiele.  $V^5Z^5$ .

2. *A. flexuosa* L., geschlängelte Schmiele.  $V^3Z^4$ , z. B. am Schlachthaus bei Dt. Krone, im Kloßow (Salzberge), zwischen Schloppe und Tüß.

3. *Aira praecox* P. B., frühzeitige Schmiele. Wald am Mehlgastsee, Koppelwerder.

#### 17. Weingaertneria, Silbergras.

1. *W. canescens* Bern., graues Silbergras.  $V^5Z^5$ . Oft große bürre Heidesflächen überziehend, so bei Stranz und Schloppe.

#### 18. Sieglingia, Sieglingie.

1. *S. decumbens* Bernh., liegende Sieglingie. Auf den Wiesen am Nordufer des großen Radumsees.

#### 19. Phragmites, Rohr.

1. *Ph. communis* Tr., gem. Rohr.  $V^5Z^5$ .

#### 20. Melica, Perlgras.

1. *M. nutans* L., nickendes Perlgras.  $V^5Z^3$ . In fast allen Laubwäldern.

#### 21. Koeleria, Kölerie.

1. *K. cristata* Pers., fahnenförmige Kölerie.  $V^4Z^3$ .

#### 22. Briza, Bittergras.

1. *B. media* L., gemeines Bittergras.  $V^5Z^5$ .

#### 23. Dactylis, Rnaulgras.

1. *D. glomerata* L., gemeines Rnaulgras.  $V^5Z^5$ .

#### 24. Poa, Rispengras.

1. *P. annua* L., einjähriges Rispengras.  $V^5Z^5$ .

2. *P. nemoralis* L., Hain-Rispengras.  $V^3Z^4$ , z. B. Koppelwerder, Seepromenade nach dem Buchwald bei Dt. Krone.

3. *P. serotina* Ehr., spätes Rispengras.  $V^3Z^4$ , z. B. Koppelwerder, Rafeler Berge, im Walde bei Alt-Prochnow.

4. *P. trivialis* L., gemeines Rispengras.  $V^5Z^5$ .

5. *P. pratensis* L., Wiesen-Rispengras.  $V^5Z^5$ .

6. *P. compressa* L., zusammengedrücktes Rispengras. Schloßberg bei Stranz.

#### 25. Catabrosa P. B., Quellgras.

1. *C. aquatica* P. B., Wasser-Quellgras.  $V^2Z^4$ . Am Pinnowsee, am langen Mehlgastsee, am flachen Hundskopffsee.

**26. Molinia, Molinie.**

1. *M. coerulea* Mch., blaue Molinie.  $V^3Z^4$ , z. B. in Torfbrüchen und feuchten Stellen des Klogows, bei Wallbruch.

**27. Glyceria, Schwaden.**

1. *G. spectabilis* M. et K., Wasser-Schwaden.  $V^5Z^5$ . Am Ufer der meisten Gewässer.
2. *G. fluitans* R. Br., flutender Schwaden. Mannagrass.  $V^4Z^4$ .
3. *G. plicata* Fr., gefalteter Schwaden, Am Stabiger See und Lebehnte-See.

**28. Festuca, Schwingel.**

1. *F. elatior* L., hoher Schwingel.  $V^5Z^4$ .
2. *F. gigantea* Vill., Riesenschwingel.  $V^3Z^3$ , z. B. im Koppelwerder, im Ziegelbusch bei Reßburg, Sagemühler Fichten.
3. *F. ovina* L., Schaf-Schwingel.  $V^5Z^5$ .
4. *F. rubra* L., roter Schwingel.  $V^3Z^4$ . Häufig an Eisenbahndämmen.

**29. Cynosurus, Rammgras.**

1. *C. cristatus* L., gemeines Rammgras.  $V^4Z^4$ .

**30. Bromus, Trefpe.**

1. *B. inermis* Leys., grannenlose Trefpe. Bei Züßer und Presswig.
2. *B. sterilis* L., taube Trefpe. Bei Märk. Friedland.
3. *B. tectorum* L., Dachtrefpe.  $V^4Z^3$ , z. B. an der Bahnstrecke im Klogow, an der Chaussee bei Brogen u. s. w.
4. *B. secalinus* L., Roggentrefpe.  $V^3Z^3$ . In Roggenfeldern, z. B. bei Harmelsdorf, bei Dt. Krone (Posien).
5. *B. mollis* L., weichhaarige Trefpe.  $V^5Z^4$ .
6. *B. racemosus* L., traubenförmige Trefpe. Auf den Wiesen bei Klausdorfer Hammer.

**31. Brachypodium, Zwenke.**

1. *B. pinnatum* P. B., gefiederte Zwenke.  $V^3Z^5$ , z. B. an vielen Stellen des Klogows und anderer Forsten.
2. *B. silvaticum* R. et S., Waldzwenke.  $V^2Z^3$ . In den Waldungen an der Rafeler und Stibber Lante, bei Alt-Brochnow.

**32. Triticum, Weizen.**

1. *T. caninum* L., Hundeweizen. An ausgeholzten Stellen im Koppelwerder.
2. *T. repens* L., Dinkel.  $V^5Z^5$ .

**33. Hordeum, Gerste.**

1. *H. murinum* L., Mäufegerste. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. Sagemühl, Gr. Linichen, Chaussee Dt. Krone—Lebehnte.

**34. Lolium, Völsch.**

1. *L. temulentum* L., Taumellösch. In der Saat bei Marzdorf.
2. *L. linicolum* A. Br., leinliebender Völsch. In Leinsaat bei Preußendorf und bei Karlsruhe.
3. *L. perenne* L., englisches Raygras. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

**10. Familie: Cyperaceen, Cypergrasgewächse.**

**1. Cyperus, Cypergras.**

1. *C. flavescens* L., gelbliches Cypergras. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. Am langen Mehlgastsee, am Böhinsee, am Gamelsee.
2. *C. fuscus* L., schwarzbraunes Cypergras. Bei Presswitz.

**2. Rhynchospora, Moorsimse.**

1. *R. alba* Vahl., weiße Moorsimse. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. An der Mündung des Stabiger Fließes in die Döberitz, im Koppelwerder, zwischen Neugolz und Daber.

**3. Cladium, Schneide.**

1. *C. Mariscus* R. Br., deutsche Schneide. Am großen Raaksee nördl. von Mierosen.

**4. Scirpus, Simse.**

1. *S. pauciflorus* Ligt., armblütige Simse. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. Auf den Wiesen nördlich vom großen Radunsee, am Linowobruich bei Ulrichsfelde.
2. *S. lacustris* L., Seesimse. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>. Am Ufer vieler Seen.
3. *S. Tabernaemontani* Gmel., Tabernämontan's Simse. Am Schulzsee bei Machlin, am großen Radunsee.
4. *S. silvaticus* L., Waldsimse. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>.
5. *S. compressus* Pers., zusammengedrückte Simse. Wiesen nördlich von Märk. Friedland, Wiesen nördlich vom Klotzow (Pilowfließ).

**5. Heleocharis, Riet.**

1. *H. palustris* R. B., Sumpf-Riet. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *H. uniglumis* Lk., einbälziges Riet. An einem Sumpf an der Chaussee zw. Quiram und Arnshfelde, am Stabigsee.

3. *H. acicularis* R. Br., nadel förmiges Riet. Vinowobbruch bei Ulrichsfelde, Wucknicksee bei Mierosen.

### 6. *Eriophorum*, Wollgras.

1. *E. vaginatum* L., scheidiges Wollgras.  $V^3Z^3$ , 3. B. im großen Bruch nördl. des großen Radunsees, in der Bahlitz, am Tüßsee.
2. *E. polystachium* L., schmalblättriges Wollgras.  $V^4Z^4$ . Auf fast allen sumpfigen und torfigen Wiesen.
3. *E. latifolium* Hoppe, breitblättriges Wollgras.  $V^3Z^3$ , 3. B. auf den Wiesen an der Rafeler Lanke, am großen Büßen-See, bei Dreeß am großen Böhlinsee.
4. *E. gracile* Koch, schlankes Wollgras.  $V^1Z^2$ . Am Dreeßsee.

### 7. *Carex*, Segge.

1. *C. dioica* L., zweihäufige Segge.  $V^3Z^3$ , 3. B. im Döberitztal nördl. der Sagemühler Fichten und bei Gangsdorf, am flachen Hundskopffsee.
2. *C. cyperoides* L., cypergrasartige Segge.  $V^1Z^2$ . Im Vinowobbruch, Nordufer des großen Radunsees.
3. *C. disticha* Huds., zweizeilige Segge.  $V^3Z^3$ , 3. B. am Wusterwitzsee, bei Seemühle, am großen Koglinsee.
4. *C. arenaria* L., Sandsegge. Am Lüptowsee, am Schwanensee.
5. *C. Ligerica* Gay., französische Segge. Am Pinnowsee.
6. *C. praecox* Schr., frühzeitige Segge. An dem Abhange des Kronerfies nach dem Döberitztal.
7. *C. vulpina* L., fuchsbraune Segge.  $V^5Z^4$ .
8. *C. muricata* L., sperrfrüchtige Segge.  $V^5Z^5$ .
9. *C. paniculata* L., rispiße Segge.  $V^3Z^4$ , 3. B. in Torfbrüchen im Klotzow, am Fließ bei Schneidemühler-Hammer, an der Rafeler Lanke.
10. *C. teretiuscula* Good., rundliche Segge. Wiesen am Karauschenpfuhl.
11. *C. leporina* L., Hasenpfotensegge. Im Koppelwerder, am blauen Wasser (Sagemühler Fichten).
12. *C. echinata* Mur., sternförmige Segge.  $V^3Z^3$ , 3. B. in der Bahlitz, am Karauschenpfuhl, am Hertasee.
13. *C. elongata* L., verlängerte Segge. Am Trebeske-See bei Schöenthal.

14. *C. canescens* L., weißgraue Segge. Am Linowobruclı.
15. *C. remota* L., entferntährige Segge. Im Walde am Dreeksee, am Hertasee, am Trebeske-See.
16. *C. stricta* Good., steife Segge. In einem Sumpf westl. von Stadtmühl, in den Sümpfen an der Chauffee von Dt. Krone nach Johanniöthal.
17. *C. acuta* L., spißantige Segge. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
18. *C. Goodenonghii* Gay., gemeine Segge. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
19. *C. pilulifera* L., pillentragende Segge. An Waldfäumen bei Alt-Lobitz.
20. *C. montana* L., Bergsegge. In den nördlichen Sagemühler Fichten
21. *C. ericitorum* Pol., Heide-Segge. V<sup>3</sup>Z<sup>4</sup>, z. B. Sagemühler. Fichten, Kronerfrier, Dycker und Harmelsdorfer Forst.
22. *C. verna* Vil., Frühlings-Segge. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
23. *C. limosa* L., Schlamm-Segge. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. in den Brüchen des Klogowö, in der Bablitz, Ufer des kleinen Krampe-Sees.
24. *C. glauca* Scop., meergrüne Segge. Döberitzwiesen bei Sagemühl, Bethkenhammer.
25. *C. panicea* L., hirsenartige Segge. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. am Nordufer des großen Radunsee, Dreigroschenwiesen, Wiesen am Stabitzer Fließ.
26. *C. pallescens* L., blasser Segge. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. am Ufer des Lebehnte und Stabitzsees, am großen Bötthinsee.
27. *C. digitata* L., gefingerte Segge. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. Kronerfrier (bei Ranke), Tulauer Berg, bei Jastrow, Waldungen am Dreeksee.
28. *C. distans* L., entfernt-ährige Segge. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. auf den Wiesen nördlich vom gr. Radunsee, bei Schneidemühler-Hammer, am Tützsee.
29. *C. flava* L., gelbe Segge. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. am Nordufer des großen Radunsees, am Pinnowsee, am großen Bötthinsee beim Koppelwerder.
30. *C. silvatica* Huds., Waldsegge. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. am Schulzsee, bei Alt-Prochnow, am flachen Hundskopffee.
31. *C. Pseudo-Cyperus* L., cypergrasähnliche Segge. Bei Gramattenbrück.
32. *C. ampullacea* Good., geschnäbelte Segge. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. auf den Wiesen am Nordufer des Stadtsees, Linowobruclı, Bötthinsee.
33. *C. vesicaria* L., Blasensegge. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. an vielen Stellen des Döberitztales, Gr. Radunsee, Hertasee.

34. *C. acutiformis* Ehr., Sumpf-Segge.  $V^3Z^3$ , z. B. am Ostufer  
des großen Böhlinsees, Pinnowsee, Wiesen bei Märk. Friedland.  
35. *C. riparia* Curt., Ufersegge.  $V^3Z^3$ , z. B. am Gr. Radunsee  
westlich der Salzberge, am Gr. Rührensee, Koppelwerder.  
36. *C. lasiocarpa* Ehr., fadenförmige Segge. Im großen Torf-  
bruch des Klogows.  
37. *C. hirta* L., kurzhaarige Segge.  $V^4Z^5$ .

## 11. Familie: Araceen, Aroengewächse.

### 1. *Acorus* L., Kalmus.

1. *A. calamus* L., gemeiner Kalmus. In den Wiesengräben  
nördlich der Försterei Moritzhof, im Pilowfließ bei Pilowbrück,  
auf den Kieselwiesen nördl. v. Stadt- und Schloßmühl.

### 2. *Calla* L., Schweinefraut.

1. *C. palustris* L., Sumpf-Schweinefraut.  $V^3Z^5$ , z. B. an sumpfigen  
Stellen des Klogows, im blauen Wasser (Sagewühl Fichten),  
Torfbruch zwischen Neugolz und Daber.

## 12. Familie: Lemnaceen, Wasserlinsen

### 1. *Lemna*, Wasserlinse.

1. *L. trisulca* L., dreifurchige Wasserlinse. In Torfstichlöchern  
nördl. vom Klogow.  
2. *L. minor* L., kleine Wasserlinse.  $V^5Z^5$ .  
3. *L. gibba* L., buckelige Wasserlinse.  $V^5Z^3$ .  
4. *L. pollyrrhiza* L., vielwurzlige Wasserlinse.  $V^5Z^3$ .

## 13. Familie: Juncaceen, Binsegewächse.

### 1. *Juncus*, Binse.

1. *J. conglomeratus* L. = *J. Leersii* Mars., Veer's Binse.  $V^5Z^4$ .  
2. *J. effusus* L., flattrige Binse.  $V^3Z^3$ , z. B. am Trebesse-See,  
am Koglinsee, bei Pilowbrück.  
3. *J. glaucus* Ehr., meergrüne Binse. Am Köpenick-See.  
4. *J. squarrosus* L., sparrige Binse. An der Plietnitz bei Zippnow,  
bei Arnshof.  
5. *J. tenuis* Willd., zarte Binse. An dem Triftwege zum Klogow  
nördl. vom Stadtsee.

6. *J. compressus* Jacq., zusammengedrückte Binse.  $V^4Z^3$ , z. B. an der Rafeler Lanke, am großen Roglinsee, Bruch am Binnow-See.
7. *J. bufonius* L., Krötenbinse  $V^4Z^5$ .
8. *J. capitatus* Weig., kopfblütige Binse. Auf einer Wiese am großen Teich bei Schloppe.
9. *J. supinus* Mch., Sumpf-Binse. Im Binowbruch.
10. *J. alpinus* Vill., schwarzbraune Binse. Auf den Wiesen nördl. vom großen Radunsee, am Karauschenpfuhl.
11. *J. lamprocarpus* Ehr., gegliederte Binse.  $V^4Z^5$ .
12. *J. obtusiflorus* Ehr., stumpfblütige Binse. In einem Sumpf in der Nähe von Gollin.

## 2. *Luzula*, Marbel.

1. *L. pilosa* Willd., behaarte Marbel.  $V^3Z^4$ . In vielen Waldungen häufig.
2. *L. angustifolia* Gek., schmalblättrige Marbel. Im Kronerfief.
3. *L. campestris* DC., gemeine Marbel.  $V^5Z^5$ .
4. *L. multiflora* Lej., vielblütige Marbel.  $V^3Z^4$ .

## 14. Familie: Liliaceen, Ziliengewächse.

### 1. *Anthericus*, Gräslilie.

1. *A. ramosus* L., ästige Gräslilie.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Schönthal, an den bewaldeten Strecken der Chaussee zwischen Stranz—Ruschen-dorf—Schloppe, zwischen Machlin und Groß-Binichen.

### 2. *Gagea*, Goldstern.

1. *G. pratensis* Schult., Wiesengoldstern.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Nieselwiesen nördlich von Stadtmühl, bei Märk. Friedland, Babilg.
2. *G. arvensis* Schult., Ackergoldstern.  $V^4Z^4$ . An vielen Stellen in der Winterfaat.
3. *G. minima* Schult., kleiner Goldstern. An der Rafeler Lanke.
4. *G. lutea* Schult., gelber Goldstern.  $V^2Z^3$ . Im Ziegelbusch, an der Mündung des Klausdorfer Mühlenfließes in die Döberitz.

### 3. *Allium*, Lauch.

1. *A. oleraceum* L., Gemüsellauch. An der Rafeler Lanke in der Nähe des Koppelwerders.
2. *A. vineale* L., Weinbergs-Lauch. An dem Fahrweg von Dt. Krone nach dem Klogow, am Wege von Kl. Rafel nach Dreeß.

#### 4. *Lilium* L., Türkenbund.

1. *L. Martagon* L., Türkenbundlilie.  $V^1Z^3$ . Im nördlichen Teile der Sagemühler Fichten, im Koppelwerder.

#### 5. *Maianthemum*, Schattenblume.

1. *M. bifolium* Sch., zweiblättrige Schattenblume.  $V^4Z^4$ . In fast allen Laubwaldungen.

#### 6. *Polygonatum*, Weißwurz.

1. *P. verticillatum* All., quirlblättrige Weißwurz.  $V^1Z^2$ . Bei Dolfusbruch.
2. *P. officinale* All., Salomonsiegel.  $V^2Z^3$ . Im Koppelwerder, in den Sagemühler Fichten am Döberitztal, im Ziegelbusch.
3. *P. multiflorum* All., vielblütige Weißwurz.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klogow an mehreren Stellen, in den Nakeler Bergen, bei Wallbruch.

#### 5. *Convallaria*, Maiblume.

1. *C. maialis* L., gemeine Maiblume.  $V^4Z^5$ .

#### 8. *Paris*, Einbeere.

1. *P. quadrifolius* L., vierblättrige Einbeere.  $V^3Z^3$ , z. B. Klausdorfer Forst bei Stadtmühl, im Klogow an den Salzbergen, Koppelwerder.

### 15. Familie: Iridaceen, Schwertelgewächse.

#### 1. *Iris*, Schwertlilie.

1. *I. Pseud-Acorus* L., Wasser-Schwertlilie.  $V^4Z^3$ .

### 16. Familie: Orchidaceen, Knabenkrautgewächse.

#### 1. *Orehis*, Knabenkraut.

1. *O. Morio* L., gemeines Knabenkraut.  $V^2Z^2$ . Wiesen am Pilowfließ nördl. der Försterei Mittelfurth, Döberitzwiesen an den Sagemühler Fichten.
2. *O. mascula* L., männliches Knabenkraut.  $V^1Z^2$ . Under StibberLanke.
3. *O. latifolia* L., breitblättriges Knabenkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. Wald am Dreeßsee, Wiesen am Koppelwerder, am Schulzsee.
4. *O. incarnata* L., fleischfarbiges Knabenkraut.  $V^3Z^4$ . Auf vielen Wiesen.
5. *O. maculata* L., geflecktes Knabenkraut.  $V^3Z^3$ . Auf Wiesen.

## 2. *Gymnadenia*, Hös wurz.

1. *G. conopea* R. B., fliegenartige Hös wurz. Am flachen Hundsfopffsee.

## 3. *Platanthera*, Ruckuckblume.

1. *P. bifolia* Rehb., zweiblättrige Ruckuckblume.  $V^1Z^3$ .
2. *P. chlorantha* Cust., grünblütige Ruckuckblume.  $V^2Z^2$ . Koppelwerder, Klogow, Schlopper Forst.

## 4. *Cephalanthera*, Zymbelkraut.

1. *C. grandiflora* Bab., großblütiges Zymbelkraut.  $V^1Z^2$ . In den Salzbergen (Klogow).

## 5. *Epipactis*, Sumpfwurz.

1. *E. latifolia* All., breitblättrige Sumpfwurz. Am Düpe-See.
2. *E. rubiginosa* G., braunrote Sumpfwurz.  $Z^1$ . Bei Rohrwiese.
3. *E. palustris* Crantz., gemeine Sumpfwurz.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Wiesen nördl. vom großen Radunsee, am Dreehsee, am Böhlinsee.

## 6. *Neottia*, Vogelneft.

1. *N. Nidus avis* Rich., gemeines Vogelneft. Im Koppelwerder, bei Grünthal.

## 7. *Listera*, Zweiblatt.

1. *L. ovata* R. Br., eiblättriges Zweiblatt.  $V^3Z^3$ , z. B. Döberitzwiesen nördl. der Sagemühler Fichten, im Koppelwerder, im Walde bei Alt-Prochnow.

## 8. *Goodyera*, Goodhere.

1. *G. repens* R. Br., kriechende Goodhere.  $V^1Z^2$ . Kronerfier.

## 9. *Liparis*, Glanzkraut.

1. *L. Loeselii* Rich., Lösel's Glanzkraut. Feuchte Waldungen am Dreehsee.

# IV. *Apetalae*, Einhüllblütige.

## 1. Familie: *Salicaceae*, Weidengewächse.

### 1. *Salix*, Weide.

1. *S. pentandra* L., fünfmännige Weide. Im Hammerbruch, östl. v. Lüben, am Tüßsee.

2. *S. fragilis* L., Bruchweide.  $V^3Z^2$ , z. B. im Koppelwerder am großen Böhlinsee, an der Ostseite des Brogensees, am Seeufer in den Salzbergen.
3. *S. alba* L., Silberweide.  $V^3Z^4$ .
4. *S. amygdalina* L., mandelblättrige Weide.  $V^3Z^2$ . An vielen Brüchen, z. B. zwischen Arnsmühl und Regelsmühl.
5. *S. daphnoides* Vill., kellerhalsblättrige Weide. Am Wege von Dt. Krone nach Breitenstein in zwei Exemplaren.
6. *S. viminalis* L., Korbweide. Am Seeufer des großen Radunsees, am Mehlgastsee.
7. *S. cinerea* L., graue Weide.  $V^3Z^3$ , z. B. Babsitz, am kleinen Rameelsee, Hammerbruch, an der Nordgrenze des Klogowwaldes.
8. *S. caprea* L., Saal-Weide. In mehreren Sümpfen im Klogow, am Schweinefließ bei Reßburg, am Brogensee.
9. *S. aurita* L., Ohrweide.  $V^4Z^4$ .
10. *S. repens* L., kriechende Weide.  $V^3Z^4$ . In vielen Mooren mit sehr verschieden geformten Blättern, z. B. am kleinen Grampe-See, auf den Moorniesen nördl. vom Stadtsee, in einem Bruch bei Wittkow.
11. *S. purpurea* L., Purpurweide. Am Südufer des Schloßsees bei Dt. Krone, in Brüchen der Rakeler Berge, bei Klausdorfer-Hammer.

Außer diesen Arten viele Bastarde.

## 2. *Populus*, Pappel.

1. *P. alba* L., Silberpappel. In Harmelsdorf, am Bahnhof Tütz, an der Chauffee zwischen Machlin und Brogen.
2. *P. tremula* L., Zitterpappel.  $V^5Z^3$ .
3. *P. nigra* L., Schwarzpappel. An Chauffeen und Wegen gepflanzt.
4. *P. monilifera* Ait., Rosenfranzpappel. Angepflanzt.
5. *P. balsamifera* L., Balsampappel. Drei Exemplare am Südufer des Schloßsees.
6. *P. italica* Ludw., Pyramidenpappel. Nur noch in einer geringen Anzahl von Exemplaren vorhanden.

## 2. Familie: *Betulaceen*, Birken.

### 1. *Corylus*, Hasel.

1. *C. Avellana* L., Haselnuß.  $V^5Z^4$ .

## 2. *Carpinus*, Weißbuche.

1. *C. Betulus* L., gemeine Hainbuche. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im östlichen Teile des Buchwaldes bei Dt. Krone; in besonders stattlichen Exemplaren in den Nafeler Bergen und im Koppelwerder.

## 3. *Betula*, Birke.

1. *B. verrucosa* Ehr., warzige Birke. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. bei Schloßmühl; im Klogow die älteren Bestände mehr und mehr ausgeholzt, drei mächtige Exemplare bei der Försterei Niederhof bei Machlin.
2. *B. pubescens* Ehr., weichhaarige Birke. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>. Hauptsächlich in Torfmooren und Brüchen.

## 4. *Alnus*, Erle.

1. *A. glutinosa* Gaertn., Schwarzerle. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *A. incana* DC., Grau- oder Weißerle. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>. Am Nordufer des Mellen-Sees, an dem Ostufer des großen Brohen-Sees, Sagemühler Fichten; außerdem angepflanzt.

## 3 Familie: Cupuliferen, Becherfrüchtler.

### 1. *Fagus*, Buche.

1. *F. silvatica* L., Rotbuche. V<sup>3</sup>Z<sup>4</sup>. Besonders starke Bäume im Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, in den Nafeler Bergen und im Koppelwerder.

### 2. *Quercus*, Eiche.

1. *Q. robur* L., Stiel- oder Sommerliche. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>. In großen Waldbeständen gepflanzt. Alte Eiche im Klogow, Umfang 8,5 m, gestürzt am 11. 1. 1902.\*)
2. *Q. sessiliflora* Smith., Stein- oder Winterliche. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. im Koppelwerder, im Klogow.

## 4. Familie: Ulmaceen, Rüstergewächse.

### 1. *Ulmus*, Ruster, Ulme.

1. *U. campestris* L., Feldulme. Nur im Park von Brohen.
2. *U. effusa* Willd., langgestielte Ulme. In den Waldungen an der Nafeler Lanke, ein starker Baum im Ziegelbusch bei Kießburg. Sonst wohl nur angepflanzt.

\*) Es war die zweitstärkste Eiche Westpreußens. (Die mächtigste steht in Königl. Schloßpark von Kadinen, die über 9 m Stammumfang hat.)

## 5. Familie: Cannabaceen, Hanfgewächse.

### 1. Humulus, Hopfen.

1. *H. lupulus* L., gemeiner Hopfen.  $V^3Z^4$ , z. B. im Ziegelbusch, am fahlen Bruch, Rafeler Berge, Klokow.

## 6. Familie: Urticaceen, Nesselgewächse.

### 1. Urtica, Nessel.

1. *U. urens* L., Brenn-Nessel.  $V^5Z^5$ .
2. *U. dioica* L., zweihäufige Nessel.  $V^5Z^5$ .

## 7. Familie: Loranthaceen, Riemenblumengewächse.

### 1. Viscum, Mistel.

1. *V. album* L., weiße Mistel.  $V^1Z^2$ . In den Rafeler Bergen in wenigen Exemplaren auf Kiefern; sonst im Kreise Dt. Krone nicht beobachtet.\*)

## 8. Familie: Santalaceen, Santelgewächse.

### 1. Thesium, Vermeinkraut.

1. *T. ebracteatum* Hayn., nachtblütiges Vermeinkraut.  $V^3Z^2$ , z. B. an der Chaussee zw Stranz und Neupreußendorf, am Wege von Behnick nach Alt-Prochnow, zwischen Theerosen und Grünthal.

## 9. Familie: Polygonaceen, Knöterichgewächse.

### 1. Rumex, Ampfer.

1. *R. maritimus* L., goldgelber Ampfer.  $V^3Z^3$ , z. B. auf sumpfigen Wiesen an der Döberitz nördl. der Sagemühler Fichten, am Dreehsee, am großen Bötthensee bei Kl. Rafel.
2. *R. obtusifolius* L., stumpfblättriger Ampfer.  $V^3Z^3$ , z. B. an den Wiesenfern des Pilowfließes nördl. von Stadtmühl und Schloßmühl im Klausdorfer Forst, im Koppelwerder am großen Bötthensee, am Lüptowsee.
3. *R. conglomeratus* Mur., gefnäuelter Ampfer.  $V^5Z^4$ . An vielen Stellen der Flußläufe und Seen.

\*) In den benachbarten Kreisen Dramburg und Czarnikau in größerer Anzahl auf Pappeln.

4. *R. crispus* L., krauser Ampfer.  $V^4Z^4$ .
5. *R. hydrolapathum* Huds., Fluß-Ampfer.  $V^4Z^3$ .
6. *R. aquaticus* L., Wasser-Ampfer.  $V^2Z^2$ , z. B. in der Pletznitz bei Jagdhaus, an der Pilow bei Hoppemühl, an mehreren Stellen des Döberitzersees.
7. *R. acetosa* L., Sauerampfer.  $V^5Z^4$ .
8. *R. acetosella* L., kleiner Ampfer.  $V^5Z^5$ . Große Flächen dürrer, sandigen Bodens oft dicht überziehend.

## 2. Polygonum, Knöterich.

1. *P. bistorta* L., Wiesenknöterich.  $V^3Z^4$ . Auf Wiesen der Flußläufe, z. B. am Karaschenpfuhl, am Schweinefließ beim Ziegelbusch, am Dreeßsee.
2. *P. amphibium* L., ortwechselnder Knöterich.  $V^4Z^3$ . An und in vielen Gewässern.
3. *P. tomentosum* Schr., filziger Knöterich. In Stabitz.
4. *P. nodosum* Pers., knotiger Knöterich.  $V^4Z^4$ .
5. *P. persicaria* L., gemeiner Knöterich.  $V^5Z^5$ .
6. *P. hydropiper* L., Wasserpfeffer.  $V^3Z^3$ . An Seerändern, z. B. am Sinowobruß bei Ulrichsfelde, am Mehlgastsee, am Mellen-See.
7. *P. mite* Schr., milder Knöterich.  $V^1Z^2$ . Am Düpe-See.
8. *P. minus* Huds., kleiner Knöterich.  $V^4Z^4$ .
9. *P. aviculare* L., Vogelnöterich.  $V^5Z^5$ . Eine der gemeinsten Pflanzen.
10. *P. convolvulus* L., windenartiger Knöterich.  $V^5Z^5$ .

## 10 Familie: Chenopodiaceen, Gänsefußgewächse.

### 1. Chenopodium, Gänsefuß.

1. *Ch. polyspermum* L., viel-samiger Gänsefuß. Am Buxterwitzsee.
2. *Ch. vulvaria* L., stinkender Gänsefuß. In Machlin.
3. *Ch. hybridum* L., unechter Gänsefuß.  $V^4Z^2$ . In vielen Gärten als Unkraut.
4. *Ch. album* L., gemeiner Gänsefuß.  $V^5Z^5$ .
5. *Ch. glaucum* L., meergrüner Gänsefuß.  $V^3Z^4$ , z. B. in Brunk, in Marzdorf, in Reberitz.
6. *Ch. rubrum* L., roter Gänsefuß.  $V^3Z^3$ . In einigen Ortschaften wie z. B. in Freudenfietz, in Zippnow, in Beßnick.

7. *Ch. bonus Henricus* L., guter Heinrich.  $V^3Z^3$ , z. B. in mehreren Gärten von Dt. Krone, in Kl. Nafel, in Appelwerder.

## 2. *Atriplex*, Melde.

1. *A. hortense* L., Garten-Melde. In einigen Gärten.  
*A. patulum* L., ausgebreitete Melde.  $V^4Z^5$ .  
*A. hastatum* L., spießblättrige Melde.  $V^4Z^4$ .  
*A. roseum* L., Stern-Melde. In Freudenfier, in Marzdorf.

## 11. Familie: *Amarantaceen*, Amarantgewächse.

### 1. *Albersia*, Albersie.

1. *A. Blitum* Kunth., gemeine Albersie. In mehreren Gärten von Dt. Krone.

## 12 Familie: *Thymelaeaceen*, Seidelbastgewächse.

### 1. *Daphne*, Kellershals.

1. *D. Mezereum* L., gemeiner Kellershals, Seidelbast.  $V^3Z^3$ , z. B. an den Abhängen nach dem großen Radunsee hin im Buchwald wie im Klogow; im Kronerfier in über 1 m hohen Sträuchern, Forst Schönthal.

## 13. Familie: *Euphorbiaceen*, Wolfsmilchgewächse.

### 1. *Euphorbia*, Wolfsmilch.

1. *E. cyparissias* L., Cypressen-Wolfsmilch.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Wilhelmshorst, bei Zabelsmühl, an der Bahnstrecke Dt. Krone—Breitenstein.  
2. *E. esula* L., gemeine Wolfsmilch. Bei Schönthal.  
3. *E. helioscopia* L., sonnenwendige Wolfsmilch.  $V^5Z^3$ . In Gärten und auf Äckern oft als dichtes Unkraut.  
4. *E. peplus* L., Garten-Wolfsmilch.  $V^3Z^2$ . Weit seltener als die vorige Art.

### 2. *Mercurialis*, Bingelkraut.

1. *M. perennis* L., ausdauerndes Bingelkraut.  $V^2Z^3$ , z. B. im Walde zwischen Sandkrug und Schönthal, im Klogow in der Nähe von Rehberg, im Teufelsbründ (in der Nähe des kleinen Kramste-Sees).

14. Familie: Callitrichaceen, Wassersterngewächse.

1. Callitriche, Wasserstern.

1. *C. verna* L., Frühlings-Wasserstern.  $V^4Z^4$ . In vielen Gewässern.
2. *C. stagnalis* Scop., Teich-Wasserstern.  $V^3Z^3$ , z. B. an verschiedenen Stellen der Döberitz, in den Sümpfen der Babelsberg.
3. *C. autumnalis* L., Herbst-Wasserstern. Im großen Böttninsee, im flachen Hundskopf-See.

15. Familie: Ceratophyllaceen, Igellockgewächse.

1. Ceratophyllum, Igellock.

1. *C. demersum* L., rauher Igellock.  $V^3Z^3$ , z. B. in den Gräben nördl. vom großen Radunsee, im Hertha-See, im Schmiede-See.

V. Thalamifloren, Fruchtbodenblütige.

1. Familie: Ranunculaceen, Hahnenfußgewächse.

1. Thalictrum, Wiesenraute.

1. *T. aquilegifolium* L., akeleiblättrige Wiesenraute.  $V^1Z^2$ . Am Nordabhang der Sagemühler Fichten nach dem Döberitztal zu.
2. *T. minus* L., kleine Wiesenraute.  $V^1Z^2$ . Auf den Pilowfließ-Wiesen bei der Försterei Mittelfurth.
3. *T. angustifolium* Jacq., schmalblättrige Wiesenraute.  $V^1Z^1$ . Auf einer Wiese bei Pilowbrück.
4. *T. flavum* L., gelbe Wiesenraute.  $V^2Z^2$ . An verschiedenen Stellen des Döberitztales.

2. Hepatica, Leberblümchen.

1. *H. triloba* Gil., dreilappiges Leberblümchen.  $V^3Z^4$ .

3. Pulsatilla, Ruhjschelle.

1. *P. pratensis* Mill., Wiesen-Ruhjschelle.  $V^3Z^3$ , z. B. an dem Forsthaus Mittelfurth, im Klogow am Wege von Dt. Krone nach Al. Nakel, im Kronerfief.
  2. *P. vernalis* Mill., Frühlings-Ruhjschelle.  $V^4Z^2$ . Vereinzelt in fast allen älteren Kiefernwaldungen; mit der Aussholzung scheint auch die Pflanze zu schwinden.
  3. *P. patens* Mill., ausgebreitete Ruhjschelle.  $V^3Z^3$ , z. B. im Kronerfief, im Klogow, im Schönthaler Forst.
- Bastarde zwischen *P. vernalis* und den anderen beiden Arten.

**4. Anemone, Windröschen.**

1. *A. nemorosa* L., weiße Osterblume.  $V^5Z^5$ .
2. *A. ranunculoides* L., gelbe Osterblume.  $V^2Z^3$ , z. B. im Pilowfließtale nördl. von Stadtmühl, im Ziegelbusch, im Koppelwerder.

**5. Myosurus, Mäuseschwanz.**

1. *M. minimus* L., kleinster Mäuseschwanz.  $V^4Z^4$ . Auf Saatfeldern.

**6. Ranunculus, Hahnenfuß.**

1. *R. aquatilis* L., Wasser-Hahnenfuß.  $V^4Z^4$ . In vielen Seen und Sümpfen.
2. *R. fluitans* Lam., flutender Hahnenfuß. In der Pilow unweit Freudenfier.
3. *R. flammula* L., brennender Hahnenfuß.  $V^4Z^4$ .
4. *R. Lingua* L., großer Hahnenfuß.  $V^3Z^3$ , z. B. am Dreessee, am kleinen Grampe-See, am Karaschenppfuhl (Sagemühler Fichten).
5. *R. acer* L., scharfer Hahnenfuß.  $V^4Z^5$ .
6. *R. lanuginosus* L., wolliger Hahnenfuß.  $V^4Z^2$ . In den Buchenwäldern.
7. *R. repens* L., kriechender Hahnenfuß.  $V^5Z^5$ .
8. *R. bulbosus* L., knolliger Hahnenfuß.  $V^4Z^4$ .
9. *R. arvensis* L., Acker-Hahnenfuß.  $V^1Z^2$ . Bei Quiram.
10. *R. sceleratus* L., Gift-Hahnenfuß.  $V^4Z^2$ . An vielen Seeufern.

**7. Ficaria, Scharbock.**

1. *F. ranunculoides* Roth., Feigwurz.  $V^3Z^5$ .

**8. Caltha, Dotterblume.**

1. *C. palustris* L., Sumpf-Dotterblume.  $V^5Z^5$ .

**9. Trollius, Trollblume, Goldknöpfchen.**

1. *T. europaeus* L., europäische Trollblume. Am Ufer des großen Radunsees im Buchwalde in einem Exemplare.

**10. Aquilegia, Akelei.**

1. *A. vulgaris* L., gemeine Akelei.  $V^2Z^1$ . Im Klogow in der Nähe des großen Radunsees, im Koppelwerder, bei Zabelsmühl.

**11. Actaea, Christophskraut.**

1. *A. spicata* L., ähriges Christophskraut.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, im Ziegelbusch bei Kefburg, Nakeler Berge, Koppelwerder.

**12. Delphinium, Rittersporn.**

1. *D. consolida* L., Feld-Rittersporn.  $V^3Z^4$ . Auf Roggenfeldern.

**2. Familie: Berberidaceen, Sauerdorngewächse.**

**1. Berberis, Sauerdorn, Berberitze.**

1. *B. vulgaris* L., gemeiner Sauerdorn.  $V^1Z^3$ . An den Ufern der Rateler Lanke.

**3. Familie: Nymphaeaceen, Seerosengewächse.**

**1. Nymphaea, Seerose.**

1. *N. alba* L., weiße Seerose.  $V^3Z^3$ . In vielen Seen und einigen Brüchern.

**2. Nuphar, Mummel.**

1. *N. luteum* Sm., gelbe Mummel.  $V^4Z^4$ .

**4. Familie: Papaveraceen, Mohnengewächse.**

**1. Papaver, Mohn.**

1. *P. Argemone* L., Sand-Mohn.  $V^3Z^4$ , z. B. in Getreidefeldern bei Lebehnte, Wilhelmshorst, Quiram.  
2. *P. Rhoeas* L., Klatschmohn. Im Getreide bei Elsenfelde u. an der Seepromenade nach dem Buchwald bei Dt. Krone.  
3. *P. dubium* L., Klatschrose.  $V^3Z^3$ , z. B. auf der Heide am Dycksee, am kleinen Roglinsee, bei Ruchendorf.

**2. Chelidonium, Schellkraut.**

1. *Ch. maius* L., größeres Schellkraut.  $V^5Z^5$ .

**5. Familie: Fumariaceen, Erdrachgewächse.**

**1. Corydalis, Verchensporn, Hohlwurz.**

1. *C. intermedia* P. M. E., mittlerer Verchensporn.  $V^1Z^3$ . In einem Gebüsch am Wege Dt. Krone—Stabitz kurz vor dem Kronerfier.

**2. Fumaria, Erdrach.**

1. *F. officinalis* L., gebräuchlicher Erdrach.  $V^3Z^3$ , z. B. am Schlachthaus von Dt. Krone, in Stabitz und Quiram.

## 6. Familie: Cruciferen, Kreuzblütler.

### 1. Nasturtium, Brunnenkresse.

1. *N. officinale* R. Br., gebräuchliche Brunnenkresse.  $V^3Z^4$ . In vielen Seen wie im Dreessee, großen Böhlinsee, Lüptowsee.
2. *N. amphibium* R. Br., ortswechselnde Brunnenkresse.  $V^4Z^4$ .
3. *N. silvestre* R. Br., Wald-Brunnenkresse.  $V^4Z^4$ .
4. *N. palustre* DC., Sumpf-Brunnenkresse.  $V^4Z^4$ .

### 2. Barbaraea, Winterkresse.

1. *B. vulgaris* R. Br., gemeine Winterkresse. Auf an die Bahlis grenzenden Felder, bei Reßburg.
2. *B. stricta* Andrzej., steife Winterkresse.  $V^3Z^2$ , z. B. auf den Wiesen beim Ziegelbusch, am Pilowfließ bei Pilowbrück, am flachen Hundstoppsee.

### 3. Turritis, Turmfrucht.

1. *T. glabra* L., kahles Turmfrucht.  $V^3Z^1-2$ , z. B. bei Gredenbruch, am kleinen Kameel-See, bei Zabelsmühl.

### 4. Arabis, Gänsekresse.

1. *A. arenosa* Scop., Sand-Gänsekresse.  $V^4Z^3$ , z. B. bei Züger, Pehnick, Brogen, nördl. vom großen Radunsee.

### 5. Cardamine, Schaumfrucht.

1. *C. pratensis* L., Wiesen-Schaumfrucht.  $V^5Z^5$ .
2. *C. amara* L., bitteres Schaumfrucht.  $V^4Z^4$ .

### 6. Sisymbrium, Rauke.

1. *S. officinale* Scop., gebräuchl. Rauke.  $V^5Z^5$ . In allen Ortschaften.
2. *S. Sophia* L., feinblättrige Rauke.  $V^4Z^4$ . In vielen Ortschaften.

### 7. Stenophragma, Schmalwand.

1. *St. Thalianum* Cel., Thal's Schmalwand.  $V^3Z^3$ . Auf Getreidefeldern.

### 8. Alliaria, Lauchhederich.

1. *A. officinalis* Andrzej., gemeiner Lauchhederich.  $V^2Z^3$ , z. B. im Ziegelbusch bei Reßburg, in einem Gebüsch auf der Ostseite des Brogen-Sees, zw. Arnsmühl und Regelsmühl.

### 9. Erysimum, Schotendotter.

1. *E. cheiranthoides* L., sackartiger Schotendotter.  $V^3Z^3$ , z. B. in der Kiesgrube am Wasserwerk von Dt. Krone, in Harmelsdorf, bei Ziegelbusch.

**10. Brassica, Kohl.**

1. *B. oleracea* L., Gartenkohl. Bei Daber verwildert.
2. *B. Rapa* L., Rübenkohl. In mehreren Ortschaften verwildert oder durch Kanarienvogelfutter gesät.

**11. Sinapis, Senf.**

1. *S. arvensis* L., Ackersenf. V<sup>3</sup>Z<sup>4</sup>, z. B. auf Äckern nördl. der Stadt Dt. Krone, auf Feldern zw. Stranz und Harmelsdorf, bei Schloppe.
2. *S. alba* L., weißer Senf. Am Schlachthaus von Dt. Krone.

**12. Alyssum, Schildkraut.**

1. *A. calycinum* L., Kelch-Schildkraut. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. an der Chaussee zwischen Neugolz und Haugsdorf, bei Machlin, bei Tütz.

**13. Berteroa, Berteroe.**

1. *B. incana* DC., graue Berteroe. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. an der Chaussee zw. Schloppe und Königsthal, am Gladensee, bei Stadt- und Schloßmühl.

**14. Erophila, Hungerblümchen.**

1. *E. verna* E. Mey., Frühlings-Hungerblümchen. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>. Dürre Heiden dicht überziehend.

**15. Camelina, Leindotter.**

1. *C. sativa* Ortz., Saat-Leindotter. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Bei Klausdorf, zwischen Stranz und Harmelsdorf.
2. *C. dentata* Pers., gezähnter Leindotter. V<sup>1</sup>Z<sup>2</sup>. Bei Reberitz.

**16. Thlaspi, Pfennigkraut.**

1. *T. arvense* L., Feld-Pfennigkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

**17. Lepidium, Kresse.**

1. *L. ruderales* L., Schutt-Kresse. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.

**18. Teesdalea, Teesdalee.**

1. *T. nudicaulis* R. Br., nacktstengelige Teesdalee. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>. Auf Sandboden durch das ganze Gebiet verbreitet.

**19. Capsella, Täschel.**

1. *C. bursa pastoris* Moench., Hirtentäschel. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>.

**20. Neslea, Nestlee.**

1. *N. paniculata* Des., rispige Nestlee. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Zwischen Klausdorf und Neugolz unter Lupinen, bei Reberitz auf einem Kartoffelfeld, auf Äckern nördl. vom großen Radunsee.

**21. Raphanistrum, Fiederich.**

1. *R. Lampsana* Gaertn., gemeiner Fiederich. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

## 7. Familie: Cistaceen, Cistrofengewächse.

### 1. *Helianthemum*, Sonnenröschen.

1. *H. Chamaecistus* Mill., gemeines Sonnenröschen.  $V^1Z^2$ . An der Chaussee zwischen Züger und Schloppe und zwischen Schloppe und Tüß.

## 8. Familie: Violaceen, Veilchengewächse.

### 1. *Viola*, Veilchen.

1. *V. palustris* L., Sumpfveilchen.  $V^4Z^3$ . Auf vielen sumpfigen Wiesen.
2. *V. arenaria* DC., Sandveilchen. In den Nafeler Bergen.
3. *V. silvatica* Fr., Waldveilchen.  $V^3Z^3$ , z. B. Seemühle bei Zastrow, Koppelwerder, Ziegelbusch.
4. *V. Riviniana* Rehb., Rivin's=Veilchen.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klockow, im Buchwald bei Dt. Krone, bei Alt-Prochnow.
5. *V. canina* L., Hundveilchen.  $V^4Z^4$ .
6. *V. tricolor* L., Stiefmütterchen.  $V^5Z^5$ . Bastarde.

## 9. Familie: Droseraceen, Sonnentaugewächse.

### 1. *Drosera*, Sonnentau.

1. *D. rotundifolia* L., rundblättriger Sonnentau.  $V^3Z^4$ . In vielen Sümpfen und Mooren.
2. *D. anglica* Huds., englischer Sonnentau.  $V^3Z^3$ , z. B. im blanken Wasser (Sagemühler Fichten), in einem Moor bei Machlin, in einem Sumpf am Grampe-See.
3. *D. intermedia* Hayne, mittlerer Sonnentau.  $V^3Z^2$ , z. B. im blanken Wasser (Sagemühler Fichten), in einem Sumpf am Koppelwerder, in einem Moor am Wege von Harmelsdorf nach Preußendorf.

## 10. Familie: Polygalaceen, Kreuzblumengewächse.

### 1. *Polygala*, Kreuzblume.

1. *P. vulgaris* L., gemeine Kreuzblume.  $V^4Z^4$ .
2. *P. comosa* Schkuhr., schopfige Kreuzblume. An flachen Hundskopffee.

## 11. Familie: Silenaceen, Taubentropfgewächse.

### 1. Gypsophila, Gipskraut.

1. *G. fastigiata* L., ebensträufiges Gipskraut.  $V^4Z^2$ , z. B. im Klogow, bei Ruchendorf, bei Mehlgast.
2. *G. muralis* L., Mauer-Gipskraut. Am Vinowobrucl.

### 2. Tunica, Felsnelke.

1. *T. prolifera* Scop., sprossende Felsnelke.  $V^3Z^3$ , z. B. auf der Anhöhe östlich vom Klogow am großen Radunsee, zwischen Schönthal und der Försterei Sandkrug, bei Zabelsmühl.

### 3. Dianthus, Nelke.

1. *D. Carthusianorum* L., Karthäuser Nelke.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Chaussee zwischen Stranz und Neupreuzendorf, bei Essensfelde, am großen Koglinsee.
2. *D. deltoides* L., Heide-Nelke.  $V^4Z^4$ .
3. *D. arenarius* L., Sand-Nelke.  $V^3Z^3$ , z. B. an vielen Stellen des Klogows, Waldungen bei Schloppe, bei Ruchendorf und Dyck.
4. *D. superbus* L., Prachtnelke.  $V^1Z^1$ . Im Klogow (Sagen 2).

### 4. Saponaria, Seifenkraut.

1. *S. officinalis* L., echtes Seifenkraut.  $V^2Z^2$ . Am Schloßsee (Pfarrgarten), am Vinowobrucl, in Schloß-Niedermühl.

### 5. Silene, Leimkraut.

1. *S. Otites* Sm., Ohrlöffel-Leimkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. in den Salzbergen des Klogows, im Kieferwalde an der Chaussee zwischen Schloppe und Tütz, im Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl.
2. *S. vulgaris* Grecke., Taubentropf.  $V^4Z^4$ .
3. *S. nutans* L., nickendes Leimkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klogow in der Nähe der Brücke, Sagemühler Fichten, bei Theerofen.
4. *S. noctiflora* L., Nacht-Leimkraut. Bei Roschütz, bei Zabelsmühl.

### 6. Viscaria, Bechnelke.

1. *V. vulgaris* Roehl., gemeine Bechnelke.  $V^4Z^3$ .

### 7. Coronaria, Kranzrade, Ruckucksbiume.

1. *C. flos cuculi* A. Br., Ruckucksbiume.  $V^5Z^4$ .

### 8. Melandryum, Lichtnelke.

1. *M. album* Grek., weiße Lichtnelke.  $V^4Z^4$ .

2. *M. rubrum* Grck., rote Lichtnelke.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Wiesen am Schweinesfließ am Ziegelbusch, am Eisenbahndamm nördl. von Dt. Krone, Seemühle bei Jastrow.

### 9. *Agrostemma*, Rade.

1. *A. Githago* L., Kornrade. Im Getreide.  $V^4Z^4$ .

## 12. Familie: *Alsineaceen*, Alsineengewächse.

### 1. *Sagina*, Knebel.

1. *S. procumbens* L., liegender Knebel.  $V^4Z^4$ .  
2. *S. nodosa* Fenzl., knotiger Knebel.  $V^4Z^4$ . An Seeufern.

### 2. *Spergula*, Sperf.

1. *S. arvensis* L., Feld-Sperf.  $V^4Z^4$ .  
2. *S. Morisonii* Bor., Morison's Sperf. Im Linicher Forst westl. von Machlin.

### 3. *Spergularia*, Schuppenmiere.

1. *S. rubra* Presl., rote Schuppenmiere.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Hoffstädt, bei Zippnow, bei Appelverder.

### 4. *Alsine*, Weirich.

1. *A. viscosa* Schreb., flebriger Weirich.  $V^2Z^3$ , z. B. bei Fiermühl, bei Niederitz, zwischen Marzdorf und Lubsdorf.

### 5. *Moehringia*, Möhringie.

1. *M. trinervis* Clari., dreinervige Möhringie.  $V^4Z^4$ .

### 6. *Arenaria*, Sandfraut.

1. *Arenaria serpyllifolia* L., quendelblättriges Sandfraut.  $V^5Z^4$ .

### 7. *Holosteum*, Spurre.

1. *H. umbellatum* L., doldenblütige Spurre.  $V^3Z^3$ , z. B. an dem Wege von Mariensee nach Wittkow, in der Bahlitz, auf Äckern in der Nähe des Schlachthofs von Dt. Krone.

### 8. *Stellaria*, Miere.

1. *St. nemorum* L., Hain-Miere.  $V^3Z^3$ , z. B. im Ziegelbusch, im Klausdorfer Forst am Pilowfließ, im Koppelverder.  
2. *St. media* Cyr., Vogelmiere.  $V^5Z^5$ .  
3. *St. Holostea* L., großblumige Miere.  $V^5Z^5$ .  
4. *St. glauca* With., meergrüne Miere.  $V^3Z^3$ , z. B. auf Wiesen am großen Böhlinsee, am Pinnowsee, Döberigwiesen.

5. *St. graminea* L., Graßmiere.  $V^4Z^4$ .
6. *St. uliginosa* Murr., Sumpf-Miere.  $V^3Z^3$ , z. B. im Linowobru-  
ch, an den Ufern des großen Radunsees und des Lüptowsees.

### 9. *Malachium*, Wasserdarm.

1. *M. aquaticum* Fr., gemeiner Wasserdarm.  $V^4Z^4$ .

### 10. *Cerastium*, Hornkraut.

1. *C. semidecandrum* L., fünfmänniges Hornkraut.  $V^3Z^5$ , z. B.  
westlich von Birkenfelde die dünnen Felder dicht überziehend.
2. *C. triviale* Link., gemeines Hornkraut.  $V^5Z^4$ .
3. *C. arvense* L., Acker-Hornkraut.  $V^5Z^3$ .

## 13. Familie: *Malvaceen*, Malbengewächse.

### 1. *Malva*, Käsepappel, Malve.

1. *M. alcea* L., spitzblättrige Käsepappel.  $V^3Z^2$ , z. B. an der Ost-  
seite des Brogensees, bei Appelwerder, am Ziegelbusch.
2. *M. silvestris* L., Roßpappel  $V^3Z^3$ , z. B. in Stabitz, Freuden-  
zier, Kl. Natel.
3. *M. neglecta* Wall., übersehene Käsepappel.  $V^5Z^4$ . In fast  
allen Ortschaften.
4. *M. rotundifolia* L., rundblättrige Käsepappel.  $V^4Z^3$ .

## 14. Familie: *Tiliaceen*, Bindengewächse.

### 1. *Tilia*, Linde.

1. *T. platyphyllos* Scop., Sommerlinde. Im Koppelwerder wahr-  
scheinlich gepflanzt.
2. *T. ulmifolia* Scop., Winterlinde.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Niederhof  
eine solche von 4 m Stammumfang, in den Waldungen an der  
Nateler Banke solche von 2—3 m Umfang, Sagemühler Fichten.

## 15. Familie: *Elatinaceen*, Tännelgewächse.

### 1. *Elatine*, Tännel.

1. *E. Hydropiper* L., pfefferfrüchtiger Tännel. Am Schulzsee bei  
Nachlin, im Linowobru.

## 16. Familie: Hypericaceen, Hartheugewächse.

### 1. *Hypericum*, Johanniskraut.

1. *H. perforatum* L., durchlöchertes Johanniskraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *H. quadrangulum* L., vierkantiges Johanniskraut. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. Eisenbahnstrecke nördl. von Dt. Krone, am See von Zabelsmühl, am Karauschenpfuhl (Sagemühler Fichten).
3. *H. tetrapterum* Fr., vierflügliges Johanniskraut. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Koppelwerder, auf den Döberitzwiesen nördl. der Sagemühler Fichten, Wiesen nördl. vom großen Radunsee.
4. *H. humifusum* L., niederliegendes Johanniskraut. Bei Alt-Bebehnte.
5. *H. montanum* L., Berg-Johanniskraut. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Im Koppelwerder, Seemühle, Grünthal.

## 17. Familie: Aceraceen, Ahorngevächse.

1. *A. pseudoplatanus* L., Berg-Ahorn. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Am Pilowfließufer in größerer Anzahl nördl. von Stadtmühl, an der Döberitz im Klausdorfer Forst ein Exemplar, jedenfalls nicht angepflanzt.
2. *A. platanoides* L., Spitz-Ahorn. Ufer der Rateler Lanke.

## 18. Familie: Linaceen, Leingewächse.

### 1. *Linum*, Lein.

1. *L. catharticum* L., Bürgier-Lein. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.

### 2. *Radiola*, Zwerglein.

1. *R. linoides* Gmel., tausendkörniger Zwerglein. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. Linowobrucl, Torfbruch bei Mittelfurth, Teufelsbruch.

## 19. Familie: Geraniaceen, Storchschnabelgewächse.

### 1. *Geranium*, Storchschnabel.

1. *G. pratense* L., Wiesen-Storchschnabel. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. Auf einer Wiese am großen Teich bei Schloppe, Wiesen an der Plietnitz bei Jagdhaus.
2. *G. palustre* L., Sumpf-Storchschnabel. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. bei Keszburg in einer Schlucht am Schweinesfließ, im Teufelsbruch, am Grampe-See.

3. *G. silvaticum* L., Wald-Storchschnabel. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. Im Koppelwerder, an der Stibber Lanke, am Dreech-See.
4. *G. sanguineum* L., blutroter Storchschnabel. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Buchwalde bei Dt. Krone, bei Neu-Preußendorf, bei Dyck, zwischen Schloppe und Lütz, Schönthal.
5. *G. pusillum* L., niedriger Storchschnabel. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>. In Gärten und an Wegen in Dörfern.
6. *G. molle* L., weicher Storchschnabel. Bei Schneidemühler Hammer.
7. *G. Robertianum* L., Ruprechtskraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>. An vielen feuchten Waldstellen.

## 2. *Erodium*, Reiher Schnabel.

1. *E. cicutarium* L'Héritier, schierlingsblättriger Reiher Schnabel. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

## 20. Familie: Oxalidaceen, Sauerfleegegewächse.

1. *O. acetosella* L., gemeiner Sauerflee. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *O. stricta* L., steifer Sauerflee. In Gärten Dt. Krone's als Unkraut, bei Moritzberg.

## 21. Familie: Balsaminaceen, Balsaminengewächse.

### 1. *Impatiens*, Springkraut.

1. *I. noli tangere* L., gemeines Springkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>, z. B. im Ziegelbusch bei Reßburg, im Walde am Lützsee und am Dreechsee.

## VI. Calycifloren, Kelchblütige.

### 1. Familie: Celastraceen, Celaftergewächse.

#### 1. *Evonymus*, Pfaffenhütchen, Spindelbaum.

1. *E. europaea* L., europäischer Spindelbaum. V<sup>4</sup>Z<sup>2</sup>.

### 2. Familie: Rhamnaceen, Kreuzdorngewächse.

#### 1. *Rhamnus*, Kreuzdorn.

1. *Rh. cathartica* L., gemeiner Kreuzdorn. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. im Klogow, Sägemühler Fichten, am Mehlgastsee.

#### 2. *Frangula*, Faulbaum.

1. *F. Alnus* Mill., Faulbaum, Pulverholz. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.

### 3. Familie: Papilionaceen, Schmetterlingsblütler.

#### 1. Genista, Ginster.

1. *G. tinctoria* L., Färber-Ginster.  $V^3Z^4$ , z. B. Hohe Birken im Klogow, Theerosen, Schönthal, Grünthal.

#### 2. Sarothamnus, Besenginster, Pfriemen.

1. *S. scoparius* Wim., gemeiner Besenginster.  $V^3Z^4$ , z. B. Chaussee zw. Pegnick und Mierosen, auf dem Mühlenberge bei Brogen, Stadtmühl, Elsenfelde.

#### 3. Cytisus L., Geißflee.

1. *C. nigricans* L., schwarz werdender Geißflee. Bei Schönthal.

#### 4. Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.

1. *L. polyphyllus* Lindl., vielblütige Lupine. An der Bahnstrecke Dt. Krone—Alte Eiche, im Klogow Sagen 48.

#### 5. Ononis, Hauhechel.

1. *O. arvensis* L., Feld-Hauhechel.  $V^2Z^3$ , z. B. am Wege von Haugsdorf nach Poln. Fuhlbeck, bei Moritzberg.
2. *O. repens* L., kriechende Hauhechel.  $V^2Z^3$ . Zwischen Machlin und Gr. Vinichen.

#### 6. Medicago, Schneckenflee.

1. *M. falcata* L., Sichelklee, schwedische Luzerne.  $V^4Z^4$ .
2. *M. sativa* L., Luzerne. Verwildert.  $V^3Z^3$ , z. B. Eisenbahndamm nördl. von Dt. Krone, in Stabitz, bei Schloßmühl.
3. *M. falcata* + *sativa*, Sandluzerne. Auf der Heide am Stranzer Bahnhof, an der Chaussee zw. Schloppe und Königs-  
thal, am Bahnhof Tüg.
4. *M. lupulina* L., Hopfenklee.  $V^5Z^5$ .

#### 7. Melilotus, Steinklee.

1. *M. altissimus* Thuil., hoher Steinklee. Bei Steinbusch.
2. *M. officinalis* Desr., gebräuchlicher Steinklee.  $V^3Z^3$ , z. B. an mehreren Stellen der Chaussee von Dt. Krone—Lebehnke, bei Harmelsdorf, Schloßmühl.
3. *M. albus* Desr., weißer Steinklee.  $V^3Z^3$ , z. B. Sägemühler Fichten, an der Chaussee zw. Schloppe und Bützer, bei Ruchendorf.

### 8. Trifolium, Klee.

1. *T. pratense* L., Wiesen- oder Rot-Klee.  $V^4Z^3$ .
2. *T. alpestre* L., Waldflee.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klogow in der Nähe der Salzberge, in den Sagemühler Fichten am Waldrande nach dem Karauschenpfuhl hin, Schlopper Forst.
3. *T. incarnatum* L., Infarnatklee. Am Waldesrand zw. Schloppe und Tütz.
4. *T. arvense* L., Acker-, Hasen-, Ragen-, Mäuschenklee.  $V^4Z^5$ .
5. *T. medium* L., mittlerer Klee.  $V^4Z^4$ .
6. *T. repens* L., Weißklee.  $V^4Z^4$ . An Chauffeen und Wegen.
7. *T. hybridum* L., Bastardklee.  $V^4Z^3$ . An Wegerändern.
8. *T. aureum* Poll., Goldklee.  $V^3Z^3$ , z. B. in der Bablig, Waldränder in den Sagemühler Fichten, Koppelwerder.
9. *T. procumbens* L., liegender Klee.  $V^4Z^3$ .

### 9. Anthyllis, Bunkelklee.

1. *A. vulneraria* L., gemeiner Bunkelklee.  $V^4Z^3$ , z. B. an der Chauffee zw. Dyck und Ruchendorf, zw. Neu-Preußendorf und Harmelsdorf, bei Grünthal.

### 10. Lotus, Hornklee.

1. *L. corniculatus* L., gemeiner Hornklee.  $V^5Z^5$ .
2. *L. uliginosus* Schkuhr., Sumpf-Hornklee.  $V^3Z^4$ , z. B. am Zabelsmühler See, auf den Wiesen am großen Radunsee, zwischen Tütz und dem Tüzer Bahnhof.

### 11. Astragalus, Bärenschote.

1. *A. Cicer* L., fischerartige Bärenschote. Bei Zabelsmühl.
2. *A. glycyphyllos* L., süße Bärenschote.  $V^3Z^3$ , z. B. an mehreren Stellen im Buchwald und Klogow, am Dreehsee, im Ziegelbusch bei Reßburg.
3. *A. arenarius* L., Sand-Bärenschote.  $V^4Z^4$ .

### 12. Coronilla, Kronwicke.

1. *C. varia* L., bunte Kronwicke.  $V^4Z^3$ . An Wegrändern.

### 13. Ornithopus, Klauenchote.

1. *O. perpusillus* L., kleine Klauenchote. Bei Alt-Lebehnte.

### 14. Onobrychis, Esparsette.

1. *O. viciaefolia* Scop., gemeine Esparsette. Sagemühler Fichten.

### 15. *Vicia*, *Wicke*.

1. *V. cracca* L., Vogelwicke.  $V^5Z^4$ .
2. *V. villosa* Roth., zottige Wicke, Bärenwicke.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Züger, Johannisthal, in der Bahlitz.
3. *V. sepium* L., Zaunwicke.  $V^4Z^3$ .
4. *V. angustifolia* Reich., schmalblättr. Wicke.  $V^3Z^2$ , z. B. an der Eisenbahnstrecke Dt. Krone-Ost — Dt. Krone-West, bei Brogen, bei Schloppe.
5. *V. lathyroides* L., platterbsenartige Wicke. An der Döberitz östlich von Sagemühl.

### 16. *Ervum*, *Erbe*.

1. *E. silvaticum* Pet., Wald-Erbe.  $V^2Z^2$ . Bei Marienbrück, im Ziegelbusch bei Reßburg.
2. *E. cassubicum* Pet., kassubische Erbe.  $V^3Z^2$ , z. B. im Koppelwerder, Nakeler Berge, an der Nakeler Lanke.
3. *E. hirsutum* L., Zitterlinse. An der Chaussee zw. Klausdorf und Neugolz, bei Märkisch-Friedland.
4. *E. tetraspermum* L., vierfamige Erbe.  $V^4Z^4$ .

### 17. *Lathyrus*, *Platterbse*.

1. *L. pratensis* L., Wiesenplatterbse.  $V^4Z^4$ .
2. *L. vernus* Bernh., Frühlings-Platterbse.  $V^3Z^3$ , z. B. Klausdorfer Forst im Pilowfließ-Tal, Ziegelbusch bei Reßburg, Sagemühler Fichten am Abhang nach der Döberitz hin.
3. *L. niger* Bernh., schwarze Platterbse. Bei Eichfier.
4. *L. montanus* Bernh., Berg-Platterbse.  $V^3Z^3$ , z. B. im Buchwald und Kloxow bei Dt. Krone, Nakeler Berge, Koppelwerder.

## 4. Familie: *Drupaceen*, *Steinobstgewächse*.

### 1. *Prunus*, *Kirsche*.

1. *P. Padus* L., Ahlkirsche, Traubenkirsche.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Nakeler und Stibber Lanke, Sagemühler Fichten, Klattenwerder.
2. *P. spinosa* L., Schlehe.  $V^3Z^3$ , z. B. am Trebeske-See, Kloxow, Sagemühler Fichten.

## 5. Familie: *Rosaceen*, *Rosengewächse*.

### 1. *Rosa*, *Rose*.

1. *R. tomentosa* Sm., filzige Rose.  $V^3Z^3$ , z. B. im Kloxow, Sagemühler Fichten, Koppelwerder.

2. *R. canina* L., Hundrose.  $V^3Z^3$ , z. B. an vielen Stellen des Klotzows, Sägemühler Fichten, Kronerfien.
3. *R. glauca* Vill., meergrüne Rose.  $V^2Z^3$ , z. B. an dem Feldwege vom Bahnhof Dt. Krone-Ost nach dem Gut Wittkow, Westufer des Lebehnte-Sees, bei Reßburg.
4. *R. dumetorum* Thuill., Heckenrose. Bei Schneidemühler Hammer.
5. *R. corifolia* Fr., lederblättrige Rose. Im Klotzow, Rafeler Berge.
6. *R. rubiginosa* L., Weinrose. Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl.

## 2. *Rubus*, Brombeere.

1. *R. plicatus* W. et N., faltenblättrige Brombeere.  $V^4Z^4$ .
2. *R. Bellardii* W. et N., Bellardi's Brombeere.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Rafeler Lanke, im Koppelwerder.
3. *R. Wahlbergii* Arrh., Wahlbergs Brombeere. Im Klotzow.
4. *R. caesius* L., Kragbeere.  $V^4Z^4$ .
5. *R. idaeus* L., Himbeere.  $V^4Z^5$ .
6. *R. saxatilis* L., Steinbeere.  $V^3Z^3$ , z. B. im Buchwald bei Dt. Krone an der Seepromenade, im Koppelwerder, zw. Grünthal und Jastrow.
7. *R. suberectus* And., fast aufrechte Brombeere. An der Rafeler Lanke.

## 3. *Geum*, Nesselwurz.

1. *G. urbanum* L., gemeine Nesselwurz.  $V^4Z^4$ .
2. *G. rivale* L., Bachnesselwurz.  $V^4Z^5$ .
3. *G. intermedium* Ehr., mittlere Nesselwurz.  $V^1Z^2$ . Im Ziegelbusch bei Reßburg.

## 4. *Fragaria*, Erdbeere.

1. *F. vesca* L., gemeine Erdbeere.  $V^5Z^5$ .
2. *F. elatior* Ehr., hohe Erdbeere.  $V^2Z^3$ . An der Chaussee zwischen Machlin und Broken, im Koppelwerder.
3. *F. viridis* Duch., Knackelbeere. Bei Schönthal.

## 5. *Comarum*, Blutauge.

1. *C. palustre* L., Sumpf-Blutauge.  $V^4Z^4$ .

## 6. *Potentilla*, Gänserich, Fingerkraut.

1. *P. norvegica* L., norwegischer Gänserich. Am Ufer des Mehlgast-Sees.

2. P.  
3. P.  
M  
4. P.  
Se  
5. P.  
6. P.  
7. P.  
na  
8. P.  
M  
9. P.  
10. F  
T  
1. A.  
2. A.  
Le  
1. S.  
E  
2. S.  
D  
1. A  
1. F  
B  
2. F  
de  
C

1. C  
in

2. *P. argentea* L., silberweißer Gänserich.  $V^4Z^4$ .
3. *P. collina* Wib., Hügel-Gänserich. Im Klozow bei der Försterei Mittelfurth.
4. *P. procumbens* Sib., gestreckter Gänserich.  $V^2Z^3$ . Am Plautsch-See bei Neumühl, am Schwanensee, bei Seemühl.
5. *P. silvestris* Neck., Blutwurz-Gänserich.  $V^5Z^5$ .
6. *P. verna* Roth., Frühlings-Gänserich. In Marthe.
7. *P. arenaria* Bork., Sand-Gänserich.  $V^3Z^3$ , z. B. am Wege v. Machlin nach Hundskopf, zwischen Arnsholde und Niefosken, bei Schloppe.
8. *P. opaca* Roth., glanzloser Gänserich.  $V^3Z^3$ , z. B. an sonnigen Abhängen im Kronerfier, in den Nateler Bergen, im Klozow.
9. *P. anserina* L., gemeiner Gänserich.  $V^5Z^5$ .
10. *P. alba* L., weißer Gänserich.  $V^3Z^3$ , z. B. im Kronerfier, bei Theerofen, Wald am kleinen Kameel-See.

#### 7. *Alchemilla*, Sinau.

1. *A. vulgaris* L., Frauenmantel.  $V^5Z^5$ .
2. *A. arvensis* Scop., Feld-Sinau.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Vorkendorf, Lebehufe, Klausdorfer Hammer.

#### 8. *Sanguisorba*, Wiesenknopf, Bluttröpflein.

1. *S. officinalis* L., gemeiner Wiesenknopf. Am Gas- und Elektrizitätswerk von Dt. Krone.
2. *S. minor* Scop., kleiner Wiesenknopf. An der Bahnstrecke zwischen Dt. Krone-Ost und Dt. Krone-West.

#### 9. *Agrimonia*, Odermennig.

1. *A. Eupatoria* L., gemeiner Odermennig.  $V^4Z^3$ .

#### 10. *Filipendula*, Mädesüß.

1. *F. Ulmaria* Max., echtes Mädesüß.  $V^3Z^4$ . Auf manchen feuchten Wiesen.
2. *F. hexapetala* Gil., knolliges Mädesüß.  $V^3Z^3$ . Bei Züger, an der Chausseestrecke Schönthal — Grünthal — Zastrow, an der Chausseestrecke Neupreuzendorf — Ruchendorf — Schloppe.

#### 6. Familie: Pomaceen, Kernobstgewächse.

##### 1. *Crataegus*, Weißdorn, Mehlbeerbaum.

1. *C. oxyacantha* L., gemeiner Weißdorn.  $V^3Z^3$ , z. B. baumartig im Klozow, im Ziegelbusch bei Reßburg, Sagemühler Fichten.

2. *C. monogyna* Jacq., eingrifflicher Weißdorn.  $V^3Z^3$ , z. B. auf dem Schloßberg bei Stranz, am Ufer des Mehlgast-Sees, bei Steinbusch.

### 2. *Pirus*, Birnbaum, Kruschke.

1. *P. communis* L., Birnbaum.  $V^3Z^2$ , z. B. Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, Südufer des Schloßsees, an der Rafeler Lanke.

### 3. *Malus*, Apfelbaum.

1. *M. silvestris* Mill., Apfelbaum, Holzapfel.  $V^3Z^2$ , z. B. Sagemühler Fichten, Rafeler Berge (ein starker Baum mit bis zum Boden hängenden Zweigen), in den Salzbergen (Kloßow).

### 4. *Sorbus*, Eberesche, Quitsche.

1. *S. aucuparia* L., Vogel- oder Quitschebeere.  $V^3Z^2$ , z. B. Rafeler Berge, Klausdorfer Forst, Linicher Forst.  
2. *S. torminalis* Crntz., Elsbeere, Ruhrbirne.  $V^2Z^2$ . Im Buchwald bei Dt. Krone, südlich von Stadtmühl, im Koppelwerder an einem Abhang nach dem großen Böhlinsee.

## 7. Familie: *Onagraceen*, Nachtkerzengewächse.

### 1. *Epilobium*, Weidenröschen.

1. *E. angustifolium* L., schmalblättriges Weidenröschen.  $V^4Z^4$ .  
2. *E. hirsutum* L., rauhaariges Weidenröschen.  $V^3Z^3$ , z. B. am flachen Hundskopffee, Döberitzufer (Sagemühler Fichten), Roglin-See.  
3. *E. parviflorum* Schreb., kleinblütiges Weidenröschen.  $V^4Z^4$ .  
4. *E. montanum* L., Berg-Weidenröschen.  $V^3Z^3$ , z. B. Rafeler Berge, Buchwald bei Dt. Krone, Wald bei Tüß.  
5. *E. roseum* Schreb., rosenrotes Weidenröschen. Auf dem Mattenwerder, auf den Rieselwiesen bei Stadtmühl.  
6. *E. palustre* L., Sumpf-Weidenröschen.  $V^4Z^3$ . An Seen und auf feuchten Wiesen.

Vastarde.

### 2. *Oenothera*, Nachtkerze.

1. *O. biennis* L., gemeine Nachtkerze.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Schloppe, Eisenfelde, Sagemühl.

### 3. *Circaea*, Herenfraut.

1. *C. lutetiana* L., gemeines Herenfraut.  $V^3Z^3$ , z. B. Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, bei Wallbruch, am Dreehsee.

2. *C. alpina* L., Alpen-Herentrant.  $V^3Z^3$ , z. B. am Trebeske-See, im Teufelsbründ (nordwestl. von Freudenfier), am Lebehnte-See.

## 8. Familie: Halorrhagidaceen, Meerbeerengewächse.

### 1. *Myriophyllum*, Tausendblatt.

1. *M. spicatum* L., ährenblütiges Tausendblatt.  $V^4Z^4$ . In den meisten Seen.
2. *M. verticillatum* L., quirlblütiges Tausendblatt. Im flachen Hundskopfssee.
3. *M. alterniflorum* DC., wechselblütiges Tausendblatt. Im flachen Hundskopfssee.

## 9. Familie: Lythraceen, Weiderichgewächse.

### 1. *Lythrum*, Weiderich.

1. *L. Salicaria* L., gemeiner Weiderich.  $V^4Z^3$ .

### 2. *Peplis*, Bachbunzel.

1. *P. Portula* L., gemeine Bachbunzel. Am Dreessee.

## 10. Familie: Paronychiaceen, Paronychiengewächse.

### 1. *Herniaria*, Tausendforn.

1. *H. glabra* L., kahles Tausendforn.  $V^4Z^3$ . Auf vielen Wegen.

## 11. Familie: Scleranthaceen, Ranaelgewächse.

### 1. *Scleranthus*, Ranael.

1. *S. annuus* L., einjähriger Ranael.  $V^5Z^5$ .
2. *S. perennis* L., ausdauernder Ranael.  $V^4Z^4$ .

## 12. Familie: Crassulaceen, Dickblattgewächse.

### 1. *Sedum*, Fetthenne, Dickblatt.

1. *S. maximum* Sut., große Fetthenne.  $V^3Z^3$ , z. B. auf dem Schloßberg bei Stranz, bei Klausdorfer Hammer, in dem Kiefernwald westl. vom Dreessee.
2. *S. acre* L., Mauerpfeffer.  $V^5Z^5$ .

3. *S. boloniense* Lois., Boulogner Fetzhenne.  $V^3Z^3$ , z. B. am Dycksee bei Stranz, Klausdorfer Forst nördl. von Klausdorfer Hammer, an der Chaussee zwischen Neugolz und Haugsdorf an mehreren Stellen.
4. *S. reflexum* L., zurückgekrümmte Fetzhenne. Zwischen Appelwerder und Dreeh.

#### 1. *Sempervivum*, Hauslauch.

1. *S. soboliferum* Sims., sprossender Hauslauch.  $V^1Z^2$ . Im Kiefernwald bei Schloppe.

### 13. Familie: *Grossulariaceen*, Stachelbeergewächse.

#### 1. *Ribes*, Stachelbeere, Johannisbeere.

1. *R. Grossularia* L., Stachelbeere. Entschieden wild: In den Rafeler Bergen, an der Rafeler Lanke, im Ziegelbusch.
2. *R. alpinum* L., Alpen-Johannisbeere.  $V^3Z^3$ , z. B. im Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, im Kronerfier, Sagemühler Fichten (Böschung am Döberigtal).
3. *R. nigrum* L., schwarze Johannisbeere.  $V^3Z^2$ , z. B. am Schwanensee, im Ziegelbusch bei Reßburg, Klausdorfer Forst (an den Kieselwiesen).
4. *R. rubrum* L., rote Johannisbeere.  $V^3Z^3$ , z. B. Rafeler Berge, am Nordabhange der Sagemühler Fichten nach dem Döberigtal, an der Ostseite des großen Broßen-Sees.

### 14 Familie: *Saxifragaceen*, Steinbrechgewächse.

#### 1. *Saxifraga*, Steinbrech.

1. *S. Hirculus* L., Moor-Steinbrech.  $V^2Z^3$ . Auf den Döberigtwiesen nördl. der Sagemühler Fichten, auf Wiesen am Süptow-See.
2. *S. tridactylitis* L., dreifingeriger Steinbrech.  $V^2Z^3$ . Am Nordufer des Schloßsees, am Lebehnte-See.
3. *S. granulata* L., Körner-Steinbrech.  $V^3Z^2$ , z. B. am kleinen Kameel-See, bei Seemühle, zwischen Arnstfelde und Rosenfelde.

#### 2. *Chrysosplenium*, Goldmilz, Milzkraut.

1. *Ch. alternifolium* L., wechselblättriges Milzkraut.  $V^4Z^5$ .

#### 3. *Parnassia*, Herzblatt, Studentenröschen.

1. *P. palustris* L., Sumpf-Herzblatt.  $V^4Z^4$ .

## 15. Familie: Umbelliferen, Doldengewächse.

### 1. *Hydrocotyle*, Wassernabel.

1. *H. vulgaris* L., Wassernabel.  $V^3Z^4$ , z. B. am Linowobruich, am Gladen-See, am Dreessee, am Stabitzer Fließ, am blanken Wasser, im Döberitztal bei Haugsdorf, am großen Radunsee.

### 2. *Sanicula*, Sanikel.

1. *S. europaea* L., europäische Sanikel.  $V^2Z^2$ . Rafeler Berge, am flachen Hundsfopf-See.

### 3. *Cicuta*, Wasserschiefeling.

1. *C. virosa* L., giftiger Wasserschiefeling.  $V^4Z^3$ , z. B. an der Döberitz zwischen Haugsdorf und Schönhölzig, an vielen Stellen am großen Radunsee, in Sümpfen an der Chaussee von Dt. Krone nach Arnshofe.

### 4. *Falcaria*, Sichelwöhre.

1. *F. vulgaris* Bernh., gemeine Sichelwöhre.  $V^2Z^2$ . An der Bahnstrecke zwischen den Stationen Dt. Krone-Ost und Dt. Krone-West, am Schlachthaus von Dt. Krone.

### 5. *Aegopodium*, Giersch.

1. *A. podagraria* L., gemeiner Giersch.  $V^5Z^5$ .

### 6. *Carum*, Kümmei.

1. *C. carvi* L., gemeiner Kümmei.  $V^4Z^4$ .

### 7. *Pimpinella*, Bibernelle.

1. *P. magna* L., große Bibernelle.  $V^2Z^2$ . Bei Hanshofe, im Ziegelbusch, bei Schneidemühler Hammer.
2. *P. Saxifraga* L., gemeine Bibernelle.  $V^5Z^5$ .

### 8. *Berula*, Berle.

1. *B. angustifolia* Koch., schmalblättrige Berle.  $V^3Z^4$ , z. B. an mehreren Stellen der Döberitz und ihrer Zuflüsse.

### 9. *Sium*, Merf.

1. *S. latifolium* L., breitblättriger Merf.  $V^4Z^4$ .

### 10. *Oenanthe*, Wasserfenchel.

1. *O. aquatica* Lmk., Pferdekümmei.  $V^4Z^4$ .

**11. Aethusa, Gleiche.**

1. *A. Cynapium* L., Hundspetersilie.  $V^5Z^3$ . Besonders in Gärten als Unkraut.

**12. Selinum, Silje.**

1. *S. carvifolia* L., kummelblättrige Silje.  $V^3Z^3$ , z. B. auf Wiesen zwischen Titz und Titzer Bahnhof, am Karauschenpfuhl, im Schweinesießtal am Ziegelbusch.

**13. Angelica, Brustwurz.**

1. *A. silvestris* L., Wald-Brustwurz.  $V^4Z^4$ .

**14. Archangelica, Engelswurz.**

1. *A. officinalis* Hoffm., gebräuchliche Engelswurz. An der Stibber Lanke, am Pilowfließ bei Mittelfurth.

**15. Peucedanum, Haarstrang.**

1. *P. oreoselinum* Moench., Grundheil, Berg-Sellerie.  $V^4Z^3$ , z. B. Mologow, Sagemühler Fichten, Schlopper und Klausdorfer Forst.
2. *P. palustre* Moench., Sumpf-Haarstrang.  $V^3Z^3$ , z. B. im Döberigtal nördl. der Sagemühler Fichten, am großen Radunsee, an der Rafeler Lanke.

**16. Pastinaca, Pastinac.**

1. *P. sativa* L., gemeiner Pastinac.  $V^5Z^5$ .

**17. Heracleum, Bärenklau.**

1. *H. sphondylium* L., gemeine Bärenklau.  $V^4Z^4$ .

**18. Daucus, Möhre, Moorrübe.**

1. *D. carota* L., gemeine Möhre.  $V^4Z^5$ .

**19. Anethum, Dill.**

1. *A. graveolens* L., gemeiner Dill. An der Bahnstrecke zwischen den Stationen Dt. Krone-Ost und Dt. Krone-West.

**20. Torilis, Klettenferbel.**

1. *T. anthriscus* Gmel., gemeiner Klettenferbel.  $V^4Z^4$ .
2. *T. Cerefolium* Hoffm., Gartenferbel. In Gärten Dt. Krone's verwildert, am Schloßsee.

**21. Chaerophyllum, Kälberkropf.**

1. *C. temulum* L., betäubender Kälberkropf.  $V^3Z^3$ , z. B. in Nachlin, Neugolz, Lubsdorf.

2. *Ch. bulbosum* L., knolliger Nalbertropf.  $V^3Z^2$ , z. B. im Schweinefließtal zwischen Reßburg und Ziegelbusch, am Stabitzer Fließ bei Klausdorfer Hammer, bei Seemühle.

### 22. *Conium*, Schierling.

1. *C. maculatum* L., gefleckter Schierling. In Hentendorf und Zippnow.

## 16. Familie: *Araliaceen*, Araliengewächse.

### 1. *Hedera*, Efeu.

1. *H. helix* L., gemeiner Efeu.  $V^2Z^2$ . Bei Jagdhaus, zwischen Schöntal und Sandkrug, im Teufelsbründ.

## 17. Familie: *Cornaceen*, Cornellengewächse.

### 1. *Cornus*, Cornellkirsche, Hartriegel.

1. *C. sanguinea* L., roter Hartriegel. Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl.

## 18. Familie: *Caprifoliaceen*, Geißblattgewächse.

### 1. *Adoxa*, Bisamkraut.

1. *A. moschatellina* L., gemeines Bisamkraut.  $V^3Z^4-5$ , z. B. im Döberitztal südöstl. der Mündung des Klausdorfer Mühlenfließes, im Ziegelbusch, auf dem Schloßberg und Klattenwerder bei Stranz.

### 2. *Sambucus*, Holunder.

1. *S. nigra* L., schwarzer Holunder.  $V^3Z^3$ , z. B. in den Rateler Bergen an der Lanke, im Klogow (Salzberge), am langen Mehlgastsee.  
2. *S. racemosa* L., Trauben-Holunder.  $V^2Z^3$ . Sagemühler Fichten, Heide bei Wilhelmshorst.

### 3. *Viburnum*, Schlinge.

1. *V. opulus* L., gemeine Schlinge, Schneeball.  $V^3Z^3$ , z. B. in den Sagemühler Fichten, Schönthaler Forst am Trebeske-See, Rateler Berge.

### 4. *Lonicera*, Heckenkirsche, Ronizere.

1. *L. xylosteum* L., gemeine Heckenkirsche.  $V^3Z^3$ , z. B. an bewaldeten Ufern und Abhängen des großen Radunsees, Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl, Sagemühler Fichten.

## 19. Familie: Rubiaceen, Rötengewächse.

### 1. *Asperula*, Meier.

1. *A. odorata* L., Waldmeier, Waldmeister.  $V^3Z^4$ , z. B. Klausdorfer Forst nördl. v. Stadtmühl, im Koppelwerder  $Z^5$ , im Döberichtal an der Mündung des Klausdorfer Mühlenfließes.

### 2. *Galium*, Labkraut.

1. *G. aparine* L., kletterndes Labkraut, Klebkraut.  $V^4Z^4$ .
2. *G. uliginosum* L., Moor-Labkraut.  $V^4Z^5$ .
3. *G. palustre* L., Sumpf-Labkraut.  $V^4Z^4$ .
4. *G. boreale* L., nordisches Labkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. am Ufer des großen Bötthinses, im Koppelwerder, bei Grünthal, bei Ruchendorf.
5. *G. verum* L., echtes Labkraut.  $V^4Z^4$ .
6. *G. Mollugo* L., gemeines Labkraut.  $V^5Z^5$ .
7. *G. silvaticum* L., Wald-Labkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. im Buchwald bei Dt. Krone, im Koppelwerder, in den Sagemühler Fichten am Abhange nach dem Döberichtal.
8. *G. saxatile* L., Felsen-Labkraut. In den Rafele Bergen.

## 20. Familie: Valerianaceen, Baldriangewächse.

### 1. *Valeriana*, Baldrian.

1. *V. officinalis* L., gemeiner Baldrian.  $V^4Z^3$ . An vielen Seen.
2. *V. sambucifolia* Mikan., holunderblättriger Baldrian.  $V^3Z^3$ , z. B. am Schweinesfließ im Ziegelbusch, am Hammerbruch, am Stabiger Fließ bei Kronerfier.
3. *V. dioica* L., kleiner Baldrian.  $V^3Z^4$ , z. B. auf den Wiesen nördl. vom großen Radunsee, auf Wiesen an verschiedenen Stellen des Pilowfließes, am Schweinesfließ.

### 2. *Valerianella*, Rapunzel.

1. *V. olitoria* Moench., gemeine Rapunzel. In Kentendorf.

## 21. Familie: Dipsacaceen, Kardengewächse.

### 1. *Knautia*, Knautie.

1. *K. arvensis* Coult., Acker-Knautie.  $V^5Z^4$ .

## 2. *Succisa*, Teufels-Abbiß.

1. *S. pratensis* Moench., Wiesen-Teufels-Abbiß.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Döberitzwiesen nördl. von Stadtmühl, auf den Pilowfließwiesen nördl. der Försterei Mittelfurth, am Karaschenpfuhl.

## 3. *Scabiosa*, Skabioje.

1. *S. columbaria* L., Tauben-Skabioje.  $V^3Z^2$ , z. B. Anhöhen am Nordufer des großen Radunsees, bei Züger, bei Dyck.
2. *S. suaveolens* Desf., wohlriechende Skabioje.  $V^3Z^3$ , z. B. in der Nähe des Forsthauses von Hundesier, auf Wiesen und lichten Wäldern bei Mittelfurth, am Schwanensee.

# 22. Familie: Compositen, Korbblütler.

## 1. *Eupatorium*, Kunigundenkraut.

1. *E. cannabinum* L., hanfartiges Kunigundenkraut.  $V^4Z^4$ . Am Ufer vieler Gewässer.

## 2. *Tussilago*, Huflattich.

1. *T. farfarius* L., gemeiner Huflattich.  $V^4Z^4$ .

## 3. *Petasites*, Pestwurz.

1. *P. officinalis* Moench., gemeiner Pestwurz.  $V^2Z^3$ . In der Nähe des Schlachthofs von Dt. Krone (allmählich eingehend), am Westufer des Stabigsees.

## 4. *Bellis*, Gänseblümchen, Tausendschönchen.

1. *B. perennis* L., ausdauerndes Gänseblümchen.  $V^4Z^4$ .

## 5. *Erigeron*, Dürrewurz.

1. *E. canadensis* L., kanadische Dürrewurz.  $V^4Z^5$ .
2. *E. acer* L., scharfe Dürrewurz.  $V^4Z^3$ .
3. *E. Droebachiensis* O. F. Mueller.  $V^2Z^3$ , z. B. bei Freudenfier, bei Schloppe in der Nähe des großen Roglinsees.

## 6. *Solidago*, Goldrute.

1. *S. virga aurea* L., gemeine Goldrute.  $V^2Z^3$ . Auf lichten Stellen der meisten Laubholzwaldungen.

## 7. *Inula*, Alant.

1. *I. Helenium* L., echter Alant. Bei Deutsch-Fuhlbeck.
2. *I. britannica* L., Wiesen-Alant.  $V^3Z^3$ , z. B. am Ufer des langen Mehlgast-Sees, bei Neufreudenfier, bei Breitenstein.

### 8 *Pulicaria*, Flohkraut.

1. *P. vulgaris* Gaert., gemeines Flohkraut, Christinchenkraut. In Harmelsdorf.

### 9. *Xanthium*, Spitzklette.

1. *X. strumarium* L., gemeine Spitzklette. In Strahlenberg (allmählich schwindend).

### 10. *Galinsoga*, Knopffraut.

1. *G. parviflora* Cav., kleinblumiges Knopffraut. In Dt. Krone auf einem Ackerstück südlich der Brauerei, in Gärten von Tüß.

### 11. *Bidens*, Wasserdoß.

1. *B. tripartita* L., dreiteiliger Wasserdoß. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>. In fast allen Gewässern.
2. *B. cernuus* L., nickender Wasserdoß. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>. Die biologische Form *B. minimus* DC. findet sich auf vielen feuchten Wiesen.

### 12. *Filago*, Schimmelfraut.

1. *F. arvensis* Fries., Acker-Schimmelfraut. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *F. minima* Fries., kleinstes Schimmelfraut. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. auf Äckern in der Nähe der Sägemühler Fichten, bei Wallbruch, bei Stabitz.

### 13. *Gnaphalium*, Rußkraut.

1. *G. silvaticum* L., Wald-Rußkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *G. uliginosum* L., Sumpf-Rußkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
3. *G. luteo-album* L., gelblichweißes Rußkraut. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>. Bei Alt-Lebehnte, am Schwanensee, bei Nederitz.
4. *G. dioicum* L., Ragenpfötchen, Himmelfahrtsblume. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

### 14. *Helichrysum*, Immergrün.

1. *H. arenarium* DC., Strohblume, Sand-Immortelle. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

### 15. *Artemisia*, Beifuß.

1. *A. Absinthium* L., Wermut. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>. In fast allen Ortschaften.
2. *A. campestris* L., Feld-Beifuß. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>.
3. *A. vulgaris* L., gemeiner Beifuß. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

### 16. *Achillea*, Garbe.

1. *A. Ptarmica* L., Bertram = Garbe, weißer Dorant. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. in Harmelsdorf am Dorfsteich, bei Deutsch-Fuhlbeck, am Lüptow-See.
2. *A. millefolium* L., Schafgarbe. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

**17. Anthemis, Hundskamille.**

1. *A. tinctoria* L., Färberkamille.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Chaussee bei Lebehnfte, auf der Anhöhe östl. vom Klogow, am Tüger Bahnhof.
2. *A. arvensis* L., Acker-Hundskamille.  $V^5Z^4$ .
3. *A. Cotula* L., stinkende Hundskamille.  $V^3Z^3$ , z. B. in Briesenitz, Zippnow, Stabitz.

**18. Matricaria, Kamille.**

1. *M. Chamomilla* L., echte Kamille.  $V^4Z^4$ . Besonders im Roggen.
2. *M. discoidea* DC., strahllose Kamille.  $V^3Z^4$ , z. B. am Schlachthaus von Dt. Krone, zwischen Neugolz und Reßburg am Schweinefließ, bei Schloßmühl.
3. *M. inodora* L., geruchlose Kamille.  $V^4Z^4$ .

**19. Tanacetum, Rainfarn.**

1. *T. vulgare* L., gemeiner Rainfarn.  $V^2Z^3$ , z. B. an der Chaussee zwischen Henkendorf und Tütz, bei Schloßniedermühl, auf den Dreigroschen-Wiesen.

**20. Chrysanthemum, Wucherblume.**

1. *Ch. Leucanthemum* L., Maßlieb.  $V^5Z^4$ .

**21. Senecio, Kreuzkraut, Baldgreis.**

1. *S. paluster* DC., Sumpf-Kreuzkraut.  $V^2Z^3$ , z. B. am Ufer des großen Böhlinsees westl. von Al. Ratel, am kleinen Koglinsee, in einem Sumpfe zwischen Neugolz und Moritzberg.
2. *S. vulgaris* L., gemeines Kreuzkraut.  $V^5Z^5$ .
3. *S. viscosus* L., flebriges Kreuzkraut.  $V^3Z^4$ , z. B. auf abgeholzten Stellen des Klogows und der Sagemühler Fichten, im Koppelwerder.
4. *S. silvaticus* L., Wald-Kreuzkraut.  $V^3Z^4$ . Oft mit der vorigen Art gemeinsam.
5. *S. vernalis* W. u. K., Frühlings-Kreuzkraut.  $V^5Z^5$ .
6. *S. Jacobaea* L., Jakobs-Kreuzkraut.  $V^4Z^2$ , z. B. in der Bahlitz, auf lichten Waldstellen des Koppelwerders, bei Brunt.

**22. Cirsium, Kragdistel.**

1. *C. lanceolatum* Scop., lanzettliche Kragdistel.  $V^4Z^5$ .
2. *C. palustre* Scop., Sumpf-Kragdistel.  $V^4Z^4$ .
3. *C. acaule* All., stengellose Kragdistel. Am Pilowfließufer bei Pilowbrück.  $Z^2$ .

4. *C. oleraceum* Scop., kohlartige Kragdistel, Wiesenkohl.  $V^4Z^4$ .  
Auf allen Wiesen der Flußläufe.
5. *C. arvense* Scop., Feld-Kragdistel.  $V^5Z^5$ .

### 23. Carduus, Distel.

1. *C. acanthoides* L., Stacheldistel.  $V^2Z^2$ . Bei Alt-Lobitz, bei Hoffstädt.
2. *C. crispus* L., krause Distel. Am hohen Ufer der Rafeler Lanke.
3. *C. nutans* L., nickende Distel.  $V^3Z^3$ , z. B. auf nicht beackerten Feldern bei Springberg, bei Wittkow, bei Freudenfier.

### 24. Onopordon, Eselsdistel.

1. *O. acanthium* L., gemeine Eselsdistel.  $V^3Z^3$ , z. B. am Wege zw. Stranz und Karlsruhe, in der Babitz, bei Kl. Rafel.

### 25. Lappa, Klette.

1. *L. officinalis* All., gebrauchliche Klette.  $V^4Z^4$ .
2. *L. tomentosa* Lmk., filzige Klette.  $V^4Z^4$ .
3. *L. minor* DC., kleinere Klette.  $V^3Z^3$ , z. B. in Stabitz, in Sagemühl, in Nachlin.

### 26. Carlina, Eberwurz.

1. *C. vulgaris* L., gemeine Eberwurz.  $V^4Z^2$ , z. B. bei Fiermühl, am großen Wusterwitz-See, bei Breitenstein, bei Lebehnte.

### 27. Centaurea, Flockenblume.

1. *C. Jacea* L., gemeine Flockenblume.  $V^5Z^3$ .
2. *C. phrygia* L., phrygische Flockenblume.  $V^3Z^3$ , z. B. am großen Radunsee auf der Anhöhe östl. vom Klogow, bei Ruschendorf, Rafeler Berge.
3. *C. cyanus* L., Kornblume.  $V^5Z^4$ .
4. *C. scabiosa* L., skabiosenartige Flockenblume.  $V^4Z^2$ .
5. *C. rhenana* Bor., rheinische Flockenblume.  $V^2Z^2$ . Auf der Heide am großen Koglin-See, bei Wittkow.

### 28. Lampsana, Milche.

1. *L. communis* L., gemeine Milche.  $V^5Z^3$ .

### 29. Arnoseris, Sammkraut.

1. *A. minima* Link., kleines Sammkraut.  $V^3Z^3$ , z. B. an dem Wege von Appelwerder nach dem Dreessee, Heide am Gladensee, zwischen Freudenfier und Sandkrug.

**30. Cichorium, Cichorie, Wegwarte.**

1. *C. intubus* L., gemeine Wegwarte.  $V^5Z^5$ .

**31. Leontodon, Löwenzahn.**

1. *L. autumnalis* L., Herbst-Löwenzahn.  $V^5Z^5$ .
2. *L. hastilis* L., spießförmiger Löwenzahn.  $V^4Z^4$ .

**32. Tragopogon, Bocksbart.**

1. *T. pratensis* L., Wiesenbocksbart.  $V^4Z^2$ . An allen Chauffeen und vielen Landwegen.

**33. Scorzonera, Schwarzwurz.**

1. *S. humilis* L., niedrige Schwarzwurz.  $V^4Z^2$ . In vielen Kiefernwaldungen am Rande der Wege.

**34. Hypochaeris, Ferkelkraut.**

1. *H. glabra* L., fahles Ferkelkraut.  $V^2Z^3$ . Am Gladensee, am Gelände des langen Mehlgast-Sees, bei Sandrug.

**35. Achyrophorus, Hachskopf.**

1. *A. maculatus* Scop., gefleckter Hachskopf.  $V^3Z^2$ , z. B. im Ziegelbusch, im Walde am flachen Hundskopffee, im Klogow.

**36. Taraxacum, Butterblume.**

1. *T. officinale* Web., gebräuchliche Butterblume.  $V^5Z^5$ .

**37. Chondrilla, Krümling.**

1. *Ch. juncea* L., binfenartiger Krümling. Bei Cassere.

**38. Lactuca, Lattich.**

1. *L. muralis* Less., Mauer-Lattich. In Tüb.

**39. Sonchus, Sandistel, Gänsedistel.**

1. *S. oleraceus* L., glatte Gänsedistel.  $V^5Z^4$ .
2. *S. arvensis* L., Feld-Gänsedistel.  $V^5Z^5$ . Form *S. laevipes* Koch am Schloßsee bei Dt. Krone.

**40. Crepis, Grundfeste.**

1. *C. biennis* L., zweijährige Grundfeste.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Wiesen des Nordufers des großen Radunsees, bei Salm, an dem Wege Sastrou—Zamborst.
2. *C. tectorum* L., Dach-Grundfeste.  $V^4Z^3$ , z. B. auf der Heide bei Bahnhof Stranz, bei Schloppe und Tüb.
3. *C. virens* Vill., grüne Grundfeste.  $V^2Z^3$ . Bei Grünthal.

#### 41. Hieracium, Habichtskraut.

1. *H. pilosella* L., gemeines Habichtskraut. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *H. auricula* Lam. et DC., Öhrchen-Habichtskraut. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Klogow, zw. Harmelsdorf und Preußendorf, bei Märk. Friedland.
3. *H. collinum* Goch. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Klogow, bei Försterei Friedrichshain, auf den Döberitzwiesen bei den Sagemühler Fichten.
4. *H. prussicum* N. P. = *H. collinum* + *pilosella*. Bei Schneidemühler Hammer.
5. *H. magyricum* N. P. An einem Sumpfe zwischen Quiram und Urnsfelde, am Schweinesfließ unweit Ketzburg. Z<sup>3</sup>.
6. *H. vulgatum* Fries., gemeines Habichtskraut. V<sup>4</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. im Walde am Dreehlee, bei Wilhelmshorst, bei Schöenthal.
7. *H. boreale* Fries., Wald-Habichtskraut. Bei Klausdorfer Hammer, im Koppelwerder.
8. *H. umbellatum* L., dolbiges Habichtskraut. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.
9. *H. laevigatum* Willd., glattes Habichtskraut. Am Trebeske-See.

#### 23. Familie: Campanulaceen, Glockenblumengewächse.

##### 1. Jasione, Saffione.

1. *J. montana* L., Berg-Saffione. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.

##### 2. Phyteuma, Teufelskrallen.

1. *Ph. spicatum* L., ähriger Teufelskrallen. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

##### 3. Campanula, Glockenblume.

1. *C. rotundifolia* L., rundblättrige Glockenblume. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *C. rapunculoides* L., kriechende Glockenblume. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. bei der Försterei Sandkrug, Waldrand am Tütssee, Nafeler Berge.
3. *C. trachelium* L., neffelblättrige Glockenblume. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Klogow, im Ziegelbusch, bei Wallbruch.
4. *C. patula* L., ausgebreitete Glockenblume. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>. Wiesen nördl. vom großen Radunsee, bei Mehlgast, am großen Koglin-See.
5. *C. persicifolia* L., pfirsichblättrige Glockenblume. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Koppelwerder am großen Bötthensee, an der Stibber Lanke, bei Seemühle.
6. *C. glomerata* L., geknäuelte Glockenblume. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. an der Chaussee im Buchwald bei Dt. Krone, auf den Döberitzwiesen nördl. der Sagemühler Fichten, am Rührensee.

## 24. Familie: Vacciniaceen, Heidelbeergewächse.

### 1. *Vaccinium*, Heidelbeere.

1. *V. myrtillus* L., Blaubeere. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *V. uliginosum* L., Rauschbeere, Drunkelbeere. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
3. *V. vitis Idaea* L., Preiselbeere. V<sup>4</sup>Z<sup>3-5</sup>.
4. *V. oxycoccus* L., Moosbeere. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

## 25. Familie: Ericaceen, Heidekrautgewächse.

### 1. *Arctostaphylos*, Bärentraube.

1. *A. uva ursi* Spreng., gemeine Bärentraube. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. an mehreren Stellen der Schönthaler und Bietnitzer Forst, in der Linicher Forst zwischen Roderitz und Machlin.

### 2. *Andromeda*, Gränke.

1. *A. polifolia* L., wilder Rosmarin. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. in einem Torfbruch zwischen Neugolz und Daber, auf den Wiesen nördl. vom großen Radunsee und nördl. vom Klogow, Teufelsbruch im Klogow.

### 3. *Calluna*, Heidekraut.

1. *C. vulgaris* Salisb., gemeines Heidekraut. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.

## 26. Familie: Rhodoraceen, Alpenrosengewächse.

### 1. *Ledum*, Porst.

1. *L. palustre* L., Sumpfporst. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>. In vielen Brüchern.

## 27. Familie: Pirolaceen, Wintergrüngewächse.

### 1. *Pirola*, Wintergrün.

1. *P. chlorantha* Swartz., grünblütiges Wintergrün. V<sup>4</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. an mehreren Stellen der Schlopper Forst, Klausdorfer Forst, Marzdorfer Forst.
2. *P. rotundifolia* L., rundblättriges Wintergrün. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. in den Sagemühler Fichten, Schlopper Forst zwischen Schloppe und Tütz, im westlichen Klogow.
3. *P. uniflora* L., einblütiges Wintergrün, Moosauge. V<sup>4</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. in den Sagemühler Fichten am Abhange nach dem Döberitztal, bei Schönthal, beim Teufelspring.

**2. Ramischia, Birnbäumchen.**

1. *R. secunda* Grek., einseitsblütiges Birnbäumchen.  $V^4Z^3$ , z. B. bei Schloßmühl, bei Dyck, bei Ruchendorf.

**3. Chimophila, Winterlieb.**

1. *Ch. umbellata* Nutt., dolbenblütiges Winterlieb.  $V^4Z^3$ , z. B. bei Zabelsmühl, bei Stadtmühl, Kronerfier.

**4. Monotropa, Fichtenspargel, Dhublatt.**

1. *M. hypopitys* L., gemeiner Fichtenspargel.  $V^3Z^3$ , z. B. im Marzdorfer Forst bei Ruchendorf, Klausdorfer Forst bei Stadtmühl, Schönthaler Forst bei Friedenshain.

**VII. Corollifloren, Kronenblütige.**

**1. Familie: Asclepiadaceen, Seidenpflanzengewächse.**

**1. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.**

1. *V. officinale* Moench., gemeine Schwalbenwurz. Zwischen Springberg und Hasenberg, bei Schneidemühler Hammer.

**2. Familie: Gentianaceen, Enziangewächse.**

**1. Menyanthes, Bitterflee, Fieberflee.**

1. *M. trifoliata* L., dreiblättriger Bitterflee.  $V^4Z^4$ .

**2. Limnanthemum, Seefanne.**

1. *L. nymphaeoides* Link., seerosenartige Seefanne.  $V^3Z^3$ , z. B. in seichten Buchten des großen Böhlinsees, im blauen Wasser (Sagemühler Fichten), im Trebeske-See.

**3. Gentiana, Enzian.**

1. *G. baltica* Murb., baltischer Enzian.  $V^1Z^1$ . Wiesen am Pilowfließ nördl. von der Försterei Mittelsfurth.

**4. Erythraea, Tausendgüldenkrant.**

1. *E. centaurium* Pers., gemeines Tausendgüldenkrant.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Döberitzwiesen und am Karauschenpfuhl in den Sagemühler Fichten, am großen Roglin-See, am Binnow-See.

### 3. Familie: Convolvulaceen, Windengewächse.

#### 1. Convolvulus, Winde.

1. *C. arvensis* L., Ackerwinde. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
2. *C. sepium* L., Baumwinde. V<sup>2</sup>Z<sup>3</sup>. In Breitenstein, in Lüben.

#### 2. Cuscuta, Seide.

1. *C. europaea* L., europäische Seide. Auf *Urtica dioica* L. bei Kl. Ratel und im Koppelwerder.
2. *C. epithymum* L., Quendelseide. Auf *Trifolium pratense* L. am Schlachthof von Dt. Krone, auf *Lupinus polyphyllus* Lindl. an der Eisenbahnstrecke Dt. Krone-Ost — Dt. Krone-West, hier auch auf *Trifolium arvense* L.
3. *C. epilinum* Weihe, Flachse-Seide. Auf einem Flachsfelde bei Stranz.

### 4. Familie: Boraginaceen, Boretschgewächse.

#### 1. Asperugo, Schlangenäuglein.

1. *A. procumbens* L., liegendes Schlangenäuglein. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. in Harmelsdorf, in Brunt, bei Preußendorf.

#### 2. Cynoglossum, Hundszunge.

1. *C. officinale* L., gebräuchliche Hundszunge. V<sup>3</sup>Z<sup>2</sup>, z. B. am See von Zabelsmühl, bei Marienfelde, bei Breitenstein.

#### 3. Anchusa, Ochsenzunge.

1. *A. officinalis* L., gebräuchliche Ochsenzunge. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>.
2. *A. arvensis* M. B., Acker-Ochsenzunge. V<sup>5</sup>Z<sup>3</sup>.

#### 4. Symphytum, Beinwell.

1. *S. officinale* L., gemeine Beinwell. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>. In der Form mit weißen Blüten (*S. bohemicum* F. W.) in der Babelitz, auf den Wiesen am Schweinesieß zwischen Reßburg und dem Ziegelbusch.

#### 5. Pulmonaria, Lungenkraut.

1. *P. angustifolia* L., schmalblättriges Lungenkraut. Im Kloster. V<sup>2</sup>Z<sup>2</sup>.
2. *P. officinalis* L., gebräuchliches Lungenkraut. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

#### 6. Echium, Natterkopf.

1. *E. vulgare* L., gemeiner Natterkopf. V<sup>3</sup>Z<sup>4</sup>, z. B. bei Stadtmühl u. Schloßmühl, zw. Schloppe und Züker, zw. Stranz und Harmelsdorf.

## 7. Lithospermum, Steinsame.

1. *L. arvense* L., Acker-Steinsame.  $V^4Z^3$ .

## 8. Myosotis, Bergißmeinnicht.

1. *M. palustris* Roth., Sumpfvergißmeinnicht.  $V^5Z^4$ .
2. *M. caespitosa* Schultz, rasiges Bergißmeinnicht.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Rafeler Lanke, am Gladensee, am Schmiede-See.
3. *M. arenaria* Schrad., Sandvergißmeinnicht.  $V^5Z^5$ .
4. *M. versicolor* Smith., verschiedenfarbiges Bergißmeinnicht.  $V^3Z^2$ , z. B. bei Neu-Preußendorf, bei Stranz in der Nähe des Dycker Sees, am Ausfluß des Pilowfließes aus dem großen Böhlinsee.
5. *M. hispida* Schldl., steifhaariges Bergißmeinnicht.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Machlin, Rafeler Berge, bei Wittkow.
6. *M. intermedia* Link., mittleres Bergißmeinnicht.  $V^4Z^3$ .

## 5. Familie: Solanaceen, Nachtschattengewächse.

### 1. Solanum, Nachtschatten.

1. *S. nigrum* L., schwarzer Nachtschatten.  $V^4Z^4$ .
2. *S. dulcamara* L., Bittersüß.  $V^3Z^3$ , z. B. im Schilf am Dreehsee und großen Böhlinsee, am Südufer des Stabitz-Sees.

### 2. Hyoscyamus, Bilsenkraut.

1. *H. niger* L., schwarzes Bilsenkraut.  $V^4Z^3$ .

### 3. Datura, Stechapfel.

1. *D. stramonium* L., gemeiner Stechapfel. Im Pfarrgarten zu Dt. Krone.  $Z^1$ , in mehreren Gärten von Breitenstein.

## 6. Familie: Scrophulariaceen, Braunwurzgewächse.

### 1. Verbascum, Wollkraut, Königsferze.

1. *V. Thapsus* L., kleinblumige Königsferze.  $V^3Z^2$ , z. B. bei Freudenfier, am kleinen Roglinsee, zwischen Ruchendorf und Schloppe.
2. *V. thapsiforme* Schrad., großblumige Königsferze.  $V^2Z^1$ , z. B. bei Hundefier, bei Wiffulle.
3. *V. phlomoides* L., windblumenähnliche Königsferze. Bei Züger.
4. *V. nigrum* L., schwarze Königsferze.  $V^3Z^1$ , z. B. bei der Försterei Sandkrug, zwischen Klausdorf und Ziegelbusch, zwischen Schloppe und Lütz.

## 2. *Scrophularia*, Braunwurz.

1. *S. nodosa* L., knotige Braunwurz.  $V^4Z^3$ . An Gewässern.

## 3. *Linaria*, Leintraut.

1. *L. minor* Desf., kleines Leintraut. Am großen Teich bei Schloppe.
2. *L. arvensis* Desf., Acker-Leintraut. An der Chaussee zwischen Brunk und Hentendorf.  $Z^2$ , bei Stabitz.
3. *L. vulgaris* Mill., Frauenflachs.  $V^4Z^3$ .

## 4. *Veronica*, Ehrenpreis.

1. *V. scutellata* L., schildfrüchtiger Ehrenpreis.  $V^4Z^4$ .
2. *V. anagallis* L., Wasser-Ehrenpreis.  $V^4Z^4$ .
3. *V. beccabunga* L., Bachbunge.  $V^4Z^4$ .
4. *V. chamaedrys* L., Gamander-Ehrenpreis.  $V^5Z^5$ .
5. *V. officinalis* L., gebräuchlicher Ehrenpreis.  $V^4Z^3$ .
6. *V. spicata* L., ähriger Ehrenpreis.  $V^3Z^3$ , z. B. in den Sagemühler Fichten, im Koppelwerder, Tafeler Berge.
7. *V. serpyllifolia* L., quendelblättriger Ehrenpreis.  $V^5Z^4$ .
8. *V. arvensis* L., Feld-Ehrenpreis.  $V^5Z^4$ .
9. *V. verna* L., Frühlings-Ehrenpreis.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Stadtmühl, bei Quiram, bei Alt-Lobitz.
10. *V. Dillenii* Oertz., Dillen's Ehrenpreis.  $V^3Z^3$ , z. B. auf der Heide bei Stranz, zwischen Elsenfelde und Klausdorf, zwischen Schloppe und Drahnow.
11. *V. triphyllos* L., dreiblättriger Ehrenpreis.  $V^5Z^4$ .
12. *V. agrestis* L., Acker-Ehrenpreis.  $V^4Z^4$ .
13. *V. hederifolia* L., efeublättriger Ehrenpreis.  $V^4Z^3$ .

## 5. *Melampyrum*, Wachtelweizen.

1. *M. cristatum* L., kammähriger Wachtelweizen. Auf den Pilowfließwiesen nördl. der Försterei Mittelfurth  $Z^1$ .
2. *M. nemorosum* L., Hain-Wachtelweizen.  $V^4Z^4$ .
3. *M. pratense* L., Wiesenwachtelweizen.  $V^4Z^5$ .

## 6. *Pedicularis*, Räusekraut, Moorkönig.

1. *P. silvatica* L., Wald-Räusekraut.  $V^3Z^3$ , z. B. auf den Wiesen auf der Nordseite des großen Radunsees, im Döberitztal nördl. der Sagemühler Fichten, im Ziegelbusch.
2. *P. palustris* L., Sumpf-Räusekraut.  $V^3Z^3$ , z. B. in der Bablitz, am großen Böhlinsee am Koppelwerder, im Hammerbruch.

### 7. Alecutorolophus, Klapper.

1. *A. minor* W. et G., kleine Klapper. An dem Wege von Dyck nach Theerofen.
2. *A. maior* Rehb., größere Klapper. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.

### 8. Euphrasia, Augentrost.

1. *E. officinalis* L., gebräuchlicher Augentrost. V<sup>5</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *E. Odontites* L., rotblütiger Augentrost. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

### 9. Lathraea, Schuppenwurz.

1. *L. squamaria* L., gemeine Schuppenwurz. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Ziegelbusch bei Krieburg, im Buchwald bei Dt. Krone, im Klausdorfer Forst nördl. von Stadtmühl.

## 7. Familie: Labiaten, Lippenblütler.

### 1. Elssholzia, Kamm-Minze.

1. *E. Patrini* Grek., gemeine Kamm-Minze. In Dt. Krone am Gymnasial-Turnplatz.

### 2. Mentha, Minze.

1. *M. aquatica* L., Wasser-Minze. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.
2. *M. arvensis* L., Feld-Minze. V<sup>5</sup>Z<sup>5</sup>.
3. *M. aquatica* + *arvensis*. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>.

### 3. Lycopus, Wolfstrapp.

1. *L. europaeus* L., gemeiner Wolfstrapp. V<sup>4</sup>Z<sup>4</sup>.

### 4. Salvia, Salbei.

1. *S. pratensis* L., Wiesen-salbei. V<sup>1</sup>Z<sup>3</sup>. An der Chaussee zwischen Kirschütz und Borkendorf, bei Zabelsmühl.

### 5. Origanum, Dost.

1. *O. vulgare* L., gemeiner Dost. Bei Schöenthal am Trebeske-See.

### 6. Thymus, Quendel.

1. *Th. serpyllum* L., Feldquendel. V<sup>4</sup>Z<sup>5</sup>.

### 7. Calamintha, Calaminthe.

1. *C. acinos* Clairv., Feld-Calaminthe. V<sup>4</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. bei Wittkow, am Stranzer Bahnhof, am großen Koglinsee.

### 8. Clinopodium, Wirbeldost.

1. *C. vulgare* L., gemeiner Wirbeldost. V<sup>3</sup>Z<sup>3</sup>, z. B. im Walde am Dreeß-See und am flachen Hundskopfssee, im Koppelwerder.

### 9. Glechoma, Sundermann.

1. *G. hederaceae* L., efeublättriger Sundermann.  $V^5Z^5$ .

### 10. Lamium, Taubnessel.

1. *L. amplexicaule* L., stengelumfassende Taubnessel.  $V^5Z^4$ .
2. *L. purpureum* L., purpurrote Taubnessel.  $V^5Z^5$ .
3. *L. maculatum* L., gefleckte Taubnessel.  $V^2Z^3$ , z. B. an der Döberitz, südl. vom Kronerfier, am Rande der Rieselfwiesen im Klausdorfer Forst.
1. *L. album* L., weiße Taubnessel.  $V^1Z^5$ . In Gr. Wittenberg.

### 11. Galeobdolon, Goldnessel.

1. *G. luteum* Huds., gelbe Goldnessel.  $V^4Z^5$ .

### 12. Galeopsis, Hohlzahn.

1. *G. ladanum* L., Acker-Hohlzahn. Auf Kartoffelacker westl. der Sagemühler Fichten.
2. *G. tetrahit* L., Hanfnessel.  $V^4Z^4$ .
3. *G. pubescens* Bess., weichhaariger Hohlzahn.  $V^4Z^4$ .
4. *G. speciosa* Mill., auf einer Wiese bei Schloßmühl.

### 13. Stachys, Ziest.

1. *S. silvaticus* L., Wald-Ziest.  $V^3Z^3$ , z. B. im Kloxow, Koppelwerder, Ziegelbusch.
2. *S. paluster* L., Sumpf-Ziest.  $V^4Z^4$ .
3. *S. annua* L., einjähriger Ziest.  $V^3Z^3$ , z. B. bei Schloppe (zw. Schloppe und Tütz), bei Moritzberg, in Stabitz.

### 14. Betonica, Betonie.

1. *B. officinalis* L., gebräuchliche Betonie.  $V^3Z^3$ , z. B. im Buchwald bei Dt. Krone, in den Sagemühler Fichten, bei Seemühle.

### 15. Marrubium, Andorn.

1. *M. vulgare* L., gemeiner Andorn.  $V^3Z^3$ , z. B. in Hentendorf, in Breitenstein, in Neugolz.

### 16. Ballote, Gottesbergeß.

1. *B. nigra* L., schwarzer Gottesbergeß.  $V^4Z^4$ .

### 17. Leonurus, Herzgespan.

1. *L. cardiaca* L., gemeines Herzgespan.  $V^3Z^3$ , z. B. in Dt. Krone (Waldemarstraße am Amtsgericht), in Klausdorf, in Nachlin.

### 18. Scutellaria, Helmkraut.

1. *S. galericulata* L., gemeines Helmkraut.  $V^4Z^4$ .

**19. Brunella, Brunelle.**

1. *B. vulgaris* L., gemeine Brunelle.  $V^5Z^4$ .
2. *B. grandiflora* Jacq., großblumige Brunelle. Im Klogow (hohe Birken)  $Z^2$ .

**20. Ajuga, Günsel.**

1. *A. reptans* L., kriechender Günsel.  $V^4Z^4$ .
2. *A. genevensis* L., behaarter Günsel.  $V^3Z^3$ , z. B. an der Chaussee zwischen Brogen und Nachlin, zwischen Stranz und Neu-Preußendorf, an lichten Stellen im Koppelwerder.

**8. Familie: Verbenaceen, Eisenhartgewächse.**

**1. Verbena, Eisenhart.**

1. *V. officinalis* L., gebräuchlicher Eisenhart.  $V^2Z^3$ . In Dt. Krone südl. von der Brauerei, in Stabitz.

**9. Familie: Lentibulariaceen, Wasserhelmgewächse.**

**1. Utricularia, Wasserhelm.**

1. *U. vulgaris* L., gemeiner Wasserhelm.  $V^3Z^4$ , z. B. in einem Graben am Nordufer des großen Radunsees, in dem großen Sumpfe bei Rederitz, im blanten Wasser.
2. *U. intermedia* Hayne, mittlerer Wasserhelm. In Gräben nördl. vom großen Radunsee.
3. *U. minor* L., kleiner Wasserhelm. Nördl. vom großen Radunsee.
4. *U. neglecta* Lehm., übersehener Wasserhelm. Südöstlich von Schloppe.

**10. Familie: Primulaceen, Himmelschlüsselgewächse.**

**1. Trientalis, Siebenstern.**

1. *T. europaea* L., europäischer Siebenstern.  $V^4Z^3$ . In allen Laubwaldungen.

**2. Lysimachia, Friedlos.**

1. *L. thyrsoiflora* L., straußblütiger Friedlos.  $V^3Z^4$ , z. B. an den Sümpfen in den Salzbergen (Klogow), am Gladensee, am großen Büßen-See.

2. *L. vulgaris* L., gemeiner Friedlos.  $V^3Z^3$ , z. B. am Dreessee bei Haugsdorf, am Karauschenpfuhl.
3. *L. nummularia* L., Pfennigfrant.  $V^4Z^3$ . Auf feuchten Wiesen.

### 3. *Anagallis*, Gauchheil.

1. *A. arvensis* L., Acker-Gauchheil, rote Miere.  $V^5Z^4$ .
2. *A. coerulea* Schreb., blauer Gauchheil. Zwischen Deutsch-Fuhlbeck und Haugsdorf.

### 4. *Primula*, Simmelschlüssel.

1. *P. officinalis* Jacq., gebräuchlicher Simmelschlüssel.  $V^4Z^4$ .

### 5. *Hottonia*, Hottonie.

1. *H. palustris* L., Sumpf-Hottonie.  $V^3Z^4$ , z. B. in der Babilz, in einem Sumpfe bei Arnstfelde, zwischen Tütz und Tüßer Bahnhof.

## 11. Familie: Plumbaginaceen, Bleiwurzwgewächse.

### 1. *Armeria*, Grasnelke.

1. *A. vulgaris* Willd., gemeine Grasnelke.  $V^5Z^5$ .

## 12. Familie: Plantaginaceen, Wegerichgewächse.

### 1. *Plantago*, Wegerich, Wegebreit.

1. *P. maior* L., großer Wegerich.  $V^5Z^5$ .
2. *P. media* L., mittlerer Wegerich.  $V^4Z^4$ .
3. *P. lanceolata* L., lanzettlicher Wegerich.  $V^5Z^4$ .
4. *P. arenaria* W. et. K., Sand-Wegerich.  $V^3Z^3$ , z. B. am Ufer des Mellen-Sees, des großen Roglinsees, im Linowo-Bruch.

