

§ I.

*Causes des Fièvres intermittentes.*

Les *fièvres intermittentes* sont dues aux vapeurs qui s'exhalent des eaux stagnantes & corrompues. Cette vérité est démontrée, parce qu'on en observe un plus grand nombre dans les saisons pluvieuses; parce qu'elles sont plus fréquentes dans les contrées où le sol est marécageux, comme en Hollande, dans les Marais de la Province de Cambridge, dans le Comté d'Essex, (sur nos côtes Maritimes, sur le bord des étangs de la Méditerranée, &c.)

Les *alimens* de difficile *digestion*, une trop grande quantité de fruits à noyaux pas assez mûrs, un *régime* aqueux & peu substantiel, l'humidité des maisons, le *serein*, le sommeil pris sur un terrain humide, les veilles, les fatigues, les passions accablantes, telles que le chagrin, la douleur, &c., peuvent encore occasionner les *fièvres intermittentes*.

Lorsque les habitans d'un pays élevé viennent habiter un lieu bas, ils manquent rarement de les gagner; & quand elles sont dues à cette cause, elles deviennent sujettes à être funestes.

En un mot, tout ce qui peut relâcher les *solides*, diminuer la *transpiration*, arrêter la *circulation* des *fluides* dans les *vaisseaux capillaires*, c'est-à-dire, dans les plus petits *vaisseaux* du corps, dispose aux *fièvres intermittentes*.