

§ II.

*Symptômes des Fièvres intermittentes.*Symptômes
qui annon-
cent l'accès.

Une *fièvre intermittente* commence, en général, par des douleurs à la tête, dans les *lombes*, dans les *reins*; par une lassitude dans tous les membres, par un sentiment de froid dans les *extrémités*, par des *pandiculations*, des bâillemens accompagnés d'*anxiétés*, de *nausées*, & quelquefois de *vomissemens*.

Symptômes
de l'accès.

A tout cela succède le *frisson*, ensuite un violent tremblement; mais bientôt la *peau* devient moite, la *sueur* coule abondamment & termine l'*accès*.

Symptômes
caractéristi-
ques.

Cependant il arrive quelquefois que cette *fièvre* prend subitement, au moment où le malade se croit en parfaite santé; mais elle est plus communément précédée d'affaiblissement, de perte d'appétit, & des *symptômes* mentionnés ci-dessus.

(Un des *symptômes* qui caractérisent plus particulièrement ces *fièvres*, est la couleur des *urines* que le malade rend pendant & surtout après la *sueur*. Elles sont rougeâtres, *briquetées*, c'est-à-dire, qu'elles déposent un *sédiment* qui a l'aspect de la brique pilée.

Dans le commencement de l'*accès*, le *pouls* est *vite*, *foible* & *petit*, la soif est assez forte. Pendant la chaleur, le *pouls* est plus fort, plus grand, & la soif est excessive. Immédiatement après le *froid*, le malade éprouve une chaleur sèche, à laquelle succède la *sueur* (2).

(2) N. B. Nous prions avec instance, de lire, avant d'aller plus loin, les Chapitres I & II de ce Volume, que nous