

en soit, plus la *fièvre rémittente* approche d'être *fièvre intermittente régulière*, moins elle est dangereuse.

(Les *fièvres rémittentes* sont donc celles qui, depuis leur invasion jusqu'à la fin, ne quittent point le malade, mais dont les *symptômes*, tels que le *frisson*, le bâillement, le froid, la chaleur, &c., naissent & augmentent tour à tour; de sorte qu'il y a des temps dans la journée où le malade se trouve très-soulagé, sans pour cela être sans *fièvre*; car il a le *pouls* toujours plus fébrile que dans l'état naturel, & l'abattement des forces est toujours considérable: ce qu'on ne rencontre point dans l'intervalle des *fièvres intermittentes*, dont on a traité ci-devant, Chap. III, de ce Vol.)

Caractères
de la fièvre
rémittente.

§ I.

Causés de la Fièvre rémittente.

LA *fièvre rémittente* est commune dans les lieux bas, marécageux, couverts d'eau stagnante & de bois: mais les cantons dans lesquels elle est le plus funeste sont ceux où une grande chaleur se trouve combinée avec une grande humidité, comme dans quelques parties de l'Afrique, dans le Bengale, aux Indes orientales, &c., où la *fièvre rémittente* est en général du genre *putride*, & très-dangereuse. On l'observe plus fréquemment pendant un temps couvert, surtout après des pluies ou de grandes inondations, &c.

Lieux où
elle est fré-
quente.

Tout le monde y est exposé: ni le sexe, ni l'âge, ni la *constitution*, n'en exemptent. Mais ceux qui sont d'un tempérament relâché, qui occupent des habitations basses & mal-propres, qui respirent un air impur & qui ne circule point,

Qui sont
ceux qui sont
le plus expo-
sés à la fièvre
rémittente.

qui ne prennent point assez d'exercice, qui vivent d'alimens mal-sains, y sont le plus sujets.

§ II.

Symptômes de la Fièvre rémittente.

Les premiers *symptômes* de cette *fièvre* sont des bâillemens, des *pandiculations*, des douleurs à la tête, des *vertiges*, & des alternatives de froid & de chaud. Quelquefois le malade tombe dans le *délire*, dès la première attaque. Il ressent une douleur à la *région* de l'estomac & quelquefois on y aperçoit un gonflement. La langue est blanche, les yeux & la *peau* paroissent souvent jaunes, & souvent il vomit de la *bile*.

Le *pouls* est quelquefois un peu dur; mais il est rarement *plein*, & le *sang* tiré de la *veine* ne donne guère de signes d'*inflammation*, c'est-à-dire, qu'il est rarement *couenneux*. Il y a des malades qui éprouvent une *constipation* excessive; d'autres, au contraire, ont des *cours de ventre* très-incommodes.

Il est impossible d'en décrire tous les symptômes, à cause de leur extrême variété.

Il est impossible de décrire tous les *symptômes* qui accompagnent cette Maladie, parce qu'ils varient suivant l'habitation, la *constitution* du malade & la saison de l'année. Ils peuvent encore beaucoup varier d'après le traitement, & d'après plusieurs autres circonstances qu'il seroit trop long de détailler.

Cette fièvre se montre souvent sous l'aspect des fièvres bilieuses, nerveuses & malignes.

Tantôt cette Maladie se montre sous les *symptômes des fièvres bilieuses*, tantôt sous ceux des *fièvres nerveuses*, & tantôt sous ceux des *fièvres malignes*. Il n'est pas du tout rare de voir ces *symptômes* se succéder les uns aux autres, ou même se compliquer en même temps chez la même personne.

(Ce