

CHAPITRE XIII.

De la Rougeole.

LA rougeole, qui parut en Europe à peu près dans le même temps que la *petite-vérole*, a beaucoup d'affinité avec cette dernière Maladie. Elles viennent toutes deux de l'Orient; elles sont toutes deux *contagieuses*, & l'on n'en est guère attaqué qu'une seule fois en sa vie.

Affinité de la rougeole avec la petite-vérole.

La rougeole paroît le plus communément au printemps; elle disparoît en été. Cette Maladie est rarement fatale par elle-même, & quand elle est bien traitée; mais quelquefois elle a des suites fâcheuses.

Dans quelle saison se montre la rougeole.

§ I.

Causes de la Rougeole.

La rougeole, de même que la *petite-vérole*, se communique par la *contagion*. Elle est plus ou moins dangereuse, relativement à la constitution du sujet, à la saison de l'année, au climat, &c.

La contagion.

(On distingue la rougeole en *bénigne* & en *maligne*. Autant la première se guérit facilement, autant la dernière est dangereuse, non seulement par l'intensité des *symptômes* qu'elle présente, mais encore par les suites funestes dans lesquelles elle entraîne).

La rougeole se divise en bénigne & en maligne.

tance de l'objet, sur lequel nous avons cru ne pouvoir trop nous étendre, surtout dans un Ouvrage qui est destiné à être répandu de tous côtés dans les Provinces & dans les Campagnes.

R ij