

man har Eindring saasnaar man under Paroxysmus i kolde Febere kommer i Svæd, saa bruges den ligeledes der under Heden. Naar man har været ude i Blæst eller i Aften-Rulde om Foraaret eller Sommeren, og finder sig derpaa kulsen eller upaselig, som viser at Transpirationen er bleven hemmet, bør man strax lade varme Sengen og røge den med Sukker, legge sig og indtage Mixture simplex, samt drikke The eller varm Oloft-Balde derpaa. Dosis er 60, 80 à 120 Draaber. I Sygdomme med Hoste og for dem, der have et svagt Bryst, passer den ikke.

No. 15.

Liquor Corn. Cerv. succinatus.

Prinzens gule Draaber.

De styrke Nerverne, drive Binde og bringe Blodets Omlob i Skik igien naar det, formedelst Spasmi eller Convulsioner, er kommet i Norden. Derfor bruges de for Børn til $2\frac{1}{3}$ à 6 Draaber naar man besejgter ~~Hierfe-Klappen~~ ^{Convulsioner}, saasom og naar det er overstaaet, i Haab at forekomme Recidiver. For Convulsioner i Almindelighed ere de og gode, deels naar de fornemmes, deels og efter et hvert Anstød. De ere ligeledes gode for Quaalme og Vapeurer, samt for kold Bind-Colique. I Besynderlighed bruges de efter Alterationer og Skræk, da Pulsen er liden, Ansigtet og Læberne blegne. De som trues med den Art af Slag eller Lammhed som vi kalde Sereuse, hvilken ei kommer af for meget rødt Blod, men af Bædsker som efter Haanden samle sig i Hiernen, bør
hver

hver Morgen bruge disse Draaber og purgere een Gang hver Maaned, samt føre en stræng Diæt, sove lidet, aldrig strax paa Mæden: De bør ligge høit med Hovedet, holde Fødderne varme, have vide Klæder og hverken Halsdug eller andet Haardt tilbundet. Denne Art af Slag er læst at skille fra den, som kommer af for meget Blod, efterdi udi den Første Ansigt og Læber see blege ud, Pulsen er laug og svag, samt de udvortes Deele hellere kolde end varme, men udi den Sidste ere Kiendes Tegnene tværtimod. I Begge falder man ned og mister al Følelse og Bevægelse, allene Pulsen gaar og Aandedrættet, endskjønt denne noget tvungen. Hos en Deel kommer da gierne Opkastning. En Deel faa snart igien Følelsen eller Bevægelsen, men ofte bliver dog noget Læm lamt. Anfaldet af Slag kommer vel hastigt, men mestendeel kan man hele Aaret forud see om man trues dermed, nemlig om man mærker at Hovedet bliver tungt; Kræfterne uden Kiendelig Årsag formindskes: nogen sædvanlig Evacuation ophører: Tungen bliver ei saa bevægelig som før, man taler ei tydelig, Maalet forandres, Huskommissen tager hastigt af, Phsyionomien bliver fremmed, og her indfinder sig ofte Svimmel. Naar noget Anstød kommer af denne Sorte Slag, bør

§. 1. Halsdugen og Klæderne løses.

§. 2. Lidet Guld-Pulver legges under Tungen eller et lidet Stykke Sukker, paa hvilket man

man har dryppet nogle Draaber af Spiritus Laven-
dulæ Compositus. Pag. 29. No. 19.

§. 3. Et Lavement, med mere Salt udi end
ordinaire appliceres.

§. 4. Et Laxativ gives, som hastigt virker,
for Exempel: en Dosis af Laxere-Pulveret. P. 43.
No. 28.

§. 5. Et stort Spansk Glue Plaster, Pag. 35.
No. 23. sættes paa hver Læg. Endeligen naar An-
faldet lader af og Legemet begynder at dampe, tages

§. 6. En Dosis af disse Draaber. Paa dette
Anstød følger siden Feber, som enten kommer til en
vis Tid hver anden Dag eller hver Dag, dog saa,
at, for Exempel: Mandags Paroxysmus svarer i
Tid og Hæftighed mod Onsdags, og Tirsdags mod
den der kommer om Torsdagen. Man seer da til at
Livet holdes daglig aabent, den ene Dag med et La-
vement og den anden med noget Laxativ, dog saa at
det har gjort sin Virkning, inden Feber-Paroxys-
mus kommer. Ved Slutningen af hvert Anfald
bruges disse Draaber. Blive Paroxysmi alt for
haarde, saa maae man stille dem med Chinchina. P.
II. No. 9. Bandet er under hvert Paroxysmo
blegt, men naar den sluttes, er det farved. Heraf
seer man om Paroxysmus holder ved endnu eller er
overstaaet, hvilket er nodigt at vide, efterdi der intet
maa bruges saa længe den varer. Folger nogen
Lamhed paa Slag, saa legges Spansk Glue Plaster
Pag. 35. No. 23. der hvor Nerverne løbe ud af
Ryggraden, der gaae til samme Lem, for Exempel:
om den høire Fod er lam, saa legges det tæt ved
Lem-

Lenden eller Smal-Ryggen til den høire Side see Artic. om Crem. tarrari. Pag. 75. No. 40. Efter Besvimelser bør de (disse Draaber) indtages, helst om Pulsen derved har været eller er svag. Man forekommer dermed at Secretionerne ei standser. og at Blodet ingensteds faaer Størkne. Dosis er 30 til 40 Draaber i The eller Senikel-Vand.

No. 16.

Elixir pectorale.

Bryst-Elixir.

Dosis er 30 à 36 Draaber. Flasken skumpes altid vel naar det skal bruges. Det tages ind om Aftenen blandet i Egge-Blomme, lidet Vand og Sukker, som vispes tilsammen. Det bruges allene mod Hoste som forarsages af Krittlen i Luftrøret (Toux gouttourale) og Catarrhale Hoste. Begge faaes af Forkøling, bart Hoved i Kuld og Blæst, samt tynde Skoe og for tidlig anlagde Sommer-Klæder. Den som man faaer om Sommeren er fortrædeligst.

Begynder den med en Snue, ont i Halsen og Tunghed over Vanden, samt har Feber med sig, saa bør nødvendigt Aaren aabnes, i sær om man er Blodrig, fornemmer Dat i Hovedet saa længe man hoster og har svagt Bryst. Man forekommer derved Blodspytten eller og Inflammation paa Lungerne, thi en stærk Snue og Peripneumonie ere nær beslægtede. Derpaa tager man strax hver Dag et Laxativ, enten det aabnende
Elixir