

Lenden eller Smal-Ryggen til den høire Side see Artic. om Crem. tarrari. Pag. 75. No. 40. Efter Besvimelser bør de (disse Draaber) indtages, helst om Pulsen derved har været eller er svag. Man forekommer dermed at Secretionerne ei standser. og at Blodet ingensteds faaer Storkne. Dosis er 30 til 40 Draaber i The eller Senikel-Vand.

No. 16.

Elixir pectorale.

Bryst-Elixir.


Dosis er 30 à 36 Draaber. Flasken skumpes altid vel naar det skal bruges. Det tages ind om Aftenen blandet i Egge-Blomme, lidt Vand og Sukker, som vispes tilsammen. Det bruges allene mod Hoste som forårsages af Krittlen i Luftrøret (Toux gouttourale) og Catarrhale Hoste. Begge faaes af Forkøling, bart Hoved i Kuld og Blæst, samt tynde Skoe og for tidlig anlagde Sommer-Klæder. Den som man faaer om Sommeren er fortrædeligst.

Begynder den med en Snue, ont i Halsen og Tunghed over Vanden, samt har Feber med sig, saa bør nødvendigt Aaren aabnes, i sær om man er Blodrig, fornemmer Dat i Hovedet saa længe man hoster og har svagt Bryst. Man forekommer derved Blodspytten eller og Inflammation paa Lungerne, thi en stærk Snue og Peripneumonie ere nær beslegtede. Derpaa tager man strax hver Dag et Laxativ, enten det aabnende
Elixir

Elixir. Pag. 10. No. 8., eller et par Uncer Man-
na Suffer, som smeltes iet Beggere Oloft-Balde,
eller en Unce Electuar. Lenitiv., og naar det har
giort sin Virning og man har siddet i lunke Fods-
bad, tages Brøst-Elixiret Pag. 24. No. 16. om
Astenen, thi da plager Hosten mest og det man
faaer op er tyndt, det lindrer ei om man end faaer
aldrig saa meget op. Naar det som ophostes bli-
ver stadigt og gult (moedent,) faaer man først Lins-
dring og da bruges ei noget meer af bemeldte Mid-
del. Man holder sig blot i tempereret Varme og
drifker tilstrækkeligen, paa det at Opkastningen ei
maa for tidlig standse; i saadant Fald faaer man
nyt Arbeide igien, og er saa got som intet avanceret.

Under Curen bør man æde lidet, i Særdeles-
hed til Astens. Ried, surt, salt og alt det der kan
hidse, lader man og drifker desto mere The, Oloft-
Balde, tynde affilede Gryn-Supper, tynd og vel
silet Mandel-Melk. Bærelserne man er udi, bør
hverken være hede eller kolde. Er man nu i Var-
me nu i Kulde, saa bliver Halsen og Lufst-Røret
hudløst og rødt, ligesom Næsen og øverste Læben
i Catharre, og kan man paa den Maade læt skaffe
sig Lunge-Sot.

Er Kritte-Hosten, som grunder sig i Lufst-Rø-
ret, uden Tegn til Feber, saa pleier den gaae over, om
man stundom tager en The-Ske af Saucen paa
indsyltet Ingefær, eller blander man en The-Ske
stødt og sigtet hvid Ingefær med en god Mad-Ske
Honning og tager deraf en The-Ske af Gangen.
Et meget got Middel er udi en halv Potte tynd
Drifke at legge et Stykke Ingefær, dobbelt saa
m. get



meget Sukker, Candi og lidet usaltet Smør. Dets
Foges indtil Halvdelen, files og driffes varmt en
Tjekop hver eller hver anden Time.

Mave-Hoste er en heel anden Sygdom, Brys-
tet irriteres da til at hoste, ligesom Maven til Op-
kastning i Steen-Coliqve. Den kommer af Crudi-
terer i Maven og fiendes let igien af ureen Tunge
og Mund, Tunghed i Maven, Mad-Lede; Bæms-
melse, stor Mave, om Hosten i Særdeleshed kom-
mer efter Maaltidet, om der ved Mave-Munden
fornemmes Pricklen eller Bærk lidet førend Hosten
begynder, om den iblant sluites med Opkastning, og
derpaa følger længere Ro, om man længe kan holde
Aanden uden at nødes til at hoste; udi denne er
Bryst-Elixiren og Bryst-Safter skadelige. Beste
Curen er Mave-Elixiren Pag. 8. No. 6. Og
forud Bræk-Pulver, Pag. 64. No. 38. samt
undertiden den aabnende Elixir, Pag. 10. No. 8.

Ingen Slags Hoste bør forsømmes: Den
svækker Brystet, tager Mad-Lysten bort og hindrer
Søvnen, ei at tale om, hvor farlig al Hoste er for
dem, der have Brok, ere svangre, underkastede
Styrtninger, Slag, &c.

Naar Hoste hos gamle Folk af sig selv ophæ-
rer, og ellers hos dem der have Tunge-Sor, saa
lækker det mod Enden.

No. 17.

Lixivium Tartari.

Draaber imod Syrlighed.

Man drypper heraf i et Glas Vand 12, 15
à 20 Draaber, alt som det er stort til og drifter
ud