

Radix Salep in Pulv. redakt.

Pulver af Roden Salep.

Om et Qvintin heraf smektes ved maadelig
 Varme udi 8 Unser Vand, siiles og svaales, bliver
 deraf en Gelée, hvoraf en Ske fuld kan smektes i
 Vand, i Riis-Vand eller noaen Suppe, og drikkes
 efter Behag i Brid, Diarrhée, Blodsot, Colique,
 Strangurie, Green-Colique, Mæthed efter store Syg-
 domme, i Hætte-~~Klappen~~ og i alle Sygdomme
 med skarpe Bædsker, ligesaa i Bantrivenhed og
 Lungesot. Den nærer, addouicerer og styrker. Vil
 man fuge et Lod heraf $\frac{1}{2}$ Time udi Mælk, sauu leg-
 ge dertil lidet Sukker og Orange-Vand, saa faaer
 man en smagelig Mad i alle de Sygdomme, hvori
 det er tilladt at spise Mælk. Denne Rod findes just
 her i Landet og er mæer mucilagineuse end den Ori-
 entalske. (See Kongl. Videnskabs Acad. Hand-
 linger for Aar 1764. P. 245.

No. 36.

Flores Zinci.

Tørrende Pulver.

Er mageløst imod Hudløsshed og naar man har
 flævet Huden af. Man blander lidet deraf med Vand,
 dypper en linned Lap deri og applicerer. I langva-
 rige Sygdomme bliver man ofte Hudløs paa Ryg-
 gen. Mærker man nogensteds røde Pletter, saa
 kan man frygte for at Huden vil gaae af. Man pudrer
 dem strax med blaa Stivelse eller applicerer man
 Klude, som man har dyppet i Vund-Vand. P. 3.
 No. 1. eller Campher-Spiritus. No. 32 P. 58.
 Vil dette ei forslaa, saa gribes til Flores Zinci.

De

De som ere meget fede, blive ofte om Sommeren
Hudløse: De hjælpes paa samme Maade. Ligeledes
Børn som ofte blive Hudløse, naar de ikke blive om-
sindede hver Gang de have gjort sig vaade eller urene.

No. 32.

Sal Absinthii.

Malurts-Salt.

Et Quintin heraf smeltes i $\frac{1}{2}$ Pøgel Vand.
Derudi presses Citron-Saft indtil at ingen Brus-
sen mærkes. Siden ses dertil en eller 2 Skeder
Rhinsk-Biin og af Pomerantz-Sirup, saa meget
der behøves til at gjøre denne Julep nogenlunde
smagelig. Den bruges

§ 1 Til at stille Opkastning, ved hvilket man
ei faaer noget op. Koldt Vand med Citron-Saft
og lidt Sukker slaar ei gierne feil, men det tages
allene Skesfuldvis. Saa længe man kan faae Slim og
Crudireter op, bør man ei stille Opkastning, men
snarere besordre den med lunket Vand eller The af
Ramille-Blomster eller af carduus benedictus.
Siden kan man styrke Mæden med Mave-Elixiret.
P. 8. No. 6., eller med Grøden som omtales i Artic.
om Theriac. P. 60. No. 33., eller et Glas udvalgt
Biin. Ovenstaaende Julep kan og bruges.

§ 2 Udi Kolde Febere i Stæden for Digestiv-
Salt. Man drikker heraf en Thekop af Gangen
i de Feber-Frie-Timer. Foraar's Febere gaae ofte
hermed over. (See Laxere-Pulveret. P. 43. No. 28.

§ 3 Under Paroxysmus af Steen, Colique.
Man bør da tage deraf hele 8 à 9 Madskeer efter hver-
andre hver Time, indtil Stenen er sluppet ned.

E 4