

De som ere meget fede, blive ofte om Sommeren
Hudløse: De hjælpes paa samme Maade. Ligeledes
Børn som ofte blive Hudløse, naar de ikke blive om-
sindede hver Gang de have gjort sig vaade eller urene.

No. 32.

Sal Absinthii.

Malurts-Salt.

Et Quintin heraf smeltes i $\frac{1}{2}$ Pøgel Vand.
Derudi presses Citron-Saft indtil at ingen Brus-
sen mærkes. Siden ses dertil en eller 2 Skeder
Rhinsk-Biin og af Pomerantz-Sirup, saa meget
der behøves til at gjøre denne Julep nogenlunde
smagelig. Den bruges

§ 1 Til at stille Opkastning, ved hvilket man
ei faaer noget op. Koldt Vand med Citron-Saft
og lidt Sukker slaar ei gierne feil, men det tages
allene Skesfuldvis. Saa længe man kan faae Slim og
Crudireter op, bør man ei stille Opkastning, men
snarere besordre den med lunget Vand eller The af
Ramille-Blomster eller af carduus benedictus.
Siden kan man styrke Mæden med Mave-Elixiret.
P. 8. No. 6., eller med Groden som omtales i Artic.
om Theriac. P. 60. No. 33., eller et Glas udvalgt
Biin. Ovenstaaende Julep kan og bruges.

§ 2 Udi Kolde Febere i Stæden for Digestiv-
Salt. Man drikker heraf en Thekop af Gangen
i de Feber-Frie-Timer. Foraar's Febere gaae ofte
hermed over. (See Laxere-Pulveret. P. 43. No. 28.

§ 3 Under Paroxysmus af Steen, Colique.
Man bør da tage deraf hele 8 à 9 Madskeer efter hver-
andre hver Time, indtil Stenen er sluppet ned.

E 4

64 i Blærren, thi da ophører strax Smerten og Vands
Det, som under Paroxysmus var blegt, bliver nu tykt.
Ellers bruger man og, i Haab om at lindre denne
gruelige Pine, en Saft som beredes af 8 Skefuld
The, der gøres af en Urt som kaldes Parietara, 4
Skeer kold-presset Mandel-Olie og lige saa megen
Althea-Syrup, hvori presses Saften af en Citron.
Dette blandes vel, og indtages inden $\frac{1}{2}$ Time. (See
videre herom det hvide Antispasmodiske Pulver.
P. 68. No. 39.

No. 38

Pulv. Radicis Ipecacuanhæ.

Jeg giver heraf aldrig en heel Dosis, men
deeler den, for Exempel: 18 à 20 Gran i 3 Deele,
hvoraf en Deel først indtages, og dersom den en
har virket inden $\frac{1}{2}$ Time, indgiver jeg den anden
Deel, og isald den ei virker inden $1\frac{1}{2}$ Quarter,
maa den 3die Deel indtages, da en eller anden
Opkastning sikkert følger, saa fremt Pulveret en
er gammelt. Til Born paa 2 eller 3 Aar tager
jeg kun 3 Gran, blander dem med 18 Gran Suk-
ker, deeler det i 3 Deele, og indgiver det med sam-
me Barsomhed. Jeg er da sikker paa, aldrig at
kunde forarsage for stærk Opkastning, men kan
styre den efter den Syges Modtærsi og Kræfter.
En Haandduk bindes om Livet naar man skal bræk-
ke. Man drikker intet oven paa Pulveret, men desto
meer lunket Vand mellem hver Opkastning. Born
behøver ei at drikke stort, efterdi de have Bædske nok
forud