

Dette Pulver bør de ofte tage eller drifke Balde, som deraf tillaves med Mælk, saa Blodet aldrig bør komme i Balling, men Livet dagligen holdes aabet. Bevægelse er dem nødvendig, men aldrig stærk, aldrig i Bæst og ondt Veir. Naar de ved Motion er komne i Damp, maa de en standse, inden de kommer under Tag i et maadelig varmt Bærelse. De bør en staae stille i Soelskin og en promenerer i Soels Heeden uden Parasol af hvidt Løi. De maa tage sig i Agt for Alas og Røg, derfor bør i deres Bærelse Spiels det en luffes: Middags-Sovn er dem heller ikke tienlig, ligesom lang Sovn er dem skadelig, saavel som trange Klæder og haardt bunden Halsdug. De bør en venne sig til at holde Hovedet meget varmt. Hoste og Brækning hindrer Blodet fra at flyde frit ned fra Hovedet; derfor bør derimod strax søges Hielp. Saadanne bør en smage, raabe stærkt, løfte noget tungt eller bukke Hovedet ned for at tage noget op af Gulvet, og det alt af samme Aarsag. Saa snart de mærke usædvanlig Rødhed i Kindene eller paa Kindbenet og dem synes at Halskluden er for trang, naagter at den en er haardere bunden end sædvanligt, bør de lade aabne Aaren paa sig og siden laxere, thi ellers fornemmes nyt Anstød.

Er man vandt til at have flydende gylden Aare, og den standser, bør man en søge at fage den aabnet ved Aloe-Piller; men saa ofte det gøres nedigt, bruge Blod-Tgler.

No. 41.

Semen Santonici.

Orm-Sro.

Paa Apotheqver findes 2de Slags, et stort

5

og

og et smaat. Dette sidste vælger man, stöder det noget lidet, ströer deraf en eller to Thefkeer paa et Smørre: Brød eller paa Honnig som er smurt paa Brød og lader Barnet spise om Morgen; eller giver man et Par Thefkeer i Pattevarmt Melk hver Morgen i Medener eller sidste Qvarter, helst i sammes Begyndelse og Slutning. Man kan og giøre smaa Bolder deraf med Melk og rulde dem i Pomerantz Syrup, da et Barn gierne tager dem. Naar Barnet har taget det i 3de Dage, lader man det tage en Dosis af Rhabarber-Tincturen P. 10. No. 7. 2de Dage i Rad. Man fortsarer paa denne Maade flere Medener efter hinanden, i Haab at döde og uddrive disse ubehagelige Gæster. Guldroorne kunde af dette Frø tage en heel Madste paa samme Maade og undertiden laxere paa Laxere-Pulveret P. 43. No. 28. som uddriver Orme endog Bændel-Orme. Birke-Saft eller Fyrre-Saft driver ligeledes Orme; men man drikker af den første eller suger af den sidste saa meget at man deraf faaer Diarrhée, da Ormene gemeentligen gaar sin Vej. Faaer man ey tilstræffeligen deraf, saa er det forgæves. En ordentlig Brønd-Cur med vore Mineral-Bande slaar sielden Feil, helst om man somme Aftener spiser Jordbær, da Formiddagen derpaa følger sterk Afgang. Salt Søe-Band driver og Orm. Fra Engeland forsikres, at Helleborus fætidus skulle være Souveraine mod Orm, i sær mod dem der ligne Jord-Orme. Alt Bræk-Pulver promte stiller paastaende Plage af Orm, er allerede sagt P. 66. §. 6. de sædvanligste Tegn til Orm ere: at Barnet ofte kløer sig i Næsen, ofte skifter colour i Ansigtet, sprins

springer i Søvn, lader i Søvn ligesom det ville svelge, det har slem, sur Aande, Munden er fuld af Vand naar det om Morgenerne vaagner. Det har snart Leede, snart igien Lust til Mad, ja ofte saa stærk, at det vil besvime, om det en strax saaer noget at æde. Mavnen bliver stor imod den sædvanlige Maaltids Tid. Det saaer ondt i Mavnen af Sukker, ligeledes naar det nyder usædvanlig Spise, helst paa fremmede Stæder. Nu er det friskt og muntert, et Øyeblik derefter kan det klage over ondt i Mavnen eller Brød omkring Navlen. Det blir usformodentligen syg uden kiendelig Aarsag, saaer Febere eller Opkastning, som mesterdeels hastigt gaaer over, men kommer en anden Gang lige usformodentligen igien. Kommer hertil at Orm har nogen Gang viset sig, saa er ikke mere Tvivl derom.

No. 42.

Piller af Rhabarber-Extract.

Den, der er besværgt af de saa kaldede Fleurs blanches (det hvide Flod) tager heraf 2de Stykker af Gangen Morgen og Aften en Tid lang; de stille dem endeligen uden Fare, som man ellers af grove stoppende Midlerne kan befrygte. The og Coffé, i Særdeleshed med Gløde, bør dog aldeles lades. Men i Besynderlighed ere de tienlige i tilstødende Diarrhéer. Dersom en ellers frisk faaer Diarrhée, er det hannem ofte gavnligt. En Hoben Samlinger i Mave og Tarmer eller fra andre Stæder i Legemet, som en ere udslypne der de bukte, maa ofte paa denne Maade komme sin Bei, og forekommes derved Sygdomme, som de ellers havde fundet forarsage.