

det strax igit; da ere de plagede af Brid. Excrementerne ere da enten allerede grønne, eller blive de, eller bliver Bleen grøn saasnart den bliver tør. De lugte og suure, og i Fald nogen Vind stiger op, saa har den saur Lugt.

Bed saadanne Omstændigheder bør man strax give Barnet en liden Knivs-Åad (eller 10 Gran) af Gangen udaf dette Pulver i lidet Fennikel- Vand 4 à 5 Gange om Dagen, eller naar man kan komme til, indtil at det faaer Åabning og excrementerne har faaet guul Coleur. Skulle det med Åabningen gaae langsomt, saa appliceres et Lavement af 6 Skeblade Bomuls og lidet Sukker. Gemeentligen gaaer Briddet hermed snart over. Skulle mere behøves, saa kan Barnet tage flittigt af Barne-Melken see No. 43. blant Recepterne og Moderen eller Ammen af Amme-Pulveret see No. 43. blant Recepterne hvilke begge findes optegnede i Underrættningen om Barne-Sygdomme P. 23. og 24. Vil Moderen eller Ammen en gierne tage Amme-Pulveret, saa giver man hende flittigt af Draaberne mod Syrlighed P. 26. No. 17. hvilke Bønder-Koner paa Landet burde bruge, naar de giver sine Børn Dæ, og de meest, som om Sommeren skeer leve ved saur Melk, hvoraf kommer, at deres Børn saa ofte have Brid, og faaer deraf Hierte-Klappen, som endes med Slag.

No. 44.

Emplastrum Diapompholygos.

Dette bruges i Rosenagtige Svulster omkring Saar, samt for saadanne inflammationer i Huden, hvilke man haver Haab om at kunde fordele; naar ikke er Saar i Huden, kan det blandes med lidet Camphor.

No.