

5

PARS PRIMA.

TRACTATUS PRIMVS.

CAPVT PRIMVM.

*De simplicibus Medicamentis vſitatioribus
in Officinis reſervandis.*

 Ranium hominis violenta morte extincti.	Maxillæ Lupi pifcis.
Cancrorum lapilli.	Mumia.
Caſtorium.	Os è cordi Cervi.
Coagulum leporis.	Ungula Alcis.
Cornu Cervi igne cal- cinatum.	Pinguedo Anatina.
Cornu Cervi ſine igne præparatum.	Anſerina.
Cornu Unicornu.	Canis.
Cornu Cervi crudum.	Capi.
Ebur.	Humana.
Fel tauri.	Vulpina.
Genitale Cervi, & Tauri.	Vrſi.
Dens Apri.	Sevum Cervinum.
Iecur Lupi.	Caprinum.
	Hircinum.
	Medulla Cervina.
	Vitulina.
	Pulmo Vulpis.
	A 3 Scin.

Scincus.
 Sanguis Hirci.
 Vipera. Trochisci ejus.
 Moschus.
 Cantharides.
 Zibetum.
 Bezoar Orientalis.
 Occidentalis.
 Ichthyocolla.
 Serici folliculi.
 Sperma Ceti.
 Sanguisugæ.
 Granatus.
 Hyacinthus.
 Rubinus.
 Sapphirus.
 Smaragdus.
 Margaritæ præparatæ.
 Cryſtallus.
 Asphaltus.
 Succinum.
 Ambra gryſea.
 Corallium rubrum.
 Album.
 Spongia.
 Os Sepiæ.

Sal.
 Corallina.
 Pumex.
RADICES.
 Acori.
 Althææ.
 Angelicæ.
 Apij. Ari.
 Aristolochiæ longæ.
 Rotundæ.

Afari.
 Asparagi.
 Asphodeli.
 Beën.
 Biſtortæ.
 Borriginis.
 Bryoniæ.
 Capparis.
 Caryophilli.
 Cardo patij.
 Chinæ.
 Cichorei.
 Cyperi longi, rotundi.
 Cyclaminis.
 Coſti.
 Dictamni.

Doro-

Doronici Romani.

Ebuli.

Enulæ Campanæ.

Eryngii.

Hellebori albi.

Nigri.

Endiviæ.

Efulæ.

Filicis.

Fœniculi.

Fraxinellæ.

Galangæ.

Gentianæ.

Glycyrrhizæ.

Graminis.

Hermodactyli.

Imperatoria.

Iridis Illyricæ.

Ialappæ.

Lapathij.

Laserpitij.

Liliorum.

Mandragoræ.

Ononidis.

Nymphaeæ.

Philipendulæ.

Peonia maris.

Pentaphylli.

Petroselin.

Peucedani.

Polypodij quercini.

Polygoni.

Pimpinellæ.

Pyretri.

Phu pontici.

Rheu pontici.

Rhabarbari.

Raphani.

Rubiæ tinctorum.

Rusci.

Saxifragiæ.

Scorzoneræ.

Satirij.

Scyllæ.

Schrophulariæ.

Symphyti.

Spica Nardi Celtica.

Indica.

Turbith.

Tormentillæ.

Vincetoxici.

Zarzæ parillæ.

Ze-

Zedoariæ.
 Zinziberis.
 Lignum Aloes.
 Guaiaci.
 Sassafras.
 Nephriticum.
 Santalum.
 rubrum.
 album.
 flavum.
 Viscus quercinus.
 Xylobalsamum.
 Rhodium.
 Asphalatum.
 Cortices Capparorum.
 Ligni Guaiaci.
 Cinamomi.
 Casia lignea.
 Cerasi nigri.
 Arantiorum.
 Granatorum.
 Mandragoræ.
 Tamarisci.
 Mediana Sambuci.
 Calyces glandium.
 Fraxini.

Abrotanum.
 Absynthium.
 Acetosa.
 Althea.
 Agrimonia.
 Apium.
 Atriplex.
 Artemisia.
 Asplenium.
 Agnus castus.
 Adiantum vtrumque.
 Anethi summitates.
 Betonica.
 Beta. Beccabunga.
 Branca Virfina.
 Borrago.
 Buglossum.
 Botris.
 Bursa pastoris.
 Bugula. Bistorta.
 Cauda equina.
 Calamintha.
 Carduus benedictus.
 Cassuta.
 Chamædrys.
 Chamæpitys.
 Cicho-

Cichorium.
 Carduus Mariæ.
 Capillares omnes.
 Caprifolium.
 Cochlearia.
 Dictamnium Creticum.
 Ebulus.
 Eupatorium aquaticū.
 Endiuia.
 Euphrasia cum floribus.
 Elenium.
 Erysimum.
 Fœniculus.
 Fumaria.
 Folia Senæ.
 Lauri.
 Hyssopus.
 Hædera terrestris.
 Lupulus.
 Lauri folia.
 Lauendula cum floribus.
 Matricaria.
 Malua.
 Maiorana.
 Marrubium.
 Melilotum.

Melissa.
 Menta.
 Mentastrum.
 Mercurialis.
 Menta crispa
 aquatica.
 Millefolium.
 Nepeta.
 Ocymum.
 Origanum Creticum.
 vulgare.
 Pilosella.
 Persicaria.
 Parietaria.
 Perfoliata.
 Plantago.
 Pulegium.
 Portulaca.
 Polythrichum.
 Pulmonaria.
 Persicaria.
 Rosmarinus.
 Ruta communis,
 muraria.
 Sabina.
 Squinantum.

B

Sani-

Sanicula.
 Salvia.
 Satureia.
 Scabiosa.
 Scolopendria.
 Scordium.
 Serpillum.
 Sifymbrium.
 Semper viuum.
 Solatrum.
 Soldanella.
 Stachas.
 Trifolium odoratum.
 Tussilago.
 Thymus cum flor.
 Veronica.
 Verbascus.
 Verbena.
 Violaria.
 Vinca peruinca.
 Amygdala.
 dulces.
 amaræ.
 Anacardi.
 Baccæ Iuniperi.
 Bacci lauri.

Capita papaueris.
 Caricæ.
 Corymbi Hederæ.
 Capparis.
 Faba rad. cauæ.
 Cubebæ.
 Cerasorum nuclei.
 Carpo balsamum.
 Vuæ passæ.
 Tamarindi.
 Cassia fistularis.
 Cydonia. Lapides mes-
 pillor.
 Dactyli.
 Colocynthis.
 Galla.
 Iuiubæ.
 Caryophilli.
 Glandes.
 Malum punicum.
 Mirabolani
 flau.
 kebuli.
 emblici.
 Bellerici.
 Indi.

Myn-

Myrtilli. Macis.
Sebesten.
Nuces cupressi.
Nux Indica.
 pineæ.
 vomica.
 moschata.
Oliuæ.
Pistachiæ.
Nuces auellanae.
Prunæ.
Vuulæ passæ seu Corin-
 thiæ.
Kermes grana seu
 Coccus baphica.
Piper album. Longum.
 nigrum.
Berberis.
Citri mali.
Citoniorum.
Ribes.
Granatorum.
Mel.
Oleum.
Omphacium.

11
Succus Rosaceus.
Violarum.
Acacia.
Aloë.
Asa foetida.
Balsamum Peruui-
 num.
Bitumen Iudaicum.
Cera.
Euphorbium.
Glycyrrhiza.
Hypocistis.
Ladanum.
Licum.
Opium.
Saccharum.
Sang. Draconis.
Manna Calabrensis.
Gom. Ammoniacum.
Bdellium.
Benzoi.
Colophonia.
Galbanum.
Gommi Arabicum.
 Tragacanthi.
 Hederæ.

B 2

Cerasi.

Cerasi.	Mali punici.
Elemi.	Buglossæ.
Animæ.	Borraginis.
Tacamahaca.	Chamemeli.
Caranna.	Croci.
Mastiche.	Epithymi.
Myrrha.	Genistæ.
Opoponax.	Lauendulæ.
Olibanum.	Liliorum alborum.
Sagapenum.	Lilij conuallij.
Terebinthina Veneta,	Meliloti.
Communis.	Nympheæ.
Sarcocolla.	Prunellæ.
Styrax calamita, liqui-	Rosarum.
da.	Sambuci.
Staete.	Verbasci.
Sandaraca.	Violarum.
Resina pini. Abietina.	Primulæ veris.
Camphora.	Centauri minoris.
Gutta gamba.	Hypericonis.
Scammonium.	Betonicæ.
Tartarum vini albi.	Calendulæ.
Thus album & rubr.	Papaueris erratici.
Flores Anethi.	Saluiæ.
Anthos.	Scænanthum.
Balaustium.	Tiliæ.
	Amcos.

Semen Ameos.
 Anisi.
 Amomi.
 Acetosæ.
 Anethi.
 Apij.
 Aquilegij.
 Asparagi.
 Alkekengi.
 Basiliconis.
 Carthami.
 Ciceris.
 Citri.
 Citrulli.
 Coriandri.
 Cotoniorum.
 Cucurbitæ.
 Cumini.
 Cucumeris.
 Dauci.
 Erucæ.
 Foeniculi.
 Fœnugræci.
 Fabæ.
 Hordeum integrum &
 excoriat.

33
 Hyosciami.
 Hyperici.
 Lactucæ.
 Lentium.
 Ligustici.
 Iuniperi.
 Fraxini.
 Lini.
 Maluæ.
 Agni casti.
 Maioranæ.
 Melonum.
 Nasturtij.
 Nigellæ.
 Orobi.
 Oleris atri.
 Peoniæ maris.
 Papaueris albi.
 Petroselini.
 Pastinacæ.
 Plantaginis.
 Portulacæ.
 Rhaphani.
 Rusci.
 Rutæ.
 Sumach.

B 3

Saxi-

Saxifragiæ.
 Sefelij.
 Staph. agriæ.
 Milij solis.
 Vrticæ.
 Bardanæ.
 Atriplicis.
 Bombacis.
 Cannabis.
 Carui.
 Endiuia.
 Lupini.
 Napi. Nardi.
 Nuclei Perficorum.
 Pfillij.
 Sileris montani.
 Scariolæ.
 Sinapi.
 Aurum.
 Argentum.
 Auripigmentum.
 Ærugo.
 Æs vstum.
 Æris squama.
 Alumen rupium.
 Vstum.

Cadmia.
 Calcanthum.
 Calcithis.
 Calx.
 Cerussa.
 Chrysocola.
 Cinnabaris.
 Ferrum.
 Gypsum.
 Lithargyrum.
 Minium.
 Nitrum.
 Plumbum vstum.
 Pompholix.
 Tuthia.
 Spodium.
 Stibium, Antimonium.
 Sulphur.
 Argentum viuum.
 Lapis Armenus.
 Lapis Lazuli.
 Lapis Hamatites
 Iudaicus.
 Magnes.
 Lyncis.
 Terra sigillata.

Terra

Terra lemnia.
 Vitriolum album.
 Cyprium.
 Hungaricum.

Sal Armeniacus.

Borax.

Ostiocolla.

Sal gemmæ,
 petræ seu nitrum.

Sublimatum.

Præcipitatum.

FARINÆ.

Amylum.

Fabarum.

Fœnugræci.

Hordei.

Lupinorum.

Orobi.

Radicum Altheæ.

Consolidæ maioris.

Seminis Lini.

Volatilis.

Circa simplicia Annotandum.

A Nimalium partes, quæ vsui Medico inferuiunt, ex Animalibus iuuenibus colligi debere, non senioribus, morbosis, aut macris, sed pinguibus, aut saltem bene carnosis & bene habentibus, idque mox vbi fuerint mactata, & minimè suâ sponte mortua.

Quando autem Herbacea, aut Plantarum partes decerpendæ, & colligendæ sint, vnicum pro omnibus tempus vix determinari cùm possit, hæc de singulis ex Auicenna lib. 6. & Dioscoride in Præfat. habeto:

Folia

Folia colligenda sunt, vbi debitum incrementum affecuta, humore plena & succulenta, priusquam aut colorem immutare, aut sponte suâ defluere inceperint.

Semina quando plena sunt, debitam magnitudinem & maturitatem adepta, omni austeritate & cruditate concocta.

Flores vbi expandi cœperint (nisi Rosæ rubræ pro Conserua facienda sint) & nondum decidere.

Radices vbi vegetæ sunt, & non exsiccatae, quales illo tempore esse videntur, quo folia suâ sponte plantam reliquentes defluunt, & non quando planta in caulem assurgit.

Caules, scapique, vbi iustum augmentum sunt consecuti, vegeti, turgidi, non marcidi autem, vel corrugati.

Lachrymæ & Gommi ante totalem eorum exsiccationem & ariditatem, postquam tamen satis spissè concreuerint.

Fructus autem maturi, & Solis ardore bene concocti, solidi, & pleni antequam decidant, sunt decerpendi; quamuis hæ Regulæ omnes tam generales esse non possint, quin certis quibusdam casibus exceptionem patiantur; nam sicuti Iuglandes, fructus Rubi Idæi, vulgò Framboise, &c. ad hoc vt condiantur, perfectâ maturitatem non postulant,
ita

ita in alijs vsibus aliter alia sese habere possunt.

Colligenda autem sunt Cælo sereno, sicco, non turbido non nebulis aut pluuijs iniurioso, non noctu, vt de herba S. Ioannis vulgus fabulatur, non certis ceremonijs, aut verbis recitatis, vt superstiosè cum suis vult Wierus: cum hac tamen animaduersione, quod Agrestes plantæ Hortenses virtute precedant: inter siluestres autem illæ omnibus, si haberi possunt, sunt præferendæ, quæ in montibus natæ, loco luci patente, aëri, ventisque exposito, Solique Orienti obuerso.

Quoad exsiccationem Herbarum illis ad conseruationem necessariam, merito quidam dubitant, quomodo *Galenus lib. 5. de compos. med.* dicat illas exiccari debere paulatim, non ad Solem, ita vt non humidæ, nec siccæ nimium reponantur, cum vix possibile videatur, eas, nisi ita solis ardore confectas, reseruari posse. Sed dicendum per *nimiam siccitatem* Galenum quasi exustionem, & omnium virium extractionem intelligere, quæ in illis partibus facile fieri posset, vbi Galenus hæc forte conscripsit, nempe in Italia aut Græcia, ubi Solis ardor & radij vehementiores, non autem benigni, vt in nostris partibus temperatioribus.

C

Acetum

Acetum Squilliticum.

R Tunicarum Scyllæ paratæ lib. f.
Aceti Vini lib. iiij.

Misceantur in vasculo bene clauso, & insolentur
per xxxv. dies; rejectis tunicis acetum colatum
seruetur ad Vsum.

Acetum Sambuci.

Calendulæ.

Rosarum, &c.

Simili ferè modo præparantur ad libitum vnus
cuiusque, sicuti alia quam plurima, quare genera-
lem ea conficiendi Methodum hic apposui-
mus, nempe:

R Florum suprascriptorum in vmbra siccato-
rum Lib. 5.

Aceti fortissimi ex Vino lib. iiij.

Insolentur calore Æstiuo in Vitro bene clauso, &
reiectionis floribus conseruetur Acetum.

Aqua

Aqua simplices Stillatitia.

A Bsynthy.
Arthemisiæ.
Agrimonix.

Acetosæ.

Betonicæ.

Borraginis.

Buglossæ.

Bursæ Pastoris.

Cychorei.

Cochleariæ.

Cardui Sancti.

Chelidoniæ.

Caprifolij.

Calendulæ.

Endiuia.

Euphragiæ.

Farfara.

Fœniculi.

Florum Fabarum.

Florum Liliorum Con-
vallium.

Fumariæ.

Fragrorum.

Graminis.

Hyssopi.

Kalendulæ.

Liliorum alborum.

Lactucæ.

Maluæ.

Melissæ.

Matricariæ.

Portulacæ.

Plantaginis.

Papaueris rubri.

Parietariæ.

Petroselini.

Rosarum.

Roris marini.

Saluiæ.

Scabiosæ.

Scorzonera.

Schordij.

Solatri.

Saxifragiæ.

Tiliæ.

Violarum.

C 2

De

De quorundam Simplicium Præparatione, in usu Medico necessaria.

Æris Præparatio.

℞. Æris optimi in lamellas deducti q. v. aspergatur, Sale, Nitro, & Sulphure S. S. S. in fictili cum ignis sufficientia, cinis derelictus, affusa aquâ sepius dulcoretur; Ita & Plumbum etiam præparatur.

Agarici Præparatio

Nil aliud est, quam Agaricus Trochiscatus.

Aloës Præparatio.

Si sordida sit, dissoluatur aquâ simplici, & colata de siccet.

Aluminis ustio.

℞. Aluminis scissilis q. placet, imponatur crucibulo, & tam diu igne comburatur, donec spumare desinat.

Ari, vel Araonis radices Præparatio.

℞. Radicum Ari mundatarum q. v. incisæ macerentur in Spiritu vini, vel vino albo per 24. horas

horas, & effuso vino exsiccentur in vmbra ad
vsum.

Chalybis Præparatio.

℞. Limaturæ Chalybis q. placet in scutella vitrea
ta, affundatur Aceti vini ad eminentiam aliqua-
lem, ponatur loco calido per aliquot dies, de-
inde exsiccentur lento igne, & molatur super
tabulam marmoream. Alij loco Aceti sumunt
Spiritus Sulphuris, vel vitrioli. Sunt & aliæ
Chalybis per Sulphur, aliaue, præparationes,
quas ad Tractatum de Chymia detulimus.

Colochyntidis Præparatio

Non est alia, quam in Trochiscos alhandal ef-
formatio.

Coriandri seminis Præparatio.

Maceratur ordinariè in Aceto pauco tempore,
& exsiccat, sed macerationem illam non neces-
sariam fore iudicamus, cum Semen illud ficcum,
gratissimum, nullam malignitatem in se habeat
quæ correctione indigeat, sed econtra disperditur
eius gratus odor, & sapor.

C 3

Coruu

Corni Cerui Præparatio.

Huius præparatio variè fieri solet: primo vstione in igne aperto ad albedinem; alio modo, vapore destillationis Aquarum Cordialiū, dum extremitates, & duriores partes filo suspenduntur in Alem-bici cacumine, ad friabilitatem, deinde in Marmore leuigentur in puluerem inpalpabilem. Simili modo præparantur ossa alia ad vsum Medicum.

Cranij humani Præparatio.

℞. Cranij raspati hominis violenta morte perempti q.v. cum s.q. aquæ Liliorum conualliū, fiat pasta; quæ ex siccata puluerifetur, & fiat pasta cum aqua Pæoniæ; & Tertio cum aqua Florum Tiliæ; & Quarto cum aqua Cerasorum nigrorum, & exsiccata reducatur in Puluerem.

Elaterij Præparatio.

℞. Fructus maturos Cucumeris asinini q.v. munden-
tur à Seminibus, ex fructibus decisis in
duas partes, mucago, & succus extrahitur, quæ
lento igne inspissatur ad Pillularum consisten-
tiam, & fit Elaterium.

Ra.

Radicum Esulæ Preparatio.

Rx. Radicum Esulæ q. v. mundetur, & infundatur in Aceto per triduum, & exsicceetur, ad vsum.

Radicum Hellebori albi, & nigri Preparatio.

Rx. Radicum Hellebori albi, vel nigri q. v. mundetur à lignea parte, & maceretur in Aceto per triduum, & exsicceetur.

Lapidis Calaminaris Preparatio.

Rx. Lapidis Calaminaris q. v. ter calefac, & extingue Aquâ Rosarum & Plantaginis. Simili modo paratur Calx, & Aqua dulci extinguitur.

Hyrudinum selectio, & asseruatio.

Capiantur Hyrudines ex Torrente, vel Aqua purissima; sint Coloris Hepatici, medianæ magnitudinis, asseruentur Hyeme in caueis, & Æstate in Sole Phialæ inclus. Aqua sit fluuiialis, vel pluuiialis, quæ sepius renouetur, & phiala mundetur, non ante trimestre à captura, in vsum Medicum adhibeantur, ne venenato morfu ægrorum corpora afficiant.

Lapides

Lapidis Lazuli Preparatio.

Lazulus Vratur in Crucibulo, deinde teratur & toties Aqua pluuiali abluatur, & vltimo Borragnis, donec Aqua Limpida post lotionem maneat.

Lumbricorum Preparatio.

Lumbrici terrestres Vino Maluatico toties abluantur, donec omnem impuritatem deposuerint, exsiccentur, & in vsum seruentur.

Margaritarum, & Lapidum Pretiosorum, aliorumque duriorum Preparatio.

Pulueriscentur, & terantur prius in mortario ad subtilitatem, deinde super Porphirium ducantur cum Aqua Cordiali in Alcohol.

Opij Preparatio.

℞. Opij q. v. Trituretur, & dissoluatur Spiritu Vini, colatura expressa exsicceetur lento igne in vsum.

Scamoniij Preparatio.

℞. Scamoni Puluerisati q. v. indatur in pomo Cydonio excauato, quod pastâ farinacea obdutum sub cineribus, vel in furno, coquatur, & hoc Scammonium, vocatur *Diagridium* aliquas Præ-

Præparationes practicant alij, quas etiam bonas approbamus, sicuti quando dissoluitur Scammonium succo Cydoniorum, & exsiccat, vel grosso modo tritaturatum Scammonium superponunt duplicatæ chartæ emporeticæ, & prunis iniiciunt flores Sulphuris continuò spatulâ Scammonium agitando, donec pinguescat, & quasi liquefiat, quod in puluerem redactum seruetur in vsum.

Tuthia Preparatio.

R. Tuthiæ q. v. ter calefactum & ter Aquâ Plantaginis extinctum super Marmor in puluerem impalpabilem leuiget.

Vitrioli in rubedinem Calcinatio.

R. Vitrioli puluerisati q. v. primo lento igne exsiccat, ad albedinem in vase terreo non lutato, deinde igne aucto vratur ad rubedinem, ex quo facto lixiuio fit quoddam sal.

Pulmonum vulpis Preparatio.

Pulmo vulpis mundetur ab Arterijs, & vasis durioribus, lotusque vino, vel aquâ (in qua decoxeris hyssopum, & Scabiosam) exsiccat loco tepido, & Absinthio, Marubio, & hyssopo inuolutus seruetur ad vsum.

D

San.

Sanguinis Hirci Preparatio.

Hircum mediæ ætatis in diebus Canicularibus mactato, & sanguinem concretum (priùs tamen serositatibus abiectis) in clibano exsiccato. Nec opus est hircum domi alere Apio, Petroselino, & alijs, sed alatur in montibus, pascuis, inter segetes alijsque in locis, in quibus salubriores decerpet herbas.

Scilla Preparatio.

℞. Scillam integram ab inutilibus corticibus repurgatam, circumda pastâ farinaceâ, & in clibano ad panis duritiem coquito, ac dempta postea, frustra laminosa filo traiecto separatim exsiccentur in loco perflabili.

Therebinthina Coctio.

℞. Therebinthinæ claræ venetæ q. v. coquatur in s. q. aquæ puræ ad duritiem, vt pilulæ efformari possint, liquida dissoluitur in potu vitellis ouorum paulatim in mortario subigendo, & vehiculo miscendo.

Dentis

Dentis Apri Preparatio.

Ry. Rasuræ dentis Apri q. v. fiat pasta cum s. q. aquæ Cardui Mariæ, exsiccata redigatur in pulverem, & fiat pasta cum aqua Papaveris Rheados, exsicceetur, & puluerisetur ad vsum.

Lacca Preparatio.

Lacca cùm ramis, & corticibus arborum accrescat, scatet innumeris sordibus, à quibus vt expurgetur, non sufficit simplex ablutio in aqua calida, sed cùm liquabilis sit, liquefiat in aqua, & vt fieri solet in purificatione ceræ, fiat colatio & expressio fortis per pannum, sordibus in eodem derelictis, deinde decoctum expressum refrigeratum munde-
tur à lacca, vel lenta coctione inspissetur ad debitam consistentiam.

Hyrundinum Vstio.

Pulli hyrundinum ingulentur sine sanguinis effusione, & modico sale asperso vrantur in fictili obturato in cineres. Eodem modo vrantur Ranæ, Erinacei, Millepedes, Bufones, &c.

De Feculis.

Quid fæcula sit aut eius nomine intelligendum veniat, ex solo ipsius fiendi modo clarè satis apparet. Eliciuntur plerumque ex Radicibus viridibus; ex folijs autem numquam, aut rarò, idque hoc modo:

℞ Radicum Bryoniæ v. g. q. s.

Lotum, vel rasum fortiter in mortario contundatur, parum subinde aquæ affundendo, vt fiat pulpa crassiuscula, qua fortissimè expressa, colaturam liquidam, vt fæces subsideant, reponè, & vbi subsederint, exsicca, & habebis fæculam perfectam; hoc modo fiunt fæcula

Ari,
Lupinorum;
Orizæ,
Pisorum,
Siliginis,
Tritici &c.

Quæ cùm facili negotio perfici queant, nullo modo necesse est illas paratas referuare, sed Medici mandatum expectent.

Deco-

*Decoctum Cordiale solutivum, siue Commune
Laxativum.*

℞. Hordei mundi p. ij.

Prun. n. xij.

Passular. mund.

Glycirrh. nas. an. ʒ. ʒ.

Seminis Anisi,

Fœniculi an. ʒij.

Fol. sennæ ʒij.

ʒ. flor. Cordial. an. p. j.

F. Decoctio in aq. comm. q. s. siue ℥ ij. ad ℥ jʒ.

Aqua Hordei.

℞. Hord. mund. ʒj. bull. in aq. comm. ℥ ij. ad ʒxij.

Decoctum Ptisana.

℞. Hord. mund. ʒij.

Passular. ab acin. mund. ʒij.

Glycirrhizæ rasæ ʒj.

Decoque in aq. comm. ℥ xij. ad ℥ viij.

Decoctio communis Clysteris.

℞. 4. Herbar. emollient. an. M. j ʒ.

Sem. Fœniculi ʒ ʒ.

Decoque in aq. hordei ℥ ij. ad ℥ j. seruetur vsui.

D 3

De-

Decoctum Clysteris Carminativi.

℞. Semin. Anisi,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Cumini,
 Carui an. ʒiij.
 Baccar. Lauri ʒij.
 Flor. Camom.
 Anethi. an. M.ʒ.
 Passular. ʒjʒ.

Decoquantur omnia in aq. comm. ʒij. ad ʒj.

Decoctum Pectorale solutivum.

℞. Hordei integri ʒʒ.
 Passular. enucleat. ʒiij.
 Iuiubarum.
 Sebesten an. N. vij.
 Dactylorum N. iij.
 Caricar. pingi. N. ij.
 Glycirrh. raf. ʒij.
 Capilli Veneris,
 Farfaræ,
 Hyssopi an. p. j.

Coquantur in aq. comm. q. s. ad ʒj.

Nota

Nota, quòd vbi Decoctio duplicanda est, ingredientia omnia, vti & ipsam aquæ, siue alterius liquoris quantitatem quidem esse duplicandam, sed non diutiùs debere excoqui, vel amplius ex ea consumi: nam sicuti vna hora sufficit, vt vncia vna v. g. virtutem suam aquæ communicet, ita eadem hora sufficiens erit ad hoc, vt secunda ingredientis vncia in duplicato addita, etiam in aquam superadditam suas vires exerat: vnde tantundem aquæ duplicato decocto solummodo addendū est, quantum vnius horæ spatio insumi posse suspicamur: ita vt si libræ duæ, ad libram vnā in Decocto simplice decoquendæ; in duplicato libræ Quinque v. g. decoquendæ sunt ad Quatuor: nisi fortè, tam multifaria essent ingredientia, vt tam parua aquæ quantitas eorum virtutem capere non posset, quod in Apozematibus interdum fieri natum est.

Deinde quamuis ex Mineralibus quibusdam decocta fieri possint, talibus nempe, quæ vires suas iusculis communicare non renuunt; qualia sunt terræ quædam, Lapides, Metalla, Antimonium, Mercurius crudus, Cinnabaris, Lithargyrum, &c. maximè si calcinata fuerint, & liquor adhibeatur penetrante facultate præditus, vti vinum, acetum, aquæ stillatitiæ, &c.

Com.

Communiore tamen decocta, ac in praxi magis obuia fiunt ex Radicibus, Corticibus, Herbis, Floribus, Baccis, Fructibus, lignis & Seminibus, quibus interdū siue minerale quodpiam, siue pars animalis quædam superaddi solet. Quod si liquoris, in quo reliqua decoquenda sunt, nulla in præscriptione Medici facta sit mentio, cū Analogū per se positū stet pro famosiore significato, accipienda est aqua fontana, vel communis. Decoctio autem s.a. (quod non rarò addi solet, fit, quando coquendæ materiæ, non simul, & semel iniiciuntur, sed vnum prius, & aliud posterius, prout nempe naturæ volatilioris, fixioris, durioris, & mollioris fuerit: cumque hoc, illo concoctionem longiorem requirat, liquoris quantitas exactè determinari vix potest, quamuis res illa tam obscura non sit, quin Tironibus lumen aliquod accendi possit: nimirum quando additur, *Aquæ, aliussuè liquoris q.s.* tunc pro singulis rerum siccarum vncijs, addi possunt liquoris plus minus novem; pro viridium verò 3j. liquoris circiter 3vj. vt fiat decoctio ad mediæ, vel tertiæ partis consumptionem.

Notandum vltimò, quod vncia j. & penè M. jß. & 3j. atque p. jß. ferè sibi respondeant, loquendo saltem de simplicibus communioribus.

T R A.