Erste Abtheilung.

Einfache Mittel.

Abrotanum. Das Kraut. Eberraute.

Artemisia Abrotanum Linn. Eine strauchartige Pflanze, im südlichen Europa und im Orient einheimisch, bei uns in Gärten gezogen.

Das Kraut bitter gewürzhaft; die untern Blätter doppelt halbgefiedert, die obern halbgefiedert mit fadenförmigen Einschnitten, einem auf der untern Fläche hervorragenden Nerven, und einem sehr zarten weichhaarigen Ueberzuge. In den Monaten Juli und August einzusammeln.

Die Eberraute. Das Stabkraut, Stabwurz, Harthagel, Gartheil.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Die Pflanze wächst auf trocknen Bergen in Frankreich, Italien, Syrien ꝛc. Der Stengel ist strauchartig, von Grund an in zahlreiche runde 3 bis 4 Fuß hohe Aeste getheilt. Die Rinde ist bräunlichgrau und nur an den kurzen aufrechten blüthetragenden Aestchen, die in großer Anzahl gegen das obere Ende an den Hauptästen hervorkommen, grün. Die Blätter sind mit bloßem Auge betrachtet graulichgrün, gleichsam bestäubt, mit der Loupe zeigt sich, besonders auf der untern Seite, der erwähnte weichhaarige Ueberzug. Sie haben einen angenehmen Citronengeruch, daher auch die Pflanze in unsern Gärten den Namen Citronkraut, Citronelle führt. Die kleinen gelblichen Blüthen stehen in einseitigen Trauben auf kurzen nickenden Blüthenstielchen.

Zum pharmaceutischen Gebrauche werden die Spitzen vor dem Aufblühen eingesammelt, die aber durch das Trocknen den angenehm aromatischen Citronengeruch größtentheils einbüßen.

Sechszehn Pfund frisches Kraut geben kaum drei Drachmen ätherisches Oel. Das braungefärbte Infusum hat einen citronenartigen Geruch, einen

bitter gewürzhaften Geschmack; wird durch schwefelsaures Eisen geschwärzt und durch Galläpfeltinctur getrübt.

Die Eberraute wird als nervenstärkendes und auch als Wurmmittel, der ätherisch-öligen Theile wegen im Aufgusse, nicht in der Abkochung, oder im Pulver verordnet, bisweilen auch zu zertheilenden Umschlägen gebraucht.

Absinthium. Das Kraut. Wermuth.

Artemisia Absinthium Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands.

Das blühende Kraut mit den zusammengesetzten halbkugelförmigen, nickenden Blüthen, die untern (Wurzel-) Blätter dreifach halbgefiedert, die obern (Stengel-Blätter) doppelt halbgefiedert, die obersten ungetheilt, mit lancettförmigen nach vorn hin breiteren Einschnitten, auf beiden Seiten, vorzüglich auf der untern, mit einem seidenartigen haarigen Ueberzuge bedeckt; Geschmack sehr bitter, Geruch stark gewürzhaft. Ist von den dickern Stengeln sorgfältig gereinigt aufzubewahren, und in den Monaten Juli und August einzusammeln.

Wermuth, Wermuthbeifuß, Wurmtod.

Absinthium officinale. Richt.

Artemisia Absinthium. Linn.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.

Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Der Wermuth ist in den südlichern Ländern Europas einheimisch, kommt jedoch nicht selten auch in Deutschland in der Nähe von Ruinen, an wüsten Stellen und unfruchtbaren Feldern wild vor, wird auch häufig in Gärten angebaut.

Die Wurzel ist perennirend, der Stengel krautartig, aufrecht 4—5 Fuß hoch, ästig und gleich den Blättern mit einem Ueberzuge fest anliegender weißer Haare bedeckt, wodurch die ganze Pflanze ein aschgraues Ansehen erhält. Bei der cultivirten Pflanze, die höher wird, auch größere Blätter bekommt, verliert sich zum Theil die graue Farbe, sie büßt aber auch zugleich einen großen Theil ihrer Arzneikräfte ein.

Die gelben, fast kugelrunden Blüthen stehen an den abstehenden Aesten in zahlreichen, einseitigen, wenigblüthigen Trauben auf kurzen nickenden Blüthenstielchen.

Alle Theile dieser Pflanze haben einen eigenthümlichen starken Geruch, und einen ausnehmend bittern und gewürzhaften Geschmack.

Man sammelt sowohl das Kraut, als auch die Blüthentheile (**Summitates Absinthii.**)

Der Wermuth enthält ein sehr kräftiges ätherisches Oel. Nach Ha-

gen und Dörffurt erhält man aus 20 Pfunden trocknen Krauts 1, 1½ bis 2 Unzen ätherisches Oehl von brauner Farbe. An wäßrigem Extract giebt der Wermuth beinahe den dritten Theil seines Gewichts. Wiegmann erhielt von dem jungen saftigen Kraute aus einem Pfunde fünf Unzen Extract, aus dem obern fast blühenden Theile nicht vier Unzen, aber weit bitterer, und vom Pfunde über zwei Scrupel Oel.

Die Bestandtheile des Wermuths sind ein bitterer Extractivstoff, freie Essigsäure, essigsaures Kali, salzsaures und schwefelsaures Kali, schwefelsaure Talkerde, grünes Harz, ätherisches Oel und Pflanzenfaser. Die Asche enthält viel Kali, sonst unter der Benennung Wermuthsalz (Sal Absinthii) berühmt. Die Arzneikräfte des Wermuths scheinen nicht sowohl in den ätherisch-öligen, als vielmehr in den bittern Bestandtheilen zu liegen; er wird daher zweckmäßig in gelinder Abkochung, am besten in einem halbweinigen Aufguß, seltner in Pulverform, als stärkendes und reizendes, die unterdrückte Thätigkeit des Magens hebendes Mittel, auch als Wurmmittel verordnet; auch findet er äußerlich, als zertheilendes Heilmittel zu Kräuterkissen Anwendung; ferner dient er zur Bereitung der Tinctur, des Extracts u. s. w.

Acetum. Essig.

Wird in eigenen Fabriken aus verschiedenen weinigen Flüssigkeiten durch die saure Gährung bereitet.

Eine saure, gelbliche Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruche, Essigsäure und noch andere Stoffe aus dem Wasser und den bei der Bereitung angewandten vegetabilischen Materien enthaltend. Er enthalte so viel Säure, daß zwei Unzen hinreichen, um eine Drachme kohlensaures Kali vollständig zu sättigen. Eine Verfälschung mit Schwefelsäure wird durch einen zu reichlichen mit salpetersaurem Baryt hervorgebrachten Niederschlag erkannt; genauer noch erkennt man dieselbe, wenn der bis zur Honigdicke verdampfte Essig der Destillation unterworfen, und das Destillat mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser vermischt wird, wo eine schweflige Säure anzeigende Trübung Spuren von Schwefelsäure verräth. Verfälschung mit scharfen Stoffen, durch das scharfe Princip verschiedener Vegetabilien bewirkt, wird, nach der Neutralisation durch Kali oder Natron, leicht durch den Geschmack entdeckt. Metallbeimischungen werden durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser und durch blausaures Eisenkali erforscht.

Der Essig war den ältesten Völkern bekannt; schon Moses erwähnt desselben.

Der Essig ist ein Product der sauren Gährung, welcher zwar gewöhn-

lich, jedoch nicht immer, die geistige Gährung vorausgeht, obgleich man eine Zeitlang, durch Boerhaave veranlaßt (Element. Chimiae. 1732. II. p. 180) dies als nothwendig angenommen hatte. Das Sauerwerden der Gurken, des Kopfkohls (Sauerkraut) u. s. w. erfolgt, ohne daß eine Weinerzeugung vorausginge.

Hinsichtlich der Erzeugung des Essigs wußte man lange, daß weinige, jedoch an Weingeist arme Flüssigkeiten eine große Neigung haben, in die saure Gährung überzugehen und daß die Verwandlung derselben in Essig beschleunigt werde, wenn man sie einer Temperatur von 20—25° R., und gleichzeitig dem Einflusse der atmosphärischen Luft aussetzte. Auch hatte man sich überzeugt, daß z. B. in dem Weine nur der Weingeist sich in Essig verwandele, welches man durch die Annahme zu erklären suchte, daß der Alkohol Sauerstoff aufnehme und dadurch gesäuert werde, was in der That der Fall ist. Jedoch konnte man von der Ursache dieser Erscheinung, also davon, was den Alkohol bestimme, Sauerstoff in sich aufzunehmen und sich zu einer Säure zu verdichten, keine Erklärung geben. Daß in dem Processe der Gährung eine besondere Thätigkeit, durch eine unbekannte Kraft hervorgerufen, herrsche, erkannte man deutlich, als man fand, daß reiner Weingeist mit reinem Wasser in solchen Verhältnissen gemischt, welche den zur Säuerung geneigten Weinen entsprechen, unter den für die Gährung günstigen Umständen, nicht in die Essiggährung übergehe, und daß durch andere Stoffe, z. B. Ferment, erst die Bedingungen zu dieser eigenthümlichen Thätigkeit gegeben werden müssen. Welche Kraft aber hier walte, und von welcher Art der Proceß der Essiggährung, oder der Gährung überhaupt, sey, diese Frage ist auch wohl jetzt noch nicht mit völliger Gewißheit zu beantworten.

Herr Dr. Goebel (Schw. N. J. X. 3. S. 257.) bemerkte, daß das aus einer weingährenden Flüssigkeit durch eine in dem Spunde des Fasses befestigte, mit Most angefüllte, 36 Zoll lange Glasröhre entweichende kohlensaure Gas einen phosphorischen Schein verbreite, und daß das Licht der Gasblasen beim Aufsteigen immer schwächer wurde, und endlich ganz erlosch, so wie die Gasblasen mit der Luft in Berührung kamen. Herr Prof. Schweigger, hierdurch veranlaßt, suchte durch Aufstellung der zwischen dem Galvanismus und der Gährung stattfindenden Analogie es wahrscheinlich zu machen, daß der Gährungsproceß ein elektrischer Proceß sei, und das bemerkte Leuchten der entweichenden Kohlensäure als ein elektrisches Leuchten angesehen werden könne. Diese Ansicht ist durch die wichtigen Versuche des Herrn Dr. Kölln (Ueber das Wesen und die Erscheinungen des Galvanismus. 1825.) noch mehr begründet worden, da es durch besondere Anordnung der zum Gährungsproceß erfoderlichen Substanzen gelang, wirklich elektrische Erscheinungen hervorzurufen.

Döbereiner hatte schon längst vermuthet, daß bei der Essiggährung ein positiv-elektrischer Zustand des Weingeistes diesen zur Säuerung (zur Aufnahme des negativ-elektrischen Sauerstoffes) bestimme, daß also positive (und gleichzeitig negative) Elektricität die erste Ursache der Essiggährung seyn möge.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0032-4

Diese Vermuthung wurde durch den Erfolg mehrerer von ihm angestellten Versuche bestätigt. Werden nämlich 10 Gran des von Edm. Davy entdeckten Platinsuboxyds mit 10 Gran absolutem Alkohol in Berührung, und die Masse bei einer Temperatur von 12° R. unter eine große mit atmosphärischer Luft und Sauerstoffgas gefüllte, und mit Queckſilber gesperrte graduirte Glasglocke gebracht, so wird der Alkohol im Augenblicke der Berührung ausgezeichnet positiv-elektrisch; das Gemenge erwärmt sich nach einigen Minuten, stößt Dämpfe aus, welche sich an der Wand der Glocke verdichten, das Volumen der eingeschlossenen Luft verringert sich allmälig, und nach 24 Stunden ist dieselbe um 18,2 Kubikzoll ihres Raumes vermindert, der Alkohol aber gänzlich in Essigsäure und Wasser verwandelt, während das Platinpräparat sich völlig unverändert zeigt. 100 Gran reinen Alkohols nehmen 69 Gran Sauerstoff auf, und bilden damit 110,66 Gran reiner völlig wasserfreier Essigsäure und 58,33 Gran Wasser. Bei dieser Umwandlung des Alkohols in Essigsäure wird keine Spur von Kohlensäure gebildet; wenn diese daher beim Gährungsprocesse der Essigbildung auftritt, so muß sie aus andern in der Flüssigkeit enthaltenen Bestandtheilen, dem Zucker oder Schleim, hervorgehen, da diese vermöge ihrer Constitution nicht, wie der Alkohol, in Essigsäure und Wasser unter Zutritt der atmosphärischen Luft zerfallen können, sondern, weil der in ihnen enthaltene Kohlenstoff nicht ganz in die Mischung des neu gebildeten Stoffes eingeht, dieser Ueberschuß des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoffe der Luft Kohlensäure bildet, welche in Gasform entweicht.

Die Wirkung des Platinpräparats, welches, wie erwähnt worden, unverändert bleibt, scheint blos mechanisch, zur Ausgleichung der elektrischen Kräfte dienend, zu seyn, ähnlich der Wirkung des staubigen metallischen Platins auf das Wasserstoffgas und Sauerstoffgas, welche unter Vermittelung desselben zu Wasser zusammentreten.

Diese Methode der Essigfabrication wird man nach Döbereiner leicht im Großen ausführen können, wenn man die Säuerung des Alkohols in solchen mit Luft erfüllten verschlossenen Räumen erfolgen läßt, wie man zur Säuerung des Schwefels in Schwefelsäurefabriken anwendet. Herr Hofrath Döbereiner hat sich bereit erklärt, hiezu mündlich Anleitung ertheilen zu wollen.

Bis jetzt ist der gewöhnliche Essig stets ein Product der sauren Gährung, und man benennt ihn Wein-, Honig-, Obst-, Frucht- oder Biereſſig, je nachdem er aus Wein, Meth, Cider, gegohrnem Malzauszug oder Bier bereitet worden. Der Weineſſig kann, wie der Name schon anzeigt, nur in den Weinländern erzielt werden, wo die schlechtern Weinsorten und auch die von selbst in anfangende Essiggährung übergegangenen Weine zur Bereitung des Weineſſigs im Großen in besonders dazu eingerichteten Fabriken benutzt werden. Aber auch alle Säfte süßer Beeren und Früchte, welche Zucker- und Gährungsstoff, und als Nebenbestandtheile Schleim, Aepfelsäure, Citronensäure, Weinsteinsäure u. s. w. enthalten, und demnach,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0033-0

wenn sie sich selbst überlassen bleiben, ganz ohne alles Zuthun in die weinige Gährung übergehen, ferner Gemische aus Zucker und Honig mit Ferment und Wasser, sind vermögend, in die Essiggährung überzugehen und gute Essige zu liefern.

Zum pharmaceutischen Gebrauch eignet sich jedoch vorzüglich ein solcher Essig, der aus dem reinen Erzeugnisse der geistigen Gährung, dem Weingeiste selbst, bereitet worden, wozu sich der wohlfeile Kartoffelbranntwein recht gut eignet, welcher von dem Fuselgeruche durch Kohle befreit werden kann (dadurch nämlich, daß man 100 Maß desselben mit 12—15 Pfunden gröblich zerstoßener frisch ausgeglühter Holzkohle vermengt, und ihn damit unter öfterem Umrühren einige Stunden lang in Berührung, und sodann durch Spitzbeutel von Filz laufen läßt), und leichter als jeder andere Branntwein säuert. Nach Döbereiner (Anleitung zur kunstgemäßen Bereitung der Essige. 1819.) vermische man in einem hölzernen Bottich 100 Maß starken Branntwein mit 800 — 900 Maß lauwarmen reinem Fluß- oder Regenwasser, setze der Flüssigkeit die nach folgender Vorschrift bereitete Essigmutter zu: nämlich ein Pfund gute Hefen wird mit zehn Pfund Honig, sechs Pfund fein gepülvertem Weinstein, und sechs Maß bestem Obst- oder Fruchtessig vermengt, das Gemenge in einen irdenen oder steinernen Topf und 3—4 Tage lang in die Nähe eines geheizten Stubenofens gebracht, nach welcher Zeit das Ganze sich vereinigt hat, und jetzt die Essigmutter darstellt: füge dann noch 15—20 Maß guten Essig hinzu, und rühre alles wohl durch einander. Hierauf vertheile man das Ganze entweder auf kleine Essigfässer oder auf steinerne Krüge, wovon jeder 16—20 Maß faßt, und stelle diese ungefähr nur $\frac{3}{4}$ damit gefüllten Gefäße neben und unter einander in die Essigstube, wo Tag und Nacht eine Wärme von 18—20° R. unterhalten wird. Nach wenig Tagen hebt die saure Gährung an, die Flüssigkeit wird nach und nach trübe und dabei wärmer, als die sie umgebende Luft ist, sie kommt in sanfte innere Bewegung und läßt ein zischendes Geräusch wahrnehmen; auf ihrer Oberfläche entsteht eine kahmige Haut oder Decke, und in ihr selbst bildet sich gleichzeitig eine fadenartige, schleimige Materie, die sich nach und nach theils an den Seitenwänden des Gefäßes absetzt, theils zu Boden sinkt. Die Flüssigkeit nimmt, während dieses erfolgt, einen sauren Geruch an, welcher immer stärker wird, ihre Temperatur fällt dann allmälig und die Flüssigkeit selbst wird endlich wieder ganz klar und hell. Dieser Gährungsproceß ist in 2, höchstens 3 Wochen beendigt, und die Flüssigkeit in einen starken, säurereichen Essig verwandelt. Ist dies der Fall, dann ziehe man mittelst eines Hebers den fertigen Essig von dem breiartigen Bodensatze ab, fülle ihn auf große Fässer und lasse ihn hier sich abklären. Der Bodensatz, welcher auf den Gährungsgefäßen zurückbleibt, kann als Essigmutter zur Säuerung einer neuen Quantität mit 8—10 Theilen Wasser vermischten Branntweins benutzt werden, nur muß man ihn zuvor wieder mit soviel Honig und Weinstein vermischen, daß auf 100 Maß Flüssigkeit, welche zu Essig werden soll, ein Pfund Honig und ein halbes Pfund Wein-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0034-5

stein kommt. Das kürzeste und beste Mittel jedoch, die saure Gährung in mit Wasser verdünntem Branntwein oder in andern weinigen Flüssigkeiten zu erregen, ist ein recht lebendiger Essig, d. h. ein solcher, welcher zeitig, stark und nicht gesotten worden ist.

Möge nun diese oder jede andere Vorschrift zur Essigbereitung befolgt werden, so bestehen doch immer die Haupterfoderniße in Folgendem:

1) In dem Daseyn einer weingeisthaltenden, oder der weinigen Gährung fähigen Flüssigkeit; geistarme Flüssigkeiten liefern nur einen schwachen und nicht haltbaren Essig.

2) In der Gegenwart säuernder Gährungsmittel, diese mögen nun der Flüssigkeit absichtlich zugesetzt werden, oder in derselben schon enthalten seyn.

3) In dem Zutritte der atmosphärischen Luft, denn aus dieser zieht der Weingeist langsam Sauerstoff an, verbrennt gleichsam nach und nach halb, und wird dadurch zu Essigsäure. Die Umwandlung des Weingeistes in Essigsäure erfolgt daher um so schneller, je größer die Berührungspunkte zwischen der Luft und der Flüssigkeit sind, daher in kleinen, leicht bedeckten Gefäßen, und wenn diese nur bis auf $\frac{2}{3}$ ihres Raumes angefüllt sind, schneller als in großen Fässern.

4) In der steten Einwirkung einer mäßigen Wärme. Diese darf jedoch nicht über 18—20 ° R. steigen, weil sonst der gährenden Flüssigkeit geistige Theile entzogen werden, und hat die Essiggährung einmal begonnen, so kann die Temperatur noch niedriger, etwa nur 15 ° seyn. Die Wärme durchdringt nämlich die Flüssigkeit, dehnt sie aus, macht die Bestandtheile des Weingeistes lockerer, und so diesen selbst zugleich zum Verbrennen, oder zur Aufnahme des Oxygens geneigter als er an und für sich ist.

Vortheilhaft ist es, die Luft des Gährungszimmers mit Essig- und Branntweindunst dadurch zu schwängern, daß man mit starkem nicht gesottenen Essig und etwas Branntwein genäßte große leinene Tücher in demselben aufhängt, so lange bis sie trocken sind, und dies Verfahren einigemal wiederholt. So wird die Luft selbst ein kräftiges Essigferment und die Säuerung der Essigmasse erfolgt in derselben schnell, und schreitet rasch vorwärts. Hat die saure Gährung angefangen, so beschickt diese selbst die Luft stets mit saurem und geistigem Dunste, und erhält sie auf diese Art in einem dem Essigbildungsprocesse günstigen Zustande. Zuführen von frischer Luft verzögert mithin die Bildung des Essigs. Eben so muß man den Raum des Gährungszimmers vor Erleuchtung durch das gewöhnliche Tages- und Sonnenlicht schützen, wenn das in demselben aufgestellte Essiggut schnell zeitigen soll. Diese Wirkung ist wohl von der bekannten desoxydirenden oder sauerstoffentziehenden Eigenschaft des Sonnenlichts abzuleiten. Endlich wird die saure Gährung auffallend beschleunigt durch die Gegenwart fester Substanzen, z. B. kleiner Rosinen (Korinthen). Ganz klare Flüssigkeiten, z. B. Branntwein mit Wasser verdünnt und mit Essig vermischt, gähren viel langsamer als trübe.

Guter Essig muß vollkommen klar und durchsichtig und nur leicht hell-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0035-1

gelb, nicht dunkel, gefärbt seyn, einen mäßig sauern Geschmack besitzen, und zwischen den Händen gerieben, einen angenehmen geistigsauren Geruch entwickeln. Ist der Essig reich an Säure und vollkommen klar, so hält er sich an einem kühlen Orte lange, ohne zu verderben; ist er dieses aber nicht, so wird er kahmig und verdirbt, so daß er sich in Fäden ziehen läßt, nach und nach alle seine Säure verliert und endlich in Fäulniß übergeht.

Um diesem Verderben Einhalt zu thun, muß der trübe Essig von Zeit zu Zeit vollkommen klar auf andere Fässer abgezogen, oder wenn er sich von selbst nicht klären will, mit Hausenblase geschönt werden. Der schon im Verderben begriffene Essig kann dadurch gerettet werden, daß man ihn einige Minuten kochen läßt, und zweckmäßig schreibt hier die **Pharmacopoea americana**, um das **Acetum purificatum** zu bereiten, vor, den Essig mit frisch ausgeglühtem Kohlenpulver zu kochen, abzuschäumen, durch doppelte Leinwand zu coliren, und nachher durch Filtriren und Absetzenlassen von dem Bodensatze zu trennen. Der schwache und säurearme Essig kann auch dadurch verstärkt werden, daß man etwas Branntwein und Weinstein zusetzt, ihn 6—8 Wochen lang im Keller liegen läßt, und ihn hierauf auf ein reines Faß klar abzieht. Nicht unpassend vergleicht Döbereiner den ungesottenen Essig mit den Magen der Thiere: immerfort sucht er neue Nahrung, nämlich Weingeist, und wenn man ihm diesen reicht, so verzehrt er ihn und verwandelt ihn ebenfalls in Essig; läßt man ihn aber hungern, so stirbt er nach und nach gleich einem Thiere ab, und geht in Fäulniß über.

Die Stärke des Essigs wird darnach bestimmt, daß zwei Unzen desselben eine Drachme Kali sättigen. Diese erfoderliche Stärke kann ihm aber durch Zusatz einer andern Säure ertheilt worden seyn, und ein Zusatz von Schwefelsäure wird leicht an der Trübung und dem Niederschlage erkannt werden, die salpetersaurer oder salzsaurer Baryt hervorbringt, indem der Baryt mit der etwa vorhandenen Schwefelsäure verbunden, als auch in zugesetzter Salpetersäure unauflöslicher Schwerspath erscheinen wird.

Von dem essigsauren Blei muß der Essig nicht bedeutend getrübt werden, auch der sich zeigende Niederschlag in einigen Tropfen Salpetersäure leicht auflöslich seyn, in welchem Falle der Niederschlag weinsteinsaures und äpfelsaures Blei war, Säuren, die wohl immer in dem rohen Essig enthalten sind; bleibt aber der Niederschlag unaufgelöst, so war schwefelsaures Blei erzeugt worden. Er kann aber auch von Salzsäure, die in Essig enthalten war, herrühren, und die Gegenwart dieser Säure wird noch besonders nachgewiesen durch den weißen käsigen Niederschlag, welcher durch schwefelsaures und salpetersaures Silber, Hornsilber, erzeugt wird.

Das als noch genauere Probe auf Schwefelsäure angegebene Verfahren, den bis zur Honigdicke verdampften Essig der Destillation zu unterwerfen, beruht darauf, daß die Schwefelsäure durch die in der dicken Flüssigkeit enthaltenen kohlenstoffhaltigen Substanzen eines Theils ihres Sauerstoffs, welcher mit Kohlenstoff verbunden als kohlensaures Gas entweicht, beraubt und in die leicht flüchtige schweflige Säure verwandelt wird, welche mit den

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0036-7

wäßrigen Theilen zugleich überdestillirt. Wird das Destillat mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser vermischt, so werden der in der schwefligen Säure enthaltene Sauerstoff, und der in dem Schwefelwasserstoff gebundene Wasserstoff sich zu Wasser verbinden, und der aus beiden Verbindungen ausgeschiedene Schwefel wird eine Trübung hervorbringen. Diese Trübung muß aber im ersten Momente der Vermischung erkannt werden, da auch das schwefelwasserstoffhaltige Wasser für sich allein sich bald an der Luft trübt. Ueberhaupt möchte es selten nöthig werden, diese Probe anzustellen, da die oben angegeben Reagentien auf Schwefelsäure genügende Genauigkeit gewähren, ja ein durch dieselben angezeigter geringer Gehalt an Schwefelsäure den Essig noch nicht unbrauchbar macht und als absichtlich verfälscht ausweist, indem eine durch die Reagentien hervorgebrachte geringe Trübung von schwefelsauren Salzen herrühren kann, welche zufällig in den Essig hineingekommen sind.

Eine etwanige, jedoch gewiß seltene Verfälschung mit Salpetersäure wird dadurch erkannt, daß das mit Kali gebildete Salz auf Kohlen verpufft; sollte der Gehalt an Salpetersäure bedeutend seyn, so wird schon ein solcher Essig Federn leicht gelb färben.

Zu einer Verfälschung mit scharfen Pflanzenstoffen werden weißer, langer oder spanischer Pfeffer, Bertramwurzel, Kellerhalssaamen, Seidelbastrinde, Senf, Paradieskörner u. s. w. gebraucht. Ein solcher Essig wird nach Verhältniß seiner Schärfe wenig Kali sättigen, und die durch Verdunsten der Saturation erhaltene Salzmasse wird auf der Zunge und der Lippe ein deutliches Brennen hervorbringen, welches bisweilen schon der rohe Essig erkennen läßt, deutlicher aber noch, wenn man ein Maß Essig bis zur Syrupsdicke verdunstet, und nun mit diesem Rückstande Lippen und Wangen bestreicht.

Jede metallische Verunreinigung wird in dem bis zur schwachen sauern Reaction neutralisirten Essig durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser und schwefelwasserstoffsaures Ammoniak angezeigt, welche dann bräunliche oder schwärzliche Niederschläge erzeugen. Blei wird durch zugetröpfelte Schwefelsäure präcipitirt, und durch eine Zinkstange metallisch niedergeschlagen. Durch blausaures Kali wird ein kupferhaltiger Essig roth, ein eisenhaltiger blau und ein zinnhaltiger weiß niedergeschlagen; jedoch muß auch hier der Essig bis zur schwachsauren Reaction neutralisirt worden seyn. Ist der Kupfergehalt bedeutend, so wird Ammoniak eine bläuliche Färbung hervorbringen, welche noch deutlicher hervortritt, wenn man vorher den Essig durch Verdunsten concentrirt. Auch wird das Kupfer durch ein in den Essig gestelltes polirtes Eisen, z. B. Messer, reducirt, und es legt sich metallisch an das Eisen an.

Worauf bei den wirklichen Weinessigen noch Rücksicht zu nehmen ist, wird bei Vinum angemerkt werden.

Ueberhaupt muß ein guter Essig nach dem Verdunsten nur einen geringen Rückstand hinterlassen, welcher eingeäschert nur eine Spur Asche giebt, hinterläßt er mehr, so enthält er viel Weinstein.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0037-3

Der Essig ist mit Wasser und Weingeist in allen Verhältnissen mischbar, nimmt die Gummiharze auf, ohne sie jedoch wirklich aufzulösen; von dem Campher aber löst er eine geringe Menge auf. Er wird innerlich und äußerlich angewendet.

Acidum muriaticum crudum. Spiritus Salis. Rohe Salzsäure. Salzgeist.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem salzsauren Natron durch zugesetzte Schwefelsäure oder geröstetes schwefelsaures Eisen.

Eine saure, weiße oder gelbliche, oft rauchende, ätzende Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruche, außer der Salzsäure gemeiniglich noch Schwefelsäure, bisweilen Chlor, schweflige Säure und Eisen enthaltend.

Specifisches Gewicht = 1,130 — 1,200.

Diese von Alters her bekannte Säure hat ihren Namen vom Kochsalze erhalten. Basilius Valentinus stellte im 15. Jahrhundert dieselbe durch Destillation des Kochsalzes mit Eisenvitriol dar, Glauber im 17. Jahrhundert aus Kochsalz mit Schwefelsäure. Bei Anwendung der Schwefelsäure wird durch diese mächtigere Säure von dem Natron die Salzsäure getrennt, und als in der Wärme flüchtig durch Destillation in der angebrachten Vorlage erhalten. Wendet der Fabricant aber schwefelsaures Eisen an, so werden durch gegenseitige Zersetzung schwefelsaures Natron und salzsaures Eisenoxyd gebildet. Dieses letztere wird durch die angebrachte Hitze zersetzt, die Salzsäure verflüchtigt und das Eisenoxyd bleibt mit dem schwefelsauren Natron in der Retorte im Rückstande.

Die strohgelbe Farbe und ein safranartiger Geruch, welche die im Handel vorkommende Salzsäure gewöhnlich begleiten, sind beinahe immer einem Gehalt an Eisen, welches die Salzsäure bei der Destillation mit hinüber nimmt, zuzuschreiben und diese, so wie die andern angegebenen Verunreinigungen, durch starke Hitze bei der Destillation herbeigeführt, machen die Säure zum technischen Gebrauche, wozu sie allein verwandt werden darf, nicht unbrauchbar.

Die zum pharmaceutischen Gebrauche bestimmte Salzsäure wird in der zweiten Abtheilung abgehandelt werden.

Acidum nitricum crudum. Spiritus nitri. Aqua fortis. Rohe Salpetersäure. Scheidewasser.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem salpetersauren Kali durch zugesetzte Schwefelsäure oder geröstetes schwefelsaures Eisen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0038-9

Ein saure, weiße oder gelbliche, ätzende Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruche, außer der Salpetersäure gemeiniglich noch salpetrige und Salzsäure, seltener Schwefelsäure enthaltend.

Specifisches Gewicht = 1,200 — 1,300.

Die Araber scheinen zuerst die Kunst erfunden zu haben, aus dem Salpeter die Säure abzuscheiden. Nach Andern ist sie von Raimund Lull im Jahr 1225 entdeckt worden. Basilius Valentinus lehrte sie aus dem Salpeter durch Eisenvitriol, Glauber durch Schwefelsäure bereiten.

In den Fabriken wird auch jetzt noch das Scheidewasser aus dem Salpeter großentheils durch Eisenvitriol ausgeschieden. Das Kali des Salpeters verbindet sich hiebei mit der Schwefelsäure des Vitriols zu schwefelsaurem Kali und die Salpetersäure mit dem Eisenoxyd zu salpetersaurem Eisen, von welchem die Säure bei höherer Temperatur leicht wieder getrennt werden kann. Die Destillation geschieht in großen eisernen Retorten, die inwendig mit einer dicken Kruste von rothem Eisenoxyd überzogen werden, damit sie die Säure nicht auflöse. Die Salpetersäure wird in großen Glasgefäßen aufgefangen, in welche man Wasser gegossen hat. Durch die Hitze wird ein großer Theil der Säure zerlegt, und durch die dabei gebildete salpetrige Säure das Glas blutroth gefärbt. Die salpetrige Säure wird aber nachher in Wasser aufgelöst und saugt auch den größten Theil des vorher bei der Zersetzung der Salpetersäure entwickelten Sauerstoffgases wieder auf.

Da der hierzu verwandte Salpeter stets Kochsalz enthält, so ist auch die gewonnene Säure mehr oder weniger salzsäurehaltig. Das Vorhandenseyn der salpetrigen Säure ist durch das vorhin Angeführte erklärt; Schwefelsäure wird nur dann das Scheidewasser verunreinigen, wenn bei einem zu großen Verhältnisse der Schwefelsäure oder des schwefelsauren Eisens ein solcher Hitzegrad angewendet worden, daß auch diese schwer flüchtige Säure übergetrieben wurde.

Wie diese zu technischen Zwecken brauchbare Salpetersäure auch zum pharmaceutischen Gebrauche geeignet dargestellt werden kann, wird im 2ten Theile angegeben werden.

Acidum pyro-lignosum crudum. Rohe Holzsäure.

Wird in chemischen Fabriken aus verschiedenen, vorzüglich den härtern Holzarten durch trockne Destillation bereitet.

Eine saure, bräunliche Flüssigkeit von empyreumatischem Geruche. Sie enthalte wenigstens so viel Säure als der rohe Essig.

Die in dieser Flüssigkeit enthaltene Säure ist die Essigsäure, die aber hier nicht Product eines Gährungsprocesses, wie bei dem rohen Essig, sondern Product einer Zersetzung des Holzes ist, welches in eisernen Retorten einer starken Rothglühhitze ausgesetzt wird, so wie überhaupt diese Säure bei Verkohlung der Vegetabilien aus ihren Bestandtheilen gebildet wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0039-7

Der Holzessig wird jetzt häufig als Nebenproduct beim Brennen des Holzes zu Kohlen in den Kohlenmeilern, die mit einem Destillirhelm versehen werden, gewonnen, und des wohlfeilen Preises wegen zu technischen Zwecken benutzt. Auch ist er sehr geeignet animalische Substanzen gegen Fäulniß zu schützen, seiner Benutzung aber zur Erhaltung animalischer Nahrungsmittel steht der Gehalt an brenzligem Oele entgegen, welches allen in dem Holzessig eingemachten Substanzen einen brenzligen Geschmack mittheilt, der sich durch nachheriges Abkochen nicht ganz entfernen läßt.

Von den Mitteln, den Holzessig zu reinigen, wird im 2ten Theile die Rede seyn.

Acidum succinicum crudum. Sal Succini. Rohe Bernsteinsäure. Bernsteinsalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem Bernstein durch trockne Destillation.

Etwas zusammenhängende gelbliche Krystalle, von einem harzig-sauren Geschmacke, dem Geruche nach Bernsteinöl, im Feuer mit brenzlig riechendem, hustenerregendem Dampfe sich völlig verflüchtigend, in 25 Theilen Wasser, mit Hinterlassung des Oeles, auflöslich, aus der Luft nicht Feuchtigkeit anziehend, Bernsteinsäure und Bernsteinöl enthaltend. Man hüte sich vor dem unreinen, mit verschiedenen fremdartigen Stoffen verunreinigten.

Die Bernsteinsäure ist im Jahr 1546 von Agricola zuerst aufgeführt, Boyle hat sie aber erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts als Säure erkannt.

Diese Säure ist vorzüglich in dem Bernstein enthalten, sie ist aber nach Lecanu und Sangiorgio in den Terpenthinarten vorhanden. Nach Beißenhirz und John ist sie erzeugt worden durch Gährung eines Gemenges von Johannisbrot, Brot, Honig, etwas Essig und Branntwein.

Man erhält diese Säure durch trockne Destillation des Bernsteins. Diese kann in einer Glasretorte mit tubulirter Vorlage vorgenommen werden, geschieht aber gewöhnlich in den Fabriken in eisernen Retorten. Der Bernstein giebt dabei zuerst ein gelbliches säuerliches Wasser, welches großentheils Essig ist; darauf kommt ein dünnes gelbliches Oel nebst Kohlenwasserstoffgas und kohlensaurem Gas, zu deren Ableitung die Vorlage tubulirt seyn muß. Während dessen schießen zugleich im Retortenhalse und im obern Theile der Vorlage gelbliche Krystalle an. Das Oel wird nach und nach bräuner, und dann erzeugen sich keine Krystalle mehr; zuletzt wird das Oel schwarz und dick wie Pech. Die im Retortenhalse befindlichen Krystalle sind Bernsteinsäure, die mit brenzligem Oele verunreinigt ist. Beim Rösten des Bernsteins zur Firnißbereitung kann eine beträchtliche Menge dieser Säure gesammelt wer-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0040-8

den, denn der geröstete Bernstein ist gerade in dem Zeitpunkte, wo die Entwickelung der Säure aufhört, zur Auflösung in Alkohol oder in fetten Oelen am tauglichsten.

Eine reichlichere Ausbeute an Säure wird erhalten, wenn der Bernstein, mit einem Zusatze von Schwefelsäure, auf jedes Pfund Bernstein ½ bis 1 Unze Schwefelsäure, destillirt wird. Die Säure scheint nämlich im Bernstein an eine alkalische Basis gebunden zu seyn, und wenn von derselben die Bernsteinsäure durch die mächtigere Schwefelsäure getrennt worden, so kann die Bernsteinsäure leichter sublimiren, und die Ausbeute erreicht das Doppelte. Nach Versuchen von Weiß scheint diese Base Kalkerde zu seyn.

Dieser Erfolg scheint darauf zu deuten, daß die Säure im Bernstein schon gebildet bestehe, und nicht erst ein Product der Destillation, wenigstens nicht allein, sey, denn auch schon durch bloße Behandlung des Bernsteins mit kochendem Wasser oder mit Weingeist, oder noch besser mit Kalilösung, wird ein Theil Säure ausgezogen.

Die gewonnene Säure ist gelb oder gelblich braun und stark durch Oel verunreinigt, von dem sie sich schwer abscheiden läßt. Sie wird in dem bei der Destillation erhaltnen Wasser aufgelöst, und durch feuchtes Papier geseihet, wodurch ein großer Theil des beigemengten Oeles zurückgehalten, und ein schon etwas gereinigtes Bernsteinsalz gewonnen wird, welches zum Theil in diesem Zustande in den Handel kommt, zum Theil auch schon von den Fabricanten noch weiter gereinigt wird. Von dem hierbei zu beobachtenden Verfahren wird im 2ten Theile gehandelt werden.

Acidum sulphuricum crudum. Oleum Vitrioli. Rohe Schwefelsäure. Vitriolöl.

Ein Präparat chemischer Fabriken durch Verbrennung des Schwefels mit salpetersaurem Kali, so wie auch durch trockene Destillation des schwefelsauren Eisens.

Eine saure, aufs höchste ätzende, weiße oder bräunliche Flüssigkeit, aus dem schwefelsauren Eisen bereitet, rauchend, mit Wasser sich erhitzend, aus Schwefelsäure und Wasser bestehend, zum öftern schwefelsaures Blei oder schwefelsaures Eisen und andere verschiedenartige Dinge enthaltend. Ihr specifisches Gewicht sey = 1,840 — 1,850.

Basilius Valentinus zeigte im 15. Jahrhundert, daß man aus dem Eisenvitriol durch Destillation eine höchst ätzende Säure von öliger Consistenz gewinnen könne, daher der Name Vitriolöl. Die fabrikmäßige Gewinnung scheint aber zuerst in Nordhausen in Sachsen betrieben worden zu seyn, daher heißt die auf diese Weise gewonnene Schwefelsäure auch jetzt noch Nordhäuser oder Sächsisches Vitriolöl, obgleich gegenwärtig auch in andern Ländern Schwefelsäure aus dem Eisenvitriol destillirt wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0041-4

Die Methode, durchs Verbrennen des mit Salpeter gemengten Schwefels Schwefelsäure zu gewinnen, soll schon im Jahr 1697 in England erfunden worden seyn, doch wurde sie erst im 18. Jahrhundert fabrikmäßig benutzt und die so gewonnene Säure erhielt den Namen Englische Schwefelsäure, welchen Namen sie auch jetzt noch führt, obgleich dergleichen Schwefelsäure-Fabriken nachher in allen Ländern errichtet worden sind.

Die Schwefelsäure kommt demnach im Handel unter dem Namen Sächsisches Vitriolöl und Englische Schwefelsäure vor, je nachdem sie nach der ersten oder nach der zweiten Methode bereitet worden ist.

Um die sächsische oder nordhäuser Schwefelsäure aus dem Eisenvitriol zu gewinnen, wird derselbe in einem Calcinirofen erhitzt, wobei er den größten Theil seines Krystallwassers verliert, und sich das Eisenoxydul auf Kosten der Luft in Eisenoxyd verwandelt. Er wird hierauf in Retorten oder weite cylindrische Gefäße von Steingut gebracht, in welchen er langsam bis zum Weißglühen erhitzt wird. Bei der ersten starken Hitze destillirt noch erst der Rest des Krystallisationswassers über, welcher besonders abgenommen wird (**Spiritus Vitrioli**), dann verläßt die Schwefelsäure das Eisenoxyd, und wird in der an der Retorte wieder angebrachten Vorlage von Glas aufgefangen. Die Heizung wird so lange fortgesetzt, als noch Schwefelsäure überdestillirt. In der Retorte bleibt das braunrothe Eisenoxyd des Vitriols mit etwas Schwefelsäure verbunden zurück, und wird nach dem Auswaschen als Farbenmaterial unter dem Namen Colcothar, oder **Caput mortuum Vitrioli**, oder Englisches Roth in den Handel gebracht.

Die Säure kommt gewöhnlich in steinzeugenen Flaschen, ohngefähr 40 Pfund enthaltend, vor, ist mehr oder weniger dunkel gefärbt und hat bisweilen ein spec. Gewicht von 1,890. In Berührung mit der Luft stößt sie einen weißen Rauch aus, welches darin seinen Grund hat, daß sie zwei verschiedene Modificationen von Schwefelsäure enthält, deren Erörterung aber erst im 2ten Theile erfolgen kann; von dieser Eigenschaft führt sie auch die Benennung rauchende Schwefelsäure.

Die sächsische Schwefelsäure steht höher im Preise als die englische, weil die Bereitungskosten größer sind, dennoch wird sie gesucht, weil sie eine eigene Anwendung hat, wozu die englische nicht mit gleichem Vortheil gebraucht werden kann, nämlich zur Auflösung des Indigo für die Art der Färbung von Wolle, welche den Namen Sächsisches Blau erhalten hat.

Die englische Schwefelsäure wird durch Verbrennung des Schwefels auf Kosten der Luft bereitet. Der Schwefel kann sich aber hierbei, und selbst beim Verbrennen im Sauerstoffgase nicht höher als zur schwefligen Säure oxydiren; man muß daher dafür sorgen, daß sich gleichzeitig ein Körper entwickele, welcher die schweflige Säure bestimmt, sich zu Schwefelsäure zu oxydiren. Ein solcher Körper ist das Stickstoffoxydgas, welches durch Verbrennung des dem Schwefel in dem Verhältniß von $\frac{1}{12}$ bis $\frac{1}{9}$ beigemischten Salpeters erzeugt wird. Die in dem Salpeter an das Kali gebundene Salpetersäure wird nämlich zerlegt, in Sauerstoffgas, welches mit dem Schwe-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0042-0 DFG

fel noch einen Antheil schwefliger Säure bildet, und in das erwähnte, gleich der Salpetersäure aus Sauerstoff und Stickstoff, nur in einem andern Verhältnisse bestehende Stickstofforydgas. Wenn dieses Gas mit der Luft in Berührung kommt, so verwandelt es sich durch Anziehung von Sauerstoff in salpetrige Säure, welche mit der Feuchtigkeit der Luft zu Dämpfen von wasserhaltiger salpetriger Säure wird. Von diesen Dämpfen wird das schwefligsaure Gas condensirt, welches der salpetrigen Säure zugleich den Sauerstoff, welchen es zur Umwandlung in Schwefelsäure bedarf, und das Wasser entzieht, welches nöthig ist, um diese in wasserhaltige Schwefelsäure zu verwandeln, während die salpetrige Säure wieder zu Stickstofforydgas wird, welches bei hinreichend vorhandener feuchter atmosphärischer Luft die eben vollendete Rolle von neuem beginnt, Feuchtigkeit und Sauerstoff in sich aufnimmt, um beide wieder dem schwefligsauren Gase abzutreten.

Die Operation wird in Kammern vorgenommen, welche inwendig wasserdicht mit Platten von Blei bekleidet sind, und auf deren Boden man einige Zoll hoch Wasser gegossen hat, um stets die Luft im Maximum von Feuchtigkeit zu erhalten. Der Schwefel wird entweder auf einer Platte innerhalb der Kammer selbst, oder in einem darunter gestellten Ofen verbrannt, dessen Schornstein in die Kammer führt. Die gebildete Schwefelsäure condensirt sich sogleich in kleinen Tropfen, welche in das Wasser auf den Boden der Kammer fallen; ein Theil der Säure geht aber verloren, nämlich derjenige, welcher sich mit dem Kali des zerstörten salpetersauren Kalis verbindet, welches im Ofen oder auf der Platte liegen bleibt. Nach der Verbrennung, die allen Sauerstoff der Luft verzehrt hat, bleibt ein Gemenge von Stickstofforydgas und Stickgas zurück, welches aus der Kammer herausgelassen und durch frische atmosphärische Luft ersetzt werden muß.

Das Gemenge von Schwefelsäure und Wasser, welches sich auf dem Boden der Bleikammer findet, wird, wenn es ein specifisches Gewicht von 1,15 bis 1,20 erlangt hat, in einen Bleikessel abgezapft, worin es gekocht wird, bis es ungefähr ein spec. Gewicht von 1,50 bekommt. Das Wasser ist nämlich flüchtiger als die Schwefelsäure, und verdunstet deshalb mit Hinterlassung der Säure. Um aber alles Wasser wegzuschaffen, welches auf diese Weise abgeschieden werden kann, ist eine höhere Temperatur erforderlich, als das Blei ertragen kann, weshalb dann die Säure in große Retorten von Glas, oder in Destillirkessel von Platin gezapft und darin weiter erhitzt wird, und zwar so lange, als noch Wasser überdestillirt. Dieses Wasser ist schwach säuerlich, und wird aufbewahrt, um als Wasser in der Kammer benutzt zu werden. Die concentrirte Säure läßt man dann erkalten, und zapft sie in große Gefäße von Glas oder Fayence, mit Pfropfen von Glas oder Fayence, welche durch geschmolzenen Schwefel befestigt, und noch überbunden werden, um die Abstoßung des Schwefels zu verhindern. Diese Gefäße werden mit Stroh umgeben, in Körben verwahrt, um das Zerbrechen derselben zu verhüten, weil in diesem Falle die Säure alles,

was sie trifft, zerstören würde. Diese in den Handel kommende sogenannte englische Schwefelsäure ist nur wasserhaltige Schwefelsäure, deren spec. Gewicht 1,850 ist. Sie enthält indeß verschiedene fremde Materien, welche theils von dem Wasser herrühren, welches auf den Boden der Kammer gegossen wird, theils von der Operation; nämlich schwefelsaures Kali, welches bei der Verbrennung in kleinen Theilen umhergeworfen, oder von dem Dampfe mit fortgerissen worden (und eine durch dieses Salz verunreinigte Schwefelsäure kann durch gehöriges Einkochen selbst bis zu einem spec. Gewicht von 1,90 gebracht werden), schwefelsaures Blei und schwefelsaures Eisen.

Die Herren Bussy und Lecanu (Schw. J. XVI. S. 1826. S. 368) haben aus ihren Untersuchungen gefolgert, daß der Niederschlag, welcher sich bei der Concentration der englischen Schwefelsäure in den Gefäßen ablagert, nicht, wie man bisher glaubte, schwefelsaures Blei, sondern ein wasserleeres schwefelsaures Eisenoxyd, bisweilen mit etwas Kieselerde vermengt, sey, daher entstanden, daß der verwendete Schwefel nicht destillirt ist, und stets noch etwas Schwefeleisen enthält, welches durch die Verbrennung in schwefelsaures Salz verwandelt, von der verdünnten Säure aufgelöst und erst bei der Concentration abgeschieden ist. Indessen geht doch aus den von Geiger und andern bewährten Chemikern gemachten Beobachtungen hervor, daß der beim Verdünnen der englischen Schwefelsäure sich zeigende Niederschlag nicht nur nicht durch mehr zugesetztes Wasser sich löst, sondern daß selbst neue Trübung und Bildung eines weißen Präcipitats sich zeigte. Auch haben Proben mit Hydrothionsäure Bleigehalt in der Säure dargethan, es ist daher nicht immer und unbedingt dieser Niederschlag als schwefelsaures Eisenoxyd anzusehen.

Die Schwefelsäure wird aber auch Selen enthalten, wenn ein selenhaltiger Schwefel verbrannt worden ist, und dieser Stoff wird sich, besonders bei der verdünnten Säure, als rother Bodensatz ablagern. Aus derselben Ursache kann die Säure auch Arsenik enthalten, zu deren Entdeckung die Mittel im 2ten Theile angegeben werden sollen.

Aber auch die destillirte sächsische Schwefelsäure ist nicht als rein zu betrachten, vielmehr enthält sie schwefelsauren Kalk, schwefelsaures Eisenoxyd und andere Unreinigkeiten, welche bisweilen 2½ bis 3 Procent vom Gewichte der Säure betragen, und von denen sie durch eine Rectification befreit werden kann.

Die rohe Schwefelsäure dient in der Medicin vorzüglich zur Bereitung mehrerer arzneilichen Präparate, in den Gewerben findet sie aber eine weit ausgedehntere Anwendung, und daß namentlich in der Färberei die sächsische Schwefelsäure der englischen vorgezogen werde, ist bereits oben erwähnt; doch soll auch die letztere zur Auflösung des Indigs dadurch geschickt gemacht werden können, daß sie einige Minuten mit etwas Schwefel gekocht wird. Stratingh glaubt, daß außer der größern Concentration der Säure durch das Erhitzen, sie darum auflösend auf den Indig wirke, weil sie ihn (ver-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0044-1

möge der gebildeten schwefligen Säure) partiell desoxydire, wodurch er leichter in Schwefelsäure löslich werde.

Acidum sulphuricum rectificatum venale. Käufliche rectificirte Schwefelsäure.

Ein Präparat chemischer Fabriken durch Destillation der rohen Schwefelsäure.

Eine saure, aufs höchste ätzende Flüssigkeit, mit Wasser sich erhitzend. Sie sey völlig frei von schwefelsaurem Blei und andern fremdartigen Stoffen. Sie werde daher, mit Wasser verdünnt und mit Aetzammoniakflüssigkeit neutralisirt, nicht getrübt, eben so wenig verändere diese Mischung auf Zusatz von Schwefelwasserstoff-Ammoniak ihre Farbe ins Braune oder Schwärzliche. Durch Zugießen von einem gleichen Gewichte Alkohol werde sie gleichfalls nicht getrübt. Spec. Gewicht = 1,840 — 1,850.

Diese in den Fabriken rectificirte Säure verhält sich gegen die im 2ten Theile anzugebenden Reagentien, welcher die Vorschrift zur Rectificirung dieser Säure enthält, gemeinhin als völlig rein, und kann daher in der Medicin zum innern Gebrauche verwandt werden.

Acidum tartaricum. Sal essentiale tartari. Weinsteinsäure. Wesentliches Weinsteinsalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem gereinigten Weinstein.

Weiße, eine Rinde bildende Krystalle, von sehr saurem Geschmacke, in zwei Theilen Wasser auflöslich. Sie sey frei von Schwefelsäure, wodurch sie feucht gemacht wird, und auf Zusatz von aufgelöstem essigsauren Blei einen in Salpetersäure nicht auflöslichen Niederschlag giebt, auch von einer zu großen Menge weinsteinsaurer Kalkerde, welche präcipitirt wird, wenn die Säure mit kohlensaurem Ammoniak übersättigt worden.

Duhamel und Marggraf erkannten zuerst im Weinstein eine eigenthümliche Säure, die Scheele 1770 zuerst darstellte, und das von ihm angegebene Verfahren zur Gewinnung dieser Säure wird im Allgemeinen auch jetzt noch befolgt.

Die im 2ten Theile enthaltene Vorschrift zur Bereitung der Weinsteinsäure wird Veranlassung geben, auch andere Methoden zu erwähnen, und die erfoderlichen Erläuterungen zu geben.

Aconitum. Herba. Eisenhütlein.

Aconitum Neomontanum Willden. (Stoerkeanum Reichenbach.) Eine perennirende Pflanze, an bergigen Orten Deutschlands hin und wieder vorkommend.

Blätter dunkelgrün, glatt, handförmig, fünftheilig, mit fast bis auf den Grund getheilten Seitenlappen, keilförmigen auseinander gesperrten Einschnitten, die letztern 2—3 Linien breit, die Stiele glatt, länger als die Nebenblätter; die Blumenkrone blau, mit einem 6—8 Linien hohen, ein wenig oberhalb einwärts gebogenen Helme, einem nicht hervorragenden und nicht gekrümmten Schnabel. Sie sind mit einem scharfen narkotischen Princip begabt. Man nehme sie von der wildwachsenden, und nicht von der in Gärten gezogenen Pflanze, in den Monaten Mai und Juni. Sie dürfen nicht über ein Jahr aufbewahrt werden. Die Pflanze werde nicht mit den verwandten Arten verwechselt, das Kraut ist mit den Blumen zu sammeln.

Dosis bis zu zwei Gran.

Aconitum Neomontanum. Eisenhütlein, Sturmhut.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Diese Pflanze wächst in hochliegenden Wäldern und Wiesen in der Schweiz, hin und wieder auch in Deutschland, in Krain, Ungarn, Schweden und Sibirien, auch wird sie seit den ältesten Zeiten cultivirt.

Die Wurzel ist rettigförmig, ein paar Zoll lang, langgeschwänzt und mit vielen Seitenfasern versehen. Der Stengel zwei bis drei Fuß hoch, aufrecht, stielrund, gänsekieldick, reich beblättert, gewöhnlich durchaus kahl. Die Blätter von unten langgestielt, im Umkreise rundlich herzförmig, fünfstückigzusammengesetzt, das oberste nur getheilt, 3 bis 5theilig. Bei jenen ist das Mittelstück deutlich gestielt, der Stiel kurz, und das Blattstück von hieraus lancettförmig, die mittleren drei Blattstücken haben im Umkreise eine rhombische Gestalt, sind zu drei wiederholt eingeschnitten und geschlitzt; die Abschnitte auf dürrem Boden schmal, auf fettem Boden breitlancettförmig, etwas spitz, oder im letztern Falle auch wohl etwas stumpf. Die Basilarblattstücken sind zweitheilig, die innern Theile aber nur nach dem Blattstiele zu doppelt eingeschnitten, die Ausschnitte immer deutlich und frei. Die Farbe der Blätter ist dunkelgrün, ölglänzend (hellgrün bei der weißblühenden Abänderung), die Unterseite stets blässer, als die obere, mit deutlich vortretenden Nerven. Die Lage der Blätter ist gewöhnlich horizontal ausgebreitet, in sehr trocknem Boden bloß abstehend, bei fast lappenförmig zusammengelegten Blattstücken.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0046-3

Der Blüthenstand ist ursprünglich eine schlasse, kurze Blüthentraube, doch ändert er sich nach der Beschaffenheit des Bodens, nach dem Verhältnisse des Standorts zur Sonne und nach der Witterung mannigfaltig, so daß er desto gedrängter und kleiner ist, und die Stengel und Blätter desto kürzer und heller werden, je trockner der Boden, diese Theile aber desto üppiger, zugleich schlaffer und dunkler werden, je fetter und beschatteter der Boden ist.

Die Farbe der Blüthen ist dunkelviolettblau, mit sanftem Glanze, bei einer häufigen Abänderung weiß und violblau gesäumt. Sie bestehen aus einer Krone mit fünf ungleichförmigen Blumenblättern, wovon das obere Blatt helmförmig und ganz kurz gewölbt, die beiden breiten rundlichen gegenüberstehenden Seitenblätter zusammengeneigt sind, und die zwei untern länglichen sich herablegen.

Die Frucht besteht aus drei eiförmigen Kapseln mit kleinen schwärzlichen Saamen.

Die Blätter sind officinell, und unsere Vorschrift verlangt, daß sie allein von der wildwachsenden, und nicht von der in Gärten gezogenen Pflanze gesammelt werden sollen.

Gewiß werden alle Pflanzen, von ihrem natürlichen Standorte genommen, die cultivirten bei weitem an Wirksamkeit übertreffen, wenn gleich eine fröhlichere Vegetation das Gegentheil anzudeuten scheint, und eben so gewiß wird dieses mit dem Eisenhütlein der Fall seyn. Indessen werden nur wenige Apotheken Gelegenheit haben, das wildwachsende Aconitum einzusammeln, die mehresten dagegen genöthigt seyn, das getrocknete Kraut, und auch das aus dem frischen Kraute zu bereitende Extract auf dem Wege des Handels zu beziehen, was auch seinen Nachtheil haben möchte.

Bis jetzt ist nur das in Gärten cultivirte Kraut in Gebrauch gezogen worden, und Wiegmann bemerkt in dieser Hinsicht aus dem reichen Schatze seiner Erfahrung, daß ein feuchter, thonhaltiger, mergelartiger Boden, und ein sehr beschatteter Standort sich am besten für das Aconitum zu eignen scheine, verlangt jedoch auch ausdrücklich, gegen die bisherige Gewohnheit das Kraut vor der Blüthe einzusammeln, daß es mit Stengel und Blume eingesammelt werden solle.

Von allen Aconitum-Pflanzen scheint das **A. Neomontanum** die giftigste, zugleich aber auch heilsamste zu seyn, es ist die einzige, über deren Wirksamkeit man sichere Beobachtungen aufgezeichnet findet, und es ist diejenige, welche Störck in die Heilkunde eingeführt hat, und auch in unsern Gärten cultivirt wird. Alle Theile derselben, vorzüglich aber Blätter und Wurzel, besitzen eine außerordentliche Schärfe.

Schrader (Taschenbuch für 1812. S. 117.) hat das **Aconitum medium** analysirt. Durch Destillation wurde weder ätherisches Oel, noch Säure, noch Ammoniak erhalten. 20 Unzen frisches Kraut mit 12 Unzen destillirten Wassers zerquetscht, verursachten durch die Ausdünstungen heftiges Kopfweh, Schwindel, Zittern und Rückenschmerzen. Durch anhaltendes Kneten mit Wasser wurde ein feinpulveriger grüner Stoff geschieden, der Saft zum

Sieden und das Eiweiß dadurch zum Gerinnen gebracht. Der Rückstand des Krautes gab durch weingeistige Extraction ein grasgrünes Harzwachs, das sich beim Erkalten ausschied. Dieser Stoff bildet wahrscheinlich den Ueberzug der Blätter. Aus dem wäßrigen Extract wurden geschieden: a) ein Extractiv- oder Seifenstoff von eigenthümlichem, bitterlichem, säuerlichem, scharfem und schwachsalzigem Geschmacke, von dunkel gelbrothbrauner Farbe, dem essigsaures Kali, salzsaures Kali und salzsaurer Kalk, freie Aepfelsäure und Essigsäure beigemischt waren; b) ein gummiger Extractivstoff von schwachsalzigem mildem Geschmacke und blaßbrauner Farbe; c) ein erdiger Stoff, der sich gleich beim Wiederauflösen des ganzen Extracts in Wasser abgesetzt hatte, und sich als äpfelsaurer Kalk mit wenigem citronensauren Kalke verhielt; d) Asche ohne Kali, fast bloß aus kohlensaurem Kalke bestehend. 20 Unzen frisches Kraut enthalten hiernach: wäßrige und flüchtige Bestandtheile 16 Unzen 6 Drachmen; Faserstoff 1 U. 3 Dr.; grünes Harzwachs 1 Dr. 50 Gr.; Pflanzeneiweiß 3 Dr. 35 Gr.; Extractivstoff mit zerfließlichen Salzen 4 Dr. 30 Gr.; gummösen Stoff 6 Dr.; äpfelsauren und citronensauren Kalk 1 Dr. 35 Gr. S. = 20 Unzen 2 Drachmen 30 Gran.

Später will Peschier (Trommsd. N. J. V. 1. S. 84.) eine eigenthümliche Säure und ein eigenthümliches Alkaloid gefunden haben. Die Säure soll in Dodekaëdern mit kugelförmigen Flächen, das Alkaloid körnig krystallisiren, jene mit den Alkalien krystallisirbare Salze geben. Trommsdorff (dessen N. J. VII. 1. S. 25.) fand, daß ein aus einem eingetrockneten Aconitextract krystallisirtes Salz neutraler äpfelsaurer oder vielmehr vogelbeersaurer Kalk war; von Peschier's eigenthümlicher Säure konnte er nichts finden. Auch Braconnot erklärt die im Eisenhut das Kali und den Kalk sättigende Säure für die mit der Vogelbeersäure identische Aepfelsäure, wogegen Vauquelin einen großen Theil Citronensäure erhielt. Trommsdorff (N. J. VIII. 1. S. 266.) bezeugte später, daß die von Peschier an ihn gesandte Probe von dessen neuer Säure verschieden von Aepfelsäure sey.

Auch Brandes (Berl. Jahrb. XXI. S. 462.) erklärt die scharfe und giftige Substanz im Sturmhut für ein Alkaloid.

Der Sturmhut wirkt kräftig reizend auf das Nerven- und Gefäßsystem, besonders auf das Gehirn. Nach Störck's Versuchen befördert er die Schnelligkeit des Blutumlaufs, vermehrt folglich auch die Hautausdünstung. Er wird bei chronischen Rheumatismen, Gicht, veralteter Syphilis u. s. w. angewandt und zwar in Pulverform, zweckmäßiger aber in dem eingedickten Safte; auch in der Tinctur.

Als Gegengift werden die Pflanzensäuren, Essig-, Citronensäure u. s. w. empfohlen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0048-4

Adeps suillus. Schweineschmalz.

Sus Scrofa. Linn.

Es werde nur gut ausgewaschen angewendet.

Das Schwein liefert zweierlei Fett. Das weichere, Speck genannt, befindet sich unmittelbar unter der Haut, das andere festere liegt in der Nähe der Rippen, der Eingeweide und der Nieren. Das letztere giebt nach dem Schmelzen das gebräuchliche Schweinefett oder Schweineschmalz. Die Nahrungsmittel, welche dem Thiere gegeben worden sind, haben großen Einfluß sowohl auf die Güte des Fleisches, als des Fettes.

Zum Ausschmelzen schneide man das rohe Fett in kleine Würfel, bringe diese mit ein wenig Wasser in einem Kessel zum Kochen, welches unter stetem Umrühren, öfterm Ab- und Durchgießen des ausgeschmolzenen Fettes, und kleinen Zusätzen von frischem Wasser so lange fortgesetzt wird, als das ausgeschiedene Fett noch weiß und klar ist, wobei man das Anbrennen des Fettes sorgfältig zu verhüten hat. Der Rückstand kann durch ein reines leinenes Tuch ausgepreßt werden, um das darin noch enthaltene Fett zu gewinnen.

Das Schweineschmalz ist weiß, körnig, von Salbenconsistenz, besitzt einen eigenthümlichen Geruch und einen angenehmen Geschmack, und zerfließt zwischen den Fingern. Der Luft und dem Lichte ausgesetzt, wird es gelb, nimmt einen ranzigen Geruch und kratzenden Geschmack an, indem es Sauerstoff aus der Luft in seine Mischung aufnimmt, wodurch es unbrauchbar wird.

Das Schweinefett wurde, so wie alle übrigen Fette des Thier- und Pflanzenreichs, lange Zeit für einen einfachen Stoff gehalten. Die französischen Chemiker Chevreul (Trommsd. J. d. Ph. XXIV. 1. S. 137., XXV. 2. S. 356., u. N. J. II. 2. S. 212.) und Braconnot (Trommsd. J. XXV. 2. S. 307.) haben das Verdienst, zuerst nachgewiesen zu haben, daß jedes Fett aus zwei Substanzen bestehe, welche hinsichts der Consistenz, der Schmelzbarkeit und der Auflöslichkeit in Alkohol von einander abweichen. Die mannigfaltigen Verhältnisse dieser beiden Stoffe bilden die verschiedenen fettigen Körper.

Die Scheidung dieser beiden Substanzen wird bewirkt, indem man flüssige Fette, z. B. das Olivenöl, erkältet bis zu dem Grade, bei welchem sie zum Theil fest werden, das Flüssige durch Abgießen und Pressen vom Festen trennt, aufs neue erkältet, abgießt u. s. w., und mit dieser Verfahrungsweise so lange fortfährt, bis das ausgeschiedene Flüssige bei einer Temperatur von — 8° R. nicht mehr erstarrt. Dieser Bestandtheil ist von Chevreul Eläine, Oelstoff, genannt worden. Aus festen Substanzen, als Schmalz, Talg u. s. w. scheidet man die Eläine durch gelindes Erwärmen und Pressen zwischen Fließpapier; das eingesogene Oel scheidet man vom Papier durch Aufweichen in Wasser und Auspressen, oder durchs Kochen mit

Wasser, und trennt den letzten Antheil festen Fettes durch Erkälten, wie vorhin. Oder man löst das Fett in heißem absoluten Alkohol, aus welchem beim Erkalten das feste Fett, von Chevreul Stearine, Talgstoff genannt, herauskrystallisirt in Gestalt kleiner seidenartig glänzender Nadeln, welche durch wiederholtes Auflösen in Alkohol von allem Oele gereinigt werden müssen. Durch Verdunstung des Alkohols wird die Eläine erhalten.

Die Eläine, der Oelstoff, hat folgende Eigenschaften. Sie ist flüssig, theils farblos, theils gelblich oder grünlich, geruchlos und von mildem Geschmacke; in der Kälte erstarrt sie butterartig, jedoch bei sehr verschiedenen Graden, die meisten bei — 8 bis 12° R. Die Eläine aus Mandelöl und Repsöl gefriert nicht in der stärksten Kälte. In der Luft bleibt sie schmierig, verdickt sich mit der Zeit salbenartig, und wird im unreinen Zustande leicht ranzig, mit den Alkalien bildet sie weiche Seife. Sie ist der Hauptbestandtheil der flüssigen, schmierig bleibenden Oele und zeigt in Farbe und Geruch einige Verschiedenheiten nach den Fetten, von welchen sie gewonnen worden. Sie hat eine spec. Schwere von 0,913 bis 0,915.

Die Stearine, Talgstoff, oder der reine Talg, ist weiß, trockener und brüchiger, aber nicht so biegsam wie Wachs, leicht pulverisirbar, schmilzt bei 38 — 40 ° Wärme und gesteht beim Erstarren zu einer durchscheinenden strahligen Masse. Sie ist geschmack- und geruchlos, und wird im unreinen Zustande nicht so leicht ranzig wie die Eläine; im reinen Zustande verändern sich beide nicht an der Luft. Alkalien verseifen den Talgstoff langsamer als den Oelstoff, und bilden damit harte Seifen. Die Stearine bildet den Hauptbestandtheil der festen Fette, Talgarten, der Butter u. s. w. Spec. Schwere 0,968.

Das Schweineschmalz besteht nach Braconnot aus 62 Oel- und 38 Talgstoff, nach Chevreul enthält es außerdem noch einen nach Galle riechenden und einen gelbfärbenden Stoff, Kochsalz und essigsaures Natron. Es hat ein spec. Gewicht von 0,938. Seine letzten Bestandtheile sind nach Saussure: Kohlenstoff 78,843; Wasserstoff 12,182; Sauerstoff 8,502; Stickstoff 0,473.

Die festen Fette enthalten mehr Kohlenstoff und weniger Sauerstoff, als die flüssigen, daher erstere besser zum Brennen dienen.

Bei der trocknen Destillation in verschlossenen Gefäßen wird das Schweineschmalz zerlegt in Wasser, Essigsäure, gekohltes Wasserstoffgas, Kohlensäure, und in eine besondere Säure, giebt aber kein Ammoniak. Schon im J. 1754 hat Hr. Geh. Rath v. Segner aus den thierischen Fettigkeiten, als Schweineschmalz, Rindertalg, menschlichem Fette und Butter, durch Destillation eine Säure erhalten, die er an fixes und auch an flüchtiges Alkali band, und aus den dargestellten besondern Mittelsalzen durch Schwefelsäure wieder abschied. Die Herren Crell und Guyton-Morveau sahen diese durch Destillation des Schweinefettes gewonnene Säure, welche einen starken üblen Geruch besaß, für eine eigenthümliche Säure an, die sie Fettsäure nannten. Thenard erklärte in Folge von ihm angestellter Versuche, daß dieses De-

stillat aus Essigsäure und Salzsäure mit durch den chemischen Proceß verändertem Fette bestehe, dagegen erhalte man durch Auswaschen des destillirten Fettes eine wirkliche eigenthümliche Fettsäure, wenn in die erhaltenen Flüssigkeiten eine Auflösung von essigsaurem Blei überschüssig geschüttet, der augenblicklich entstehende weiße flockige Niederschlag von fettsaurem Blei gesammelt, gewaschen, getrocknet und dann mit einer dem Gewichtsbetrage gleichen Menge Schwefelsäure, die mit ihrem 5 bis 6fachen Gewichtsbetrage Wasser verdünnt worden, in der Wärme behandelt wird. Die Schwefelsäure verbindet sich mit dem Bleioxyd und macht die Fettsäure frei, welche aus der heiß filtrirten Flüssigkeit nach dem Erkalten in kleinen weißen Nadeln von geringem Zusammenhange herauskrystallisirt. Berzelius bewies aber, daß diese neue Fettsäure Thenard's nichts weiter als eine mit etwas Fett verunreinigte Benzoësäure sey, von welcher sie befreit, und in den Zustand der gewöhnlichen Benzoësäure gebracht werden könne.

Buchner (Inbegriff d. Ph. VII. S. 98. und Hänle's Magazin Dec. 1823. S. 285.) erhielt bei der Destillation des frischen Schweinefettes folgende Producte: 1) den Pyrofettäther, eine ätherisch-ölige, sehr flüchtige Flüssigkeit, welche äußerst heftig auf den thierischen Organismus wirkt, besonders wenn sie in die Lungen kommt, auch die Augen und das Geruchsorgan sehr angreift und in den Magen gebracht, wie ein narkotisches Gift wirkt; 2) eine flüchtige Säure, welche von der Essigsäure durchaus nicht verschieden war; 3) eine in kaltem Wasser wenig auflösliche flockige Substanz in geringer Menge, welche Benzoësäure zu seyn schien, und 4) eine theerartige Masse, *welche sich erst bei der Rectification des ersten Destillats zu bilden scheint.*

Diese Versuche wurden vorzüglich in der Absicht angestellt, um eine Aufklärung zu erhalten über das Wurstgift, durch welches in neuern Zeiten so häufige Vergiftungen, vorzüglich in Baiern und Würtemberg, vorgekommen sind. Ist nun auch durch diese schätzenswerthen Versuche die Natur dieses Giftes noch nicht völlig ausgemittelt, so ist doch als ausgemacht anzusehen, daß durch eine sorglose Aufbewahrung der nicht hinreichend geräucherten Würste ein Verderben derselben herbeigeführt worden. Diese in einer chemischen Zersetzung beruhende Verderbniß des Fleisches und vorzüglich des Fettes ist Bedingung zur Erzeugung des Wurstgiftes, dessen tödliche Wirkung durch vielfache Beispiele bestätigt ist. Die Schädlichkeit faulender animalischer Stoffe ist allgemein bekannt.

Nach Abhandlungen von Bussy und Lecanu (Geiger's Magazin Nov. 1825. S. 174. und Buchner's Repertorium XXII. 3. S. 399.) und von Dubuy (Trommsd. N. J. der Ph. XII. 1. S. 258.) geben alle fette Stoffe bei der trocknen Destillation: 1) Margarinsäure; 2) Oleïnsäure; 3) Talgsäure (siehe Sapo); 4) flüchtiges schwach riechendes Oel; 5) eine Art empyreumatischen, in Beziehung auf das vorhergehende, festen Oels; 6) eine eigenthümliche, flüchtige, stark riechende, nicht saure und in Wasser auflösliche Substanz. Die festen Fette geben ein festeres Destillat, und viel mehr

Margarinsäure als die flüssigen Fette, wogegen die fetten Oele die größte Menge Oelsäure liefern, von welcher die festen thierischen Fette weniger, das Wachs gar nichts ausgiebt. Auch hier bemerkte Dubuy (vergl. Cera flava) daß sich bei niederen Temperaturgraden mehr Talgsäure bildete, als bei höheren, in welchen nämlich die Zersetzung vollständiger erfolgt.

Das Schweineschmalz findet in der Medicin zu Salben u. dergl. häufige Anwendung. Es muß frisch seyn und reinlich in steinzeugenen, nicht in kupfernen oder messingenen Gefäßen aufbewahrt werden, damit es nicht kupferhaltig werde, wobei es eine grünliche Farbe annimmt.

Außer dem Schweineschmalz werden noch bisweilen andere Fette verlangt, als Hundsfett, Hasenfett (gelb, salbenartig, von eigenthümlichem Geruche), Fuchsfett, Wildkatzenfett, Dachsfett, Biberfett u. s. w., welche alle aber in ihren physischen Eigenschaften so wenig von einander abweichen, daß sie füglich durch gutes Schweinefett ersetzt werden können.

Aerugo. Viride aeris. Grünspan.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem durch gährende Weintrestern oder durch Essigdämpfe zerfressenen Kupfer.

Eine feste, schwer zu brechende, auf dem Bruche erdig-blättrige, mit zerkleinerten Krystallen gemischte, zerreibliche, blaugrüne Masse, zum Theil in Wasser auflöslich, aus essigsaurem Kupfer und Kupferoxydhydrat gemischt. Sie sey nicht gar zu sehr mit fremdartigen in Schwefelsäure nicht aufzulösenden Stoffen gemischt.

Die fabrikmäßige Bereitung des Grünspans geschieht an vielen Orten in Deutschland, Holland, England, vorzüglich aber in Frankreich und hier besonders zu Montpellier. Kupferplatten und frisch ausgepreßte Trebern von Weintrauben werden schichtweise aufeinander gelegt, und 4—6 Wochen liegen gelassen. Die Weintrebern gehen bald in Gährung über, erhitzen sich und bilden Essigsäure, welche sich mit dem an der Luft oxydirten Kupfer verbindet. Das Kaltwerden der Masse zeigt an, daß die Gährung aufgehört hat; sogleich werden die Platten herausgenommen und mit neuen Trebern aufgeschichtet. Oder die Kupferplatten werden durch den in Dämpfen aufgetriebenen Wein- oder Holzessig zerfressen. Wenn die Rinde des essigsauren Kupfers dick genug geworden ist, so werden diese Platten in irdene Gefäße gelegt und mit etwas Essig befeuchtet, damit sich die Salzkruste aufbläht und von dem metallischen Kupfer leichter getrennt werden kann. Das Salz, welchem noch Kupferstückchen und Ueberbleibsel von Traubenbeeren beigemengt sind, wird mit etwas Wein zusammengeknetet, in Schaaffelle eingepackt und so in den Handel gebracht.

Ein guter Grünspan muß an der Luft nicht feucht werden, keine schwarzen oder weißen Flecken enthalten, die erwähnte blaugrüne Farbe, einen schwachen

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0052-5

Essiggeruch und einen ekelhaft metallischen Geschmack haben. Nach einer früheren Angabe Proust's wurde der Grünspan angesehen als ein Gemenge von auflöslichem essigsaurem Kupferoxyde und von unauflöslichem basischem essigsaurem Salze, und zwar ungefähr von 43 Th. basisch und 57 Th. einfach essigsaurem Kupferoxyd; später erklärte ihn dieser Chemiker für ein Gemenge von 43 Th. einfach sauren Salzes und von einem aus 27 Oxyd und 30 Wasser zusammengesetzten Hydrat. Dieser Ansicht stimmt auch Berzelius in seinen neuesten Untersuchungen der essigsauren Kupfersalze (Poggendorff's Annalen, Jahrg. 1824. 11tes Stück S. 233.) bei, daß nämlich der Grünspan als eine Verbindung des neutralen essigsauren Kupferoxyds ($\dot{C}A^2$) mit Kupferoxydhydrat ($\dot{C}Aq^2$) und dem dieser Verbindung zukommenden Krystallwasser (10 Aq.) zu betrachten sey, welches er demnach durch die Formel bezeichnet $\dot{C}A^2 + \dot{C}Aq.^2 + 10$ Aq., in welcher durch das letzte Glied das Krystallwasser von dem Wasser unterschieden ist, welches sich gegen das Kupferoxyd wie eine Säure verhält, und mit ihm das Hydrat bildet. Wird der Grünspan mit kaltem Wasser übergossen, so zerfällt er in drei verschiedene Salze, nämlich in neutrales essigsaures Kupferoxyd, in ein basisches auflösliches und in ein basisches unauflösliches Salz. Wendet man aber warmes Wasser in geringer Menge an, so wird die Masse dunkelblau, und enthält sehr viel von dem basischen auflöslichen Salze, das sich beim Erkalten als eine unregelmäßige blaue Masse ohne Spur von Krystallisation absetzt. Wird Grünspan mit einer größern Menge Wassers gekocht, so wird er braun; je größer die Quantität des Wassers war, um so geringere Hitze ist dazu erfoderlich, so daß es mit sehr vielem Wasser schon bei 40° eintritt. Es setzt sich dabei ein braunes überbasisches Salz ab, und die Flüssigkeit enthält, wenn sie sehr verdünnt ist, freie Essigsäure und das neutrale Salz.

Der Grünspan ist demnach in Wasser nur zum Theil, in Essigsäure aber bis auf wenige zurückbleibende Unreinigkeiten völlig auflöslich, von welchen er durch Pülvern und Abschlagen durch ein Sieb befreit werden kann. Absichtliche Verfälschungen mit Kreide, Gyps ꝛc. lassen sich durch Auflösen in verdünnter Schwefelsäure erkennen, indem der im ersten Falle gebildete, und der im zweiten schon vorhandene Gyps zu Boden fällt.

Phillips hat den französischen und den englischen Grünspan zerlegt, und giebt folgendes Verhältniß der Bestandtheile an:

	französischer	englischer
Essigsäure	29,3	29,62
Kupferoxyd	43,5	44,25
Wasser	25,2	25,51
Unreinigkeiten	2,0	0,62
	100,0	100,00

Der Grünspan wird vorzüglich in der Malerei, aber auch in der Medicin, wiewohl jetzt nur noch äußerlich als Aetzmittel, gebraucht; früher ist er auch innerlich in der Epilepsie, gegen den tollen Hundsbiß ꝛc. gegeben wor-

den. Seiner giftigen Eigenschaften wegen erfodert er stets große Vorsicht. Chemisches Gegenmittel gegen Vergiftung durch Kupferauflösungen überhaupt ist ein stark mit Schwefelwasserstoff angeschwängertes Wasser, von dem das Kupfer als Schwefelkupfer gefällt wird. Die Schwefellebern dürfen ihrer ätzenden Eigenschaften wegen nicht angewandt werden. Auch der Zucker wird als ein Gegenmittel von unbezweifelter Wirksamkeit angegeben, wiewohl die Art seiner Wirksamkeit nicht erkannt ist. Doch ist diese nicht nur nach Duval durch Versuche mit Thieren erprobt, sondern auch Orfila erzählt mehrere Fälle von Personen, die essigsaures Kupfer verschluckt hatten, und durch große Gaben von Zucker wieder hergestellt worden sind.

Um diesen Erfolg zu erklären, wird angeführt, daß Blei und Kupfer mit dem Zucker so innige Verbindungen einzugehen vermögen, daß das mit dem Zucker verbundene Kupfer durch chemische Reagentien nicht mehr entdeckt werde. (Ure's Handwörterbuch, weimarsche Ausgabe S. 632.). Kocht man in einem Kolben 1 Unze weißen Zucker, 1 Unze Wasser und 10 Gran Grünspan ½ Stunde lang, so erhält man eine grüne Flüssigkeit, die von der empfindlichsten Kupferprobe, z. B. von eisenblausaurem Kali, von Ammonium und Schwefelwasserstoff nicht afficirt wird. Auf dem Boden des Kolbens bleibt ein unauflösliches, grünes, kohlensaures Kupfer. In meinen Versuchen (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. 1826. S. 21.) war die grüne Farbe der Mischung in eine dunkelgelbe, ähnlich altem Franzwein, umgeändert, und ein rothbrauner Niederschlag ausgeschieden worden. Auf die süße Flüssigkeit reagirte Ammonium unmerklich, eisenblausaures Kali erzeugte aber den röthlichbraunen Niederschlag, eben so zeigten Schwefelwasserstoffkali und Galläpfelsäure unzweideutig den Kupfergehalt an. Es ist demnach aus chemischen Gründen die Wirksamkeit des Zuckers gegen Kupfersalze nicht einzusehen.

Braconnot (Trommsd. N. J. XIII. 1. S. 134.) giebt an, daß die auflöslichen pektischsauren Salze als das sicherste Gegenmittel bei Vergiftungen durch die mehresten metallischen Salze, als Blei-, Kupfer-, Zink-, Antimon- und Mercursalze angewandt werden können, wodurch diese sogleich coagulirt und pektischsaure Metallsalze gebildet werden. Das Gift wird hierdurch eingehüllt und neutralisirt, und deshalb, so gut wie durch schleimige Getränke, der durch das Gift hervorgebrachte Reiz gemindert. Das pektischsaure Kali wird nach folgender Vorschrift bereitet: auf 50 Theile gut ausgewaschenes und stark ausgepreßtes Mark von Rüben oder Möhren nehme man 300 Th. Wasser und 1 Th. kaustisches Kali. Setzt man zu einer Auflösung des pektischsauren Kalis eine Säure, z. B. Salzsäure hinzu, so wird die pektische oder Gallertsäure niedergeschlagen.

* Aerugo crystallisata. A. destillata. Cuprum aceticum. Flores Viridis aeris. Krystallisirter, destillirter Grünspan. Essigsaures Kupfer.

Auch dieses Salz wird fabrikmäßig dadurch bereitet, daß man den von

den Kupferplatten frisch abgeschabten Grünspan in destillirtem Essig kochen läßt. Dabei wird das basisch essigsaure Kupfer, oder vielmehr das Kupferoxydhydrat, in auflösliches neutrales Salz verwandelt und mit dem schon vorhandenen zugleich aufgelöst. Die Flüssigkeit wird ruhig stehen gelassen, abgegossen, gehörig eingedunstet, und die Krystallisation auf folgende Weise bewirkt. Man gießt die Flüssigkeit in kleine Fässer und steckt hölzerne Stäbe hinein, die an dem einen Ende in vier Theile gespalten sind, welche vermittelst kleiner hölzerner Pflöcke aus einander gehalten werden. Das Salz krystallisirt auf diesen Stäben, und bildet im Ganzen abgestumpfte vierseitige Pyramiden. Wenn man sieht, daß die Krystallklumpen nicht mehr zunehmen, so werden sie herausgenommen, die Flüssigkeit abgedampft und die ersteren wieder hineingestellt; durch dieses Verfahren erhält man auf deren Oberfläche ziemlich deutliche Krystalle von essigsaurem Kupfer, nämlich Rhomben.

Die Krystalle haben eine sehr dunkle grüne Farbe, verwittern an der Luft, und beschlagen mit einem hellen blaugrünen Pulver. Das Pulver von den zerstoßenen Krystallen ist spangrün. Der krystallisirte Grünspan ist in 13,4 kalten, in 5 kochenden Wassers und in 14 kochenden Weingeistes auflöslich. Verschiedene Zuckerarten fällen aus der Auflösung im Lichte oder in der Hitze metallisches und oxydulirtes Kupfer. Spec. Schw. = 1,78.

Bestandtheile nach	Phillips	Ure
Kupferoxyd	39,2	39,6
Essigsäure	49,2	52,0
Wasser	11,6	8,4
	100,0	100,0

Dieses Salz, welches jetzt vorzüglich zur Malerei gebraucht wird, ist früher zur Ausscheidung der concentrirten Essigsäure, des sogenannten Radicalessigs, benutzt werden. Desfosses hat es zur Bestimmung des in einem Schwefelwasser enthaltenen Schwefelwasserstoffgases empfohlen. Es wird nämlich in der Auflösung dem Wasser so lange zugesetzt, bis es leicht vorwaltet. Das als Niederschlag erhaltene Schwefelkupfer, gewaschen und sorgfältig getrocknet, giebt die Menge des Schwefels, und also auch die des Schwefelwasserstoffgases an, die im Wasser enthalten war. Denn 100 Kubikzoll Schwefelwasserstoffgas liefern nach Berzelius 4,33 Schwefelkupfer. Dieses Doppelschwefelkupfer besteht aber aus 100 Metall und 50,836 Schwefel, wonach sich die Rechnung leicht machen läßt. Buchner bestätigt dies aus langer Erfahrung, weil dieses metallische Salz den Schwefel vollkommen niederschlägt, ohne auf Salzsäure, Schwefelsäure u. s. w., die in der Flüssigkeit enthalten seyn können, zu wirken, wie dies bei den Auflösungen von Blei, Silber u. s. w. mehr oder weniger der Fall ist.

* Alcanna. Die Wurzel.

Das Wort Alkanna ist das arabische Wort al henna, le henné, von Avicenna Tamrahenni, nicht Tamarhendi, genannt.

Die wahre Alkanna ist die Wurzel der Lawsonia inermis, eines in

Ostindien und Aegypten wild wachsenden Strauchs. Der Gebrauch derselben als Schminke, unter dem Namen des cyprischen Pulvers, von welchem schon bei Dioskorides und Plinius die Rede ist, ist außerordentlich alt; im ganzen Orient färbte man die Finger und die Nägel der Finger damit, die Frauen färbten sich auch die Nägel der Zehen.

Diese Wurzel ist dunkler und stärker als die folgende, kann aber durch dieselbe als Färbemittel sehr gut ersetzt werden.

Anchusa tinctoria Linn. Die rothe Ochsenzunge.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 9. Asperifoliae.

Diese in Deutschland häufige, ausdauernde Pflanze treibt mehrere, etwa 8 Zoll hohe, stark behaarte, auf der Erde aufliegende Stengel. Ihre Blätter gleichen denen der gemeinen Ochsenzunge, und die Blumen sind blau oder purpurfarbig.

Die Wurzel ist walzenförmig, zugespitzt, ziemlich lang, zuweilen fingersdick, mit einer dunkelrothen, leicht abfärbenden Rinde bedeckt, innen weißlich und holzig, aus dünnen runden Fasern bestehend. Sie ist geruchlos und von schwach süßlich-bitterlichem Geschmacke.

Der in der Rinde der Wurzel enthaltene Farbestoff allein wird benutzt. Pelletier (Trommsd. J. XXIV. 2. S. 229.) hat ihn untersucht. Alkohol nimmt ihn auf, aber die durchs Abrauchen des Alkohols erhaltene Substanz ist noch nicht reiner Farbestoff, denn wenn man sie in Aether auflöst, so bleibt ein braungelber bitterer Körper zurück. Um den Farbestoff ganz rein darzustellen, muß man dieses Auflösen in Aether mehrmals wiederholen, oder gleich mit Aether ausziehen.

Der so als Masse erhaltene Farbestoff ist so dunkelroth, daß er braun scheint; sein Bruch ist harzig, er wird bei mäßiger Wärme leicht weich und schmilzt vollkommen noch vor dem 60° Cent. In Wasser ist er unauflöslich, daher dieses auch von der Wurzel nur braun gefärbt wird; in Alkohol, Aether und in allen fetten Körpern aber ist er auflöslich und theilt diesen eine sehr schöne rothe Farbe mit. Mit den Alkalien bildet er auflösliche und unauflösliche Gemische von einer schön blauen Farbe. Wird die geistige Auflösung durch Metallauflösungen niedergeschlagen, so erhält man verschiedentlich gefärbte Lackfarben.

Auch John (Chemische Schriften, IV. S. 31.) hat die Alkanna analysirt und folgende Bestandtheile in 100 gefunden: eigenthümlichen, den Harzen verwandten Farbestoff (Alkannin), nicht schmelzbar, 5,50; Gummi 6,25; Extractivstoff 1,00; unauflöslichen eigenthümlichen Extractivstoff 65,00; Holzfaser 18,00; Verlust 4,25.

In der Pharmacie wird diese Wurzel noch bisweilen zum Färben einiger Fette benutzt.

* Alcornoco. Cortex. Alkornokorinde.

Alchornea latifolia Swartzii. Breitblättrige Alchornie.

Linn. Cl. XXII. Dioecia Ord. 13. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Dieser Baum, einem gewissen Alchorne zu Ehren so genannt, wächst häufig auf den höheren Bergen in Jamaika, und wird 20 Fuß hoch. Die Blätter stehen abwechselnd oder zerstreut, sind gestielt, 3 Zoll lang, oval zugespitzt, gezähnt, glatt. Die Blüthen stehen in mehr oder weniger zusammengesetzten Trauben, haben einen Kelch, aber keine Blumenkrone; die männlichen stehen zu 4 und 6 in Bündeln zusammen, die weiblichen Blüthentrauben hängen. Die Frucht ist eine schwärzliche runde Kapsel.

Die Rinde scheint von dem Stamme und den dickern Aesten gesammelt zu seyn, und kommt in Stücken von 4 bis 8 Zoll Länge, $\frac{1}{2}$—1 Zoll Breite und einigen Linien Dicke. Der äußere Theil der Rinde ist gewöhnlich ohne Oberhaut, uneben, und beträgt $\frac{2}{3}$ der Rinde; die eigentliche Rindensubstanz ist im Bruche fast eben, etwas körnig-faserig, hellröthlich-braun, glanzlos, von einem zusammenziehenden bitterlichen Geschmacke, und einem besondern moosartigen Geruche, welcher dem der Chinarinde nicht unähnlich ist. Der innere Theil der Rinde, oder der Splint, ist schmutziggelblich, auch wohl gelbweiß, im Bruche holzig faserig, besitzt einen schwächern Geruch und Geschmack, als der äußere Theil der Rinde, und läßt sich von diesem ziemlich gut trennen.

Durch Kochen mit Wasser giebt die Rinde ein Decoct, welches einem schwachen Chinadecocte ziemlich ähnlich ist, und auch bei dem Erkalten trübe wird. Durch Filtriren nach dem Erkalten wird es hell, und hat die Farbe eines alten Rheinweins. Es röthet das Lackmuspapier nicht, wird durch Säuren nicht merklich verändert, aber durch kohlensaures Kali grünlich, und durch ätzende Kalilauge goldgelb gefärbt. Es schlägt das basische essigsaure Blei weißgelb, und das neutrale mit gelber, etwas ins Grünliche spielender Farbe nieder. Eisenauflösung wird olivenbraun und Brechweinstein weißgelblich gefällt. Die Leimauflösung schlägt es nieder, während es auch durch Galläpfeltinctur getrübt wird.

Sie hat daher manches mit der China gemein (Trommsd. in dessen J. d. Ph. XXV. 1. S. 38.), unterscheidet sich aber durch eine größere Menge ausziehbarer Theile, durch die geringere Bitterkeit, und durch eine eigenthümliche krystallisirbare Substanz, von der weiter unten die Rede seyn wird.

Der Weingeist giebt damit eine sehr dunkelroth gefärbte Tinctur, die gleich der Abkochung den Geschmack der Rinde hat.

Nach einer Analyse von Rein (Gilbert's Annalen. 1815. 5. S. 121.) enthalten 1000 Th.: geschmackloses Harz 0,054; bittern Seifenstoff 0,102; Gummi 0,105; Wasser 0,136; Pflanzenfaser 0,603.

Nach Geiger (Trommsd. N. J. I. 2. S. 448.) enthalten 3 Unzen 6 Drachm.: bittern Extractivstoff 2 Dr. 18 Gr.; gummigen Extractivstoff mit chinasaurem (?) Kalk 28 Gr.; eisengrünenden Gerbestoff 20 Gr.; dem Vogelleim ähnliches Harz 54 Gr.; braunrothes geschmackloses Harz 1 Dr.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0057-4

14 Gr.; unauflöslich gewordenen Extractivstoff 8 Gr.; Pflanzenfaser 2 Unz. 6 Dr. 44 Gr.; Verlust an Feuchtigkeit 1 Dr. 54 Gr.

Schon im Jahre 1816 bemerkte Hr. Biltz (Brandes Archiv XII. 1. 1825. S. 46.) in der Alkornokorinde eine eigenthümliche krystallisirbare Substanz, die man am reinsten aus dem Splinte der Rinde durch Ausziehung mit Aether erhält. Mit dem Mikroscop erblickt man im Splinte diesen Stoff als weiße Körnchen. Diese eigenthümliche Substanz hat folgende Eigenschaften: sie fühlt sich fettig an, ist geschmacklos, leichter als Wasser, schwerer als Weingeist, Terpenthinöl und fette Oele, löst sich in Aether, in Terpenthinöl und im absoluten Weingeist schon in der Kälte leicht auf; in Weingeist von 80° W. aber löst sie sich bei niederer Temperatur nur gering, bei höherer aber in ziemlicher Menge, und scheidet sich dann beim Erkalten in Sternchen ab. In fetten Oelen ist sie in der Kälte nicht löslich, leicht aber in denselben löslich in der Wärme, und scheidet sich daraus beim Erkalten nicht wieder ab. Aetzkali und Aetzammonium, sowie schwache Säuren sind ohne Wirkung darauf. Concentrirte Schwefelsäure löst die Substanz mit braunröthlicher Farbe auf, und setzt man Wasser hinzu, so wird die Lösung milchig. Concentrirte rauchende Salpetersäure löst die Substanz in der Wärme auf, aber beim Erkalten scheidet sich ein Theil aus, und bei Zumischung von Wasser alles übrige. Die geistige Lösung reagirt weder sauer noch alkalisch, wird mit Wasser vermischt milchig, läßt die Eisensalze unverändert, fällt aber mit Bleizucker weiß nieder. In einer Glasröhre erhitzt, stößt die Substanz weiße Dämpfe aus, die sauer reagiren, aber an die kalten Wände legen sich die weißen Dämpfe in regelmäßigen Sternchen an, die aber nicht sauer reagiren, mithin rührt die saure Reaction von den Theilen der Substanz her, die bei der Sublimation zerstört werden. Nach Herrn Biltz steht diese Substanz zwischen Harz und Wachs, Stoltze hielt sie aber dem Alantkampher am ähnlichsten.

2 Unzen Alkornokorinde gaben nach Biltz: eigenthümliche krystallisirbare Substanz 11 Gr.; eine in Weingeist auflösliche, in Wasser und Aether unauflösliche Substanz 16 Gr.; Gerbestoff (harzigen Extractivstoff) 2 Dr. 17 Gr.; sogenannte gummöse Theile (gummigen Extractivstoff) 5 Dr. 24 Gr.; verbrennlichen Faserstoff und Verlust 7 Dr. 38 Gr.; Asche 14 Gr.

Diese Rinde wurde mit großem Aufsehen, als das vorzüglichste Mittel gegen die Schwindsucht, in die Medicin eingeführt, sie wurde in der Abkochung gegeben, hat aber ihren Ruf nicht bestätigt, und ist daher beinahe gänzlich wieder außer Gebrauch gekommen.

Allium Cepa. Bulbi. Zwiebeln.

Die Zwiebel hat einen starken, stechenden Geruch und scharfen Geschmack, welchen sie durchs Kochen verliert. Nach Versuchen von Fourcroy und Vauquelin (Gehlen's Journ. V. S. 357.) enthält sie 1) ein weißes, scharfes flüchtiges Oel, welchem sie ihre reizende Eigenschaft verdankt, und worin

sich Schwefel aufgelöst befindet, der die Ursache des widrigen Geruches ist; 2) eine thierisch-vegetabilische, dem Kleber ähnliche Substanz, die in der Hitze gerinnt; 3) vielen nicht krystallisirbaren Zucker; 4) eine große Menge dem arabischen Gummi ähnlichen Schleimes; 5) phosphorsauren Kalk, freie Phosphorsäure, Essigsäure und ein wenig citronensauren Kalk; 6) Pflanzenfaser.

Allium sativum. Bulbi. Knoblauch.

Die Knoblauchzwiebeln besitzen einen dem vorigen ähnlichen, durchdringenden, stechenden Geruch, und einen scharfen brennenden Geschmack, deren Hauptgrund auch hier in einem flüchtigen, äußerst stark riechenden gelben Oele liegt. Die übrigen Bestandtheile sind Eiweiß, Schwefel, eine zuckerartige Substanz und ein wenig Satzmehl. (Cadet in Gehlen's N. J. V. S. 354.)

Der ausgepreßte Saft, zu einigen Tropfen auf Zucker, ist als Wurmmittel gerühmt worden.

Aloë lucida. Glänzende Aloë.

Der an der Luft verhärtete Saft aus den durchgeschnittenen Blättern der Aloë spicata Thunberg, eines im südlichen Afrika einheimischen Strauches.

Gelbbraune, halbdurchscheinende, glänzende, zerreibliche Stücke, von einem sehr bittern, widrigen Geschmacke und widrigen Geruche, in Weingeist völlig, in Wasser bis auf den größten Theil auflöslich.

Die Aloë kommt wahrscheinlich von mehreren schönen Pflanzen heißer Länder, welche zur Gattung Aloë gehören, aus Hexandria Monogynia Linn., oder der 3ten Classe, Familie der Liliaceen Juss. Vorzüglich aber werden die genannte Aloë spicata, die am Vorgebirge der guten Hoffnung wächst, ihren botanischen Merkmalen nach aber nur sehr unvollkommen bekannt ist, und die A. perfoliata, durchwachsene Aloë, Aloë soccotrina Haw. als diejenigen Pflanzen bezeichnet, von welchen der eingedickte Saft gewonnen wird. Diese letztere ist ursprünglich auf der Insel Sokotorah, welche im indischen Meere über der östlichsten Spitze von Afrika liegt, einheimisch, aber auch in mehreren Gegenden des heißen Asiens und im südlichen Afrika, besonders auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung so häufig, daß die Berge von der Spitze bis zum Fuße dicht damit bedeckt sind. Auch nach Westindien hat man sie verpflanzt, nach Jamaika und Barbados, wo sie vollkommen gedeihet.

Die Wurzel dieser Pflanze ist faserig. Die am Grunde des Stengels rosenartig angehäuften Blätter sind dick, fleischig, länglich, spitz, 8—10 Zoll lang und 3—4 Zoll breit, am Rande gezähnelt, stengelumfassend, graugrün, hin und wieder mit weißen stachligen Warzen besetzt. Der Schaft ungefähr 2 Fuß hoch, mit aufrechten, spitzen Schuppen bedeckt; die

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0059-8

Blüthen roth, im geöffneten Zustande hängend, vor dem Aufblühen aufrecht, und eine längliche Traube bildend. Die Blüthen röhrig, die Staubfäden etwas länger als der Kelch; die Kapsel eiförmig-länglich, dreifächrig und mit 3 Längsfurchen bezeichnet.

Mehrere Aloëpflanzen werden als Varietäten der durchwachsenen Aloë angesehen, so die Aloë vulgaris, mit gegen 2 Fuß langen, am Grunde beinahe 3 Zoll breiten, sehr saftigen, schwertförmigen und gezähnten Blättern und gelben Blumen, von welcher ebenfalls der Saft gewonnen wird, wie dieses wahrscheinlich von noch einigen verwandten Arten dieser Gattung, als A. fruticosa, A. elongata, A. linguaeformis der Fall ist; doch soll nach Murray A. spicata die beste Aloë liefern.

Nach Murray enthält nicht das ganze Blatt die Eigenschaften des eingedickten Saftes; das Innere besteht aus einem unwirksamen schleimigen Marke, und der bittere Saft ist blos in den mehr oder weniger zahlreichen Gefäßen enthalten, welche in gleicher Richtung und der Länge nach unter der Oberhaut liegen. Es würde also unzweckmäßig seyn, zur Gewinnung des Saftes die ganzen Blätter zu zerstampfen. Auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung schneidet man daher bloß die Blätter an ihrem Grunde ab, und legt sie dergestalt in Haufen über einander, daß die untern Blätter zu Aufnahme- und Ablaufrinnen des von den obern Blättern herabträufelnden Saftes dienen. Auf Jamaika und Barbados stellt man die Blätter mit dem abgeschnittenen Theile nach unten in Fässer, welche man auf diese Weise damit anfüllt, und auf deren Boden sich der Saft sammelt. Zuletzt drückt man jedoch die Blätter schwach mit den Händen aus, und wahrscheinlich bringt schon der auf diese Weise nicht so rein erhaltene Saft eine Verschiedenheit in der Güte des Products hervor. Auch thut man auf Jamaika die in Stücke zerschnittenen Aloëblätter in kleine Körbe oder in Leinwand, und taucht sie 10 Minuten lang in kochendes Wasser, hierauf zieht man sie heraus und verfährt eben so mit den übrigen. Dieses setzt man so lange fort, bis die Flüssigkeit genug Saft zu enthalten scheint. Diesen läßt man erkalten, sich setzen und klärt ihn ab.

Der auf die eine oder die andere Weise erhaltene Saft bedarf keines sehr langen Abdunstens; man läßt denselben entweder in nicht sehr tiefen hölzernen Gefäßen an der freien Luft verdunsten — und die dadurch gewonnene Aloë ist die schönste — oder häufig dampft man den Saft über dem Feuer ab, bis derselbe Fäden zieht, die fest und zerbrechlich werden. Dann gießt man ihn in die Gefäße, in welchen er auch nach dem Erkalten verschickt wird.

Ob nun die verschiedenen im Handel vorkommenden Aloësorten von wirklich verschiedenen Pflanzen herkommen, oder ob, wie Guibourt behauptet, die Verschiedenheit der Sorten von der verschiedenen Bereitungsweise abhänge, und daß in jedem Lande, wo die Aloë bereitet wird, durch Anwendung des reinsten Saftes der dort gebauten Pflanzen die reinste (sokotrinische) Aloë erhalten werde, und daß man, um nicht den Rückstand

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0060-9

dieses Saftes verloren zu geben, aus diesem noch Aloë bereitet, welche nach dem Grade ihrer Unreinheit den Namen Leber- oder Roßaloë erhält, läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden, doch scheint die weiter unten anzuführende chemische Verschiedenheit der Aloësorten diese Meinung Guibourt's zu bestätigen.

Im Handel unterscheidet man vorzüglich 3 Sorten:

1) Die sokotrinische Aloë (Aloë socotrina), welche ihren Namen von der erwähnten Insel Sokotarah erhalten hat. Diese Aloë besteht aus großen braunrothen Massen, welche in dünnen Stücken wie Spießglanzglas fast purpurroth durchscheinend, in größern Stücken nur an den Kanten durchscheinend sind. Sie ist glänzend, von Glasglanz, leicht, auf dem Bruche muschlig, von safrangelbem Striche, welche Farbe auch das Pulver hat, leicht zerbrechlich und zerreiblich, von einem der Myrrhe etwas ähnlichen aromatischen Geruche und einem in hohen Grade rein bittern, lange anhaltenden Geschmacke. Die beste Sorte kommt in Kürbisschalen vor, ihr Hauptkennzeichen ist, daß sie sich in Weingeist ohne Rückstand auflöst. Diese feinste Sorte kommt nur noch selten, bisweilen als cap'sche Aloë (Aloë capensis) vor.

Ehedem hat man wohl noch die glänzende Aloë (Aloë lucida) unterschieden. Dieser Saft tröpfelte aus den in die Blätter der Pflanze gemachten Einschnitten, er trocknete auf den Blättern selbst ein, und hatte die Gestalt kleiner rother, durchscheinender Tropfen. Auch diese kommt nicht mehr im Handel vor, und wird durch die sokotrinische ersetzt.

Die Aloë ist in Weingeiste und heißem Wasser auflöslich. Die heiße wäßrige Auflösung bildet eine durchsichtige dunkelgelbe Flüssigkeit, die sich aber beim Erkalten trübt, und ein gelbbraunes, durchsichtiges Harz fallen läßt, welches nur mäßig bitter schmeckt, auch weniger purgirend wirkt, und sich völlig wie ein Harz verhält. Der im Wasser aufgelöst gebliebene Stoff ist sehr bitter, nach dem Abdampfen zur Trockne völlig wieder auflöslich, sowohl in Wasser als in absolutem Alkohol, nicht aber in Aether. Die wäßrige Auflösung der Aloë geht nach Pfaff in sehr langer Zeit in keine, weder weinige, noch saure, noch Schimmelgährung ein, nur fand Braconnot, daß sie nach Verlauf von 2½ Monaten eine Art Zähigkeit angenommen hatte, und daß der Galläpfelaufguß nunmehr einen ziemlich reichlichen Niederschlag machte.

In absolutem Alkohol ist die Aloë völlig auflöslich, und diese Auflösung läßt sich mit Wasser vermischen, ohne daß das Harz ausgeschieden wird. Erst wenn der Weingeist abgezogen, die Flüssigkeit völlig zur Trockne verdunstet ist, und der Rückstand in siedendem Wasser aufgelöst wird, fällt das Harz beim Erkalten der Auflösung zu Boden.

Nach Trommsdorff (J. d. Ph. XIV. 1. S. 27.) besteht die Sokotrinaloë aus 74,4 bitterm Seifenstoffe, 25 Harz, 0,6 Holzfaser und einer Spur Gallussäure.

Diesen in Wasser und Weingeist gleich auflöslichen Seifenstoff hält

Pfaff, bei aller seiner Aehnlichkeit mit andern Arten des Seifenstoffs, doch für so eigenthümlich, daß er ihn mit dem besondern Namen Aloëstoff bezeichnet, und zur Darstellunng desselben folgendes Verfahren angiebt. Die Aloë (Sokotrin- oder Leberaloë) wird mit Alkohol ausgezogen, die geistige Tinctur mit dem gleichen Gewicht Wasser versetzt, der Weingeist abgezogen, die rückständige Flüssigkeit vollends bei gelindem Feuer zur Trockne abgedunstet und der Rückstand wieder mit kochendem destillirten Wasser übergossen, worauf sich beim Erkalten die harzigen Theile absetzen, und die überstehende klare Flüssigkeit den reinen Aloëstoff enthält. Auch kann dieser Aloëstoff hinlänglich rein durch Ausziehen der Aloë mit kaltem, destillirten Wasser erhalten werden.

Der Aloëstoff hat folgende Eigenschaften: in trocknem Zustande ist er braunroth, in dünnen Schichten durchscheinend, von sehr bitterm Geschmack und einem schwachen, eigenthümlichen, den Safran etwas ähnlichen Geruch. Zerrieben stellt er ein gelbes Pulver dar. Er ist in Wasser wie in Alkohol vollkommen auflöslich, doch löst er sich in letzterm langsamer und in verhältnißmäßig geringerer Menge auf. Beide Auflösungen sind vollkommen durchsichtig und dunkel goldgelb gefärbt; durch das Stehen an der Luft verändert sich die Farbe der wäßrigen Auflösung, welche beim Schütteln schäumt, etwas ins Dunkelbräunliche, doch ohne daß sich etwas absetzt. In Aether ist er unauflöslich. Die Auflösung röthet das Lackmuspapier nicht, sondern theilt vielmehr dem gerötheten Papier eine bläulichgrüne Tinte mit. Bei der trocknen Destillation giebt der Aloëstoff eine empyreumatische Säure, mit Ammoniak nicht vollkommen gesättigt, sowie ein dickes Oel von einem scharfen und beißenden Geschmack ohne alle Bitterkeit, und es bleibt eine lockere voluminöse Kohle zurück, die sich leicht einäschern läßt, und eine Spur von kohlensaurem Kali zurückläßt.

Erhitzt man das Aloëbitter mit 8 Theilen Salpetersäure, dampft es zur Trockne ab, und behandelt den Rückstand mit Wasser, so bleibt ein dunkelgelbes sehr bitteres Pulver, welches einer großen Menge Wasser eine schöne Purpurfarbe mittheilt, auf einer Karte mittelst einer Kohle erhitzt verpufft, und dabei einen purpurnen Dampf, der die Kohle purpurn färbt, entwickelt, und welches mit Kali eine purpurne verpuffende Verbindung giebt.

Wenn man auf die angegebene ganz einfache Weise, daß man die Sokotrinaloë durch kaltes destillirtes Wasser auszieht, die beiden Bestandtheile der Aloë zu trennen sucht, so erhält man den erwähnten Aloëstoff, der auf gerötheten Lackmuspapier schwach alkalisch wirkt, wogegen der harzige Bestandtheil, in Weingeist aufgelöst, das Lackmuspapier schwach röthet. Um beide Reactionen zu erkennen, befeuchte man die Reagenzpapiere mit den Auflösungen, oder besser, bringe etwas von dem Aloëstoffe auf das mit Wasser angefeuchtete, vorher durch Essig gerötheten Lackmuspapier, und etwas von dem Aloëharze auf das mit Weingeist angefeuchtete Lackmuspapier, wasche nach einiger Zeit beide Papiere ab, und man wird die Farbeänderung erkennen. Es scheinen demnach diese beiden Bestandtheile eine einigermaßen

salzartige Verbindung zu bilden, welche auch durch die galvanische Säule getrennt werden kann. Wird Aloë in einem Gläschen mit Weingeist übergossen, und mit einem andern, gleichfalls etwas Weingeist enthaltenden Gläschen durch einen Baumwollenfaden in Verbindung gesetzt, dann in jedes derselben ein Pol der galvanischen Säule geleitet, so wird sich bald der klare Weingeist färben, und der mit dem positiven Pol verbundene Weingeist das Lackmuspapier röthen, wogegen am negativen Pole die Farbe des gerötheten Lackmuspapiers wieder hergestellt wird. Es scheidet hier demnach der Aloëstoff als das basische, das Aloëharz als das saure Prinzip aus, ohne daß jedoch der erstere zu den Alkalien, und das zweite zu den Säuren gezählt werden könnte, wenn gleich Meißner (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 296.) ein Aloëalkaloid durch folgendes Verfahren erhalten haben will. Er schlug den wäßrigen Aloëauszug durch essigsaures Blei nieder, rauchte die essigsaure Auflösung ab, trieb die Essigsäure durch Schwefelsäure aus, und erhielt so ein krystallinisches, bräunliches, in Wasser auflösliches, unangenehm aloëartig riechendes und schmeckendes Salz, das durch vorsichtig zugesetztes Barytwasser zersetzt eine braune Auflösung gab, die deutlich alkalisch auf gerötheten Lackmuspapier reagirte. Meißner schließt daraus auf ein eigenthümliches Alkaloid in der Aloë, das er Aloine nennt. Es möchte hier aber wohl die chemische Einwirkung der Säuren auf die Bestandtheile der Aloë zu berücksichtigen seyn.

Braconnot nimmt noch eine flohfarbne Substanz (principe puce) an, welche den beiden genannten Bestandtheilen beigemischt sey. Man soll dieselbe fast ganz rein erhalten durch Auflösen der Aloë in kochendem Wasser, ruhiges Hinstellen zum Abkühlen, und wiederholtes gleiches Verfahren mit dem erhaltenen Absatze. Sie ist dunkelbraun (flohfarben), ohne Geruch und fast ohne Geschmack, brennt mit weniger Flamme ohne zu schmelzen, und fast ohne sich aufzublähen, ist in schwacher Lauge leicht, auch etwas in kochendem Wasser auflöslich, und giebt durch Abziehen der Salpetersäure darüber eben so, wie der Aloëstoff, ein gelbes auf Kohlen verpuffendes, sehr bitteres Pulver, das dem Wasser eine orangerothe Farbe mittheilt. Braconnot hält es dem Farbestoff in der China, im Wermuth, Tausendgüldenkraut ꝛc. analog, auch darum, weil es mit dem Aloëbitter eben so innig verbunden ist, wie die rothe färbende Substanz mit dem Chinastoff. Pfaff erklärt aber dieses principe puce mit Recht für nichts anderes, als den harzigen Bestandtheil der Aloë.

Auch über das Verhalten der Aloë gegen Laugensalze hat Braconnot Versuche mitgetheilt. Diesen zufolge bildet sie mit den Alkalien eine Art Seife, und mit dem Ammoniak nach behutsamen Abrauchen sogar eine nadelförmige Krystallisation (deren Darstellung mir aber nicht gelingen wollte.) Eben so sind die Versuche über die Einwirkung der Salpetersäure auf die Aloë mitgetheilt. Durch Abziehen derselben über Aloë wird nämlich, außer Kleesäure und Aepfelsäure, eine ganz eigenthümliche merkwürdige gelbe Substanz, Welter's gelber Säure ähnlich, gebildet. Sie hat wohl ausgewaschen

eine sehr schöne gelbe Farbe, eine ausnehmend starke Bitterkeit, röthet das Lackmuspapier, und braust mit kohlensauren Laugensalzen auf, hat einen angenehm aromatischen Geruch, besonders erwärmt, in der Hitze schmilzt sie, verbreitet einen aromatischen Dampf und hinterläßt einen reichlichen kohligen Rückstand; im Wasser ist sie nur zu $\frac{1}{1200}$ auflöslich, die Auflösung hat eine schöne rothe Farbe, wie das arterielle Blut; salzsaures Zinn bildet darin einen Niederschlag wie Weinhefen; Alkohol löst $\frac{1}{36}$ davon auf, die Auflösung hat eine sehr dunkelrothe Farbe; die mineralischen Säuren lösen sie in der Wärme auf, ohne sie zu verändern, in der Kälte fällt sie wieder nieder; das Kali bildet damit eine dunkelrothe krystallisationsfähige Verbindung, das rothe Salz detonirt mit der Heftigkeit des Salpeters, und hinterläßt eine leichte Spur von Kohlen und einen merklichen Geruch nach Blausäure.

Dieser gelbe Stoff scheint nicht verschieden von dem zu seyn, welchen Pfaff durch die Einwirkung der Salpetersäure auf den Aloëstoff, und Braconnot auf die flohfarbne Substanz erhielten.

Trommsdorff nimmt außer dem Aloëstoff und Aloëharz noch eine Spur Gallussäure als Bestandtheil der Aloë an, weil die Aloëauflösung das Lackmuspapier roth und die Eisenauflösungen dunkel färbt, ohne jedoch die Gallerte niederzuschlagen. Pfaff stimmt dem aber nicht bei, weil bei ihm (auch bei mir) das Rothfärben des Lackmuspapiers sich nicht zeigte, und die Farbe, welche die Gallussäure in oxydirten Eisenauflösungen hervorbringt, ganz verschieden ist von derjenigen, welche der Aloëaufguß bewirkt.

Die neuesten Versuche über die Aloë sind von Herrn Dr. Winkler (Geiger's Magazin, März 1826. S. 274.). Er folgert aus denselben, daß die Aloë als ein höchstwahrscheinlich neutrales Pflanzensalz anzusehen sey, bestehend aus einem eigenthümlichen nicht bittern Hartharz (basischer Natur?), einem färbenden, nicht bittern, sich sauer verhaltenden Princip, und einer eigenthümlichen, nur wenig bittern, basischen Substanz, die aber nur ein sehr geringes Abstumpfungsvermögen gegen Säuren besitzt, und sich den amphoteren Stoffen, z. B. Gummi, Amydon, anzureihen scheint.

Bemerkenswerth ist, daß, wenn Aloëauflösung mit Bleiglätte digerirt worden, das Blei nicht durch Hydrothionsäure abgeschieden werden konnte, sondern dieses nur durch Schwefelsäure gelang.

2. Leberaloë (Aloë hepatica). Die beste Sorte dieser Aloë kommt in Kürbisschalen vor. Diese ist auf der Oberfläche schwarzbraun; zeigt auf dem frischen Bruche, der eben ist, eine dunkle leberbraune Farbe, ist dunkler als die Sokotrinaloë, nicht so glänzend, weniger durchscheinend, trocken und fest, von widrigem starken Geruche und ekelhaft bitterm Geschmacke. Es giebt von der Leberaloë mehrere Sorten, die in Leder oder in mit Leder überzogenen Kisten verpackt sind, und sich der Sokotrinaloë mehr oder weniger nähern. Eine sehr geringe Sorte, in Fässern verpackt, aus Barbados oder auch vom Vorgebirge der guten Hoffnung kommend, ist mehrentheils weich und klebrig, hat einen noch widrigern Geruch und Geschmack.

Im Wesentlichen verhält sich die Leberaloë wie die Sokotrinaloë. Das

Wasser löste in Trommsdorff's Versuchen von 16 Unzen 13 Unzen auf, die alle Eigenschaften des Aloëstoffes zeigten; die übrigen 3 Unzen aber verhielten sich nicht als reines Harz, sondern es blieben bei der Behandlung mit Alkohol 2 Unzen zurück, die sich ganz wie Eiweißstoff verhielten. Dieser Analyse zufolge bestehen 100 Leberaloë aus 81,25 bitterm Seifenstoff (Aloëstoff), 6,25 Harz, 12,50 Eiweißstoff mit einer Spur Gallussäure (?).

Der bedeutende Gehalt an Eiweißstoff scheint zu beweisen, daß die Leberaloë durch Auspressen der Blätter erhalten werde, wobei sich der allgemein in den Blättern enthaltene Eiweißstoff beimischte. Nach Bouillon Lagrange und Vogel sind die Bestandtheile: Harz 42; Aloëbitter 52; geronnener Eiweißstoff 6. Aeltere Analysen von Levis und Boulduc weichen noch mehr ab, und geben in der Leberaloë mehr Harz (nämlich $\frac{1}{2}$) als in der sokotrinischen (nämlich $\frac{1}{4}$) an, und gar keinen Eiweißstoff. Wahrscheinlich giebt auch die verschiedene Bereitungsart nicht ein stets gleiches Product.

3) Die Roßaloë (Aloë caballina). Sie ist die allerschlechteste Sorte, beinahe schwarz, riecht und schmeckt sehr widrig, und ist mit allerhand erdigen, steinigen und fremdartigen Theilen vermischt, kommt aber jetzt nur noch selten vor.

Die Aloë ist in kleinen Gaben ein die Thätigkeit des Magens erregendes, die Verdauung beförderndes, in größeren Gaben ein hitziges Purgirmittel, welches nicht für alle Naturen paßt. Nach Wedekind wirkt sie allein dadurch purgirend, daß sie Galle secernirt, welche abführend ist. Daher ihre erst nach 8—12 Stunden erfolgende Wirkung, wenn die ausgeschiedene Galle auf die Gedärme und den Mastdarm wirkt; daher ihre specifische Wirkung in der Gelbsucht, die Wedekind durch Dosen von 2 Gran Aloëextract täglich sicher in 8 Tagen heilt.

Die Aloë kommt zu mehreren Pillenmassen und Tincturen, dient auch zur Bereitung des Extracts; äußerlich wird sie gleichfalls angewendet.

Althaea. Herba. Eibischkraut. Altheekraut.

Althaea officinalis Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands.

Blätter fast herzförmig, fast fünflappig und fast dreilappig, ungleich und scharf gekerbt, mit einem aschgrauen sehr weichen Filze bedeckt, mit vielem Schleime angefüllt. In den Monaten Juni und Juli vor der Blüthezeit einzusammeln.

Althaea officinalis. Der gemeine Eibisch.
Linn. Cl. XVI. Monadelphia. Ord. 6. Polyandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 14. Malvaceae.

Diese sehr schöne, in Europa einheimische Pflanze wächst gern an feuchten Orten, an Flüssen und Bächen, auf Wiesen und an Waldrändern; sie wird auch häufig in Gärten und auf Feldern gezogen.

Die Wurzel ist lang, rund, graugelblich und wenig ästig; sie treibt ei-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0065-8

nen weißfilzigen Stengel, der aufrecht, rund, 2—4 Fuß hoch und mit einigen abwechselnden Aesten besetzt ist. Die abwechselnden, gestielten, sehr weichen, weißlichgrünen Blätter sind ausgebreitet herzförmig-eirund, mit 3—5 wenig deutlichen, spitzen, gekerbten Lappen, und mit wolligem, fast seidenartigem Filze bedeckt; zwei häutige, abfallende, behaarte, tief in 2—3 schmale Zipfel getheilte Nebenblätter stehen am Grunde jedes Blatts.

Die blaß-purpurröthlichen, fleischfarbigen oder auch weißen Blüthen stehen in den obern Blattwinkeln in kleine Büschel vereinigt. Der Kelch ist doppelt, die Krone fünfblättrig.

Die Frucht ist eine vielfächerige Saamenkapsel mit kleinen, braunen, nierenförmigen Saamen.

Die Pflanze blüht im Juli und August.

Das officinelle Kraut ist geruchlos, der Geschmack desselben ist schleimig und etwas bitter. Es wird als erweichendes Mittel, jedoch selten, gebraucht; es enthält bedeutend weniger Schleim, als die Wurzel.

Auch die Blumen sind als Brustmittel angewandt worden.

Althaea. Radix. Eibischwurzel. Altheewurzel.

Die Wurzel nach dem Stengel aufwärts ästig, mit langen fast einfachen Aesten, von der Dicke des kleinen Fingers, außen bräunlich-grau, innen weiß, von schwachem Geruche und süßlichem Geschmacke. Sie kommt gemeiniglich von der äußern Haut befreit im Handel vor. Muß im Herbste gesammelt werden.

Diese Wurzel soll nach Link (Schweigg. J. XIII. S. 186. u. Trommsd. J. XXV. S. 398.) den Schleim in den Zellen in Form von kleinen Körnern, wie das Stärkemehl, enthalten, die man durch das Vergrößerungsglas erkennen könne, die durch Aufgießen von kaltem Wasser verschwinden, aber durch Auswaschen der klein zerschnittenen Wurzeln mit absolutem Alkohol eben so abgetrennt und für sich dargestellt werden, wie man die Stärke durch Auswaschen mit kaltem Wasser darstellt. Der milchige Alkohol setzte ein gelblichweißes, zartes, leichtes Pulver ab, der Stärke im Aeußern bis auf die weniger weiße Farbe ganz ähnlich, das unter dem Vergrößerungsglase aus lauter kleinen durchsichtigen Körnern von verschiedener Größe bestand, die kaltes Wasser schleimig machten, aber auch in sehr vielem kalten Wasser sich bei weitem nicht, wohl aber in heißem, bloß mit Hinterlassung einer ungeformten Masse, auflösten, woraus Link schließt, daß diese Körner zum Theil schon in den Zustand der Stärke übergegangen seyen. Pfaff erklärt sie dagegen eher für Inulin, als eine besondere Art des Stärkemehls. In der weitern Analyse wurde die Wurzel mit Wasser gekocht, und die Abkochung zur Extractdicke abgeraucht, welches braun war, und einen faden süßlichen Geschmack hatte. Absoluter Alkohol machte sogleich einen Niederschlag, der zähe und elastisch war, und durch das Trocknen noch zäher und

elastischer wurde. Was von Alkohol nicht aufgenommen wurde, löste sich bis auf einen sehr kleinen Rückstand, welcher eine dem Kleber am nächsten verwandte Substanz war, im Wasser wieder vollkommen auf. Die wäßrige Auflösung war braun, schmeckte fad, und hatte einen besondern Geruch. Schwefelsaures Eisen wurde nicht davon verändert, essigsaure Kupferauflösung aber mit grüner Farbe niedergeschlagen. Wieder zur Extractdicke abgeraucht, brachte absoluter Alkohol eine Gerinnung hervor, und färbte sich gelb. Die geistigen Tincturen, auch die früheren, hinterließen einen braunen klebrigen Rückstand von dem eignen, faden, etwas süßlichen Altheegeschmacke. Link hält diesen für unveränderten Altheeschleim, durch etwas Wasser auflöslich gemacht, Pfaff erklärt ihn dagegen für süßen in Alkohol und Wasser auflöslichen Extractivstoff. Bei der trocknen Destillation wurde freies Ammoniak erhalten. Mit Salpetersäure gekocht wurde nicht Schleimsäure, wohl aber Kleesäure und etwas äpfelsaurer Kalk erhalten.

Buchner (Repert. IV. S. 393.) bemerkt, daß die Eibischwurzel auch wahres Stärkemehl enthalte, indem der durch Kochen bereitete Auszug desselben durch Jod blau gefärbt wird, eine Bemerkung, die auch schon früher Collin und Gaultier (Schw. J. XIII. S. 453.) gemacht hatten.

Leo Meier (Berl. Jahrb. XXVII. 2. S. 75.) giebt als Resultate seiner Untersuchung folgende Bestandtheile in 1000 an: 1) Schleim mit freier Aepfelsäure, mit äpfels., salzs., schwefels. und phosphorsaurem Kalk, Magnesia und Kieselerde 200,00 (durch kaltes Ausziehen mit Wasser erhalten); 2) süßer Extractivstoff mit freier Aepfelsäure, äpfelsaurem Kalk und Kali, salzsaurem und schwefelsaurem Kalk, schwefelsaurer Talkerde und Kieselerde 101,44 (durch Digestion des kalten wäßrigen Auszugs mit Alkohol erhalten); 3) Kleber; 4) Inulin 5,58 (aus der Abkochung schied sich ein graulich gelbes Pulver aus, welches durch Abdampfen vermehrt wurde); 5) Stärke 13,88; 6) Harz ?; 7) Faserstoff 657,50; 8) Verlust, worin aber auch der Kleber und das Harz mit inbegriffen sind.

Pleischl (Schweigg. N. J. XIII. S. 491.) hat auch Schwefel in der Eibischwurzel gefunden. Ferner soll auch kohlensaures Ammoniak darin enthalten seyn. (Kastn. Archiv IV. S. 420.)

Bacon erhielt ein Salz, dessen Basis er noch nicht hat erkennen können, in glänzenden, halbdurchsichtigen rhombischen Oktaëdern von grüner Farbe, welches Lackmus röthete. Die übrigen bei der Analyse erhaltenen Substanzen sind: Stärkemehl, Schleimzucker, Schleim und ein gelbes Oel.

Auch bei dieser Pflanze ist der Einfluß der Cultur auf eine auffallende Weise wahrzunehmen; wird sie nämlich, statt auf lehm- und mergelartigem Boden, auf sandigem, gut gedüngtem gezogen, so ist die Wurzel fast geschmacklos, und in minderem Grade schleimig.

Die Eibischwurzel wird in Pulverform, im Aufguß und Decoct verordnet. Durch langes Kochen aber nimmt der Schleim einen widrigen Geschmack an. Der süße Schleim oder Extractivstoff ist gährungsfähig, daher der Auszug nicht auf sehr lange Zeit bereitet werden muß.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0067-0

Der Altheeschleim wirkt auf die essigsaure Kupferauflösung, auf die Blei- und Queckſilbersalze, mit welchen er coagulirt, zersetzend; Eisensalze werden nicht verändert.

Alumen. Sulphas aluminico-kalicus cum aqua, aut aluminico-ammonicus cum aqua. Alaun.

Ein Präparat aus den Alaunerzen in eigenen Fabriken.

Ein Salz in weißen fast durchsichtigen krystallinischen Stücken, von süßlichem herben Geschmacke, in sechszehn bis zwanzig Theilen Wasser auflöslich. Besteht aus schwefelsaurer Alaunerde, schwefelsaurem Kali oder Ammoniak und einer großen Menge Wasser. Er sey nicht gar zu sehr mit Eisen verunreinigt, und von Kupfer ganz frei, welches sich, auf den Zusatz von ätzender Ammoniakflüssigkeit, durch die blaue Farbe verräth.

Der Alaun war nach Plinius schon den Alten bekannt; doch wissen wir daß die Kunst der Bereitung kaum seit 3 Jahrhunderten von der syrischen Stadt Rocca, welche früher Edessa hieß, nach Europa übergegangen (daher denn die nicht allgemein verstandene Benennung des Alauns von Rocca), in Italien zuerst ausgeübt worden sey, und erst später in Deutschland sich verbreitet habe. Um das das Jahr 1544 bestanden schon mehrere Alaunfabriken in Deutschland, von denen eine in Schwemsal noch vorhanden ist.

Der Alaun kommt zwar auch im natürlichen Zustande vor, jedoch nur in sehr geringer Menge, denn nur wenige mineralische Quellen und einige Seen in Toscana enthalten ihn ganz gebildet, daher wird bei weitem der mehreste Alaun durch die Kunst bereitet. Da nun dieses Salz besonders für den technischen Gebrauch von großer Wichtigkeit ist, so hat es viele Untersuchungen über die Bereitung und Zusammensetzung desselben veranlaßt.

Die häufigste künstliche Bereitung ist die aus den sogenannten Alaunerzen, als dem schwefelhaltigen Thon, welcher das reinste Alaunerz enthält, hauptsächlich aber derjenige von Tolfo bei Civita Vecchia in Italien, dem kiesigen Thon, den man zu Schwemsal in Sachsen in einer Tiefe von 10 oder 12 Fuß findet, dem Alaunschiefer, welcher ein nicht beständiges Verhältniß Steinöl und Kies, die innig mit ihm verbunden sind, enthält, dem vulcanischen Alaunerz, z. B. demjenigen zu Solfatara bei Neapel, und dem bituminösen Alaunerz, welche Schieferart soviel ölige Materie oder Erdharz enthält, daß sie brennbar ist.

Diese Erze enthalten den Alaun nicht als solchen schon gebildet, sondern nur die Elemente desselben: Schwefel und Alaunerdemetall. Damit nun das Erz an der Luft verwittere, d. h. Sauerstoff und Feuchtigkeit aus der Luft anziehe, und sich in schwefelsaure Alaunerde verwandle, ist es des beigemischten Erdharzes wegen häufig nöthig, daß das Erz im Feuer geglühet werde, eine

gewisse Zeit hindurch, von 2 bis 12 Monaten und länger, der Luft ausgesetzt bleibe, und von Zeit zu Zeit mit Wasser begossen werde. Sobald die Erze gänzlich zerfallen sind, werden sie ausgelaugt, die Flüssigkeit auf frische geröstete Erze gebracht, bis sie eine spec. Schwere von 1,15 hat, und dann in bleiernen Pfannen bis auf 1,35 spec. Gewicht abgedampft. Da aber die schwefelsaure Thonerde an sich nicht krystallisirbar ist, so muß der Lauge von solchen Erzen, die kein oder nicht genug Alkali enthalten, etwas davon zugesetzt werden, entweder durch Zugießen von Asch- oder Kalilauge, oder Urin, oder man hat vorher zwischen den Erzen beim Rösten abwechselnd Reisigbündel aufgeschichtet, welche verbrennen und kalihaltige Asche liefern.

Die bis zur gehörigen Stärke abgedampfte Flüssigkeit wird nun in Fässer zur Krystallisation gebracht. Die Krystalle werden gewaschen, getrocknet und in soviel Wasser gebracht, daß bei der Siedehitze eine gesättigte Auflösung entsteht. Diese wird in Fässer abgegossen. Nach 10 oder 16 Tagen zerschneidet man die Reifen an den Fässern, und nimmt letztere aus einander. Man findet den Alaun äußerlich in Gestalt eines festen Kuchens, und in der innern Höhlung in großen pyramidalischen Krystallen. Diese letztere Operation wird das Versteinern genannt.

Zu Paris wird der Alaun aus seinen Bestandtheilen zusammengesetzt, indem ein Thon, welcher etwas weniges kohlensauren Kalk und Eisenoxyd enthält, geglüht, um das Eisen vollkommen zu oxydiren, und in bleiernen Trögen mit verdünnter Schwefelsäure behandelt wird. Der erhaltenen Auflösung setzt man entweder schwefelsaures Kali oder schwefelsaures Ammoniak zu und läßt sie krystallisiren.

Zuweilen bereitet man den Alaun auch dadurch, daß man den bei der Bereitung der Salpetersäure, bei welcher das salpetersaure Kali durch Thon zersetzt wird, erhaltenen, aus Thon und Kali bestehenden Rückstand mit Schwefelsäure behandelt, wodurch sogleich ohne weitern Zusatz Alaun gebildet wird.

Der Alaun bildet, wie er im Handel vorkommt, größere aus Oktaëdern bestehende krystallinische Massen, deren Krystallform jedoch nicht genau bestimmt ist, ist weiß, beinahe durchsichtig, von muschligem, glasigem Bruche, von einem erst süßen, hintennach herben, widrigen Geschmacke. In Alkohol ist er ganz unauflöslich. An der Luft wird er durch eine schwache Verwitterung an seiner Oberfläche mehlig. Einem gelinden Feuersgrade ausgesetzt schmilzt er in seinem Krystallisationswasser, schwillt auf, und verwandelt sich in eine weiße, erdige Masse (gebrannter Alaun). Der mit Kali geglühte Kalialaun wird zu Pyrophor. Diese Verbindung, unter dem Namen „Hombergscher Pyrophor" bekannt, stellt man gewöhnlich dar, indem man 3 Th. krystallisirten Kalialaun mit 1 Th. Mehl, Zucker oder einer andern kohlenstoffhaltigen Substanz unter Umrühren mit einem Spatel bis zum Verkohlen und Verflüchtigen des Krystallwassers röstet, dann das gröbliche schwarze Pulver in einem eisernen, irdenen oder gläsernen Gefäße mit enger Mündung glüht, bis die anfangs erscheinende bläuliche Flamme von Kohlenoxyd-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0069-4

gas und Schwefel verlöscht, worauf man das Gefäß erst mit einem Kreide-, dann mit einem genau schließenden Stöpsel verschließt. Nach Lampadius wird durch einen Zusatz von $\frac{1}{16}$ Schwefelkali der Pyrophor verbessert. Döbereiner empfiehlt gleiche Theile gebrannten Alaun, kohlensaures Kali und Kienruß.

Die verschiedenen Pyrophore erscheinen als graue oder schwarze staubige Massen, welche sich beim Zutritte von nicht ganz trockner Luft von selbst entzünden. Die Ursache dieser Entzündung ist mit Davy sehr wahrscheinlich in das fein zertheilte, durch das Glühen der Masse gebildete Kalium (Kalimetall) zu setzen.

Der Alaun (Alumen vulgare, A. album, A. glaciale, A. sacchari-num) ist ein Doppelsalz und besteht aus Schwefelsäure, Alaunerde und Kali oder Ammoniak, aus welchem die Thonerde durch Kali abgeschieden werden kann. Wegen vorwaltender Säure wird das Lackmuspapier geröthet.

besteht nach Berzelius

Das krystallisirte schwefelsaure Alaunerde-Kali		Das krystallisirte schwefelsaure Alaunerde-Ammoniak	
aus Kali	9,95	Ammoniak	8,8
Alaunerde . .	10,76	. . . . .	11,5
Schwefelsäure .	33,74	. . . . .	36,0
Wasser . . .	45,55	. . . . .	43,7
	100,00		100,0

Außer diesem gemeinen Alaun kommt noch ein anderer im Handel vor, der römische oder rothe Alaun, und zwar in Stücken, die kleiner und unregelmäßiger als die des gemeinen Alauns sind. Dieser römische Alaun, der aus den Alaunsteinlagern bei Tolfo gewonnen wird, bietet die zuerst von Hassenfratz bemerkte, und noch nicht hinlänglich erklärte, auffallende Erscheinung dar, immer in Würfeln zu krystallisiren, wodurch er sich von dem nachgekünstelten sehr gut unterscheiden läßt. Er ist mit vielem blaßrothen Staube bedeckt, welcher aus Eisenoxyd und basisch schwefelsaurer Thonerde mit Kali besteht. Durch Lösen und Filtriren erhält man daraus einen farblosen fast eisenfreien Alaun. Da diese Alaunsorte wegen der äußerst geringen Menge des darin enthaltenen schwefelsauren Eisens, welches Salz im gewöhnlichen Alaun in größerer Menge enthalten, und bei der Anwendung des Alauns in der Färberei der Lebhaftigkeit gewisser Farben nachtheilig ist, im Handel mehr gesucht wird, und daher auch in einem höhern Preise steht, so sucht man ihn bisweilen dadurch nachzumachen, daß der befeuchtete gewöhnliche Alaun in einem Gemenge von 1 Th. Eisenoxyd und 60 Th. Alaunpulver gewälzt wird, was durch die erwähnte verschiedene Krystallform sogleich erkannt wird.

Der in der Gravenhorstischen Fabrik zu Braunschweig bereitete rothe Alaun ist mit Kobalt gefärbt, und daher zum arzneilichen Gebrauche zu verwerfen.

Die angegebene Verunreinigung mit Eisen wird dadurch erkannt, daß ätzendes Kali, welches zuerst die Thonerde niederschlägt, im Uebermaße zugesetzt aber dieselbe wieder vollkommen auflöst, braune Flocken, Eisenoxyd,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0070-5

unaufgelöst läßt; Galläpfeltinctur erzeugt eine schwarze, Blutlaugensalz eine blaue Färbung. Kupfer giebt mit Ammoniak eine blaue, mit Blutlaugensalz eine rothe Farbe.

Der Alaun ist ein adstringirendes Mittel und wird zur Bereitung der Molken, als **Serum lactis aluminosum** (20 — 30 Gran Alaun auf ein Pfund Milch), verordnet; äußerlich wird er als blutstillendes Mittel, auch zu Gurgelwassern gebraucht.

Zersetzt wird derselbe durch die Alkalien und kalischen Erden, z. B. Kali, Magnesia, Kalkwasser ꝛc.; auch durch viele Salze, als essigsaures Blei, die Queckssilbersalze, Salpeter, Salmiak u. s. w.

Ambra grisea. Grauer Amber.

Krankhafte Excremente des **Physeter macrocephalus Linn.** und anderer Wallfische, an den Küsten Ostindiens, Afrikas und des südlichen Amerikas zu finden.

Stücke von verschiedener Größe, von der Härte des Wachses, schwärzlich-grau, mit weißen Flecken und Furchen unterbrochen, undurchsichtig, leicht, von sehr angenehmen Geruche, bei gelinder Hitze wie Wachs schmelzend, der Flamme ausgesetzt brennend, in Aether fast gänzlich, in Weingeist zum Theil auflöslich. In gut verschlossenen Gefäßen aufzubewahren.

Ueber den Ursprung des grauen Ambers sind viele Hypothesen aufgestellt worden. Er wurde nach einander für ein Erdharz, für die Excremente von Vögeln, für einen wachsartigen, oder aus Pflanzenharzen bestehenden Körper angesehen, welcher von den nahgelegenen Küsten herabgeschwemmt, und hierauf durch die gleichzeitige Einwirkung des Salzwassers, der Luft und der Sonne in ein Erdharz umgewandelt worden sey.

Swediaur hatte die Bemerkung gemacht, daß der graue Amber Ueberbleibsel von Fischen, und hauptsächlich Knochen und Schnäbel von Dintenfischen enthält, welche die Hauptnahrung des Pottfisches auszumachen scheinen, und daß man ferner in den Eingeweiden dieses fischartigen Säugethiers zuweilen beträchtliche Stücke von dieser Substanz vorgefunden hat, wodurch dasselbe belästigt zu werden schien; und er stellte daher zuerst die Meinung auf, daß sich der graue Amber in dem Körper desselben erzeuge, und als ein verhärtetes Excrement oder als ein Bezoar des Pottfisches zu betrachten sey.

Gegen diese Meinung hat Virey (Almanach für Scheidekünstler für 1824. S. 1.) die schon von Bouillon Lagrange ausgesprochene Hypothese aufgestellt, daß der graue Amber das Product einer ähnlichen Zersetzung und Verwesung vorzüglich gewisser Arten von Sepien, namentlich der wohlriechenden Sepia, sey, wie diejenige, durch welche Leichname in Fettwachs verwandelt werden, und daß der so erzeugte Amber nun als Nahrungsmittel von den Cachelots verschluckt werde, und den krankhaften Zustand erzeuge.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0071-1

Es ist aber dagegen zu erinnern, daß man noch kein großes Stück Ambra gefunden hat, ohne eine größere oder geringere Quantität darin befindlicher Schnäbel der Sepia octopedia, der gewöhnlichen Nahrung des genannten Pottfisches. Denn würde die Ambra nur zuweilen von ihm verschlungen, und der Fisch dadurch krank, so müßte sie häufiger ohne jene Schnäbel angetroffen werden, wenn man sie in der See schwimmend oder auch am Strande findet. Ferner sprechen dagegen die neueren Beobachtungen von Chevallier und Laffaigne, die in den verweseten Excrementen von Delphinus globiceps und Raja Batis eine dem Amberstoff ähnliche Materie fanden. Ja Ure hat in einem englischen Journale die Beschreibung und Analyse eines Stücks Ambra mitgetheilt, das aus dem Mastdarm einer lebenden Frau gezogen worden war, und Vogel (Schw. J. XXVI. S. 391.) hat eine ähnliche Resultate liefernde Zergliederung einer von einem lebenden Manne abgegangenen Concretion gegeben.

Es ist demnach als ausgemacht anzusehen, daß der Amber, welcher in unglaublichen Quantitäten in den untern Eingeweiden und nie höher als 7 Fuß vom After gefunden wird, in den Pottfischen erzeugt werde, und da man die Ambra nur bei kranken Fischen angetroffen hat, so ist ferner als gewiß anzusehen, daß es krankhafte Excretionen, wenn gleich nicht verhärtete Excremente, wie Swediaur glaubte, sind. Oken erklärt den Ambra für ein verhärtetes Gallenharz, und daß es wirklich für eine krankhaft secernirte Galle zu halten sey, dafür sprechen die Ergebnisse der chemischen Analyse, welche Ansicht auch vorzüglich Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 333.) als Ergebniß ihrer Analyse geltend machen, daß nämlich die Ambreïne dem Gallensteinfette (Cholestearine), dem krystallisibaren Stoffe der menschlichen Gallensteine, noch am nächsten zu kommen scheine. Ueberdem sey es ja bekannt, daß die Galle der Thiere, wenn sie von dem thierischen Stoffe befreit worden, mit der Zeit einen Geruch annimmt, welcher dem Moschus- oder Ambergeruche zu vergleichen ist.

Der Pottfisch oder Cachelot (Physeter macrocephalus) gehört zu der Classe der Säugethiere, und zur Ordnung der Wallfische (Cetaceen). Er bewohnt gewöhnlich die Meere in der Nähe der Pole, und wird nur selten in den gemäßigten Zonen angetroffen. Er ist wegen seines ungeheuer großen Kopfes merkwürdig, welcher seine ungeheure Größe durch eine an seinem obern Theile aufliegende Höhle erhält, die durch Knochenlamellen geschieden ist, und ein flüssiges milchweißes Oel einschließt, welches an der Luft erhärtet und Wallrath genannt wird.

Den grauen Amber findet man auf dem Meere, welches Afrika und das mittägige Asien bespühlt, in der Nähe von Madagaskar, an der Küste Koromandel, bei den Molukken und um Japan, aber auch an den Küsten von Brasilien, den Antillen, theils auf dem Meere schwimmend, theils am Ufer, theils an Felsen hängend. Er besteht aus unregelmäßigen, rundlichen, aus verschiedenen Lagen gebildeten Stücken, welche gewöhnlich unter einem Pfunde schwer sind. Man erzählt aber von Stücken, welche 10 bis 20, ja 100 bis 200 Pfund gewogen haben. In Froriep's Notizen, October 1826.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0072-7

S. 231., findet man Nachricht von einer großen Masse Amber, die auf der Insel New-Providence dadurch aufgefunden worden, daß ein Matrose sich auf einen Block, den er für einen Stein hielt, setzte, um zu schlafen, und als er wieder aufstehen wollte, seine Beinkleider angeklebt fand. Nichts ahnend kehrte er auf's Schiff zurück, wo der starke Geruch einem seiner Kameraden auffällt, welcher, da der erstere nicht gemeinschaftlich den für Ambra erkannten Block aufsuchen wollte, denselben allein fand, und ihn an den Capitain eines Kauffartheischiffes verkaufte, von welchem er noch durch mehrere Hände gegangen, und endlich in England für 2500 Pfund Sterling (86 Schilling für die Unze) verkauft worden ist. Das größte Stück Amber ist aber das, welches, wie Rumpf erzählt, der amsterdamer orientalischen Gesellschaft gehört, 182 Pfund (2912 Unzen) gewogen und einen Werth von 116,400 holländischen Gulden besessen hat.

Der graue Amber ist eine feste Substanz von grauer Farbe, mit gelben und schwarzen Flecken durchsprengt, ist undurchsichtig, matt auf dem Bruche, leichter als Wasser, und hat einen solchen Grad von Zähigkeit, daß er sich zwar brechen, aber nicht zerreiben läßt. Durch die Wärme der Hand, in der der Amber lange gehalten wird, muß er weich und biegsam werden. Eine glühende Nadel muß ohne großen Widerstand durchgehen, an derselben nichts kleben bleiben, und aus der Oeffnung ein wohlriechendes Oel schwitzen; er schmilzt bei der Hitze des siedenden Wassers, und fließt wie ein Oel, in größerer Hitze verflüchtigt er sich in Gestalt eines weißen Dunstes; an der Flamme läßt er sich leicht entzünden, und verbrennt, ohne irgend eine Spur von Asche zu hinterlassen. Der Amber hat einen milden, besonders in der Wärme ungemein lieblichen, eigenthümlichen, einigermaßen der Benzoë ähnlichen Geruch und fast keinen Geschmack. Spec. Gew. = 0,9086. Ist auch in den fetten und ätherischen Oelen auflöslich.

Der Amber ist oft chemisch untersucht worden. Juch (Berl. Jahrb. 1797. S. 144.) erhielt, als er 30 Gran Amber mit einer Unze Wasser bis zur Hälfte Wasser abdestillirte, 4 Gran eines auf dem Wasser schwimmenden, höchst angenehm riechenden Oels von hellgelber Farbe. Bucholz (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 28.) erhielt zwar nur ein sehr wohlriechendes Wasser, aber doch dabei schwache Spuren eines Oelhäutchens; Rose (Berl. Jahrb. 1797. S. 167.) aber gar nur ein fades Wasser ohne allen Ambergeruch, was wahrscheinlich an dem Alter des angewandten Ambers gelegen hat. Uebrigens hängt das Geruchsprincip mit dem fixen Theile des Ambers so innig zusammen, daß auch der Rückstand nach der Destillation den Geruch noch in hohem Grade besitzt, welches sich jedoch auch bei mehreren andern Körpern findet.

Abgesehen von diesem flüchtigen Riechstoffe ist nach Bucholz der Amber als ein Stoff ganz eigner Art anzusehen, und Amberstoff (Ambreïne) zu nennen. Um diesen Stoff rein darzustellen, kocht man den Amber mit Weingeist und filtrirt, wo das Amberfett herauskrystallisirt, von dem man durch Abdampfen und Erkälten noch mehr erhält, welches durch Umkrystalli-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0073-2

siren gereinigt wird. Es besteht dann aus höchst zarten, glänzend weißen büschelförmig zu Warzen vereinigten Nadeln, und scheint das Mittel zwischen dem Wachse und dem Harze zu halten, sich aber dem Harze dadurch zu nähern, daß es sich in größerer Menge als das Wachs in Alkohol auflöst. Daß dieser Stoff nach den Versuchen der Herren Pelletier und Caventou eine dem Gallensteinfette analoge Substanz zu seyn scheint, ist bereits oben angeführt worden.

Mit concentrirter Salpetersäure bildet das Amberfett einen klumpigen Teig, löst sich dann beim Erhitzen, färbt sich unter Entwickelung von Salpetergas erst graulich, dann hellgelb, und ist in eine eigenthümliche Säure, die Amberfettsäure oder Amberinsäure, verwandelt. Mit 2 Th. Kali und 4 Th. Wasser läßt es sich selbst durch achtstündiges Kochen nicht saponificiren. In Aether, flüchtigen und fetten Oelen ist das Amberfett auflöslich.

Nach John (Berl. Jahrb. XIX. S. 99.) hat der Amber folgende Bestandtheile: Amberfett 85,0; in Wasser und Weingeist lösliche säuerlich-süße balsamische Materie, welche Benzoësäure zu enthalten scheint 2,5; in Wasser lösliche braune Materie mit Benzoësäure und Kochsalz, ungefähr 1,5; Verlust 11,0.

Bucholz konnte keine Benzoësäure finden; auch Ure untersuchte zwei verschiedene Stücke Amber; in dem einen fand er Benzoësäure, in dem andern nicht. Bouillon Lagrange (Trommsd. J. XII. 2. S. 250.) behauptet, daß die geistige Tinctur des Ambers, aus der sich das Amberfett abgesetzt hat, noch einen bedeutenden Gewichtstheil Harz enthalte.

Im reinsten Zustande erscheint der Amber nach Proust honiggelb und gleichförmig, und enthält nur eine Spur fremder Beimischung; in dem gemengten Zustande aber, in welchem er gewöhnlich vorkommt, enthält er noch einige Procente erdige und fasrige Theile, letztere wahrscheinlich thierischer Abkunft, neben einem geringen Antheile einer schwarzen und braunen Substanz, die dem gewöhnlichen Amber die Farbe zu geben scheint, und sich durch große Schwerlöslichkeit selbst in absolutem Alkohol und größere Löslichkeit in Aether auszeichnet.

Des so hohen Preises wegen ist der Amber manchen Verfälschungen unterworfen, indem man nämlich Mischungen von Benzoë, Gummi, Mehl u. s. w. mit Moschus parfümirt. Schon das fettige Aussehen, der Geruch des erwärmten Ambers, und das übrige Verhalten des ächten Ambers lassen eine solche Verfälschung erkennen, noch mehr aber die chemischen Eigenschaften, nämlich die geringe Neigung des Ambers, sich mit den Alkalien zu Seife zu verbinden, die auffallend größere Löslichkeit in Schwefeläther als selbst in absolutem Alkohol, doch so, daß auch der gewöhnliche Alkohol unter Mitwirkung der Wärme den Amber aufzulösen vermag, und die bedeutend größere Löslichkeit in heißem als in kaltem Alkohol.

Der graue Amber galt sonst für eine wahre Panacee, jetzt ist er fast ganz außer Gebrauch gekommen. Er wird selten in Pulverform, häufiger noch in der Tinctur verordnet, wozu das alte brandenburger Dispensatorium

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0074-8

von 1781 folgende Vorschrift giebt: eine Drachme Amber, 15 Gran Moschus, Rosenspiritus und höchst rectificirter Franzbranntwein, von jedem 3 Unzen, werden 8 Tage hindurch gelinde digerirt und dann filtrirt.

Bei den Franzosen steht der Amber noch mehr in Ansehen, und die pariser Pharmakopöe giebt folgende Vorschrift zur Tinctura regia: 2 Scrupel Amber, 1 Scrupel Bisam, 10 Gran Zibeth, 6 Tropfen Zimmtöl, 4 Tropfen Rosenholzöl, und 4½ Unze über Rosen und Orangenblüthen abgezogenen Weingeist.

Ammoniacum, gemeiniglich Gummi Ammoniacum. Gummi Ammoniak.

Ein an der Luft verhärteter Saft einer unbekannten Pflanze des östlichen Afrikas.

Ein Gummiharz, in außen braungelben, innen weißen, mehrentheils unter sich zusammengeklebten Stücken oder Körnern, undurchsichtig, von einem Fettglanze, in der Kälte härtlich zerbrechlich, in der Wärme zähe, zwischen den Fingern erweichend, von einem starken Geruche und einem bitterlich widrigen etwas scharfen Geschmacke. In Wasser löst es sich zum Theil in einer milchigen Auflösung, in Alkohol bis fast zur Hälfte zu einer gelbbraunen Auflösung auf.

Als diejenige Pflanze, von welcher dieses Gummi abstammt, wurde von Willdenow **Heracleum gummiferum** bezeichnet. Neuere Bestimmungen geben die **Ferula orientalis**, welche in Griechenland, Kleinasien, Taurien und Numidien wächst, und **Ferula Ferulago**, welche in Sicilien und der Barbarei einheimisch ist. Beide Pflanzen gehören zu **Pentandria Digynia L.** und zur 12. Cl., Familie der Doldengewächse **Juss.** Nach einer Nachricht vom Capit. Hart zu Bombay (Froriep's Notizen, Octbr. 1826. S. 248.) wird die Pflanze, welche das Ammoniakgummi liefert, Oschak-Pflanze genannt. Sie war in einem schönen Exemplar 7 Fuß 4 Zoll hoch, und die Circumferenz am untern Theil des Stengels 4 Zoll. Sie wächst wild, hauptsächlich in der Ebene zwischen Yorda, Kauft und Kumischa in der Provinz Vauk. Das Gummi ist in solcher Menge darin vorhanden, daß bei dem kleinsten Einstiche, den man macht, es gleich hervordringt, selbst aus den Spitzen der Blätter. Wenn die Pflanze vollständig ausgewachsen ist, durchbohren unzählige Käfer sie in allen Richtungen. Das ausgedrungene Gummi erhärtet bald, wird dann abgenommen, und über Buschir nach Indien und von da weiter versendet, so daß es einen beträchtlichen Ausfuhrartikel abgiebt. Capit. Hart hatte auch eine genaue Zeichnung, und Stengel, Blatt und Blume mitgebracht, so daß Hoffnung ist, das bisherige Dunkel aufgeklärt zu sehen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0075-4

Von diesem vegetabilischen Milchsafte kommen im Handel zwei Sorten vor.

1) Ammoniak in Körnern (Ammoniacum in granis s. in lacrymis) Es besteht aus rundlichen, im Bruche glänzenden Körnern von verschiedener Größe, die allein vermöge ihrer Klebrigkeit zusammenhangen.

2) Ammoniak in Kuchen (Ammoniacum in pane s. in placentis). Es kommt zu uns in bedeutenden gelblichen Stücken, welche mit vielen weißen Körnern (je mehr, desto besser ist die Sorte) durchstreut sind. Es ist nicht so rein, als das vorige, häufig mit Sand, kleinen Holzspähnen und einem dem Dill ähnlichen Saamen vermengt.

Die erste Sorte verdient wegen ihrer Reinheit den Vorzug, die zweite kann zur Bereitung von Pflastern angewandt werden. Ganz verwerflich aber ist das dunkelbraune, sehr klebrige, kleine weiße Körner (Mandeln) enthaltende Gummi, welche bisweilen durch weißes Pech ersetzt werden sollen, eine Verfälschung jedoch, die durch den mangelnden Geruch der weißen Stücke leicht erkannt werden kann. Von den zufällig beigemengten Unreinigkeiten kann es bei seiner großen Sprödigkeit in der Winterkälte leicht durch Pulvern gereinigt werden.

Bucholz (Taschenb. 1809. S. 170.) erhielt, als er über 1000 Gran Ammoniak 4 Unzen Wasser abdestillirte, eine wasserhelle Flüssigkeit, auf deren Oberfläche sich eine sehr dünne ungefärbte Oelhaut befand, von durchdringendem Geruche nach Ammoniak. Calmeyer (Trommsd. J. XVII. 2. S. 82.) nahm eine größere Quantität Ammoniak und Wasser, welches bereits über Ammoniak abgezogen war, und erhielt nur auf der Oberfläche des Destillats deutlich erkennbare Oeltheile. J. F. Hagen (Berl. Jahrb. 1815. S. 95.) zog über 16 Unzen Ammoniak Wasser ab, schüttete über das Destillat aufs neue eben so viel frisches Ammoniak, und erhielt jetzt über eine Drachme ätherisches Oel von gelblicher Farbe, penetrantem Geruche und einem anfangs milden, nachher aber ekelhaft bittern Geschmacke. Mit Wasser zusammengerieben erhält man eine Milch, aus der sich bald einige Harztheile ausscheiden. Mit Alkohol ausgezogen liefert das Ammoniak eine klare gelbbraune Tinctur; wird von dieser der Weingeist abgezogen, so riecht und schmeckt dieser stets nach Ammoniak. Nach dem völligen Verdunsten des Alkohols bleibt nach dem Erkalten ein blaß bräunlich-gelbes, ziemlich klares und durchsichtiges, etwas zähes Harz zurück, das sich in absolutem Alkohol bis auf einige Flocken Gummi völlig wieder auflöst. Schwefeläther läßt von diesem Harze einen kleinen Theil ungelöst, den jedoch absoluter Alkohol leicht wieder aufnimmt. Das von Schwefeläther aufgelöste und nach dem Verdunsten desselben zurückbleibende Harz ist vollkommen durchsichtig, von gelbbrauner Farbe und leicht zerreiblich, in Terpenthin- und Olivenöl auflöslich, bitter von Geschmacke, und verhält sich in jeder Rücksicht wie ein gewöhnliches Harz.

Das durch absoluten Alkohol erschöpfte Ammoniak zeigte sich nach Bucholz im feuchten Zustande gelblich weiß und undurchsichtig, beim Trocknen geht aber die Farbe nach und nach ins Bräunliche über, es wird klar, durch-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0076-0

sichtig, dem arabischen Gummi gleich, schmeckt eben so mild und süßlich, kaum zu bemerken nach Ammoniak, ist etwas spröder, als das arabische Gummi, löst sich in destillirtem Wasser fast gänzlich auf, und läßt nur wenige aufgequollene weißliche Flocken, dem aufgequollenen Saleppulver nicht unähnlich, zurück, die getrocknet sehr viel Aehnlichkeit mit einem getrockneten Traganthschleim haben, zuletzt eine schwarzbraune Farbe annehmen, und auch in siedendem Wasser fast ganz unauflöslich sind.

Da dieser Stoff im feuchten, nicht getrockneten Zustande, gleich nach vollendeter Ausziehung durch Alkohol sich in kaltem Wasser sehr leicht und vollständig auflöste, so ist Bucholz geneigt, ihn als einen beim Austrocknen durch den Zutritt des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft unauflöslich gewordenen Schleimstoff anzusehen. Als ein glutinöser oder eiweißartiger Stoff ist er nicht zu betrachten, da er auf glühenden Kohlen keinen stinkenden, dem brennenden Horn ähnlichen Geruch verbreitete.

Bei der trocknen Destillation erhielt Bucholz, außer Kohlensäure und Kohlenwasserstoffgase, zuerst ein braungelbes dünnes Oel, welches zwar schon brenzlig, aber doch noch stark nach Ammoniak roch, ferner ein schwarzbraunes, dickflüssiges, stark brenzlig riechendes, etwas Ammoniak haltiges Oel, und eine wäßrige saure Flüssigkeit, die größtentheils schon mit dem dünnen Oele übergegangen war, und aus wäßriger brenzliger Essigsäure mit etwas Ammoniak bestand. Die rückständige Kohle hatte einen Glanz wie Gagat, war leicht zerbrechlich und blättrig, etwas schwer einzuäschern und enthielt kohlensaures Kali, kohlensauren Kalk, phosporsauren Kalk, Thonerde, Eisenoxyd eine Spur, Quarzkörner.

Braconnot (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 149.) zog Salpetersäure über Ammoniak ab, und erhielt eine gelbe harzartige Substanz, welche sich während der Arbeit auflöste. Nach dem völligen Eindicken blieb ein bitterer harziger Stoff von einem sehr reinen Gelb zurück, der bei einer sehr gelinden Wärme schmelzbar war, sich mit den Alkalien verband, in Alkohol und in kochendem Wasser auflöslich war, sich aber aus letzterem beim Erkalten ausschied; auch in kaltem Wasser sich zu einem großen Theile auflöste und ihm eine gelbe Farbe mittheilte, welche sehr stark an den Fingern hängen blieb, mit vieler Leichtigkeit an Seide und Wolle haftete, und sehr dauerhaft war.

Auch Hatchett erhielt bei Behandlung des Ammoniakgummis mit Salpetersäure ähnliche Resultate.

100 Theile Ammoniakgummi enthalten

	nach Bucholz	Braconnot	Calmeyer	
Harz	72,0	70,0	53,0	wovon ein kleiner
Gummi oder Schleimstoff	22,4	18,4	37,2	Theil in Aether un-
Glutenartigen Stoff . .	1,6	4,4	—	auflöslich war.
Wasser	—	6,0	—	
Holzfaser, Sand u. dergl.	—	—	9,8	
Verlust	4,0	1,2	—	
	100,0	100,0	100,0	

Zum innern Gebrauche des Ammoniaks ist die Pillenform die zweckmäßigste; zur Ammoniakmilch ist es vortheilhaft, auf 2 Theile Ammoniak 1 Theil Schleim von arabischem Gummi oder das Gelbe vom Ei zuzusetzen. Soll diese Milch mit Decocten bereitet werden, so müssen diese erst völlig erkaltet seyn.

Ammonium carbonicum crudum seu Alkali volatile crudum. Carbonas ammoniacus crudus. Rohes flüchtiges Laugensalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem salzsauren Ammoniak durch Sublimation mit Kreide.

Ein Salz in zusammenhängenden, zerreiblichen, weißen, auf der Oberfläche bald staubig werdenden, in der Luft endlich völlig zerfallenden Krystallen, Kehle und Nase beim Athmen sehr reizend, im Feuer völlig sich verflüchtigend, in zwei Theilen Wasser auflöslich. Besteht aus Ammoniak und Kohlensäure. Zum innerlichen Gebrauche darf es nur angewandt werden, wenn es von einer Verunreinigung mit Blei völlig frei ist, was durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser oder durch Schwefelsäure erkannt wird. Eine zu große Menge beigemischtes salzsaures Ammoniak wird entdeckt, wenn es mit Salpetersäure neutralisirt und salpetersaure Silberauflösung zugegossen wird, wodurch ein weißes käsiges Präcipitat gefällt wird.

Das flüchtige Laugensalz führt den gewöhnlicheren Namen Ammoniak, weil es einen Bestandtheil des **Sal ammoniacum**, Salmiak ausmacht, dessen wahrscheinliche Ableitung dort wird angegeben werden.

Dieses Alkali kommt in der Natur selten fertig gebildet vor; mit Salzsäure und Schwefelsäure verbunden findet man es in einigen Seen und vulcanischen Producten. Fast ausschließlich erhält man es aus organischen, besonders aus thierischen Stoffen, durch Destillation, und ein solches, aus faulem Harne im flüssigen Zustande geschieden, kannte bereits Lull im 13. Jahrhundert, als Harngeist (**Spiritus urinae**). Allein das hiedurch erlangte Ammoniak ist ganz unrein, und wird vorzüglich zur Bereitung des Salmiaks benutzt. Außerdem bildet sich auch Ammoniak zuweilen im Lebensprocesse der Pflanzen und Thiere, und wenn thierische Körper faulen, oder mit andern Alkalien oder alkalischen Erden behandelt werden. Es findet sich auch als Bestandtheil mehrerer Mineralien, mancher Alaunerze; endlich wird das Ammoniak oft aus seinen Bestandtheilen auf chemischem Wege gebildet, und das Zusammentreten derselben zu Ammoniak ist auf die zahlreichsten und verschiedenartigsten Weisen möglich.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0078-1

Die Gewinnung des besten kohlensauren Ammoniaks aus dem Salmiak kannte schon Basilius Valentinus gegen das Ende des 15. Jahrhunderts; später haben Paracelsus und van Helmont die Kenntnisse darüber etwas erweitert.

In den Fabriken wird das kohlensaure Ammoniak auch wohl aus animalischen Substanzen, durch trockne Destillation, oder auch aus faulem Harne, wo die Erzeugung dieses Salzes durch die Zersetzung des Harnstoffes bedingt ist, gewonnen, in welchen Fällen aber der erhaltene Sublimat durch wiederholte Sublimationen mit Kreide noch gereinigt werden muß; gewöhnlicher aber ist die Ausscheidung desselben aus dem Salmiak durch Kreide. Die getrocknete feingeriebene Kreide (1¼ Th.) wird mit dem trocknen pulverisirten Salmiak (1 Th.) genau durchs Zusammenreiben gemengt, in eine nicht zu große Retorte gebracht, deren Hals aber so weit als möglich seyn muß, um mit ihr eine ebenfalls weithalsige Vorlage bequem in Verbindung bringen zu können; der Hals der letzteren muß so weit seyn, daß man mit entblößtem Arme bequem bis auf den Boden derselben gelangen kann, um das an die Seitenwände der Vorlage oft sehr fest sich anlegende Salz herausnehmen zu können. Hat man eine gläserne Retorte angewandt, so wird sie ins Sandbad gebracht und völlig mit Sand umschüttet; eine irdene Retorte ist vortheilhafter, weil man diese ins offne Reverberirfeuer bringen kann, wobei viel Feuerung, und, wegen der schnelleren Beendigung der Arbeit, auch Zeit erspart wird. Man verbindet die Retorte luftdicht mit der gläsernen Vorlage, welches hier am besten mit einem aus weißem Bolus und Wasser verfertigten Teige geschieht, den man auf Leinwandstreifen streicht, mit diesen die Fugen zwischen Retorte und Vorlage luftdicht belegt, und mit Bindfaden noch fest einschnürt. Man fängt, wie bei jeder Sublimation, wenn das Zerspringen der Gefäße vermieden werden soll, mit gleichförmigem schwachen Feuer an, welches nach und nach verstärkt wird. Die innern Wände der Vorlage werden mit einem weißen Salzanfluge bedeckt, welcher immer dichter wird, zugleich geht eine kleine Quantität wäßriger Flüssigkeit über, welche von der dem Salmiak und der Kreide noch anhängenden Feuchtigkeit herrührt. So lange noch Ammoniak übergeht, ist die Vorlage merklich warm, welches von den aus der Retorte übergehenden Dämpfen herrührt, die bei der niedern Temperatur der Vorlage sich verdichten, den Wärmestoff absetzen, und als concretes kohlensaures Ammoniak erscheinen. So lange also diese zwar nicht hohe, aber doch von der äußern Luft beträchtlich verschiedene Temperatur der Vorlage stattfindet, ist die Arbeit noch nicht beendigt, und sie ist erst dann als beendigt anzusehen, wenn beim starken Glühen der Capelle oder des untern Theils der irdenen Retorte im Reverberirfeuer, die Temperatur der Vorlage nicht beträchtlich erhöht wird. Doch darf man diesen Feuersgrad nicht eher anwenden, als bis man aus der Menge des schon übergegangenen Salzes nur noch auf eine kleine rückständige Quantität schließen kann, weil sonst durch die schnelle und häufige Entwickelung der Dämpfe die Gefäße zersprengt werden können. Man findet dies schon bei allmäliger

Verstärkung des Feuers, wobei die Temperatur der Vorlage zugleich stufenweise erhöht wird, wenn die Arbeit noch nicht beendigt ist; in diesem Falle muß die Feuerung sogleich wieder gemäßigt werden. Um sich zu überzeugen, ob während der Arbeit das Lutum völlig luftdicht ist, kann man eine mit concentrirter Salzsäure befeuchtete Glasröhre oder irgend einen andern damit befeuchteten Körper in die Nähe des Lutums bringen, wo dann, wenn wirklich ein kleiner Theil des dunstförmigen Ammoniaks durch die Fugen dringt, sichtbare weiße Wolken entstehen. Im Anfange ist die Oeffnung bisweilen kaum bemerkbar, nach und nach erweitert sie sich aber, wo dann mehr Ammoniak entweicht; in diesem Falle muß das Feuer gemindert werden ehe man an ein genaues Verschließen der Oeffnung denkt. Nach beendigter Arbeit wird die Geräthschaft auseinandergenommen, das kohlensaure Ammoniak von den Seitenwänden der Vorlage abgelöst und in fest verschlossenen Gläsern aufbewahrt. In der Retorte findet sich salzsaure Kalkerde.

In England wird das kohlensaure Ammoniak aus einer länglichen Sublimirpfanne übergetrieben, welche unbedeckt quer über dem Roste liegt, und bloß zur Seite eine Oeffnung hat, woran eine Röhre tritt, die zunächst der Pfanne aus Eisen, und nachher aus Blei besteht; das andere Ende der Röhre geht in einen Recipienten von Blei, dessen oberes Ende von einem festen lutirten Deckel, in der Art eines Schachteldeckels, bedeckt ist. Diese Sublimation in einen bleiernen Recipienten ist die Ursache von dem Bleigehalte, welchen man an dem englischen kohlensauren Ammoniak bemerkt hat (siehe hierüber das königl. Ministerialrescript in den Berl. Jahrb. XXII. S. 348., ferner Taschenbuch auf 1820. S. 287.), welcher sich als ein grauer Ueberzug oder als graulliche Flecken zu erkennen giebt, selten in das Salz selbst hineindringt, und daher schon durch vorsichtiges Abschaben großentheils entfernt werden kann.

Bei der gleichzeitigen Erhitzung des salzsauren Ammoniaks und der kohlensauren Kalkerde in den Sublimirgefäßen geht ein gegenseitiger Austausch der Bestandtheile vor sich: das neue, aus zwei sehr flüchtigen Stoffen — dem Ammoniak und der Kohlensäure — gebildete kohlensaure Ammoniak wird sublimirt, wogegen der Kalk mit der Salzsäure verbunden als salzsaurer Kalk im Rückstande bleibt. Der eigentliche Hergang der Sache kann aber erst bei **Ammonium muriaticum depuratum** im zweiten Theile erklärt werden, da die chemische Zusammensetzung dieser Verbindung hier noch nicht abgehandelt werden kann.

Das im Handel vorkommende Salz bildet gemeiniglich harte weiße Massen von einem fasrig-krystallinischen Gefüge, und starkem ammoniakalischen Geruche. Das Verhältniß der Bestandtheile — Ammoniak und Kohlensäure — so wie die anzustellenden Prüfungen auf die etwanigen Verunreinigungen, werden im zweiten Theile eine Stelle finden, und es kann hier nur noch bemerkt werden, daß aus der Auflösung dieses Salzes in Wasser das beigemischte Blei durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser als Schwefelblei, und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0080-1

durch Schwefelsäure als schwefelsaures Blei, die Salzsäure aber aus dem Salmiak durch salpetersaures Silber als Hornsilber gefällt wird.

Es wird dieses Salz selten an sich verordnet, in welchem Falle jedoch die Pillen- oder Latwergenform die zweckmäßigsten sind, wobei seine flüchtige Natur und seine alkalische Wirkung auf die Neutral- und Mittelsalze berücksichtigt werden müssen; häufiger geht es in die zusammengesetzten Mittel ein, und macht den Hauptbestandtheil mehrerer in großem Vertrauen stehender Medicamente.

Ammonium muriaticum crudum seu Sal ammoniacum crudum. Hydrochloretum Ammonii crudum. Roher Salmiak.

Wird in chemischen Fabriken aus den Bestandtheilen, die auf verschiedene Weise verbunden werden, bereitet.

Ein Salz in oberwärts convexen, unterwärts concaven, bisweilen kegelförmigen, weißen, außerhalb bisweilen durch Ruß geschwärzten Kuchen, von einem scharfen Geschmacke, in drei Theilen Wasser auflöslich, im Feuer sich verflüchtigend. Besteht aus Ammoniak und Salzsäure. Nur das sublimirte werde angewandt. Es sey von Schwefelsäure und metallischen Verunreinigungen völlig frei; dieses wird an der Farbe und durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser, jenes durch salpetersauren Baryt erforscht.

Die Entdeckung und Anwendung dieses Salzes geht bis ins graue Alterthum. Seinen Namen, **Sal Ammoniacum**, soll es davon erhalten haben, weil es nach Plinius in großer Menge in der Nähe des Tempels des Jupiter Ammon in Afrika gefunden, oder wahrscheinlicher, weil es aus dem Miste der Kameele jener Karavanen, welche diese Gegenden durchreisten, gewonnen wurde. Nach Andern führt es seinen Namen von der Provinz Ammonien in Lybien, in der es zuerst bereitet worden seyn soll.

Der Salmiak kommt im natürlichen Zustande in der Nähe von Vulcanen, z. B. in der Solfatara in Italien, und an der Mündung des Vesuvs vor, wo er manchmal ganz rein sublimirt ist; auch in verschiedenen Theilen von Asien und Afrika. So wird jährlich ein großer Theil in dem Lande der Kalmucken, welches an Sibirien grenzt, und zugleich zwischen der Mongolei und beiden Buchareien liegt, als natürliches Product gewonnen, und durch den Handel nach Rußland und Sibirien verführt.

Der größte Theil aber wird künstlich producirt, und dieses geschah vormals vorzüglich in Aegypten — daher die Benennung **Sal ammoniacum aegyptiacum** — aus dem Miste der Kameele und einiger anderer Thiere, die von salzigen Pflanzen leben. Dieser getrocknete Mist wird von den Aermern des Landes als Brennmaterial benutzt, der hierbei erzeugte Salmiak, aus dem

von den thierischen Stoffen beim Verbrennen entstehenden Ammoniak, und aus der von den salzigen Bestandtheilen, welche von den Nahrungsmitteln in den Mist übergegangen sind, losgetrennten Salzsäure, verflüchtigt sich, und verdichtet sich mit dem Ruße in den Rauchfängen. Der Ruß wird sorgfältig gesammelt, und von den Salmiakfabrikanten gekauft. Dann werden gläserne Ballons, ungefähr 1 Fuß im Durchmesser, bis auf wenige Zoll von der Mündung mit dem Ruße gefüllt, in einen länglichen Ofen gestellt, wo sie einer allmälig gesteigerten Hitze ausgesetzt werden. Der obere Theil der Glaskugel ragt aus dem Ofen hervor und wird verhältnißmäßig von der Luft abgekühlt, den dritten Tag ist die Operation vollendet. Mit einem eisernen Stabe wird zuweilen in die Mündung der Glaskugeln gestochen, damit sie sich nicht verschließen, und Gefahr laufen zu zerspringen.

Nach dem Erkalten werden die Glaskugeln zerbrochen, und man findet dann den obern Theil derselben mit Salmiak in halbrunden Broten, gegen 2½ Zoll dick, von graulich-weißer Farbe, halbdurchsichtig und mit etwas Elasticität begabt, überzogen. 26 Pfund Ruß geben gegen 6 Pfund Salmiak.

Die Fabrication des Salmiaks ist auch nach Europa übergegangen, und die erste Salmiakfabrik in Deutschland wurde 1759 von den Gebrüdern Gravenhorst in Braunschweig errichtet, welcher bald mehrere in und außerhalb Deutschland folgten. Er wird aber hier auf eine andere Weise gewonnen, nämlich gemeiniglich dadurch, daß man thierische, Stickstoff enthaltende Stoffe in verschlossenen Gefäßen durch Feuer zersetzt, und das gewonnene Ammoniak mit Salzsäure verbindet. Gußeiserne Cylinder werden nämlich mit Knochen, Hörnern, Hautabgängen und dergl. gefüllt, und einer starken Rothglühhitze ausgesetzt. Die an das eine Ende der Cylinder gekitteten weiten Röhren leiten die entstehenden Dämpfe in mit Wasser angefüllte Fässer, die wie die Flaschen eines Woulfischen Apparats gestellt sind. Diese Dämpfe bestehen aus Wasser, brenzligem Oele, essigsaurem, blausaurem und besonders vielem kohlensauren Ammoniak, welches sich mit dem vorhergehenden und mit einem Antheile Oel in Wasser auflöst. Die Flüssigkeit, welche stark braun gefärbt ist, wird mit einer trüben Gypsauflösung zusammengerührt und digerirt, oder auch wohl durch gepulverten Gyps filtrirt. Hierbei erfolgt eine gegenseitige Zersetzung beider Salze, die Schwefelsäure aus dem Gypse verbindet sich mit dem Ammoniak zu dem leicht auflöslichen schwefelsauren Ammoniak, die Kohlensäure aus dem Ammoniak tritt dagegen an die Kalkerde des Gypses und bildet mit dieser den unlöslichen kohlensauren Kalk. Die von dem Bodensatze getrennte, das neu gebildete schwefelsaure Ammoniak enthaltende Flüssigkeit wird dann mit Kochsalz im Ueberschusse versetzt, wobei wieder eine gegenseitige Zersetzung beider Salze erfolgt, und durch Umtausch der Säuren salzsaures Ammoniak und schwefelsaures Natrum gebildet werden. Beide Salze, als im Wasser auflöslich, bleiben in der Flüssigkeit, können aber geschieden werden, entweder durch Krystallisation, indem beide Salze zu verschiedenen Zeiten krystallisiren, oder durch Sublimation, indem die ganze

Lauge zur Trockne verdunstet und der sublimirbare Salmiak von dem feuerfesten Glaubersalze geschieden wird.

Den durch Krystallisation gewonnenen Salmiak in zarten Flocken pflegt man aus den Gefäßen, in welchen sie angeschossen sind, mit einem Löffel herauszunehmen, in eine durchlöcherte Form, welche die Gestalt eines Zuckerhutes hat, einzudrücken und in der Wärme zu trocknen. Dieser sogenannte Braunschweiger Salmiak in Zuckerhüten enthält aber gewöhnlich salzsaure Kalkerde, welche die Ursache seiner feuchten Beschaffenheit ist.

Noch verschiedene andere Methoden werden zur Bereitung des Salmiaks befolgt, so z. B. läßt man den Harn faulen, destillirt das dadurch gebildete Ammoniak ab; oder Gemenge aus Steinkohlen, Kochsalz, thierischen Theilen und Thon werden in eigenen Oefen verbrannt, und der erzeugte Ruß sublimirt, u. s. w.

Der sublimirte Salmiak besitzt einen gewissen Grad von Dehnbarkeit, so daß er nicht leicht zu pulvern ist.

Der Geschmack des Salmiaks ist widrig, scharf und stechend salzig; bei seiner Auflösung in Wasser erzeugt er Kälte; er ist auch in Alkohol auflöslich, eine Unze nimmt bei mittlerer Temperatur 15, in der Siedehitze 54 Gran auf. An der Luft ist er beständig, in der Hitze erhebt er sich aber sogleich in weißen Dämpfen, die sich in der Kälte zu feinen nadelförmigen Krystallen verdichten (Salmiakblumen), ohne dabei zersetzt zu werden. Auf glühende Kohlen gestreut, theilt er der Flamme eine blaugrüne Farbe mit. Spec. Gew. 1,42.

Die Mittel, die Verunreinigungen des Salmiaks zu erforschen, so wie die chemische Constitution und der Gebrauch desselben sollen bei **Ammonium muriaticum depuratum** im zweiten Theile erörtert werden.

Amomum. Semen. Englisches Gewürz.

Myrtus Pimenta Linn. Ein in Westindien häufig vorkommender Baum.

Die unreifen getrockneten, kugelförmigen, etwas runzligen, schwarzbraunen, zweifächrigen Beeren mit zwei Saamen, von gewürzhaftem Geruche und Geschmacke. Man sehe darauf, daß nicht die Saamen des schildblättrigen Mondsaamens (**Cocculus palmatus**) beigemischt sind.

Myrtus Pimenta. Der Nelkenpfefferbaum.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 7. Myrti.

Dieser treffliche, mit immergrünem Laube geschmückte Baum ist auf den westindischen Inseln, besonders auf Jamaika und Barbados, auch in Meriko einheimisch. Er wird häufig cultivirt, erlangt im 7. Jahre seine volle Ausbildung, und gewährt dann eine reiche Erndte.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0083-8

Der Stamm wird ungefähr 20—30 Fuß hoch, und 8—10 Zoll dick; seine Rinde ist bräunlich-grau und vollkommen glatt; die zahlreichen Aeste bilden eine dichte buschige Krone.

Die Blätter sind gegenständig, kurz gestielt, länglich-lancettförmig, ungefähr 5 ″ lang und 1½—2 ″ breit, vollkommen glatt, schön grün und auf der untern Seite punktirt. Die kleinen Blüthen bilden zahlreiche aufrechte zusammengesetzte vielblüthige weiße Trauben, welche kürzer sind, als das Blatt, in dessen Winkeln sie entspringen; die Aestchen dieser Trauben sind dreitheilig und doldentraubenförmig geordnet.

Die Frucht ist eine schwarze, zweifächrige und zweisaamige, saftige, vom Kelche bekleidete Beere. Der Saamen ist rundlich-nierenförmig, dunkelbraun; sehr oft ist nur ein Fach mit einem Saamen ausgefüllt.

Alle Theile dieses Baumes, besonders aber die Blätter und die unreifen Früchte, besitzen einen starken, feurigen, aber angenehmen aromatischen Geschmack, den die reifen Früchte größtentheils verlieren. Die erstern geben das bekannte englische Gewürz, Nelkenpfeffer, Piment, von dem nach Browne aus Jamaika jährlich über 400,000 Pfund ausgeführt werden. Sie werden vor der Reife abgenommen, sorgfältig getrocknet, und zeigen, wie sie im Handel vorkommen, an der Spitze die Spuren der Kelchzähne. Die Rindensubstanz dieser Früchte ist im Innern gelblich, und besitzt mehr Aroma als der Saame.

Nach einer Analyse von Braconnot (Buchn. Repert. VIII. S. 372. und Taschenb. 1821. S. 171.) besteht der Nelkenpfeffer aus Amylon 9,0; sehr scharfem Oele 1,9; Wachssubstanz in Verbindnng mit einem rothen Färbestoffe 0,9; besonderer gummiartiger Materie 6,0; animalischer Substanz 5,0; citronensaurem Kali 6,0; unauflöslichem Rückstande 67,8; salzsaurem Kali, phosphorsaurem Kali und Verlust 3,4. S. = 100,0.

Bonastre hat nach der bei Zerlegung des Pfeffers befolgten Verfahrungsweise auch den Nelkenpfeffer analysirt. (Trommsd. N. J. XI. 1. S. 127. und Berl. Jahrb. XXVII. 2. S. 98.). Nach dieser mit den Schalen und mit den Kernen besonders ausgeführten Analyse enthalten 1000 Theile der Schalen: ätherisches Oel, schwerer als Wasser, dem diese Früchte ihren feurigen aromatischen Nelkengeschmack verdanken, 100; grüne ölige, der in den Gewürznelken von Lodibert aufgefundenen ähnelnde Materie, von brennend scharfem, sehr pikantem Geschmacke, die gleichsam zwischen den flüchtigen und fetten Oelen in der Mitte steht, 80; weiße flockige Materie, der Stearine analog 9; gerbestoffhaltigen Extractivstoff 114; gummiges Extract mit Gerbestoff verbunden 30; in Alkalien auflöslichen Farbestoff 40; in Alkohol und Aether auflösliche harzige Materie 12; Zucker oder unkrystallisirbaren Honig 30; Aepfel- und Gallussäure 6; Feuchtigkeit 35; Holzfaser 500; salinischen Rückstand 28; Verlust 16; Satzmehl? S. = 1000.

1000 Theile der Kerne bestehen aus: ätherischem Oele 50; grüner öliger Materie 25; braunen Flocken 32; gerbestoffhaltigem Extract, aus dem Rückstande der Destillation, 398; schleimigem Extract 72; ziegelrother, in

Wasser unlöslicher Substanz 88; weißlicher flockiger Materie 12; ekelerregendem, unkrystallisirbarem Honig 80; Aepfel- und Gallussäure 16; Feuchtigkeit 30; häutigem Rückstande 160; salinischem Rückstande 19; Verlust 18; Satzmehl? S. = 1000.

Die angeführte Beimischung der schädlichen Kokkelskörner läßt sich schon durch das äußere Ansehen unterscheiden, denn diese sind bleicher von Farbe, weniger runzlig, und die meisten fast noch einmal so groß. Diese Verfälschung kann daher auch nur sehr selten bei den unzerstückten Saamen vorkommen, es soll dieses aber häufiger der Fall seyn bei dem gestoßenen Nelkenpfeffer, der aus den Seestädten sehr wohlfeil versandt wird. Um diese höchst schädliche Beimischung zu erkennen, hat Stoltze (Berl. Jahrb. XXIII. S. 302.) folgendes Verfahren angegeben: man zieht einen Theil des verdächtigen Pulvers mit 8 Theilen Wasser in der Wärme aus. Der Auszug des reinen Nelkenpfeffers hat die Farbe des Franzweins, und setzt beim Erkalten graue Flocken ab. Der von den Flocken geschiedene klare Auszug hat noch dieselbe Farbe, er wird durch Galläpfeltinctur nicht getrübt, und die Lösung des essigsauren Kalks bringt darin einen dunkelgrauen Niederschlag hervor, über welchem die darüber stehende Flüssigkeit sich fast wasserhell befindet. Enthält aber das Pulver Kokkelskörner, so ist die Farbe des Auszugs weit dunkler, Galläpfeltinctur erzeugt darin starke weiße Flocken, die Lösung des essigsauren Kalks bringt darin einen mehr bräunlichen Niederschlag hervor, und die darüber stehende Flüssigkeit ist keineswegs fast wasserhell, sondern sie ist vielmehr nach Verhältniß des Gehalts an Kokkelskörnern mehr oder weniger braun gefärbt.

Der Nelkenpfeffer wird vorzüglich als Gewürz gebraucht; zum medicinischen Gebrauche würde sich die Tinctur eignen.

Amygdalae amarae. Bittere Mandeln.

Amygdalus communis Linn. Variet. Ein im Orient und im nördlichen Afrika einheimischer, im südlichen Europa cultivirter Baum.

Längliche, zusammengedrückte Saamen, außen braungelblich, innen weiß, von bitterem Geschmacke, mit Hydrocyansäure begabt. Verwerflich sind die alten, inwendig mit gelben Flecken beschmutzten.

Amygdalae dulces. Süße Mandeln.

Amygdalus communis Linn.

Längliche, zusammengedrückte Saamen, den bittern ähnlich, aber größer, von einem angenehmen, nicht bittern Geschmacke. Verwerflich sind die alten, von ranzigem Geschmacke und inwendig mit gelben Flecken besprengten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0085-0

Amygdalus communis L. Gemeiner Mandelbaum.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Dieser in Asien und im nördlichen Afrika einheimische Baum wächst jetzt in jedem gemäßigten Klima und wird häufig in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, England, Holland und in den südlichen Gegenden Deutschlands in Gärten und Weinbergen angepflanzt. Er wird bis 20 Fuß hoch, und ist für die Pflanzungen besonders zur Zeit der Blüthe eine schöne Zierde. Er ist dem Pfirsichbaume ähnlich.

Sein Stamm ist uneben, und mit aufgesprungener, aschfarbiger Rinde bedeckt; die Aeste sind etwas abstehend. Die Rinde der jüngern Zweige ist glatt und hellgrünlich.

Die Blätter stehen abwechselnd, sind lancettförmig, lang zugespitzt, fein gesägt, glatt und auf beiden Seiten hellgrün.

Die blaßrothen oder röthlich-weißen, aufsitzenden Blüthen sind hin und wieder, zuweilen einzeln, öfter aber gepaart, längs den Aesten zerstreut. Der abfallende Kelch ist einblättrig, röhrig und hat fünf stumpfe abstehende Einschnitte. Die Krone, welche größer ist als der Kelch, besteht aus fünf gleichförmigen, stumpfen, ausgerandeten rosenförmig geöffneten Blumenblättern. An der innern Seite des Kelches sind gegen 30 fadenförmige, aufrechte Staubfäden befestigt, welche halb so lang sind, als die Krone und einfache Staubbeutel tragen. Der Fruchtknoten sitzt oben, ist rundlich und fein behaart. Der Griffel ist einfach, so lang als die Staubfäden und hat eine kopfförmige Narbe.

Die Frucht, eine Steinfrucht, ist grünlich, eiförmig-länglich, zusammengedrückt, am Ende in eine Spitze verlängert, aus einer ziemlich dicken, festen, wenig saftigen, lederartigen, wolligen Schale bestehend, welche eine gelbbräunliche, glatte, doch mit vielen Löchern und an beiden Seiten mit einem Rande versehene, dick- oder dünnschalige, harte oder zerbrechliche Nuß bedeckt. Diese Nuß enthält einen spitzigen, eiförmigen, platten Kern, die Mandel, welche auswendig mit einer braungelben, gefurchten, mit gelbem Staube bestreuten Haut überzogen, inwendig weiß ist, bitter oder süß, je nach der Varietät des Baums wovon sie kommt, schmeckt, an ihrer Spitze einen herzförmigen Keim hat, und leicht in zwei Hälften zu theilen ist.

Hayne führt zwar **Amygdalus amara** als eine eigne Art auf, indessen wird dieser Baum allgemein nur als eine Varietät mit kleinerer Frucht angesehen. Die bittern Mandeln sind kleiner als die süßen, haben einen eignen Geruch und bittern Geschmack, der vorzüglich in ihrem graubraunen Oberhäutchen steckt.

Die süßen Mandeln haben einen sehr angenehmen, süßlich-öligen Geschmack mit etwas Gewürzhaftigkeit. Es kommen im Handel mancherlei Sorten vor, von denen die italienischen und valencer, als die größten und wohlschmeckendsten, den provencer und barbadischen vorgezogen werden. Außerdem kommen auch noch die in einer leicht zerbrechlichen Schale eingeschlos-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0086-5

senen Krach- oder Knackmandeln zu uns, welche von einer besondern Spielart des Mandelbaums abstammen sollen.

Die bittern Mandeln enthalten Blausäure, und geben bei der Destillation mit Wasser ein mit Blausäure geschwängertes scharfes und bitteres Oel. Daß diese beiden Stoffe, wie man sonst vermuthete, in den äußern Schalen der bittern Mandeln enthalten seyen, ist nach den Versuchen von Remmler (Almanach 1787. S. 136.) und besonders von Vogel (Schw. J. XIX. S. 59.) nicht ferner anzunehmen, da beide Chemiker aus den geschälten bittern Mandeln die erwähnten Producte erhielten, wogegen die Schalen ein geruch- und geschmackloses Destillat lieferten. Eben so wenig sind sie aber auch in dem fetten Oele enthalten, denn das ausgepreßte Oel der bittern Mandeln ist eben so geruchlos wie das von süßen Mandeln. Doch erhält man, wie Planche beobachtet hat, ein stark riechendes fettes Oel, wenn man die bittern Mandeln in Wasser taucht, um die Haut abzulösen, und sie an einem warmen Orte trocknet, bevor man sie unter die Presse bringt. Diese beiden Stoffe scheinen demnach in dem Parenchym der bittern Mandeln enthalten zu seyn.

Vogel kochte die Schalen der bittern Mandeln mit kaustischer Kalilauge und erhielt eine dunkelrothe Auflösung, aus welcher die Säuren einen braunen Niederschlag und ein fettes Oel absonderten. Auch das zum Erweichen gebrauchte Wasser ließ ein braunes Pulver fallen. Dieses braune Pulver, eben so die durch kochendes Wasser erschöpften Schalen färben die Eisenauflösung dunkelschwarz, woraus Vogel auf Gerbestoffgehalt schließt. Die geschälten Mandeln wurden ausgepreßt, die rückständige Kleie mit Wasser destillirt, und dadurch ein blausäurehaltiges Wasser und ein schweres weißes Oel erhalten. Der Rückstand in der Retorte wurde mit Wasser ausgekocht, die filtrirte Flüssigkeit zur Honigdicke abgeraucht, und mit kochendem Weingeist behandelt, der einen großen Theil auflöste und nach dem Abrauchen 9½ Procent eines sehr süßen durchsichtigen Syrups hinterließ, der nur einen schwachen bittern Nachgeschmack hatte, und sich in jeder Hinsicht als flüssiger Zucker verhielt. Was der Weingeist nicht aufgelöst hatte, war Gummi mit einer Art Käsestoff, den Pfaff Emulsin benennt, weil von ihm vorzüglich mit die Eigenthümlichkeit der aus den ölreichen Saamen gebildeten Emulsionen abhängt. Der nach dem Auskochen erhaltene Rückstand hatte getrocknet noch ein fettiges Ansehen, das noch anklebende Oel wurde durch Alkohol ausgezogen, worauf eine weiße Materie zurückblieb, die mit Wasser eingeknetet und im Keller einige Tage aufbewahrt, das Ansehn von gegohrnem Kuhkäse erhielt, den eigenthümlichen starken Käsegeruch annahm, sich in warmer Kalilauge und Ammoniak, auch in verdünnten Säuren auflöste, und im rothglühenden Tiegel die Erscheinungen verbrennender thierischer Materie zeigte. Die rückständige Asche enthielt kohlensaures Kali und phosphorsauren Kalk.

Werden die Mandeln mit kaltem Wasser angerieben, so löst sich alles bis auf $\frac{1}{10}$ faserigen Rückstand zur Emulsion auf. Diese verhält sich im We-

sentlichen wie die Milch und enthält wie diese eine Art Käsestoff (Emulsin), der sich schon durch das Kochen und beim Hinstellen in einer flachen Schale, auch bei gewöhnlicher Temperatur, mit dem fetten Oele als Rahm auf der Oberfläche abscheidet, ferner fettes Oel und Zucker. Auch enthält diese Emulsion phosphorsauren Kalk, wie die gewöhnliche Milch.

Nach dieser Analyse enthalten 100 Th. bittere Mandeln: Wasser unbestimmt; Schalen 8,5; fettes Oel (muß den dritten Theil mehr betragen) 28,0; Käsestoff (Emulsin) 30,5; Schleimzucker 6,5; Gummi 3; Pflanzenfaser 5,0; schweres ätherisches Oel und Blausäure unbestimmt. Die Menge dieses Oels giebt Pagenstecher (Trommsd. J. XIX. S. 73.) — vom Pfunde eine Drachme — offenbar zu hoch an; v. Ittner (Schw. J. XXIV. S. 395. erhielt aus 6 Pfunden 1 Drachme und 40 Gran Oel, und 2 Pfund concentrirtes Wasser.

Boullay (Trommsd. N. J. III. 1. S. 352.) hat die süßen Mandeln analysirt und hierbei im Wesentlichen denselben Weg wie Vogel eingeschlagen, und auch im Wesentlichen dieselben Resultate erhalten, mit dem Unterschiede, daß die Destillation unterblieb. Doch sieht er den Pseudokäsestoff der Mandeln nur für gewöhnlichen Eiweißstoff an, der es nur einer Beimischung von etwas Oel zu verdanken habe, daß er durch eine Art Gährung in den Zustand von Käse übergehe, indem das durch Erhitzung oder Säuren in der Mandelmilch bewirkte Coagulum, durch Pressen seines Oels beraubt, alle Eigenschaften des Eiweißstoffes zeige. Nach Pfaff unterscheidet sich aber das Emulsin wesentlich von dem gewöhnlichen Eiweiße durch den Mangel an Schwefel, daher es denn auch bei der freiwilligen Zersetzung keinen geschwefelten Wasserstoff giebt.

100 Theile süße Mandeln bestehen nach Boullay aus: Wasser 3,5; Schalen 5,0; fettem Oele 54,0; Käsestoff (Eiweißstoff) 24,0; Schleimzucker 6,0; Gummi 3,0; Pflanzenfaser 4,0; Essigsäure und Verlust 0,5. S. = 100. Nach einer Analyse von Bizio bestehen die Mandeln aus: fettem Oele 67,000; Zumim 1,750; Amygdalin 11,400; stärkemehlartiger Substanz 7,950; Zucker 0,558; Gummi 4,570; Extractivstoff 3,000; Faserstoff 2,820; Verlust 0,952. S. = 100.

Zum pharmaceutischen Gebrauche sind nur solche Mandeln zu wählen, welche nicht zerstückelt, gut ausgewaschen, trocken, weiß und leicht zerbrechlich sind; verwerflich sind die weichen, biegsamen, durchscheinenden, ranzigen, welche sich durch ihren Geschmack, und inwendig wahrzunehmende gelbe Flecken auszeichnen.

Die süßen Mandeln, welche in den Gegenden, wo sie einheimisch sind, in großer Menge als Nahrungsmittel verbraucht werden, gehören zu den vorzüglich wirksamen erweichenden, beruhigenden Mitteln, und werden mit Wasser zerrieben in der Emulsion (Mandelmilch), bei Entzündungen der Verdauungs- und Harnwerkzeuge, verordnet. Eine Unze Mandeln giebt 8 Unzen einer möglichst gesättigten Emulsion. Sehr häufig ist ihr Verbrauch zur Auspressung des fetten Oels.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0088-7

Die bittern Mandeln setzt man zwar den süßen in geringer Menge zu, um denselben einen angenehmen Geschmack zu ertheilen, jedoch sind sie wegen ihres Blausäuregehalts nicht nur für manche Thiere giftig, sondern können auch in starker und fortgesetzter Gabe den Menschen schädlich werden, daher z. B. die damit bereiteten Liqueurs, als Persico, die gefährlichsten sind.

Vögel, und nach bestätigten Wahrnehmungen auch Ratten und Mäuse, werden durch fein zerschnittene und mit Mehl bestäubte bittere Mandeln sicher und schnell getödtet.

In der Pharmacie werden sie hauptsächlich gebraucht zur Bereitung des ätherischen Oels und der destillirten Wässer.

Amylum. Kraftmehl.

Verschiedene angebaute Arten des Weizens.

Das Kraftmehl, Stärkemehl, war schon den Griechen bekannt; es soll auf der Insel Chios entdeckt worden seyn.

Es ist ein Satzmehl, welches in vielen Pflanzen, vorzüglich in den Saamen der Gräser (der Getreidearten), in den Kartoffeln, in den Wurzeln der Zeitlose, der Bryonie, der Salep, überhaupt in den weißen Knollen und Wurzeln, im Stamme vieler Palmen u. s. w. vorkommt. Das aus den Saamen der Getreidearten, und vorzüglich des Weizens, geschiedene ist von allen das reinste, und kann zum Vorbilde dienen, um die allgemeinen Eigenschaften dieser Art von Pflanzenproducten festzustellen.

Um es im Kleinen darzustellen, vermische man Weizenmehl mit Wasser, mache einen festen Teig daraus, und knete diesen unter einer laufenden Wasserröhre, und über einem großen mit einem Haarsiebe bedeckten Gefäße. Auf diese Art wird das pulverartige Stärkemehl durch das Wasser weggespühlt, und läuft mit diesem durch das Haarsieb, während der Kleber, ein anderer Bestandtheil des Mehls, der im feuchten Zustande eine große Zähigkeit besitzt, in der Hand zurückbleibt. Man läßt das Auswaschwasser ruhig stehen, gießt die überstehende Flüssigkeit ab, wäscht den Niederschlag und läßt ihn trocknen.

Im Großen wird das Kraftmehl in Fabriken aus den Abfällen und Graupen, aus dem schadhaften Weizen, häufig auch aus der Gerste durch folgendes Verfahren gewonnen. Die Gerste wird gröblich gemahlen und von den Kleien geschieden, hierauf mit Wasser vermischt, in ein Faß gethan, und bei einer Temperatur von 16—20° R. hingestellt, damit das Gemenge in Gährung gerathe. Nach 14—20 Tagen wird das Ganze auf ein Drathsieb gegossen, das Wasser läuft mit dem Stärkemehle, etwas Kleien und zersetztem Kleber hindurch. Man läßt dasselbe ruhig stehen, das dichtere Stärkemehl sinkt zuerst zu Boden, die Kleien und der Kleber bilden oben einen Schaum, den man mit einer Schaufel hinwegnimmt, nachdem das darüberstehende Wasser abgegossen worden. Dieses abgegossene Wasser wird bei den spätern Arbeiten statt des frischen Wassers genommen, weil dann die Gährung weit schneller vor sich geht. Der Zweck der Gährung

aber ist Zersetzung des Klebers, der alsdann seine Zähigkeit verliert, und nicht mehr der Abscheidung des Stärkemehls hinderlich ist.

Bei Bereitung des Kraftmehls aus dem Weizen wird dieser in kaltem Wasser eingeweicht, so lange, bis er stark aufgequollen, weich, und zwischen den Fingern gedrückt milchig ist; dann wird er unter senkrechten Mahlsteinen oder in Säcken unter Wasser so lange ausgepreßt, als das Wasser milchig wird. Um die Stärke aus Kartoffeln zu gewinnen, werden diese wohl gereinigt, zerrieben, und unter beständigem Zugießen von Wasser auf einem Haarsiebe geknetet.

Hermbstädt (Schw. J. XVI. 3. 1826. S. 278.) hat durch interessante Versuche nachgewiesen, daß die verschiedenen Düngungsmittel nicht bloß eine Verschiedenheit hinsichts des Ertrags der Fruchtkörner bewirken, sondern auch einen entschiedenen Einfluß auf die Erzeugung der näheren Gemengtheile haben, so daß 5000 Th. der aus einem mit Ziegenmist gedüngten Boden, bei 12fachem Ertrage, gewonnenen Weizenkörner 1644 Th. Kleber und 2121 Th. Amylon (außer den andern Bestandtheilen) enthielten, wogegen 5000 Th. der aus einem gleichen mit Taubenmist gedüngten Boden, bei 9fachem Ertrage, 610 Th. Kleber und 3159 Th. Amylon enthielten. Die aus einem bloß mit Pflanzenerde gedüngten Boden gewonnenen Körner, bei 5fachem Ertrage, gaben 480 Th. Kleber und 3297 Th. Amylon. Kleber und Amylon sind in jeder Hinsicht die beiden wichtigsten Bestandtheile des Weizens und der Getreidearten überhaupt; ersterer nähert sich durch seinen Stickstoff- und Phosphorgehalt mehr den animalischen Substanzen, während das Amylon seiner elementaren Zusammensetzung nach mehr den rein vegetabilischen angehört, und die verschiedene Production jener Grundstoffe steht im genauen Zusammenhange mit der elementaren Zusammensetzung der angewandten Düngerarten, so daß animalische Düngemittel den Klebergehalt, vegetabilische aber den Amylongehalt vermehren.

Die auf die eine oder die andere Weise gewonnene Stärke wird mit kaltem Wasser an- und öfters umgerührt, und durch ein sehr feines Haarsieb getrieben. Nachdem sich das Amylon abermals gesetzt hat, wird das Wasser abgegossen, und das Stärkemehl so schnell als möglich getrocknet. Beim Trocknen des Stärkemehlteigs bemerkt man immer, daß sich derselbe in unregelmäßige, aber einander ähnliche, vierseitige Säulen bildet. Das aus dem Weizen gewonnene Stärkemehl ist das reinste und feinste, das aus den Kartoffeln gewonnene besteht nicht aus so feinen Theilen, weswegen dasselbe nicht immer wie das erstere angewendet werden kann, und mehr als Nahrungsmittel benutzt wird.

Die Stärke zeigt in ihrem reinsten Zustande folgende Eigenschaften:

1) Sie hat eine schöne weiße Farbe, zeigt unter dem Mikroskope ein körniges, einigermaßen krystallinisches Gefüge, und knirscht zwischen den Fingern.

2) In kaltem Wasser löst sie sich nicht auf, zerfällt aber sehr bald zu einem Pulver, und bildet damit eine milchige Flüssigkeit. Mit kochendem

Wasser verbindet sie sich zu einem dicken Breie, und hat alsdann einen schwachen eigenthümlichen Geruch; kalt geworden ähnelt dieser Brei einer halbdurchsichtigen Gallerte, die bei gelinder Wärme getrocknet spröde ist, und im Aeußern den Gummis ähnelt.

3) Der Alkohol zeigt selbst in der Wärme keine Wirkung auf die Stärke.

4) Eben so der Aether, die ätherischen und fetten Oele.

5) Die ätzenden Alkalien lösen die Stärke auf, und bilden damit eine Art von gallertartiger Seife, die im Alkohol auflöslich ist.

6) Mit den Auflösungen der metallischen Salze findet keine merkliche Reaction statt. Trommsdorff (Taschenbuch 1824. S. 24.) hat das Verhalten des reinen Satzmehls geprüft und gefunden, daß die Lösung desselben sich gegen viele, vielleicht alle metallischen Salze sehr indifferent verhält. Das salzsaure Platin, Zinn, Palladium, Eisenoxyd und Kadmium, das salpetersaure Silber, Kobalt, Kupfer, Nickel, Zink, Queckfilberoxydul und Uran, das essigsaure Blei, weinsteinsaure Spießglanz und schwefelsaure Mangan erlitten dadurch gar keine Veränderung, und das salzsaure Gold wurde dadurch bloß schön gelb gefärbt.

7) Charakteristisch ist die Reaction der Stärkeauflösung mit Galläpfeltinctur; sie bildet mit derselben einen reichlichen weißflockigen Niederschlag; bloßer Weingeist bewirkt keinen solchen Niederschlag.

8) Noch bezeichnender ist das Verhalten des Jods gegen das Stärkemehl. Die Auflösung wird nämlich dadurch indigblau, violett oder röthlich gefärbt, je nach dem Verhältniß, indem durch sehr geringe Mengen Jod die letzteren Schattirungen hervorgerufen werden, bei nur etwas größerem Verhältniß des Jods aber stets die indigblaue Färbung erfolgt. Diese Färbung ist so eigenthümlich, daß sich beide Stoffe gegenseitig als Reagentien dienen. Einige Tropfen Jodtinctur geben nämlich die geringste Menge Stärkemehl zu erkennen, und wenn eine Flüssigkeit, die ein hydriodsaures Salz enthält, mit wenig Stärkeauflösung vermischt, und etwas Salz- oder Salpetersäure zugesetzt wird, so entdeckt sich die geringste Spur Jod. Doch ist diese Verbindung nicht beständig, und im feuchten Zustande entweicht alles Jod mit dem Wasser, im trocknen Zustande verliert sie nur einen Theil des Jod.

9) Die zu Brei gekochte Stärke, einer feuchten Luft in mittlerer Temperatur ausgesetzt, verliert bald ihre Festigkeit, nimmt einen sauren Geschmack an, und ihre Oberfläche überzieht sich mit Schimmel. Durch letztere Veränderung unterscheidet sich die Stärke vom Gummi.

Sauſſure (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 112.) hat die Veränderungen untersucht, welche das Stärkemehl erleidet, wenn es mit Wasser angerührt einer Temperatur von 20—25° eine längere Zeit hindurch ausgesetzt wird. Es bildet sich dabei 1) eine Art Zucker, die dem, welcher durch Behandlung der Stärke mit Schwefelsäure entsteht, sehr ähnlich ist. 2) Eine Art Gummi, die dem, welches durch Rösten der Stärke erhalten wird, sehr ähnelt. 3) Eine Materie, deren Eigenschaften zwischen denen der Stärke und des vorigen Gummi mitten inne stehen, und welcher Sauſſure den

Namen Amidine beigelegt hat. 4) Eine Materie, die der Faser sich dadurch nähert, daß sie weder in kochendem Wasser, noch in mehreren Säuren sich löst, aber ihre stärkenartige Natur dadurch anzeigt, daß sie die wäßrige Lösung der Jodine purpurroth färbt.

Geht die obige Zersetzung unter dem Zutritte der Luft vor, so wird viel Wasser gebildet, wozu aber die Atmosphäre nicht das Sauerstoffgas hergiebt. Das eingesogene Sauerstoffgas wird vielmehr zur Bildung des sich ausscheidenden kohlensauren Gases verbraucht, und es scheidet sich noch außerdem Kohle ab, die alle Producte der Operation braun färbt. Der trockne Rückstand von der zersetzten Stärke wiegt weniger, als vorher, welches von der Verflüchtigung des neu gebildeten Wassers, weniger der Kohlensäure, herrührt. Geschieht die Zersetzung beim Ausschlusse der äußern Luft, so wird kein Wasser gebildet, aber es entbindet sich eine kleine Menge kohlensaures Gas und fast reines Wasserstoffgas. Doch wiegt der Rückstand, der aus denselben Bestandtheilen besteht, im trocknen Zustande etwas mehr, als das angewandte Stärkemehl, woraus zu schließen, daß hier die Bestandtheile des Wassers von dem Stärkemehle in die Verbindung aufgenommen worden.

Nach *Caventou* wird das *Amylum* auch durch das Behandeln mit kochendem Wasser verändert, denn es verliert dadurch seine vorzüglichste Eigenschaft, seine Unauflöslichkeit im kalten Wasser. Der Kleister ist nicht bloß ein Hydrat, wofür man ihn gehalten hat, sondern ein Gemisch von Wasser, Stärke und veränderter Stärke. Läßt man eine Amidinauflösung lange kochen, so verliert sie die Eigenschaft, durch Jod blau gefärbt zu werden, behält aber jene, Galläpfeltinctur und essigsaures Blei (welches letztere nach *Trommsdorff* nicht gefällt wird) zu fällen, noch bei. Sie wird jetzt mit Jod purpurroth, wie die des gerösteten Stärkemehls, oder eine mit verdünnter Schwefelsäure gekochte Stärkeauflösung. Durch noch längeres Kochen wird endlich die Amidinauflösung vom Jod nicht mehr gefärbt.

Wird verdorbener Kleister verdünnt auf ein Filtrum gebracht, so wird die durchgelaufene Flüssigkeit durch Jod purpurroth, der Rückstand aber blau gefärbt.

Durch gelindes Rösten bis zu einer blaßgelben Farbe wird die Stärke in eine Art Gummi, dem arabischen Gummi sehr ähnlich, verwandelt, so daß sie sich jetzt auch im kalten Wasser auflöst. Wird die so geröstete Stärke mit kaltem Wasser ausgezogen, und die Auflösung abgedampft, so erhält man ein Product, welches zu manchen Zwecken, z. B. in Fabriken, statt des arabischen Gummis angewandt werden kann. Es wird hierbei der Gehalt an Sauerstoff vermehrt, daher die Auflösung, wie das gewöhnliche arabische Gummi, Lackmuspapier röthet.

Die Salpetersäure löst die Stärke größtentheils unter Entwickelung von Salpetergas mit Lebhaftigkeit auf, nimmt davon eine grüne Farbe an, und mit Hülfe der Wärme bildet sie Aepfel- und Kleesäure aus der Stärke. Im Destillationsapparat geht Essigsäure über, und es scheidet sich eine (dem Weizenstärkemehl beigemengt gewesene?) aufschwimmende talgartige Materie ab.

Im Vitriolöl löst sie sich langsam unter Entwickelung schwefliger Säure zu einer schwarzen steifen Substanz auf, aus welcher Wasser kohlige Materie abscheidet. Wird 1 Th. Stärkemehl mit 4 Th. Wasser und ungefähr 0,01 bis 0,1 Vitriolöl stunden- oder tagelang (je weniger Vitriolöl genommen worden, desto länger muß das Kochen anhalten) unter fleißigem Umrühren, und unter beständiger Erneuerung des Wassers gekocht, so wird die kleisterartige Mischung bald dünnflüssig, wobei sich jedoch noch wenig oder gar kein Zucker, sondern nach Saussure ein Gummi gebildet hat, doch endlich ist alles Stärkemehl in krümlichen und selten auch in gemeinen Zucker verwandelt.

Bei dieser Zuckerbildung, die von Kirchhoff entdeckt worden, wird nach Vogel weder ein Gas aus der Luft absorbirt, noch kohlensaures, schwefelsaures oder ein anderes Gas aus der Flüssigkeit entwickelt, auch bleibt nach Saussure die Menge der Schwefelsäure unverändert. Nach Vogel und de la Rive erfolgt diese Zuckerbildung auch in verschlossenen Gefäßen bei abgehaltener Luft. Nach Vogel wirkt die Säure durch Wasserentziehung; nach Saussure vermehrt die Säure die Flüssigkeit der Stärkeauflösung, wodurch dem Stärkemehle Gelegenheit gegeben wird, eine gewisse Menge, oder vielmehr Wasser- und Sauerstoff in die organische Verbindung aufzunehmen.

Aus 100 Th. Stärkemehl erhielt Kirchhoff 90, Saussure 110,14 Zucker.

	100 Th. Weizenstärke bestehen nach Gay-Lussac u. Thenard	100 Th. Stärkemehl bestehen nach Saussure	nach Saussure
aus Kohlenstoff	43,55	45,39	37,29
Wasserstoff	6,77	5,90	6,84
Sauerstoff	49,68	48,31	55,87
Stickstoff	—	0,40	—
	100,00	100,00	100,00

Bei der trocknen Destillation liefert die Stärke kohlensaures und brennbares Gas, Wasser, Essigsäure, wenig oder kein freies brenzliges Oel und Kohle. Diese Kohle wird im offenen Feuer ohne merklichen Rückstand gänzlich verzehrt.

Auf einem glühenden Eisen brennt sie mit einer hellen Flamme wie Zucker.

In der Medicin wird sie selten, innerlich und zum Lavement, verordnet, sonst auch zum Bestreuen der Pasten benutzt.

Als ein besonderes Satzmehl ist seit einigen Jahren aus Ostindien ein feines Mehl, unter dem Namen **Arrow-Root** gebracht worden. Es soll das Satzmehl von **Maranta arundinacea** oder **indica Tussac** seyn; Martius (Buchn. Repert. VI. 2. S. 223.) vermuthet aber dem englischen Namen nach, daß es von einer **Sagittaria** und zwar vielleicht von **sagittifolia** herrühre, auch machte er vergleichende Versuche mit dem Satzmehle aus den Knollen unserer einheimischen **Sagittaria sagittifolia**, und fand das Resultat vollkommen mit dem **Arrow-Root** übereinstimmend.

Wenn nun auch noch manche Aerzte diesem Satzmehle Vorzüge vor der Kartoffelstärke zuschreiben, als leichter verdaulich u. s. w., so geht doch aus den chemischen Versuchen der Herren Pfaff, Buchner, Martius, Pelletier und Caventou aufs deutlichste hervor, daß es sich nicht chemisch unterscheidet, und daß es nicht nöthig sey, dieses theure und der Verfälschung so leicht unterworfene Mehl in den Arzneivorrath aufzunehmen. Als das einzige sichere Unterscheidungszeichen gilt, daß die aus 10 Gran Weizen- oder Kartoffelstärke mit 2 Unzen Wasser bereitete Auflösung einen beim Erkalten consistenten, einer Gallerte gleichenden Kleister, das unverfälschte Arrow-Root dagegen eine schleimige kleisterartige Auflösung giebt, die kein zusammenhängendes Ganze darstellt.

Ein anderes sehr bekanntes Satzmehl ist der Sago. Pelletier und Caventou sahen zwar den Sago so wie die Tapioka (das durch einiges Backen schon veränderte Stärkmehl von **Jatropha Manihot**, das in Indien statt der Kartoffel gebraucht wird) als besondere Arten von Stärkemehl an, weil sie durch Jod blau gefärbt werden, sich jedoch in kaltem Wasser zum Theil auflösen; indessen rührt dieser Unterschied wahrscheinlich nur davon her, daß sie durch die erlittene Hitze etwas verändert worden sind.

Der Sago, kleine rundliche, weißliche oder röthliche, sehr harte, elastische, halbdurchsichtige Körner, wird auf den Molucken aus dem Marke der Sagopalme (**Sagus farinaria Rumph.**) bereitet. Der Baum wird 30 Fuß hoch, und erreicht oft eine solche Dicke, daß ein Mensch nicht im Stande ist, denselben zu umfassen. Er ist zum Umhauen gut, wenn sich seine Blätter mit einem weißlichen Mehle überziehen, oder wenn etwas mit einem Holzbohrer herausgezogenes Mark bei dem Verdünnen mit Wasser Satzmehl fallen läßt. Nachdem der Baum umgehauen worden, wird der Stamm in Stücke geschnitten, diese in vier Theile gespalten und das Mark herausgenommen, welches hierauf zerquetscht und mit Wasser verdünnt wird. Das auf die gewöhnliche Weise erhaltene Satzmehl ist sehr weiß und fein, und wird von den Einwohnern der Molucken zum Brote und zu einigen wohlschmeckenden und nahrhaften Speisen benutzt. Nur wenn sie dasselbe in den Handel bringen wollen — der Sago wurde zuerst in England 1729, in Frankreich 1740 und in Deutschland 1744 bekannt — treiben sie das noch feuchte Satzmehl durch eine mit Löchern versehene Metallplatte, dadurch verwandeln sie dasselbe in kleine Körner, welche sie vollends, unter beständigem Umrühren, in flachen, gelinde erwärmten Pfannen trocknen. Durch dieses schwache Rösten erhält auch der Sago die gewöhnliche röthliche Farbe.

Angelica. Die Wurzel. Angelikawurzel.

Angelica Archangelica Linn. Eine zweijährige im nördlichen Europa einheimische Pflanze.

Die Wurzel mit länglichem, dicken Kopfe (Wurzelstocke), dichten, langen, fleischigen, bis 2 Linien dicken Fasern oder Wür-

zelchen, außen schwarzbraun, innen weiß, mit zahlreichen gelben Gefäßen, von starkem Geruche und scharf gewürzhaften Geschmacke. Sie werde im zweiten Jahre zur Frühlingszeit gesammelt.

Angelica Archangelica Linn. Engelwurz.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese Pflanze gehört zu den seltenern Bürgern unserer deutschen Flora. Sie wächst in den südlichern Gegenden auf Bergen, im Norden auf der Ebene an feuchten Stellen. Sie wird auch in Gärten angebaut, und ist fast die einzige Pflanze, welche durch Cultur an Heilkraft gewinnt, da die auf schattigem, feuchtem aber magern Boden gebaute wirklich Vorzüge hat vor der wild in Sümpfen wachsenden.

Der Stengel erreicht eine Höhe von 5—6 Fuß, und eine Dicke von 1½ Zoll im Durchmesser; er ist rund, glatt, röthlich bereift, innen hohl, ästig. Die Wurzelblätter stehen auf fußlangen, runden, gestreiften Blattstielen, die am Grunde mit einer weiten kurzen Scheide den Stengel umfassen; sie werden an 3 Fuß lang, fast eben so breit und sind doppelt gefiedert; die Fiederblätter der zweiten Ordnung (pinnulae) sind gestielt, groß, mehr oder weniger tief eingeschnitten, gelappt und gezahnt, die äußerste Spitze der Blätter ist tief dreilappig. Die Stengelblätter sind verhältnißmäßig kleiner, und hängen auf großen weiten gefurchten Blattscheiden herab. Die am Grunde der Blüthenstiele stehenden sind sehr klein, und bestehen aus drei einfachen gezahnten Blättchen. Alle diese Blätter sind ganz glatt, oben dunkelgrün, unten bläulichgrün bereift.

Die Blüthen stehen in zahlreichen, großen, etwas converen, vielstrahligen und vielblüthigen Dolden an der Spitze des Stengels und der Zweige. Die Blumenkrone ist aus fünf lancettförmigen kleinen ganzrandigen gelblichweißen Blumenblättchen gebildet. Die weißen Staubfäden sind länger als die Kronen.

Alle Theile der Pflanze riechen stark aromatisch.

Die officinelle Wurzel ist ziemlich groß; im frischen Zustande ist ihre innere Substanz fleischig, weiß, milchend, der Saft gelblich; getrocknet ist sie schwammig, und der Länge nach aufgeschnitten zeigt sie kleine gelbe Rinnen, die auf dem Querdurchschnitte wie harzige Punkte oder Flecken erscheinen, von den durchschnittenen Gefäßen, in welchen ein ätherisches Oel und ein balsamartiger Stoff enthalten sind. Ihr Geruch ist einigermaßen zwischen dem Fenchel- und Alantgeruche in der Mitte stehend, der Geschmack erst süßlich, dann beißend erwärmend, hintennach etwas bitterlich. Sie wird leicht schimmlig und wurmstichig, und muß daher an einem trocknen Orte wohl verwahrt werden.

Die Wurzel der in sumpfigen Gegenden wachsenden Waldangelika (**Angelica sylvestris**) kommt im Wesentlichen überein, ist aber weit schwächer

an Geruche und Geschmacke, ihr Mark enthält auch nicht die gelben Punkte und Flecken, und ist in die Quere gestreift.

Wenn man die frische Wurzel im Frühlinge aufschneidet, so liefert sie von der innern Seite der Rinde einen etwas dicklichen, gelblichen, stark aromatisch riechenden Saft, der gelind getrocknet seinen Geruch beibehält, und eine Art von Gummiharz darstellt. Der Hauptbestandtheil desselben ist jene gelbe balsamartige Materie, welche in der trocknen Wurzel in jenen der Länge nach laufenden Canälen sich befindet, und auf dem Durchschnitte die gelben Punkte bildet. Diese gelbe Substanz wird vom Weingeiste leicht und völlig aufgelöst, und giebt damit eine gesättigt goldgelbe Tinctur. Bei der Destillation mit Wasser giebt die Wurzel ein ätherisches Oel von hellgelber Farbe, einem sehr stechenden Geschmacke und durchdringenden Geruche. Der wäßrige Aufguß ist gesättigt rothgelb gefärbt, hat nur einen schwach aromatischen, dabei etwas bitterlichen Geschmack, und wird durch die Eisenauflösungen in seiner Farbe nicht verändert.

John (Chemische Tabellen der Pflanzenanalysen. 17.) hatte in 300 Th. gefunden: farbeloses, sehr flüchtiges, schwach riechendes Oel 2; Gummi 100,5; Inulin 12; bittern Extractivstoff 37,5; scharfes Harz 20; eigenthümliche nur in Kalilauge auflösliche Substanz mit Eiweißstoff 22; holzigen Theil 90; Verlust 16. S. = 300.

Bucholz und Brandes (Trommsd. N. J. I. 2. S. 138.) haben eine sehr ausführliche Analyse geliefert und gefunden: Extractivstoff mit Spuren von schwefels., salzs. und pflanzensauren Salzen $264\frac{1}{4}$; gummigen Stoff $317\frac{3}{4}$; Angelikabalsam $60\frac{3}{13}$; Stärkemehl und stärkemehlartigen Stoff 54; eigenthümlichen Stoff $6\frac{2}{3}$; Eiweißstoff 9; Feuchtigkeit 175; Faser 86; angenommenen Gehalt an ätherischem Oele 7. S. = $979\frac{81137}{700}$.

Die Asche des vollkommen ausgezogenen Angelikarückstandes war zusammengesetzt, größtentheils aus kohlensaurem Kalk und Kieselerde; ferner kohlensaurem Kali, schwefelsaurem Kali, salzsaurem Kali, Alaunerde, Eisenoxyd und Kupferoxyd.

Der Angelikabalsam wird nebst dem ätherischen Oele als der vorzüglich wirksame Bestandtheil der Angelika erklärt. Er ist in der Hauptmasse schwarzbraun, beim dünnen Ueberzuge röthlichgelb, hat einen starken angenehmen Geruch, wie die Wurzel, einen anfangs mild bittern, beim Verbreiten über die Zunge brennend gewürzhaften Geschmack, wie die Wurzel; jedoch weit concentrirter, hintennach im Halse kratzend. Consistenz, die eines dicken Zuckersaftes. In Wasser ist er unauflöslich, nur eine dünne Oelhaut schien zu seyn; in rectificirtem Weingeist ist er löslich, noch mehr in absolutem Alkohol und Aether, auch in Terpenthinöle und Mandelöle. Der Extractivstoff ist schwarzbraun, in geringem Durchmesser dunkelröthlich braun, hat einen süßlichen, dem Wachholderbeersafte ähnlichen Geruch, der in der Wärme stärker ist, einen mäßig bittern, kaum merklich erwärmenden und scharfen Geschmack; ist trocken, hart und zerreiblich, zieht Feuchtigkeit aus der Luft an; ist in Wasser und absolutem Alkohol leicht auflöslich; absoluter

Aether zeigt keine Wirkung. Eisensalze und Galläpfeltinctur brachten keine Veränderung hervor. Der eigenthümliche Stoff zeigte in einigen Eigenschaften viele Aehnlichkeit mit dem Eiweißstoffe, in andern hingegen sich gänzlich davon verschieden. In einem Löffel über der Lichtflamme möglichst erhitzt, erfolgte nicht das geringste Schmelzen oder Fließen, noch Aufblähen oder Aufstoßen eines riechenden Dunstes, sondern der behandelte Stoff ging dadurch bloß ins Schwärzliche über.

Bucholz und Brandes fanden demnach kein Inulin, auch kein Harz. Der süße Geschmack, welchen das wäßrige Extract, auch die Wurzel selbst hat, ließ noch Schleimzucker vermuthen, um so mehr, da man nach Haller aus der frischen Wurzel durch Gährung einen sehr kräftigen Geist bereiten kann, der nach Moschus riecht.

Die Angelika ist sicher ein sehr kräftiges Arzneimittel, sie kommt am meisten mit der Serpentaria überein. Ihrer flüchtigen Theile wegen darf sie nicht in der Abkochung, sondern im Aufgusse verordnet werden. Der obigen Analyse zufolge würde die Tinctur die kräftigste Form seyn, und nächstdem ein weiniger Aufguß.

Angustura. Die Rinde. Angusturarinde.

Bonplandia trifoliata Willd. oder Angostura Cuspare Roem. et Schult. Ein in den Wäldern um den Oronokofluß im südlichen Amerika einheimischer Baum.

Die Rinde in beinahe platten oder gewölbten, eine halbe Linie bis zu einer Linie dicken Stücken, außen von einer ziemlich dicken gleichsam mehlartigen schmutzig gelblichweißen Epidermis, der innere Theil bei ebnem Bruche gelblichbraun, die innere Oberfläche goldgelbbraun, von etwas gewürzhaftem, schärflichem, stark bittern Geschmacke. Man hüte sich, daß nicht die unächte, aus Ostindien gebrachte, aufs höchste schädliche Rinde untergeschoben werde, die außen aschgrau, mit weißen Wärzchen und rostfarbigen Flecken gezeichnet, innen fast schwarz, von einem stark bittern widrigen Geschmacke ist, und deren Abkochung von schwefelsaurer Eisenauflösung schwarz gefärbt wird.

Bonplandia trifoliata Willd. Dreiblättrige Bonplandia.
Cusparia febrifuga Humb. Fieberwidrige Cusparia.
Angostura Cuspare R. et S. Galipea febrifuga et Cusparia St. Hil. Bonplandia Angustura Spr.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 21. Rutaceae.

Dieser schöne und ansehnliche Baum erreicht eine Höhe von 60—80 Fuß. Der Stamm ist gerade aufrecht, die Rinde desselben 2—3 Linien dick und

grau, die des jungen Holzes ist grün, glatt und mit graulichweißen Höckerchen besetzt. Die abwechselnd stehenden, immergrünen, 1—2 Fuß langen Blätter sind aus drei besondern Blättchen, die an der Spitze eines 10 Zoll langen Blattstiels stehen, zusammengesetzt (folia ternata); die Blättchen sind länglich, auf beiden Seiten zugespitzt, ganzrandig, mit punktförmigen Drüsen besetzt und wohlriechend. Die Seitenblättchen sind etwas kleiner, am Rande ungleich.

Die Blüthen stehen in aufrechten zusammengesetzten Trauben von der Länge der Blätter, aus deren Winkeln sie entspringen. Der Kelch ist glockenförmig, und am Saume in fünf gleiche Zähne gespalten. Die Blumenkrone besteht aus fünf weißen, auf der äußern Seite behaarten Blumenblättern, die sich in Gestalt einer einblätterigen röhrenförmigen Blumenkrone an einander anschließen.

Die officinelle Rinde wurde lange Zeit der Magnolia glauca zugeschrieben, bis Humboldt und Bonpland die richtige Pflanze kennen lehrten.

Die Rinde kommt in meistens platten, nur wenig gerollten, dünnen, länglichen, regelmäßigen Stücken, deren Dicke, je nachdem sie von dünnern oder dickern Zweigen herrührt, bis zur halben, nicht leicht aber über eine Linie steigt, und die gewöhnlich ½ bis ¾ Zoll breit, 2, 3 bis 4 Zoll lang sind. Die äußere Seite ist entweder mit der grünlichgrauen und ziemlich glatten Epidermis bekleidet, oder an einzelnen Stellen mit einer weichen lockern und schwammigen blaßgelblichen Substanz bedeckt; die innere Seite ist glatt, fahlgelb, zuweilen ins Röthlichgelbe übergehend. Der Bruch ist dicht, gelbbraun und harzig. Der Geruch ist unbedeutend, etwas dumpfig, der Geschmack sehr bitter, von einem einigermaßen gewürzhaften und scharfen Nachgeschmacke. Diese nach der Bitterkeit sehr merkliche Schärfe unterscheidet diese Rinde von der später zu erwähnenden unächten Angusturarinde sehr deutlich. Das Pulver sieht frisch gelb, wie gute gepulverte Rhabarber, aus, wird aber nach einiger Zeit blässer, es riecht weit stärker gewürzhaft, als die Rinde.

Der gesättigte wäßrige Aufguß der Angusturarinde ist schön hellrothbraun, gleichsam orangefarbig, von bitterm nur wenig scharfem Geschmacke; verdünnt geht er ins Gelbe über, durch kohlensaures Kali wird er dunkelgelbroth, und setzt nach einiger Zeit einen hellcitronengelben, etwas flockigen Niederschlag ab. Die concentrirte Abkochung ist schön rothbraun, wird beim Erkalten trübe, und läßt einen hochgelben pulverigen Satz fallen, schmeckt stark, jedoch nicht widrig bitter, und hintennach etwas brennend scharf. Die Rinde mit Wasser und etwas Laugensalz gekocht, erregt kein Aufbrausen, das dunkelbraune Decoct wird aber kalt nach Pfaff nicht roth, sondern fällt ins Grünliche; in meinen Versuchen behielt die mit Kali gemachte Abkochung auch beim Erkalten ihre dunkelgelbrothe Farbe, hatte aber ihre Bitterkeit eingebüßt. Die concentrirte geistige Tinctur ist dunkelgelblich-rothbraun, schmeckt angenehm bitter, und etwas gewürzhaft scharf, wird durch Wasser sehr stark getrübt, und setzt ein hellgelbliches Harz ab. Das über die Rinde abgezo-

gene Wasser hat einen ganz eigenen, dem Petersilienwasser nicht unähnlichen Geschmack, und obenauf schwimmt ein weißes wesentliches Oel, das ganz vollkommen den Geruch der Rinde hat, scharf schmeckt, und auf der Zunge einen Eindruck von Wärme, wie Campher macht. Hr. Prof. Heine (Berl. Jahrb. 1815. S. 117. erhielt aus vier Pfund Rinde 1½ Quentchen von diesem ätherischen Oele, und Hummel aus zwei Pfund nur 28 Gran. Den Versuchen des letztern zufolge enthalten 1000 Gran Rinde: ätherisches Oel etwa 2 Gran; balsamisches Weichharz 80 Gran; Hartharz unbestimmt; bittern Extractivstoff (mit dem Hartharz) 240. Fischer (Berl. Jahrb. 1816. S. 76.) erhielt aus 8 Unzen Rinde: ätherisches Oel 10 Gran; Seifenstoff (gelben bittern Extractivstoff) 2 Drachmen 23 Gran; Gummi mit Schleimstoff verbunden 5 Drachm. 40 Gran; balsamisches Weichharz 1 Drachm. 15 Gran; Hartharz 1 Drachm. 6 Gran; Kaoutschouk 6 Gran; Rindenstoff 6 Unzen 7 Drachm. 20 Gran.

Pfaff (System der Mat. med. II. S. 69.) giebt folgende Bestandtheile an: 1) ein flüchtiges Princip, in Form eines ätherischen Oels mit Wasser destillirbar; 2) einen eigenthümlichen bittern Extractivstoff (Angusturabitter), der das vorzüglich Wirksame dieser Rinde ausmacht, und in Wasser und Weingeist gleich löslich ist; 3) zweierlei Harz, a) ein bitteres Harz, das dem bittern Extractivstoffe sehr nahe kommt, und in mehr trockner Gestalt dargestellt werden kann, b) ein mehr öliges oder schmieriges Harz, das eigentliche Princip des scharfen und zum Theil widrigen Geschmacks dieser Rinde; 4) freie Weinsteinsäure; 5) mehrere Salze, namentlich salzs. und schwefels. Kali, weinsteins. Kali, schwefels. Kalk; 6) Rindenfaserstoff.

Nach Brandes soll sich das Bitter der Angustura in reiner Gestalt als eine Pflanzenbasis darstellen lassen. Jedoch ist hierüber nichts Näheres bekannt geworden, auch ist es Pfaff (Mat. med. VII. S. 73.) nicht gelungen, ein Alkaloid darzustellen. Er befolgte dasselbe Verfahren, wie bei Darstellung des Chinins; bei Präcipitation der mit Zusatz von Schwefelsäure gemachten Auszüge entwickelte sich ein starker Geruch nach Ammoniak, welcher das Daseyn eines ammoniakalischen Salzes in der Rinde anzeigte. Der mit dem gelbgefärbten Niederschlage digerirte Weingeist enthielt nun ein ungemein zähes klebriges Harz (Weichharz) von dunkelbrauner Farbe und scharfem noch etwas bittern Geschmacke, welcher von dem dem Harze beigemischten Bitter herrührte, da er durch Essigsäure beinahe ganz ausgezogen werden konnte, wogegen die Essigsäure die Bitterkeit annahm. Nach Absetzung des Harzes blieb eine höchst bitter schmeckende Flüssigkeit zurück, die alkalisch reagirte, aber nicht zur Krystallisation gebracht werden konnte. Sie war braun gefärbt, hat aber die merkwürdige Eigenschaft, zur Trockne gebracht die schönste carminrothe Farbe anzunehmen. Die den meisten übrigen Alkaloiden gemeinschaftliche Eigenschaft, den Galläpfelaufguß reichlich niederzuschlagen, kommt ihr nicht zu; der gesättigte Aufguß und die Abkochung aber werden, wie die der Chinarinden, vom Galläpfelaufguß und vom Brechweinstein gefällt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0099-5

Auf den Gebrauch der Angusturarinde in der Abkochung wurden zuerst im Jahr 1804 zu Hamburg sehr üble Zufälle bemerkt, worauf der dortige Stadtphysikus Dr. Rambach den Auftrag erhielt, die Sache zu untersuchen. Dieser unterschied zuerst zwei Hauptarten der Angusturarinde, nämlich die ächte und die unächte. Beide fanden sich bei Materialisten sowohl als in den Apotheken mit einander gemengt, und mußten erst sortirt werden. Neue Unglücksfälle, welche sich in Ungarn ereigneten, veranlaßten eine neue genauere Untersuchung von Seiten der medicinischen Facultät in Wien, als deren Resultat sich ergab, daß die unächte Angusturarinde zu den heftigsten Pflanzengiften gehöre, indem ganz kleine Dosen derselben, nämlich 10 bis höchstens 20 Gran Pulver, gesunde und starke Hunde in wenigen Minuten unter Convulsionen tödteten. Die Wirkungen sind Schwindel, Angst, Ermattung und ein unangenehmes Gefühl von Bewegloſigkeit, Erbrechen, Fieber, Zittern und krampfhafte Zuckungen.

Diese unächte Angusturarinde, unter dem Namen der ostindischen, ist der **Brucea ferruginea**, einem durch Bruce gefundenen, in Abyssinien einheimischen, zu den Terebinthaceen gehörigen Strauche zugeschrieben worden. Die höchst giftigen Eigenschaften aber dieser falschen Angusturarinde, und die Ergebnisse der chemischen Zerlegungen, welche die Anwesenheit eines narkotischen Alkaloids, des Brucins, eines dem Strychnin sehr verwandten Stoffes darthun, machen es mehr als wahrscheinlich, daß die falsche Angusturarinde von einer gleichfalls in Westindien einheimischen Strychnosart abstamme, woraus auch die Untermengung von unächter unter ächter Angusturarinde begreiflicher ist. Daß aber **Strychnos colubrina** die Mutterpflanze sey, wie Virey angiebt, ist deshalb nicht wahrscheinlich, weil dieses Gewächs ebenfalls ostindisch ist.

Die Stücke dieser unächten Rinde, so wie sie im Handel vorkommen, unterscheiden sich, was ihr äußeres Ansehen betrifft, in einigen Punkten von einander, so daß man verschiedene Sorten machen könnte, doch stimmen sie in der Hauptsache so überein, daß man sie ohne allen Anstand als Varietäten einer und derselben Gattung von Rinde ansehen kann. Sie bildet nämlich größtentheils unregelmäßige Stücke von verschiedener Größe, mehr breit als lang, theils auch gerollt, zum Theil auch nach außen umgebogen, im Durchschnitte viel dicker als die ächte, bis auf 2 Linien dick, überhaupt von grobem Gewebe, von außen mit einem größtentheils aus abgesonderten kleinen weißen, gelblichen oder rostfarbigen Warzen bestehenden Rindengeflechte, gleich einem wahren Ausschlage überzogen, welcher fest an der Rinde hängt, und sich schwer abschaben läßt; auf der innern Fläche theils schmutzig gelblichweiß, theils grau, theils, und dies in den meisten Fällen, schwarz, ohne unterscheidbare Fasern, leicht brüchig, auf dem Bruche aber theils weiß, theils weißgelblich, theils auch hellbräunlich, nicht glänzend und harzig, sondern mehr mehlig, zum Theil deutlich zwei Schichten darstellend. Der Geruch hat einige Aehnlichkeit mit der ächten Angusturarinde, der Geschmack ist im höchsten Grade widrig bitter, lange anhaltend, ohne alles Gewürzhafte,

Schärfe, so wie auch ohne alles Zusammenziehende. Gekaut wird sie bleicher. Ihr Pulver ist mehr hellgelb.

Die Versuche mit Auflösungsmitteln und chemischen Reagentien setzen die wesentliche Verschiedenheit der unächten und ächten Angusturarinde in ein noch helleres Licht.

Der concentrirte Aufguß der unächten Angusturarinde ist nicht so klar, wie der der ächten, noch mehr schmutzigbraun, und wird mit Wasser verdünnt nicht gelb; der Geschmack ist höchst widrig bitter. Schwefelsaures oder salzsaures oxydirtes Eisen bewirkt eine dunkelgrüne Färbung, und einen reichlichen sammetartigen schwarzen, etwas ins Aschgraue sich ziehenden Bodensatz, der sich in Salpetersäure vollkommen wieder auflöst und damit eine graulichbraune Auflösung bildet. Die ächte Rinde wird von diesem Reagens nach Pfaff nicht ins dunklere Grün oder Blau umgeändert, sondern wird höher roth, und es setzt sich nach einiger Zeit ein rosenfarbiger Niederschlag ab. Nach Guibourt wird ein sehr reichlicher weißlichgrauer Niederschlag erzeugt, der auch in meinen Versuchen erhalten wurde.

Diese Farbenveränderung und Niederschlag wurde gleich von Rambach als das Hauptunterscheidungsmerkmal der ächten und unächten Angusturarinde mit Recht anerkannt; doch ist dieses nicht, wie Rambach und Trommsdorff glauben, von adstringirendem Princip oder Gerbestoffe herzuleiten, da Gallerte in beiden Infusionen nicht eine Spur von Niederschlag hervorbringt, sondern jener die Eisenauflösung grünfärbende Bestandtheil ist das Brucin. Kohlensaures Kali ändert die Farbe des Aufgusses der unächten Angustura, *nicht wie bei der ächten ins Braunrothe, sondern vielmehr in Grünliche um*, es setzt sich gleichfalls ein flockiger, graulichgelblicher Niederschlag ab, und nach und nach färbt sich die überstehende Flüssigkeit von der Oberfläche aus ins Dunkelbraune.

Die Abkochung der unächten Rinde ist bräunlichgelb (schwärzlichgrün bei mir), läßt einen häufigen graubraunen (schwärzlichgrünen) Bodensatz fallen, hat einen höchst widrig bittern, lange anhaltenden ekelhaften Geschmack, und verhält sich gegen Reagentien im Wesentlichen wie der Aufguß, nur daß die Niederschläge noch viel reichlicher sind. Auch mit Kalkwasser, mit essigsaurem Blei, Brechweinstein und Galläpfeltinctur bildet diese Abkochung reichliche flockige Niederschläge.

Die geistige Tinctur der unächten Rinde ist weniger dunkel gefärbt, als die der ächten, schmeckt unerträglich bitter, läßt sich mit Wasser, ohne merkliche Trübung und ohne Harz abzusetzen, vermischen, indem sie alsdann bloß ein blaßgelbes opalisirendes Ansehn erhält. Eine Auflösung des oxydirten schwefels., salzs. oder salpetersauren Eisens verwandelt diese Farbe sogleich in die schmutziggrüne und fällt einen grauschwarzen Niederschlag. (Pfaff im Berl. Jahrb. 1808. S. 26.)

Die Herren Pelletier und Caventou haben durch eine sorgfältige Analyse (Schw. J. XXVIII. S. 32; Gilbert's Annalen, Jahrg. 1819. 3s Stück. S. 322. Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 136.) nachgewiesen, daß die

giftig wirkende Substanz in der unächten Angusturarinde ein dem Strychnin ähnliches Alkaloid sey, welches sie Brucin genannt haben. Dasselbe wird durch folgendes Verfahren erhalten. Man befreit zuerst die Rinde durch Digestion mit Aether vom Fett, kocht sie dann wiederholt mit Weingeist, dampft die Auszüge ab, löst das geistige Extract in Wasser auf, versetzt es mit Bleizucker, um den Farbestoff größtentheils niederzuschlagen, entfernt aus der Flüssigkeit das überschüssig zugesetzte Blei durch Schwefelwasserstoffgas, filtrirt wieder, kocht mit Bittererde, wäscht dieselbe mit Wasser aus, und trennt auf diese Weise das in vielem Wasser auflösliche Brucin von dem unlöslichen Rückstande. Durch Abdampfen der Flüssigkeit erhält man ein mit Farbestoff verunreinigtes körniges Brucin; dieses verwandelt man durch Zusatz von Kleesäure in kleesaures Brucin, behandelt dieses mit kaltem (im Sommer mit künstlich bis auf 0° erkältetem, damit es nicht auch das Salz auflöse) absoluten Alkohol, welcher den Farbestoff aufnimmt, und reines kleesaures Brucin zurückläßt. Endlich zersetzt man das kleesaure Brucin durch Einkochen mit Wasser und Kalk oder Magnesia, wodurch das Alkaloid frei wird, welches durch Alkohol aufgelöst und durch langsame Abdunstung krystallisirt erhalten werden kann. Ist dasselbe roth gefärbt, so wiederhole man die Behandlung mit Kleesäure.

Durch diese Behandlung wird das in der Rinde an eine Pflanzen- (Gallus-?) säure gebundene Brucin vermittelst der Magnesia abgeschieden, welches jedoch als ziemlich löslich in Wasser nicht bei der Magnesia bleibt, sonder ausgewaschen werden kann. Um das Brucin von den färbenden Theilen zu befreien, wird es in das in kaltem absoluten Alkohol unlösliche kleesaure Brucin verwandelt.

Das Brucin krystallisirt in weißen, durchsichtigen, geschoben vierseitigen Säulen, welche zuweilen einige Linien dick sind, häufig aber in unregelmäßigen, zusammengehäuften, perlmutterglänzenden Blättchen. Es ist luftbeständig, geruchlos, schmeckt sehr und anhaltend bitter, wirkt dem Strychnin ähnlich, jedoch minder heftig. Es ist in 500 Th. kochendem und 850 Th. kaltem Wasser auflöslich (beigemischter brauner Farbestoff befördert sehr die Löslichkeit); auch ist es in Weingeist sehr, in flüchtigen Oelen wenig, in Aether und fetten Oelen gar nicht auflöslich.

Der hervorragendste Charakter des Brucins ist, daß es mit überschüssiger Salpetersäure eine schön rothe Lösung giebt, welche durch Hydrothionsäure, schweflige Säure oder salzsaures Zinnoxydul entfärbt wird; beim Erwärmen oder beim weitern Zusatz von Salpetersäure geht die rothe Farbe in Gelb über; fügt man zu der gelbgewordenen Flüssigkeit salzsaures Zinnoxydul, so entsteht augenblicklich eine lebhafte violette Färbung und ein eben solcher Niederschlag. Die kleinste Menge Brucin ist durch dieses Reagens zu entdecken.

Mit Säuren bildet das Brucin die Brucinsalze, welche zum Theil sauer, zum Theil neutral, meistens krystallisirbar und leicht löslich in Wasser sind. Sie schmecken sehr bitter, und werden durch alle Alkalien, Bittererde, Mor-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0102-2

phium und Strychnin zersetzt. Wird ein Brucinsalz aus seiner Lösung durch ein Alkali niedergeschlagen, so verschluckt das Brucin eine beträchtliche Menge Wasser, die es erst durchs Schmelzen wieder verliert. Das reine krystallisirte Brucin ist ein wahres Hydrat; 100 enthalten 21,65 Wasser, wogegen das Strychnin sich nicht mit Wasser zu verbinden scheint.

Das reine Brucin besteht nach Dumas und Pelletier (Schw. N. J. X. 1. 1824. S. 89. u. Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 117.) aus 75,04 Kohlenstoff; 6,52 Wasserstoff; 7,22 Stickstoff und 11,21 Sauerstoff. S. = 99,99. Das Brucin ist auch in den Strychnosarten vorgefunden worden, nämlich in der Ignazbohne und in der Nux vomica mit dem Strychnin vermischt, wogegen es in der indischen Angusturarinde rein enthalten ist.

Außer dem Brucin erhielten die Herren Pelletier und Caventou aus der falschen Angusturarinde: einen fetten nicht giftigen Stoff, viel Gummi, einen gelben in Wasser und Alkohol auflöslichen Stoff, Spuren von Zucker, Holzfaser.

Pelletier (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 219.) hat auch die rostfarbene Flechte, welche sich so häufig auf der falschen Angustura findet, noch besonders untersucht. Der merkwürdige rothgelbe Farbestoff dieser Flechte ist vegetabilischer Natur, in Alkohol, aber nicht in Wasser, löslich, verbindet sich mit der Salpetersäure nach Art einer basischen Substanz und nimmt dadurch eine gesättigt grüne Farbe an.

Die Wirkung der falschen Angusturarinde stimmt sehr mit der der Krähenaugen überein, so daß durch dieselbe unter heftigen Convulsionen der Tod herbeigeführt wird. Sehr lehrreiche Versuche hierüber hat Hr. Prof. Emmert in Tübingen angestellt. Das Brucin äußert diese Wirkungen noch in erhöhtem Maße, jedoch wirkt es nicht so heftig als Strychnin. Als Gegenmittel hat man zwar ein Galläpfelinfusum vorgeschlagen, mit welchem nämlich die giftige Substanz, das Brucin, eine unauflösliche Verbindung einzugehen scheint; doch wurde die tödtliche Wirkung nur aufgehalten, nicht aufgehoben. Essig und Kaffee sollen nach Emmert's Erfahrungen die giftige Wirkung noch vermehren.

Der Gebrauch der Angusturarinde geht nicht über das Jahr 1788 hinaus. Sie wurde zuerst als eine Chinarinde, welche in Peru nach der Landessprache Quina de Kalisaya heiße, in Deutschland bekannt; früher war sie aber schon in England unter dem Namen Angusturarinde gekannt und gebraucht Sie gilt zwar auch jetzt noch als ein nervenstärkendes, die Digestion beförderndes Mittel, und wird in der Diarrhöe und Anorexie gebraucht, doch ist ihr Gebrauch, wegen der zu besorgenden Vermischung mit der unächten Angusturarinde, und der zu befürchtenden üblen Folgen davon, sehr selten geworden, und im Oestreichischen und Badenschen gänzlich verboten.

Die Angusturarinde wird verordnet in Pulverform, 10 bis höchstens 20 Gran für Erwachsene, im Aufguß oder Decoct — eine halbe Unze zu 8 Unzen — am besten stets mit einem Zusatze von Zimmtpulvern oder Zimmtwas-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0103-8

ser, oder einer aromatischen Tinctur, um dem Ekel, den die Rinde leicht erregt, vorzubeugen, oder im Extract, 4 bis 8 Gran auf die Gabe, oder endlich in der Tinctur.

* Anime. Anime. Animeharz.

Dieses Harz wurde im 16. Jahrh. in Europa bekannt und ist häufig mit dem Copal verwechselt worden.

Als Mutterpflanze dieses Harzes hatte Hr. v. Martius in seiner Reisebeschreibung **Hymenaea Courbaril** bezeichnet, später hat aber derselbe diese Angabe dahin berichtiget, daß dies die Mutterpflanze desjenigen Harzes sey, welches die Engländer Anime nennen, nämlich des amerikanischen oder westindischen Copals, und daß das ächte Anime das Product einer Icicaart und dem Elemi sehr nahe verwandt sey (Richard's med. Botanik übersetzt von Kunze S. 1258.).

Das ächte Anime ist eine in dem Handel ziemlich seltene Substanz; man verkauft unter diesem Namen mehrere, eben so von der ächten Anime als unter sich verschiedene harzige Substanzen. Gewöhnlich kommt das Anime, auch Fluß- oder Courbarilharz genannt, in Thränen oder unregelmäßigen gelblichen oder röthlichen, mit einer Art grauen Staubes bedeckten Stücken vor (seltener in großen Kuchen); es ist auf dem Bruche glänzend, und von sehr gewürzhaftem Geruche.

Graf Domenico Paoli giebt (Trommsd. N. J. IX. 1. 1824. S. 40.) eine Beschreibung des orientalischen Animeharzes, welches nach Guibourt gar nicht mehr im Handel vorkommt. Es bildet unregelmäßige Massen von verschiedener Größe, welche von zwei verschiedenen Substanzen gebildet zu seyn scheinen, von denen die innere undurchsichtig, hellgelb oder blaßgelb ist, und den größten Theil bildet; die andere durchsichtig, mit einer gelben, sich mehr ins Röthliche ziehende Farbe erscheint. Spec. Gew. = 1,0272. Es fließt bei mäßiger Wärme; an der Lichtflamme schmilzt es und brennt mit einer glänzenden Flamme und unter Entwickelung eines harzigen sehr angenehmen Geruches. Es löst sich in Alkohol, besonders bei Mithülfe der Wärme ohne Rückstand auf, und bildet damit eine durchsichtige helle, strohgelbe Tinctur, die das Lackmus nicht bemerklich röthet.

Dieses Harz wurde durch die Portugiesen aus Afrika nach Europa gebracht. Welche Pflanze dasselbe hervorbringt, ist nicht zu bestimmen, auch nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit zu untersuchen.

Das amerikanische Anime bildet unförmliche Massen von der Größe einer Haselnuß bis zu der einer Wallnuß. Es ist mit einem weißen Mehle bedeckt, welches vielleicht von dem Reiben herkommt, welchem das Harz auf dem Transporte ausgesetzt ist. Es hat einen angenehmen Geruch, welchen es besonders beim Verbrennen verbreitet. Am Lichte entzündet es sich und brennt mit Flamme. Spec. Gew. = 1,0322. Es ist in seiner ganzen Masse durchsichtig. In der Farbe nähert es sich dem reinsten **Olibanum in lacrymis**; einige Stücke sind jedoch zum Theil opak. Einige Zeit im

Munde gehalten, wird es weich wie Mastix, dem es sich auch im Geschmacke nähert. Im Alkohol löst es sich zum Theil auf, mit Hinterlassung eines weißen, harzigen, blaßgelben, glutinösen, im Wasser oben schwimmenden und darin unlöslichen Rückstandes. Dieser Rückstand löst sich jedoch in Alkohol bei der Wärme, wenn er mit Terpenthin vereinigt wird.

Dieses ist nun das im Handel gewöhnlich vorkommende, fälschlich der **Hymenaea Courbaril** zugeschriebenen Animeharz, dessen Massen häufig sehr verschieden sind, sowohl in Hinsicht der Farbe, welche zwischen Braun, Gelb und Weiß variirt, als in Hinsicht der Durchsichtigkeit, indem manche Stücke, welche auch specifisch leichter sind, weiße oder gelbe, völlig undurchsichtige, im Bruche nicht harzige Massen bilden. Nicht selten findet man auch in den Stücken Bruchstücke einer Rinde, welche im Aeußern der Eichenrinde nicht unähnlich ist.

Die **Resina Anime americana brunea**, welches Harz sich auch, obwohl sehr selten, im Handel unter dem Namen **Gummi Anime** findet, kommt in größern und kleinern Bruchstücken und in Massen vor, und ist, wie das vorhergehende, mit einem weißlichen Pulver bestreut. In seiner Masse bemerkt man einige blasige Höhlen, wodurch man glauben könnte, daß es eine Schmelzung erlitten habe. Sein frischer Bruch ist unregelmäßig, wenig glänzend und etwas splittrig. In der Farbe gleicht es etwas dem **Bdellium** in Massen, von welchem es sich jedoch durch den weniger glänzenden Bruch und dadurch unterscheidet, daß es mehr braungrün ins Röthliche gefärbt ist. Es ist zerbrechlich, hat einen angenehmen Harzgeruch; zwischen den Zähnen zerbröckelt es, ehe es sich erweicht. Im Innern fast undurchsichtig, zeigt es sich nur in einigen Punkten an seinen Kanten durchsichtig. Spec. Gew. 1,0781. An der Flamme entzündet es sich, und verbrennt mit einem angenehmen Geruche. Auf Kohlen verbrennt es mit starkem Rauche und Geruche, welcher sich dem des Olibanums nähert. Mit Alkohol giebt es, wie das orientalische Anime, eine strohgelbe Tinctur von schwach bitterm Geschmacke.

Nach Dom. Paoli besteht das Anime aus: in Alkohol löslichem Harze 54,30; in Alkohol unlöslichem Unterharze, glutinös, blaßgelb, und von der Consistenz des Terpenthins, 42,80; flüchtigem Oele 2,40. Häufig kommt jetzt statt des Animeharzes eine Art Takamahaka im Handel vor.

Die Einwohner brauchen diese Substanz zum Leuchten als Fackeln und zum Ueberfirnissen ihrer Geräthe. Jedoch benutzt man es in Deutschland noch zu Räucherungen, und in Brasilien gegen langwierigen Husten und Lungenaffectionen, selbst bei Blutspucken und anfangender Lungensucht.

Interessante Nachrichten über Einsammlung und Benutzung des Anime in Brasilien findet man in Buchner's Repert. XVII. 2. S. 185.

Anisum. Das Oel. Anisöl.

Ein Destillat aus den Blumenstielchen und den Saamen der **Pimpinella Anisum L.** einer einjährigen orientalischen in Europa angebauten Pflanze.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0105-0

Ein ätherisches, gelbliches, stark riechendes Oel, von süßlichem Geschmacke, bei + 5 — 7 Grad eine krystallinische Masse darstellend. Spec. Gew. = 0,987.

Pimpinella Anisum L. Anis-Bibernell, der gemeine Anis.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Die Anispflanze kommt in Aegypten, in der Levante und in Italien wildwachsend vor, in Deutschland wird sie an mehreren Orten, vorzüglich in Thüringen, angebaut.

Die Wurzel ist einjährig, weiß, spindelförmig, faserig, und besitzt einen scharfen Geschmack, der mehreren Arten der Gattung **Pimpinella** eigen ist. Der Stengel ist aufrecht, fußhoch und höher, ästig, gestreift, behaart. Die Wurzelblätter stehen auf langen Blattstielen, sind nierenförmig-rundlich, glatt, am Rande tief gezahnt; die Stengelblätter stehen auf scheidenartigen Stielen und sind in drei Hauptlappen getheilt. Die weißen Blumendolden sind vor dem Aufblühen überhängend, später aufrecht, acht- bis zehnstrahlig, vielblüthig.

Die officinellen Saamen geben durch Destillation ein ätherisches Oel, und zwar geben nach Hagen 20 Pfund 6 Unzen, welches häufig an den Orten, wo man den Saamen baut, im Großen bereitet wird. Bei dem Einkaufe hat man darauf zu achten, daß es den reinen Anisgeruch habe, auch in der Wärme nicht einen Terpenthinölgeruch entwickele, und nicht mit einem fetten Oele verfälscht sey, welches man durch Vermischung mit 4 — 6 Theilen Alkohol entdeckt, welcher wohl das ätherische Anisöl, aber nicht das fette Baumöl oder Mandelöl auflöst; auch lassen solche fette Oele auf Papier in der Wärme einen Fettfleck zurück. Es soll auch bisweilen mit Wallrath verfälscht vorkommen. Schwieriger ist die Vermischung mit Alkohol zu entdecken. In den Versuchen von Tremlich (Buchn. Repert. XXIV. S. 419.) zeigte sich ein selbst destillirtes Anisöl noch bei + 11½° R. schön strahlig krystallisirt, und nur ein kleiner Theil befand sich in klarer fluider Gestalt; ein 15 Procent Alkohol enthaltendes Oel dagegen war durchaus klar und durchsichtig, ohne die geringste Ausscheidung von Alkohol bemerken zu lassen. Es ist daher der Temperaturgrad, bei welchem das Anisöl erstarrt, sehr zu berücksichtigen; auch bleibt ein stark mit Alkohol versetztes Oel, mit Wasser geschüttelt, darin aufgelöst, oder die Menge des ausgeschiedenen Oels ist gering.

Das Anisöl scheint seine Erstarrungsfähigkeit bei + 6 — 7 ° R. zu verlieren, wenn es längere Zeit der Sonne ausgesetzt gewesen, und schon Geoffroy bemerkte, daß es nach Verhältniß seines Alters immer schwerer krystallisire.

Buchner (Repert. XV. S. 63.) fand ein Anisöl bei — 5 ° noch flüssig, das augenblicklich erstarrte, sowie das Glas geöffnet wurde. Ein

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0106-6

ähnliches Verhalten bemerkt man bei einer in der Wärme bereiteten concentrirten Glaubersalzlösung, die in verschlossenen ruhig stehenden Gefäßen beim Erkalten nicht krystallisirt, aber augenblicklich beim Oeffnen des Stöpsels.

Von dem chemischen Verhalten des Anisöls wird im 2ten Theile die Rede seyn.

Anisum stellatum. Der Saamen. Sternanis.

Eine Art Illicium, auf den Philippinischen Inseln wachsend.

6—8 in einen Kreis gereihete, etwas zusammengedrückte, außen runzlige, innen glatte, einfächrige, am obern Rande aufspringende, einzelne zusammengedrückte glänzende Saamen enthaltende Kapseln, von angenehm gewürzhaftem Geruche und süßlichem Geschmacke.

Illicium anisatum L. Sternanis.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 6. Polygynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 14. Magnoliaceae.

Ein schöner immergrüner Baum, in China, Japan und der Tatarei einheimisch, wird etwa 8 Fuß hoch und hat glatte abstehende Aeste. Die Blätter sind abwechselnd, kurz gestielt, elliptisch, 3—4 Zoll lang und 1—1½ Zoll breit; die Blüthen gelblich, und bestehen aus einem abfallenden Kelche und einer vielblättrigen Krone.

Die Frucht, die erst zu Ende des 16. Jahrh. durch einen englischen Schiffer nach Europa gebracht wurde, ist sternförmig, und besteht aus 5—8 — 12 harten, dicken, holzigen, dunkelbraunen, zusammengewachsenen Kapseln, deren jede einen eiförmigen, röthlichen, glänzenden und zerbrechlichen Saamen einschließt, welcher wiederum einen weißlichen und öligen Kern enthält.

Alle Theile dieses Baumes verbreiten einen sehr angenehmen, gewürzhaften Geruch, der aber in den Früchten, dem bekannten Sternanis, am stärksten zu seyn scheint. Der Geruch derselben, (sowohl der Körner als der Kapseln) ist anisartig, aber milder und angenehmer, der Geschmack süß, scharf und aromatisch, dem Anis und Fenchel sehr ähnlich; beide sind größtentheils dem ätherischen Oele, welches die Früchte enthalten, zuzuschreiben. Meißner (Alman. 1818. S. 1. u. 1819. S. 1.) hat das Gehäuse und die Saamen des Sternanis besonders untersucht. 500 Gran vollkommener Früchte gaben ihm 392 Gr. Saamenkapseln und 108 Gr. Saamen, die jedoch schon etwas vertrocknet waren. 500 Gran der Schalen enthalten: ätherisches Oel 26½ Gran; Benzoësäure 1; grünes fettes Oel 24; Aepfelsäure, sauren äpfelsauren Kalk und Extractivstoff 42; eigenthümliches (in Aether unauflösliches) Harz 53½; gerbenden Extractivstoff 16; Extractivstoff 10½; Gummi 30; gummösen Extractivstoff 38; Stärkemehl 99; Faser 32; Feuchtigkeit 42. S. = 504½ Gran.

Das ätherische Oel ist als der vorzüglich wirksame Bestandtheil anzuse-

hen; es ist wasserhell, nach einigen Wochen wird es gelblich, von angenehmen, süßlich anisartigem Geruche und Geschmacke, dünnflüssig, noch nicht bei + 2 ° R. gerinnend, auf dem Wasser schwimmend, ziemlich flüchtig. Durch rauchende Salpetersäure wird es unter Aufschäumen und Erhitzung zu einem schmierigen Harze; mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt es sich, und bildet damit eine carmoisinrothe harzige Materie, die in Aether und Kalilauge völlig auflöslich ist, durch Alkohol weiß wird, ohne daß sich der Alkohol selbst färbt.

500 Gran Saamenkerne enthalten: ätherisches Oel 9 Gran; fettes Oel, in Aether ziemlich leicht, in Alkohol nur schwer löslich, 89½; talgartiges fettes Oel, in Aether und Alkohol leicht löslich, 8; Aepfelsäure, sauren äpfelsauren Kalk mit Extractivstoff, 24; eigenthümliches, in Aether unauflösliches Harz 13; Extractivstoff 21; bittern Extractivstoff 10½; gummösen Extractivstoff 115; Gummi 6; Amylum 32; kleesaure Kalkerde 2; Faser 147; Feuchtigkeit 21. S. = 498 Gr.

Die Asche des Sternanis enthielt, außer den gewöhnlich vorkommenden Salzen, Kieselerde, Eisen-, Manganoxyd und Spuren von Kupferoxyd.

Der Sternanis wird vorzüglich als Zusatz zu Brustthee, bisweilen auch in Pulverform verordnet; er ist ein sehr reizendes Mittel.

Anisum vulgare. Der Saamen. Anis.

Pimpinella Anisum Linn.

Die beinahe kugelrunden, gestreiften, grünlichen, mit sehr kurzen feinen Härchen besetzten Früchte, von süßlichem gewürzhaftem Geschmacke.

Der eigentlich wirksame Bestandtheil des Anissaamens ist, wie bei allen Saamen der Doldengewächse, das ätherische Oel, welches seinen Sitz in der Schale des Saamens, und vorzüglich in den Schläuchen hat, von welchen die erhabenen Streifen derselben herrühren. Der innere Kern des Saamens enthält ein fettes Oel, das man auspressen kann. Wird es aus den ganzen Saamen ausgepreßt, so enthält es ätherisches Oel beigemischt, und hat davon Geruch und Geschmack; es ist grün. Weingeist und Wasser nehmen die extractiven und balsamischen Theile der Saamen auf. Brandes und Reimann (Buchn. Repert. XXIV. S. 337.) fanden in 1000 Th. des Anissaamens folgende Bestandtheile: Stearine mit Chlorophyll verbunden 1,25; Harz mit Spuren von äpfelsaurem Kalk und äpfelsaurem Kali 1,75; in Alkohol leicht lösliches fettes Oel 33,75; Halbharz 4,00; essigs. und äpfels. Kalk 4,00; salzs., äpfels. Kalk, freie Aepfelsäure und Extractivstoff 53,00; Phyteumacolla 78,50; Schleimzucker mit Aepfelsäure 6,50; Gummi mit äpfels., phosphors. und schwefels. Kalk 65,00; saures äpfels. Kali 10,00; phosphors. Kalk 13,50; äpfels. Kalk 1,25; Extractivstoff 5,00; Anisulmin 86,00; Gummoin 29,00; Faser 328,50; anorganische Salze mit Kieselerde und Eisenoxyd 35,50; ätherisches Oel 30,00; Wasser 230,00. S. = 1016,50.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0108-7

Hinsichtlich der arzneilichen Wirksamkeit möchte nach den Herrn Verf. besonders außer dem ätherischen Oele der Schleimzucker, der Extractivstoff und der reiche Gehalt an Salzen in Betracht zu ziehen seyn.

Das Anisulmin, welches, so wie das Gummoin, durch Aetzkali ausgezogen worden, wird für eine eigenthümliche Substanz erklärt, von der noch ungewiß ist, ob sie dem reinen Ulmin, oder einer Art des Klebers näher stehe.

Verwerflich sind die mulstrig gewordenen, schimmligen, schwarzen, mit zu vieler Spreu, auch mit unreif eingesammelten Körnern vermischten Saamen.

Der Anis wird zu Brustspecies, auch in Pulverform verordnet.

Aqua communis. Gemeines Wasser.

Filtrirtes Regenwasser ist als das reinste vorzuziehen. Wenn es aber fehlt, so kann das einige Zeit hindurch abgesetzte und filtrirte Flußwasser substituirt werden, wenn es nicht eine zu große Menge fremdartiger Bestandtheile enthält. Das sehr unreine Quellwasser darf nicht angewendet werden, wenn es nicht vorgeschrieben worden ist.

Das Fluß- noch mehr aber das Quell- oder Brunnenwasser enthält sehr viele fremdartige Theile, und zwar vorzüglich Kohlensäure, kohlensauren und schwefelsauren Kalk, welche Bestandtheile sehr oft auf die zusammengesetzten Medicamente, namentlich Salze, zersetzend einwirken. Das Flußwasser enthält bedeutend weniger von den Kalksalzen, als das Brunnenwasser, welches letztere durch dieselben selbst zu vielen wirthschaftlichen und technischen Zwecken unbrauchbar gemacht wird, z. B. zur Reinigung der Wäsche, indem die Seife durch die Kalksalze zersetzt wird, zum Bierbrauen, Branntweinbrennen, zum Kochen, vorzüglich der Hülsenfrüchte, u. s. w. Wird das Brunnenwasser aufgekocht, so verflüchtigt sich die Kohlensäure, in welcher großentheils die Kalkerde aufgelöst sich befindet; diese fällt zu Boden, und bildet nebst einem zugleich niederfallenden Antheile Gyps den sogenannten Pfannenstein, welcher das Innere der Kochgeschirre, als der Theekessel ꝛc. mit einer steinartigen Kruste überzieht. Durch Aufkochen wird demnach das Quellwasser zwar von einigen Bestandtheilen befreit, doch behält es deren noch genug an auflöslichen schwefelsauren, salzsauren, bisweilen auch salpetersauren Salzen, so daß es nicht anders, als wenn es verlangt wird, angewendet werden darf. Auch das Flußwasser verliert dadurch, daß es einige Zeit an die Luft hingestellt wird, seinen geringen Gehalt an Kohlensäure, und damit die wenige darin aufgelöste Kalkerde, so daß es sich dann dem fast reinen Regen- oder Schneewasser nähert.

Argentum. Silber.

Wird aus den Silbererzen in Bergwerkshütten erhalten.

Ein weißes dehnbares Metall, spec. Gew. 10,5; wird auf trock-

nem Wege nicht oxydirt; in Salpetersäure aufgelöst bildet es mit zugemischter Salzsäure oder salzsauren Salzen das salzsaure Silber, einen weißen, käsigen Niederschlag, der am Lichte purpurn, zuletzt schwarz wird, in Wasser gar nicht, in Aetzammoniakflüssigkeit leicht auflöslich ist. Man nehme das sogenannte Capellensilber, welches bisweilen nur höchst wenig Blei enthält, und verwerfe dasjenige, welches gar zu sehr mit Kupfer verunreinigt im Handel vorkommt, so daß es in Salpetersäure aufgelöst eine bläuliche Farbe zeigt.

Das Silber ist schon seit den ältesten Zeiten bekannt. Es kommt metallisch theils ziemlich rein und krystallisirt, oder in metallischen Vegetationen, theils in Verbindung mit Gold, Antimonium, Arsenik oder Queckſilber, am gewöhnlichsten aber als Schwefelsilber, entweder allein, oder mit andern Schwefelmetallen, als Kupfer, Blei, Antimonium gemischt, seltner als Chlorsilber vor.

Man gewinnt es aus seinen Erzen nach ihrer verschiedenen Zusammensetzung. Das gewöhnlichste Silbererz ist Schwefelblei (Bleiglanz), welches etwas eingemengtes Schwefelsilber enthält. Die Quantität des Silbers geht selten über 16 Loth auf den Centner, und der gewöhnliche Gehalt ist zwischen 2 und 6 Loth.

Um das Silber aus dem Bleiglanz zu erhalten, wird die Bergart gepocht, und das Leichtere, welches das Steinpulver ist, wird vom schwerern Bleierz abgespühlt. Dieses wird darauf getrocknet, in eigenen Oefen geröstet, so daß der Schwefel wegbrennt, die geröstete Masse wird dann mit Kohle niedergeschmolzen. Man erhält mit der Schlacke silberhaltiges Blei, welches sich am Boden des Ofens sammelt. Dieses Blei wird nachher auf einem sehr platten Ofen, welcher Treibheerd genannt wird, die Form einer großen flachen Schüssel hat, und von ausgelaugter Holzasche gemacht wird, geschmolzen. Nachdem das Metall in glühenden Fluß gekommen ist, läßt man Luft mit zwei Blasebälgen über die Oberfläche des Metalls hinstreichen, wodurch das Blei oxydirt wird. Es bildet sich erst eine Rinde von einem schwerflüssigen Oxyd, die 2 bis 3mal abgezogen wird, nachher aber entsteht flüssiges Bleioxyd, Glätte, die man an der Seite des Ofens durch eine angebrachte Vertiefung abfließen läßt. Diese ist den Blasebälgen gegenüber gestellt; damit das Bleioxyd von der Luft dahin getrieben werde. Ein Arbeiter ist dabei immer beschäftigt, das erstarrende Bleioxyd aus dem Wege zu räumen, und dem geschmolzenen freien Ablauf zu verschaffen, weil die Operation abgebrochen wird, wenn die Oberfläche des Metalls sich bedeckt.

Der Zweck dieses Verfahrens ist, die oxydationsfähigeren Metalle, gewöhnlich ein wenig Kupfer, Eisen und Zink, mit dem Blei zugleich wegzubrennen, worauf endlich das Silber beinahe rein zurückbleibt. Es muß jedoch noch einmal in einem dem vorhergehenden ähnlichen, aber kleineren Ofen,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0110-7

Test genannt, aus Laubholzasche, umgeschmolzen werden, wo stärkere Hitze, wegen Schwerflüssigkeit des Silbers, gegeben und alle sich bildende Bleiglätte, die zugleich die letzten Antheile der das Silber verunreinigenden, jetzt gleichfalls oxydirten Metalle in sich aufnimmt, jetzt vom Test absorbirt wird. Am Ende der Operation erhält die Masse an der Oberfläche die Farben des Regenbogens, und wird darauf mit einem Mal klar und spiegelglänzend. Man nennt dies das Blicken des Silbers, und es zeigt an, daß jetzt alles Blei verbrannt und das Silber allein übrig ist. Diese Methode wird sehr häufig benutzt, um dem im Handel vorkommenden unreinen Silber die mit ihm verbundenen Metalle, durch das Abtreiben mit Blei auf einer Capelle, zu entziehen, und das auf diese Weise gereinigte Silber führt den Namen Capellensilber.

Wenn das Silber nicht in Verbindung mit Bleiglanz vorkommt, so bedient man sich eines andern Processes, der Amalgamation. Diese Operation beruht darauf, daß man das Schwefelkies haltende, oder, wenn dies nicht der Fall ist, absichtlich damit vermischte Erz zu feinem Pulver verpocht, und mit 8 — 9 Procent Kochsalz mischt. Dieses Gemenge wird unter Umrühren in einem Reverberirofen geröstet. Es bildet sich dabei aus einem Theile Schwefel und dem Sauerstoffe der Luft Schwefelsäure, die das Kochsalz zersetzt, dessen Chlor sich theils mit dem Silber zu Chlorsilber verbindet, theils entweicht. Die wieder zu feinem Mehle gemahlene Masse wird in Tonnen mit Wasser gemischt und mit Eisenstücken und Quecksilber versetzt. Die Tonnen werden entweder durch ein Wasserrad auf Axen umgetrieben, oder man läßt eine Art von Umrührer in ihnen umhertreiben. Während des Umschüttelns wird das Chlorsilber vom Eisen zersetzt, und das abgeschiedene Silber vom Quecksilber aufgenommen, mit welchem es ein flüssiges Gemenge, Amalgam genannt, bildet. Das Quecksilber wird aus den Tonnen gezapft, die Masse durch ein dünnes Fell gepreßt, worin eine feste Verbindung von Silber und Quecksilber zurückbleibt. Diese wird in eigenen Anstalten einer absteigenden Destillation unterworfen, wobei das Quecksilber in Wasser aufgefangen wird, und das Silber als ein poröser Kuchen zurückbleibt.

Dieses Silber nennt man Bergfein; es ist auch ziemlich rein, jedoch kann es nicht chemisch rein genannt werden. Um sich dieses zu verschaffen, löse man das Silber in reiner Salpetersäure auf, schlage mit warmer Kochsalzlösung nieder, wasche den Niederschlag — Chlorsilber, Hornsilber — aus und trockne ihn. Um hieraus das Silber zu erhalten, schmelzt man in einem Tiegel doppelt soviel Potasche, und wenn diese flüssig geworden ist, streut man nach und nach ein wenig vom Chlorsilber ein, welches dann unter Entwickelung von Sauerstoffgas und kohlensaurem Gas reducirt wird. Nachdem alles Silbersalz eingelegt ist, wird die Hitze hinreichend verstärkt, um das Silber zu schmelzen, welches sich nach dem Erkalten der Masse in einem Klumpen am Boden gesammelt hat. Wenn man das Silbersalz mit der Potasche unmittelbar mengt, und sie darauf mit einander zusammen-

schmelzt, so entsteht im Gemenge während der Zersetzung ein Aufbrausen, und man verliert dadurch viel Silber, daß es an den Wänden des Tiegels umhergespritzt wird; überdies kann auch die geschmolzene Potasche leicht über den Rand des Tiegels steigen.

Langsamer kann die Reduction auch durch die einfache galvanische Kette bewirkt werden, indem man einen unten mit einer Blase verschlossenen, oben offnen Cylinder, welcher in Wasser vertheiltes Hornsilber enthält, auf eine unter gesäuertem Wasser befindliche Zinkplatte stellt, von welcher ein Silber- oder Platindraht in das Wasser des Cylinders geleitet wird.

Das Silber hat von allen Metallen die weißeste Farbe, ein vollkommen dichtes Gefüge und starken metallischen Glanz. Es ist härter als Gold, aber weicher als Kupfer, und nach dem Golde das geschmeidigste aller Metalle; ein Gran Silber kann zu einem Drathe von 400 Fuß Länge ausgezogen werden. Das Silber schmilzt bei einer niedrigern Temperatur als Gold und Kupfer, ungefähr bei 540 ° F. Bei einer sehr hohen Temperatur, z. B. im Focus des Brennspiegels, geräth es ins Kochen und verfliegt. Beim langsamen Erkalten krystallisirt es in vierseitigen Pyramiden oder Oktaëdern. Bei der Reduction in der galvanischen Säule erhält man es zuweilen in Schuppen, zuweilen in Würfeln krystallisirt. Spec. Gew. zwischen 10,474 bis 10,542.

Es hat zum Sauerstoff eine schwache Verwandtschaft, und wird für sich bei keiner Temperatur, weder von der Luft noch vom Wasser oxydirt. Wir kennen bis jetzt nur 2 Oxydationsstufen (da das Suboxyd Faraday's aus 94,875 Silber und 5,125 Sauerstoff, dadurch erhalten, daß man eine Auflösung des Silberoxyds in Ammoniak an die Luft aussetzt, noch als problematisch anzusehen ist), nämlich Oxyd und Hyperoxyd. Das Oxyd erhält man, wenn das Silber in Salpetersäure aufgelöst, und die Auflösung mit kaustischem Kali oder mit Kalkwasser gefällt wird. Es hat eine graubraune Farbe, und wird beim Trocknen dunkel. Stellt man dieses Oxyd ins Sonnenlicht, so giebt es eine Quantität Sauerstoff in Gasform ab, und bildet ein schwarzes Pulver. Es ist noch nicht untersucht, ob dieses ein Suboxyd, oder ob es reducirtes metallisches Silber sey. Mit dem kaustischen Ammoniak verbindet es sich zu einem, wegen seiner heftig explodirenden Eigenschaft, sehr gefährlichen Körper, Knallsilber genannt. Dieses Oxyd ist die Basis der Silbersalze, und besteht aus 93,4 Silber und 6,89 Sauerstoff.

Das Hyperoxyd erhält man von dem positiven Leiter, wenn die elektrische Säule durch eine schwache Silberauflösung entladen wird; es ist nur in chemischer Rücksicht zu bemerken.

Das beste Auflösungsmittel für das Silber ist die Salpetersäure. Concentrirte Schwefelsäure löst es in der Hitze auf, und von concentrirter Chlorwasserstoffsäure wird es sehr unbedeutend angegriffen, wobei sich Chlorsilber bildet, und Wasserstoffgas entwickelt. Diese Verbindung des Silbers mit Chlor ist als Hornsilber bekannt, und besteht aus 75,34 Silber und 24,66 Chlor. Die Schwärzung desselben am Lichte beruht auf einer durch die Sonnenstrahlen eingeleiteten Zersetzung.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0112-8

Mit den Metallen bildet das Silber die Silberlegirungen, von denen die mit Kupfer unser gewöhnliches Arbeitsilber giebt. Man versetzt nämlich das Silber deswegen mit Kupfer, weil das Silber dadurch härter wird, und sich weniger leicht abnutzt, ohne dadurch merkbar an Geschmeidigkeit zu verlieren. Das Arbeitsilber hat gemeiniglich eine weniger weiße Farbe, als das reine; durch einen größern Zusatz von Kupfer wird das Silber röthlich. Man nennt das Silber 14 löthig, wenn in 16 Loth Arbeitsilber sich 14 Loth Silber und 2 Loth Kupfer befinden, 12 löthig, wenn es nur 12 Loth Silber in 16 Loth enthält, u. s. w., und dieses letztere wird gewöhnlich bei uns verarbeitet.

Zur vorläufigen Prüfung des vorkommenden Silbers bedient man sich der Probirnadeln und des Probirsteins. Jene werden aus Silber und Kupfer gemacht, und enthalten 16- bis einlöthiges Silber; dieser ist eine feine schwarze Trappart, die man glatt geschliffen hat, und die, wenn man darauf metallische Striche gemacht, durch Waschen mit Salpetersäure davon gereinigt wird. Auf diesen Stein streicht man mit dem Silber, welches geprüft werden soll, so daß man einen kleinen metallischen Strich bekommt, und neben diesem macht man nachher Striche mit den Probirnadeln, welche dem Silber an Löthigkeit zunächst zu liegen scheinen, und schließt dann von dem Striche der Probirnadel, die mit der Farbe des Strichs, den man mit dem zu prüfenden Silber gemacht hatte, am nächsten überein kam, auf den Silbergehalt desselben. Zur genauen Prüfung muß die Legirung mit Blei in bestimmten Verhältnissen, so daß bei einem geringern Verhältnisse Kupfer mehr Blei erfodert wird, zusammengeschmolzen werden, welches das Kupfer zur Schlacke macht, und das Silber rein zurückläßt, welches gewogen den Silbergehalt angiebt, es ist aber hiezu viel Uebung erfoderlich.

Das Silber dient in der Medicin zur Bereitung des Höllensteins, und wird auch als Blattsilber gebraucht; es giebt aber auch dem Chemiker unentbehrliche Geräthe, als Pfannen, Tiegel u. s. w. Das Silber widersteht nämlich bei der Glühhitze besser, als andere Metalle, das Gold ausgenommen, der Einwirkung von Salpeter und kaustischen Alkalien. Zu solchen chemischen Operationen, die das Schmelzen mit irgend einem dieser Alkalien erfodern, bedient man sich daher der Silbertiegel, die aus chemisch reinem Silber verfertigt sind, weil Platintiegel, die sonst den Säuren so gut widerstehen, und von der strengsten Hitze nicht leiden, von kaustischem Alkali aufgelöst und zerstört werden.

Argentum foliatum. Blattsilber.

Ein Präparat technischer Werkstätten.

Das in die dünnsten Blättchen gebrachte Silber. Es sey von Kupfer so frei, als es zu erhalten möglich ist.

Gewöhnlich hat dieses Blattsilber, welches zum Versilbern der Pillen gebraucht wird, noch einen kleinen Rückhalt von Kupfer, daher die Auflö-

fung in Salpeterfäure auch nicht vollkommen weiß ist, wie sie seyn sollte, sondern einen kleinen Stich ins Bläuliche zeigt. Sollte die blaue Farbe der Auflösung einen bedeutendern Kupfergehalt anzeigen, so ist ein solches Blattsilber zu dem erwähnten Zwecke durchaus unbrauchbar.

* Aristolochia fabacea s. cava. Die Wurzel. Hohlwurzel.

Corydalis tuberosa. Decand. Runde Hohlwurzel, dichte Lerchenwurz. Fumaria bulbosa Linn.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 1. Hexandria.

Juss. Cl. XIII. Ord. 2. Papaveraceae.

Ist ein niedriges Pflänzchen, welches auch bei uns an schattigen Orten gefunden wird. Die Blätter sind glatt, stehen wechselsweise auf Stielen und sehen dem Erdrauche ähnlich. Sie sind in 3 Blättchen getheilt, deren jedes seinen besondern Stiel hat, und wieder in etliche ungleiche Lappen getrennt ist. Die Blumen stehen in einer Aehre, sind irregulär, spornförmig, hellroth oder ganz weiß, und zwischen jeder finden besonders gestaltete grüne Blattansätze von der Länge der Blumen statt. Die knollige Wurzel, welche von den gemeinen Leuten Bäumchenhohlwurzel genannt wird, ist rund, manchmal hohl, inwendig weiß, bitter, mit einem gelben Häutchen bedeckt und kommt von sehr verschiedener Größe vor. Sie ist dem Wurmfraß sehr unterworfen.

Wackenroder (Kastn. Archiv VIII, 4. 1826. S. 417.) hat bei Zerlegung dieser Wurzel ein Alkaloid gefunden und es Corydalin genannt. Dieses kann auf verschiedene Weise erhalten werden. Man zieht das geistige Extract der Wurzel mit Wasser aus, fällt diesen Auszug mit basischem essigsaurem Blei, jedoch nicht im Ueberschusse, weil sonst auch das Alkaloid gefällt wird.

Am vortheilhaftesten aber wird die gröblich pulverisirte Wurzel einige Tage hindurch mit Wasser macerirt, und die gewonnene, säuerlich reagirende, dunkelgrüne Flüssigkeit mit kohlensaurem Natrum bis zu einer schwach alkalischen Reaction versetzt, und von dem copiösen hellgrauen Niederschlage getrennt. Die Maceration wird mit Wasser, welches mit Schwefelsäure angesäuert worden, erneuert, und der Auszug wie oben gefällt. Der letzte Niederschlag ist dunkler und daher für sich zu reinigen. Die Niederschläge werden mit Alkohol digerirt und von den Tincturen der Weingeist abgezogen; aus der gelblichgrünen dunklen Flüssigkeit schießen kleine ungefärbte Krystalle des Corydalins an, der größte Theil bleibt aber in der Auflösung. Diese wird verdampft, in verdünnter Schwefelsäure wieder aufgelöst, wobei sich ein grüner harziger Stoff ausscheidet, und dann wird das Corydalin durch Kohlensäure oder besser ätzende Alkalien gefällt.

Das Corydalin, entweder in ungefärbten prismatischen Krystallen oder feinschuppig, ist ohne Geruch, und wegen seiner geringen Löslichkeit in Wasser ohne Geschmack. Die Salze sind aber von ausnehmender Bitterkeit,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0114-0

welche sich der des Chinins anschließt, aber sich dem Quassiabitter nähert. In Alkohol ist es auflöslich, die Auflösung reagirt alkalisch.

Nach dieser Analyse enthalten 100 Th. Wurzel: Wasser 78,30; vegetabilisches Eiweiß 0,40; äpfelsauren Kalk, Schleim und etwas schwefelsaures Kali 2,00; Corydalin mit Aepfelsäure, nebst salzsaurem Kali und Schleimzucker 3,86; Amylum 4,58; grünes Harz und weiches widerlich schmeckendes Fett 0,18; Holzfaser 10,68. Im trocknen Zustande: Wasser 0; Eiweiß 1,84; äpfelsauren Kalk u. s. w. 9,21; Corydalin ꝛc. 17,78; Amylum 21,10; Harz 0,87; Holzfaser 49,20.

* Aristolochia longa. Die Wurzel. Lange Osterluzeiwurzel.

Linn. Cl. XX. Gynandria. Ord. 2. Hexandria.
Juss. Cl. V. Ord. Aristolochiae.

Diese Pflanze wächst in Spanien, Italien, Oestreich und dem südlichen Frankreich wild. Die Wurzel ist spindelförmig, runzlig, bisweilen von der Länge eines Schuhes und der Dicke eines Daumens. Die Blätter sind nierenförmig, stumpf, gestielt.

Die Wurzel wird noch bisweilen, jedoch selten, verlangt; sie ist außen hellbraun, der Länge nach gefurcht, innerlich hellgelb, hat einen geringen Geruch und ekelhaft bitterlichen Geschmack.

* Aristolochia rotunda. Die Wurzel. Runde Osterluzeiwurzel.

Classe und Ordnung wie bei der vorigen.

Die runde Osterluzei hat mit der vorigen dasselbe Vaterland. Die Wurzel ist knollig, rund, ziemlich dick, schwer, höckerig, ungefähr von der Größe einer Wallnuß, außen grau oder braun, glatt oder zuweilen scharf gerunzelt, innen gelblich, von unangenehmen Geruche, und einem besondern scharfen und zugleich bittern Geschmacke.

Armoracia seu Raphanus rusticanus. Die Wurzel. Meerrettig.

Cochlearia Armoracia Linn. Eine perennirende in Deutschland einheimische, häufig angebaute Pflanze.

Eine sehr lange, einfache, walzenförmige, weißliche, fleischige, saftige Wurzel. Sie werde nur im frischen Zustande angewandt, und im Herbste gesammelt.

Cochlearia Armoracia L. Meerrettig: Löffelkraut.
Linn. Cl. XV. Tetradynamia. Ord. 1. Siliculosa.
Juss. Cl. XIII. Ord. 3. Cruciferae.

Der Meerrettig kommt durch ganz Europa an feuchten Stellen, an Gräben,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0115-5

vor; doch wird er in Deutschland seltner wild gefunden, aber sehr häufig der Wurzel wegen angebaut.

Die Wurzel ist kriechend, ausdauernd, weißlich, stark, fleischig, von scharfem Geschmacke, außen gelblich, innen weiß, durch sie wird die Pflanze sehr leicht und stark vermehrt, so daß sie, einmal angebaut, fast nicht wieder ausgerottet werden kann.

Aus dieser Wurzel kommen $1\frac{1}{2}$ — 3 Fuß lange, langgestielte, allmälig spitzer zugehende, hellgrüne und am Rande eingekerbte Wurzelblätter hervor, zwischen denen mehrere runde gestreifte oder gefurchte Stengel aufsteigen, an welchen sich abwechselnde, schmale, lancettförmige Blätter befinden. Die Blüthen stehen in langen Trauben an der Spitze des Stengels. Die Kelchblättchen sind blaßgrün, die Blumenblättchen weiß.

Die frische Wurzel besitzt den scharfen flüchtigen Stoff, der allen Cruciferen, besonders aber dieser Gattung **Cochlearia** eigenthümlich ist, in sehr großer Menge, so daß sie die Haut stark röthet, und deshalb häufig den Sinapismen zugesetzt wird. Sie muß frisch unter feuchtem Sande im Keller aufbewahrt werden.

Beim Destilliren mit Wasser wird eine milchige Flüssigkeit erhalten, von dem durchdringenden Geruche des Meerrettigs. Einhoff (Journ. für Chemie, Physik ꝛc. V. S. 365.) erhielt von 2 Pfund Wurzeln 10 Tropfen eines schweren ätherischen Oels von hellgelber Farbe und der Consistenz des Zimmtöls. Der Geruch desselben war unerträglich nach Meerrettig, sein Geschmack im Anfange süßlich, hinterließ aber eine äußerst brennende Schärfe. Das destillirte Wasser reagirte weder sauer noch alkalisch, wurde auch sonst von den gewöhnlichen Reagentien nicht verändert, außer von dem salpetersauren Silber und essigsauren Blei, welche schwarze und braune Niederschläge hervorbrachten. Dieser Erfolg deutet auf Schwefelgehalt, welcher durch Gutret (Crell's Annalen 92. II. S. 173. 243. 379.) außer allen Zweifel gesetzt worden ist. Silber in abgezogenes Meerrettigwasser gebracht, wird ganz schwarz, das Destillat klärt sich auf, während zugleich ein gelblicher Bodensatz sich absetzt, der mit bläulicher Flamme brennt. (Vergl. Sinapis. Der Saamen.)

Das destillirte Wasser, so wie die Auflösung des Oels in Wasser verlieren an freier Luft ihren stechenden Geruch bald, und behalten bloß einen Geruch nach Steckrüben. In verschlossenen Gefäßen bleibt der Geruch unverändert. Einhoff hatte einen Theil des milchigen Wassers an einem kühlen Orte stehen lassen, es waren noch einige Tropfen Oel darin zurückgeblieben; diese waren jetzt verschwunden, und es hatten sich in der Flüssigkeit kleine silberähnlich glänzende Spießchen gebildet, die auch getrocknet den Geruch nach Meerrettig behielten, einen Reiz im Schlunde erregten, und auf einem Löffel über einer Lichtflamme gehalten, flüssig wurden, zuerst einen starken Geruch nach Meerrettig, dann nach Pfeffermünzöl und endlich nach Campher ausstießen, und zuletzt ganz verflüchtigt wurden.

Nach Gutret's Versuchen kommt dem flüchtigen Princip die Eigen-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0116-1

schaft zu, das Silber zu schwärzen, denn so wie es diese Verbindung einging, verschwand der eigenthümliche Meerrettiggeruch, und ein Steckrübengeruch trat an die Stelle. Den Schwefel will er durch folgendes Verfahren aus dem Meerrettig abgeschieden haben: frischer und getrockneter Meerrettig wird in Scheiben geschnitten, einen Finger hoch mit Schwefeläther übergossen, 4—6 Tage in der Wärme stehen gelassen, das Gefäß dann geöffnet, wonach dem Verdunsten des Aethers auf der Oberfläche der Wurzel Schwefelkrystalle sich abgesetzt hatten. (Auch Baumé sah in einem stark gesättigten geistigen Auszuge Schwefelkrystalle anschießen.)

Der ausgepreßte Saft des Meerrettigs ist braun und etwas trübe; er schmeckt scharf und dabei zuckersüß. Lackmuspapier wird geröthet. Die übrige Wurzel gab beim Auswaschen mit vielem destillirten Wasser ein graues Satzmehl. Aus dem Aussüßwasser schied sich beim Erwärmen Eiweißstoff ab. Beim Abrauchen des Saftes setzte sich auf der Oberfläche und inwendig am Gefäße eine leichte graue Rinde ab. Diese wurde abgenommen, und am Ende ein schwärzlich braunes, klares, sehr klebriges Extract erhalten, welches durch Ausziehen mit Weingeist zerlegt wurde in einen gummigen Extractivstoff, der säuerlich wie eingekochte Fruchtsäfte schmeckte, und leicht austrocknete; in Zuckerstoff und bittern Extractivstoff, welche von Weingeist ausgezogen wurden; in einen Antheil Harz, das durch Aether ausgeschieden war. Was sich beim Abrauchen des Saftes als graue Rinde abgesetzt hatte, war essigsaurer Kalk. Außerdem erhielt der Verf. schwefelsauren Kalk; die freie Säure war Essigsäure.

Vier Pfund frischer Meerrettig enthalten hiernach: Feuchtigkeit 3 Pf. 4 Lth.; ätherisches Oel 20 Gr.; Eiweißstoff 31⅓ Gr.; Stärkemehl 3 Lth. 20 Gr.; gummigen Extractivstoff 4 Lth. 3 Qt.; Seifenstoff und Zuckerstoff 3 Lth. 2 Qt.; bitteres Harz 6⅔ Gr.; Faserstoff 16 Lth.; essigsauren Kalk, schwefels. Kalk und Essigsäure 1 Qt. 41⅓ Gr.

Der Meerrettig ist ein kräftiges Antiscorbuticum; am häufigsten aber ist seine Anwendung als Zusatz zu Senfpflastern.

Arnica. Die Blumen. Wohlverleihblumen.

Arnica montana L. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Zusammengesetzte, strahlige, goldgelbe Blumen, mit einem Kelche aus linienförmigen gleichen Blättchen von der Länge der Scheibe, mit Strahlenblümchen, die länger als die doppelte Scheibe, 2 Lin. breit und dreizähnig sind, mit sitzenden, etwas scharfen zerbrechlichen Federchen, von scharf bitterlichem Geschmacke, mit dem Fingern gerieben Niesen erregend. Sie müssen nicht mit den Blumen der **Inula britannica** vermengt werden, deren Strahlenblümchen schmäler sind. Die frisch entwickelten sind einzusammeln.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0117-7

Arnica montana L. Der wahre Wohlverleih.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.

Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese Pflanze wächst in bergigen Gegenden fast durch ganz Europa, auf den östreichischen, schweizerischen, schwedischen und lappländischen Alpen.

Die Wurzel besteht aus einem einige Zoll langen, braunen, etwa federkieldicken Wurzelstocke (Rhizoma). Der Stengel ist 1½ Fuß hoch, einfach oder mit zwei, seltener vier gegenüberstehenden, einblüthigen Aesten versehen; er ist rund, zottig und etwas klebrig. Die Blätter stehen zu sechs an der Wurzel, wovon die drei untersten kleiner als die obern sind; am Stengel finden sich zwei oder zuweilen vier gegenüberstehende lancettförmige kleinere Blättchen.

Die großen goldgelben Blüthen stehen einzeln und nickend an der Spitze des Stengels und der Zweige, wo diese vorhanden sind. Der gemeinschaftliche Kelch (periclinium) besteht aus mehreren dicht in einander liegenden lancettförmigen behaarten Blättchen von gleicher Länge. Die Blümchen im Strahle sind ungefähr einen Zoll lang, gestreift und an der Spitze dreizähnig; die gewölbte Scheibe ist etwas länger als der Kelch, und besteht aus röhrigen meistens dreispaltigen Blüthchen. Diese sind regelmäßig Zwitter, die Halbblüthchen des Umkreises weiblich.

Die Blumen haben frisch einen etwas widrigen, getrocknet aber, besonders zwischen den Fingern geriehen, einen schwachen balsamischen Geruch und erregen durch äußerst feine seidenartige Theilchen, die sich in die Nase ziehen, und einen starken Reiz daselbst hervorbringen, Niesen; ihr Geschmack ist süßlich bitter, dabei scharf. Sie kommen in den Apotheken gewöhnlich von den Kelchen befreit vor.

Außer der angeführten Verwechselung mit den Blumen der **Inula britannica**, werden auch wohl die Blumen der **Inula dysenterica** untergeschoben, deren Kelch grau und zottig, die Strahlenblümchen aber kürzer, und die Scheibenblümchen nicht röhrig, sondern trichterförmig, meistens fünfspaltig sind; auch mit den Blumen der **Inula salicina**, deren Strahlenblümchen schmal und die Scheibenblümchen trichterförmig sind. Diese Blumen sind getrocknet heller gelb, haben auch keinen scharfen reizenden Geruch und Geschmack.

Le Mercier, ein franz. Arzt, (Trommsd. J. XXII. 1. S. 102.) fand, als er Wohlverleihblumen, die den Kranken Magenkrampf, Uebelkeiten und Erbrechen verursacht hatten, genauer untersuchte, dieselben mit kleinen, schwarzen, schmutzigen, ovalen, ein bis zwei Millemeter langen Gehäusen angefüllt, die sehr viel Aehnlichkeit mit Mäusekoth hatten. Die Blumen selbst besaßen nicht die charakteristische hochgelbe Farbe und den besondern Geruch, sondern die Blümchen waren in eine grauliche zusammengeklebte Masse verwirrt, welche den Blumenboden und die Kelche bedeckte. In dem Innern derselben und in ihren Zwischenräumen hielten sich die kleinen Gehäuse auf. Diese Körperchen sollen die Larven und zum Theil die Eier

seyn, aus welchen Le Mercier die weichen, weißgelben, 5 — 6 Millimeter langen fußlosen Thierchen hervorkommen sah. Diese Beobachtung ist auch anderweitig bestätigt; das Insect ist aber nicht Atherix maculata, wie in Buchner's Repertorium III. S. 300. angegeben ist, sondern Musca Arnicae L. Von den Puppen dieses Insects werden die Blumen zerstört, und verursachen dann die erwähnten üblen Zufälle. Es müssen daher beim Einsammeln nur die ganz gesunden Blumen ausgewählt werden, die man an ihrer schönen gelben Farbe, an ihrem etwas balsamischen Geruche und daran erkennt, daß die schmalen Blümchen ganz getrennt von einander sind, und die Strahlenblümchen mit ihrer schönen gelben Farbe frei über den Kelch herabhängen, wogegen die durch Insecten verdorbenen ein mattes düsteres Ansehen haben, verwelkt, mißfarbig und fast ohne Farbe sind, und die graulichen oder rothfahlen Blümchen so zusammenkleben, daß sie den im Innern oder in den Zwischenräumen der kleinen Kelche eingeschlossenen Larven zum Schutze dienen.

Chevallier und Lassaigne untersuchten solche Blumen, deren Abkochung jedesmal heftiges Erbrechen verursachte, konnten aber keine Spur von Eiern oder Larven zwischen ihnen entdecken. Auch Pfaff stimmt darin bei, daß die Wohlverleihblumen selbst in Fällen, wo bei genauer Untersuchung keine Spur von Eiern oder Larven bemerkt werden konnte, doch Uebelkeit und Brechen verursacht haben. Dieser Erfolg ist wahrscheinlich dem der Cytisine ähnlichen Bestandtheile der Blumen, welcher durch Kochen zum Theil aufgelöst wird, zuzuschreiben.

Das über ächte Wohlverleihblumen abgezogene Wasser hat den Geruch nach Chamillenwasser. Der wäßrige Auszug ist dunkelbraun, röthet stark das Lackmuspapier, und schmeckt brennend und kratzend. Durch Ammoniak wird er noch dunkler gefärbt.

Nach Weber's Analyse (Trommsd. J. XVIII, 2. S. 153.) enthalten 100 Th. Wohlverleihblumen: ätherisches Oel (welches nach v. Martius durch seine blaue Farbe sich dem Chamillenöle nähert) eine Spur; scharfes Harz $7\frac{1}{2}$; scharfen Seifenstoff mit essigs. Salzen 15; schleimigen Extractivstoff $17\frac{1}{2}$; Pflanzenfaser 60.

Chevallier und Lassaigne (Almanach 1821. S. 91. und Berl. Jahrb. XXIV, 1. S. 158.) fanden in den Wohlverleihblumen: ein Harz; eine bittere ekelhafte, der Cytisine (Bestandtheil des Cytisus Laburnum) ähnliche Materie (Extractivstoff); Gallapfelsäure; eine gelbfärbende Materie; Eiweißstoff und Gummi (salzs. und phosphors. Kali, Spuren schwefels. Salze, kohlens. Kalk und ein Atom Kieselerde.) Das durch Ausziehen der Blumen mit Aether erhaltene Harz, von welchem die gelbe Farbe der Blumen abhängt, hatte eine gelbe Farbe, den Geruch der Blumen, und verbrannte auf glühenden Kohlen unter Verbreitung eines weißen aromatischen Rauches. Die der Cytisine ähnliche Materie wurde erhalten, als aus der weingeistigen Ausziehung des wäßrigen Extracts die Gallussäure und die färbende Materie mit Bleizucker niedergeschlagen, und, nachdem aus der überstehenden Flüssigkeit

durch Hydrothionsäure das Blei entfernt worden war, abgedampft wurde. Sie war von gelbbrauner Farbe, hatte einen bittern ekelhaften beißenden Geschmack, Galläpfelaufguß schlug dieselbe in Flocken nieder, und wurde außer dem Bleiessig von keinem Metallsalze gefällt. Von dieser Materie, die auch im Geschmacke die größte Aehnlichkeit mit der brechenerregenden Materie der Saamen des Cytisus Laburnum hatte, rührt auch das bei dem Gebrauche der Wohlverleihblumen bisweilen eintretende Erbrechen her.

Die Wohlverleihblumen werden am besten im Thee oder im Aufgusse verordnet, doch ist bei ihrem Gebrauche Vorsicht nöthig, da empfindliche Personen leicht Erbrechen darnach bekommen. Sie sind als ein vorzügliches Heilmittel berühmt bei Quetschungen durch Fallen, daher der Name Fallkraut, auch bei Rheumatismen und Lähmungen als ein die Nerven erregendes Mittel. Das Pulver dient als Niesemittel.

Arnica. Das Kraut. Fallkraut. Wohlverleih.

Längliche in einen Blattstiel auslaufende, etwas spitzige, dreifach gerippte, ganzrandige, mehr oder weniger weichhaarige Blätter von blaßgrüner Farbe, schärflichem und bitterlichem Geschmacke. Im Monat Mai zu sammeln.

Man sammelt nur die Wurzelblätter vor dem Blühen ein. Sie sind auf der obern Fläche dunkelgrün, öfters mit kleinen rothen Flecken bezeichnet, auf der untern Fläche blaßgrün. Sie haben den Geschmack der Blumen, sind aber geruchlos; in ihren Bestandtheilen nähern sie sich den Blumen, stehen jedoch denselben an Wirksamkeit weit nach, und sind nur noch selten im Gebrauch.

Arnica. Die Wurzel. Wohlverleihwurzel.

Die im Knie gebogene, außen schwarzbraune, der Länge nach runzlige Wurzel (Wurzelstock), mit schwarzbrauner Rinde, ziemlich hartem, weißlichen Holze, bedeutenderem Marke, lange dichte Fasern oder Wurzelchen auf der einen Seite ausschickend, bitterlich und schärflich gewürzhaft. Im Frühlinge zu sammeln.

Diese kräftige Wurzel, deren Geruch eigenthümlich stark, etwas gewürzhaft ist, und deren Staub starkes Niesen erregt, wird nicht selten mit der Wurzel der Inula dysenterica verwechselt, und gewöhnlich findet man diese Wurzel der durch den Handel bezogenen Arnicawurzel untergemischt. Man erkennt sehr leicht dieselbe daran, daß sie rund herum befasert, gelbbräunlich ist, schleimig-bitterlich schmeckt, und nur einen schwachen Geruch hat. Nach Happ (Trommsd. N. J. V. 2. S. 429.), der gleichfalls diese Verfälschung nicht selten bemerkte, kann dieselbe auch durch chemische Reaction leicht erkannt werden. Ein gesättigter Aufguß der ächten Arnicawurzel nim-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0120-2

lich erhält durch Ammoniak sogleich eine dunklere, sich ins Grünliche ziehende Farbe, die nach 24 Stunden bei Einwirkung der Luft in eine gesättigt grüne übergeht. In wohlverschlossenen Gefäßen im Dunkeln nimmt er nach einigen Tagen seine vorige Farbe wieder an, die aber bei neuer Einwirkung der Luft wieder ins Grüne zurückkehrt. Auch andere Alkalien bringen diese grüne Farbe hervor, vorzüglich aber das eisenblausaure Kali. Salzsaure Eisenauflösung bewirkt in dem Aufgusse eine bläulichgrüne Farbe und sehr reichlichen Niederschlag. Auch der Alkohol und Aether zieht diesen Stoff aus. Diese Reaction, die Pfaff bestätigt hat (bis auf die Wiederkehr der grünen Farbe) und welche auch ich als ein sicheres Merkmal empfehlen kann, hängt von der Gallussäure der Wohlverleihwurzel ab. Die Wurzel der **Inula dysenterica**, die man leicht nach den äußern Kennzeichen absondern kann, giebt ein viel helleres **Infusum**, welches durch Ammoniak höchst unbedeutend verändert, und durch salzsaures Eisen nur wenig getrübt wird.

Auch sollen ältere Wurzeln der **Betonica officinalis** fälschlich eingesammelt werden; die Wurzelfasern sind zwar auch hier nach einer Seite gerichtet, jedoch sind sie länger und dicker, als bei der **Arnica**; die erwähnten chemischen Kennzeichen gelten auch hier.

Pfaff (System der **Mat. med. III. S. 210.**) destillirte 4 Unzen auserlesener pulverisirter Arnicawurzel mit Wasser und erhielt ein milchiges Wasser, über dem mehrere Tropfen eines gelblichen Oels schwammen, wovon ungefähr 20 Gran gesammelt werden konnten, und welches den eigenthümlichen aromatischen Geruch der Arnicawurzel und einen scharfen brennenden aromatischen Geschmack ohne Beimischung von Bitterkeit hatte.

Das in der Retorte zurückgebliebene Decoct war gesättigt dunkelbraun, ging langsam durch das Seihezeug, und überzog sich sehr bald mit Schimmel. Nach dreimaligem Auskochen wog die rückständige Wurzel 2 Unzen und ein Quentchen.

Das davon erhaltene Extract war dunkelbraun und betrug 13½ Quentchen; das Fehlende ist zum Theil als ätherisches Oel, zum Theil als Wassergehalt anzunehmen, theils als Verlust. Durch Digestion mit Alkohol wurde dieses Extract geschieden in einen mit Weingeist auflöslichen Seifenstoff, welcher alle Eigenschaften des Gerbestoffs des Catechu und Kino zeigte, und 10 Qt. betrug. Was der Alkohol zurückgelassen hatte, war ein schleimiger Extractivstoff.

Aus dem Wurzelrückstande zog Alkohol eine grünlichbraune Tinctur aus, aus welcher sich beim Abrauchen erst ein grünliches, später ein bräunliches Harz absonderte. Der Rückstand nach völligem Verdunsten des Alkohols betrug 2 Qt. Der nunmehrige Wurzelrückstand verhielt sich als Holzfaser, und betrug scharf getrocknet 1 Unze und 7 Quentchen.

Es enthalten also 100 Th. Wurzel: ätherisches Oel 1,5; scharfes Harz 6,0; Seifenstoff, dem Gerbestoff ähnlich, 32,0; Schleim 9,0; Holzfaser 51,5.

Diese Analyse bestätigt die besondere Wirksamkeit der Wohlverleihwurzel

als antiseptisches Mittel durch ihren bedeutenden Gehalt an Gerbestoff, und unterscheidet sie dadurch sehr bestimmt von den Blumen. Nach Collin's Versuchen behauptet auch wirklich diese Wurzel in Bewahrung des Fleisches vor Fäulniß vor allen andern antiseptischen Mitteln den Vorzug, und in Verbesserung des faulen Fleisches, so wie der faulen thierischen Säfte eine sogar siebenmal stärkere Wirksamkeit, als selbst die Fieberrinde. Daher auch ihre vortreffliche Wirksamkeit in der Hemmung der Diarrhöe. Durch ihren flüchtigen Bestandtheil äußert sie auch große Wirksamkeit auf das Nervensystem.

Die Arnicawurzel wird im Aufgusse, oder in Fällen, wo das ätherische Oel weniger als das adstringirende Princip berücksichtigt werden darf, in der Abkochung, zu welcher nicht Eisensalze gemischt werden dürfen, oder auch in Pulverform gegeben.

Arsenicum album. Acidum arsenicosum. Weißes Arsenik. (Arsenige Säure.)

Wird in Bergswerkshütten aus Arsenik-, Kobalt- und andern Erzen durch Sublimation bereitet.

Dicht, schwer, weiß, frisch halbdurchsichtig, mit der Zeit undurchsichtig, in Wasser schwer auflöslich, aus einem eigenthümlichen Metall und aus Sauerstoff bestehend. Das verderblichste Gift. Verflüchtigt sich auf Kohlen unter der Gestalt eines weißen Rauchs, einen Knoblauchgeruch verbreitend. In einer unten zugeschmolzenen Glasröhre mit Kohlenpulver erhitzt, überzieht es den obern Theil der Röhre mit einer glänzenden metallischen Rinde. Aus der Auflösung wird es durch Schwefelwasserstoffwasser mit citronengelber, durch flüssiges schwefelsaures Ammoniakkupfer mit gelbgrüner Farbe gefällt. Ist mit der höchsten Vorsicht und den Verordnungen gemäß aufzubewahren.

Das Arsenik ist lange bekannt gewesen. Aristoteles erwähnt einer Verbindung desselben mit dem Schwefel, unter dem Namen Sandarak, und Dioskorides bedient sich schon des Namens Arsenicum. Paracelsus wußte, daß weißes Arsenik zu einem Metalle reducirt werden könne; doch erst Brand stellte 1733 die ersten genauen Versuche über seine chemische Natur an.

Das Arsenik kommt bald gediegen, als Scherbenkobalt, Fliegenstein, Mückenstein, Cobaltum, vor (man muß daher diesen sogenannten Kobalt der Apotheker wohl von dem eigentlichen Kobalt unterscheiden, welcher ein eigenthümliches Metall ist), bald oxydirt, jedoch in geringer Menge, als dünne, büschelförmig aus einander laufende Nadeln, oder gewöhnlicher als ein weißer Sand, in der Nähe arsenikhaltiger Erze, namentlich der Kobalterze, bald

und zwar häufiger vererzt, und mit andern Körpern verbunden, als Arsenikkies oder Mißpickel, Operment oder Rauschgelb, rother Arsenik, Arsenikkies u. s. w.

In dem weißen Arsenik ist die metallische Basis mit Sauerstoff verbunden, welcher demselben dadurch entzogen werden kann, daß man es unter begünstigenden Umständen mit kohlenstoffhaltenden Substanzen, als Kohlenpulver, Oel ꝛc. zusammenbringt. Man vermische nach Scheele 1 Th. weißes Arsenik mit 3 Th. schwarzem Fluß (durch Verpuffen von 2 Th. Weinstein mit 1 Th. Salpeter erhalten) mit einander, bringe die Mischung in einen Tiegel, stürze einen andern darüber, und verstreiche beide mit Thon (Bolus) und Sand. Die Tiegel werden darauf in ein darnach ausgeschnittenes Stück Eisenblech so eingesetzt, daß der obere Tiegel durch dasselbe gegen die Einwirkung der Hitze geschützt und kalt erhalten werden kann, und dann wird der untere Tiegel in Rothglühhitze gebracht. Der Sauerstoff aus dem weißen Arsenik verbindet sich hierbei mit dem Kohlenstoffe des schwarzen Flusses zu gasförmigen Producten, dem kohlensauren und Kohlenoxydgase, welche entweichen, und das Metall wird reducirt, und im obern Schmelztiegel verdichtet. Kleinere Massen können in unten mit Thon und Sand beschlagenen Glasröhren oder Retorten reducirt werden, in deren obern kaltem Theile sich das Metall ansetzt. Man kann auch das Arsenik leicht erhalten, wenn das in der Natur (gediegen) vorkommende Arsenik (Scherbenkobalt) in einer Retorte sublimirt wird, wobei sich der größte Theil desselben, welcher gediegenes Arsenik ist, sublimirt, und am Boden der Retorte Arsenikkobalt, Arsenikeisen und Arsenniknickel zurückbleiben. Die Retorte wird zerschlagen und das Sublimat herausgenommen.

Das Arsenik hat eine lichtbleigraue Farbe, ist stark glänzend, von blättrigem Gefüge, sehr spröde, aber nicht sehr hart; entzündet sich bei der Glühhitze, brennt mit blauer Flamme, und einem weißen knoblauchartig riechenden Dampfe. Dieser Knoblauchgeruch kommt bloß dem metallischen Arsenik zu, denn nur auf glühenden Kohlen, durch welche das weiße Arsenik in Metall reducirt wird, verbreitet letzteres den knoblauchartigen Geruch; in einer Glasröhre erhitzt, sublimirt es sich ohne den geringsten Geruch zu verbreiten. Mit Salpeter gemischt und angezündet, verpufft das Arsenik mit Heftigkeit. Bei 180° wird es verflüchtigt, ohne zu schmelzen. Spec. Gew. 5,70. Es ist nicht magnetisch, und besitzt noch die sehr merkwürdige Eigenschaft, den Magnetismus aller seiner Verbindungen zu berauben.

Das Arsenik gehört zu den brennbarsten Metallen, denn schon bei gewöhnlicher Temperatur der Luft ausgesetzt überzieht es sich allmälig mit einer schwarzen Rinde, und zerfällt endlich, indem es um höchstens 8 Proc. an Gewicht zunimmt, zu einem schwarzen Pulver, welches von Prout als ein Gemenge von Metall und arseniger Säure angesehen wird, weil bei abgehaltener Luft gelind erhitzt, sich daraus weißes Arsenik entwickelt, und das Metall zurückbleibt, auch Wasser ihm arsenige Säure entzieht. Berzelius, welcher 3 Oxydationsstufen des Arseniks annimmt, nämlich 1)

Suboxyd, 2) arsenige Säure und 3) Arsenikſäure, ſieht das erwähnte ſchwarze Pulver als die 1ſte Oxydationsſtufe oder als das Suboxyd an, welches bei abgehaltener Luft erhitzt und bei Uebergießung mit Waſſer zerſetzt werde in metalliſches Arſenik und arſenige Säure.

Die Zuſammenſetzung dieſes Suboxyds iſt noch unbekannt.

2) Arſenige Säure, allgemein weißes Arſenik. Wird das metalliſche Arſenik an der Luft bis zum Verdampfen erhitzt, ſo nimmt es mehr Oxygen in ſich auf, und wird zu weißem Arſenik. Schon Scheele hatte dieſen als eine Verbindung des Arſenikmetalls mit Sauerſtoff erkannt; Fourcroy war der erſte, welcher das weiße Arſenik, ſtatt Arſenikoxyd, mit dem Namen der arſenigen Säure belegte, welche Benennung, als mit ſeinen Eigenſchaften übereinſtimmend, man faſt allgemein angenommen hat.

Die arſenige Säure, welche im Handel den Namen weißes Arſenik führt, wird bei dem Abtreiben der Kobalterze als Nebenproduct gewonnen. Dieſe Erze werden in einem dazu beſonders eingerichteten Ofen, der mit einem Backofen Aehnlichkeit hat, und in einen wagerechten Rauchfang (Schlott) von ungefähr 200 Ellen Länge ausgeht, welcher Mehl- oder Giftfang genannt wird, geröſtet. Indem das Erz geröſtet wird, ſteigt das Arſenik in die Höhe, verbindet ſich mit dem Sauerſtoffe der Luft und verdichtet ſich in dem Rauchfange als ein grauliches oder ſchwärzliches Pulver. Dieſes wird in eiſernen Kolben, die mit eiſernen Helmen bedeckt ſind, mit einem Zuſatze von Aſche oder etwas Kali einer nochmaligen Sublimation unterworfen, wobei die Unreinigkeiten zurückbleiben, und das Arſenik, indem es zu einem Glaſe ſchmilzt, ein faſt durchſichtiges kryſtalliniſches Anſehen erhält, welches es jedoch in Berührung mit der Luft allmälig wieder verliert, von außen undurchſichtig, eine weiße porcellanartige Maſſe wird, und nur in ſeinem Innern beim Zerſchlagen noch die verglaſte Beſchaffenheit zeigt.

Das meiſte Arſenik kommt aus den Kobaltwerken Sachſens, wo die Schmalte gemacht wird, ſonſt aber auch aus Böhmen, Schleſien und Oeſtreich. Ein großer Theil pflegt ſchon gepulvert herübergebracht zu werden, welches jedoch ſelten rein, ſondern faſt immer mit Kalk, zermahlenem Gyps und Schwerſpath vermiſcht iſt. Auch unter dem ganzen Arſenik ſollen ſogar ganze Stücke Schwerſpath, mit Schwerſpath- und Gypspulver beſtreut, vorkommen. Dieſe Verunreinigungen geben ſich durch ihre Feuerbeſtändigkeit zu erkennen, wogegen das Arſenik auf Kohlen völlig verdampft, deſſen Dampf man jedoch mit der größten Vorſicht zu vermeiden hat, da das weiße Arſenik eins der verderblichſten Gifte iſt.

Die arſenige Säure ſchmeckt herbe und ſcharf metalliſch, hintennach ſüßlich, röthet die blauen Pflanzenfarben, wiewohl ſie den Veilchenſaft grün färbt. Auf glühende Kohlen gebracht verbreitet die daraus reducirte metalliſche Baſis einen ſtarken Knoblauchsgeruch, wobei dieſe durch den Sauerſtoff der Luft wieder zu arſeniger Säure wird und als ſolche weiße Dämpfe bildet; in verſchloſſenen Gefäßen wird ſie ſublimirt, und ſchmilzt bei einer plötzlich angebrachten Hitze zu einem durchſichtigen Glaſe. An der Luft wird ſie

jedoch undurchsichtig und zu einer porcellanartigen Masse. Wasserstoff und Kohlenstoff entziehen ihr in der Rothglühhitze den Sauerstoff, wobei im erstern Falle Wasser, im zweiten Kohlensäure gebildet, in beiden aber das Metall reducirt wird. Spec. Gew. im glasigen Zustande 5,0; im gepulverten 3,699. Nach Berzelius besteht sie aus 75,82 Arsenik und 24,18 Sauerstoff.

Ueber die Auflöslichkeit der arsenigen Säure in Wasser ist man lange in Zweifel gewesen. Bucholz nahm an, daß der eine Theil derselben dem andern Theile etwas Sauerstoff entziehe, wodurch der erstere etwas mehr gesäuert (ohne jedoch in Arsenikſäure überzugehen) und in Wasser auflöslich gemacht werde, wogegen der andere Theil von graulicher, schmutziger, dem Metallglanze sich etwas nähernder Farbe zurückbleibt, und dadurch seine Annäherung zum metallischen Zustande einigermaßen zu erkennen giebt. Hr. Prof. Fischer (Schw. J. XII. S. 155.) stellte hierauf die Behauptung auf, daß das weiße Arsenik als solches in Wasser unauflöslich sey, und daß eine Lösung desselben eine Erhöhung seines Oxydationszustandes voraussetze, daß diese Erhöhung jedoch entweder auf Kosten des im Uebermaße vorhandenen Arseniks, oder auch durch Erhöhung der Temperatur bewirkt werden könne. Pfaff (Handbuch der analytischen Chemie 1ste Ausg. 2r Bd. S. 380.) fand diese Behauptung nicht bestätigt, indem es ihm gelang, nicht nur in der Siedehitze, sondern auch bei gewöhnlicher Temperatur das weiße Arsenik bis auf die letzte Spur aufzulösen; auch konnte er bei Auflösung einer großen Quantität weißen Arseniks in Wasser bei einer Hitze von 60°, wobei die Retorte mit dem pneumatischen Apparate in Verbindung gesetzt wurde, keine Spur von Wasserstoffgasentwickelung bemerken. Wenn nämlich eine Säuerung des Arseniks zur völligen Auflöslichkeit desselben erfoderlich ist, so könnte diese bei dem Ausschlusse der atmosphärischen Luft nur auf Kosten des Wassers erfolgen, und wenn der Sauerstoff desselben sich mit dem Arsenik verbindet, so mußte der zweite Bestandtheil des Wassers, der Wasserstoff, ausgeschieden werden, und als Gas in die pneumatische Röhre treten. Fischer überzeugte sich von der Richtigkeit dieser Angaben, meint jedoch, seine Ansicht nicht aufgebend, daß sich hier vielleicht eine Verbindung von Wasserstoff, Sauerstoff und Arsenik in der Art bilde, daß zwar etwas Sauerstoff an das Arsenik trete, ohne daß jedoch der dazu nöthige Sauerstoff den Wasserstoff ganz frei mache, sondern dieser vielmehr in der Auflösung mit dem Wasser verbunden bleibe. Beim Abrauchen der Auflösung tritt nach Fischer die in der Auflösung enthaltene neugebildete arsenige Säure durch Wiederabgabe ihres Sauerstoffs wieder in den Zustand des gewöhnlichen weißen Arseniks zurück, denn dieses wird als Rückstand erhalten.

Angemessener scheint wohl die Annahme, daß die Auflöslichkeit des weißen Arseniks mehr von seinen Aggregatzustande abhänge. Das lange der Einwirkung feuchter Luft ausgesetzt gewesene gepulverte Arsenik (das also Hydrat ist) löst sich leicht auf, wogegen glasartige, zu Pulver geriebene Stückchen lange anhaltendes Kochen erfodern, endlich sich aber doch auflösen. Jedoch

wird selbst durch anhaltendes Kochen des Wassers mit Arsenik nicht eine gesättigte Auflösung erhalten werden; man kann nämlich die Auflösung noch sehr bedeutend abdampfen, ohne daß die Säure abgeschieden wird. Wenn sie zu krystallisiren anfängt, enthält die Auflösung zwischen $\frac{1}{12}$ oder $\frac{1}{13}$ ihres Gewichts weißen Arsenik. Nach Bucholz wird 1 Th. arsenige Säure bei + 100° von $12\frac{1}{3}$ Th. Wasser, bei + 60° von 22 Th., bei + 18° von 50 Th. und bei 10° von 66,6 Th. Wasser aufgenommen. Die Säure krystallisirt aus der Auflösung in durchsichtigen Nadeln, Oktaëdern und Tetraëdern.

Die arsenige Säure zeigt wenig Affinität zu den übrigen Säuren, sie löst sich in ihnen oft weniger leicht, als in Wasser; die lose Verbindung zerfällt oft schon beim Erkalten der heißen Lösung. Mit den Basen bildet sie die arsenigsauren Salze; in der Verwandtschaft steht sie aber schon der Kohlensäure nach, da die Salze zum Theil durch diese zerlegt werden.

Die arsenige Säure findet in der Medicin, sowohl zum innerlichen als zum äußerlichen Gebrauche Anwendung, und hiezu wähle man die noch recht glänzenden und blendend weißen Stücke. Zum innerlichen Gebrauche ist von der preuß. Medicinalbehörde folgende Vorschrift zur Bereitung der **Solutio arsenicalis** gegeben worden:

Nimm: Weißes aufs feinste gepulvertes Arsenik
Gereinigtes kohlensaures Kali, von jedem 64 Gran,
Destillirtes Wasser 8 Unzen,
löse es durch Digestion in einem gläsernen Kolben auf.

Der erkalteten Auflösung setze hinzu:

Zusammengesetzten Angelicaspiritus ein halbe Unze,
Destillirtes Wasser soviel als erfodert wird, damit die ganze Masse zwölf Unzen an Gewicht halte.

Jede Drachme dieser Auflösung enthält $\frac{2}{3}$ Gran Arsenik.

In dieser Auflösung ist die arsenige Säure mit dem Kali verbunden, und dieses arsenigsaure Kali (**Kali arsenicosum**), welches auch bisweilen für sich in der Auflösung verordnet wird, wird dadurch erhalten, daß man weißes Arsenik mit aufgelöstem kohlensaurem Kali in der Wärme behandelt, die Auflösung filtrirt, und zur Trockne verdampft, wodurch man eine gelbe, klebrige, ekelhaft riechende Masse erhält, welche auch zweckmäßig im flüssigen Zustande aufbewahrt werden kann, jedoch so, daß die Menge des aufgelösten Arseniks bekannt ist.

Auch äußerlich findet das weiße Arsenik in der Medicin Anwendung, und folgendes Mittel gegen den Gesichtskrebs von dem Zollrendanten Hellmund in Oldendorf ist von mehreren Seiten empfohlen worden.

Nimm: Zinnober eine halbe Drachme
Asche von alten gebrannten Schuhsohlen
Drachenblut; von jedem vier Gran
Weißes Arsenik einen halben Scrupel.

Von diesem Pulver werden ungefähr anderthalb Gran unter eine Drachme von folgender Salbe gemengt:

Nimm: Peruvianischen Balsam
Schierlingsextract von jedem eine Drachme
Essigsaures Blei einen Scrupel
Wachssalbe eine Unze.

Mit dieser Salbe bestreicht Hellmund ganz dünn ein Plumasseau, welches groß genug ist, nicht allein die schadhaften Theile, sondern auch eine Linie breit die gesunden zu bedecken. Der Schmerz ist gering und hält nur kurze Zeit an. Der Verband bleibt 24 Stunden liegen, wird dann durch ein warmes Decoct von Hollunderblüthen losgeweicht, das Mittel auf dieselbe Art von neuem aufgelegt, und so fünf Tage hinter einander verfahren. Den 6ten, 7ten, 8ten, 9ten, 10ten, 11ten und 12ten Tag wird der Schaden bloß mit der Salbe, ohne daß Pulver zugesetzt wird, verbunden, worauf das Geschwür rein wird, und die Heilung nach einigen 20 Verbänden, gewöhnlich höchstens nach dem 40sten Verbande, erfolgt. Findet Hellmund nach dem 12ten Verbande, daß vielleicht eine Stelle nicht ganz rein ist, so verbindet er diese noch 2 Tage, wie es in den ersten 5 Tagen geschehen ist, (nämlich mit Zusatz des arsenikhaltigen Pulvers). Hellmund macht darauf aufmerksam, daß man nicht allein feine Charpie nehmen, sondern diese auch mittelst eines Messers weich machen müsse, damit die Salbe alle schadhaften Theile besser berühren könne.

Häufig wird das weiße Arsenik auch zur Vertilgung der Ratten und Mäuse aus den Apotheken verlangt; es darf jedoch niemals für sich allein und unvermischt, sondern nur nach folgender Zusammensetzung verkauft werden:

Nimm: Acht Loth fein gepulvertes Arsenik
Sieben Loth feines Weizenmehl
Ein Loth feinste Kohle, oder eben so viel ausgeglühten Kienruß
und Einen Gran Bisam mit verdünntem Weingeiste abgerieben.

Das Gemenge wird innig vermischt, und in wohl verstopften Krucken zu 2 Loth verwahrt.

Das weiße Arsenik wird auch häufig in Künsten und Gewerben angewandt, besonders in der Färberei, Kattundruckerei, bei der Bereitung des Glases, wobei es zugesetzt wird, um das in den Materialien befindliche Eisen in Oxyd zu verwandeln, wovon das Glas weniger als vom Oxydul gefärbt wird, zur Bereitung des Operments, Scheeleschen Grüns u. s. w. Doch ist der Handel damit den nöthigen Beschränkungen unterworfen.

3) Die Arsenikſäure. Sie wurde von Scheele entdeckt. Man erhält sie, wenn 8 Th. arsenige Säure mit 2 Th. concentrirter Chlorwasserstoffsäure von 1,2 spec. Gew. gekocht werden, die man mit 24 Th. Salpetersäure von 1,25 spec. Gew. in kleinen Portionen versetzt. Das Gemenge

wird in gläsernen Gefäßen, bis es die Consistenz eines Syrups erhalten, destillirt. Die Säure wird darauf in einen Platintiegel gegossen, und bis zu einer dem Glühen nahen Temperatur erhitzt, bei welcher sie lange erhalten wird, damit alle Salpetersäure verjagt werde. Die so erhaltene Säure ist milchweiß und ist wasserfreie Arsenikſäure. Im Glühen wird ein Theil zersetzt, und man erhält eine geschmolzene Masse, die aus Arsenik und aus arseniger Säure besteht, und die bei Auflösung in Wasser die letztere unaufgelöst zurückläßt. In strengerer Hitze wird sie gänzlich in Sauerstoffgas und arsenige Säure verwandelt, welche sich verflüchtigen. Die wasserfreie Arsenikſäure löst sich beim Uebergießen mit Wasser nur theilweise auf, und läßt ein weißes Pulver unaufgelöst zurück, welches sich aber nach längerer Einwirkung des Wassers, zumal bei öfterm Umschütteln der Flüssigkeit, ohne Rückstand auflöst.

Die Arsenikſäure ist eine der stärkeren Säuren, und verjagt, unterstützt durch Wärme, alle flüchtigen Säuren. Sie besteht aus 65,3 Arsenik und 34,7 Sauerstoff.

Beide Säuren des Arseniks geben eigene neutrale, basische und saure Salze. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß, wenn sie auf Kohlen vor dem Löthrohre erhitzt werden, sie einen starken Knoblauchgeruch ausstoßen, und mit Kohlenpulver gemischt und in einer Glasröhre erhitzt, metallisches Arsenik geben.

Schwererde und Strontian haben nach Moretti eine größere Verwandtschaft zur Arsenikſäure, als zur Schwefelsäure; arsenikſaures Strontian ist leicht auflöslich, nicht aber die arsenikſaure Schwererde. Diese letztere (aus arsenikſ. Kali und salpeterſ. Baryt erhalten), mit Traganth zu Pasten gemacht, giebt nach Osann einen Leuchtstein, welcher, einer glühenden Kohle ähnlich, das Leuchten des bononischen Phosphors hinter sich läßt.

Mit dem Wasserstoffe verbindet sich das Arsenik in 2 Verhältnissen:

1) Arsenikwasserstoff in fester Form, wenn man bei der Zersetzung des Wassers durch die Elektricität sich des Arsenikmetalls als negativen Leiters bedient. Die Verbindung des Arseniks mit dem Wasserstoffe scheidet sich vom Metalle in kastanienbraunen Flocken ab.

2) Arsenikwasserstoffgas, von Scheele entdeckt. Man erhält diese Gasart, wenn Zinn oder Zink mit feingepulvertem Arsenikmetall vermischt, und in concentrirter Chlorwasserstoffsäure aufgelöst wird. Der Geruch ist stinkend und sehr unangenehm, und dem des Arseniks nicht ganz ähnlich. Diejenigen, welche mit dieser Gasart Versuche angestellt haben, und die von den kleinen Quantitäten, deren Ausgang an den Gefäßen man oft bei den Versuchen nicht hindern kann, eingeathmet haben, sind von Angst, Müdigkeit, Schwindel, Ekel, Erbrechen und der hartnäckigsten Verstopfung befallen worden, gegen welche man Thee und schwefelwasserstoffhaltiges Wasser als die besten Linderungsmittel benutzt hat. Der verdiente Gehlen wurde von diesem Gase getödtet.

Hünefeldt (Physiologische Chemie S. 133.) giebt bei dem Beweise der

fäulnißwidrigen Kraft des Arseniks an, daß sich nach geraumer Zeit das Arsenik in Verbindung mit Wasserstoff als Arsenikwasserstoffgas aus den damit vergifteten Leichen entferne, und eben wegen dieses Umstandes die Arbeiten der Taxidermie sehr schädlich werden können. Derselbe bemerkt (Horn's Archiv 1826. Juli und August S. 10.), daß auch die mit Scheeleschem Grün angestrichenen Zimmer, besonders wenn sie auf ebener Erde, etwas dunkel und feucht sind, eine sehr schädliche Luft enthalten können; wenigstens muß ein längerer Aufenthalt in solchen, zugleich nachlässig gelüfteten Zimmern sehr nachtheilig werden. Die arsenige Säure des mit thierischem Leim angerührten Scheeleschen Grüns wird zum Theil allmälig in Arsenikwasserstoffgas umgewandelt, was man schon durch den knoblauchartigen Geruch erkennen könne. Hünefeldt ist durch eigene hinlängliche Erfahrung von der Wahrheit dieser Behauptung überzeugt worden.

Mit dem Schwefel kann das Arsenik in allen Verhältnissen zusammengeschmolzen werden. Wir kennen davon 3 bestimmte Verbindungen:

1) Schwarzes Arsenik, wenn die rothe Schwefelungsstufe oder das Realgar mit einer Auflösung von kaustischem Kali digerirt wird, wobei sich das Realgar in ein schwarzes, etwas ins Bräunliche ziehendes Pulver verwandelt.

2) Rothes Schwefelarsenik, Realgar, Sandarak. Man erhält dies, wenn Schwefel mit metallischem Arsenik, oder mit arseniger Säure, die im Ueberschusse zugesetzt worden sind, zusammengeschmolzen werden. Die Masse ist durchsichtig, schön rubinroth. Es wird im Großen dargestellt durch Destillation des Schwefelkieses mit Arsenikkies. Es kommt im Mineralreiche krystallisirt vor, und zwar in Sachsen, Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen und vielen vulcanischen Gegenden, auch in China und Japan. Besteht nach Berzelius aus 70,04 Arsenik und 29,96 Schwefel. Klaproth fand das natürliche zusammengesetzt aus 69 Arsenik und 31 Schwefel. Es wird in der Malerei gebraucht, wozu es schon die Griechen angewandt haben. Auch kommt es zu dem sogenannten weißen indischen Feuer, welches man erhält, wenn ein Gemenge von 24 Th. Salpeter, 7 Th. Schwefelblumen und 2 Th. Realgar genau gemischt und entzündet wird. Das Feuer dieses Gemenges ist ganz farblos.

3) Gelbes Schwefelarsenik, Rauschgelb, Auripigment, Operment, wird erhalten, wenn eine Auflösung der arsenigen Säure in Chlorwasserstoffsäure durch Schwefelwasserstoffgas niedergeschlagen wird. In der Auflösung der arsenigen Säure in Wasser bildet sich nach Gmelin mit der Hydrothionsäure hydrothionsaures Arsenikoxyd, welches die Flüssigkeit gelb färbt, aus der sich aber erst durch Zusatz einer stärkern Säure Schwefelarsenik niederschlägt. Der Niederschlag ist schön citronengelb, und in Säuren unauflöslich, wird aber von Salpetersäure und Königswasser zersetzt.

Im Großen wird das Operment dadurch bereitet, daß man einen Theil Schwefel und zwei Theile ungereinigte arsenige Säure in Sublimirgefäßen erhitzt. Ein Antheil Schwefel wird durch den Sauerstoff der arsenigen

Säure in schweflige Säure verwandelt, der übrige sublimirt sich mit dem metallischen Arsenik verbunden zu Rauschgelb. Dieses erscheint in schweren citrongelben Massen, welche einen muschligen Bruch haben, und in dünnen Blättchen halbdurchsichtig sind. Es wird in der Färberei benutzt, oft auch als desoxydirendes Mittel bei der Auflösung des Indigs.

Diese Verbindung kommt auch, in Massen von biegsamen, gelben, glänzenden Blättern, bisweilen mit kleinen Antheilen der vorhergehenden gemengt, in der Natur krystallisirt vor, und zwar hauptsächlich in Ungarn, Siebenbürgen, Natolien und in einem großen Theile des Orients. Klaproth fand sie zusammengesetzt aus 62 Arsenik und 38 Schwefel. Nach Berzelius besteht das Rauschgelb aus 60,92 Arsenik und 39,08 Schwefel.

4) Das mit der Arsenikſäure proportionale Schwefelarsenik wird erhalten durch Fällung einer etwas concentrirten Auflösung von Arsenikſäure mit Schwefelwasserstoffgas, oder durch Zersetzung einer concentrirten Auflösung von arsenikſaurem Kali mittelst dieses Gases und durch Fällung des dabei gebildeten Schwefelsalzes mit Chlorwasserstoffsäure. Man erhält einen der vorigen Schwefelungsstufe so ähnlichen Niederschlag, daß er dem Ansehen nach nicht davon unterschieden werden kann, außer etwa durch die etwas hellere Farbe. Er besteht aus 48,3 Arsenik und 51,7 Schwefel.

5) Eine noch höhere Schwefelungsstufe des Arseniks. Diese fünfte und die erste Schwefelungsstufe stehen nicht in einem solchen einfachen Verhältnisse, wie die 2te, 3te und 4te (nämlich wie 2, 3 und 5). Das erste besteht aus 96,53 Arsenik und 3,47 Schwefel, das letzte dagegen aus 20 Arsenik und 80 Schwefel. Beide sind nur in chemischer Rücksicht zu bemerken.

Mit den Metallen verbindet sich das Arsenik leicht; die geschmeidigen werden davon spröde, und die schwerschmelzenden leichtflüssiger.

Wird Arsenik mit fetten Oelen gekocht, so erhält man eine dunkle pflasterähnliche Masse, die einen sehr unangenehmen Geruch verbreitet.

Auf lebendige Thiere und auf Pflanzen (Marcet's Versuche in Schw. N. J. XV. 1825. S. 340.) wirkt dieses Metall ohne Ausnahme wie ein zerstörendes Gift. Die Arsenikſäure und nach ihr die arsenige Säure sind die giftigsten Verbindungen dieses Metalls. Ihre Salze und das Schwefelmetall sind es in weit geringerem Grade. Nach Orfila (Toxikologie, übers. von Hermbstädt I. S. 247.) soll nur das künstlich bereite Schwefelarsenik giftig wirken, während das natürliche Operment nicht dieselben giftigen Wirkungen zeigt.

Es ist eine für Jeden nützliche Kenntniß, die Erscheinungen zu kennen, welche den Verdacht erregen können, daß eine Vergiftung mit diesem gefährlichen Metalle stattgefunden habe, und die Mittel zu wissen, die man dagegen versuchen muß. Die Symptome, welche von einer gefährlichen Dosis Arsenik erzeugt werden, fangen ungefähr eine Viertelstunde nach dem Verschlucken des Giftes an. Zuerst fühlt der Leidende Schmerzen im Magen, mit Angst begleitet, danach kommt eine brennende Hitze im Magen und in den Gedärmen, mit einem beinahe nicht zu stillenden Durste. Darauf stellen sich

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0130-8

nach einander Erbrechen, fürchterliche Kolikschmerzen, und bisweilen ein gewaltsamer Durchfall ein, wobei der Mastdarm die Oberhaut verliert und angefressen wird; kalter Schweiß, Ohnmachten, peinlicher Krampf in Armen und Beinen, Besinnungslosigkeit, Zuckungen und endlich der Tod. Dieser schreckliche Zustand kann oft 5—10 Stunden und darüber dauern. Der todte Körper schwillt stark auf, und wenn er blutreich war und die Jahreszeit warm ist, geräth er schnell in eine stinkende Fäulniß, woran jedoch das Arsenik eigentlich keinen Theil hat. Bei der Leichenöffnung findet man das innere Häutchen des Magens entzündet, hie und da angefressen und zerstört. Es ist jedoch nicht ohne Beispiel, daß es Arsenikvergiftungen gegeben hat, wobei keine inflammatorischen Zufälle sichtbar gewesen sind. Die Gefäße des Gehirns sind mit Blut überfüllt, nicht selten ist eins oder das andere davon geborsten, so daß sich hier im Gehirn ganz dieselben Erscheinungen, wie beim Schlagflusse, obgleich in höherem Grade, zeigen.

Als Rettungsmittel sind zu versuchen a) Brechmittel, b) neutralisirende Mittel, die seine Giftigkeit einhüllen oder vermindern, und c) einhüllende, welche die Gedärme gegen den Reiz des Giftes bedecken. Keins dieser Mittel darf versäumt werden. Brechwurzel paßt besser als andere Brechmittel, gewöhnlich darf aber das von selbst erfolgende Erbrechen nur durch eine Menge lauwarmes Wasser oder Milch, mit ein wenig Alkali versetzt, um ihr einen ekelhaften Geschmack zu geben, befördert werden. Man muß das beim Erbrechen Ausgeleerte einsammeln, um es untersuchen zu können, weil die größte Menge dieses Giftes öfters auf diesem Wege fortgeht. Darauf werden neutralisirende Mittel, Alkalien und schwefelwasserstoffhaltiges Wasser, gegeben. Erstere sind leicht bei der Hand, man braucht nur auf gewöhnliche Asche kochendes Wasser zu gießen, und die Lauge mit Milch oder mit etwas dicker Hafersuppe zu mischen, und den Kranken recht viel davon verzehren zu lassen, und immer die Dosis zu wiederholen, so oft sie durch Erbrechen ausgeleert worden ist. Das arsenigsaure Kali ist weniger giftig.

Sollte das Schwefelarsenik weniger giftig seyn, so würde es vielleicht am besten seyn, 15 bis 20 Gran Schwefelleber zu geben, welches man in sehr vielem, z. B. ½ berliner Quart, Wasser auflöst. Als Gegengift ist auch Zuckersaft, in reichlichem Maße getrunken, empfohlen worden. Eine chemische Einwirkung von 2 Unzen Zuckersaft auf ¼ Gran Arsenik konnte von mir nicht bemerkt werden, indem selbst nach Jahresfrist noch sämmtliche Reagentien das Arsenik anzeigten.

Neben allem diesen muß man die einhüllenden Mittel nicht versäumen, unter welchen die Milch die erste Stelle einnimmt.

Nachdem alle Lebensgefahr aufgehört hat, bleibt eine Empfindlichkeit der Gedärme zurück, die oft durch Unvorsichtigkeit und schlechte Behandlung den Tod zur Folge haben kann. Diese Empfindlichkeit erfodert einen oft wiederholten Gebrauch von Opium und Milchdiät. Im Allgemeinen ist es weit leichter, alte, als junge Leute zu retten, und bei Thieren hat man ge-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0131-4

funden, daß sehr alte, oft ohne bedeutende Beschwerde, Dosen vertragen, die junge Thiere von derselben Gattung schnell tödten.

Da die Gesetze Leben für Leben fodern, so ist es nöthig, daß alle diese Zeichen einer geschehenen Vergiftung auch durch die wirkliche Anwesenheit des Giftes in dem Inhalte des Magens und der Gedärme, oder in den Stoffen, deren sich der Kranke durch das Erbrechen entledigt hat, bestätigt werden. Man sucht dann zuerst die arsenige Säure in fester Form auf, und entdeckt sie dabei öfters in Gestalt kleinerer oder gröberer weißer Körner. Man untersucht, ob sich solche Körner in den Contentis befinden, auf die Weise, daß der ganze Inhalt des Magens und der Gedärme in Wasser gelegt und damit angerührt wird, wo dann die Arsenikkörner eher als die andern Substanzen zu Boden sinken, und gesammelt werden können. Man untersucht auch die innere Haut des Magens, besonders die am meisten inflammirten Stellen, ob sich keine Körner von arseniger Säure darin festgesetzt haben.

Die Ausmittelung des Arseniks bei Leichnamen ist demnach einer der wichtigsten Gegenstände der gerichtlichen Medicin, und es ist dieser Gegenstand daher auch seit langer Zeit mit vorzüglicher Sorgfalt bearbeitet worden. Die vorzüglichsten Reagentien zur Entdeckung des Arseniks sind:

1) Die Hydrothionsäure oder das Schwefelwasserstoffgas, aus durch Zusammenglühen von Aetzkalk und Schwefel frisch bereiteter, keine Kohlensäure enthaltender Schwefelleber, oder am besten aus dem Schwefeleisen (siehe Ferrum) durch Salzsäure entwickelt. Da etwanige Kohlensäure die Wirksamkeit dieses Reagens bedeutend schwächt dadurch, daß sie die Aufnahme des Schwefelwasserstoffgases von der durch jenes Gas angeschwängerten Flüssigkeit hindert, so ist es nöthig, die Flüssigkeit zur Vertreibung der Kohlensäure nicht nur aufzukochen, sondern auch sie einzuengen, weil bei einer geringen Quantität Arsenik sich erst dann der Niederschlag ausscheidet. Schumann fand es noch vorzüglicher, die gelbgefärbte Flüssigkeit gefrieren zu lassen, aus welcher sich dann nach dem Aufthauen der Niederschlag, wahrscheinlich durch vermehrte Krystallanziehung, ausschied. Noch mehr hat man auf Entfernung eines etwa in der zu prüfenden Flüssigkeit vorhandenen freien Alkalis, durch Zusatz von Essig- oder Weinsteinsäure, zu achten, weil durch jenes die Einwirkung des Gases auf Arsenik gänzlich aufgehoben wird. Ist Arsenik in der Flüssigkeit vorhanden, so wird ihr durch das Gas eine citronengelbe Farbe mitgetheilt, die auch noch bei 100,000facher Verdünnung bemerklich wird, jedoch ohne alle Trübung, wenn nicht eine stärkere Säure, namentlich die Weinsteinsäure zugesetzt worden, in welchem Falle Schwefelarsenik als ein flockiger citronengelber Niederschlag zu Boden fällt, der auch bei 120,000facher Verdünnung nach einiger Zeit noch bemerklich wird. Daher kann auch die Hahnemannsche Weinprobe benutzt werden, die aber den Nachtheil hat, daß sie die Flüssigkeit bedeutend verdünnt.

Dr. Christison (Schw. N. J. XIII. S. 347.) erklärt diese Probe und die nachfolgende Reduction für untrüglich, und daher auch für allein

hinreichend, um über die Gegenwart des Arseniks entscheiden zu können. Gegen Pfaff's (Analytische Chemie 1821. I. S. 119.) Behauptung, daß auch die Arsenikſäure und die arsenikſauren Salze durch Schwefelwasserstoffgas gelb niedergeschlagen werden, führte Schumann (Schw. N. J. XIII. 1825. S. 358.) Versuche an, die das Gegentheil beweisen sollten. Auch Buchner (Toxikologie S. 403.) behauptet, daß die Arsenikſäure und ihre Salze nicht verändert würden, und bemerkt, daß erst nach mehreren Stunden ein gelber Niederschlag erscheine, welches entweder davon herrühre, daß die Arsenikſäure mit etwas arseniger Säure vermischt war, oder daß der Schwefelwasserstoff im Ueberschusse angewendet desoxydirend gewirkt hat. Pfaff (Schw. N. J. XV. 1825. S. 95.) hat hingegen durch Versuche nachgewiesen, daß die reine Arsenikſäure sogleich durch die erste hindurchſtrömende Blase Schwefelwasserstoffgas gelb gefärbt, und auch ein Niederschlag gebildet wurde. Dieser Niederschlag ist das als 4te Schwefelungsstufe beschriebene Schwefelarsenik, welches, wie dort angeführt worden, behufs einer etwa nöthig werdenden Berechnung des Gehalts an Arsenik, in 100 nur 48,3 Arsenik enthält, wogegen das aus der arsenigen Säure gefällte Schwefelarsenik 60,92 Arsenik enthält.

Die Empfindlichkeit dieses so vorzüglichen Prüfungsmittels, des Schwefelwasserstoffgases, scheint durch Kochsalz, Fleischbrühe und Theeaufguß geschwächt zu werden; völlig unsicher aber wird dasselbe durch Brechweinstein, welcher durch dasselbe mit orangengelber Farbe niedergeschlagen wird, und dann den etwanigen Arsenikgehalt nicht erkennen läßt; ja es schlägt unter gewissen Umständen auch organische Stoffe nieder. Cadmium wird ähnlich gefällt.

2) Kupferammoniak. Eine Auflösung des **Cuprum sulphurico-ammoniatum** scheint vor einer Auflösung des aus schwefelsaurem Kupfer durch Kali gefällten Kupferoxydes in ätzendem Ammoniak den Vorzug zu verdienen. Durch das Kupferoxyd wird das Arsenik in gelblichgrünen, fast apfelgrünen Flocken (arsenigsaures Kupferoxyd, Scheelesches Grün) niedergeschlagen, und es bewirkt noch bei 100,000facher Verdünnung eine schwache grünliche Färbung. Doch wende man dieses Reagens nur in geringer Menge an, damit nicht die lasurblaue Farbe desselben die Erkennung der grünlichen Färbung hindere.

Ueberschüssiges Ammoniak hindert die Niederschlagung; Brechweinstein erzeugt einen weißen Niederschlag; Fleischbrühe hebt die Einwirkung durchaus auf; Theeaufguß ändert die blaue Farbe sogleich in eine dunkelrothbraune um; Salmiak endlich vernichtet alle Wirksamkeit so weit, daß sogar ein schon vorhandener Niederschlag von Scheeleschem Grün durch Salmiak völlig wieder aufgelöst wird unter Wiederherstellung der blauen Farbe. Eben so machen freie Säuren und Alkalien den Niederschlag wieder verschwinden. Dem Angeführten zufolge wird aus einer Abkochung der Magenhäute das Arsenik durch Kupferammoniak nicht niedergeschlagen werden. Ueberdem wird dieses Reagens noch dadurch unsicher, daß Zwiebelabsud mit demselben eine dem Scheeleschen Grün ganz ähnliche grünliche Färbung hervorbringt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0133-5

3) Kalkwasser. Dieses muß frisch mit destillirtem Wasser bereitet seyn, und noch heiß angewandt werden. Es bewirkt einen weißen Niederschlag von arsenigsaurem Kalke, und trübt die Auflösung noch bei 3000facher Verdünnung. Da der arsenigsaure Kalk nicht nur durch jede Säure, sondern auch durch überschüssige Arsenikauflösung aufgelöst wird, so muß die zu prüfende Flüssigkeit frei von Säure seyn, auch diese in das Kalkwasser gegossen werden. Die Behauptung, daß der arsenigsaure Kalk auch in einem Ueberschusse von Kalkwasser oder einem freien Alkali auflöslich sey, ist nur dann richtig, wenn die in der Flüssigkeit etwa enthaltene Salpetersäure mit Ammoniak (nicht mit Kali oder Natron) gesättigt worden, denn das dadurch gebildete salpetersaure Ammoniak (das salpetersaure Kali und Natron nicht) hat das Vermögen, den schon gebildeten arsenigsauren Kalk wieder aufzulösen, welche Eigenschaft außerdem auch dem salzs., essigs. und schwefels. — nicht dem phosphors. und kohlensauren — Ammoniak zukommt.

Das Kalkwasser wird jedoch schon für sich, ohne Beimischung des Arseniks getrübt von Theeaufguß, Brechweinauflösung und Fleischbrühe. Dieser letztere Niederschlag wird fast immer in den Contentis entstehen, und ist theils phosphorsaure Kalkerde, theils eine Verbindung von Kalk mit thierischen Stoffen.

4) Salpetersaures Silber. Giebt mit arseniger Säure einen gelben, mit Arsenikſäure einen braunen Niederschlag. Enthält die Auflösung nur $\frac{1}{100000}$, ja $\frac{1}{120000}$ weißes Arsenik, so scheidet sich das arsenigsaure Silberoxyd als ein gelber Niederschlag aus, der an der Luft und beim Trocknen braun wird. Die arsenige Auflösung muß jedoch vorher mit einigen Tropfen Aetzammoniak versetzt werden, um ein neutrales arsenigsaures Salz zu bilden, wobei große Genauigkeit zu beobachten ist, da nämlich das arsenigsaure Silberoxyd sowohl in Ammoniak als in Säuren leicht auflöslich ist, der Erfolg mithin davon abhängt, daß weder eins noch das andere vorwalte. Wenn man mit einem Glasstabe einen Tropfen Aetzammoniak in die kleine Probe der Flüssigkeit bringt, und dann die Oberfläche derselben mit einem mit Silberauflösung befeuchteten Glasstäbchen berührt, so sieht man hier sogleich einen gelben Streifen entstehen, der sich allmälig in der Flüssigkeit senkt.

Theeaufguß wird von salpetersaurem Silber dunkel rothbraun gefärbt, und läßt einen geringen Arsenikgehalt nur undeutlich durch eine schwache gelbliche Trübung erkennen. Brechweinstein ändert die gelbe Farbe des Niederschlags in eine weiße um. War Kochsalz in der Flüssigkeit vorhanden, so fälle man die Salzsäure durch salpetersaures Silber so lange, bis ein in salzsäurehaltiges Wasser fallender Tropfen dieser Flüssigkeit anzeigt, daß sie schon etwas salpetersaures Silber im Ueberschusse enthalte. Hierauf setze man derselben Salpetersäure bis zum mäßigen Vorwalten zu, um das etwa niedergefallene arsenigsaure Silber wieder aufzulösen, filtrire vom Hornsilber ab, und stumpfe in der klaren Lauge wie vorhin die überschüssige Salpetersäure durch Ammoniak ab.

Besonders zu berücksichtigen ist, daß auch die phosphorsauren Salze von

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0134-1

Silberfolution gelb gefärbt werden. Um dieses Hinderniß zu heben, und die Brauchbarkeit dieses so sehr vorzüglichen Prüfungsmittels zu erhöhen, ist folgendes Verfahren empfohlen worden (Rust und Casper Repert. XII. 3. S. 396.). Mit der verdächtigen Flüssigkeit soll eine breite Linie auf weißes Papier gezogen werden; längs dieser ziehe man ein Stück Höllenstein langsam her, und man wird dann einen Streif bilden, der röthlichgelb ist, aber gleichmäßig von arsenikfauren und von phosphorsauren Salzen gebildet wird; der von Arsenik gebildete ist aber rauh, geronnen, flockig, der von einem phosphorsauren Kali gebildete homogen und glatt, wie mit einem Pinsel aufgetragen. Was aber noch wichtiger ist, ist, daß in einigen Minuten das Phosphorgelb in ein dunkles Grün übergeht, schwärzer und zuletzt ganz schwarz wird, während das Arsenikgelb länger steht, und dann braun wird. Dieses Experiment muß nicht im Sonnenscheine gemacht werden, weil sonst der Uebergang der Farben zu rasch erfolgt.

Zu empfehlen ist auch noch folgende Verfahrungsweise. Die verdächtige Flüssigkeit wird mit einigen Tropfen Salpetersäure und etwas salpetersaurer Silberauflösung versetzt, und dann ein Stückchen Kreide hineingelegt. Nachdem durch diese die Salpetersäure abgestumpft worden, zeigt sich nach etwa einer halben Stunde ein sehr deutlicher braunrother Beschlag auf der Oberfläche der Kreide, welcher ein arsenikfaures Silberoxyd ist. Will man den Erfolg beschleunigen, so setze man einige Tropfen essigsauren Baryts hinzu, und bald wird sich der erwähnte Niederschlag zeigen, auch die überstehende Flüssigkeit eben so gefärbt erscheinen; phosphorsaure Salze erzeugen jedoch auch hier ganz ähnliche Erscheinungen. Brechweinstein und Theeaufguß scheinen hier nicht hindernd einzuwirken, nur nimmt der Niederschlag durch den ersteren eine violette Färbung an. Kochsalzgehalt kann auf die oben angezeigte Weise beseitigt werden. Auch hier sey die Menge des salpetersauren Silbers nicht zu groß, weil das Silberoxyd durch die Kreide mit grauer Farbe, die allmälig in die dunkle übergeht, gefällt wird, und dadurch Irrthum veranlaßt werden kann.

5) Das mineralische Chamäleon. Die zuletzt roth bleibende Auflösung wird durch eine auch 100,000fach verdünnte Auflösung des weißen Arseniks ins Gelbe umgeändert. Dieselbe Erscheinung erfolgt aber auch durch Brechweinstein, Fleischbrühe und Zwiebelabsud; Theeaufguß wird dunkelbräunlich gefärbt. Schwefel- und salzsaures Eisen, essig- und salpetersaures Blei geben gelbe, wenn auch etwas anders gefärbte Niederschläge.

6) Aetzendes Queckfilbersublimat. Werden dem zu prüfenden Fluidum einige Tropfen Sublimatauflösung zugesetzt, und fällt bei Zutröpfelung von kohlensaurem Kali nicht das bekannte Queckfilberoxyd mit orangengelber Farbe nieder, sondern zeigt sich ein weißer Niederschlag, so ist Arsenik zugegen. Bei sehr geringen Quantitäten Arsenik fällt der Niederschlag mehr oder weniger blaßgelb aus, jedoch verschieden von der orangengelben Farbe. In diesem Falle ist das Verhältniß des Sublimats zum Arsenik zu groß gewesen, man löse daher alles wieder in Essigsäure auf, setze eine größere Menge des auf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0135-7

Arsenik zu prüfenden Fluidums hinzu, und verrichte die Fällung durch Kali von neuem. Da jedoch bekanntlich das Queckſilberſublimat ebenfalls weiß wird, ſobald Salmiak gegenwärtig iſt, ſo muß hierauf recht ſehr Rückſicht genommen werden.

7) Jod. Um zu entſcheiden, ob in einer giftigen Flüſſigkeit Arſenik oder ätzendes Queckſilberſublimat enthalten ſey, hat Brugnatelli (Schw. J. XX. S. 56.) folgendes Prüfungsmittel vorgeſchlagen. Man koche friſch bereitete Weizenſtärke in Waſſer bis zu einer gehörigen Dicke, hiezu ſetze man ſo viel Jod, daß die Maſſe eine blaue Farbe bekommt, und verdünne dann das Ganze mit reinem Waſſer, bis es ſchön azurblau wird. Bringt man in dieſe Maſſe einige Tropfen einer wäßrigen Auflöſung des Arſeniks, ſo wird die Farbe röthlich und verlöſcht endlich. Eine Auflöſung des Queckſilberſublimats bringt, zu Jod und Stärke gemiſcht, faſt dieſelben Veränderungen als das Arſenik hervor; ſetzt man aber der Flüſſigkeit, auf welche das Arſenik bereits gewirkt hat, einige Tropfen rectificirte, durchaus keine ſchweflige Säure enthaltende Schwefelſäure hinzu, ſo wird die urſprüngliche Farbe ſchöner noch, als ſie vorher war, wieder hergeſtellt. Hat man ätzendes Queckſilberſublimat in die Miſchung gebracht, ſo vermag Schwefelſäure keine Wiederherſtellung der Farbe zu bewirken.

Die Jodſtärke wird aber nicht nur durch ſchweflige Säure, ſelbſt im Minimum, ſo daß ſie das feinſte Reagens auf dieſe Säure iſt, entfärbt, ſondern auch durch Zwiebelabkochung, und hier wird die verſchwundene Farbe ganz wie beim Arſenik wiederhergeſtellt. Außerdem entfärben noch mehrere Stoffe die Jodſtärke, als die Blauſäure, das Cyanqueckſilber, das ſalpeterſaure Queckſilberoxydul.

Das ſchwefelſaure Eiſen, welches die Gegenwart des Arſeniks durch eine weißliche, ſchleimige, langſam niedergehende Wölkung anzeigen ſoll, iſt ein wenig empfindliches und trügliches Reagens, da dieſes Eiſenſalz mit Phosphorſäure ganz denſelben Niederſchlag giebt, auch durch die mehreſten Salze, wenn auch mit veränderten Farben, niedergeſchlagen wird.

Cooper hat eine Auflöſung des chromſauren Kalis empfohlen, deſſen Säure durch Abſetzung von Oxygen an die arſenige Säure in Oxyd mit grüner, durch Ammoniak nicht blau werdender (Kupfer) Farbe verwandelt wird. Dieſe Probe aber kann gleichfalls manche Täuſchungen veranlaſſen, und ſteht den andern nach.

Sämmtliche Reagentien können durch Beimiſchungen, wie angeführt worden, unſicher gemacht, und nur dann als beweiſend angeſehen werden, wenn Arſenik in Subſtanz vorgefunden und dieſer in deſtillirtem Waſſer aufgelöſt worden iſt. Man kann daher die Unterſuchung dadurch fortſetzen, daß man den durch Kalkwaſſer erzeugten Niederſchlag zwiſchen 2 polirte Kupferplatten bringt, dieſe mit Eiſendraht zuſammenbindet, und mit Kohlenpulver umgeben einer ſchwachen Rothglühhitze ausſetzt. Nach dem Auseinandernehmen findet man, wenn Arſenik in dem Niederſchlage enthalten war, bei beiden Platten an der Berührungsſtelle einen weißen Fleck (Weißkupfer),

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0136-3

welcher auch einem anhaltenden Scheuern nicht weicht. Kalomel und Sublimat geben zwar ganz ähnliche weiße Flecken, doch unterscheiden sich diese von den durch Arsenik hervorgebrachten dadurch, daß auf den Flecken sich eine Kruste gebildet hat, welche abgenommen beim Reiben auf der Oberfläche der Platten sich mit dem früheren Anfluge vereinigt, und ihn wieder weiß macht, auch die Flecken selbst bei starker anhaltender Hitze durch Verflüchtigung des Queckſilbers verschwinden, und dem Kupfer eine rauhe Oberfläche zurücklassen.

Diese Probe kann ziemlich als beweisend angesehen werden; $\frac{1}{20}$ Gran Arsenik konnte von mir aufs deutlichste erkannt werden.

Bei größeren Mengen kann man den Kalkniederschlag mit etwas Kupferfeile und etwas Kohlenpulver und Kali mischen, und in einem Tiegel, in dessen Boden ein kleines Grübchen gebohrt worden, und den man über die Hälfte mit Kochsalz zudeckt, einer halbstündigen Glühhitze aussetzen. Bei gehöriger Vorsicht wird man den kleinen weißen Metallkönig unter der geflossenen Decke auf dem Boden finden.

Ein anderer Theil des getrockneten Kalkniederschlages werde mit etwas Borax gemischt auf Kohle vor das Löthrohr gebracht; war Arsenik vorhanden, so wird sich ein knoblauchartiger Geruch entwickeln, durch den noch $\frac{1}{10}$ Gran erkannt werden kann. Der knoblauchartige Geruch ist nun zwar eine bezeichnende Eigenschaft des Arseniks, doch sind auch hier Täuschungen möglich, wenn nämlich Fremdartiges beigemischt war, welches beim Verbrennen gleichfalls einen Geruch entwickelt, unter dem sich der des Arseniks verliert; auch ist zu bemerken, daß Zink und Phosphor einen ähnlichen Geruch entwickeln. Wird dagegen Arsenik in Substanz vorgefunden, so gehört dieser Versuch zu den entscheidenden.

Die Hauptprobe aber, das **experimentum crucis**, welche als völlig beweisend nie fehlen darf, ist die Reduction. Hierzu werde der Kalkniederschlag, mit noch etwas Kalk vermischt, mit ganz trocknem schwarzem Fluß gemischt, und in eine enge, an dem einen Ende zugeschmolzene, und hier mit einem Teig aus Bolus und Sand beschlagene Glasröhre gebracht. Nachdem die Seiten derselben mit einer Feder gereinigt, und das offne Ende lose mit Papier, oder mit einem Stöpsel von falschem Golde, unächtem Blattgolde, mit dessen Kupfer das sich etwa verflüchtigende Arsenik Weißkupfer bilden wird, verschlossen ist, erhitze man das untere Ende eine Minute lang durch eine Weingeistlampe bis zum Rothglühen. Es werden sich knoblauchartig riechende Dämpfe erheben, und gleichzeitig wird sich an den Wandungen der Röhre ein Ueberzug von metallischem Arsenik mit Stahlglanz ungefähr $\frac{1}{4}$ Zoll über dem Boden der Röhre zeigen. Man durchschneidet nun an dieser Stelle die Röhre mittelst einer zarten Feile, trennt die Arsenikschuppen mit der Spitze eines Federmessers ab, oder wendet, wenn die Menge zu gering ist, den in Stücken zerbrochenen Theil der Röhre mit dem Anfluge selbst an, bringt etwas davon in einem kleinen Weinglase mit einigen Tropfen des aufgelösten **Cupri sulphurico-ammoniati** zusammen, reibt beide Theile einige Minuten lang mit einem Glasstäbchen zusammen, wo dann

die blaue Farbe der Mischung bald in die grüne übergehen, und die metallischen Blättchen verschwinden werden. Ist dieser Versuch vollständig gelungen, so ist das Vorhandenseyn des Arseniks bis zur völligen Gewißheit dargethan.

Die Reduction kann auch noch durch Galvanismus versucht werden, indem das Arsenik am — Pole in schwarzen Blättchen abgeschieden wird. Buchner (Repert. XXI. 1825. S. 14.) macht zwar mit Recht darauf aufmerksam, daß ein bedeutender Theil des Arseniks mit dem sich gleichfalls am — Pole entwickelnden Wasserstoffgase zugleich entweiche, und daß die Arsenikſäure noch hartnäckiger als die arsenige Säure der Reduction durch eine einfache elektro-chemische Kette widerstehe, daher denn auch Pleischl (Buchn. Repert. XXI. S. 443.) diese Prüfungsmethode für gar nicht zulässig erklärt; indessen kann ich hier nicht unbedingt beistimmen, indem es mir gelungen ist, noch $\frac{1}{10}$ Gran Arsenik auf diese Weise mit völliger Gewißheit nachzuweisen. Ein Kupferdraht, von dessen Enden das eine sich in einen Knopf (den Kupferpol), das andere in einen breiten Streifen endigt, werde mit seinem breiten Ende um ein in einer Glasschale befindliches Stück Zink gelegt, auf dieses eine an beiden Enden offene, unten aber mit Blase überbundene Glasröhre, welche die verdächtige Flüssigkeit, oder die durch Kalkwasser, Kupferammoniak, mineralisches Chamäleon ꝛc. erhaltenen, noch feuchten Niederschläge enthält, gestellt; hierauf werde der Kupferdraht umgebogen, und dergestalt in die Glasröhre gesteckt, daß der Pol mit dem Niederschlage in unmittelbare Berührung komme. In die Glasschale werde jetzt Salmiakwasser gegossen, und das Ganze der gegenseitigen Einwirkung überlassen. Nach 24 Stunden findet man in dem Kupferpol einen deutlichen grauschwarzen Anflug, der Kupferammoniak grün färbt.

Die Anwendung der angeführten Reagentien wird nicht selten schwierig durch die zufälligen Bestandtheile, welche die zu untersuchenden Flüssigkeiten, als die Contenta des Magens, der Gedärme ꝛc., enthalten. Gallerte schlägt zwar den Gerbestoff des Thees und Kaffees nieder, ohne auf das Arsenik zu wirken, Oeltheile können durch die Capillarthätigkeit von Dochtfäden abgeschieden werden, indessen bleiben doch die Flüssigkeiten nicht selten noch so gefärbt, daß die durch Reagentien hervorgebrachten Farben nicht erkannt werden können; auch hindert oft die schleimige Beschaffenheit die Ausscheidung der Niederschläge. Um dieses Hinderniß zu heben, wird (Buchn. Repert. XXIV. S. 444.) vorgeschlagen, die Flüssigkeit bis zum Sieden zu erhitzen, oder, wenn dies nicht hilft, Kochsalz oder Salmiak zuzusetzen, wobei jedoch auf das früher Vorgetragene Rücksicht zu nehmen ist. Orfila schlägt vor, die Farbe durch Chlor, Phillips, durch Digestion mit thierischer Kohle zu zerstören. Ersteres entfärbt indessen selten vollkommen, ändert auch leicht die arsenige Säure in Arsenikſäure um; durch die thierische Kohle wird aber oft alles Arsenik mit niedergerissen. Am zweckmäßigsten ist noch das von Rose empfohlene Kochen mit Salpetersäure, welche die organischen Theile zerstört, ohne sogleich Arsenikſäure zu bilden. Ich habe fol-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0138-4

gendes Verfahren anwendbar gefunden (Berl. Jahrb. XXIII. S. 198.). Die verdächtige Flüssigkeit werde sämmtlich mit Kalkwasser niedergeschlagen, der Niederschlag ausgewaschen, und auf einem Filter gesammelt. Die Hälfte desselben werde mit saurem oxalsaurem Kali (Kleesalz), welches mit kohlensaurem Kali bis zur hervorstechenden Basis versetzt worden, in dem Verhältnisse 9 : 10, d. h. 9 Th. Niederschlag und 10 Th. Kleesalz, gemengt, mit destillirtem Wasser übergossen und gekocht. Durch gegenseitige Zersetzung wird unauflöslicher oxalsaurer Kalk und auflösliches arsenigsaures Kali gebildet werden. Die Flüssigkeit wird abgegossen und der Bodensatz ausgewaschen. Sollte die klar filtrirte und beinahe ganz ungefärbte Flüssigkeit einen bedeutenden Antheil unzersetztes opalsaures Kali enthalten, so kann dieses durch Krystallisation geschieden werden; doch hindert es auch nicht die Empfindlichkeit der Reagentien, nur wird die Probe mit Kalkwasser dadurch unzulässig.

Ist kein Fluidum zur Untersuchung vorhanden, so müssen der Magen, die Gedärme u. s. w. ausgekocht werden. Christison wendet bloß reines Wasser an, indessen ist dieses nicht als hinreichend anzunehmen, vielmehr ein Zusatz von kaustischem oder kohlensaurem Kali anzuwenden, und sollte die Vergiftung durch Schwefelarsenik geschehen seyn, so muß die Abkochung mit Königswasser geschehen.

Wollaston concentrirt die verdächtige Flüssigkeit, oder dampft bis zur Trockne ab, um die vorhandenen organischen Stoffe durch Salpetersäure zu zerstören. Die klare Flüssigkeit wird auf eine Glastafel gebracht, und nach verschiedenen Richtungen in Linien ausgezogen. In eine dieser Linien bringt man ein wenig schwaches flüssiges Ammoniak, und spritzt dann mit Hülfe eines Haarpinsels etwas schwache salpetersaure Silberauflösung auf. Indem man das Glas in verschiedenes Licht bringt, es entweder auf weißes Papier legt, oder schräg vor die Augen hält, so kann man die geringste Veränderung der Farbe bemerken. Auf eine andere Linie der Flüssigkeit läßt man das Kupferammoniak, auf eine dritte schwefelwasserstoffhaltiges Wasser, auf eine vierte Kalkwasser ꝛc., und auf die gegenüberstehenden Ränder des Ganzen die Poldrähte einer galvanischen Kette einwirken. Auf diese Weise kann man mit einem einzigen Tropfen der Giftauflösung eine große Reihe genauer Versuche anstellen, welche jedoch voraussetzen, daß der Experimentator mit dergleichen Versuchen bekannt sey.

Smithson hat vorgeschlagen, den verdächtigen Stoff mit Salpeter zu verpuffen, und die dadurch gebildete Arsenikſäure durch salpetersaures Silber nachzuweisen.

Berzelius (Poggendorff's Annalen 1826. 1. S. 71.; Berz. Chemie, übers. von Wöhler 1825. 2ten Bandes 1ste Abth. S. 48.) erklärt die Zurückführung des Arseniks in den metallischen Zustand für den einzigen untrüglichen Beweis der Anwesenheit dieses Giftes, und giebt hierzu vollständige Anleitung.

Wenn arsenige Säure in Körnern vorgefunden wird, so schreitet man


sogleich zur Reduction. Ein Stück Barometerröhre zieht man in eine feinere Röhre von dem Durchmesser einer dicken Stricknadel aus, und schmelzt die feinere Röhre



einige Zoll weit von der Ausziehungsstelle zu. In das zugeschmelzte Ende a bringt man dann ein Korn der verdächtigen Substanz, und darauf schüttet man bis zu b Pulver von Kohle, welche man kurz zuvor in der Löthrohrflamme ausgeglüht hat, so daß alle Feuchtigkeit daraus verjagt worden ist. Hierauf hält man die Röhre auf eine solche Art horizontal in die Flamme einer Spirituslampe, daß a, worin das Arsenikkorn liegt, außerhalb der Flamme bleibt. Wenn nun die Kohle bei b glüht, so wird auch a in die Flamme gebracht, wodurch die arsenige Säure in Gas verwandelt und während ihres Durchganges durch die glühende Kohle reducirt wird. Das metallische Arsenik condensirt sich in der schmalen Röhre gleich da, wo sie aus der Flamme tritt, in Gestalt eines glänzenden, dunkel metallischen Ringes, welcher durch gelinde Erhitzung noch weiter vorgetrieben und mehr angesammelt werden kann, wodurch er noch spiegelnder und heller wird. Man schneidet die Röhre vor der Stelle, wo das Metall sitzt, ab, und erhitzt sie dann, während man in einigem Abstande die Nase darüber hält, wobei sich der Arsenikgeruch stark und deutlich zu erkennen giebt. Jedes Körnchen arseniger Säure, welches so groß ist, daß es von der Stelle, wo es liegt, in die Röhre gebracht werden kann, ist hinreichend, um ein zuverlässiges Resultat zu geben.

Ist kein Arsenik in Substanz vorhanden, so werden die Contenta und der zerschnittene Magen mit Wasser und einigen Drachmen ätzendem Kali gekocht, die Flüssigkeit wird mit Salzsäure (nicht mit Salpetersäure) übersättigt, filtrirt, und durch dieselbe dann ein Strom von Schwefelwasserstoffgas geleitet. Enthielt die Flüssigkeit Arsenik, so wird sie nach einer Weile gelb, worauf sich Schwefelarsenik als ein gelbes Pulver niederschlägt. Ist der Arsenikgehalt sehr geringe, so wird die Flüssigkeit gelb, ohne gefällt zu werden; wird sie dann aber abgedampft, so scheidet sich Schwefelarsenik aus in dem Grade, als sich die Säure während des Verdampfens concentrirt. Scheidet sich auch jetzt nichts ab, so kann die gelbe Farbe allein nicht als Beweis für die Gegenwart von Arsenik gelten. Diese Färbung trifft fast immer ein, wenn die Flüssigkeit Salpetersäure enthält, welche, zu salpetriger Säure reducirt, die aufgelösten thierischen Stoffe gelb färbt. Die Flüssigkeit wird durch ein sehr kleines Filtrum filtrirt, und das Schwefelarsenik wird ausgewaschen. Ist seine Menge so gering, daß es nicht vom Filtrum abgenommen werden kann, so wird es mit Aetzammoniak darin aufgelöst, welches dann auf einem Uhrglase verdampft wird, wobei es als Schwefelarsenik zurückbleibt, und von dem Glase gesammelt werden kann. Es wird hierauf dadurch in Arsenikſäure verwandelt, daß man dasselbe nach und nach

in kleinen Portionen auf Salpeter wirft, welcher in einer an dem einem Ende zugeblasenen Glasröhre in geschmolzenen Zustand gebracht ist. Das Schwefelarsenik oxydirt sich mit geringem Aufbrausen und ohne Feuererscheinung, worauf das übrigbleibende Salz in einigen Tropfen Wasser aufgelöst, die Auflösung mit Kalkwasser im Ueberschusse versetzt und zum Kochen erhitzt wird, wodurch sich der arsenikſaure Kalk besser sammelt. Er wird gelind geglüht, hierauf mit frisch geglühter Kohle vermischt, und in eine an dem einen Ende zugeschmolzene, und eine Strecke weit davon ausgezogene Glasröhre gelegt, so daß das Gemenge in a zu liegen kommt.



Die Röhre wird zuerst gelind zur Verjagung aller der Feuchtigkeit erhitzt, welche das Gemenge eingesogen haben könnte, und hierauf wird der Boden von a in die Löthrohrflamme bis zum anfangenden Schmelzen des Glases gebracht. Das Arsenik wird dann reducirt, und sammelt sich in dem schmalen Stücke b an, wo es über eine so geringe Fläche vertheilt ist, daß die geringsten Mengen erkannt werden können. Schwefelarsenik, welches nicht mehr als $\frac{1}{10}$ Gran wiegt, ist hinreichend, um eine entscheidende Reactionsprobe zu geben.

Bei so scharfen Proben, wie diese, wobei selbst kleine Spuren der Entdeckung nicht entgehen, muß man wohl überzeugt seyn, daß die angewandten Reagentien kein Arsenik enthalten, indem es leicht der Fall ist, daß die Salzsäure arsenikhaltig ist, weil die zur Bereitung derselben angewandte Schwefelsäure sehr häufig aus arsenikhaltigem Schwefel oder arsenikhaltigen Kiesen bereitet ist. Man muß deshalb zuvor untersucht haben, ob sowohl die zur Entwickelung des Schwefelwasserstoffgases angewandte Schwefelsäure, als auch die Salzsäure arsenikfrei seyen, dadurch, daß man einen Strom Schwefelwasserstoffgas hindurch leitet.

Bei einer Vergiftung mit Arsenikſäure reagirt das Schwefelwasserstoffgas nur schwierig und unvollständig. Man übersättigt dann die saure Flüssigkeit mit wasserstoffgeschwefeltem Schwefelammonium, erwärmt sie eine Stunde lang, und fällt sie dann mit Salzsäure, worauf der Niederschlag, welcher in diesem Falle nur Schwefelarsenik seyn kann, auf die angeführte Weise behandelt wird. Enthielt er keinen Arsenik, so bewirkt Kalkwasser keinen Niederschlag.

Berzelius erinnert noch dabei, daß kein Arzt oder Chemiker ein gesetzlich bestätigtes Zeugniß über eine solche Untersuchung, wobei Gift gefunden worden war, abliefern sollte, wenn er nicht selbst beim Herausnehmen der Masse gegenwärtig gewesen ist, oder wenn sie nicht in der Gegenwart gültiger Zeugen herausgenommen und sogleich mit den Siegeln und der Aufschrift dieser Zeugen versehen und bestätigt war, um hierdurch allen Unterschleifen auszuweichen.

Artemisia. Die Wurzel. Beifußwurzel.

Artemisia vulgaris Linn. Eine ausdauernde in Deutschland häufige Pflanze.

Die kegelförmige, gekrümmte, an der Spitze in mehrere lange Aeste getheilte Wurzel, abwärts sehr zahlreiche und verlängerte Aeste ausschickend, der Länge nach etwas runzlig, außen von brauner, innen von weißer Farbe, von erdigem Geruche, süßlichem, schleimigem, zuletzt scharfem Geschmacke. Im Herbste zu sammeln.

Artemisia vulgaris. Gemeiner Beifuß.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Eine überall an Wegen, Zäunen und wüsten Stellen gemeine Pflanze.

Der perennirende Wurzelstock löst sich in viele lange ästige gelblichweiße Fasern auf, und treibt an seiner Spitze mehrere Stengel. Diese sind aufrecht, etwas eckig, glatt, ästig, 4—5 Fuß hoch, der Länge nach gestreift, bei einigen Pflanzen roth, bei andern weiß. Die Wurzelblätter sind gestielt, herzförmig, stumpf, dreilappig, gezähnt; die Stengelblätter sind doppelt gefiedert-zerschnitten (bipinnatifida); die Abschnitte sind lancettförmig, zugespitzt, mehr oder minder gezahnt; nach der Spitze des Stengels hin werden die Blätter einfach gefiedert-zerschnitten, mit linien-lancettförmigen Abschnitten, und in der Nähe der Blüthen bleiben nur diese als die ganzen Blätter übrig. Alle sind oben grün und glatt, unten aber mit einem weißen seidenartigen Filze bedeckt. Die kleinen Blüthen sind festsitzend, ährenförmig an den Spitzen des Stengels und der Zweige zusammengehäuft.

Die Pflanze blüht im Juli und August.

Die Wurzel ist in neuerer Zeit von Dr. Burdach in Triebel und Dr. Gräfe (Hufel. Journ. 1824. April S. 78., Mai S. 115., December S. 30.; Gräfe und Walther Journ. VI. 2. S. 357.; Hufel. Journ. October und November 1825 und Januar 1826.) als ein wirksames Antiepilepticum empfohlen worden. Sie muß im Frühjahre oder Herbste gesammelt, durchaus nicht abgewaschen, sondern behutsam getrocknet und sogleich gepulvert, in verschlossenen Gefäßen, vor dem Einflusse des Lichts und der Luft geschützt, aufbewahrt werden. Frisch hat sie einen schwachen, sorgfältig getrocknet einen specifischen starken Geruch. Der Rindentheil oder vielmehr die Fasern werden für vorzüglicher gehalten, als der holzige Theil und überhaupt der Wurzelstock.

Die Herren Brez und Elieson (Taschenb. 1826. S. 57.) haben eine Analyse der Wurzel veranstaltet. Durch Destillation mit Wasser erhielten sie ein auf dem Wasser schwimmendes krystallinisches Oel, von gelblicher ins Grünliche spielender Farbe, einem höchst durchdringenden, ganz specifi-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0142-5

schen Geruche, und einem ekelhaft bitterlichen, anfänglich brennenden, dann kühlenden Geschmacke und butterartiger Consistenz.

Der aus der frischen Wurzel gepreßte Saft ließ beim Sieden etwas Pflanzeneiweiß ausscheiden.

Durch Digestion der getrockneten Wurzel mit absolutem Alkohol, und Abziehen des Weingeistes von den braun gefärbten Tincturen, die beim Erkalten nichts absetzten, wurde ein geistiges Extract erhalten, aus welchem sich zwei verschiedene Substanzen absonderten: eine ölartige schwarze, und eine dunkelbraune extractförmige. Als dieses Extract mit siedendem Aether behandelt wurde, lagerten sich drei verschiedenartige Substanzen auf einander: eine schwarzbraune, dickflüssige, ölartige nach unten, eine grünlich gefärbte, flockige in der Mitte, und die mit Aether verbundene stand oben auf. In einem mit kochendem Wasser umgebenen Scheidetrichter abgesondert, verhält sich die untere wie Schleimzucker mit einer Pflanzensäure innig verbunden, wodurch die leichte Auflöslichkeit derselben in Alkohol erklärlich ist. Die gelbgrünliche flockenartige Substanz, durch ein Filtrum von der ätherhaltigen Flüssigkeit abgesondert, war butterartig, sehr schmierig, hatte einen unangenehmen, starken, ganz specifischen Geruch, einen ekelhaften, ungemein kratzenden, Husten erregenden Geschmack, röthete Lackmuspapier, und war in Aether, absolutem und 80procentigen Alkohol, Aetzkali und Säuren unauflöslich, in Terpenthinöl größtentheils, in Mandelöl leicht auflöslich, überhaupt ein austrocknendes Pflanzenfett mit vielleicht einem kleinen Antheile Cerin.

Aus der ätherhaltigen Flüssigkeit schied sich beim Abrauchen zur Syrupsconsistenz eine ölartige, dunkel schwarzbraun gefärbte, obenauf schwimmende Substanz aus, die, durch einen Scheidetrichter geschieden, in Aether, Alkohol, fetten und ätherischen Oelen und in Aetzlauge leicht auflöslich war, und sich wie ein Weichharz verhielt. Die andere dunkelbraun gefärbte Flüssigkeit wurde in destillirtes Wasser geschüttet, wo sich ein hellgelber flockiger Niederschlag bildete, der sich wie ein harziger Farbestoff verhielt. Das abfiltrirte Wasser war hellgelb von Farbe, röthete Lackmuspapier und enthielt salzsauren und äpfelsauren Kalk.

Der Wurzelrückstand wurde ausgekocht, die Decocte wurden abgeraucht, das Extract mit Aether digerirt, welcher noch Weichharz auszog, dem ein adstringirender in Wasser löslicher Stoff mit äpfels., salzs. und kleesaurem Kali und Kalksalzen beigemischt war. Beim Abrauchen der Decocte hatte sich eine graubraune flockige Substanz abgelagert, welche die Verfasser für Kleber (?) erklären. Das mit Aether behandelte wäßrige Extract ließ beim Auflösen in kochendem destillirten Wasser noch etwas Kleber zurück; aus den mit der klaren Auflösung angestellten Prüfungen mit Reagentien ließ sich sicher schließen, daß sie aus einem gerbestoffartigen Extractivstoff und Pflanzengummi mit schwefels. und salzs. Kali und Kalksalzen und etwas Stärkemehle bestehe.

Der Wurzelrückstand wurde noch mit Salzsäure ausgekocht, und dadurch schwefels. und salzs. Kalk, schwefels. Kali, schwefels. Talkerde und Anzeigen eines metallischen Körpers erhalten.

Die eingeäscherte Pflanzenfaser gab salzs. Kalk, schwefels. Kali, schwefels. Talkerde, viel Eisen, phosphors. Kalk und Kieselerde.

Resultate der Analyse: 1) Krystallinisches Oel; 2) Pflanzeneiweiß; 3) Schleimzucker; 4) austrocknendes Pflanzenfett; 5) Cerin; 6) Weichharz; 7) harziger Farbestoff; 8) adstringirender Stoff; 9) Kleber; 10) gerbestoffhaltiger Extractivstoff; 11) Eisen grau fällender Gerbestoff; 12) Pflanzengummi; 13) Faserstoff; Kali, Kalk, Talkerde, Kieselerde, Eisenoxyd, Kleesäure, Aepfel-, Schwefel-, Salz- und Phosphorsäure.

Diese Wurzel wird in Pulverform, und zwar in Dosen von 30—40 Gran gegeben. Die getrockneten Blätter dieser Pflanze, und vorzüglich die weiche Wolle, welche unten an den Blättern des Beifußes wahrgenommen wird, nach Andern die innern wolligen Fibern des Beifußes, welche durch Stoßen, Reiben zwischen den Händen und Kämmen von der Rinde und den übrigen Theilen abgesondert werden, sollen die berühmte Mora der Chinesen und Japaner abgeben.

Der Aberglaube ertheilte diesem Kraute, in die Schuhe gesteckt, die Kraft, die Müdigkeit im Gehen zu verhüten, daher der Name Beifuß.

* Arum. Die Wurzel. Aronswurzel.

Arum maculatum. Gemeiner Aron.

Linn. Cl. XX. Gynandria. Ord. 4. Polyandria.

Juss. Cl. II. Ord. 1. Aroideae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst fast in allen Gegenden des südlichen Europas an schattigen und feuchten Orten.

Die Wurzel besteht aus einem fleischigen, weißen, haselnußgroßen Knollen, welcher nach unten mit Wurzelfasern besetzt ist. Der Schaft ist rund, 6—7 Zoll hoch, und nach unten mit häutigen Scheiden umgeben. Die Blätter, vom Wurzelhalse entspringend, sind langgestielt, 9—10 Zoll hoch, pfeilförmig, am Rande ungetheilt, oben grün und glänzend, bisweilen schwarz gefleckt.

Die Blume, merkwürdig durch ihre Gestalt und ihren Bau, zeigt statt des Kelches eine häutige, einblättrige, außen grünliche, inwendig bleiche oder weißliche, sehr breite, gerad ausstehende Blumenscheide, in Form eines Eselsohrs, so daß ihre Ränder sich vorwärts gegen einander beugen. Sie endigt sich oben in eine scharfe Spitze. In der Mitte ragt ein einfacher Kolben hervor, welcher kürzer ist als die Scheide, und nach Wegnahme derselben noch deutlicher zum Vorschein kommt. Er ist keilförmig, anfangs weißgelblich, dann röthlich oder purpurfarbig, von sehr dichter Substanz, wird nach und nach dünner, und hat an seinem untern Ende viele Fäden stehen.

Die länglich eirunde, allenthalben mit kleinen Kanten versehene, auswendig gelblichweiße, inwendig weiße Wurzel ist frisch von einem äußerst scharfen, dem spanischen Pfeffer ähnlichen, brennenden Geschmacke, beim Zerquetschen durch den Dunst Nase und Auge heftig reizend, auf die Haut gelegt rothmachend und blasenziehend. Im Keller in Sand eingegraben behält sie

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0144-7

diese Schärfe ein Jahr lang, sie verliert aber dieselbe durchs Trocknen größtentheils, und durch langes Liegen gänzlich, so daß sie dann schneeweiß, ganz mehlig wird, und fast wie Kreide abfärbt.

Die Schärfe liegt in einem Milchsafte, welcher sehr purgirend wirkt, und den Tod herbeiführen kann.

Die Wurzel kommt gewöhnlich in den Apotheken von der äußern Haut befreit vor; wenn sie nicht sehr alt ist, so entwickelt sie beim Kauen noch einige Schärfe.

Bucholz (Almanach 1810. S. 122.) hat die trockne Wurzel zerlegt, und 1000 Th. zusammengesetzt gefunden aus: Stärkemehl 714; traganthähnlichem Stoff 180; Gummistoff 56; schleimzuckerartigen Pflanzenseifenstoff 44; besonderem fetten Oele 6.

Da diese Analyse nicht mit frischen Wurzeln vorgenommen werden konnte, so kann sie auch über den eigentlich wirksamen Bestandtheil, das flüchtige Princip, keinen Aufschluß geben; er scheint aber alkalischer Natur zu seyn, da der aus den frischen Wurzeln gepreßte Saft den Veilchensaft grün färbt.

Die Wurzel wurde sonst häufig in Pulverform verordnet, jetzt wird sie nur noch selten gebraucht.

Asa foetida. Stinkender Asand.

Der an der Luft eingedickte Saft aus der durchgeschnittenen Wurzel der **Ferula Asa foetida Kaempf.**, einer perennirenden Pflanze Persiens.

Ein Gummiharz, in außen rosenfarbig-braunen, innen weißlichen, meistentheils unter sich zusammengebackenen, bisweilen etwas durchscheinenden Stücken oder Körnern, von einem Fettglanze, zähe, unter den Fingern sich erweichend, von einem scharfbitterlichen Geschmacke, und knoblauchartigen ekelhaften Geruche. In Wasser wird es zum Theil mit weißlicher trüber, in Alkohol zum Theil mit gelbröthlicher klarer Auflösung aufgelöst.

Ferula Asa foetida. Stinkasand-Seckenkraut.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der Stinkasand, Teufelsdreck, war seit langer Zeit her als Arzneimittel geschätzt, doch wußte man nichts Genaues von der Pflanze, die ihn lieferte. Kämpfer reiste im Jahre 1687 nach Persien, von wo nämlich der Asand bezogen wurde, und bestimmte die Pflanze.

Diese Pflanze wächst auf den Gebirgen der persischen Provinzen Chorasan und Laar.

Die Wurzel ist spindelförmig, der Pastinakwurzel ähnlich, bald einfach, bald ästig, mit einer dunkelschwarzen Rinde bedeckt, innen weiß. Die Blätter sämmtlich an der Wurzel stehend, gestielt, dreifach dreizählig, einiger-

maßen den Päonienblättern ähnlich. Aus der Mitte der Wurzelblätter erhebt sich ein nackter, walzenrunder, gestreifter, 5—6 Fuß hoher Stengel, mit häutigen Scheiden besetzt. Die blaßgelben Blüthen bilden große, 12—20 strahlige Dolden.

Die Wurzel enthält einen milchigen Saft, welcher ausgetrocknet den Asand liefert. Zur Gewinnung desselben wählt man die Wurzeln, welche wenigstens 4 Jahr alt und dicker als ein Arm sind. Der obere Theil solcher Wurzeln wird von der Erde befreit, und die Wurzel dann oben queer durchgeschnitten. Der Milchsaft, der in Menge herausquillt, trocknet durch die Sonnenhitze ein, worauf selbiger weggenommen und die Operation so lange wiederholt wird, bis die Wurzel keinen Saft mehr giebt. Nach Andern hat der frische aus der Wunde herausquellende Saft eine Neigung in Fäulniß überzugehen, und muß daher sorgfältig vor der Sonne geschützt werden.

Der frische Asand soll nach Kämpfer einen so außerordentlich starken Geruch besitzen, daß eine Drachme frischer flüssiger Saft stärker riecht, als 100 Pfund trockner Asand. Je länger man ihn aufbewahrt, desto schwächer wird der Geruch. Die Perser müssen zum Transport dieser Waare entweder besondere Schiffe miethen, damit nicht die andern Waaren von dem Geruche durchdrungen und verdorben werden, oder die mit Asand angefüllten Säcke oben an den Mastbaum hängen.

Wir erhalten den Stinkasand in unförmlichen Massen von verschiedener Größe. Für die beste Sorte hielt man diejenige, welche in einer bräunlichen, stellenweise röthlichen Masse viele mandelförmige Stücke von weißlicher Farbe, die auf dem Bruche glänzend, muschlig, undurchsichtig sind, die nach einiger Zeit auf dem frischen milchweißen Bruche durch den Einfluß der Luft eine pfirsichblüthrothe oder auch violettrothe Farbe annehmen, an der Lichtflamme mit dem eigenthümlichen Geruche fast so leicht wie Campher brennen, wobei sie eine geringe, leichte, etwas glänzende Kohle zurücklassen, eingemengt hält. Spec. Gew. = 1,300.

Außer dieser besten Sorte kommen auch noch schlechtere Sorten im Handel vor, welche desto schlechter sind, je mehr die Masse feucht, schmierig, dunkelbraun, fast schwärzlich, mit vielen Unreinigkeiten vermengt, auch gewöhnlich viel schwerer ist. Auch soll eine völlig verfälschte Asa foetida, aus Harz mit Knoblauchssaft angestoßen, vorkommen. Der Mangel der Eigenschaften des guten Asands, die Sprödigkeit, der stark glänzende Bruch, und die vollkommene Auflöslichkeit in Weingeist, so wie der Geruch beim Verbrennen werden den Betrug erkennen lassen. Ferner will man eine Vermengung mit Ammoniakgummi bemerkt haben (Martius in Buchn. Repert. XV. 1. S. 72.) und zwar in der Art, daß die Stücke fest in einander geflossen sind, so daß es wahrscheinlich wird, diese Verfälschung finde schon im Mutterlande statt. Trommsdorff (dessen J. 1. 2. S. 137.) erhielt aus 4 Unzen Asand 30 Gran leichtes und 20 Gran schweres ätherisches Oel; und 1000 Th. bestehen nach dieser Analyse aus: ätherischem Oele 31; Schleimstoff 500; Harz 240; Holzfaser und Unreinigkeiten 229.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0146-8

Nach einer Analyse von Pelletier bestehen 100 Th. aus: Harz 65,00; Gummi 19,44; Bassorin (Traganthstoff) 11,66; ätherischem Oele 3,60; saurem äpfelsauren Kalke (eine Spur) und Verlust 0,30.

Brandes (Buchn. Repert. VII. 1. S. 120.) hat in 100 Th. folgende Bestandtheile angegeben: in Weingeist und Aether lösliches Harz 47,25; nicht in Aether lösliches Harz 1,6; flüchtiges Oel 4,6; lösliches Gummi mit Spuren von äpfels., essigs., phosphors. und schwefels. Kali und Kalk 19,4; Bassorin 6,4; Extractivstoff mit essigs. und äpfels. Kali 1,0; äpfels. Kalk mit etwas Harz 0,4; schwefels. Kalk mit wenig schwefels. Kali 6,2; kohlens. Kalk 3,5; Eisenoxyd und Alaunerde 0,4; Wasser 6,0; Sand und Holztheile 4,6. S. = 101,35.

Nach Hatchett liefert der Asand mit Salpetersäure und mit Vitriolöl künstlichen Gerbestoff. Trommsdorff hatte, als er Salpetersäure über das von ihm ausgeschiedene Harz abzog, Kleesäure in ziemlicher Menge und Phosphorsäure erhalten. Diese letztere Säure wäre vielleicht als durch Oxydation des Phosphors entstanden anzusehen, doch ist dieser nicht weiter als Bestandtheil des Asands nachgewiesen. Wohl aber enthält derselbe Schwefel, wie Zeise (Schw. N. J. XVI. 3. 1826. S. 324.) bewiesen hat. Als Asa foetida mit einer Auflösung von kaustischem Kali behandelt, nachher etwas Säure hinzugefügt und ein Streifen mit Bleiauflösung getränkten Papiers über die aufbrausende Masse gehalten wurde, so färbte sich das Papier ganz deutlich wie im Schwefelwasserstoffgase. Ein geistiges Extract der Asa foetida mit Königsscheidewasser behandelt gab eine schwefelsäurehaltige Flüssigkeit. Das ätherische Oel der Einwirkung des Kaliums ausgesetzt, und die Masse nach und nach bis zum Rothglühen erhitzt, gab eine Mischung von Kohle und einer großen Menge von Schwefelkalium.

Auch Angelini (Kastn. Arch. IX. 1. 1826. S. 101.) macht darauf aufmerksam, daß Stinkasand enthaltende versilberte Pillen nach einiger Zeit ihren Metallglanz verlieren und schwarz werden. Durch Destillation mit Wasser erhielt A. aus einem Pfunde Asand, neben einem milchweißen Wasser, ein strohgelbes, sehr flüssiges, stark riechendes flüchtiges Oel, welches mit Quecksilber zusammengerieben nach einiger Zeit dieses gelb färbte, welche Farbe nach einigen Stunden verschiedene Abstufungen hindurch und in Schwarz überging, wobei sich eine geringe Menge eines schwarzen Pulvers absetzte, überhaupt den angestellten Versuchen zufolge als Schwefel enthaltend nachwies.

Setzt man den Stinkasand dem Einflusse des Lichts und der Luft aus, so verändert sich seine natürliche Farbe in wenigen Tagen, er wird zuerst rosenfarben, dann weinroth, violett und zuletzt braun, welche Veränderungen auf Absorption des Sauerstoffs aus der Luft hinzudeuten scheinen. In dem Maße, wie er mehr braun wird, verliert er auch seinen eigenthümlichen Geruch; zugleich bilden sich einzelne nadelförmige krystallinische Auswüchse, mit deren Wachsthum die Zunahme seiner Härte und die Abnahme seiner Riechbarkeit im Verhältniß steht, so daß er endlich fast Steinhärte gewinnt. Diese krystallinischen Auswüchse sind schwefelsaurer Kalk.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0147-4

Zum pharmaceutischen Gebrauche muß der Stinkasand pulverisirt, und durch Absieben von den etwanigen Unreinigkeiten befreit werden. Dieses kann aber nur in der Winterkälte geschehen, in welcher er spröde wird und gestoßen werden kann.

Man giebt den Asand am häufigsten in Pillen, weil auf diese Weise der widerliche Geruch und Geschmack am besten versteckt wird. Für sich kann er schon mit einigen Tropfen Weingeist zur Masse angestoßen werden; werden Extracte zugleich verordnet, so muß auch, der bessern Consistenz der Masse wegen, ein vegetabilisches Pulver zugesetzt werden. Soll der Asand in flüssiger Form verordnet werden, so läßt man ihn mit Eidotter und Wasser abreiben, oder wählt den geistigen Auszug. Außerdem wird der Asand im Klystier, Pflaster ꝛc. verordnet, und geht in verschiedene pharmaceutische Präparate ein.

Die uns so widerliche **Asa foetida** wird von den Persern zur Würzung ihrer Speisen und Getränke benutzt; ja auch in Europa hat dieses Gewürz, welches einigermaßen dem Knoblauch ähnlich ist, bisweilen Beifall gefunden.

Asarum. Die Wurzel. Haselwurzel.

Asarum Europaeum Linn. Eine ausdauernde in Wäldern wachsende Pflanze Deutschlands.

Die im Knie gebogene, der Länge nach runzlige Wurzel, mit weißer äußerer und brauner innerer, das weiße Holz wie eine Linie umgebender Rinde, sehr zahlreiche dünne verschlungene Wurzelzasern ausschickend, graulichbraun, von bitterm, scharf widerlichem Geschmacke und Niesen erregendem Geruche. Im Monat August einzusammeln.

Asarum Europaeum Linn. Europäische Haselwurz.
Linn. Cl. XI. Dodecandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. V. Ord. 1. Aristolochiae.

Das Haselkraut wächst durch ganz Deutschland und auch im übrigen Europa in schattigen hochliegenden Wäldern unter kleinen Gebüschen, besonders unter Haselsträuchern. Die Wurzel ist kriechend und von der Dicke eines Strohhalmes. Die Stengel sind klein, kaum einen Zoll hoch, zottig, etwas liegend, und endigen sich in zwei auf 3—4 Zoll hohen Stielen befindliche Blätter, aus deren Theilung die Blume sich erhebt. Die Blätter sind nierenförmig, ganzrandig, oben glänzend, glatt und von dunkelgrüner Farbe, unten aber bläßer, mit netzförmigen Adern durchzogen, und zuweilen etwas behaart. Die Blüthen stehen einzeln auf kurzen Stielen, sind klein und von schwarz purpurrother Farbe.

Die Pflanze blüht im März und April.

Es werden von dieser Pflanze die Blätter, vorzüglich aber die Wurzel

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0148-0

benutzt. Diese hat einen scharf bittern, ekelhaften, erhitzenden Geschmack, und einen dem Baldrian etwas ähnlichen, einigermaßen gewürzhaften Geruch. Durch das Trocknen werden Geruch und Geschmack beträchtlich vermindert, und bei langem Liegen gehen beide fast gänzlich verloren, daher sie je älter desto unkräftiger wird.

Es sollen zwar nur die Wurzeln eingesammelt werden, gewöhnlich findet man aber die Wurzel mit den jungen Blättern; auch werden die Blätter für noch wirksamer gehalten, als die Wurzel.

Die Wurzel des Märzveilchens (Viola odorata), mit der die obige Wurzel verwechselt werden könnte, unterscheidet sich durch ihre gelblichgrüne Farbe und Geruchlosigkeit.

Görz (Pfaff Mat. med. III. S. 229.) erhielt bei der Destillation der Wurzel mit Wasser ein milchiges, stark riechendes, ekelhaft scharf und campherartig schmeckendes Destillat, aus welchem sich das zu einer campherähnlichen Masse verdickte ätherische Oel (Haselwurzcampher) während des Destillirens in kleinen weißen Körnern, und nach dem Erkalten binnen einigen Tagen in weißen, langen, zarten, spießartigen Krystallen, nach Lassaigne und Feneulle (Trommsd. N. J. V. 2. S. 71.) in viereckigen, perlfarbenen und durchsichtigen Tafeln absetzte. Diese Substanz war in Weingeist auflöslich und hinterließ beim Verflüchtigen auf Papier einen Fettfleck. Der Geruch war campherartig und dabei auch eigenthümlich gewürzhaft. Lassaigne und Feneulle geben folgende Bestandtheile der Haselwurzel an: 1) ein flüchtiges krystallisirbares Oel; 2) ein sehr scharfes fettes Oel; 3) eine gelbe Materie, ähnlich der Cytisine (siehe Arnica. Die Blumen), in welcher die Eigenschaften der Haselwurzel zu liegen scheinen; 4) Satzmehl; 5) Schleim; 6) Ulmin; 7) Citronensäure; 8) saurer citronensaurer und äpfelsaurer Kalk; 9) ein essigs. Salz, ein Ammoniakalsalz und Mineralsalze.

Der Aufguß der Haselwurzel ist röthlichbraun, durchsichtig und brechenerregend; die Abkochung ist nicht mehr brechenerregend, dagegen noch purgirend. Das ekelerregende Princip scheint daher flüchtig zu seyn, wogegen die purgirende Eigenschaft mehr in dem der Cytisine ähnlichen, in Weingeist und Wasser auflöslichen Stoffe zu beruhen scheint. Auch wird das Pulver, welches niesenerregend ist, in Gaben zu 10—20—30 Gran gegeben.

* Asparagus. Die Wurzel. Spargelwurzel.

Asparagus officinalis Linn. Gemeiner Spargel.

Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. III. Ord. 2. Asparagineae.

Diese perennirende Pflanze wächst an bebauten Orten, auf Wiesen, besonders auch auf Salzboden wild; man baut sie auch häufig in Gärten.

Die Wurzel ist ein kriechender, schuppiger, walzenförmiger, ästiger, fleischiger, daumengroßer Wurzelstock, aus dem sich lange, einfache, fleischige, cylindrische, schreibfederkieldicke Fasern in großer Anzahl entwickeln. Der Stengel ist aufrecht, walzenförmig, glatt, nach oben ästig. Die Blätter

stehen büschelweise, gerade, sind borstenartig, pfriemenförmig zugespitzt, weich, entstehen aus der Achsel einer Schuppe. Die Blüthen sind gelblichgrün, klein, auf dünnen, hängenden, in der Mitte gegliederten Stielen befindlich; die Früchte kleine, erbsenförmige, rothe Beeren, welche 3 — 6 Saamen enthalten.

Die jungen Spargelsprossen, als eine gesunde und leicht verdauliche Speise bekannt, äußern eine specifische Wirkung auf die Harnorgane, indem nach ihrem Genusse der Harn sehr bald einen starken widrigen Geruch erhält. In dem Safte des Spargels ist von Vauquelin und Robiquet ein eigenthümlicher Stoff, Spargelstoff, Asparagin, entdeckt worden. Man gewinnt diesen dadurch, daß man den ausgepreßten, filtrirten, und zur Saftdicke abgedunsteten Spargelsaft längere Zeit der Ruhe überläßt, wo sich dann das Asparagin in wasserhellen, geraden, geschobenen Säulen herauskrystallisirt, welches man mechanisch von den Krystallen des zuckerartigen Stoffes sondert, und durch wiederholtes Auflösen in Wasser und Krystallisiren reinigt.

Das Asparagin ist in Wasser ziemlich leicht auflöslich; in Weingeist unauflöslich. Es reagirt weder sauer noch alkalisch, hat einen kühlenden, schwach ekelerregenden Geschmack; mit Kali zusammengerieben entwickelt es kein Ammoniak, wohl aber bei der Zersetzung durchs Feuer. Das Asparagin gehört demnach zu den thierisch-vegetabilischen Substanzen.

Nach Hermbstädt (Bullet. III. S. 338.) enthält ein Pfund frischer Spargel: Eiweißstoff 40 Gr.; Gummi mit salzigem Wesen (worin er schon einen eigenthümlichen Stoff vermuthete) 2 Drachmen 50 Gr.; Seifenstoff mit Schleimzucker und salzigem Wesen 1 Lth. 2 Dr. 10 Gr.; Feuchtigkeit 28 Lth. 3 Dr. 20 Gr.; Pflanzenfaser 3 Dr. Das flüchtige riechbare Wesen des Spargels scheint nach H. aus Schwefel- oder Phosphorwasserstoffgas zu bestehen, von dem aber die französischen Chemiker nichts gefunden haben. Nach einer chemischen Untersuchung von Dulong (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. 1826. S. 110.) ist die Spargelwurzel zusammengesetzt aus: Pflanzeneiweiß; gummiger Materie; durch basisches essigsaures Blei und salpetersaures Queckſilberoxydul reichlich fällbarer eigenthümlicher Materie; Harz; zuckeriger Materie; sauren äpfels., salzs., essigs. und phosphorsauren Kali- und Kalkverbindungen und einer geringen Menge Eisen. Asparagin und Mannit, beide in den jungen Sprossen von Vauquelin entdeckt, konnten hier nicht gefunden werden.

Die Wurzeln dieser Pflanze waren sonst als harntreibendes und abführendes Mittel officinell, sind jetzt aber ganz außer Gebrauch; sie sind schleimig und etwas bitter.

Asphaltum seu Bitumen Judaicum. Asphalt oder Judenpech. Schlackiges Erdpech.

Ein festes Erdharz, sowohl auf dem todten Meere und einigen andern Seen Asiens und Europas schwimmend, als auch in

Berggruben Frankreichs und anderer Länder Europas vorkommend.

Dichte, zerbrechliche, schwarze, beim Reiben braune, auf dem frischen Bruche glänzende, an der Flamme nach dem Schmelzen mit einem bituminösen Geruche verbrennende Stücke. Man sehe darauf, daß es nicht mit festem Peche verunreinigt sey, was durch die Auflösung in Alkohol erkannt wird.

Dieses Erdharz findet man in weichem oder flüssigem Zustande auf der Oberfläche des todten Meeres. Das Wasser dieses Sees ist so reich an Salzen, daß es die spec. Schwere von 1,25 erreicht, daher der Asphalt, der im trocknen Zustande schwerer als Wasser ist, auf diesem schwimmend sich erhält. Der Geruch dieses schwimmenden Erdharzes soll, wie man ehedem behauptet hat, so stark seyn, daß die über den See hinfliegenden Vögel getödtet werden, so daß davon der Name „das todte Meer" hergeleitet wurde; mehr scheint aber dieser Name von der Unfruchtbarkeit der Ufer entstanden zu seyn. Man findet aber das Erdpech auch auf einigen Landseen in China, im südlichen Asien und Europa, in Amerika und besonders auf der Insel Trinidad. Es wird ferner auch in einigen Gebirgsgegenden, auf den Karpathen, in Frankreich, Neufchatel, Sachsen, Dänemark, Schweden, Sibirien u. s. w. ausgegraben.

Der Asphalt ist an sich geruch- und geschmacklos, beim Reiben aber, durch welches er Harzelektricität erlangt, entwickelt er einen empyreumatischen Geruch nach Steinöl, den er angezündet, wo er mit lebhafter Flamme und starkem Rauche verbrennt, ohne (besonders der auf Seen schwimmend gefundene) einen merklichen Rückstand zu hinterlassen, noch mehr erkennen läßt. In Wasser ist der Asphalt unauflöslich, der Weingeist zieht nur eine grünliche Farbe heraus, und der Aether ist ohne merkliche Wirkung darauf. Mit rauchender Salpetersäure braust er auf, durch längere Behandlung damit wird er in künstlichen Gerbestoff verwandelt.

Durch trockne Destillation erhält man aus 16 Unzen beinahe 12 Unzen eines braunschwarzen empyreumatischen Oels (**Oleum Asphalti**), welches einen sehr widrigen Geruch besitzt, und mit dem Braunkohlenöl (**Oleum bituminis lithanthracis**) fast übereinkommt. Aus 100 Gran Asphalt erhielt Klaproth bei der trocknen Destillation: bituminöses Oel 32 Gran; schwach ammoniakalisches Wasser 6; Kohle 30; Kieselerde $7\frac{1}{2}$; Thonerde $4\frac{1}{2}$; Kalkerde $\frac{3}{4}$; Eisenoxyd $1\frac{1}{2}$; Manganoxyd $\frac{1}{2}$ Gran und 36 Kubikzoll gekohltes Wasserstoffgas.

Der im Handel vorkommende Asphalt ist gemeinhin mit Pech vermischt, welche Verfälschung sich an der Auflöslichkeit des Pechs in Alkohol erkennen läßt. Er zeigt sich daher auch in seinen Eigenschaften verschieden, und ist deswegen, so wie auch das **Oleum Asphalti**, fast ganz außer Gebrauch gekommen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0151-5

Die Aegypter brauchten den Asphalt unter dem Namen **Mumia mineralis** zum Einbalsamiren, wodurch die berühmten unzerstörbaren ägyptischen Mumien entstanden sind. Diese, früher gleichfalls im medicinischen Gebrauche, zeigen die Wirkungen des Asphalts, doch ist dabei nicht außer Acht zu lassen, daß die mit Farben bemahlten Binden, in welchen die Mumien eingewickelt sich befinden, außer Eisen auch Arsenik und Auripigment gezeigt haben.

Beim Baue von Babylon ist der Asphalt als Mörtel gebraucht worden, und auch in neueren Zeiten ist er nebst andern harzigen Stoffen zu Wasserbauten u. dgl. als Bindemittel empfohlen worden.

* Astragalus. Die Wurzel.

Astragalus exscapus Linn. Der schaftlose Traganth.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Der schaftlose Traganth oder Zwergbocksdorn, eine ausdauernde Pflanze, wächst in bergigen und felsigen Gegenden, im Orient, in Ungarn, der Schweiz, auch in einigen Gegenden Deutschlands, z. B. in Thüringen.

Die Wurzel ist rund, einfach, allmälig dünner zugehend, von der Dicke einer Federspule bis zu der eines kleinen Fingers, 1—2 Spannen lang, seitwärts in Fasern auslaufend, bloß gegen die Spitze zu getheilt, etwas höckerig, und mit einer dünnen dunkelbraunen Oberhaut bedeckt.

Der Stengel fehlt. Die ungepaart gefiederten, spannenlangen, zottigen Blätter stehen auf der Erde in Büscheln beisammen und sind aus 12—16 Paaren ungestielten, gegenüberstehenden, eiförmigen und stumpfen Blättchen zusammengesetzt. Die gelben, angehäuften, sehr kurz gestielten Blüthen entspringen aus der Wurzel.

Die Pflanze blüht im Mai und Juni.

Die sonst officinelle Wurzel hat unter der getrocknet runzligen, braunen Oberhaut eine weiße poröse und faserige Rinde, welche einen gelblichen holzigen Kern einschließt. Sie ist geruchlos und besitzt einen bitterlichen, schwach zusammenziehenden, schleimigen Geschmack, welcher in der braunen Abkochung davon zwischen dem Geschmacke von Bittersüß und Süßholz steht. Sie enthält Schleim, ein Harz, kohlens. und schwefels. Kali und nach Fuchs nicht wenig Baryt.

Sie ist als ein schweiß- und harntreibendes Mittel gegen die Lustseuche, auch gegen Gicht und Rheumatismus, in der Abkochung empfohlen worden.

Aurantium seu Napha. Die Blüthen. Pomeranzenblüthen.

Citrus Aurantium Linn. Ein aus China herstammender Baum, der in verschiedenen wärmeren Gegenden und bei uns in Gewächshäusern gezogen wird.

Die weißen saftigen frischen Blumenblätter, und auch der fünf-

zähnige Kelch mit dem oberhalb befindlichen Fruchtknoten, von einem sehr lieblichen Geruche und einem bitterlichen gewürzhaftem Geschmacke.

Citrus Aurantium Linn. Pomeranzencitrone.
Linn. Cl. XVIII. Polyadelphia. Ord. 3. Icosandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 10. Aurantiaceae.

Dieser schöne immergrüne Baum soll zuerst gegen das Jahr 1520 von Juan de Castro nach Portugal gebracht worden seyn; jetzt wird er häufig in Portugal, Spanien, Italien, Sicilien und im südlichen Frankreich angebaut. In Deutschland wird er während des Winters in Gewächshäusern unterhalten.

In den wärmern Ländern erhebt sich dieser Baum auf einem zuweilen mannsdicken Stamme zu einer Höhe von 25—30 Fuß. Sein Holz ist hart und von gelblichweißer Farbe. Seine nahe bei einander stehenden Aeste bilden einen sehr dichten, etwas rundlichen, stark belaubten, buschigen Gipfel.

Die Blätter stehen abwechselnd und sind so wie die Blüthen officinell. Diese sind weiß, groß, in wenigblüthigen Sträußern am Ende der Aeste stehend. Die Blumenkrone hat fünf längliche, flache, abstehende, dicke saftige Blätter. Die Staubfäden, ungefähr 20 an der Zahl, sind in mehrere Bündel getheilt. Die Staubbeutel sind länglich, der obere Fruchtboden trägt einen Griffel. Die Frucht führt den Namen Pomeranze (Orange), ist rundlich, an beiden Enden etwas eingedrückt, und mit einem Nabel versehen. Sie ist mit einer dicken, drüsigen, runzligen, von außen im frischen Zustande rothgelben, getrocknet aber ungleichen, dunkelschwärzlich gelben oder braungelben, inwendig dick- weiß- schwammigen Rinde bedeckt, und enthält ein gelbliches, saftiges, säuerlichbitterlich schmeckendes Fleisch, das durch mehrere häutige, durchsichtige Scheidewände in 9—12 Fächer abgetheilt ist, worin 18 fast eirunde, etwas plattgedrückte, knorpelige Saamen liegen.

Der sehr angenehme durchdringende Geruch der Pomeranzenblüthen geht durchs Trocknen größtentheils verloren, sie werden daher fast nur allein eingesalzen zur Bereitung des destillirten Wassers in den Apotheken aufbewahrt. Nach den von Boullay (Trommsd. J. XIX. 1. S. 86.) angestellten Versuchen, enthalten die Pomeranzenblüthen, außer einem ätherischen Oele, welches als ihr wirksames Princip anzusehen ist, freie Essigsäure, viel essigsauren Kalk, gummige Theile, und bittern Extractivstoff, von dem auch die gelbe Farbe abhängt, der in Weingeist, aber nicht in Schwefeläther auflöslich ist.

Von dem Pomeranzenbaume, der in seinem Vaterlande (China und den Inseln des indischen und des stillen Meeres) das ganze Jahr hindurch Blüthen und Früchte trägt, hat man durch Cultur mehrere Abänderungen erhalten, wozu vorzüglich die Apfelsine, Sinaapfel und der Bergamottenbaum gehören.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0153-7

Aurantium. Das Oel der Blüthen; Neroliöl. Pomeranzenblüthenöl.

Durch Destillation aus den Blüthen von Citrus Aurantium im südlichen Europa bereitet.

Ein röthlichgelbes ätherisches, wohlriechendes Oel. Spec. Gew. = 0,819.

---

600 Pfund frischer Blumen sollen kaum eine Unze Oel geben, welches einen höchst lieblichen feinen Geruch haben soll, aber auch so höchst kostbar ist, daß es wohl nur sehr selten ganz ächt und rein vorkommen wird. Das in den Apotheken unter diesem Namen vorhandene ist größtentheils Bergamottenöl, welches durch Digeriren mit den Blüthen mit ihrem Geruchsprincip geschwängert ist.

Aurantium. Die Blätter. Pomeranzenblätter.

Die ovalen, langgespitzten, fast gesägten, unbehaarten Blätter, mit geflügeltem Blattstiel, der Flügel breiter, als bei den Blättern der Apfelsine und schmäler als bei den Blättern der Pampelmuß, von bitterlichem Geschmacke und angenehmen Geruche.

Diese Blätter, welche auf der obern Fläche lebhaft glänzend grün, auf der untern bleich mattgrün sind, zeigen gegen das Licht gehalten viele durchsichtige Punkte, die nichts anderes, als mit Oel angefüllte Bläschen sind, und die vorzüglich deutlich in den frischen Blättern zu erkennen sind. Sie sind am Grunde zu beiden Seiten mit herzförmigen Flügeln oder kleinen Blattansätzen (dem wesentlichen Unterscheidungszeichen von den Citronenblättern) versehen, über denen sie leicht abgebrochen werden können. Zwischen den Fingern gerieben verbreiten vorzüglich die frischen Blätter den bekannten angenehmen Pomeranzengeruch, der bei den trocknen kaum zu bemerken ist. Sie haben einen gewürzhaft bittern Geschmack.

Die Citronenblätter, mit denen sie vermischt seyn könnten, entbehren jener Blattansätze, und haben einen weniger bittern Geschmack. Die Apfelsinenblätter sind lancettförmig spitzig, die Blattstiele nur schwach geflügelt, und der Geschmack ist weniger aromatisch. Die Pampelmußblätter sind weit größer, ausgeschnitten, am Ende stumpf.

Der wäßrige Aufguß der Pomeranzenblätter ist gelb, die Abkochung gelbroth. Die oxydirten Eisenauflösungen verändern die Farbe in das Dunkelbraune, doch ohne einen Niederschlag hervorzubringen, und bei keinem Grade der Verdünnung ist dieser Farbe etwas Grünes beigemischt, auch bringt die Leimauflösung keine Trübung hervor. Es ist also kein Gerbestoff vorhanden. Galläpfeltinctur bringt eine starke Trübung hervor. Salzsaures Zinnoxydul erzeugt einen sehr reichlichen, fast käseartigen weißen Niederschlag.

Die geistige Tinctur ist grün. Das wäßrige Extract beträgt $\frac{1}{5}$, und

ist bitter pomeranzenartig, etwas ekelhaft. Das geistige Extract beträgt fast eben so viel.

Die Pomeranzenblätter werden in Pulverform, im Aufgusse, oder auch in der Abkochung verordnet. Sie werden in Convulsionen und in der Epilepsie gerühmt, erfodern aber einen mehrere Monate hindurch fortgesetzten Gebrauch.

Aurantium. Die unreifen Früchte. Unreife Pomeranzen.

Die unreifen getrockneten kugelrunden Früchte, die auserlesenen bis zur Größe einer Kirsche, grünlich schwarz, gewürzhaft bitter.

In den Ländern, wo es viele Pomeranzenbäume giebt, werden alle die kleinen Früchte, welche abfallen, aufgelesen, und nach dem Trocknen, so wie sie sind, in den Handel gebracht. Sie enthalten einen bittern Extractivstoff und ätherisches Oel, welche beide von den in der Pomeranzenschale enthaltenen nicht verschieden sind. Auch der Aufguß und die Abkochung zeigen ein beinahe gleiches Verhalten; Eisenauflösungen färben sie dunkelbraun, in kurzer Zeit setzt sich ein ziemlich reichlicher lockerer Niederschlag zu Boden. Von der Galläpfeltinctur wird die Abkochung gar nicht, und von salzsaurem Zinn kaum merklich getrübt. Es findet sich keine Spur von Gerbestoff darin. Das wäßrige Extract beträgt $\frac{2}{3}$ des Ganzen, ist dunkelbraun, und aromatisch bitter ohne alles Zusammenziehende.

Das beste Ausziehungsmittel der unreifen Pomeranzen ist der Weingeist, und daher werden sie auch am häufigsten in der Tinctur als magenstärkendes Mittel verordnet.

Aurantium. Die Schalen der Früchte. Pomeranzenschalen.

Die Schale der reifen Frucht, von aromatischer Bitterkeit und angenehmen Geruche.

Wir erhalten die Pomeranzenschalen in ziemlich harten, nicht sehr dicken, länglichen, spitzig eirunden Stücken, aus einer außen dunkelgelben oder bräunlichen, mit vielen Löchern durchstochenen Rinde, und einem innern weißen, mehr oder weniger dicken, etwas schwammigen Marke bestehend. Nur die äußere Rinde hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und einen aromatischen, erwärmenden, kräftig bittern Geschmack. Vom Marke befreit geben sie das Gelbe der Pomeranzenschalen (**Flavedo corticum Aurantiorum**).

Eine andere im Handel vorkommende Sorte sind die Curassaoschalen (**Cort. Curassao**), welche weit dünner sind, weniger Mark enthalten, brauner von Farbe, größer, und von einer kräftigern aromatischen Bitterkeit sind. Sie sollen aus der amerikanischen Insel Curassao kommen, und von unreifen Früchten gesammelt werden; die häufig darunter vorkommenden grünen Schalen sprechen dafür.

Die Pomeranzenschalen verdanken ihre Wirksamkeit theils einem äthe-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0155-8

rischen Oele, theils dem vorzüglich kräftigen Extractivstoffe, der in Wasser und Alkohol von 80 Procent fast gleich auflöslich ist.

Der wäßrige Aufguß ist gelb, die Abkochung rothgelb, von einem angenehmen bittern Pomeranzengeschmacke. Die oxydirten Eisenauflösungen verändern die Farbe in das Dunkelbraune, wie bei den Blättern; Leimauflösung bringt keine Trübung hervor. Galläpfeltinctur bringt nur eine schwache Trübung, salzsaures Zinn nur einen geringen lockern Niederschlag hervor; die Bleiauflösungen erzeugen einen reichlichern Niederschlag, so wie auch das oxydirte salpetersaure Quecksilber. Brechweinsteinauflösung verändert die Abkochung nicht; Säuren hellen die Farbe auf, Laugensalze machen sie dunkler. Eine Unze des von der weißen Substanz so viel als möglich befreiten Pomeranzengelben liefert etwas über 3 Quentchen eines dunkelbraunen, sehr kräftig bitter und pomeranzenartig schmeckenden Extracts.

Der geistige Auszug verhält sich beinahe wie der wäßrige, das geistige Extract ist etwas heller von Farbe als das wäßrige, steigt von einer Unze bis auf 8 Scrupel, und hat einen aromatischen, sehr kräftig bittern, angenehmen Pomeranzengeschmack.

Zum pharmaceutischen Gebrauche muß nur das Pomeranzengelbe genommen werden. Das davon bereitete Pulver giebt einen sehr kräftigen aromatischen Zusatz zu andern Pulvern; es muß in verkorkten Gläsern aufbewahrt werden. Beim Aufgusse vermeidet man das Verflüchtigen der ätherischen Theile; sollen sie zu einem Decocte zugesetzt werden, so muß dies nur gegen das Ende geschehen. Kräftiger ist ein weiniger oder geistiger Auszug.

Auch die mit Zucker eingemachten Pomeranzenschalen geben ein angenehmes Magenmittel ab.

* Aurantium. Das Oel der Schalen. Pomeranzenschalenöl.

Dieses ätherische Oel (Oleum corticum Aurantiorum) wird durch Destillation aus den trocknen Schalen erhalten. Es ist gelb, dünnflüssig und angenehm von Geruche und Geschmacke. Spec. Gew. = 0,888. Es setzt in verschlossenen Gefäßen campherartige krystallinische Klümpchen ab; durchs Alter wird es dick und braun.

Aurum foliatum. Blattgold.

Ein Präparat technischer Werkstätte.

Das in die dünnsten Blättchen gebrachte Gold.

Das Gold ist seit den ältesten Zeiten bekannt.

Es wird nur in kleinen Quantitäten angetroffen; aber man hat es in den meisten Ländern gefunden, obgleich es eigentlich in den wärmern Zonen der Erdkugel am häufigsten vorkommt. Es kommt immer gediegen vor, theils ziemlich rein, theils mit Schwefel- und Arsenikmetallen gemischt. In der größten Menge und mit der geringsten Mühe erhält man das Gold im südlichen Amerika und bei dem uralschen Gebirge in Sibirien, wo man es

gewöhnlich in größern und kleinern Körnern antrifft, mit Gries, Sand und Erde gemengt, oder mit dem Sande in die Flüsse geführt. Die vornehmste europäische Goldgrube findet man in Ungarn.

Man trennt das Gold von den Erzen durch Queckſilber auf die bei Argentum angegebene Weise. Die eigentliche gelbe Farbe und die äußern Charaktere des Goldes sind allgemein bekannt. Es verändert seinen Glanz nicht in der Luft oder im Feuer. Es hat die Eigenschaft, das Licht aquamarinfarben zu brechen. In seinem reinsten Zustande ist es beinahe eben so weich wie Blei, und ist von allen Metallen das geschmeidigste. Die Dehnbarkeit des Goldes hat beinahe keine Grenzen. Ein Gran Gold kann zu einem 500 Fuß langen Drathe ausgezogen werden, und man schlägt das Gold zu Blättern aus, die nicht mehr als $\frac{1}{200000}$ Zoll an Dicke haben. Seine Ausdehnung geht noch weiter, wenn man einen Silbercylinder mit Gold überzieht, und dieser nun zum feinen Drath ausgezogen wird. Reaumur brachte es auf diese Weise dahin, daß das Goldblättchen hier ein 12Millionentheil eines Zolles ausmachte. Das Gold schmilzt schwerer als Silber und Kupfer, und fodert ungefähr + 705 Thermometergrade, um in Fluß zu kommen. Es leuchtet dann mit einer meergrünen Farbe, die beim Erkalten des Goldes wieder gelb wird. Es ist wenig flüchtig; wenn es aber im Focus eines starken Brennglases geschmolzen wird, so verdunstet es, und wenn man eine silberne Scheibe einige Zoll darüber hält, so wird sie von den Dämpfen vergoldet. Läßt man eine größere Masse Gold sich langsam abkühlen, so schießt das zuerst erstarrte in kurzen vierseitigen Pyramiden an. Spec. Gew. zwischen 19,4 und 19,65.

Das Gold hat von allen Metallen die schwächste Verwandtschaft zum Sauerstoffe. Für sich wird es bei keiner Temperatur der Luft oxydirt; obgleich es in Verbindung mit andern oxydirten Körpern oxydirt, und in diesem Zustande sogar verglast werden kann. Wir kennen bis jetzt mit Sicherheit nur 2 Oxydationsstufen, das Oxydul und das Oxyd. Ersteres besteht aus 96,13 Gold und 3,87 Sauerstoff.

Das Goldoxyd, aus 89,22 Gold und 10,78 Sauerstoff bestehend, hat sehr wenige Eigenschaften einer Salzbase, vielmehr nähert es sich der Metallsäure, denn es wird zwar von den Säuren aufgelöst, es hat aber auch in hohem Grade die Eigenschaft, sich mit den Alkalien zu eigenen, beinahe farblosen Salzen zu verbinden. Will man daher Goldchlorid mit einem Alkali niederschlagen, so muß man weniger hinzusetzen, als zur Sättigung des Chlors nöthig ist. Nach Pelletier, der über das Verhalten des Goldes sehr genaue Versuche angestellt hat (Schw. N. J. 1. 1821. S. 305.) tritt das Goldoxyd mit keiner einzigen Säure in Verbindung, sondern alle Goldsalze sind nach ihm Verbindungen des metallischen Goldes mit Chlor, welches an sich, oder in der Salpetersalzsäure (**Aqua regia, Königswasser**), das eigentliche Auflösungsmittel des Goldes ist. Die Verbindung des Goldoxyds mit dem Ammoniak, (das goldsaure Ammoniak) ist unter dem Namen **Knallgold, Aurum fulminans**, bekannt.

Eine Verbindung von Zinnoxyd mit Gold in einem noch unbestimmten Verhältnisse wird **Goldpurpur, Purpura mineralis, Purpura Cassii**, genannt.

Von den Legirungen des Goldes ist besonders die mit Kupfer zu beachten. Diese Legirung ist geschmeidig. Das zu gewöhnlichen Zierrathen verarbeitete Gold, welches 23,6 Proc. Kupfer enthält, läuft während des Gebrauchs nicht selten dunkel an, und sieht schmutzig aus, welches von der Oxydation des Kupfers herrührt. Wenn man es dann mit etwas kaustischem Ammoniak wäscht, so bekommt es die Goldfarbe wieder.

Die Weichheit des Goldes macht, daß es in reinem Zustande nicht zu Münzen und zur Goldarbeit angewendet werden kann, sondern man versetzt es, um denselben eine größere Festigkeit zu geben, entweder mit Silber oder mit Kupfer, oder mit einer Mischung von beiden. Wenn verarbeitetes Gold $\frac{3}{24}$ Silber oder Kupfer enthält, sagt man daß es 21 Karat Gold halte.

Das Gold wird auf dem Probirsteine mit sogenannten Probirnadeln, wie beim Silber angegeben worden ist, geprüft.

Das Blattgold wird noch bisweilen zum Vergolden der Pillen gebraucht. In neuern Zeiten ist das Gold von Chretien, einem französischen Arzte, im metallischen aber höchst fein zertheilten Zustande sowohl innerlich als äußerlich gegen Syphilis empfohlen worden. Die beste Methode, das Gold zum unfühlbarsten Pulver zu zertheilen, ist die von Pelletier und Du Portal angegebene, nach welcher man eine Goldsolution durch Eisenvitriol fällt, den Niederschlag sorgfältig sammelt, aussüßt und trocknet. Aber auch die Goldpräparate, von denen das Aurum potabile, eine Auflösung des Goldchlorids in Schwefeläther, schon in früheren Zeiten bekannt gewesen, sind von demselben Arzte, statt der Queckfilberpräparate, gegen syphilitische Krankheiten in Gebrauch gezogen worden. Der Gebrauch des Goldes ist dabei wegen der sehr kleinen Dosen, die man von diesen Präparaten giebt, weniger kostbar, als derjenige des Queckfilbers.

Der ökonomische Gebrauch des Goldes, welches seines hohen Preises und seiner schönen Farbe wegen zu verschiedenen Gegenständen des Luxus angewandt wird, ist allgemein bekannt.

Avena. Der ausgeschlaubte Saamen. Hafergrütze.
Avena sativa Linn. Gemeiner Hafer.

Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. II. Ord. 4. Gramineae.

Der Hafer wird wildwachsend angetroffen auf der Insel Juan Fernandez, an der Küste von Chili. Der bei uns gebaute Hafer, von dem es mehrere Sorten giebt, scheint jedoch aus einer andern Gegend abzustammen.

Die von den Hülsen befreiten und gröblich zerstoßenen Saamenkörner dieser allgemein bekannten Pflanze geben die Hafergrütze, deren schleimige Abkochung als reizminderndes Mittel benutzt wird. Sie muß einen Mehlgeruch besitzen, aber nicht staubig seyn. An einem nicht luftigen Orte aufbewahrt, wird sie durch langes Liegen scharf und ranzig.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0158-5

Davy und Vogel haben das Hafermehl chemisch untersucht, aber ziemlich abweichende Resultate erhalten. Jener fand 0,06 Kleber darin, den dieser dagegen nicht als nähern Bestandtheil anführt. Außer dem Satzmehle, dem Zucker und dem Schleime befindet sich im Hafer noch ein fettes Oel und ein bitterer Stoff, welchen Vogel nicht vom Zucker trennen konnte. Bestandtheile nach Vogel: Stärkemehl 59; graue Materie, die dem geronnenen Eiweiß ähnlicher ist, als der Kleber 4,30; Zucker und Bitterstoff 8,25; fettes Oel 2,00; Gummi 2,50; Verlust 23,95.

Journet (Trommsd. J. XXIV. 2. 1815. S. 157.) hat aus den Hülsen des Hafers einen aromatischen vanilleähnlichen Stoff ausgeschieden; die Grütze lieferte nichts davon.

Balsamum peruvianum seu indicum nigrum. Schwarzer peruvianischer Balsam.

Der beim Brennen des Holzes von Myroxylon peruiferum L. fil., einem im südlichen Amerika einheimischen, vorzüglich im Königreiche Neu-Granada häufigen Baume, herausgeflossene Saft.

Eine ölige, dickliche Flüssigkeit, schwarzröthlich, von scharfem gewürzhaftem Geschmacke, angenehmen benzoëartigem Geruche, auch wirklich Benzoësäure enthaltend. In fünf Theilen Alkohol fast gänzlich auflöslich, mit zuerst trüber, dann bei Anwendung von Wärme klarer Auflösung, mit einem geringen Bodensatze. Die mit einem fetten Oele bewirkte Verfälschung wird durch die Auflösung in Alkohol, die mit Copaivabalsam durch den Geruch, wenn die Benzoësäure vorher durch Ammoniak gesättigt worden, endlich die mit einem ätherischen Oele geschehene Verfälschung wird auf gleiche Weise durch den Geruch erkannt. Von 1000 in Alkohol aufgelösten Theilen müssen 75 Th. krystallisirtes kohlensaures Natron gesättigt werden. Spec. Gew. = 1,140 — 1,150.

Der weiße peruvianische oder indische Balsam, aus einem unbekannten Baume des südlichen Amerikas tröpfelnd, von gelblicher Farbe, von dem schwarzen unterschieden und sehr selten, darf dem schwarzen nicht vorgezogen werden.

Nach Sprengel (Berl. Jahrb. XXVII. 2. S. 20.) ist das von Linné d. J. als eigene Gattung aufgestellte Myroxylon schon 1763 von Jacquin unter dem Namen Myrospermum gründlich beschrieben und abgebildet, es sey also dieses wieder an die Stelle der verschiedenen Benennungen Toluifera L. und Myroxylon zu setzen.

Myroxylon peruiferum Linn. fil. Der peruanische Balsambaum.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Dieser schöne und ansehnliche Baum ist in Neu-Granada, Peru, Columbien und Mexiko einheimisch, und in jenen Gegenden unter dem Namen Tache, Quina Quina, bekannt.

Der Stamm ist mit einer dicken, glatten, sehr harzreichen Rinde bedeckt. Die jungen Zweige sind glatt und mit kleinen runden Warzen von etwas hellerer Farbe besetzt. Die immergrünen Blätter stehen abwechselnd, und sind ungleich gefiedert, aus eilf oder mehreren ebenfalls abwechselnd stehenden Fiederblättchen gebildet; die Fiederblättchen sind eiförmig-länglich, stumpf und etwas ausgerandet, auf beiden Seiten glatt, oben glänzend grün, unten blässer; gegen das Licht gehalten zeigen sie durchsichtige Drüsen und sind lederartig, netzförmig aderig.

Die Blüthen bilden einfache aufrechte ungefähr 5 ″ lange Trauben an der Spitze der jungen Zweige, der Kelch ist glockenförmig, die Blumenkrone aus fünf sehr ungleichen zarten Blumenblättern gebildet, von denen 4 sehr schmal sind, das obere die Fahne einer schmetterlingsförmigen Blüthe darstellt; alle sind weiß mit gelblichen Nägeln.

Dieser Baum soll, wie man annimmt, aus den in ihm gemachten Einschnitten den weißen peruvianischen Balsam entlassen, wogegen der schwarze peruvianische Balsam dadurch bereitet werde, daß man die Rinde, die Zweige und andern Theile, die keinen weißen Balsam mehr ausfließen lassen, klein geschnitten mit Wasser auskocht, oder nach Andern, daß man die Zweige ꝛc. des Baums einer absteigenden Destillation unterwirft.

Stolze, dem wir eine musterhafte Analyse dieses Balsams verdanken (Berl. Jahrb. XXV. 2. 1824. S. 24.) hielt es nicht für wahrscheinlich, daß der weiße und der schwarze Perubalsam von einem und demselben Baume abstammen, denn ihre innere Zusammensetzung ist sehr verschieden; dagegen zeige der weiße Perubalsam und der flüssige Borax so große Uebereinstimmung mit einander, daß bei diesen beiden die Abstammung von einem Baume glaublich sey. Auch sprechen die Ergebnisse seiner Zerlegung gegen die Annahme, daß der schwarze Perubalsam durch eine absteigende Destillation erhalten werde, denn in diesem Falle müßten auch die Ergebnisse einer solchen Destillation aus der Holzfaser vorgefunden werden, welches aber nicht der Fall ist. Stolze erklärt es daher für das Wahrscheinlichste, daß der schwarze Perubalsam, gleich der ihm so nahe verwandten Benzoë, freiwillig oder durch Ritzen der Rinde aus dem Baume fließe; doch sey es auch möglich, daß man zugleich das Auskochen des Holzes mit Wasser anwende, denn das siedende Wasser entzieht dem Balsam nur einen geringen Theil seiner Benzoësäure, und ändert übrigens keine seiner übrigen Eigenschaften. Aus den lebenden Bäumen ziehe man wahrscheinlich den Balsam durchs Ritzen der Rinde, aus den gefällten durchs Auskochen.

Nees v. Esenbeck erklärt es für wahrscheinlich, daß aus den jungen

Zweigen dieses Baumes, und wahrscheinlich auch aus denen des bei **Balsamum de Tolu** zu erwähnenden **M. toluiferum**, durch Auskochen mit Wasser der schwarze Perubalsam, durch freiwilliges Ausfließen aber der weiße Perubalsam gleichfalls aus beiden Bäumen erhalten werde.

Sprengel (Berl. Jahrb. XXVII. 2. S. 20.) stimmt der Meinung von Ruiz bei, daß ein und derselbe Baum, von den Einwohnern **Quinoquino** genannt, beide Balsame, den von Tolu und den von Peru liefere. Auch Humboldt, der sowohl in Peru als in Neu-Granada die Balsambäume untersucht hat, fand nur eine Art. Diese liefert in Peru den Peru-, in Neu-Granada den Tolu-Balsam. Der Unterschied scheint nach Sprengel nur von dem verschiedenen Standorte herzurühren; der Standort des Balsambaums in Peru ist 6000 Fuß höher als um Tolu, auch liegt er gerade unter dem Aequator, während Tolu 150 geographische Meilen nördlicher liegt.

Richard, welcher gleichfalls vermuthete, daß Peru- und Tolubalsam von einem und demselben Baume geliefert würden, überzeugte sich aus Humboldt's Herbarium, daß es zwei verschiedene, obgleich sehr nahe verwandte Arten seyen, wovon weiter unten die Rede seyn wird.

Der schwarze peruvianische Balsam, dessen zuerst im Jahr 1580 von Nic. Monardes, Professor in Sevilla, Erwähnung geschieht, hat eine dunkel braunrothe Farbe, ist in Tropfenform vollkommen durchsichtig, besitzt einen vanilleartigen Geruch, einen anfangs milden, bitterlich-gewürzhaften Geschmack, der aber auf der Zunge und im Schlunde bald in den der rohen Benzoësäure eignen prickelnden Reiz übergeht, hat ein spec. Gew. von 1,140 bis 1,150, eine syrupähnliche Dicke und trocknet an warmer Luft nicht ein. Vermittelst eines Dochtes brennt derselbe lebhaft, verbreitet jedoch dabei einen starken Rauch. Ohne Docht brennt er erst dann bei Annäherung einer Flamme, wenn er bis zur Zersetzung erhitzt worden.

Kaltes Wasser, noch mehr aber heißes Wasser löst aus dem damit geschüttelten Perubalsam Benzoësäure und auch Spuren der andern Bestandtheile des Balsams auf, doch kann ihm alle Benzoësäure nur durch einen Zusatz von Kalien entzogen werden; er verhält sich also hierin ganz der natürlichen Benzoë analog. Durch heißes Wasser allein kann nie eine Theilung des Balsams in seine Bestandtheile, sondern nur in eine auf der Oberfläche des Wassers erscheinende Haut, und in einen zu Boden fallenden Theil bewirkt werden; beide sind aber von gleicher Beschaffenheit, und die obenaufschwimmende Haut wird nur vermöge der Adhäsion auf der Oberfläche des Wassers erhalten.

Schwefeläther löst nur einen Theil, gewöhnlicher weingeisthaltiger Aether etwas mehr von dem Balsam auf.

Absoluter Weingeist mischt sich mit dem Balsam in allen Verhältnissen: erst nach einiger Zeit setzte sich eine unbedeutende Menge brauner Stäubchen ab.

Je mehr der Weingeist verdünnt ist, desto mehr verliert er die Fähig-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0161-1

keit den Balsam zu lösen, so daß von 70 Procent haltigem Weingeiste 6 Theile erfoderlich sind. Es wäre also eine Verfälschung mit höchst starkem Weingeiste möglich, doch würde, damit der Balsam nicht zu flüssig werde, nur wenig, höchstens $\frac{1}{8}$, angewandt werden können. Diese Verfälschung wäre leicht zu erkennen 1) an dem bedeutend verminderten spec. Gewichte, und 2) bei der Destillation im Wasserbade, wo statt einiger Tropfen Wasser und etwas Benzoësäure ein weingeisthaltiges Destillat erhalten werden würde.

Terpenthinöl läßt sich bis zum achten Theile mit dem Perubalsam vermischen, eben so die ätherischen und fetten Oele, namentlich das weiße Baumöl; bei einem größern Zusatze erfolgt vollständige Trennung, die durch Wärme noch mehr beschleunigt wird. Eine solche Verfälschung würde also nie mehr als den achten Theil betragen können; ist aber der Zusatz nicht größer und das fette Öl rein und möglichst geruchlos, so kommen die äußern Eigenschaften eines solchen Gemisches, so wie Geruch und Geschmack, ganz mit dem ächten überein. Dieses fette Oel bleibt aber bei der Lösung in Weingeist von 75 Proc. ungelöst zurück. (Ricinusöl wird jedoch ebenfalls vom Weingeiste aufgelöst. D.). Den Zusatz von ätherischen Oelen erkennt man leicht bei der Erwärmung des Balsams durch den Geruch.

Mit Copaivabalsam läßt er sich bis zum 4ten Theil vermischen, ohne eine Zersetzung zu erleiden; wird der Zusatz aber größer, so erfolgt eine Zerlegung, die auch durch Wärme befördert wird. Um eine Verfälschung mit Copaivabalsam zu erkennen, empfahl man bisher die Prüfung durch den Geschmack und durch concentrirte Schwefelsäure. Ersterer kann aber leicht durch den prickelnden Reiz der im Perubalsam befindlichen Benzoësäure versteckt werden, und letztere Prüfung, daß nämlich bei Zusammenmischung der concentrirten Schwefelsäure mit Copaivabalsam weit mehr Wärme entwickelt werde, als mit dem schwarzen Perubalsam, ist nach Stolze's Versuchen durchaus trüglich. Durch folgende Prüfung ist aber die kleinste Beimischung von Copaivabalsam zu erkennen. Man löst etwas von dem verdächtigen Balsam in starkem Weingeiste auf, sättigt die freie Benzoësäure mit Aetzammoniak, setzt dann etwas Wasser hinzu, und verdampft den Weingeist. Der Balsam wird sich nebst etwas ausgeschiedenem Harze unter der wäßrigen Flüssigkeit befinden, die man abgießt, und dann die balsamische Materie stark erwärmt. War auch nur die geringste Beimischung von Copaivabalsam vorhanden, so wird sich diese durch ihren specifischen Geruch sogleich zu erkennen geben, da im entgegengesetzten Falle nur der Geruch des reinen Balsams sich verbreitet. Auch durch den Geschmack läßt sich in dem nach dieser Methode von Benzoësäure befreiten Perubalsam der beigemischte Copaivabalsam deutlich erkennen, jedoch ist die Prüfung durch den Geruch noch schärfer. Beträgt die Verfälschung $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{4}$, so wird diese auch schon durch das bedeutend verminderte spec. Gewicht entdeckt, und in diesem Falle lassen sich die Dämpfe des Copaivabalsams ohne alle Vorbereitung erkennen.

Da dem im Handel vorkommenden Balsam leicht ein Theil der Benzoësäure durch kohlensaure Alkalien entzogen seyn könnte, ohne daß er an sei-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0162-6

nen äußern Eigenschaften viel litte, so muß man denselben auch in dieser Hinsicht prüfen. Man löst den Balsam in seinem sechsfachen Gewichte Weingeist von 70 Proc. auf, und sättigt die Lösung genau mit einer verdünnten Lösung des basischen kohlensauren Natrons. 1000 Gewichtstheile ächten Perubalsams müssen 75 Gewichtstheile reinen krystallisirten basischen kohlensauren Natrons sättigen.

Vermischt man in der Kälte eine ganz concentrirte Aetzkalilauge mit schwarzem Perubalsam, so entsteht eine seifenartige Mischung, doch wird eine braune, schmierige Masse — Harz — abgeschieden.

Mit concentrirter Schwefelsäure entsteht eine beträchtliche Erhitzung, deren Größe von dem Verhältnisse der gegenseitig angewandten Quantitäten abhängig ist, und es wird viel schwefelige Säure entwickelt. Die Mischung hat eine schön dunkel braunrothe Farbe angenommen, und der Balsam ist in eine künstliche gerbestoffartige Materie verwandelt worden.

Die concentrirte rauchende Salpetersäure läßt sich mit dem Perubalsam ruhig vermischen, und die dabei entstehende Erhitzung ist weit geringer, als bei der Mischung mit Schwefelsäure. Es entwickelt sich etwas Salpetergas, aber die weitere Einwirkung geht nur langsam vor sich; destillirt man aber das Gemisch, so enthält das Destillat neben der mit übergegangenen Salpetersäure und salpetrigen Säure viel Benzoësäure und Blausäure. Im Rückstande befindet sich eine saure harzige Masse.

Die Beimischung von Zuckersyrup ist höchst unwahrscheinlich, denn so lange schwarzer Perubalsam und Zuckersyrup mit einander gemengt sind, bilden sie eine trübe undurchsichtige Mischung, die im Aeußern von schwarzem Perubalsam ganz abweicht, und beim ruhigen Stehen trennen sich beide bald wieder von einander.

Die Substituirung eines Kunstgemisches aus Copaivabalsam, Benzoë, Asphalt u. s. w., wenn es ja vorkommen sollte, würde sich leicht verrathen durch das geringere spec. Gewicht, da ein solches, statt unterzusinken, auf dem Wasser schwimmen würde; auch würde bei Erhitzung der eigenthümliche Geruch des Copaivabalsams sich leicht erkennen lassen; es würde, dem ächten Balsam zu gleichen Theilen, oder in noch größerm Verhältnisse zugesetzt, den letztern zersetzen ꝛc.

Nach der Analyse von Stolze bestehen 1000 Th. des schwarzen Perubalsams aus schwerlöslichem braunem Harze 24; leichtlöslichem braunem Harze 207; Perubalsamöl 690; Benzoësäure 64; extractartiger Materie 6; Feuchtigkeit und Verlust 9.

Das schwerlösliche Harz, durch Absetzen aus der Auflösung des Perubalsams in Weingeist von 75 Proc. erhalten, ist leicht zerreiblich, geruch- und geschmacklos, schmilzt bei mäßiger Hitze unter Verbreitung eines nach Benzoë riechenden Dampfes, und hinterläßt bei stärkerer Hitze unter Zersetzung eine lockere Kohle. Es ist nur in wasserfreiem Weingeiste bei Siedehitze löslich, und die erkaltete Lösung wird etwas milchig. Concentrirte Aetzlauge wirkt in der Kälte nur wenig darauf, in der Siedehitze aber löst

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0163-2

sie es auf zur Harzseife. Das leichtlösliche Harz wurde dadurch gewonnen, daß der weingeistigen klaren Lösung, nachdem ihr zuvor durch kohlensaure Natronlauge die Benzoësäure entzogen worden, und der unverändert abgeschiedene Balsam wieder in 75 Procent haltigem Weingeiste gelöst worden war, durch Abdampfen der Weingeist entzogen, und der zurückbleibende Balsam mit seinem zwölffachen Gewichte weißen Baumöls versetzt, und die Mischung etwas erwärmt wurde. Die in großer Menge ausgeschiedenen harzigen Flocken wurden durch ein Filter von dem Oele geschieden, welches mit hellgelber Farbe ablief. Das durch Auflösen in Weingeist von 75 Proc. gereinigte Harz ist von dunkelbrauner Farbe, in dünnen Flächen durchsichtig, geruch- und geschmacklos, schmilzt noch vor dem Siedepunkte des Wassers, wird bei stärkerer Hitze unter Verbreitung grauer, brenzlig-harzig riechender Nebel zersetzt, und läßt eine lockere Kohle zurück. Es ist in wasserfreiem und etwas gewässertem Weingeiste (bis 70 Proc.) leicht löslich; mit Aetzkalilauge bildet es Harzseife.

Das Perubalsamöl wurde aus der Mischung mit Baumöl durch Weingeist von 75 Proc. geschieden. Dieses ist durchsichtig, von bräunlichgelber Farbe, hat in gewöhnlicher Temperatur die Dicke eines Zuckersaftes, ein spec. Gewicht von 1,034, einen eigenthümlichen milden balsamischen Geruch und Geschmack, macht auf Papier gestrichen einen Fettfleck, trocknet an der Luft nicht aus, ist unlöslich im Wasser, und mischt sich in allen Verhältnissen mit absolutem Schwefeläther, wasserfreiem Weingeiste, Terpenthinöl und weißem Baumöle. Von Weingeist von 75 Proc. erfodert es 4 Theile zur Lösung; durch Aetzkalilauge ist es nicht leicht verseifbar, längere Zeit jedoch in der Siedehitze damit behandelt wird eine bräunlichweiße feste zerreibliche Seife gebildet. Doch zeigt sich bei Zersetzung dieser Seife durch Säuren, daß das Oel nicht unzersetzt aufgenommen worden ist, sondern eine bedeutende Veränderung erlitten hat.

Die Benzoësäure wurde aus der Natronlauge durch Schwefelsäure geschieden.

Die extractartige Materie, aus der benzoësauren Natronlauge erhalten, hatte einen balsamischen Geschmack, löste sich leicht in Wasser und gewässertem Weingeiste, in absolutem Aether und in Oelen auf.

Der schwarze peruvianische Balsam wird sowohl innerlich, mit Eigelb abgerieben, oder in spirituösen Tincturen aufgelöst, als auch äußerlich gebraucht.

Von dem weißen peruvianischen Balsam nimmt man, wie bereits erwähnt worden ist, an, daß er gleichfalls von **Myroxylon peruiferum** herstamme, und die Verschiedenheit beider Balsame durch die verschiedene Gewinnungsweise zu erklären sey, indem der weiße Balsam durch Einschnitte in den Baum, aus welchen er ausfließt, der schwarze aber durch Auskochen erhalten werde.

Ruiz, Sprengel und Humboldt kennen nur einen Balsambaum, welcher durch freiwilliges Ausfließen, seinem Standorte nach, den weißen Pe-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0164-8

rubalsam und den Tolubalsam, durch Auskochen aber den schwarzen Perubalsam liefere. Richard und Nees v. Esenbeck geben an, daß **Myroxylon peruiferum** den weißen Perubalsam, **M. toluiferum** aber den Tolubalsam durch Ausfließen liefere, daß aber beide Balsame einander so ähnlich seyen, daß sie auf keine Weise unterschieden werden können, und daß beide nach dem Eintrocknen das **Opobalsamum siccum** geben. Ich besitze einen Balsam, unter dem Namen weißer peruvianischer Balsam, welcher beinahe die Consistenz des venetischen Terpenthins, eine röthlichgelbe Farbe und einen angenehmen Geruch hat, welcher jedoch sowohl von dem des schwarzen Perubalsams als dem des **Opobalsamum siccum** verschieden ist, und sich dem des flüssigen Storax anschließt, so daß ich, wenigstens hinsichts des vor mir habenden Balsams, der Meinung Stolze's beistimme, daß wahrscheinlich der schwarze und der weiße Perubalsam nicht von einem und demselben Baume herstammen, und daß auch der letztere von dem Tolubalsam verschieden sey.

Balsamum tolutanum. Tolubalsam.

Ein an der Luft erhärteter Saft des **Myroxylon toluiferum Richard. fil.**

Ein trocknes Harz, zwischen den Fingern geknetet erweichend, von gelbbräunlicher Farbe, aromatischem Geschmacke und benzoëartigem Geruche.

Linné hatte die Mutterpflanze dieses Balsams **Toluifera Balsamum** genannt; nach Richard's Untersuchungen aber existirt die Gattung **Toluifera** gar nicht, und der Baum, welcher den Tolubalsam liefert, ist gleichfalls ein **Myroxylon**, von ihm **toluiferum** genannt, dem **M. peruiferum** sehr nahe verwandt, jedoch hinsichts der Blätter etwas verschieden. (Blüthe und Frucht waren bei dem einzigen vorhandenen Exemplar in Humboldt's Herbarium nicht befindlich.)

Myroxylon toluiferum. Der Balsambaum von Tolu wächst auf den hohen Ebenen (**Savannen**) von Tolu bei Corozol und Villa Tacasuan im südlichen Amerika in großer Menge.

Er ist ein sehr hoher und schöner Baum; das ältere Holz hat eine dunkelrothe Farbe, ist fest und dauerhaft, und verbreitet einen sehr angenehmen rosenähnlichen Geruch. Die Blätter stehen abwechselnd, und sind ungleichgefiedert, aus 7—8 ebenfalls abwechselnd stehenden kurzgestielten Fiederblättchen gebildet; diese sind eiförmig-länglich, mit einer langvorgezogenen aber stumpfen Zuspitzung, und das am Ende des Blattstiels stehende Blättchen ist größer, als die übrigen.

Aus diesem Baume erhält man durch Einschnitte, die man in der heißesten Tageszeit macht, den Tolubalsam, den man in Gefäßen auffängt. Frisch hat er die Dicke des Terpenthins, eine schöne hellbraunröthliche Farbe.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0165-4

Wir erhalten ihn gewöhnlich eingetrocknet in kleinen Kürbisschalen als eine bräunlichgelbe oder auch röthlichbraune spröde harzige Substanz von sehr angenehmen, der Vanille und Benzoë ähnlichem Geruche, und einem schwach aromatischen etwas beißenden Geschmacke. Er führt dann den Namen **Opobalsamum siccum**, schmilzt in der Wärme sehr leicht, und läuft dann in eine Masse zusammen; schon mit den Fingern läßt er sich eindrücken und im Munde erweichen. Auf glühenden Kohlen verbreitet er einen reinen angenehmen Geruch, und es läßt sich eine etwanige Verfälschung mit Terpenthin oder Geigenharz dadurch erkennen. In 6 Th. Alkohol ist er vollkommen auflöslich; er vermischt sich leicht mit ätherischen, schwerer mit ausgepreßten Oelen. Mit Wasser destillirt giebt er wenig flüchtiges Oel, und ein Wasser, welches Oel und Benzoësäure enthält; letztere sublimirt sich auch bei fortgesetzter Destillation. (Planche in Trommsd. J. XVIII. 1. S. 391.)

Dieser Gehalt an Benzoësäure ist nach Trommsdorff (N. J. II. 1. S. 80.) eben so bedeutend, wie bei der Benzoë selbst, und 100 Th. bestehen aus: Harz 88; Benzoës. 12, und flüchtigem Oele 0,2.

* Balsamum de Mecca, s. gileadense. Balsam von Mekka oder von Gilead.

Amyris Opobalsamum Willd. Mekkasche Amyris.
Amyris gileadensis L. Gileadensische Amyris.
(Willd. in Berl. Jahrb. 1795. S. 107.)

Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Diese kleinen Bäume oder Sträucher wachsen in dem glücklichen Arabien wild, und werden in Palästina und Aegypten angebaut. Der Mekkabalsam, welcher zu den ältesten Arzneimitteln gehört, und schon lange vor Christi Geburt im Orient gebraucht worden ist, wird auf zweierlei Weise gewonnen: 1) durch gemachte Einschnitte in den Stamm und die Zweige, aus welchen er, jedoch so sparsam ausfließt, daß aus jedem Einschnitte täglich nur drei oder vier Tropfen quellen, und aus dem besten Baume nur 10, höchstens 15 Quentchen gewonnen werden. Dieser sehr kostbare Balsam kommt wohl nie, oder doch nur höchst selten in den Handel, weil er für den Großherrn und die Vornehmsten in Constantinopel aufgehoben wird. Der ganz ächte soll dünnflüssiger als Terpenthin, aber etwas dicker als Copaivabalsam seyn, von einer citronengelben Farbe, die etwas ins Rothe spielt, von einem Geruche, der das Mittel zwischen Rosmarin, Salbei, Citronen und Muskatnüssen hält, und von einem bittern, aromatischen, etwas zusammenziehenden Geschmacke. 2) Durch's Auskochen der Zweige und Blätter in Wasser. Dieser Balsam kommt in den Handel. Der in meinem Besitze befindliche Balsam, in einer Flasche von Blei, als Originalflasche bezeichnet, 4 Unzen Balsam enthaltend, erhalten, ist kaum etwas consistenter als Copaivabalsam, von citronengelber wenig ins Rothe spielender Farbe,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0166-0

von einem sehr gemischten Geruche, bei dem jedoch der nach Rosmarin vorwaltet, und einem bitterlichen, dem Geruche entsprechenden Geschmacke.

Durch das Alter wird der Mekkabalsam allmälig zäher, so daß er sich in Fäden ziehen läßt, und zuletzt einem trocknen Harze ähnlich wird, wobei er zugleich an Geruch einbüßt.

Der Balsam soll schon mit Sesamöl, welches in Aegypten häufig gepreßt wird, oder mit Straußenfett verfälscht zu uns kommen; auch sollen uns die Engländer mit einem Kunstproduct aus canadischem Balsam, Citronenöl ꝛc. versehen.

Der Mekkabalsam löst sich in Alkohol und auch in Aether, bis auf einen sehr kleinen Rückstand auf, welchen Vauquelin untersucht, und darin ein Harz gefunden hat, welches in Alkohol aufquillt und klebrig wird. Der Mekkabalsam hat in den früheren Jahrhunderten, als mit Wunderkräften begabt, in sehr großem Rufe gestanden; jetzt ist er außer Gebrauche, da er in Hinsicht der medicinischen Wirksamkeit mit dem wohlfeileren Terpenthin übereinkommen möchte. Die Morgenländer gebrauchen ihn besonders als Schönheitsmittel und die ägyptischen Frauen betrachten ihn als das wirksamste Mittel gegen Unfruchtbarkeit.

Ein Gleiches gilt von den früher gebräuchlichen Beeren dieser Sträucher, den Balsamkörnern (Carpobalsamum), die gewöhnlich röthlich, kleiner als Erbsen, meist ohne Geruch und Geschmack, selten schwach balsamisch sind, und einen weißen Kern enthalten. Eben so wenig braucht man noch das Balsamholz (Xylobalsamum), dünne Zweige, die eine runzlige und graue Rinde haben, wenig riechen und schmecken, angezündet aber einen sehr angenehmen Geruch verbreiten.

Bardana. Die Wurzel. Klettenwurzel.

Arctium Lappa et Bardana Willd. Zweijährige in Deutschland vorkommende Pflanzen.

Eine lange, fast einfache Wurzel, mit wenigen Wurzelzasern, der Länge nach runzlig, außen schwärzlich, mit einer inwendig weißen, gegen das Holz hin bräunlich werdenden Rinde, mit dickem löchrigem weißlichem Holze, von einem scharf süßlichen Geschmacke. Sie werde im zweiten Jahre im Frühlinge gesammelt. Man hüte sich aufs sorgfältigste, daß nicht die Wurzeln der Belladonna untergemischt sind.

Arctium Lappa L. Die gemeine Klette.

Arctium Bardana Willd. Die Spinnenklette, die Wollklette.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.

Juss. Cl. X. Ord. 2. Cinarocephalae.

Beide Pflanzen sind auf Schutthaufen, an Wegen und unbebauten Plätzen ziemlich gemein. Beide erreichen eine Höhe von 3—4 Fuß und sind sehr

wenig unterschieden. Der Stengel der Spinnenklette ist aufrecht, und durch die langen aufrecht abstehenden Aeste von einem bedeutenden Umfange, stark gerippt, etwas röthlich und mehr oder minder mit zarten weißen Haaren bedeckt. Die Blätter, die an dem untern Theile des Stengels stehen, sind sehr groß, und stehen auf fußlangen, eckigen, oben rinnenförmigen Blattstielen; sie sind herzförmig stumpf, fast so breit als lang, am Rande etwas buchtig, wellenförmig und mit sehr kleinen spitzen Zähnchen besetzt (bei der gemeinen Klette deutlicher gezähnt); auf der obern Seite sind sie sehr schwach behaart und grün, auf der untern zeigt sich ein deutlich hervortretendes Gefäßnetz, und ein graulichweißer Filz (tomentum). Gegen die Spitze des Stengels hin werden die Blattstiele sehr kurz, und die Blätter nehmen allmälig an Größe ab.

Die Blüthen stehen in zusammengesetzten Doldentrauben an den Spitzen der Zweige. Der gemeinschaftliche Kelch ist kugelförmig, aus dachziegelartig übereinander liegenden schmalen Blättchen gebildet, die in eine lange dünne, am Ende hakenförmig gekrümmte Grannen auslaufen, womit sie sich an die Kleider anhängen. Die Blumen sind alle trichterförmig, violettroth.

Die der Länge nach zerschnittene und getrocknete Wurzel dieser Pflanzen so wie von Arctium minus, auf gleichen Stellen vorkommend, kommen als Klettenwurzel in den Officinen vor. Der Geruch der getrockneten Wurzel ist eigenthümlich dumpfig, aber schwach, der Geschmack bitter süßlich, etwas scharf. Sie enthält ein bitteres Harz, Schleim, und nach Guibourt viel Inulin.

Sie wird als schweißtreibendes und blutreinigendes Mittel in der Abkochung verordnet, macht einen Bestandtheil der Holzspecies, und wird auch äußerlich zum Waschen angewandt.

Baryta sulphurica nativa. Spatum ponderosum. Sulphas baryticus nativus. Schwerspath.

Ein in den Bergwerken des Harzes, Sachsens und in andern vorkommendes Mineral.

Ein Stein in weißen, blättrigen, schweren Stücken, aus Baryt und Schwefelsäure bestehend, in Wasser völlig unauflöslich. Es müssen die mit fremdartigen Substanzen weniger verunreinigten Stücke ausgesucht werden.

Der Schwerspath wurde lange für schwefelsaure Kalkerde gehalten, bis Scheele die Baryterde entdeckte. Er kommt im Mineralreiche häufig, und verschieden krystallisirt vor, gewöhnlich in geschoben vierseitigen Tafeln; er hat ein spec. Gew. von 4 bis 4,47, und besteht nach Berzelius aus 65,643 Baryt und 34,357 Schwefelsäure. Er ist in Wasser, selbst wenn es freie Säure enthält, unauflöslich; löst sich in kochender concentrirter Schwefelsäure auf, woraus er beim Erkalten in Nadeln anschießt. Künstlich wird

dieses Salz immer da erzeugt, wo Schwefelsäure oder ein schwefelsaures Salz mit Baryt oder einem Barytsalze in Berührung kommt. Diese große Verwandtschaft der Schwefelsäure zur Baryterde macht die Barytsalze zu den vorzüglichsten Reagentien auf Schwefelsäure, indem, wo diese vorhanden ist, sogleich durch erstere ein in Wasser und in verdünnten Säuren unauflöslicher Niederschlag erzeugt wird. Aus eben diesem Grunde bedient man sich bei chemischen Untersuchungen der Barytsalze, um die Schwefelsäure quantitativ zu bestimmen, indem sich aus dem Gewichte des getrockneten Niederschlages nach dem oben angegebenen Verhältnisse der Bestandtheile des Schwerspaths leicht der Gehalt an Schwefelsäure berechnen läßt. Berzelius macht auf den hiebei oft stattfindenden Umstand aufmerksam, daß die gefällte schwefelsaure Baryterde nicht niedersinkt, und daß sie mit durch das Filtrum läuft, wenn man die Flüssigkeit abzufiltriren versucht. Dieses ereignet sich vorzüglich, wenn die Fällung in neutralen Flüssigkeiten von einer gewissen Concentration geschieht, und es findet nicht statt, wenn die Flüssigkeit sehr verdünnt oder wenn sie sauer ist, und auch nicht, wenn sie sehr stark concentrirt ist. Die Gegenwart eines Natronsalzes trägt in hohem Grade zu diesem üblen Umstande bei. Hat die schwefelsaure Baryterde einmal diesen Zustand angenommen, so hilft weder der Zusatz von Säure noch die Abdampfung der Masse zur Trockenheit und Wiederauflösung derselben etwas. Die Säure coagulirt wohl das Gemenge, sobald aber der Niederschlag ausgewaschen werden soll, so geht er wieder durch das Papier.

In der Pharmacie wird der natürliche Schwerspath zur Darstellung mehrerer Barytsalze gebraucht. Man muß hiezu die Stücke aussuchen, welche vollkommen weiß, nicht mit Quarz und Metalltheilen verunreinigt sind, und an Säuren nichts Auflösliches abgeben. Damit er mürbe werde und sich leichter pulvern lasse, glüht man ihn, und löscht ihn glühend in kaltem Wasser ab. Wird er mit Kohle geglüht, so wird die mit der Baryterde verbundene Schwefelsäure zersetzt, nämlich der Sauerstoff ihr und zugleich der Baryterde durch den Kohlenstoff entzogen, und Schwefelbaryum gebildet. In strenger Weißglühhitze schmilzt der Schwerspath zu einem weißen Email. Kohlensaure Alkalien entziehen ihm nur unvollkommen die Schwefelsäure, und zersetzen ihn sowohl auf trocknem als auf nassem Wege nur unvollständig.

Die Barytsalze wirken auf den Organismus höchst nachtheilig und giftig ein, mit Ausnahme der schwefelsauren Baryterde, welche wegen ihrer Unlöslichkeit keine solche Wirkung äußert, daher denn auch bei etwanigen Vergiftungen durch Barytsalze ein schwefelsaures Salz, z. B. das Glaubersalz, das geeignetste Gegenmittel ist, durch welches nämlich der unschädliche Schwerspath gebildet wird.

Basilicum. Das Kraut. Basilienkraut.

Ocimum Basilicum Linn. Ein Sommergewächs Persiens und Ostindiens, welches bei uns in Gärten gezogen wird.

Ein ästiges, bisweilen purpurröthliches Kraut, mit eiförmi-

gen spitzigen, ganzrandigen oder sägeförmigen, unbehaarten, punktirten Blättern, einen sehr angenehmen Geruch verbreitend. Im Monat Juni einzusammeln.

Ocimum Basilicum Linn. Gemeines Basilienkraut.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Von dieser einjährigen Pflanze giebt es in unsern Gärten durch Cultur mehrere Varietäten, die sich durch die verschiedene Form der Blätter und die Farbe der Blumen von einander unterscheiden.

Die Wurzel ist hart, zaserig, und braun oder schwarz von Farbe.

Der Stengel ist aufrecht, ästig, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, und wie die ganze Pflanze entweder hellgrün oder dunkelröthlich, am obern Theile hie und da mit kleinen weißen Haaren besetzt.

Die Blätter stehen gegenüber, sind gestielt, eiförmig, mehr oder weniger lancettförmig, am Rande verloren gezähnt, zuweilen ganzrandig, punktirt und etwas fleischig. Die Blüthen, welche um den Stengel und die Aeste quirlförmige Aehren bilden, sind von weißer und purpurröthlicher Farbe; der Kelch ist einblättrig, kurz und gefranzt; die Blumenkrone einblättrig, rachenförmig und verkehrt stehend. Die Frucht besteht in länglich eiförmigen Saamen, die im Grunde des Kelchs befestigt sind.

Die Pflanze blüht im Juli und August.

Das officinelle Kraut besitzt einen feinen, sehr angenehmen Geruch, der bei vorsichtigem Trocknen nicht verloren geht, und einen majoranähnlichen, gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack. Statt desselben wird auch das kleine Basilienkraut (**Ocimum minimum**) eingesammelt, dessen Blätter viel kleiner, aber von ähnlichem noch feinern und angenehmern Geruche und Geschmacke sind.

Das Kraut enthält ein ätherisches Oel, und wird bisweilen gegen Blähungen, mehr aber noch als Küchengewürz gebraucht.

* Bdellium. Bdellium.

Lamarck hatte nach langer Ungewißheit die gummitragende Mohrrübe, **Daucus gummifer**, als diejenige Pflanze bezeichnet, welche das Bdellium liefere; nach der neuesten Bestimmung des Herrn Prof. Sprengel ist aber die Weinpalme, **Borassus flabelliformis,**

Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 6. Hexandria.
Juss. Cl. III. Ord. I. Palmae.

die Mutterpflanze des Bdelliums.

Diese Palme wird 25 bis 30 Fuß hoch, und wächst in ganz Ostindien. Die Blätter derselben stehen, wie es bei diesen Gewächsen gewöhnlich ist, am Gipfel, sind handförmig gestaltet, bis 4 Fuß lang, und haben Blattstiele, die mit scharfen krummen Dornen besetzt sind. Aus den Blumenkolben wird

der Saft ausgepreßt und daraus der Palmwein bereitet. Die Früchte sind von der Größe eines Kinderkopfes.

Das Bdellium kommt häufig in großen Stücken zu uns. Die feinste Sorte besteht aber aus rundlichen, gelblich-, grünlich- oder röthlichgrauen, halbdurchsichtigen Stücken, von verschiedener Größe, und von einem matten, wachsartigen Bruche. Es besitzt einen schwachen, der Myrrhe ähnlichen Geruch, einen scharfen bittern Geschmack, und klebt stark an den Zähnen. Es kommt mit Myrrhe, und auch wohl mit arabischem Gummi vermischt vor.

Sowohl der Weingeist als das Wasser nehmen eine große Menge desselben auf, und in laugensalziger Flüssigkeit ist es vollkommen auflöslich. Spec. Gew. = 1,371. Nach einer Analyse von Pelletier enthält es in 100: Harz 59; lösliches Gummi 9,2; Bassorin oder Traganthstoff 30,6; flüchtiges Oel und Verlust 1,2.

In Feuer erweicht es sich, fließt und entflammt sich wie ein Harz, wobei es einen angenehmen Geruch verbreitet. Bei der trocknen Destillation liefert es Wasser, welches essigsaures Ammoniak enthält, stinkendes röthlichbraunes Oel, und 0,09 schwer einzuäschernde Kohle, welche 0,04 Asche giebt, die aus kohlensaurem Kalke nebst Spuren von Eisenoxyd und Kochsalz besteht.

Belladonna. Das Kraut. Tollkirschenblätter, Belladonnenblätter.

Atropa Belladonna Linn. Eine ausdauernde Pflanze Europas.

Die Blätter groß, in einen Blattstiel verdünnt, eiförmig, ausgeschweift, etwas spitzig, lebhaft grün, die jüngern weichhaarig, die ausgewachsenen nur an den Nerven etwas weichhaarig, sehr giftig. Sie werden von der wildwachsenden Pflanze genommen, und nicht über ein Jahr aufbewahrt. Sie müssen nicht verwechselt werden mit den kleinern, beinahe eckigen, etwas scharfen Blättern des schwarzen Nachtschattens. Sie sind im Monat Juli einzusammeln und vorsichtig aufzubewahren.

Belladonna. Die Wurzel. Belladonnenwurzel.

Eine lange, gegen den Stengel hin ästige, im Herabsteigen einfache Wurzel, mit wenigen Fasern oder Wurzelzasern, außen schmutzig gelb, innen weißlich, mit gegen das Holz hin bräunlich werdender Rinde, mit einem dicken etwas löcherigen Holze, von schwachem honigartigem Geruche, sehr giftig. Im Frühlinge einzusammeln und vorsichtig aufzubewahren.

Die Gabe von beiden bis auf vier Gran.

Atropa Belladonna. L. Gemeines Tollkraut, Wolfskirsche, Tollkirsche, Tollbeere, Wuthbeere.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Diese im südlichen Europa, in Italien, der Schweiz, England, überhaupt in den wärmeren und gemäßigten Himmelsstrichen gewöhnliche Pflanze, wächst häufig in gebirgigen, hohen Waldungen, in schattigen Gräben und an Hecken, wird auch bei uns in Gärten gezogen.

Der Stengel ist aufrecht, rund, krautartig, etwas haarig, röthlich, zuweilen purpurroth, 3—5 Fuß hoch und meist dreitheilig; die Aeste sind zweitheilig.

Die kurzgestielten Blätter stehen ohne besondere Ordnung, meistens gepaart und oft ungleich groß. Die Blüthen stehen in den Blattwinkeln, sind gestielt, hängend, inwendig von schmutzig purpurrother Farbe, am Grunde gelb, auswendig grünlich roth und etwas haarig. Der Kelch ist einblättrig mit 5 tiefen Einschnitten; die Blumenkrone einblättrig, glockenförmig, mit fünfspaltigem etwas zurückgebogenem Rande. Die Frucht ist eine rundliche, glänzend schwarze, markige Beere, ungefähr so groß, wie eine gewöhnliche Kirsche, an dem Grunde mit dem vergrößerten Kelche umgeben. Sie ist sehr weich, und voll von einem purpurrothen Safte, in zwei Fächer getheilt, und enthält mehrere nierenförmige Saamenkörner, welche an einem Saamenlappen festsitzen.

Diese Pflanze blüht im Juni, Juli und August, und bringt im September und October reife Saamen.

Die officinellen Blätter an der Wurzel sind 8—10 Zoll lang und halb so breit; die am Stengel sind verhältnißmäßig kleiner, kurzgestielt, ganzrandig, von betäubendem unangenehmen Geruche und ein wenig scharf zusammenziehendem Geschmacke. Sie werden jährlich frisch vor der Blüthe eingesammelt.

Man verwechselt sie mit den Blättern des gemeinen Nachtschattens (**Solanum nigrum**), welche aber nicht so groß, langgestielt, nicht spitzig sondern stumpf, und am Rande etwas gezahnt sind.

Vauquelin (Trommsd. J. XIX. 2. S. 119.) suchte nach einem ähnlichen scharfen Princip, wie er es in dem Tabak gefunden hatte (siehe **Nicotiana**), ohne jedoch hier ein ähnliches finden zu können. Der ausgepreßte, filtrirte und dadurch vom grünen Satzmehle befreite Saft der Blätter hat eine sehr dunkelbraune Farbe, und einen bittern ekelhaften Geschmack. Durch Hitze und durch wäßrigen Galläpfelauszug wird er stark zum Gerinnen gebracht, wegen seines Gehaltes an Eiweißstoff. Der bis zur Extractdicke concentrirte Saft wurde mit Alkohol behandelt. Der nach dem Abrauchen des Alkohols zurückbleibende Extractivstoff war nicht ganz rein, sondern hatte noch ziemlich viel essigsaures Kali, vielleicht auch essigs. Ammoniak, etwas salzs. Kali und Salpeter, der sich nicht ganz entfernen läßt, und eine freie Säure beigemischt, die sich als Essigsäure zeigte. Dieser Extractivstoff,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0172-2

so viel als möglich gereinigt, ist bitter und ekelhaft von Geschmacke; er wird aus seiner Auflösung in Alkohol durch geistigen Galläpfelauszug reichlich niedergeschlagen, ätzendes Kali entwickelt einen starken widrigen Geruch, auf glühenden Kohlen bläht er sich auf, verbreitet stechende, scharfe und ammoniakalische Dünste, giebt bei der trocknen Destillation Ammoniak und empyreumatisches Oel, und hinterläßt eine außerordentliche Menge Kohle, die alkalisch und zugleich nach Blausäure schmeckt, und deren Lauge Eisensalze reichlich zu Berlinerblau fällt. Wenn man nun auch annimmt, daß der Salpetergehalt zu diesem Erfolge mitgewirkt habe, so hat doch auch die vegetabilische Materie beigetragen, und sie muß also viel Stickstoff und Wasserstoff enthalten. Durch directe Versuche an einem Hunde überzeugte sich Vauquelin, daß die narkotischen Kräfte ausschließend in diesem Extractivstoffe liegen.

Was der Alkohol nicht aufgenommen hatte, verhielt sich als eine eigenthümliche Modification des sogenannten gummigen Extractivstoffes, verbunden mit saurem kleesauren Kali, schwefels. und etwas salzs. Kali. Dieser Extractivstoff wird vom Galläpfelaufgusse reichlich niedergeschlagen, weswegen ihn Vauquelin eine Art von thierisch-vegetabilischer Materie nennt, um so mehr, als er auch durch Salpetersäure in Kleesäure und gelbe Substanz verwandelt wurde.

Der Saft der Belladonna enthielt demnach eine in Alkohol auflösliche Substanz, welche als das wirksame Princip angesehen werden müsse, eine in Alkohol unauflösliche thierisch-vegetabilische Materie, freie Essigsäure und mehrere Salze mit kalischer Grundlage, nämlich viel salpetersaures, salzsaures, schwefelsaures, saures kleesaures und essigsaures Kali.

Das Ueberbleibsel der Belladonna, aus welcher man den Saft erhalten hatte, wurde ausgewaschen, getrocknet und verbrannt. Die Asche bestand aus einer sehr großen Menge Kalk, welcher an Kleesäure gebunden gewesen war, aus phosphorsaurem Kalk, Eisen und Kieselerde.

Brandes (Schweigg. J. XXVIII. S. 9. und Buchn. Repert. VIII. S. 289. und IX. S. 40., auch Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 128.) zog das trockne Kraut erst mit kaltem Wasser durch die Rommershausen'sche Presse, dann mit kaltem, hierauf mit heißem Wasser aus. Dann wurde es mit Wasser ausgekocht, und zuletzt noch mit Salzsäure und Aetzkalilauge behandelt.

Nach dieser Analyse enthalten 2000 Th. Blätter der Belladonna: saures äpfelsaures Atropium 30,25; klees. Kali 12,00; äpfels. Kali und Kalk, salpeters. und salzs. Kali, Spuren von klees. Kali und äpfels. Atropium 5,50; äpfels. Talkerde mit Spuren von klees. Kalk 5,00; klees. Kalk mit phosphors. Kalk und Talk 104,75; äpfels. Kalk 12,00; salpeters. Kali 6,00; salzs. Kali 4,00; schwefels. Kali 5,00; Pseudotorin mit einigen der obigen Salze 321,00; Phyteumacolla, (Pflanzenleim, thierisch-vegetabilische Materie) 138,00; Eiweißstoff 94,00; verhärteten Eiweißstoff 120,00; Chlorophyll (Blattgrün, harziges Blattgrün, Pflanzenwachs, grünes Satzmehl,

der färbende Stoff der grünen Pflanzentheile) 116,75; Wachs 14,00; Gummi 166,50; Stärkemehl mit phosphors. und kleesaurem Kali 25,0; Faser 274,0; Feuchtigkeit 510,0; Verlust 36,25. S. = 2000.

Pseudotoxin (falschen Giftstoff) nennt Brandes den viel Stickstoff enthaltenden narkotischen Extractivstoff Vauquelin's, welcher sich in Weingeist und Wasser löst, durch siedendes Wasser nicht gerinnt, durch Galläpfeltinctur gefällt wird, und eine große Anziehung zu den Basen der Metallsalze besitzt. Die etwanigen giftigen Eigenschaften desselben schreibt Brandes einem Rückhalte von Atropium, dem ausschließendem Sitze des Narkotismus, zu. Um dieses Atropium zu gewinnen, wird nach Brandes der mit Hülfe der Luftpresse erhaltene gesättigte wäßrige Auszug der getrockneten Blätter mit Schwefelsäure versetzt, um Eiweißstoff und andere gerinnbare Pflanzensubstanzen zu entfernen, dann Kaliauflösung im Ueberschusse hinzugesetzt, und der so erhaltene Niederschlag von Atropium durch wiederholtes Auflösen in Säuren und Abtrennen durch Laugensalze gereinigt. Es hat dann folgende Eigenschaften: es erscheint in langen, glänzenden, nadelförmigen, durchsichtigen Krystallen (aus der erkalteten geistigen Auflösung abgeschieden), theils auch in wachsähnlichen Flocken, oder in gallertartiger Form durch Ammoniak niedergeschlagen, im reinsten Zustande blendend weiß, sonst gelblich weiß; es ist geschmacklos, in kaltem Wasser fast unauflöslich, eben so in kaltem Alkohol, in kochendem in viel geringerem Grade als das Morphium auflöslich; auch in Aether und Terpenthinöl unauflöslich. Das Atropium scheint alkalisch zu reagiren; mit den Säuren bildet es krystallinische Verbindungen, ohne sie jedoch völlig zu neutralisiren. Der Geschmack derselben scheint nicht bitter, sondern mehr salzig zu seyn. In der Hitze wird das Atropium zerstört, wird schwarz und verbrennt unter Entwickelung eines empyreumatischen Geruchs und Hinterlassung von Kohle. Beim Zusammenreiben des Atropiums mit Aetzkali wird Ammoniak entwickelt.

Den von Brandes angestellten Versuchen zufolge ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß in dem Atropium die narkotische Kraft der Belladonna ihren Sitz habe.

Runge (Neueste phytochemische Entdeckungen S. 120.) schlägt die wäßrige Abkochung der Blätter mit Bleizucker nieder, entfernt das Blei aus der Flüssigkeit vermittelst Schwefelsäure und zuletzt durch Schwefelwasserstoffgas, raucht zur Extractdicke ab, und behandelt dieses mit dem zwanzigfachen Gewichte Weingeist, welcher eine große Menge einer braunen Materie daraus niederschlägt. Der Weingeist wird abdestillirt, und der Rückstand nachmals mit einem Gemische von einem Theile Aether und 4 Theilen starken Weingeistes behandelt, wodurch wiederum eine dunkelbraune Materie gefällt wird. Die klare Flüssigkeit wird abermals der Destillation unterworfen, und der Rückstand mit 30 Th. Wasser verdünnt. Die Lösung hat eine hellgelbe Farbe, und ein einziger Tropfen derselben reichte hin, um bei einer Katze eine 20 Stunden lang dauernde Erweiterung der Pupille hervorzubringen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0174-4

Die narkotische Base kann von den Säuren und andern anhängenden Materien durch reine Bittererde getrennt werden, welche nicht zerstörend auf dieselbe wirkt, wogegen die ätzenden Alkalien und Kalkmilch sie zerstören. Da aber die geglühte Bittererde wegen ihres Cohäsionszustandes nur sehr langsam auf die Pflanzensäfte einwirkt, so verschaffte sich Runge die Bittererde im Hydratzustande, indem er eine Lösung des reinen (ätzenden) Kalis mit schwefelsaurer Bittererde in der Art versetzte, daß die letztere vorstach. Der wäßrige Auszug der Blätter wird mit dieser Mischung, die Bittererdehydrat, schwefelsaure Bittererde und schwefelsaures Kali enthält, gemischt und bei lebhaftem Feuer zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird gepulvert und mit sehr starkem Alkohol digerirt. Die hellgelbe Lösung hinterläßt nach dem freiwilligen Verdunsten eine krystallinische Masse, welche das geröthete Lackmuspapier schwach bläuet, sich in Wasser löset, und die Pupille ungemein erweitert. Die Verbindungen dieser Materie mit Schwefel-, Salz- und Salpetersäure zeigen auf das Auge dieselbe Wirkung.

Peschier (Trommsd. N. J. V. 1. S. 89.) erhielt durch Zerlegung der weingeistigen und wäßrigen Auszüge des Extracts mit essigsaurem Blei ein Alkaloid, welches in Wasser und Weingeist auflöslich war, eine gewisse Menge Feuchtigkeit anzog, die bloß fähig war, es eine honigartige Consistenz annehmen zu lassen, in welcher es langsam eine körnige und krystallinische Gestalt annahm, in der sich langsam Haufen von ziemlich großen Krystallen entwickelten. In diesem Zustande war es klebrig, hatte eine schwache Capacität für die Säuren, verband sich mit ihnen unter Hervorbringung eines schwachen Aufbrausens, und bildete krystallisirbare Salze. Auch will Peschier durch Zersetzung des durch Barytsalze in der Abkochung der Blätter des Tollkrautes erhaltenen Niederschlages eine eigenthümliche flüssige sehr saure Säure (Atropiumsäure) erhalten haben.

Die Belladonnenblätter werden in Pulverform, oder im Extract innerlich und äußerlich zu Kataplasmen, Klystieren u. s. w. gegeben; sie vertragen aber kein starkes Kochen, sondern müssen nur mit heißem Wasser übergossen werden.

Die Wurzel der Belladonna ist schmutziggelb, oft röthlichbraun, mit Querrunzeln versehen, im getrockneten Zustande hart, beinahe weiß und ohne Geruch.

Der wäßrige Auszug der Wurzel wird durch Galläpfeltinctur reichlich niedergeschlagen, eben so durch essigsaures Blei, oxydulirtes und oxydirtes Queckſilber; die Farbe der Eisenauflösungen wird nicht geändert.

Die Belladonna hat mit mehreren narkotischen Pflanzen die Eigenschaft gemein, die Pupille des Auges zu erweitern, daher sie von den Aerzten bei Staaroperationen, und zwar im Extract, gebraucht wird. Da die Wirkung sicherer wird, wenn nur das wirksame Princip der Belladonna zur Anwendung gezogen werden kann, die Bereitung der Alkaloide aber zu kostspielig ist, auch die Darstellung nicht allgemein gelingen will, so hat Buchner vorgeschlagen, Extracte, die den Alkaloiden an Wirksamkeit nicht nachstehen

möchten, dadurch zu bereiten, daß man entweder die Substanz mit kaltem Wasser auszieht, abdampft, das Extract mit Weingeist digerirt, und die Tinctur zum Extract verdampft, oder daß man die Substanz mit Weingeist auszieht, das Extract mit kaltem Wasser behandelt, und wieder abdampft. Das auf diese Weise aus dem Kraute bereitete Extract war lange nicht so wirksam, als das aus der Wurzel; am kräftigsten zeigte sich aber das aus den Saamen bereitete, doch scheint es etwas reizend zu seyn und Schmerzen zu erregen, daher es also dem Extract aus den Bilsenkrautsaamen nachsteht. Auch enthalten die Saamen nach Buchner mehr Atropin, als die Wurzeln, wenigstens läßt es sich nach ihm daraus in reichlichster Menge abscheiden. Becher benutzte die in seiner Gegend sehr häufig wachsende Pflanze, um die Saamen zu sammeln, und aus diesen das Oel zu pressen. Das gewonnene Oel war klar, goldgelb, von mildem öligen Geschmacke, und an Geruche einigermaßen dem Repsöl ähnlich. Es gehört zu den austrocknenden Oelen, und kann wie Nuß- und Leinöl sehr gut zu Oelfarben und Firnissen angewendet werden.

Die Eigenschaft, die Pupille zu erweitern, ist für Belladonna und für sehr viele Species von Hyoscyamus und Datura so charakteristisch, daß Runge in Fällen von Vergiftungen mit diesen Stoffen vorschlägt, etwas von der zu untersuchenden Flüssigkeit in das eine Auge einer Katze zu bringen, und dasselbe dann mit dem andern zu vergleichen. $\frac{1}{1000}$ Gran Extract von Belladonna in der Flüssigkeit zeigt schon deutliche Wirkung.

Die Belladonnenwurzel, die in Pulverform nicht in großer Menge vorräthig gehalten werden muß, weil sie sonst unwirksam wird, was auch später bei der ganzen eintrifft, wird gegen den tollen Hundsbiß in ziemlich starken Dosen gegeben, auch im Krebs, im Staar, gegen Keuchhusten, in der Epilepsie und im Wahnsinn. Ein unmäßiger Gebrauch aber wird sicher nachtheilige Folgen nach sich ziehen, und Zeichen einer solchen Vergiftung sind Schwindel, Zittern, Schläfrigkeit, erweiterte Pupille, lustiger Wahnsinn ꝛc., und Wendt äußert die Vermuthung, daß die nach dem Bisse eines Hundes, und dem darauf gefolgten übermäßigen Gebrauche der Belladonna entstandene Wasserscheu bisweilen ein Kunstproduct der Tollkirsche gewesen seyn könne.

Gegenmittel sind Brechmittel, Blutentziehungen, vegetabilische Säuren, Essigklystiere und ableitende scharfe Fußbäder.

Benzoë seu Asa dulcis. Benzoëharz. Wohlriechender Asand.

Der an der Luft eingedickte Saft von Styrax Benzoë Dryandri, eines in Ostindien einheimischen, vorzüglich in Sumatra häufigen Baumes.

Ein gelblichbraunes Harz, mit weißen eingemischten Stücken gefleckt, zerreiblich, glänzend, von schärflichem Geschmacke und sehr

angenehmen Geruche, Benzoësäure enthaltend. In drei Theilen Alkohol wird es fast gänzlich, in Schwefeläther größtentheils aufgelöst.

Styrax Benzoin Dryand. Benzoë-Storax.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 1. Ebenaceae.

Dieser soll gegenwärtig auch in Sumatra angebaut werden. Er erreicht eine mittlere Höhe, und sein Stamm ungefähr die Dicke eines Mannes. Die Aeste bilden eine schöne Krone; die Rinde ist graubraun, das Holz hart und dicht. Die Blätter sind kurzgestielt, ovallänglich, 5—6 Zoll lang, ganzrandig, auf der obern Seite dunkelgrün und glatt, auf der untern mit einem kurzen weißen dichten Filze bedeckt. Die Blüthen stehen in zusammengesetzten sparrigen Trauben in den Blattwinkeln. Der Kelch ist kurz, glockenförmig, die Blumenkrone aus vier oder fünf lancettförmigen, am Grunde zusammenhängenden, auf der äußern Seite, so wie der Kelch, mit einem dichten, sehr kurzen weißen Filze bekleideten Blumenblättern gebildet, auf der innern Seite sind sie glatt und röthlichbraun. Die Frucht ist eine runde, feste und holzige Nuß, die von außen runzlig, bald mehr grau, bald mehr bräunlich gefärbt ist; der das Fruchtbehältniß ausfüllende Saame ist gelblich.

Aus diesem Baume wird durch Einschnitte, die man in die Rinde und in das Holz macht, das anfangs flüssige Benzoëharz gewonnen. Die beste Sorte, die sich durch ihre weiße Farbe und größere Reinheit auszeichnet, wird von 5 und 6jährigen Stämmen gesammelt, daher man die ältern Bäume gewöhnlich ausrottet. Ein Stamm kann ungefähr drei Pfund Benzoë liefern.

Die Benzoë kommt in großen Stücken zu uns, an deren Oberfläche man noch die Eindrücke der Rohrmatten bemerkt. Sie ist ganz trocken, hart, leicht zerreiblich, von bräunlichrother, fleckenweise heller rother Farbe, und hat, je besser sie ist, um so mehr weiße Körner, gleichsam wie Mandeln der Gestalt und Größe nach (Mandelbenzoë, **Benzoë amygdaloides**) eingesprengt, welche einen ebenen, etwas fettglänzenden Bruch haben und durchscheinend sind, während die Hauptmasse undurchsichtig, uneben von Bruche, matt und hin und wieder löcherig ist. Der Geschmack ist süßlich, harzigbalsamisch, der Geruch, besonders wenn sie gerieben oder angezündet wird, durchdringend angenehm, balsamisch-eigenthümlich. Spec. Gew. = 1063.

Die großen, ganz undurchsichtigen, bräunlichen, schwärzlichen, nicht mit jenen weißen Körnern versehenen Stücke sind die **Benzoë in sortis**. Die Benzoë verbrennt auf glühenden Kohlen unter Verbreitung eines dicken, weißen, stark und stechend riechenden, zum Husten reizenden Dampfes. Dieser Dampf ist Benzoësäure.

Die Benzoë ist in Alkohol und Aether auflöslich, die Auflösung wird durch Wasser milchartig getrübt, und das Harz niedergeschlagen. Die ätherischen und fetten Oele äußern auf die Benzoë keine Wirkung. Schwefel-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0177-1

säure bildet damit eine durchsichtige braune Auflösung, es sublimirt sich in der Wärme reine Benzoësäure, und bei lange genug fortgesetzter Digestion wird eine bedeutende Menge Kohle abgeschieden, aus welcher man durch Alkohol künstlichen Gerbestoff ausziehen kann. Auch Essigsäure löst die Benzoë in der Kälte auf.

Wird Salpetersäure wiederholt darüber abgezogen, so bleibt ein Rückstand zurück, der mit Wasser eine blaßgelbe sehr bittere Auflösung giebt, und sich wie künstlicher Gerbestoff verhält. Wäßriges Ammoniak löst nur wenig, kochendes Wasser, Kali und Natron lösen mehr Benzoë mit brauner Farbe auf. (Suersen in Berl. Jahrb. 1806. S. 121.)

Nach einer Analyse von Bucholz (Trommsd. J. XX. 2. S. 73.) bestehen 100 Th. Benzoë aus einem röthlichbraunen, durchsichtigen, spröden, auf dem Bruche glänzenden, in Weingeist und Aether leicht löslichen Harze 83,3; dem Perubalsam ähnlicher Materie 1,7; aromatischem in Wasser und Weingeist löslichen Princip 0,5; Benzoësäure 12,5; holzigen Resten und Unreinigkeiten 2.

John (Naturgeschichte des Succins ꝛc. 1816. II. S. 94.) hat hiermit übereinstimmende Resultate erhalten, nämlich: flüchtiges Aroma; Harz 84,50; Benzoësäure 12,00; aromatisch-bittern Extractivstoff 0,50; wäßrige Feuchtigkeit 0,25; holzige Gemengtheile 2,00; phosphors. und benzoës. Kalk, benzoësaures Kali, Eisenoxyd und Manganoxyd 0,75.

Stolze (Berl. Jahrb. XXV. 1. 1823. S. 55.) sonderte die weißen und braunen Benzoëstücke möglichst sorgfältig von einander ab, und untersuchte beide besonders. Er löste sie in Weingeist von 75 Proc. auf, setzte dann eine sehr verdünnte, und, so weit es ohne Abscheidung möglich war, mit Weingeist versetzte Lösung des basischen kohlensauren Natrons bis zur genauen Sättigung hinzu, verdünnte dann mit dem gleichen Gewichte Wasser, wodurch das Ganze milchig wurde, und verdampfte dann den Weingeist, wodurch das Harz abgeschieden wurde. Aus den weißen Stücken der Benzoë erhielt St. ein hellgelbes in Aether lösliches Harz, und aus den braunen Stücken ein braunes in Aether unlösliches Harz. Aus der Lauge wurde durch Schwefelsäure die Benzoësäure ausgeschieden.

1000 Th. der weißen Benzoëstücke enthielten:		1000 Th. der braunen Benzoëstücke	
ätherisches Oel	Spuren		Spuren
gelbes in absolutem Aether lösliches Harz	798,25		88,00
braunes in absolutem Aether unlösliches Harz	2,50		697,25
reine Benzoësäure	198,00		197,00
Extractivstoff	000,00		1,50
zufällige Unreinigkeiten	000,00		14,50
Feuchtigkeit und Verlust	1,25		1,75
	1000,00		1000,00

Das Benzoëharz hatte die Eigenschaft, die Lösung des salzsauren Ei-

fenorydes grün zu färben. (Gallusfäure und Gerbestoff konnten nicht abgeschieden werden.)

100 Th. in Weingeist gelöster guter Benzoë müssen 24—26 Th. krystallisirten basischen kohlensauren Natrons sättigen.

Als Stoltze eine feine mit mandelartigen Stücken reichlich durchsetzte Benzoë im Ganzen zerlegte, fand er in 1000 Th.: ätherisches Oel, Spuren; gelbes in absolutem Aether lösliches Harz 271; braunes in absolutem Aether unlösliches Harz 505,25; reine Benzoëfäure 194,25; Extractivstoff 2,50; zufällige Unreinigkeiten 26; Feuchtigkeit und Verlust 1.

Die Benzoë wird in der geistigen Tinctur mit Wasser gemischt zum Waschen als Schönheitsmittel, um die Haut glatt und zart zu erhalten, gebraucht, vorzüglich dient sie aber als Räucherungsmittel und zur Bereitung der Benzoëfäure.

Berberis. Die Beeren. Berberizenbeeren.

Berberis vulgaris Linn. Ein Strauchgewächs Deutschlands.

Die frischen, länglichen, scharlachfarbenen, glänzenden, fleischigen, sehr sauren Beeren, mit 2—3 Saamen.

Berberis vulgaris L. Gemeine Berberize, Sauerdorn, Beißelbeere, Passelbeere.

Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 18. Berberideae.

Dieser Strauch wächst fast in jedem Klima; man findet ihn häufig an Hecken und Zäunen, auch wird er in Gärten gezogen.

Die Wurzel ist holzig, gelblich, kriechend und ästig. Die Stengel, welche eine Höhe von 6—8, zuweilen auch von 10—12 Fuß erreichen, sind aufrecht, die Aeste abwechselnd, eckig und mit einer dünnen, glatten, aschgrauen Rinde bedeckt. Das Holz ist von gelber Farbe. An dem Grunde jeder Knospe und jedes Astes befinden sich zuweilen einer, gewöhnlich drei sehr feine, gerade, ungleich große, sehr spitzige Stacheln, die nichts anderes, als fehlgeschlagene Blätter sind. Die Blätter sind büschelförmig zusammengedrängt, verkehrt eiförmig, kurz gestielt, stumpf, gewimpert, gezähnt, auf beiden Seiten glatt und oben graugrün, unten aber matt, wie bestäubt.

Die Blüthen sind gelb, von einem angenehmen Geruche, und bilden an der Spitze der kurzen Zweige zwischen den Blättern seitwärts hängende, einfache, längliche Trauben. Jede Blüthe ist mit einem besondern Stiele und einem kleinen, schuppenartigen Deckblatte versehen. Der Kelch ist grüngelblich, abfallend, und besteht aus sechs eiförmigen Blättchen. Die Blumenkrone besteht aus sechs eiförmigen, vertieften, aufrecht-abstehenden Blumenblättern, welche kaum länger sind, als der Kelch, und am Grunde zwei rundliche, gefärbte Honigdrüsen haben. Die sechs Staubfäden sind etwas kürzer, als die Blumenblätter, im Blumenboden eingefügt, und besitzen eine

große Reizbarkeit, so daß sich bei geringer Berührung die Staubbeutel, deren zwei an jedem Faden befindlich sind, mit Heftigkeit an die Narbe legen, und den Blumenstaub fahren lassen. Der Fruchtknoten ist länglich, fast walzenförmig, und endigt in einer dicken, scheibenförmigen Narbe.

Die Frucht ist eine rothe, stumpfe, einfächrige, anfangs grüne, zur Zeit der Reife rothe, oben mit einem schwarzen Punkte versehene Beere, welche 2—3 längliche, stumpfe Saamen enthält.

Die Berberize blüht im Mai und Juni, die Früchte reifen im September und October.

Das Fleisch der officinellen Beere besitzt einen angenehm sauern, etwas zusammenziehenden Geschmack, und färbt den Speichel roth. Durchs Auspressen der zerquetschten Beeren wird der Saft gewonnen, der zu erfrischenden Getränken dient. Soll dieser aufbewahrt werden, so muß man ihn erst durch ruhiges Stehenlassen ganz klar und hell werden lassen, dann behutsam abgießen, aufkochen, durchseihen und auf gläserne Bouteillen füllen, die fest verstopft und umgelegt werden. Dieser Saft, der zur Bereitung des Berberizensyrups gebraucht wird, enthält fast keine Citronensäure, dagegen viel Aepfelsäure.

Von dieser Pflanze sind ehedem Wurzel, Rinde und Saamen in Gebrauch gewesen.

Ueber die Wurzel, und den in derselben enthaltenen, der Benutzung werthen, gelben Farbestoff findet man eine lesenswerthe Abhandlung von Brandes im XI. Bande des Archivs des Apothekervereins im nördlichen Deutschland.

Bergamottae oleum. Bergamottöl.

Ein Präparat technischer Werkstätte aus den Früchten einer Varietät von Citrus Aurantium.

Ein bräunlichgelbes, wohlriechendes, ätherisches Oel. Spec. Gew. = 0,856.

Diese Varietät des Pomeranzenbaumes führt den Namen Citrus bergamia vulgaris, und ist auf der Insel Barbados einheimisch.

Das Bergamottenöl wird dadurch gewonnen, daß die Früchte dieses Baumes in Trichtern, die inwendig mit hervorragenden Stacheln gleich einem Reibeisen besetzt und in dem Boden mit einem Roste versehen sind, dergestalt umgedreht werden, daß das mit Oel angefüllte Zellgewebe der Schale von allen Seiten zerrissen wird, und das freigemachte Oel durch den Rost in die untergesetzte Flasche läuft. Es riecht angenehm, schmeckt bitter. Damit es nicht seinen Wohlgeruch verliere, muß es von dem sich zeigenden Bodensatze öfters abgegossen, und in frische Gläser gefüllt werden.

Mit rauchender Salpetersäure bildet es ein gelbes, mit Vitriolöl ein braunes schmieriges wohlriechendes Harz.

Es dient, um äußerlichen Mitteln einen Wohlgeruch zu ertheilen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0180-6

Bismuthum, gemeiniglich Marcasita. Wismuth.

Wird aus den Erzen durch Ausschmelzen in den Bergwerken bereitet.

Ein leicht zerbrechliches, weißröthliches Metall, von blättrigem Bruche, bei gelindem Feuer schmelzend, bei stärkerer Hitze in Gestalt eines gelben Rauches in die Atmosphäre sich verflüchtigend. In Salpetersäure aufgelöst wird es durch Wasser niedergeschlagen. Spec. Gew. fast 10,0.

Das Wismuth ist ein schon in der Vorzeit bekanntes Metall, welches jedoch die Alten öfters mit Zinn und Blei verwechselten. Agricola führte 1520 die Erze dieses Metalles an, aber Stahl und Dufay zeigten zuerst, daß es ein eigenes, von andern bestimmt verschiedenes Metall sey.

Es kommt meistens gediegen vor. Man findet es bisweilen mit Schwefel verbunden, und sehr selten oxydirt. Man erhält das Wismuth meistens aus dem gediegenen Wismuth, welches in Sachsen, Böhmen und Siebenbürgen vorkommt, und zwar auf die Art, daß man das Erz zwischen Kohlen oder Holz erhitzt, wobei das Metall ausfließt, und in einer Grube unter dem Ofen gesammelt wird. Das auf diese Weise aus der Gangart ausgeschmolzene Metall kommt in den Handel, ist jedoch nicht rein, sondern enthält Arsenik, Eisen und vielleicht auch andere Metalle. Es wird davon gereinigt, wenn man das Metall in Salpetersäure auflöst, die klare Auflösung mit Wasser mischt, welches das Wismuth abscheidet, und die andern Metalle zurückbehält, worauf man den Niederschlag trocknet, mit etwas schwarzem Flusse mischt, und bei gelindem Feuer in einem Tiegel reducirt, wobei sich das Metall in einen Klumpen am Boden sammelt.

Wismuth ist weiß, hat beinahe das Ansehn von Antimon, aber einen Stich ins Rothe, und ist mehr bestimmt krystallinisch, nämlich von einem blättrigen Gefüge. Es hat vielen Glanz, ist spröde, und kann leicht gepulvert werden; das reine Wismuth soll jedoch etwas biegsam seyn. Spec. Gew. 9,83. Es ist leichtflüssiger als Blei, und fließt bei + 246 °. In einer hohen Temperatur ist es flüchtig, und läßt sich in verschlossenen Gefäßen überdestilliren, wobei es sich in Blättchen sublimirt; unter Zutritt der atmosphärischen Luft entsteht gelbes Wismuthoxyd, welches einen gelben Rauch bildet.

Mit dem Sauerstoffe verbindet sich das Wismuth leicht, und stellt 2 Verbindungen dar:

1) Das Suboxyd. Man erhält es, wenn das Wismuth bei gelinder Hitze in offener Luft geschmolzen wird. Schon bei gewöhnlicher Temperatur läuft das Metall auf der Oberfläche an, und verwandelt sich allmälig in dieses rothbraune Suboxyd. Proust und Davy sahen diese Stufe als ein Gemenge von Oxyd und Metall an, weil Salzsäure ihm jenes entzieht und letzteres zurückläßt. Nach Berzelius zerfällt das Suboxyd bei der

Behandlung mit Salzsäure in salzsaures Wismuthoxyd und in zurückbleibendes Metall; es besteht aus 94,66 Wismuth und 5,34 Sauerstoff.

2) Das Oxyd. Es wird auf trocknem Wege gebildet, wenn Wismuth bis zur Weißglühhitze erhitzt wird, wobei es sich entzündet, und mit einer kleinen blauen Flamme brennt, die jedoch kaum merkbar ist. Es sublimirt sich das Oxyd als ein gelbes Pulver. Die beste Art aber, das Oxyd des Wismuths zu erhalten, ist, Wismuthmetall in Salpetersäure aufzulösen, die Auflösung mit Wasser niederzuschlagen, und den Niederschlag zu glühen. Man erhält ein strohgelbes Oxyd, das vom kaustischen Kali und Natron, und zum Theil auch vom kaustischem Ammoniak aufgelöst wird. 100 Oxyd bestehen aus 89,87 Metall und 10,13 Sauerstoff.

Mit den Metallen verbindet sich das Wismuth leicht, und trägt öfters dazu bei, die Verbindung leichtflüssig zu machen. Man bedient sich in den Künsten des Wismuths zu verschiedenen leichtflüssigen Mischungen für Löthungen und Abdrücke. 8 Th. Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn geben das leichtflüssige Metall (d'Arcetsches Metall), welches bekanntlich beim Siedepunkte des Wassers schmilzt, und über einem Lichte in einem Stück steifen Papier flüssig gemacht werden kann, ohne daß letzteres verbrennt. 1 Th. Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn geben das sogenannte Bleigießerloth.

Mit den Säuren bildet das Wismuth farblose Salze, die durch Kupfer, Cadmium und Zink metallisch gefällt, und durch Wasser meist in saure auflösliche und basische unauflösliche Salze geschieden werden, und in dieser Hinsicht macht das Wismuth einen Gegenstand der Pharmacie aus.

* Bistorta. Die Wurzel. Schlangen- oder Natterwurzel.

Polygonum Bistorta Linn. Wiesenknöterig, Natterwurz.

Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 3. Trigynia.

Juss. Cl. VI. Ord. 5. Polygoneae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst durch ganz Deutschland, auf feuchten ungebauten Orten und Wiesen.

Der Stengel ist einfach, aufrecht, mit röthlichen Gelenken versehen, rund, gestreift, hohl, glatt und erhebt sich zu einer Höhe von 2—3 Fuß. Die Wurzelblätter sind herzförmig, länglich, gekräuselt, unten weißlich und behaart. Die kleinern, schmalern Stengelblätter besitzen eine sehr breite Scheide, auf der sich ein stark verlängertes, spitzes Blatthäutchen befindet; die obern Blätter sind sitzend, und bieten immer eine häutige, stengelumfassende Scheide dar. Die Blüthen sind röthlichweiß, und stehen in einer eiförmigen, gedrückten Aehre am Ende des Stengels; jede Blüthe ist gestielt, und am Grunde von mehrern trocknen Deckblättern umschlossen.

Die Pflanze blüht im Mai und Juni.

Die officinelle Wurzel dieser Pflanze wird im Frühlinge eingesammelt. Sie ist zusammengedrückt, fast wie ein Finger dick und lang, hart, gekrümmt und gebogen, gegliedert, mit ringförmigen Runzeln versehen und mit vielen Fasern besetzt; auswendig schwarzbraun, inwendig röthlich oder

fleischfarbig, mit der Zeit orangegelb anlaufend. Sie besitzt einen kaum merklichen Geruch, aber einen sehr herben adstringirenden Geschmack.

Das Decoct ist roth, und schlägt das Eisen und die Gallerte stark nieder; sie enthält also viel Gerbestoff, Gallussäure, außerdem viel Stärkemehl, und ein wenig Sauerkleesäure. Sie ist ein tonisches und adstringirendes Heilmittel, welches in Blutflüssen, Durchfällen u. s. w. angewandt wird. Die Abkochung muß aber nicht gleichzeitig mit Eisensalzen verordnet werden.

Boletus igniarius. Feuerschwamm.

Ein Präparat aus dem Boletus igniarius Linn., einem durch ganz Europa an Eichen, Birken und andern Bäumen sehr häufig vorkommenden Schwamme.

Der innere getrocknete Theil des Schwammes, braun, leicht, löcherig, zähe. Man sehe darauf, daß er nicht mit Salpeter imprägnirt sey.

Boletus igniarius Linn. Der Zunder: Löcherpilz.
Linn. Cl. XXIV. Cryptogamia. Ord. Fungi.
Juss. Cl. 1. Ord. 1. Fungi.

Dieses bekannte Gewächs wird mit mehrern ähnlichen Arten durch Kochen in Lauge weich gemacht, geklopft, und um seine Brauchbarkeit als Zunder- oder Feuerschwamm zu befördern, in eine Auflösung von Salpeter eingeweicht, hierauf wieder getrocknet und geklopft. Soll dieser Schwamm nun zu chirurgischen Zwecken, als Wundschwamm angewandt werden, so ist sehr darauf zu sehen, daß der Schwamm völlig rein und nie in einer Salpeterlauge gewesen sey. Dem Wasser ertheilt der Feuerschwamm eine braune Farbe und einen adstringirenden Geschmack. Die Flüssigkeit enthält schwefelsauren Kalk, salzsaures Kali und einen Extractivstoff. In der unaufgelösten Substanz werden nach dem Verbrennen phosphorsaure Kalk- und Talkerde und etwas Eisen gefunden. Alkalien verwandeln diese Substanz mit etwas Schwierigkeit in eine seifenartige Flüssigkeit, die Ammoniakdünste aushaucht. Benzoësäure ist nicht darin gefunden worden.

* Boletus laricis s. purgans. Agaricus albus. Lerchenschwamm.

Classe und Ordnung wie vorher.

Dieser Pilz (das ἀγαρικὸν des Dioskorides) wächst auf dem Stamme und den alten Aesten der Lerchenfichte, in Asien, dem südlichen Europa und auf den Alpen. Er sitzt ohne Strunk fest, hat die Gestalt eines abgerundeten Kegels, von der Größe einer Faust bis zu der eines Kinderkopfs, ist oberhalb mit einer rauhen, harten, holzigen, und mit kreisförmigen gefranzten Streifen durchzogenen Rinde bedeckt, unterhalb mit feinen kaum zu erkennenden Löcherchen versehen, und in seinem Innern von weißer, leichter und schwammiger Substanz. Beim Einsammeln wird er von der farbigen

Rinde befreit, an der Sonne gebleicht und mit hölzernen Hämmern geschlagen. Dadurch wird er weiß, leicht und zerreiblich, und in dieser Gestalt kommt er in den Apotheken vor. Je leichter er ist, desto besser ist er; den aus Aleppo hielt man sonst für den besten.

Der Lerchenschwamm ist geruchlos, hat einen anfänglich süßen, nachher scharfen, bittern und ekelhaften Geschmack. Er erregt beim Pulvern, welches seiner Zähigkeit wegen schwer von statten geht, durch den aufsteigenden Staub Husten, Niesen und Thränen der Augen; um dieses möglichst zu vermeiden, wird er daher vorher mit Traganthschleim zu einer breiigen Masse angestoßen, dann getrocknet und gepülvert.

Bucholz (Berl. Jahrb. 1808. S. 111.) zog 1000 Gran gröblich gepulverten weißen Lerchenschwamms erst mit Alkohol aus. Die gesättigt rothbraune Tinctur läßt auf Zusatz von Wasser sogleich das Harz in Gestalt eines weißen Pulvers fallen. Die durch Behandlung mit Weingeist davon erhaltene Harzmasse hat eine leberbraune Farbe, ist sehr brüchig und spröde, läßt sich leicht zu einem erbsengelben, ins Bräunliche fallenden Pulver zerreiben; gekaut hat sie fast gar keinen bittern Geschmack, nach der Auflösung in Alkohol aber zeigt sie ihre ganze Bitterkeit. Ohne Erwärmung besitzt das Harz keinen ausgezeichneten Geruch, auf einen stark erhitzten Körper gestreut verbreitet es einen fettartigen Geruch, der von einem harzigen, schwach balsamischen begleitet ist. Es löst sich in Schwefeläther, wie in absolutem Alkohol, leicht und vollkommen auf; auch in heißem Terpenthinöl erfolgt die Auflösung leicht und in solcher Menge, daß die Auflösung nach dem Erkalten die Dicke einer dünnen Salbe annimmt, wodurch es sich von dem auch in siedendem Terpenthinöle gänzlich unauflöslichen Jalappenharze unterscheidet. Ein Antheil dieses Harzes ist jedoch nur in heißem Terpenthinöle auflöslich, und scheidet sich beim Erkalten daraus wieder ab.

Das aus der geistigen Auflösung durch Wasser niedergeschlagene Lerchenschwammharz löst sich in Aetzkalilauge vollkommen auf, und die Auflösung trübt sich kaum etwas, wenn letztere im Ueberschusse zugesetzt wird, wodurch es sich vom Geigenharze unterscheidet.

Aus dem durch Alkohol erschöpften Lerchenschwamme zieht das Wasser noch ein Gummi von schwach süßlich-bitterm Geschmacke, und zäher hornartiger Beschaffenheit aus. Der Rückstand zeigte durchaus nichts von den Eigenschaften des verhärteten Eiweißes oder Klebers, sondern verhielt sich mehr wie eine Art von verhärtetem Pflanzenschleime, der zum Theil schon in einen der Holzfaser ähnlichen Zustand übergegangen ist. Bei der trocknen Destillation wurde nur sehr wenig im Ueberschusse mit Essigsäure verbundenes Ammoniak erhalten.

1000 Th. enthalten nach Bucholz: ein in Terpenthinöle bei mittlerer Temperatur in allen Verhältnissen auflösliches Harz 410; ein darin nur in der Siedehitze auflösliches Harz 90; wäßrigen Extractivstoff von schwach bitterm, erwärmendem Geschmacke mit etwas Seifenstoff 30; gummig-schleimige Sub-

stanz 60; Faserstoff, einem verdichteten Schleime ähnlich, wovon 33 Th. sich mehr der Natur der Holzfaser nähern; Wasser und Verlust 104.

Bouillon-Lagrange (Ebend. S. 121.) folgert aus den von ihm angestellten Versuchen, daß der Lerchenschwamm in die Reihe der animalisirten Pflanzenstoffe gestellt werden müsse, und im Allgemeinen scheinen sich auch wirklich die Schwämme der Natur der thierischen Stoffe mehr zu nähern, als irgend ein anderes Erzeugniß des Pflanzenreichs, indem sie als letzte Bestandtheile, außer Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff, eine beträchtliche Menge Stickstoff enthalten und bei der trocknen Destillation Ammoniak geben. Auch durch ihr schnelles Aufwachsen und Absterben, durch den großen Gestank, welchen sie bei der Zersetzung durch Feuer verbreiten, scheinen sie sich der Natur thierischer Stoffe zu nähern. Proust hat in ihnen Benzoësäure und phosphorsauren Kalk entdeckt. Sie haben daher mit Recht spätere chemische Untersuchungen veranlaßt, nämlich von Vauquelin (Schw. J. XII. 1814. S. 253.) und Braconnot (Ebend. S. 260.). Nach diesen gleicht der unauflösliche fungöse Theil der Schwämme zwar in mancher Hinsicht der Holzfaser, ist aber in Alkalien nicht so unauflöslich wie letztere, giebt eine nahrhafte Speise, und ist ein eigenthümlicher Stoff, dem man deshalb den Namen Fungin gegeben hat. Auch sind zwei neue vegetabilische Säuren, die Schwammsäure und die Pilzsäure aufgefunden worden.

Bouillon Lagrange bemerkte schon eine sehr merklich saure Reaction des Lerchenschwammes; auch erhielt er aus dem Harze des Lerchenschwammes durch Behandeln mit Kalk und Zersetzen durch Salzsäure Benzoësäure. Durch Salpetersäure erhielt er aus dem Lerchenschwamme Kleesäure, Aepfelsäure und eine dem Fettwachs ähnliche Substanz. Der eingeäscherte Lerchenschwamm zeigte kohlensaures, schwefels. und salzs. Kali, schwefelsauren und phosphorsauren Kalk, kohlens. Kalk und ein wenig Eisen.

Der Lerchenschwamm, als dessen vorzüglich wirksamer Bestandtheil das Harz anzusehen ist, wirkt wasserabführend, ist aber in größern Gaben ein drastisches Purgirmittel. Die Pulverform ist zum Gebrauche weniger zu empfehlen, als ein weiniger oder schwach geistiger Auszug. Er macht einen Bestandtheil der Species zu dem sogenannten Lebenselixir aus.

Bolus alba. Weißer Bolus.

Ein Mineral, an verschiednen Orten ausgegraben.

Eine zusammenhängende, zerreibliche, weißliche, abschmutzende, befeuchtet zähe Erde, im Wasser zerfallend, größtentheils aus Thon bestehend. Der durch Auswaschen von den fremdartigen Theilen gereinigte ist vorzuziehen.

Der weiße Bolus kommt sehr häufig vor, und ist desto besser, je weißer und reiner er ist. Er besteht aus Thonerde, Kalkerde, Kieselerde, und enthält auch fast immer etwas Eisenoxyd. Alle Bolusarten haben die Thon-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0185-5

erde zur Basis, welche bekanntlich eine von den auf der Erde am meisten verbreiteten Substanzen ist, und die Eigenschaft hat, das Wasser stark anzuziehen, und nur erst bei den heftigsten Feuersgraden nach und nach wieder fahren zu lassen, wobei sie stark zusammengeht. Sie eignet sich daher nicht nur, im feuchten Zustande alle Formen anzunehmen, und nach dem Brennen Ziegel, irdene, Fayence- und Procellangeschirre darzustellen, sondern ist auch wegen der Fähigkeit, die Feuchtigkeit zurückzuhalten, für den Ackerbau von der größten Wichtigkeit, und bildet in der Verbindung mit dem kohlensauren Kalk als Mergel ein bekanntes Düngungsmittel.

In der Medicin wird der Bolus nicht mehr angewendet; früher wurde er als austrocknendes Mittel, zum Bestreuen wunder Stellen bei kleinen Kindern, gebraucht. Mit vielem Nutzen aber wird er als Lutum angewendet, besonders zum Ausstreichen der Fugen und zum Verkleben solcher Destillationsgefäße, in welchen Salzsäure, Salpetersäure, Essigsäure in Dämpfen übergetrieben werden sollen, zu welchem Zwecke man ihn mit etwas feinem Sande versetzt, mit Wasser zu einem dünnen Brei anrührt, und damit Leinwandstreifen bestreicht, welche man um die Fugen des Destillirgefäßes legt. Kastner empfiehlt folgende Weise: zuerst wird die Fuge mit dem zum steifen Breie mit Wasser angerührten weißen Bolus hinreichend dick ausgestrichen, und der Lufttrockniß überlassen, die man auch durch künstliche Wärme beschleunigen kann. Hierauf, nachdem dieser Kitt vollkommen getrocknet, überpinselt man seine gereinigte Oberfläche mit gereinigtem Leinöl oder einem andern austrocknenden Oele so lange, bis kein Oel mehr eingesogen wird, und nun sind die Fugen so dicht geschlossen, daß auch selbst sehr heißes Salzsäuregas, salpetersaurer Dampf u. s. w. nicht hindurch geht.

Ueberzieht man Glaskolben, Retorten ꝛc. mit wäßrigem Thonbrei und bestäubt diesen dann mit Sand, oder setzt man noch zweckmäßiger vor der Bestäubung dem Thon etwas frischgebrannten Kalk zu, so erhält man einen sehr dauerhaften Beschlag, der gegen das Zerreißen der Gefäße im offnen Kohlfeuer sehr gut schützt.

Läßt man den weißen Bolus in Wasser zergehen, so setzt sich der eingemengte grobe Sand zu Boden; wird dann die Masse in kleine scheibenförmige oder walzenförmige und flache Kuchen geformt, und mit einem Stempel bezeichnet, so erhält sie den Namen weiße Siegelerde (Terra sigillata alba), die früher noch besonders in der Medicin Anwendung fand.

Bolus armena. Armenischer Bolus.

Ein Mineral, nicht nur in Armenien, sondern auch in Deutschland u. s. w. vorkommend.

Eine zusammengesetzte, zerreibliche Erde, beim Anfühlen fettig, gelblichroth, aus Thon und Eisenoxyd gemischt.

Der armenische Bolus wurde früher, wie schon der Name zeigt, aus dem Orient gebracht, jetzt bezieht man ihn schon seit sehr langer Zeit bloß

aus einigen Gegenden in Frankreich und in Deutschland. Er besteht aus derben schweren Stücken von vollkommen muschligem Bruche, innerlich flimmerndem Glanze und glänzendem Striche. Die Farbe ist gelbroth, er fühlt sich zart und fettig an, hängt sehr an der Zunge, zerschmilzt gleichsam im Munde, und zerfällt im Wasser, vorher getrocknet mit einem knisternden Geräusche, zu einem feinen Brei. Mit Säuren braust er nicht auf. Spec. Gew. 1,4 bis 2,0.

Die Bestandtheile sind auch hier Thonerde und Kieselerde, die Farbe wird ihm durch Eisenoxyd, Eisenocher ertheilt.

Der wohlfeilere und gröbere rothe Bolus, von gleicher Zusammensetzung, welcher dem armenischen bisweilen untergeschoben wird, ist matt, röthlichweiß mit verschiedenen Abänderungen der Farbe, bis ins Rothe.

Die rothe Siegelerde (**Terra sigillata rubra**) wird durch eine ähnliche Bearbeitung der rothen Bolusarten erhalten, wie bei dem weißen angegeben worden ist. Sie kam ehemals aus der Levante und von der Insel Lemnos, daher sie auch den Namen Lemnische Erde (**Terra Lemnia**) führte.

Ein ähnlich zusammengesetzter Körper, aus Thonerde, Kieselerde und Eisenoxyd, ist die rothe Kreide oder der Rothstein.

Borax. Boras natricus cum aqua. Borax.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem rohen Borax, Tincal genannt, einem im mittlern Asien sich vorfindenden fossilen Salze.

Ein Salz in weißen, harten, an der Luft ein wenig matt werdenden, krystallinischen Stücken, von einem süßlichen laugenhaften Geschmacke, in zwölf Theilen Wasser auflöslich, bei gelinderm Feuer sich aufblähend, bei stärkerem sich verglasend. Es besteht aus Natron und Boraxsäure, wobei jenes vorwaltet, und auch aus einer großen Menge Wasser.

Der Ursprung des Borax war lange Zeit in Europa unbekannt. Im Jahr 1772 kamen einige Boraxexemplare in krystallinischer Gestalt, die in Tibet aus der Erde gegraben worden waren, nach Schweden. Auch scheint er den Alten nicht bekannt gewesen zu seyn, denn ihr Chrysokolla, von zwei griechischen Worten, die die Anwendung zum Löthen des Goldes bezeichnen, ist nach Ure eine ganz andere Substanz gewesen, und hat aus Kupferrost mit Harn zusammengerieben bestanden. Das Wort Borax findet sich zum ersten Male in Geber's Werken.

Der natürliche Borax, Tincal, Pounxa (**Borax nativa**), wird nicht allein im Morgenlande, vorzüglich in Tibet, China, sondern auch in Südamerika in zwei Bergwerken von Potosi, wo er von den Eingebornen zu Schmelzung der Kupfererze gebraucht wird, gefunden. Der verkäufliche kommt größtentheils aus Tibet. Hier ist er in dem Wasser mehrerer Seen

dieses Landes aufgelöst enthalten, oder erzeugt sich in demselben. Man erhält ihn dadurch, daß man das Wasser solcher Seen in Gruben leitet und verdunsten läßt, den mehrsten aber wohl dadurch, daß man den bei dem theilweisen Eintrocknen der Seen während der heißesten Jahreszeit in Krystallen abgesetzten Borax sammelt. Dieser rohe Borax ist, wie er in den Handel gebracht wird, mit Thon und einer besondern fetten, durch das überschüssige Alkali des Borax seifenartig gewordenen Materie verunreinigt, und von bläulicher oder gelblicher Farbe.

Man unterscheidet drei Sorten des rohen Borax: den indischen Borax, welcher aus kleinen, mehr oder weniger unreinen Krystallen besteht, den bengalischen oder den Borax von Chandernagor, in großen rundlichen Krystallen, und den chinesischen Borax, welcher halbrein ist, und aus 4 bis 5 Centimeter dicken Stücken oder Krusten besteht, welche von außen dem Milchzucker ziemlich ähnlich sehen.

Die Reinigung des Borax wurde lange Zeit von den Venetianern und Holländern als ein Geheimniß betrieben. Sie geschieht aber jetzt auch in andern Ländern, und zwar entweder durch anhaltendes Kochen in Wasser und wiederholtes Umkrystallisiren, oder indem man ihn im Feuer schmilzt, um den färbenden fetten Stoff zu zerstören, dann auflöst und krystallisirt, oder indem man ihn nach Robiquet's Vorschlag in kaltem Wasser mit einem Zusatze von Kalk wäscht, wodurch die fettige Substanz von dem Natron getrennt, und in unauflösliche Kalkseife verwandelt wird. Das Ganze wird umgerührt, und auf ein Haarsieb gegossen, damit die Lauge von dem Borax ablaufe, welcher sodann vollends aufgelöst wird. Um die letzten Antheile von Natronseife zu zerlegen, wird $\frac{1}{2}$ salzsaurer Kalk zugesetzt, die Flüssigkeit filtrirt, abgeraucht und krystallisirt.

Seit einiger Zeit wird ein bedeutender Theil des käuflichen Borax von französischen Fabricanten auf eine wohlfeilere Weise bereitet, als er bis jetzt aus dem ostindischen Tincal dargestellt werden konnte. Schon im Jahr 1776 entdeckten Höfer und Mascagni, daß mehrere warme Quellen Toscana's, namentlich die zu Cherchiajo, Monti-Cerboli und Castel Nuovo, freie Borarsäure enthalten, und daß auch die Erde in der Nähe dieser Quellen damit geschwängert sey. Diese borarsäurehaltige Erde wird vermittelst des heißen Wassers der Quellen ausgelaugt, und die Lauge bis zum Krystallisationspunkte abgedampft, woraus dann die Säure in kleinen graulichen Blättern anschießt. Diese rohe Borarsäure wird größtentheils nach Frankreich eingeführt und in dortigen Fabriken mit kohlensaurem Natron, bis zum Ueberschusse des letztern, in der Hitze gesättigt. Um die im Handel beliebten großen und gut ausgebildeten Krystalle zu erhalten, ist nothwendig, das Verhältniß dieses Ueberschusses gut zu treffen, und demnächst die Krystallisation recht langsam und regelmäßig vor sich gehen zu lassen. Gewöhnlich läßt man den Borax zweimal krystallisiren, und zwar das letztemal in großen Massen, weil hier sich größere Krystalle bilden.

Der gereinigte Borax bildet ziemlich große, weiße, feste, halbdurch-

sichtige, glänzende Krystalle, die nur selten reguläre sechsseitige Säulen mit zwei breiten und vier schmälern Seitenflächen und dreiseitigen pyramidalen Endspitzen darstellen, und einen glänzenden flachmuschligen Bruch haben. Er hat einen milden, süßlichen, nachher laugenhaft bittern Geschmack, wird an der Luft mit der Zeit unscheinbar, und an der Oberfläche mehlig, bedarf bei mittlerer Temperatur zwölf, in der Siedhitze zwei Theile Wasser zu seiner Auflösung, und ist im Alkohol ganz unauflöslich. In der Hitze wird er erst flüssig, bläht sich dann auf, und liefert eine leichte, lockere Masse, gebrannter Borax, der sein Krystallisationswasser verloren hat. Bei einem noch stärkeren Feuersgrade fließt er zu einem durchsichtigen Glase.

Der Borax ist ein basisches Salz, daher er auch den Veilchensaft grün färbt, und besteht

	nach Berzelius	Soubeiran	L. Gmelin
aus Boraxsäure . .	36,5248	34,976	35,6
Natron . . .	16,4752	16,775	17,8
Wasser . . .	47,0000	48,249	46,6
	100,0000	100,000	100,0

Aus der Auflösung des Borax in Wasser wird die Boraxsäure durch Schwefel-, Salpeter- oder Salzsäure in glänzenden Blättchen ausgeschieden.

Verfälschungen des Borax werden wohl selten vorkommen, da untergeschobener Alaun durch den styptischen Geschmack, Röthen des Veilchensyrups, und durch die mit Kali niedergeschlagene Thonerde, Steinsalz aber durch das Verprassen auf glühenden Kohlen und Entwickelung salzsaurer Dämpfe vermittelst concentrirter Schwefelsäure sich leicht erkennen lassen.

Der Borax hat die besondere Eigenschaft, den Schleim von arabischem Gummi, so wie den des isländischen Mooses und des Saleps beträchtlich zu verdicken, welche Verdickung aber durch Zucker oder Honig wieder aufgehoben wird. (Schweigger's J. XIII. S. 491.). Schon 2—3 Gran Borax sind hinreichend, ein Loth Mimosenschleim in eine elastische, leicht und ohne Fäden zu ziehen trennbare Masse, welche beim Reiben nicht an den Fingern klebt, noch dieselben befeuchtet, zu verwandeln. Auf andere Schleime wirkt er nicht.

Der Borax wird innerlich in Pulver und in der Auflösung, aber auch häufig äußerlich gebraucht. Nach Wurzer ist die Boraxauflösung ein besseres Lösungsmittel für die Harnsäure, als alle andere Lösungsmittel auf nassem Wege. Diese Erfahrung scheint nicht nur für die Analyse der Harnsteine, sondern auch als Heilmittel gegen dieselben wichtig zu seyn. Der innerliche Gebrauch des Borax als wehenbeförderndes Mittel, und auch bei Kindern ist bekannt Aeußerlich ist er von Hufeland gegen die rothen Hitzblattern, ein halbes Quentchen Borax in Pomeranzen- und Rosenwasser, von jedem ein Loth, und die Flecke täglich 4—5 mal damit zu betupfen und eintrocknen zu lassen, empfohlen. In den Schönheitsmitteln, als der Pariser Schönheitsmilch, in der Milch der Venus ꝛc., spielt der Borax eine Hauptrolle. Dr. Dewees hat bei dem so außerordentlich quälenden Jucken an

den pudendis, welches bei Weibern zuweilen vorkommt, eine starke Auflösung von Borax in Wasser, zum Waschen und Einspritzen, 4—5 mal des Tages empfohlen u. s. w.

Eine wichtige Anwendung findet der Borax in der analytischen Chemie im verglasten Zustande als flußbeförderndes Mittel zu Löthrohrversuchen. Mehrere Metalloxyde werden durch die Farbe erkannt, welche sie vor dem Löthrohre dem verglasten Borax ertheilen: so färbt Mangan violett, Eisen bouteillengrün, Kobalt blau u. s. w. Aber auch in den Künsten und Gewerben ist der Borax von großem Nutzen: so stellt eine kleine Quantität Borax die Flüssigkeit der Glasmasse, die nicht mehr recht fließen will, wieder her. Am häufigsten braucht man ihn zum Löthen; er befördert den Fluß des Lothes, und erhält die Oberfläche der Metalle in einem weichen oder rein metallischen (vielleicht in einem entgegengesetzt elektrischen) Zustande, wodurch das Geschäft des Löthens erleichtert wird.

Mit Schellack vermischt, in dem Verhältniß wie 1 zu 5, bewirkt er, daß der Lack in fast siedendem Wasser durch Digestion auflöslich ist.

Brassica Rapa. Die Wurzel. Weiße Rübe.

Brassica Rapa sativa Linn.

Linn. Cl. XV. Tetradynamia. Ord. Siliquosa.
Juss. Cl. XIII. Ord. 3. Cruciferae.

Der Rübsenkohl ist eine bekannte zweijährige Pflanze, welche in Gemüsegärten und auf Aeckern gebaut wird.

Die Wurzel, Speiserübe, wird als Nahrungsmittel benutzt, aus den öligen Saamen erhält man aber durch Auspressen eine reichliche Ausbeute eines gelben übelriechenden Oeles, welches zum Brennen und zum Einträuken der Wollenzeuge und des Leders benutzt, sehr häufig aber dadurch gereinigt und zu verschiedenen Zwecken geschickt gemacht wird, daß man ihm die färbenden Stoffe durch Schlagen mit Vitriolöl entzieht, in welchem Zustande es das allgemein bekannte raffinirte Rüböl darstellt.

Bryonia. Die Wurzel. Gichtrübe. Zaunrübe.

Bryonia alba Linn. et Bryonia dioica Jacquin. Ausdauernde Pflanzen Deutschlands.

Die frisch spindelförmige, milchende, sehr große Wurzel, in Querscheiben zerschnitten und getrocknet weiß, mit sich gegenseitig aufliegenden Ringeln (der Rinde), mit einem aus festen Bündeln zusammengesetzten Holze, von bitterm, widrigem Geschmacke. Im Herbste einzusammeln.

Bryonia alba Linn. Die weiße Zaunrübe, Gichtrübe.
Bryonia dioica Jacq. Die rothbeerige Zaunrübe, Gichtrübe.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0190-5

Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 2. Cucurbitaceae.

Von beiden Pflanzen wird die officinelle Bryonienwurzel gesammelt; die erstere ist weit seltener, und unterscheidet sich von der hier zu beschreibenden durch einhäusige Blüthen und schwarze Früchte.

Die rothbeerige Zaunrübe wächst durch ganz Deutschland wild.

Die Wurzel (die größte von allen einheimischen Gewächsen) ist sehr stark, 4—6 Pfund schwer, rübenförmig, nach unten verdünnt und oft zweispaltig, fleischig, außen gelblichgrau und runzlig, innen weiß. Aus ihr kommen krautartige, ästige, eckige, mit einzelnen Haaren besetzte Stengel hervor, die eine Länge von 6 Fuß und drüber erreichen, und sich weit um alle benachbarten Bäume und Sträucher herumschlingen.

Die Blätter sind gestielt, nach einer Seite gerichtet, herzförmig, fünflappig; die Lappen sind stumpf gezahnt, und werden gegen die Spitze des Stengels viel schmäler und spitzer. Die männlichen, blaßgelben Blüthen stehen in langgestielten Trauben in den Blattwinkeln, und sind mit grünen Nerven versehen; die weiblichen Blüthen stehen zu 4—5 auf kurzen Stielen, einzeln oder in kleinen Dolden. Die im unreifen Zustande dreifächerige Beere, mit 2 Saamen in jedem Fache, wird bei der Reife schön roth, und die Scheidewände verschwinden fast ganz.

Die Pflanze hat einen eigenen, unangenehmen, bisweilen moschusartigen Geruch; sie blüht den ganzen Sommer hindurch.

Die frische Wurzel enthält einen scharfen und bittern Milchsaft und hat einen widrigen Geruch. Durch Trocknen geht dieser und der scharfe Geruch größtentheils verloren, so daß die heftig drastische Wirksamkeit der frischen Wurzel nur noch in geringem Maße der getrockneten inwohnt. Zum Trocknen pflegt man sie in Scheiben zu zerschneiden. Sie zeigt concentrische Ringe und Strahlen, die vom Mittelpunkte ausgehen. Getrocknet ist sie schwammig, mehlig, blaßgelb und wird sehr bald von den Würmern zerfressen.

Der Saft dieser Wurzel, welcher vorzüglich in ältern Zeiten als ein stark abführendes und urintreibendes Mittel, namentlich in der Wassersucht, häufig gebraucht worden, ist von Vauquelin (Berl. Jahrb. auf das Jahr 1807. S. 14.) zerlegt worden, und nach dieser Zerlegung enthält die Wurzel: 1) eine eigenthümliche in Alkohol lösliche bittere Substanz, welche das wirksame Princip der Wurzel ist; 2) Stärkemehl; 3) äpfelsauren Kalk mit überschüssiger Säure; 4) phosphorsauren Kalk; 5) eine reichliche Menge Gummi; 6) eine kleine Menge Zucker; 7) eine thierisch-vegetabilische Substanz; 8) holzige Faser.

Brandes und Firnhaber (Archiv des Apothekervereins ꝛc. III. S. 351. Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 209.) haben in 2000 Th. der Bryonienwurzel gefunden: Bryonin, verbunden mit etwas Zucker, Phyteumacolla, essigs. und äpfels. Kalksalzen 38; Harz in Aether löslich, mit etwas Wachs 42; Halbharz in Aether unlöslich 26; Schleimzucker mit Phyteumacolla, saurem äpfels. Kalk und äpfels. Kali 200; Gummi 290; Stärkemehl 40;

Gelatin 50; verhärtetes Stärkemehl 20; phosphors. Bittererde und Alaunerde 10; äpfels. Bittererde 20; verhärtetes Pflanzeneiweiß 124; Gummoin durch Kalilauge ausgezogen 55; durch Kali löslich gemachte extractive, der Phyteumacolla verwandte Materie 340; Faser 315; Wasser 400; Verlust 30. S. = 2000.

Das Bryonin (Vauquelin's bittere Substanz) ist wahrscheinlich der wirksame Bestandtheil der Wurzel. Es ähnelt sehr dem Kathartin (siehe Senna. Folia), hat eine röthlichbraune Farbe, einen süßlichen Geruch, einen anfangs süßlichen, dann gering stechenden, und darauf außerordentlich bittern Geschmack, zieht an der Luft Feuchtigkeit an, löst sich in Wasser und Weingeist, und diese Lösung röthet Lackmus und wird durch Galläpfeltinctur, so wie durch essigsaures Blei stark gefällt. Man erhält es am reinsten, wenn man die Auszüge der Zaunrübenwurzel mit essigsaurem Blei fällt, den Niederschlag abscheidet, dann mit Wasser anrührt, durch dieses Gemisch Hydrothionsäure bis zur völligen Zersetzung des Niederschlages strömen läßt, die Flüssigkeit filtrirt, zur Trockne abraucht, und aus diesem Rückstande das Bryonin mit wasserfreiem Weingeist auszieht. Durch mehrmalige Behandlung mit absolutem Weingeist erhält man es in noch reinerem Zustande. Durch Behandlung mit reiner Bittererde wird daraus kein Alkaloid abgeschieden.

Diese Wurzel, welche im Aufgusse oder auch im Pulver verordnet werden kann, ist fast ganz außer Gebrauch gekommen.

Cacao. Die Saamen. Cacaobohnen.

Theobroma Cacao Linn. Ein in den wärmeren Gegenden Amerikas cultivirter Baum.

Eiförmig-längliche, zusammengedrückte, harte, braunschwärzliche, von einem milden salbenartigen Oele strotzende Saamen, von einem öligen, bitterlichen, angenehmen Geschmacke.

Theobroma Cacao Linn. Wahrer Cacao.
Linn. Cl. XVIII. Polyadelphia. Ord. 1. Pentandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 13. Malvaceae.

Dieser merkwürdige Baum kommt wildwachsend in Mexiko und andern Gegenden Südamerikas vor. Sein Anbau hat sich aber auf die Antillen und über andere Gegenden des amerikanischen Festlandes verbreitet.

Der Cacaobaum erhebt sich bis 30 oder 40 Fuß. Der Stamm, dessen Holz zart und leicht ist, theilt sich in eine Menge schlanker, langer Aeste, aus denen die abwechselnden, ganzrandigen, kurzgestielten, verkehrt-eiförmigen, zugespitzten, glänzenden und kahlen Blätter stehen. Zwei am Grunde des Blattstiels sitzende Nebenblätter sind linienförmig, ganzrandig, abfallend.

Die Blüthen sind röthlich, von dünnen, zu kleinen Büscheln vereinigten Stielen getragen. Einige dieser Blüthenbüschel entstehen an dem Stamme und den großen Aesten, und bloß hier sind die Blüthen fruchtbar, dagegen alle an den jungen Aesten stehende keine Früchte tragen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0192-7

Die Frucht, die eine gurkenähnliche Gestalt hat, zeigt eine ungleiche, höckerige, nach den verschiedenen Spielarten bald gelbe, bald rothe Oberfläche; die Saamen sind von einem wäßrigen, etwas säuerlichen Breie umhüllt. Sie bestehen aus einer eigenthümlichen, krustigen Saamenhaut, die einen dicken Keim verbirgt. Die beiden Saamenlappen sind in eine Menge unregelmäßig gefalteter Lappen zerschnitten.

Wenn die Früchte ihre vollkommne Reife erlangt haben, werden sie gesammelt und zerbrochen. Das Mark, welches stark anhängt, und seines süßlich-säuerlichen Geschmackes wegen gegessen wird, wird von den Saamen genau abgesondert; diese werden noch ganz frisch in große Fässer gepackt, mit Steinen beschwert, und bleiben so einige Tage liegen, wobei sie eine Art Gährung erleiden, welche theils dazu dient, den Bohnen den bittern und herben Geschmack zu benehmen, theils auch, um das nachherige Auskeimen zu verhüten. Nach der Gährung breitet man die Bohnen, die jetzt eine rothe oder braune Farbe angenommen haben, an einem freien Orte in der Sonne aus, und kehrt sie fleißig um, damit sie recht trocken werden. Man gräbt auch wohl die Saamen in die Erde, um sie hier der Gährung zu überlassen.

Nach den verschiedenen Gegenden, in welchen der Cacaobaum wächst, unterscheidet man im Handel auch verschiedene Sorten Cacao; wahrscheinlich sind es aber auch verschiedene Arten von Bäumen; nicht bloß Abarten, von denen die Früchte gesammelt werden.

Cacao von Caracas (Cacao caraque, de Caraquas). Die beste Sorte von allen, die aus der Provinz Venezuela oder Nikaragua in Mexiko, oder auch wohl von Caracas, einer Stadt und Hafen in Peru am stillen Ocean, kommt. Die Bohnen sind größer, dicker, schwerer und härter, als die übrigen, von unebener Oberfläche. Die Schalen sind gemeiniglich mit kleinen, glänzenden, weißlichen Flittern bedeckt, welche Glimmer oder Talk sind, der sich wahrscheinlich von der Erde, worauf sie in ihrem Vaterlande getrocknet sind, angehangen hat. Unter dieser Schale befindet sich der braunroth-grauliche, etwas glänzende, leicht brüchige Kern, der bei mäßigem Drucke in kleine Stücke zerfällt, rein fettig und angenehm bitterlich schmeckt. Diese Bohnen enthalten auch mehr Oel als die andern.

Geringer an Güte sind die von den Inseln Amerikas kommenden Cacaobohnen, von denen die von der Insel Barbion den vorigen am nächsten kommen. Sie sind rundlicher, kleiner, von mehr ebener und glatter Oberfläche und dünnerer Schale, die mit einem hellgrauen, glimmerartigen Staube überzogen ist, und auch von angenehm bitterm, doch nicht so feinem Geschmacke. Der Cacao von Martinique, welcher mit dem aus Surinam und St. Domingo von gleicher Beschaffenheit ist, ist kleiner, mehr breit als rund, flacher, dünner und weniger ölreich. Die Schale ist glatt, nicht bestäubt, hellbraun und hängt viel fester an dem bitter und etwas herbe schmeckenden Kerne. Diese Sorte kommt am häufigsten vor und dient gewöhnlich zur Bereitung der Chocolade.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0193-3

Die schlechteste Sorte ist der brasilianische oder portugiesische Cacao (Cacao brasiliensis, C. Maragnan), der lang, schmal, dunkelbraun und trocken ist, und bitterlich schmeckt.

Beim Einkaufe hat man nicht nur auf die Verwechselung und Vermengung mit schlechten Sorten, sondern auch darauf zu achten, daß die Bohnen nicht schimmlig, inwendig weißlich sind, und einen dumpfen, faden Geschmack haben. Nach Schrader (Allgem. J. f. Chemie und Physik VI.) enthalten die Cacaobohnen einen dem Coffëin (siehe Coffea) verwandten Stoff, eine bedeutende Menge eines fetten und consistenten Oels und Faser. Das fette Oel findet in der Medicin Anwendung. Am häufigsten aber werden die Cacaobohnen benutzt zur Bereitung der Chocolade. Zu diesem Endzwecke werden die Bohnen geröstet, um den etwas dumpfigen Geruch zu benehmen, die Feuchtigkeit größtentheils zu vertreiben, und um die Schärfe und Bitterkeit zu vermindern. Auch läßt sich dann die Schale leichter ablösen. Die von ihren Schalen gereinigten Bohnen werden hierauf in einem eisernen gelind erwärmten Mörser, oder in einem eignen weiten eisernen Kessel zerrieben, bis sie vermöge ihres fetten butterartigen Oeles zerflossen und so fein sind, daß auf der Zunge nichts Körniges mehr unterschieden werden kann. Dann wird der fein gepulverte Zucker allmälig zugesetzt, und mit dem Reiben oder Stoßen so lange fortgefahren, bis die Masse wieder ganz gleichartig ist, worauf dann zuletzt das Gewürz, Vanille oder in deren Ermangelung peruvianischer Balsam zugemischt, der Teig in blecherne Formen getragen, und durch Klopfen ihm eine ganz gleiche, glatte Oberfläche ohne Blasen gegeben wird. Nach dem Erkalten sind die Tafeln leicht von den Formen zu trennen.

Von mehreren Seiten ist in neuerer Zeit auf die Spuren von freiwerdender Elektricität bei der frisch bereiteten, noch in den Tafeln befindlichen Chocolade aufmerksam gemacht werden, diese sind aber schon in früherer Zeit bemerkt. So heißt es in Wiegleb's Geschichte der Chemie (IIter Th. S. 283.): „Als Pabst in Riga in jetzigem Winter (1782) eine Portion Chocolade verfertigt hatte, und die erkalteten Tafeln so auf einander legte, daß immer die Seite, welche an der Form gelegen hatte, oben zu liegen kam, so bemerkte er, daß einige kleine abgesprungene Stückchen, welche oben drauf fielen, sich schnell in die Höhe richteten, und daraus vermuthete er eine elektrische Wirkung. Als er darauf mit einigen Tafeln ins Dunkle ging, welche noch in der Form waren, sie dann herausnahm, und die Fläche, welche den blechernen Boden berührt hatte, mit den Fingern berühren wollte, so konnte er aus mancher starken Tafel 20 bis 30 starke elektrische Funken ziehen."

Die sogenannte Gesundheitschocolade ist entweder aus dem zerflossenen Cacao allein (Cacao tabulata), oder aus Cacao und Zucker zu gleichen Theilen bereitet. Die Gerstenchocolade besteht aus gleichen Theilen Cacao und präparirtem Gerstenmehle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0194-9

Cajeput. Das Oel. Cajeputöl.

Es wird in Ostindien aus den Aesten und Blättern von Melaleuca Leucadendron Linn., einem dort einheimischen kleinen Baume, durch Destillation bereitet.

Ein ätherisches dünnflüssiges, gemeiniglich grünes, seltener gelbliches Oel, von campherartigem Wohlgeruche, scharfem und gewürzhaftem Geschmacke. Spec. Gew. = 0,926. Das kupferhaltige darf nur, um das rectificirte Oel daraus zu bereiten, oder zum äußerlichen Gebrauche angewendet werden.

Melaleuca Leucadendron. Weißstämmiger Cajeputbaum.
Linn. Cl. XVIII. Polyadelphia. Ord. 4. Polyandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 7. Myrti.

Der Cajeputbaum wächst auf mehreren Inseln des ostindischen Archipels, besonders auf Celebes, Amboina, Buro und Cerama, wo er, besonders auf den zuletzt genannten Inseln, nach Rumph ganze Berge bedeckt; er kommt hier einzeln, so daß er nie dichte Wälder bildet, an sonnigen Orten auf kiesigem Thonboden vor.

Der Stamm erreicht die Dicke eines Mannes, und eine Höhe von 50 Fuß; das Holz ist graulichweiß, fest und schwer; seine Rinde ist weiß, unserer Birke ähnlich, ihre Epidermis reißt wie bei dieser auf, und rollt sich spiralförmig zurück. Am untern Theile sind die Stämme zuweilen schwarz, wie verkohlt, wodurch dieser Baum ein ganz eigenes Ansehen gewinnt. Die langen nackten und gekrümmten Aeste bilden eine lichte unansehnliche Krone.

Die Blätter sind in der ersten Jugend mit einem weißen seidenartigen Haarüberzuge bedeckt, im erwachsenen Zustande vollkommen glatt, fest und trocken; sie sind lancettförmig, ungefähr 4 Zoll lang und 8—10 Linien breit, gelblichgrün und mit fünf weißlichen Nerven durchzogen. Die weißlichen Blüthen stehen in Aehren auf besondern Aestchen, die aus den Winkeln der obern Blätter entspringen, und sich nach der Blüthe wieder in Blätter entfalten; sie sitzen zu zwei bis drei ohne Blüthenstiele beisammen. Die Frucht ist eine runde, graue, etwas bauchige, abgestutzte Kapsel, dreifächerig und mit zahlreichen, spreuartigen, länglichen und eckigen Saamen angefüllt.

Die Blätter und die Früchte dieses Baumes geben bei der Destillation das Cajeputöl. Es ist leichter als Wasser, und besitzt einen eigenthümlichen aromatischen, starken, nicht unangenehmen Geruch, und einen feurigen, zuletzt kühlenden Geschmack. Die grüne Farbe des Oels rührt zuweilen von Kupfer her, doch versichert Thunberg ausdrücklich, daß das ächte Oel eine grasgrüne Farbe habe, und auch Pfaff bezeugt, ein vortreffliches Oel von blaßgrüner Farbe gehabt zu haben, welches ohne einen Fleck auf dem Papiere zu hinterlassen über glühenden Kohlen verdampfte. Viele Schriftsteller versichern, daß die grüne Farbe zufällig sey, und von kupfernen Ge-

süßen herrühre, in welchen das Oel verschickt werde; die Versendung aber geschieht in grünen Glasbouteillen, wie schon Martius (Berl. Jahrb. XVI. 1815. S. 173.) behauptet hat, und ich selbst besitze eine solche grüne Originalflasche mit Cajeputöl, wie sie von der ostindischen Compagnie in den Auctionen zu London verkauft werden. Wenn sich daher in einem ächten Cajeputöl ein Kupfergehalt finden sollte, so könnte man es eher mit Martius dem Umstande zuschreiben, daß bei der Bereitung der kupferne Destillationsapparat nicht reinlich genug gehalten worden sey. (Vergl. Oleum Cajeputi im 2ten Theile.)

Bisweilen kommt auch ein künstliches Cajeputöl im Handel vor, welches durch Destillation des Rosmarinöls über Cardamom und Campher bereitet, und entweder durch Kupfer oder durch ein Pflanzenharz, z. B. von der Schafgarbe gefärbt worden. Vergleichung mit ächtem Cajeputöl wird den Unterschied lehren. Ein Gehalt an Terpenthinöl wird durch Weingeist von etwa 75 Procent entdeckt, welcher zwar das Cajeputöl, aber nicht das Terpenthinöl auflöst, welches letztere daher sich aus der milchigen Flüssigkeit ausscheidet. Absoluter Alkohol löst beide Oele auf.

Calamus. Die Wurzel. Kalmuswurzel.

Acorus Calamus Linn. Eine ausdauernde Sumpfpflanze Deutschlands.

Die walzenförmige, zusammengedrückte, geringelte Wurzel (Wurzelstock), von ein bis zwei Daumen Dicke, außen grün oder roth, von abgeschnittenen Wurzelfasern genarbt, innen weiß, schwammig, von bitterm und gewürzhaftem Geschmacke und angenehmen Geruche. Gemeiniglich kommt sie geschält und der Länge nach zerschnitten zum Verkauf. Im späten Herbste oder im Frühlinge einzusammeln.

Acorus Calamus Linn. Gemeiner Kalmus.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. II. Ord. 1. Aroideae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst durch ganz Europa an Gräben, Seen, Flüssen und in Sümpfen. An mehreren Punkten der kriechenden dicken Wurzel erheben sich aufrechte, glatte, einfache, zusammengedrückte, den Blättern ziemlich ähnliche Schafte von 2—3 Fuß Höhe. Die Wurzelblätter sind aufrecht, sehr lang, flach, schmal, glatt, schilfartig, schwertförmig, wellenförmig, am Rande schneidend, und inwendig mit einer weißen schwammigen Substanz versehen. Fast gegen die Mitte des blattförmigen Schaftes bildet sich zur Seite ein aufsitzender, ziemlich dicker, walzenförmiger, fast 2 Zoll langer, gelblicher, ganz mit kleinen, dicht neben einander sitzenden Blumen bedeckter Kolben ohne Scheide.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0196-0

Die Blüthezeit ist Juni und Juli.

Die officinelle Wurzel ist ziemlich lang, daumensdick, auch wohl dicker, etwas platt zusammengedrückt, mit schief über einander liegenden, scheidenartigen und ringförmigen Absätzen versehen, wodurch sie ein gegliedertes Ansehen erhält. Frisch ist sie äußerlich braun, grünlich-glänzend, an verschiedenen Stellen, besonders unterwärts, mit vielen Fasern und runden zellenartigen Punkten besetzt; inwendig ist sie weiß, weich und einigermaßen schwammig. Sie besitzt einen eigenthümlichen aromatisch-bittern Geschmack, und verbreitet, so wie auch die Blätter, in den Händen gerieben oder gequetscht, einen angenehmen balsamischen Geruch. Sie wird im Anfange des Frühlings oder im Spätherbst eingesammelt, geschält, in der Länge zerspalten und schnell getrocknet, weil sie in der Luft bald lichtroth anläuft. Gut aufbewahrt behält sie lange ihre Kräfte.

Trommsdorff (dessen J. XVIII. 2. S. 119.) erhielt aus 12 Pfund frischer Wurzel 40 Gran eines hellgelben ätherischen Oels von dem Geruche des Kalmus, und einem gewürzhaften, bitterlich brennenden, etwas campherartigen Geschmacke, das an der Luft zu einem schmierigen Balsam eintrocknete, der starke Spuren von Säure zeigte. (Hoffmann erhielt aus 50 Pfund zwei Unzen, und Neumann aus einem Pfunde der getrockneten Wurzel eine Drachme ätherisches Oel). Das aus dem Rückstande bereitete Extract ging, ungeachtet der Geschmack einen ansehnlichen Theil Schleimzucker verrieth, nicht in die weinige Gährung über.

Durch Zerstampfen der frischen Wurzel mit Wasser wurde eine Art Stärkemehl erhalten, das sich von dem gewöhnlichen jedoch dadurch unterschied, daß der größte Theil des im siedenden Wasser aufgelösten beim Erkalten niederfiel, und eine röthliche Farbe annahm (Inulin?). Von diesem Stoffe hängt wohl das Röthlichwerden der Kalmuswurzel beim Trocknen, so wie die leichte Trübung des im heißen Zustande ganz hellen Aufgusses der Kalmuswurzel ab.

Beim Sieden der vom Stärkemehle abgelaufenen Flüssigkeit schied sich oxydirter Extractivstoff (?), oder vielmehr Eiweißstoff ab. Das aus der klar filtrirten Flüssigkeit erhaltene Extract wurde durch Weingeist geschieden in einen in Weingeist auflöslichen Extractivstoff, und in eine geschmack- und geruchlose Substanz, die Trommsdorff für eine Verbindung von Schleim und phosphorsaurem Kali erklärte.

Aus dem Wurzelrückstande wurde durch Alkohol eine dicke, gleichsam ölige Substanz von gelber Farbe ausgezogen, die auf keine Weise in einen trocknen Zustand versetzt werden konnte, einen sehr beißenden, stechenden Geschmack, ganz wie die frische Wurzel, nur in höherem Grade, und etwas ihren Geruch besaß.

Dieser Analyse zufolge enthalten 64 Unzen frischer Kalmuswurzeln: ätherisches Oel 13,33 Gran; einen besondern, dem Satzmehle ähnlichen Stoff (Inulin?) 1 Unze 1 Qt.; Extractivstoff von süßlich scharfem Geschmacke mit etwas salzsaurem Kali 2 U. 1 Qt. 10 Gr.; Gummi mit phosphorsaurem

Kali 3 u. 4 Qt.; schmieriges scharfes Harz 1 u. 4 Qt.; holzige Theile 13 u. 6 Qt.; Feuchtigkeit 42 u. 35,67 Gr.

Die Kalmuswurzel gehört zu den kräftigsten und schätzbarsten flüchtig-tonischen Mitteln. Ihre Wirksamkeit liegt größtentheils in den flüchtigen Theilen, sie darf daher nicht in der Abkochung verordnet werden; auch werden schon die wirksamen Theile durch Wasser, Wein und Weingeist in der Digestionswärme ausgezogen. Da sie schon in kleinen Gaben wirksam ist, so kann sie auch in Pulverform verordnet werden. Die überzuckerte Wurzel (Conditum s. Confectio Calami) ist weniger zweckmäßig, da die Wurzel vorher erst mit Wasser weich gekocht, und dadurch ihrer wirksamen Bestandtheile größtentheils beraubt wird.

Calcaria usta seu Calx viva. Oxydum calcicum. Gebrannter Kalk.

Wird aus dem Kalksteine durch Brennen in Kalköfen bereitet.

Ein zerreiblicher, weißer Stein, mit Wasser sich erhitzend und sehr schwer auflöslich. Besteht aus Kalkerde, oft mit andern Erden und Eisenoxyd gemischt. Muß in gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden.

Die Kalkerde kommt in allen drei Naturreichen vor, als kohlensaurer, phosphorsaurer, schwefelsaurer, salzsaurer, salpetersaurer, arsenikfaurer, flußspathsaurer ꝛc. Kalk, und in Verbindung mit Erden. Am häufigsten kommt sie vor im Mineralreiche, und ist hier mit Kohlensäure verbunden und in großer Menge vorhanden, als Kalkspath, Kalkstein, Kreide, Marmor, Erbsenstein u. s. w.; mit Schwefelsäure in den verschiedenen Arten des Gypses. Im Thierreiche kommt sie vor als Austerschalen, Eierschalen, Knochen u. s. w.; im Pflanzenreiche als Basis verschiedener Salze.

Wird die kohlensaure Kalkerde einem Glühfeuer ausgesetzt, so läßt sie die Kohlensäure fahren, und bleibt im ätzenden Zustande zurück. Dieses geschieht im Großen mit dem gemeinen Kalkstein in Kalköfen, der dadurch in gebrannten Kalk verwandelt wird. Wenn dieser mit ungefähr der Hälfte seines Gewichts Wassers zusammengebracht wird, so erhitzt er sich, oft bis zum Entzünden von Schwefel, und zwar um so schneller und heftiger, je reiner er ist, wobei er zu einem weißen Pulver — Kalkhydrat — zerfällt und Wasser gebunden hält, welches ihm nur erst wieder durch schwache Glühhitze entzogen werden kann. Die große entstehende Hitze beim Löschen des Kalkes, wobei durch die Wasserdämpfe auch viel Kalk mitgerissen wird, hat man dadurch erklären wollen, daß das Wasser bei der Verbindung mit dem Kalke in den Zustand des krystallisirten Eises übergehe, wobei es seinen Wärmestoff fahren lasse; die Steigerung der Temperatur ist aber viel zu bedeutend, als daß sie allein dem freiwerdenden Wärmestoffe des Wassers zugeschrieben werden könnte, auch wird durch Vermischung von Eis und Kalk

Wärme erzeugt. Bei der Heftigkeit der gegenseitigen Einwirkung ist elektrische Thätigkeit nicht unwahrscheinlich, auch hat Pelletier beim Löschen des Kalkes im Finstern Licht bemerkt.

Wird das Kalkhydrat durch schnell zugesetztes Wasser in einen Teig verwandelt, und dieser mit rothem Eisenoxyd, oder Alaunerde oder Kieselerde vermischt, so entsteht, wahrscheinlich durch chemische Verwandtschaft mit diesen Körpern, eine Mischung, die sehr bald erhärtet, und viel zusammenhängender ist, als wenn Kalk allein angewandt würde. Durch eine solche chemische Verbindung erfolgt das sogenannte Todtbrennen der unreinen thonhaltigen Kalksteine, die hierbei ihre Aetzkraft und Auflöslichkeit in Wasser einbüßen. In hoher Temperatur verbindet sich nämlich die Kalkerde genauer mit den fremdartigen Beimengungen, zu einer glasähnlichen Substanz zusammengesintert, und bildet gleichsam Salze. Allgemein bekannt ist ferner die Mischung des Kalkhydrats mit Sand, welche als Cäment beim Bauen benutzt wird, und dabei zuerst als Hydrat erstarrt, allmälig aber durch die in der atmosphärischen Luft befindliche Kohlensäure in kohlensauren Kalk verwandelt wird. Die Härte des Mörtels an sehr alten Gebäuden hängt von der vollkommnen Verwandlung aller seiner Theile in kohlensauren Kalk ab, so daß die Festigkeit eines alten Mörtels nach seinem Kohlensäuregehalte bestimmt werden kann. Der Mörtel geht hierbei gleichsam in den Zustand des krystallisirten kohlensauren Kalkes über. Nach Plinius machten die Römer ihren besten Mörtel oder Kitt ein Jahr vorher, ehe sie ihn benutzten, so daß er sich schon zum Theil mit Kohlensäure verbunden hatte.

Die Kalkerde kommt schon in dem mit Kohlensäure verbundenen Zustande zum medicinischen Gebrauche, als Austerschalen, Krebsaugen oder Krebssteine u. s. w., und ist sowohl in diesem als im ätzenden Zustande dem Pharmaceuten zu vielen Präparaten unentbehrlich; so giebt der gebrannte Kalk mit Wasser, in welchem er sehr wenig auflöslich ist, das Kalkwasser u. s. w. Die Kalkerde ist aber auch für Künste, Gewerbe und Ackerbau von der größten Wichtigkeit, in welcher Hinsicht die bereits erwähnte Anwendung derselben zum Mörtel wohl die erste Stelle einnimmt. Aber auch für den Ackerbau ist sie wichtig, indem für manchen Boden die kohlensaure Kalkerde dadurch ein Düngungsmittel wird, daß sie ihren Gehalt an Kohlensäure den Pflanzen als Nahrungsmittel abtritt, diese Gasart aber begierig wieder aus der Luft einsaugt, und so den Pflanzen stets neuen Nahrungsstoff zuführt; bei einem andern Boden wird die gebrannte Kalkerde dadurch zur Verbesserung desselben wirken, daß die vielen darin enthaltenen unzersetzten vegetabilischen und auch thierischen Stoffe auflöslicher gemacht und in Pflanzennahrungsmittel umgewandelt werden.

Der gebrannte Kalk muß in gut verschlossenen Gefäßen vor dem Zutritte der Luft verwahrt werden, damit er nicht Gelegenheit erhalte, die Kohlensäure anzuziehen, und sich wieder in kohlensauren Kalk zu verwandeln.

Zu gewöhnlichen Zwecken kann der gewöhnliche gebrannte Kalk, welchen die neuere Chemie als das Oxyd eines metallischen Radicals erkannt hat,

angewandt werden; da dieser jedoch aus dem Kalksteine gebrannt wird, welcher, wie bereits erwähnt, und wie auch die mehr oder weniger graue oder gelbliche Farbe anzeigt, stets unrein ist, und Thonerde, Kieselerde, Eisenoxyd, zuweilen auch etwas Talkerde und Manganoxyd enthält, so kann auch nicht ein reiner gebrannter Kalk daraus erhalten werden, sondern es muß, wo dieser erfoderlich ist, eine andere Verfahrungsweise beobachtet werden, welche im zweiten Theile bei * Calcaria pura angegeben werden soll.

Camphora. Campher.

Wird in Japan durch Sublimation aus den Aesten und Blättern von Laurus Camphora Linn., einem dort einheimischen Baume, bereitet. In Europa wird er durch eine nochmalige Sublimation gereinigt.

Ein flüchtiges Harz, in kreisrunden, oben convexen unten concaven Kuchen, weiß, glänzend, durchsichtig, leicht, etwas fettig, von einem eigenthümlichen starken nicht unangenehmen Geruche, von scharfem aromatischem Geschmacke, in der Luft bei mittlerer Temperatur sich völlig verflüchtigend, bei gelindem Feuer geschmolzen wie Oel fließend, angezündet ohne Rückstand verbrennend, in Wasser wenig, in Weingeist aber und auch in den Aethern und Oelen, sowohl den fetten als den ätherischen, gänzlich auflöslich.

Laurus Camphora Linn. Der Campher-Lorbeer.
Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VI. Ord. Laurineae.

Der Campherlorbeer ist ein schöner Baum, welcher ursprünglich in Japan, China, Cochinchina ꝛc. wächst, und die Größe einer mittelmäßigen Linde erreicht.

Der Stamm ist gerade, und wird sehr stark. Die Aeste sind aufsteigend, das Holz ist weiß nnd röthlich marmorirt und von angenehmen Geruche. Die immergrünen, glänzenden, eirund-länglichen, gestielten, unten weißlichen Blätter stehen abwechselnd, sind fast einen Zoll breit und drei Zoll lang. Die kleinen weißlichen Blumen sind oft getrennten Geschlechts, und stehen zu mehreren beisammen in Rispen, deren allgemeiner Blumenstiel seitwärts oder in den Blattwinkeln entspringt, und ziemlich lang ist. Der Kelch fehlt; die einblättrige Blumenkrone ist kelchartig und sechstheilig. Die Frucht, eine Steinfrucht, ist rundlich, bei der Reife schwarzroth, glänzend und von der Größe einer Erbse.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli, die der Fruchtreife November und December.

Der Campher, den Griechen und Römern unbekannt, kam erst durch die Araber nach Europa, und wurde früher bald zu den Gummen, bald zu den

Harzen gezählt; erst später wurde er, seiner physischen Kennzeichen und seines chemischen Verhaltens wegen, als ein eigenthümlicher Körper anerkannt, der verschiedentlich im Pflanzenreiche vorkommt.

Um den Campher aus dem Campherlorbeer zu erhalten, werden die Wurzel, der Stamm und die Aeste des Campherlorbeers in kleine Stücke zerschnitten, damit große eiserne Kolben, die mit irdenen, inwendig mit Reisstroh oder Binsen ausgefütterten Helmen bedeckt sind, angefüllt, und Wasser darauf gegossen. Dieses wird 48 Stunden hindurch in mäßigem Sieden erhalten, wodurch sich der Campher verflüchtigt, und auf dem Stroh sublimirt. Er wird gesammelt, und als roher Campher, aus graulichen, zusammengehäuften, öligen, feuchten, mehr oder weniger unreinen Körnern bestehend, nach Europa gesendet. Dieser wurde vormals in Venedig, später lange Zeit ausschließlich von den Holländern raffinirt, jetzt geschieht dies aber an mehreren Orten, als in Hamburg, Berlin, Kopenhagen u. s. w. Zu diesem Endzwecke wird er gewöhnlich mit einem Zusatze von $\frac{1}{16}$ lebendigem Kalke oder gepulverter Kreide (um das gelbfärbende brenzlige Oel zurückzuhalten) in flachen gläsernen Kolben nochmals sublimirt, wobei er sich an dem obern kühlern Theile des Sublimirgefäßes, unter Zurücklassung der Unreinigkeiten, als eine reine weiße krystallinische Masse ansetzt.

Dieser raffinirte Campher, in Gestalt runder in der Mitte gewöhnlich durchbohrter Brode und Kuchen von 1 bis 2 Pfund Gewicht, zeigt sich als eine feste, nicht besonders harte, weiße, halbdurchsichtige, etwas zähe, leicht in kleinere, stets eckige Stücke zu zerbröckelnde, aber nicht für sich zu einem feinen Pulver zerreibbare Substanz von 0,996 spec. Gew. Das Gefüge ist körnig, doch ist der Campher einer regelmäßigen Krystallisation fähig, und läßt sich namentlich durch Sublimation in Oktaëdern, vierseitigen Pyramiden oder in sechsseitigen Blättern darstellen. Schon in der Entfernung verbreitet der Campher einen starken, durchdringenden, ganz eigenthümlichen, nicht unangenehmen, aromatischen Geruch. Zwischen den Zähnen gekaut verhält er sich fast wie Wachs, und läßt dabei einen etwas scharfen, anfangs erwärmenden, nachher kühlenden, etwas bittern Geschmack erkennen. Bei der mittlern Temperatur behält er unverändert seine Consistenz, verdunstet aber allmälig an der Luft; erst bei 110° R. nimmt er einen dünnflüssigen, ölartigen Zustand an, geräth bald darauf in ein starkes Kochen, und verflüchtigt sich in dicken, weißen, stechenden Dämpfen, welche sich an einem etwas kühlern Raume zu blendend weißen, undurchsichtigen Blumen, oder auch zu einer klaren festen Masse verdichten.

Im Wasser ist der Campher nur sehr wenig auflöslich, denn das Aufgelöste beträgt kaum $\frac{1}{1000}$, doch nimmt das Wasser Geruch und Geschmack an. Reines Kali, nicht Natron und Ammoniak, giebt die kleine Menge des in Wasser aufgelösten Camphers durch Trübung zu erkennen. Durch Hülfe von Zucker, besser Gummi und Eigelb, läßt sich aber der Campher in größerer Menge mit dem Wasser vermischen. Wird der Campher der Hitze des papinianischen Topfes ausgesetzt, so zeigt er sich jetzt, indem er dadurch in

seiner Grundmischung verändert zu werden scheint, in großer Menge in Wasser auflöslich, ohne sich wieder abzuscheiden. Werden kleine Campherstückchen auf Wasser geworfen, so gerathen diese sehr oft in eine lebhafte kreisende Bewegung, welches Venturi aus der Bildung eines auf dem Wasser sich ausbreitenden und dann verdampfenden Oeles erklärt.

In Alkohol löst sich der Campher leicht auf, und dieser nimmt in der Wärme mehr als die Hälfte seines Gewichts auf. Das Wasser schlägt ihn unverändert daraus nieder, und zwar bei langsamern Zusetzen in kleinen blättrigen oder fadenartigen Krystallen. Wenige Tropfen Weingeist machen den Campher fähig, zu einem feinen Pulver zerrieben zu werden. Campher in Alkohol aufgelöst erhöht sehr die auflösende Kraft desselben auf den Copal.

Auch der Schwefeläther, die fetten und die flüchtigen Oele lösen den Campher auf. Concentrirte Schwefelsäure löst den Campher leicht auf, in der gewöhnlichen Temperatur ihr gleiches, in erhöhter Wärme ihr dreifaches Gewicht. Sie giebt damit eine röthlichbraune Flüssigkeit, aus welcher, frisch bereitet, das Wasser den Campher unverändert fällt. Mit der Zeit aber wird der Campher durch die Schwefelsäure zersetzt, und es entbindet sich schwefligsaures Gas. Noch schneller erfolgt diese Zersetzung, wenn man die Auflösung der Destillation unterwirft, wo dann der Campher in ein flüchtiges Oel, welches im Geruch dem Lavendel- oder Pfeffermünzöl ähnlich ist, in eine gerbestoffartige Substanz, und in eine dichte sehr harte Kohle umgeändert wird. Erhitzt man Campher mit Wasser und wenig Schwefelsäure, so wird nach Buchner Lackmuspapier durch die Dämpfe geröthet. Von der concentrirten Salpetersäure wird der Campher gleichfalls sehr leicht und schon in der Kälte aufgelöst, wobei er indeß zugleich zum Theil oxydirt wird. Die Lösung scheidet sich in zwei Schichten, wovon die obere eine gelbliche Farbe besitzt, und den uneigentlichen Namen Campheröl (Oleum Camphorae) führt. Diese enthält den Campher unverändert. Die untere farblose Flüssigkeit hingegen enthält den Campher zum Theil schon in einem etwas oxydirten Zustande. Durch Wasser wird der Campher, besonders aus der obern Schicht niedergeschlagen, löst sich aber in einer größern Menge Wasser wieder auf, welches auch bei der Schwefelsäure der Fall ist. Wird der Campher zu wiederholten Malen mit Salpetersäure der Destillation unterworfen, und das Destillat so lange in die Retorte zurückgegossen, bis alles zersetzt worden ist, so erhält man die zuerst von Kosegarten 1785 dargestellte eigene Säure, die Camphersäure, welche in glänzend weißen Nadeln krystallisirt, von der Brandes (Schweigg. N. J. VIII. 1823. S. 269.) eine sehr vollständige Monographie geliefert hat, und die nach Buchner's Untersuchungen (Repert. XV. S. 432.) in ihren Salzbildungen die meiste Aehnlichkeit mit der Benzoësäure und mit der Korksäure hat.

Die gasförmige Salzsäure, schweflige Säure und die Flußsäure lösen den Campher auf. Die concentrirte Essigsäure nimmt noch einmal so viel Campher auf, als sie selbst an Gewicht beträgt. Die erhaltene Lösung stellt eine dickliche, scharf schmeckende, leicht entzündliche und gänzlich zu

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0202-8

verbrennende Flüssigkeit dar. Gewöhnlicher Essig löst viel weniger davon auf.

In den Alkalien ist der Campher unauflöslich, jedoch absorbirt er ungefähr ein Maß Ammoniakgas. Mit Phosphor und Schwefel läßt er sich zusammenschmelzen. Auch im Schwefelkohlenstoffe löst er sich schnell auf; diese Auflösung ist mit Weingeist, nicht mit Wasser mischbar.

Der Campher ist leicht entzündlich, und brennt, selbst auf Wasser, mit einer sehr hellen Flamme unter Ausstoßung von Rauch, aber ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Im Sauerstoffgase brennt er mit einer sehr glänzenden Flamme, es bilden sich dabei Kohle, Kohlensäure, etwas Camphersäure und wahrscheinlich auch Wasser. Mit Thonerde destillirt, wird der Campher zersetzt, und man erhält ein flüchtiges Oel von goldgelber Farbe, etwas Camphersäure, viel kohlensaures Gas und Kohlenwasserstoffgas; in der Retorte bleibt Kohle mit Thonerde verbunden zurück. Auch wenn Campherdämpfe durch glühende Porcellanröhren geleitet werden, erfolgt Zersetzung, nur wenig Kohle wird abgesetzt, und über gekohltem Wasserstoffgase wird ein flüchtiges Oel gebildet, welches in Alkohol leichter auflöslich ist, als der Campher.

Bestandtheile des Camphers nach	Th. v. Saussure	Thomson	Göbel	Ure
Kohlenstoff	74,38	73,8	74,67	78,02
Wasserstoff	10,67	14,4	11,24	11,58
Sauerstoff	14,61	11,8	14,09	10,40
Stickstoff	0,34	—	—	—
	100,00	100,0	100,0	100,00

Außer diesem vom Campherlorbeerbaum gewonnenen Campher soll auch noch in einem andern nicht gehörig bekannten Baume auf den Inseln Borneo und Sumatra, den Bonpland **Dryobalanops Camphora** nennt, und der in einer früher mitgetheilten Nachricht (Brandes Archiv ꝛc. V. S. 230.) nach Correa **Pterygium teres** genannt wird, eine so große Menge Campher enthalten seyn, daß im Innern desselben ganz ausgebildete Campherstückchen gefunden werden. Der daraus erhaltene Campher, welcher zum Theil von selbst ausschwitzt, und dieser wird Campheröl genannt, zum Theil aus dem gefällten Baume gesammelt wird, kam sonst nie nach Europa, weil er nach Japan und China gebracht wurde, wo er in einem solchen Preise stand, daß für ein Pfund bis vierzig Pfund japanischer Campher gegeben wurden. Jetzt soll dieser sumatraische oder borneosche Campher, oder auch Campher von Baros (die Residenz und Handelsstadt auf Sumatra), auch auf den europäischen Markt kommen, weil er in Japan und China nicht mehr so gesucht wird. Er soll weit durchsichtiger, bei seinem Anfühlen etwas weniger fettig, und stärker von Geruch seyn als der gewöhnliche, und beim Raffiniren das Laboratorium mit einem sehr deutlichen Veilchengeruche erfüllen, im übrigen ist er aber nicht unterschieden.

Der Campher findet sich aber auch noch in andern zur Familie der Lau-

rineen gehörigen Bäumen, welche im Allgemeinen eine große Uebereinstimmung darin zeigen, daß in ihnen ein flüchtiges gewürzhaftes Oel sich reichlich verbreitet zeigt, zu denen auch der Campher gerechnet werden kann, welches den Theilen derselben einen starken und durchdringenden Geruch ertheilt, als der Zimmtrinde, dem Sassafrasholze, den Lorbeeren, den Pichurimbohnen u. s. w. So kann aus den Wurzeln einer Abart des Zimmtbaums (Capura-Curundu oder Campherzimmt genannt) mit Vortheil Campher gewonnen werden. Ferner wird von vielen Vegetabilien, als den Wurzeln des Zittwer, Sassafras, Thymian, Rosmarin, Salbei, Alant, Anemone, Pulsatille ꝛc., bei der Destillation mit Wasser ein gleichsam festes ätherisches Oel erhalten, welches in seinen Eigenschaften so viel Uebereinstimmung mit dem Campher zeigt, daß man diese aus dem Destillate in krystallinischer Gestalt sich ausscheidenden Stoffe Pulsatillen-, Anemonen-, Alant- ꝛc. Campher nennt. Viele ätherische Oele, als Terpenthin-, Lavendel-, Salbei-, Majoran-, Rosmarin- und andere Oele geben, wenn sie in flachen Gefäßen einer Temperatur von 57 ° F. anhaltend ausgesetzt werden, eine nicht unbedeutende Ausbeute an Campher, und nach *Proust* soll in den spanischen Provinzen Murcia und Valencia eine ansehnliche Menge Campher aus den dort im Ueberfluß gewonnenen ätherischen Oelen auf diese Weise gewonnen werden. Hier scheint der Campher zum Theil schon als solcher vorhanden gewesen, zum Theil aber erst unter Mitwirkung der Wärme und der atmosphärischen Luft gebildet worden zu seyn. Daß aus dem Terpenthinöle vermittelst des durchstreichenden salzsauren Gases eine campherähnliche Verbindung dargestellt werden könne, welche jedoch wesentlich von dem Campher dadurch unterschieden ist, daß sie Salzsäure in ihrer Mischung enthält, wird dort erwähnt werden.

Der Campher ist sowohl ein innerliches als äußerliches geschätztes Arzneimittel. Zum innern Gebrauche wird er in Pulvern, die jedoch nicht auf sehr lange Zeit ausreichen müssen, damit sich nicht der Campher allmälig verflüchtige, oder auch in Mixturen verordnet, wobei eine 2—3fache Menge arabisches Gummi oder Traganth zugesetzt, jedoch auch beim jedesmaligen Gebrauche die Mixtur gut umgeschüttelt werden muß, weil sich der Campher absondert und obenauf schwimmt. In Pillen wird der Campher schon durch die gewöhnlich in die Zusammensetzung kommenden Extracte, oder andernfalls durch Schleim gebunden, wobei es zweckmäßig ist, die Pillen in einem zugestopften Gläschen zu verwahren. In Aether oder ätherhaltigem Weingeiste aufgelöst kann der Campher auch in Tropfenform gegeben werden, wäßrige Flüssigkeiten scheiden aber den Campher daraus ab. Aeußerlich wird er in Weingeist, in fetten und ätherischen Oelen aufgelöst, mit Salben gemischt u. s. w. angewendet; aus der spirituösen Auflösung scheidet Wasser den Campher ab.

Cancer. Die Steine. Krebssteine.

Concremente aus dem Magen des Cancer Astacus Linn. oder Astacus fluviatilis Fabricii, eines Krustenthieres Deutschlands.

Weiße, kreisrunde, oberhalb convexe, unterhalb mit einem erhabenen Rande concave Steine, von blättrigem Gewebe. Sie bestehen vorzüglich aus kohlensaurem Kalke und Gallerte, welche nach der Auflösung in concentrirtem Essig zurückbleibt.

Die Flußkrebse halten sich in langsam fließenden Bächen auf; sie fressen Aas, Würmer, Schnecken. Im Winter stecken sie in Uferlöchern. Bei schwülem Wetter und bei bevorstehenden Gewittern kommen sie hervor. Sie schwimmen meistens rückwärts. Der ganze Körper ist mit einer kalkartigen Schale bekleidet. Sie häuten sich im August, und die neue Schale erzeugt sich sehr bald wieder. Zu dieser Zeit der Wechselung der Schale erzeugen sich an beiden Seiten des Magens, der sich auch häutet, diese kalkartigen Concretionen, von denen man glaubt, daß sie zur Wiedererzeugung der Schale dienen; denn so wie die neue Schale allmälig härter wird, verschwinden die Krebssteine allmälig wieder.

Um sie zu erhalten, läßt man die Krebse in Haufen über einander faulen, oder man zerstampft sie, und rührt sie mit Wasser um, damit sich die Steine abscheiden und zu Boden sinken. Hierauf werden sie ausgewaschen und getrocknet. Die weißen und schönsten kommen aus Polen und Rußland, vorzüglich von Astrachan. Sie sind scheibenförmig, auf der einen Seite erhaben, auf der andern flach, in der Mitte vertieft, und hier rund herum mit einem vorspringenden Rande versehen (wodurch sie einige Aehnlichkeit mit einem Auge bekommen, daher die Benennung Krebsaugen), glatt, hart und fest, von weißer oder etwas röthlicher Farbe, einem blättrigen Gewebe und erdartigem Geschmacke. In verdünnter Salpeter- oder concentrirter Essigsäure aufgelöst, hinterlassen sie eine gallertartige Haut, welche die Figur der aufgelösten Steine hat. Sie bestehen aus 13 Th. kohlensaurer Kalkerde mit etwas phosphorsaurer Kalkerde und 2 Th. Gallerte. Wenn sie in kochendes Wasser getaucht werden, so nehmen sie eine rosenrothe Farbe an, die eine Abstufung der hochrothen Farbe ist, welche die Schale des Krebses beim Kochen annimmt. Häufig werden jedoch die Krebssteine im kochendem Wasser nicht rosenroth, sondern violett, blau oder grünlich; vielleicht liegt die Ursache darin, daß man meistens die Krebse verfaulen läßt, um die Krebssteine zu erhalten, und daß die Fäulniß nothwendig auf den darin enthaltenen Farbestoff Einfluß hat.

Die etwa vorkommenden, aus Kreide oder Thonerde künstlich bereiteten Krebssteine sind sehr leicht zu erkennen, da ihnen die blättrige Zusammensetzung fehlt. Sie sind allemal schwerer, kleben an der Zunge und zerfallen in Wasser; die aus Thonerde brausen fast gar nicht mit Säuren.

Man giebt die Krebssteine zum feinsten Pulver präparirt, als absorbirendes Mittel, zu 5—20 Gran.

Canella alba. Weißer Zimmt.

Canella alba Murray. Ein in Jamaika einheimischer Strauch.

Die innere harte, mehr oder weniger zusammengerollte, außen und innen gelblich- oder bräunlichweiße Rinde, oft mit röthlichen Querstreifen, mit innerer weißer Oberfläche, von ebenem Bruche, bis zu einer Linie dick, von scharfem gewürzhaftem Geschmacke und wenig angenehmen Geruche.

Canella alba Murray. Der weiße Kanehlbaum, der weiße Zimmt.
Canella Winterana Gaertn.
Linn. Cl. XI. Dodecandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 11. Meliaceae.

Der weiße Zimmt ist in den südlichern Theilen Amerikas, auf den Antillen, und besonders auf Jamaika einheimisch, wo er in den niedrig liegenden Waldungen und auf steinigen Hügeln häufig vorkommt.

Der Stamm hat einen schönen Wuchs, erreicht eine mittlere Höhe von 18, 20 und mehreren Fuß, und eine Dicke von ungefähr 6 Zoll im Durchmesser. Die Rinde ist besonders an dem jungen Holze glatt, weiß und sehr aromatisch. Die Blätter sind kurzgestielt, keulenförmig, stumpf, ganzrandig, hellgrün, auf der Oberfläche glänzend, und ungefähr 3 Zoll lang und 1½ Zoll breit. Die Blüthen stehen an der Spitze der Zweige in Doldentraubeu.

Der Kelch besteht aus drei übereinander liegenden und am Grunde verwachsenen Blättchen. Die fünf Blumenblättchen sind von rother Farbe. Die Frucht ist eine schwarze dreisaamige Beere.

Von den jungen Aesten dieses Baumes wird die Rinde mit einem eisernen Instrumente abgeschält, im Schatten getrocknet und als weißer Zimmt, **Canella alba**, auch **Costus corticosus**, **Costus dulcis**, **Costus amarus**, **Cortex Winteranus spurius** — von Cartheuser falsche Winter'sche Rinde genannt, weil sie mit dieser oft im Handel verwechselt wird — in den Handel gebracht. (Die ältern Unterscheidungen zwischen **Canella alba** und **Costus dulcis** sind unbegründet, und durch die etwas verschiedene Stärke der Rindenstückchen nicht gerechtfertigt.) Wir erhalten diese Rinde in 3—5 Zoll langen, halb zusammengerollten Stücken, von ein bis zwei Linien Dicke; die äußere Seite ist von der bei größern Stücken noch vorhandenen, schwammigen, röthlichen, rissigen Epidermis entblößt, ganz glatt, gelblich- oder röthlichweiß, die innere Seite ist mit einer sehr dünnen weißen Bastlage bedeckt. Sie ist fest, aber leicht zerbrechlich, auf dem Bruche dicht körnig. Sie hat einen scharfen, aromatischen, nelkenartigen, etwas bittern Geschmack, und einen vorzüglich beim Zerstoßen angenehm gewürzhaften Geruch.

Von der Winter'schen Rinde unterscheidet sie sich durch die bedeutend größern Stücke, durch die dicke und braune Farbe der ersteren.

Das Kräftige und Wirksame der Rinde liegt vorzüglich im ätherischen Oele, das im Wesentlichen mit dem Gewürznelkenöle übereinstimmt. Durch

Destillation der Rinde mit Wasser wird es bald wasserhell, bald gelb von Farbe erhalten; nach Sloane ist es schwerer als Wasser.

In neuern Zeiten ist sowohl diese Rinde als die Winter'sche häufig untersucht worden. Henry (Taschenbuch 1821. S. 101., Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 166.) digerirte wiederholt kalt mit Aether, wodurch von 100 Grammen 18 Grammen eines weichen und klebrigen Extracts erhalten wurden, von rothgelber Farbe, ausgezeichnetem Kanehlgeruche, und ein wenig bitterm, aber brennendem und beinahe ätzendem Geschmacke, das sich in 30gradigem Alkohol vollkommen auflöste, und eine Mischung von Harz, ätherischem Oele und etwas Extractivstoffe war. Das Harz, durch Sieden in Wasser von dem Extractivstoffe und dem ätherischen Oele befreit, erschien in zerreiblichen Schuppen von gelblicher Farbe, ohne merklichen Geruch, wurde zwischen den Zähnen weich und hatte einen gewürzhaften, aber keinen scharfen und bittern Geschmack, so daß also die Schärfe vorzüglich vom ätherischen Oele abhing.

Der bei der Ausziehung mit Aether zurückgebliebene Rückstand wurde nun mit 36gradigem Alkohol in einer Wärme von 40 ° C. wiederholt behandelt, und hierdurch eine zwar orangengelbe Flüssigkeit erhalten, die aber keinen dem Alkohol fremden Geruch und Geschmack hatte, durch Zusatz von Wasser nicht milchig wurde, und nach dem Ueberdestilliren des Alkohols 6 Grammen eines braungelben Extracts hinterließ, das einen starken, dem des thierischen Leims ähnlichen Geruch, aber nichts von den Eigenthümlichkeiten des Kanehls, einen salzigen, bittern Geschmack hatte, die Lackmustinctur röthete, die Feuchtigkeit aus der Luft anzog, mit dunkelbraunen zerreiblichen Platten bestreut war, nur zur Hälfte sich in destillirtem Wasser auflöste, und als Rückstand ein gelbes harziges Pulver zurückließ. Der vom Wasser aus jenem Extracte ausgezogene Antheil enthielt nur wenig Farbestoff, wie der geringe Niederschlag durch Alaun und salpetersaures Wismuth bewies, kein Kalksalz, und wie die Calcination und die Untersuchung der zurückgebliebenen Asche zeigte, salzsaure Talkerde, essigsaures Kali und nur eine Spur von Kalksalzen.

Der wäßrige Auszug der Rinde von bleichgelber Farbe und beißend scharfem Geschmacke und dem Geruche der Rinde wurde durch Eisenauflösungen und Galläpfeltinctur nicht verändert, röthete nicht die Lackmustinctur, und zeigte das Daseyn von Kalksalzen und salzsauren Salzen. 100 Grammen gaben nur 14 Grammen braunes, trocknes, heiß und bitter schmeckendes Extract. Die durch Aether und Alkohol erschöpfte Rinde gab mit Wasser ausgezogen eine Flüssigkeit, die schnell faulte, und nach dem Abrauchen 8 Grammen eines zähen klebrigen Extracts von einem angenehmen und ein wenig zuckerfüßen Geschmacke gab. Das kochende Wasser zog noch viel stärkemehlartige Materie aus. Verdünnte Salzsäure zog dann noch kleesauren Kalk in ziemlicher Menge aus.

Wasser, über den weißen Zimmt abgezogen, war milchig, und mehrmals cohobirt, setzte es ein leichtes gelbes Oel ab, von dem Geruche und beißenden Geschmacke der Rinde.

20 Grammen der ganzen Rinde hinterließen 2,1 Gr. Asche, aus kohlensaurem Kali, salzs. Kalk, kohlens. Kalk und Talk bestehend.

1000 Th. des weißen Kanehls enthalten demnach: ätherisches Oel 5; Harz ohne merkliche Schärfe 200; Extractivstoff mit Farbestoff 30; Schleim 80; Stärkemehl, Eiweißstoff, essigs. Kali, essigs. Kalk, salzs. Kali, salzs. Talk, sauerkleesaures Kalk und Rindensubstanz 635.

Henry hat auch die Winter'sche Rinde untersucht (siehe * Winteranus), und nach diesen Untersuchungen lassen sich auch beide Rinden sehr gut chemisch dadurch unterscheiden, daß der kalte wäßrige Aufguß des weißen Kanehls weder den salpetersauren Baryt noch das schwefelsaure Eisenoxydul fällt, wogegen der Aufguß der Winter'schen Rinde mit beiden Reagentien Niederschläge giebt.

Später haben die Herren Petroz und Robinet (Taschenb. 1824. S. 104., Berl. Jahrb. XXIV. 2. S. 98., Schweigg. N. J. V. S. 212.) gleichfalls den weißen Kanehl analysirt. Sie erhielten durch die wäßrige Ausziehung eine eigenthümliche zuckerige Materie, deren Geschmack sich dem des Melonenzuckers nähert, die in den meisten Verhältnissen mit dem Zucker aus Fraxinus Ornus oder aus der Manna (dem Mannastoffe, Mannit) übereinstimmt und welche sie Canellin nennen. Ihr Verfahren ist folgendes. Die Abkochung setzt nach ihnen beim Erkalten eine harzige Substanz ab, und giebt dann concentrirt eine sehr bittere, etwas zuckerige Masse ab, mit kleinen Krystallen vermengt. Die bittere Masse läßt sich durch Alkohol wegnehmen, worauf das Canellin in weißen Krystallen erhalten wird.

Das Canellin schmeckt angenehm, etwas zuckerig, und löst sich leicht in Wasser zu einem Syrup auf. Absoluter Alkohol nimmt nur einen kleinen Theil desselben auf, und setzt ihn beim Erkalten wieder ab. Durch Behandlung mit vieler Salpetersäure wird es in Kleesäue verwandelt; mit Ferment versetzt geht es (dem Mannastoff ähnlich) nicht in Gährung über; beim Verbrennen verbreitet es einen balsamischen Geruch, und nicht den des verbrannten Zuckers.

Als Bestandtheile des Kanehls geben sie an: 1) Canellin; 2) eine eigenthümliche bittere Materie; 3) Harz; 4) ein sehr scharfes und selbst brennendes Oel; 5) Eiweißstoff; 6) Gummi; 7) Stärkemehl; 8) einige Salze.

Henry, der die Verfahrungsweise der Herren Petroz und Robinet wiederholte, konnte auch jetzt nicht die zuckerige krystallinische Substanz erhalten, oder nur in einer äußerst geringen Menge. Als er aber eine andere dunklere Sorte weißen Kanehl von beißenderm Geschmack zu den Versuchen anwandte, gelang die Darstellung des Canellins sehr gut. Es kommen also, wie Henry meint, im Handel zwei Sorten weißen Kanehls vor, von denen diejenige, welche eine dunklere Farbe und einen sehr reizenden Geschmack besitzt, den Vorzug verdient, oder das Verhältniß der zuckerigen und der bittern Materie scheint durch den Vegetationsproceß veränderlich zu seyn, und in diesem veränderlichen Verhältnisse wäre denn der Grund zu suchen, warum diese Rinde bald Costus dulcis, bald C. amarus genannt worden ist.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0208-3

Der weiße Kanehl wird als analeptisches stärkendes Mittel, als Zusatz in Pulverform oder im Aufgusse, jedoch nicht häufig, verordnet.

Cannabis. Der Saamen. Hanfsaamen.

Cannabis sativa Linn. Eine einjährige, im Orient einheimische, in Europa angebaute Pflanze.

Rundliche leichte Saamen, von weißlicher Farbe, und öligschleimigem Geschmacke.

Cannabis sativa Linn. Der gemeine Hanf.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 5. Pentandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Diese nützliche Pflanze, deren eigentliches Vaterland Persien seyn soll, ist jetzt in allen Ländern Europas so naturalisirt, daß sie ursprünglich wild wachsend zu seyn scheint, um Dörfer und unter der Saat gefunden, ihres Nutzens wegen aber häufig angebaut wird.

Die Wurzel ist weiß, holzig, büschelförmig, faserig; der Stengel aufrecht, steif, gewöhnlich einfach, stumpf-viereckig, hohl, rauh, 3—5 Fuß hoch. Die gefingerten, gegenüberstehenden, gestielten Blätter bestehen aus 5—7 langen, rauhen, lancettförmigen, gesägten und unten blaßgrünen Blättchen. Die grünlichweißen Blüthen sind zweihäusig; jedoch finden sich auch Pflanzen, die beide Geschlechter in getrennten Blumen tragen.

Die Frucht ist eine eirunde, etwas gedrückte, glatte, an einem Ende stumpfe, am andern mit einem runden Grübchen versehene braune oder grauweiße zweiklappige Nuß, welche unter der harten zerbrechlichen Schale einen weißen, süßlichen, öligschleimigen Kern enthält, der mit einem braungelblichen Häutchen umgeben ist.

Der Hanf blüht im Mai, Juni und Juli, und bringt im September und October reife Saamen.

Alle Theile dieser Pflanze haben einen unangenehmen betäubenden Geruch, weshalb man die Pflanze für verdächtig hält. Bleibt man den Ausdünstungen einer Hanfpflanze eine Zeitlang ausgesetzt, so empfindet man bald heftiges Kopfweh, Schwindel, und überhaupt die Zufälle einer anfangenden Berauschung. Je weiter nach Süden dieses Gewächs angebaut ist, desto ausgezeichneter treten jene Erscheinungen hervor. Die Morgenländer bereiten aus den Blättern ein berauschendes Getränk, oder machen daraus verschiedene Zubereitungen, als Conserven, Pulver, Pillen u. s. w. Die letzteren sind mit Opium, Moschus, Campher, Nieswurz ꝛc. versetzt, ziemlich groß, und führen den Namen Fröhlichkeitspillen. Die auf den Genuß des Hanfes oder seiner Zubereitungen erfolgenden Wirkungen gleichen denen, welche das Opium hervorbringt, in vieler Hinsicht, daher ist auch das weinige Extract von 2 Th. Hanfkraut und 1 Th. Safran als Stellvertreter des Opiums vorgeschlagen worden, jedoch nur wenig in Anwendung gekommen. Auch hat die von Tscheppe in Tübingen 1821 in seiner Dis-

sertation gelieferte Analyse der Hanfblätter wenig Aufschluß über die Wirkung derselben gegeben. Die Bestandtheile derselben nämlich sind: Holzfaser mit Thonerde und Schwefel; stickstoffhaltiges grünes Satzmehl mit phosphorsaurem Kalke und kohlensaurer Magnesia; Eiweißstoff; braunes zähes Gummi; drei verschiedene Extractivstoffe; essigsaurer Kalk, Magnesia, Kalk und Ammoniak; eine Spur salzsaures Kali.

Die Saamen, die ein gelbes, geschmackloses, leicht in der Kälte erstarrendes Oel enthalten, werden zu lindernden, beruhigenden Emulsionen, vorzüglich bei entzündlichen Krankheiten der Harnwege angewendet; doch müssen nur die der letzten Ernte angewendet werden, weil sie leicht ranzig werden.

Bucholz (Gehlen's J. VI. S. 615.) giebt als Bestandtheile in 100 an: fettes Oel 19,1; Harz 1,6; Schleimzucker mit Extractivstoff, süßlich, säuerlich, bitter 1,6; braunes gummiges Extract 9,0; löslichen Eiweißstoff 24,7; Holzfaser 5,0; Hülse 38,3; Verlust 0,7.

Die häufige Benutzung der Saamen in technischer Hinsicht zur Gewinnung des fetten Oeles ist bekannt; dieses ist grünlich gelb, wird am Lichte und an der Luft gelb, riecht nach Hanf, schmeckt mild und trocknet an der Luft aus. Nach Resal färbt es sich im rothen Lichte blutroth.

Die nach dem Pressen des Oeles zurückbleibenden Kuchen werden zur Viehmästung benutzt.

Cantharides. Spanische Fliegen.

Meloë vesicatorius Linn. seu Lytta vesicatoria Fabricii.

Ein Insect, welches im mittlern und südlichen Europa angetroffen wird.

Käfer-Insecten, 6—8 Linien lang, von einer grünlich-goldgelben Farbe, glänzend, mit schwarzen fadenförmigen Fühlern, von unangenehmen Geruche, mit einem scharfen Princip begabt. Sie können im Monat Juni und Juli, während sie die Esche, den Flieder und Liguster (Rheinweide) heerdenweise abfressen, gesammelt werden. Sie müssen vorsichtig aufbewahrt werden.

Die Gabe bis zum halben Gran.

Die Gattung der Käfer, zu welcher die spanische Fliege gehört, enthält mehrere Arten, welche sich in ihrer Größe, Farbe und andern nicht sehr wichtigen Merkmalen unterscheiden, die aber alle, in einem verschiedenen Grade, blasenziehende Kräfte besitzen. Die gebräuchliche Art, welche eine der wirksamsten zu seyn scheint, und in den wärmern Ländern, in Spanien, Frankreich, Sicilien und im südlichen Deutschland sich in Menge findet, ist länglich-rund, 6—10 Linien lang, und 2—3 Linien breit, von glänzend goldgrüner, bei einigen ins Bläuliche spielender Farbe, mit ganzen hornartigen Flügeldecken, unter denen die braunen häutigen Flügel liegen, schwarzen Füßen und zwei schwarzen gegliederten fadenartigen Fühlhörnern. Sie

haben einen starken eigenthümlichen, ekelhaft süßlichen, einigermaßen betäubenden Geruch, der aber bei den getrockneten schwächer ist, als bei den lebendigen. Der Geschmack ist anfangs schwach harzig, hernach scharf brennend, beinahe fressend. Der starke Geruch zeigt ihre Nähe an, und ist beim Einsammeln derselben der sicherste Wegweiser.

Die Einsammlung geschah vormals vorzüglich in Spanien, daher ihr auch jetzt noch beibehaltener Name; jetzt geschieht sie aber nicht nur in vielen andern Ländern, sondern auch bei uns, wozu heiße und trockne Sommer besonders günstig sind, auf folgende Weise. Gegen die Zeit der Sommersonnenwende, also im Juni und Juli, fallen diese Insecten gewöhnlich haufenweise auf die Pappeln, Rheinweiden, Rosenstöcke und vorzüglich auf die Eschen ein, von welchen sie das Laub verzehren, und es ist dann gefährlich, unter diesen Bäumen zu schlafen. Vor Sonnenaufgang, wenn sie durch die Kühle und Feuchtigkeit der Nacht noch erstarrt sind, schüttelt man, nachdem man Gesicht und Hände bedeckt hat, die Bäume, unter welchen zum Auffangen der spanischen Fliegen Tücher ausgebreitet werden. Sie werden in einem leinenen Säckchen oder in einem Siebe durch Essig- oder Schwefeldampf getödtet, und in einer warmen Stube getrocknet. Bei dem Trocknen verlieren sie viel von ihrem Gewichte, so daß alsdann ungefähr 50 auf ein Quentchen gehen. Zum medicinischen Gebrauche sind die kleinern vorzuziehen. Bisweilen findet man unter ihnen einzelne Exemplare von einem dunkelgrünen, etwas goldfarbenen **Cerambyx**, welcher Käfer sich aber durch seine Größe, durch die dickern Fühlhörner, und besonders leicht durch den auf beiden Seiten mit einer Art von stachelförmigen Hervorragung versehenen Brustschild unterscheiden läßt.

Die seit kurzem in den Handel gekommenen ostindischen Kantharіden, **Lytta coerulea**, haben ganz die Form und Größe der gewöhnlichen spanischen Fliegen, ihr ganzer Körper aber, auch die Flügeldecken, ist dunkelblau und nur am vordern Theile des Unterleibes roth. Eine ziemlich vollständige Beschreibung derselben, in so weit es nämlich die unvollständigen Exemplare verstatteten, ist von Hrn. Dr. Leuckart gegeben in Geiger's Magazin, August 1825. S. 132.

Von den amerikanischen Aerzten wird **Lytta vittata** als blasenziehendes Mittel gebraucht. Aber auch mehrere andere Käfer besitzen diese blasenziehende Eigenschaft, als der Zwitterkäfer und Maikäfer (**Meloë proscarabaeus, M. majalis**), der siebenpunktirte Blattlauskäfer oder Sonnenkäfer (**Coccinella septempunctata**) und der gemeine Reizkäfer (**Mylabris**).

Die Kantharіden sind schon von Neumann dem damaligen Stande der Wissenschaft gemäß untersucht worden. Das über sie abgezogene Wasser hatte einen widerlichen Geruch; die durch Wasser erhaltenen Extracte waren gallertartig, ohne blasenziehende Kräfte, sie schimmelten nicht. Alle Kraft war in den geistigen Auszügen. Später sind die Kantharіden genauer untersucht worden, so von den französischen Aerzten Thouvenel und Beaupoil (Berl. Jahrb. 1804. S. 99.). Thouvenel erhielt vermittelst der

Behandlung mit Wasser und Weingeist 1) ein röthlichgelbes Extract, welches eine mit Schärfe begleitete Bitterkeit besaß, die der der Ameisen ähnlich, jedoch nicht so sauer war; 2) eine andere weniger dunkle gelbe Substanz, die fast unschmackhaft war; 3) eine fette grüne Materie, die einen scharfen Geschmack und den den Kantharіden eigenthümlichen Geruch hatte; 4) endlich Zellgewebe. Beaupoil giebt das Verhältniß der Bestandtheile in einer Unze gut getrockneter Kantharіden folgendermaßen an: 1) eine schwarze in Wasser auflösliche extractartige Materie 1 Dr. 2 Gran; 2) eine gelbe, ebenfalls in Wasser auflösliche Materie, welche von der ersten durch Alkohol abgeschieden wurde, 1 Dr. 2 Gr.; 3) eine grüne, auf heißem Wasser flüssig werdende und darauf schwimmende, in Aether und Alkohol auflösliche Materie 1 Dr. 8 Gr.; 4) häutiger Rückstand 4 Dr. 36 Gr.; Säure, der Phosphorsäure ähnlich, unbestimmt; 5) phosphorsauren Kalk 12 Gr., kohlens. Kalk 2, schwefels. und salzs. Kalk 4, Eisenoxyd 2 Gr. Nach seinen physiologischen Versuchen schließt Beaupoil, daß die Kantharіden zwei Principe enthalten, die gemeinschaftliche Eigenschaften besitzen: das eine, die grüne Materie, schränke seine Wirkung bloß darauf ein, daß es auf der Haut Blasen errege, ohne noch andere Wirkungen auf die thierische Oekonomie auszuüben; das andere Princip, die extractartige Materie, besitze doppelte Eigenschaften, nämlich Blasen zu ziehen und in das Kreislaufsystem einzugehen. Der gelben Substanz schreibt der Verfasser gleichfalls eine sehr kräftige blasenziehende Eigenschaft zu.

Robiquet's Untersuchungen (Trommsd. J. XX. 2. S. 227. und in Schw. J. IV. S. 198. dargestellt von Bachmann) gewähren befriedigendere Resultate. Der Verfasser hielt es für unwahrscheinlich, daß drei verschiedene Substanzen so wenig verschiedene Eigenschaften besitzen sollten, und vermuthete vielmehr, daß die so merkwürdige Wirkung der spanischen Fliegen bloß einer einzigen Materie zukommen müßte. Er kochte mit destillirtem Wasser aus. Das Decoct war rothbraun, röthete das Lackmus, und zeigte die blasenziehende Eigenschaft in sehr hohem Grade. Das Auskochen wurde wiederholt, bis es nichts mehr aufnahm. Die Decocte wurden zum Extract abgeraucht, welches durch Alkohol in zwei ganz unterschiedene Theile getrennt wurde: der eine war schwarz und unauflöslich, der andere gelb, zähe und sehr auflöslich. Dieser in Alkohol auflösliche Theil war stark blasenziehend; Robiquet zog also die schwarze Materie wiederholt mit kochendem Alkohol aus, so daß die rückständige Masse nichts Blasenziehendes mehr enthielt. Der durch Weingeist ausgezogene gelbe Stoff wurde mehrere Stunden in einer hermetisch verschlossenen Flasche mit Schwefeläther, der im Anfange keine Wirkung zu äußern schien, geschüttelt, wobei jener Stoff sich erweichte, und der Aether eine schwach gelbe Farbe annahm. Bei dem allmäligen Verdunsten des Aethers an der Luft schieden sich kleine glimmerartige Plättchen ab, die mit Tröpfchen von einer gelblichen Flüssigkeit verunreinigt waren, von der sie aber durch kalten Alkohol befreit werden konnten. Die auf Druckpapier getrockneten Blätter wurden in kochendem Alkohol aufgelöst, und fielen

in krystallinischer Gestalt daraus nieder. Diese Plättchen besitzen die blasenziehende Eigenschaft im concentrirtesten Grade, und müssen als das eigentliche wirksame Princip der Kantharíden angesehen werden, welches man Kantharidin genannt hat. Es ist in den Oelen in allen Verhältnissen auflöslich, und macht diese auffallend ätzend, so daß einige Atome davon in Mandelöl aufgelöst und auf die Haut gelegt binnen wenigen Stunden Blasen ziehen. Bei einer Vergiftung mit Kantharíden ist also Oel durchaus zu vermeiden.

Um den Kantharíden das blasenziehende Princip zu entziehen, ist es bloß nöthig, dieselben wiederholt auszukochen, wozu in Hrn. Bachmann's Versuchen eine sechsmalige Auskochung erfoderlich war. Durch Digestion der Kantharíden mit Alkohol konnte Hr. Bachmann nicht das Princip ausziehen; um dieses aus der wäßrigen Abkochung auszuscheiden, hat man diese bloß so weit zum Extract abzurauchen, daß nicht die dem Alkohol sich beimischende Feuchtigkeit einen Antheil der schwarzen Materie mit auflöse, und dann das alkoholische Extract mit Aether zu behandeln. Die andern Stoffe wirken nur blasenziehend, so lange sie etwas von diesem Princip beigemischt enthalten.

Aus den durch kochendes Wasser erschöpften Kantharíden erhielt Robiquet durch Alkohol eine grünliche Tinctur, die der freiwilligen Verdunstung überlassen ein grünes, flüssiges Oel zurückließ, das nicht blasenziehend war, selbst wenn es auf die Lippen gebracht wurde.

Aus den zur Ausmittlung der freien Säure in den Kantharíden angestellten Versuchen schließt Robiquet, daß es Essigsäure sey, und daß die gleichfalls in den Kantharíden enthaltene Phosphorsäure an Talkerde gebunden sich befinde. Da die Essigsäure aber von den zur Tödtung der Insecten angewandten Essigdämpfen herrühren konnte, so wurden lebende spanische Fliegen in einem Mörser zerquetscht, und dann mit Wasser destillirt. Das Product war milchig, roch stark nach spanischen Fliegen und röthete das Lackmuspapier, allein die Wirkung geschah nicht sehr schnell. Die Essigsäure war daher nur in geringer Menge vorhanden. Andere Chemiker haben kein saures, Neumann vielmehr ein ammoniakalisches Destillat erhalten. Da aber die Abkochungen der frischen spanischen Fliegen keine so unzweideutigen Zeichen einer Säuerung gaben, wie die der käuflichen, so wurden, um diese Ungewißheit zu heben, frische spanische Flliegen in destillirtem Wasser gekocht, die Abkochung filtrirt und abgeraucht, wobei ein dem Anscheine nach erdiger, viel reichlicherer und von dem verschiedener Bodensatz entstand, der sich bei gleicher Behandlung aus alten spanischen Fliegen erzeugt. Von der bis zur Syrupsdicke abgerauchten Abkochung abgesondert, und mit kaltem Wasser abgewaschen, zeigte sich dieser Bodensatz als ein körniges, gelbgrauliches Pulver, das mit ein wenig Wasser benetzt, Lackmuspapier röthete, zwischen den Zähnen knirschte, und sich nach allen Versuchen ganz wie Harnsäure mit ein wenig phosphorsaurer Talkerde und ein wenig thierischer Materie verbunden verhielt. Merkwürdig ist es, daß diese Insecten, die ausgezeichnet auf die Urinwege wirken, Harnsäure enthalten; in alten Kantharíden konnte sie aber nicht aufgefunden werden.

Nach Robiquet's Untersuchungen enthalten die Kantharíden folgende

Bestandtheile: 1) ein blasenziehendes Princip; 2) ein grünes concretes Oel (Weichharz); 3) ein gelbes flüssiges Oel; 4) eine eigenthümliche schwarze Substanz, die nur in Wasser und wäßrigem Weingeiste, aber nicht in Alkohol auflöslich ist; 5) eine gelbe Substanz, die in Wasser und Alkohol gleich auflöslich ist (Osmazom?); 6) Harnsäure; 7) Essigsäure; 8) phosphorsaure Talkerde; 9) parenchymatöses oder zelliges Gewebe.

Gmelin nennt das blasenziehende Princip, das Kantharidin, Kantharidencampher. Die Krystalle schmelzen nach seinen Versuchen in der Wärme zu einem gelben Oele, welches beim Erkalten strahlig erstarrt; bei stärkerem Erhitzen verdampfen sie als ein weißer Nebel, und legen sich als ein weißes krystallinisches Sublimat unverändert an. Indessen stimmen seine sonstigen Eigenschaften, der Mangel an Verdunstbarkeit in gewöhnlicher Temperatur, die Unauflöslichkeit in kaltem Alkohol nicht mit den Eigenschaften des Camphers überein, so daß es nicht zu demselben gezählt werden kann.

Auch aus der oben erwähnten Lytta vittata hat Dana zu Cambridge in Nordamerika (Schw. J. XXX. S. 247.) durch ein ganz ähnliches Verfahren krystallinische Blättchen dargestellt, welche zwischen den Fingern gerieben Jucken und Röthen verursachten. Die ostindischen Kanthariden enthalten gleichfalls viel blasenziehendes Princip, auch Harnsäure. Beim Trocknen geben sie Ammoniak aus. Das aus dem wäßrigen Extract ausgezogene alkoholische Extract ist dunkelbraun, und verbreitet ganz den Geruch des geistigen Extracts aus dem eingedickten Urin.

Die medicinische Anwendung der spanischen Fliegen als blasenziehendes Mittel ist bekannt, sie werden aber auch innerlich gegeben, jedoch erfodert ihre Anwendung, ihrer giftigen Eigenschaften wegen selbst in sehr kleinen Gaben, sehr große Vorsicht. Sie wirken vorzüglich auf die Harngefäße, und diese Wirkung ist so stark, daß sie durch das bloße Auflegen der spanischen Fliegen auf den Arm hervorgebracht werden kann. Ihrer heftig wirkenden Eigenschaften ungeachtet leiden sie bisweilen von einem Käfer (Ptinus fur), wodurch sie ganz verdorben werden; es sind daher die feuchten, zerbrochenen, oder in ein gröbliches Pulver zerfallenen Kanthariden von ekelhaftem und dumpfigem Geruche verwerflich. Vorzüglich ist diesem Verderben das Pulver der Kanthariden unterworfen, welches nur gröblich seyn muß, und im Fall des Verderbens durch Würmer, statt des grünlichgrauen Aussehens, ganz grau aussieht, locker und wollig ist.

* Cautschouc. Resina elastica s. cajennensis, Gummi elasticum. Kautschuck, Federharz.

Ein aus dem Stamme der Hevea guianensis Aubl., eines amerikanischen Baumes, ausfließender und an der Luft sich verdickender Milchsaft.

Hevea guianensis Aubl. Wahrer Kautschuckbaum, Federharzbaum.

Jatropha elastica Linn. fil., Siphonia Cahuchu Willd., Siph. elastica Pers.

Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Dieser Baum, der in Amerika von Mexiko bis herab nach Brasilien vorkommt, kann eine Höhe von 60 Fuß erreichen, und wird gegen 4 Fuß dick. Er verzweigt sich in glatte braune Aeste mit abwechselnden, gedreiten, langgestielten Blättern aus 4—5 Zoll langen, verkehrt-eiförmigen, länglichen, stumpfen, ganzrandigen, undeutlich zugespitzten, gestielten Blättchen, welche oben glatt und glänzend, unten blaugrün sind. Die rispenförmigen, achselständigen Blüthentrauben aus kleinen, gelblichen, sammt den Stielchen schwach filzigen Blüthen werden 2—3 Zoll hoch, und kommen an Länge den Blattstielen gleich.

Das Federharz wird in Brasilien, an den Ufern des Amazonenflusses, in Quito, auf der Insel Cajenne, in Guiana, auch auf Isle de France gewonnen. Humboldt fand in Popayan eine Art Lobelien, deren Milchsaft das in Quito verkäufliche Federharz liefert, welche dort Caoutchouc genannt wurde, er nannte daher diesen Baum Lobelia Caoutchouc. In Guiana heißt der Baum, der dort das Federharz liefert, Chevé. Der Beschreibung dieses Baumes von Fresnau zufolge ist es die oben beschriebene Hevea guianensis Aubl., welche von dem jüngern Linné mit Unrecht Jatropha elastica genannt worden ist. Später stellte Willdenow die Hevea als eigne Gattung unter dem Namen Siphonia auf, und nannte den Baum Siphonia Cahuchu. In Neu-Granada wird das Federharz von mehreren Feigenarten gewonnen, von denen einige selbst den Namen Caoutchouc führen, und die Humboldt als Ficus elliptica und prinoides aufstellt. Es ist also nicht mit Bestimmtheit anzugeben, von welcher Pflanze unser verkäufliches Federharz abstammt, da sich diese eigenthümliche Substanz in mehreren, sehr verschiedenen Pflanzenfamilien findet, und es sind dieses nach Sprengel (Berl. Jahrb. XXVI. 1. 1824. S. 9.) vorzüglich die Tricoccen, die Urticeen, die Lobelien, Contorten, ja selbst die Cichoreen und Papavereen.

Das Federharz ist erst seit 1736 bekannt. Es ist der aus den bis aufs Holz in die Rinden gemachten Einschnitten ausfließende milchweiße Saft, welcher von den Eingebornen lagenweise auf irdene Formen aufgestrichen wird. Nicht eher wird eine frische Lage aufgestrichen, als bis die vorige an der Luft oder über Feuer trocken geworden ist. Wenn sie glauben, daß das Ganze dick genug sey, so wird die Form zerbrochen, und diese stückweise durch die Oeffnung, welche an dem Gefäße von Federharz gelassen worden ist, herausgeschüttet. Das Federharz kommt daher gewöhnlich in Gestalt kleiner Flaschen vor, zuweilen geben ihm die Indianer die Gestalt eines Vogels, oder andern Thieres, oder auch von Früchten. Vor einiger Zeit erhielt man es in großen festen tafelförmigen Massen.

So wie das Kautschuck im Handel vorkommt, ist es eine bräunliche, in dünnen Stücken halbdurchsichtige, sehr biegsame, lederartige und äußerst elastische Substanz von 0,9335 spec. Gewicht. Bei ungefähr 100 ° R. schmilzt

es, bläht sich bedeutend auf, und brennt mit einer weißen hellen Flamme, unter Verbreitung eines dicken riechenden Rauches (in Cajenne brennt man es statt der Talglichter). Bei der trocknen Destillation giebt es Ammoniak aus. Es ist in kaltem Wasser unauflöslich, in heißem wird es bloß weich. Auch in Alkohol löst es sich nicht auf. Die ätzenden Alkalien greifen es nach Einigen nicht an, nach Andern wird es darin weich und schmierig und löst sich zuletzt sogar darin auf. Die Schwefelsäure verwandelt es bei zweimonatlicher gelinder Digestion unter Entwickelung von schwefligsaurem Gase, ohne künstlichen Gerbestoff zu erzeugen, oberflächlich in Kohle. Salpetersäure färbt es gelb, entwickelt Stickgas, kohlensaures Gas und Blausäuredampf, und läßt Kleesäure und einen fettigen Körper zurück.

Weingeisthaltender Aether löst nur äußerst wenig auf, weingeistfreier Aether aber löst das Federharz, wenn es durch Kochen mit Wasser ganz erweicht ist, in großer Menge auf, mit Zurücklassung des Rußes. Die farblose Auflösung wird durch Weingeist gefällt; beim Verdampfen an der Luft läßt sie unverändertes Federharz fallen. In kaltem gereinigtem Steinöle schwillt es zum 30fachen auf; beim Erhitzen löst sich ein Theil auf, während der andere, der sich ebenfalls als Federharz verhält, sich in dem Oele unauflöslich zeigt. Unter den ätherischen Oelen löst das Chamillenöl am meisten auf, nächstdem Bernstein-, Wachs-, Kümmel-, Angelica-, Myrrhen-, Rosmarin-, Terpenthin- und Muscatöl. Die Auflösung ist um so schmieriger, je mehr sie Federharz enthält, welches durch Weingeist unverändert gefällt wird, und durch Austrocknen an der Luft seine vorigen Eigenschaften wieder erhält. Die fetten Oele wirken weniger darauf, am meisten löst noch das Mandelöl auf.

Faraday (Geiger's Magazin, Mai 1826. S. 180.) analysirte den Milchsaft, welcher das Kautschuck liefert. Er fand darin: Wasser, Säure u. s. w. 563,7; reines Kautschuck 317,0; bittere, färbende, stickstoffhaltende Substanz 70,0; in Wasser und Weingeist lösliche Substanz 29,0; eiweißartige Substanz 19,0; Wachs 1,3. S. = 1000. Das reine Kautschuck ist nach Faraday weiß, durchscheinend und sehr elastisch.

Mehrere Varietäten von Kautschuck findet man auch im Mineralreiche, welches weich, außerordentlich elastisch, fettig anzufühlen und von schwach aromatischem Geruche ist, eben so mit glänzender Flamme brennt, aber den Auflösungsmitteln noch mehr als das vegetabilische widersteht. Auch künstlich kann man einen ähnlichen Stoff darstellen, wenn Leinöl auf einen Stein gestrichen, und der Luft 6—7 Monate lang ausgesetzt wird; es erlangt fast alle Eigenthümlichkeiten des Kautschuck.

Das natürliche vegetabilische Kautschuck wird nicht nur zu chirurgischen Instrumenten gebraucht, sondern ist auch für die Chemie von großem Nutzen zur Darstellung von Leitungsröhren u. s. w. Zu diesem Zwecke erweicht man das in Striemen geschnittene Federharz in der Wärme und preßt sie stark an einander, oder man bestreicht vorher die Ränder mit einer daraus gefertigten Auflösung, oder man schneidet einen gleichförmigen Streif von gehöriger Dicke, und windet denselben spiralförmig um ein Glas- oder Me-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0216-7

kallstäbchen, so daß die Ränder in genauer Berührung mit einander stehen; kocht man es in diesem Zustande einige Zeitlang, so verkleben die Ränder dergestalt mit einander, daß das Ganze eine Röhre bildet. Noch leichter stellt man diese dadurch dar, daß man das in Streifen geschnittene Federharz mit Aether so weit übergießt, daß es damit bedeckt ist; dadurch wird es in kurzer Zeit so erweicht, daß die der Länge nach um eine Glasröhre an einander gelegten Streifen durch Rollen leicht in eine Masse gehen und eine Röhre bilden. Auch zum Verkleben der Fugen ist es so zubereitet am schicklichsten. Stratingh erweicht zu diesem Zwecke die Enden von 1½ bis 2 Zoll breiten Streifen in kochendem Wasser, vereinigt sie dann, bringt sie unter die Presse, und nimmt sie nach einiger Zeit heraus. Auf solche Weise zu 15 — 20 Zoll langen Riemen innigst verbunden, umwindet er damit, nachdem sie zuvor in Wasser eingeweicht waren, die Fugen der Destillirgefäße und hat dann, nach beendigter Befestigung mit Drath und Trocknung, ein sehr reines von Wasser, Alkohol und verdünnten Säuren unangreifbares Lutum.

Dr. Macartney zu Dublin bedient sich dünner Scheiben aus Kautschuck zum Verbinden der mit Weingeist gefüllten Gefäße statt der Blase. Diese Scheiben sind aber gefirnißt. Sie richten sich genau nach der jedesmaligen Temperatur der Gefäße, und schließen daher besser als jede andere ähnliche Vorrichtung. Leder mit Kautschuck überzogen und gefirnißt würde vielleicht eben so gut dienen, und kostete viel weniger.

Auch in den Gewerben findet das Federharz seine Anwendung, indem die mit einer daraus bereiteten Auflösung bestrichenen Zeuche, z. B. Tuch, Filz ꝛc., durch das nach dem Trocknen unverändert darauf befindliche Federharz die Eigenschaft erlangen, dem Wasser den Durchgang zu versagen, wasserdicht werden. Zu diesem Zwecke ist es namentlich in England in Gebrauch gezogen worden. Man löst hiezu das Kautschuck in dem aus Steinkohlentheer gewonnenen Oele auf, welches man in den Werkstätten, wo das brennbare zur Erleuchtung dienende Gas bereitet wird, im Ueberflusse erhält. Mittelst eines Pinsels bestreicht man die eine Seite des Stoffes 5 oder 6 mal mit dieser Auflösung, bedeckt hierauf den Stoff mit einem andern gleich großen Stücke, und zieht nun beide zwischen zwei Cylinder durch, um sie fest mit einander zu verbinden. Diese Stoffe hängen jetzt so fest zusammen, daß eher der Stoff zerreißt, als daß er sich von dem Kautschuck trennte.

Capsicum annuum seu Piper hispanicum. Die Früchte. Spanischer Pfeffer.

Capsicum annuum Linn. Eine einjährige, im südlichen Amerika einheimische, bei uns in Gärten cultivirte Pflanze.

Lederartig-häutige, kegelförmige, glänzende Beeren, von rother Farbe, zwei-, dreifächrig, mit weißen zusammengedrückten Saamen angefüllt, von brennend pfefferartigem Geschmacke.

Capsicum annuum Linn. Jährige Beißbeere, Spanischer, Indischer oder Türkischer Pfeffer.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Diese Pflanze ist ursprünglich in Westindien zu Hause, sie wächst in Brasilien, Peru, Barbados und Mexiko wild, wird aber auch dort sehr häufig eigends angebaut, bei uns aber in Gärten und Gewächshäusern gezogen.

Der aufrechte krautartige Stengel ist ästig, 1—2 Fuß hoch. Die Blätter sind kurzgestielt, abwechselnd, länglich-oval, spitzig, ganzrandig und glatt. Die Blüthen stehen einzeln den Blättern gegenüber, und sind von gelblichweißer oder weißer Farbe. Der bleibende Kelch ist einblättrig, fünfspaltig, die Blumenkrone einblättrig, radförmig, halb fünfspaltig und etwas gefaltet.

Die Frucht ist eine trockne, zweifächerige, hohle, vielsaamige Kapsel, die Anfangs grün, bei der Reife aber glänzend roth, schön rothgelb oder dunkelorangefarbig ist, manchmal bleibt auch ihre Farbe gelb. In der Größe, Form und Farbe giebt es mehrere Abänderungen. Gewöhnlich sind die Kapseln eiförmig und spitzig, zuweilen, jedoch selten, kugelförmig und rund. In einem lockern, schwammigen, sehr trocknen Marke enthalten sie viel kleine, platte, nierenförmige, weißliche Saamen. Der Geschmack der äußern Schale sowohl, als besonders des Markes ist höchst brennend, beißend, der Geruch im frischen Zustande etwas betäubend.

Die Pflanze blüht im Juli, und ihre Frucht erlangt in den gemäßigten Klimaten Europas gewöhnlich ihre Reife.

Die Früchte sind officinell. Im trocknen Zustande sind diese fast geruchlos, theilen auch dem darüber abgezogenen Wasser weder Geruch noch Geschmack mit, reizen aber durch ihren Dunst, oder wenn sie stäuben, leicht zum Niesen. Auf der Haut erregen sie entzündliche, schmerzhafte Röthe, zuweilen auch Blasen.

Bucholz (Taschenb. 1816. S. 1.) hat den spanischen Pfeffer zerlegt, und denjenigen Stoff, in welchem das so ausgezeichnet Brennende und Wirksame seinen Sitz hat, Capsicin genannt. Er erhielt es durch Ausziehen des alkoholischen Extracts mit Schwefeläther in der gewöhnlichen Temperatur und Verdunsten desselben. Dieses Princip hatte 1) eine dunkel gelbrothe Farbe; 2) einen nicht unangenehmen, eigenthümlichen, balsamischen Geruch; 3) einen eigenen, schwach balsamischen Geschmack, der gleich darauf, selbst in der kleinsten Menge, in ein heftiges anhaltendes Brennen überging, und bei größerer Menge Entzündung und Betäubung des Geschmacks bewirkte; 4) eine balsamartige Consistenz; 5) über der Weingeistlampe zersetzte es sich unter Verbreitung eines dicken, weißen, im höchsten Grade zum Husten und Niesen reizenden Dampfes, und Hinterlassung eines kohligen Rückstandes; 6) das kalte Wasser wirkte nur wenig darauf, und mit demselben zusammengerieben und filtrirt brachte es nur ein schwaches Brennen auf den Lippen hervor; 7) destillirter Essig löste mehr davon auf, und bewirkte ein stärke-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0218-8

res Brennen; 8) 85 Procent haltiger Alkohol löste es leicht auf, die rothgelbe Tinctur hatte einen anhaltend heftig brennenden Geschmack; 9) eben so verhielt sich Schwefeläther und 10) Terpenthinöl; 11) Mandelöl löste diesen Stoff gleichfalls auf, dämpfte aber das Brennen, während der balsamische Geruch sehr stark blieb; 12) auch eine schwache Aetzkalilauge gab eine gesättigte, rothgelbe, etwas trübe Auflösung von einem besonders heftig brennenden, entfernt safranartigen Geschmacke und hervorstechendem Balsamgeruche; 13) Salpetersäure und Schwefelsäure, die damit in Berührung gebracht worden waren, schienen nichts davon aufgelöst zu haben, wenigstens hatten sie keinen brennenden Geschmack angenommen. Pfaff vermuthet, daß das Capsicin ein Alkaloid sey, was jedoch zu bezweifeln ist. Außer diesem Capsicin oder brennendem Balsamharz enthielt der spanische Pfeffer noch einen zweiten zu seiner arzneilichen Kraft mitbeitragenden Bestandtheil, einen kräftigen Extractivstoff von merklich bitterm, nicht unangenehm erwärmendem, schwach gewürzhaftem Geschmacke, dessen chemische Reactionen übrigens nichts Auffallendes hatten. Die übrigen Bestandtheile, die Bucholz fand, sind als ziemlich indifferent zu betrachten. Er erhielt aus 500 Theilen: Capsicin (brennendes Balsamharz) 20; reinen Extractivstoff von bitterm gelind aromatischem Geschmacke 43; Extractivstoff mit einem Antheil Gummi 105; gummigen Stoff 46; Wachs 38; eiweißstoffähnliche Substanz besonderer Art 16; Parenchym 140; Feuchtigkeit 60; Verlust 32.

In der Asche des spanischen Pfeffers fand Bucholz eine sehr große Menge kohlensaures Kali, nämlich $\frac{3}{4}$ des Ganzen, mit einem geringen Antheil von salzs., schwefels. und phosphorsaurem Kalke darin; das übrige $\frac{1}{4}$ aber zum größten Theil aus Kalk, einem geringen Antheile Alaunerde und Eisen, und einer geringen Spur Bittererde und phosphorsaurem Kalke, aber nichts von Kieselerde.

Eine Analyse von Braconnot (Gmelin's Handb. der Chemie II. S. 1584.) gab folgende Bestandtheile in 100: wachsartige Materie nebst einem harzigen rothen Farbestoffe, der weniger brennend schmeckt, als das scharfe Harz 0,9; scharfes Oel (Weichharz) 1,9; Gummi 6,0; braunrothe, stärkemehlartige, nicht in kochendem Wasser, aber in Kali lösliche, und daraus durch Säuren in braunen Flocken fällbare Materie 9,0; thierisch-vegetabilische Materie 5,0; citronensaures Kali 6,0; phosphorsaures und salzsaures Kali (und Verlust) 3,4; unauflöslichen Rückstand 67,8.

Auch von Herrn Maurach befindet sich eine Analyse im Berl. Jahrb. XVII. 1816. S. 63.

Der spanische Pfeffer, der seine Hauptanwendung in Südamerika und Westindien, wie auch in Rußland und England, seltner bei uns, als Gewürz findet, indem in den heißen Himmelsstrichen die so leicht erschlaffende Lebensthätigkeit solcher starken Reize mehr zu bedürfen scheint, als in den gemäßigten, ist auch, besonders in neueren Zeiten, als Arzneimittel sehr empfohlen worden, und zwar in der geistigen Tinctur, oder in Pulverform zu 2—6 Gran, zu welchem Behufe die Kapseln erst mit Traganth zur Masse

gestoßen, diese getrocknet und dann pulverisirt werden müssen. Große Gaben bringen Zufälle von Vergiftung hervor.

(Der Cajennepfeffer besteht aus den zerriebenen Saamen und reifen Früchten des **Capsicum baccatum**, Weizenmehl und Sauerteig, welche Masse in Oefen getrocknet und dann gepulvert wird. Es soll demselben bisweilen, um ihm Farbe zu geben, **Minium** beigemischt seyn, welches durch Essig aufgelöst, aus dieser Auflösung aber durch schwefelsaures Natrum, als schwefelsaures Blei, niedergeschlagen wird.)

Carbo vegetabilis. Kohle.

Die vegetabilische Kohle kann in ihrem gewöhnlichen Zustande nicht in den medicinischen und pharmaceutischen Gebrauch gezogen werden, sondern muß durch das bei **Carbo purus** im 2ten Th. vorgeschriebene Verfahren erst dazu geeignet gemacht werden, wo auch von den Eigenschaften der vegetabilischen und der animalischen Kohle, so wie von dem chemischen Verhalten des Kohlenstoffes die Rede seyn wird.

Cardamomum minus. Kleine Cardamomen.

Alpinia Cardamomum Roxburgh., sive Elettaria Cardamomum Whitei et Matoni. Eine ausdauernde Pflanze Ostindiens.

Kleine, schwärzliche, fast dreieckige, runzlige Saamen, von stark aromatischem Geschmacke, angenehmen campherartigen Geruche, in einer häutigen dreiseitigen, an beiden Enden langzugespitzten, dreifächrigen Kapsel, von $\frac{1}{2}$ Zoll Länge.

Alpinia Cardamomum R. Das kleine Cardamom.
Linn. Cl. I. Monandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IV. Ord. 2. Cannae.

Diese Pflanze wächst wild auf Bergen in Malabar, und wird dort häufig angebaut.

Aus der knolligen, mit fleischigen Fasern besetzten Wurzel erheben sich aufrechte, perennirende, 6—9 Fuß hohe, glatte, gegliederte, von den Blattscheiden eingehüllte Stengel. Die Blätter sind lancettförmig, oben haarig, unten seidenartig, und 1—2 Fuß lang. Die Blumen kommen am Grunde des Stengels in niederliegenden gebogenen ästigen Trauben von 1—2 Fuß Länge hervor, und sind gelblich oder grünlichweiß mit purpurfarbenen Streifen an der Lippe des innern Kelches.

Die Fruchtkapseln sind unter dem Namen des kleinen Cardamoms, vorzugsweise vor zwei andern im Handel vorkommenden Sorten des Cardamoms, bekannt und geschätzt. Sie sind 4—6 Linien lang, und halb so breit, dreiseitig, gestreift, gelblichweiß und glatt. Inwendig sind diese

Kapseln in drei Fächer getheilt, in deren jedem zwei Reihen unregelmäßig viereckiger, etwas gefurchter, an einander hängender, äußerlich brauner, inwendig weißer Saamen liegen, welche zerdrückt einen sehr starken angenehmen, etwas campherartigen Geruch von sich geben, und einen angenehmen, gewürzhaften, etwas campherartigen, scharfen Geschmack haben.

Neumann erhielt aus den Kapseln kein ätherisches Oel, jedoch ein sehr stark riechendes Wasser, die Saamen aber, als der eigentlich kräftige Theil, geben aus einem Pfunde 5—6 Quentchen ätherisches, auf dem Wasser schwimmendes Oel, von blaßgelber Farbe, dem kräftigen Geruche und dem sehr scharfen Geschmacke der Cardamomen. Das auf die Saamen gegossene Wasser zieht viel Schleim aus, und giebt einen dicklichen, gelblichen, aromatischen Auszug. Das daraus erhaltene Extract beträgt $\frac{1}{11}$ des Ganzen, und ist fast geschmack- und geruchlos. Der Weingeist nimmt ganz das Gewürzhafte der Saamen in sich; die gelbbraune Tinctur hat den Geruch und Geschmack der Cardamomen, und giebt nach Verdunstung des Weingeistes den achten Theil an blaßbraunem Extract, von dem Geruche der Saamen und einem anfangs angenehm aromatischen, hintennach sehr scharfen, brennenden und anhauernden Geschmacke.

Im Handel kommen noch 2 Sorten Cardamom vor, welche ihres geringern Preises wegen bisweilen dem kleinen untergeschoben werden, nämlich 1) der große oder lange Cardamom (**Cardamomum majus s. longum**). Diese Saamenkapseln kommen von einer besondern Art **Alpinia** her, welche Roxburgh **Alpinia Cardamomum medium** nennt. Die anderthalb Zoll lange, dünne, dreieckige, an beiden Enden zugespitzte, graugelbe, der Länge nach gestreifte Kapsel enthält Saamen, die in Gestalt und Farbe den Bockshornsaamen gleichen, und einen viel schwächern gewürzhaften Geruch und Geschmack als die kleinen Cardamomen haben. 2) Der mittlere oder runde Cardamom (**Cardamomum medium s. rotundum**) von **Amomum Cardamomum Linn.**, einer Pflanze, die auf Sumatra und einigen andern ostindischen Inseln vorkommt, und welche sonst als die Mutterpflanze des kleinen Cardamoms angegeben wurde. Sie gehört zu derselben Gattung wie die vorigen, und liefert den jetzt nur selten im Handel vorkommenden runden Cardamom. Diese Saamenkapseln sind von der Größe einer kleinen wilden Schwarzkirsche, rundlich mit drei converen abgerundeten Seiten, mehr oder weniger gestreift, graulichweiß, oder etwas röthlich. Mit der Loupe zeigt sich deutlich an einzelnen Stellen der abgeriebene Haarüberzug. Die Saamen, die sehr oft zusammengeschrumpft und verdorben gefunden werden, sind in den bessern Früchten etwas größer und dunkler braun, als die des kleinen Cardamoms, auf der einen Seite eben, auf der andern rund, und besitzen einen mehr bittern, stärker campherartigen Geschmack, und nicht so angenehmen Geruch, als die kleinen Cardamomen.

Hierher gehören auch noch die im Handel vorkommenden sogenannten Paradieskörner (**Grana Paradisi**) von **Amomum Granum Paradisi**. Es sind dreieckige, von außen gelbbraune, inwendig weiße Saamen, größer als

die vom kleinen Cardamom, sie besitzen einen nur schwachen gewürzhaften Geruch, aber einen scharfen pfefferartigen Geschmack. Aus 16 Unzen erhielt Willert 40 Gran ätherisches Oel von gelblicher Farbe, starkem Geruche und durchdringendem Geschmacke. Der Rückstand quoll vom Wasser gleich einem steifen Traganthschleime auf, der auch bei mehr zugegossenem Wasser sich durch einen leinenen Sack nicht abpressen ließ. Der Weingeist zog aus diesem schleimigen getrockneten Rückstande eine Tinctur aus, die nach Verdunstung des Weingeistes ein flüssiges Harz von brennend scharfem und sehr lange anhaltendem Geschmacke hinterließ.

Diese Saamen werden nur zum Räuchern angewendet, oder auch unerlaubter Weise, um dem Branntwein, dem Essig ꝛc. eine trügerische Schärfe zu geben.

Carduus benedictus. Das Kraut. Cardobenedictenkraut.

Centaurea benedicta Linn. Eine einjährige Pflanze, aus den Inseln des Archipelagus, in medicinischen Gärten angebaut.

Das blühende, sehr bittere Kraut, mit sitzenden, buchtig-halbgefiederten, gezähnten, etwas dornigen, weichhaarigen Blättchen, mit zusammengesetzten Blumen, die Röhrenblümchen gelb, der Kelch mit verschanzenden spinnenwebartig-filzigen Nebenblättern. Sogleich nach Entwickelung der Blumen einzusammeln.

Centaurea benedicta Linn. Cardobenedictenkraut, Benedictenflockenblume.

Cnicus benedictus Spreng.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.

Juss. Cl. X. Ord. 2. Cinarocephalae.

Diese sehr geschätzte Arzneipflanze wächst in den südlichern Ländern Europas, in Frankreich, Spanien und Griechenland wild; bei uns wird sie in Gärten gebaut.

Die Wurzel ist einjährig, ästig; der Stengel aufrecht, etwas eckig, röthlich gefärbt, vom Grunde an in viele lange, abstehende Aeste zertheilt, und überall mit langen, krausen, weißen, etwas klebrigen Haaren bedeckt. Die Wurzelblätter, die ungefähr einen Fuß Länge erreichen, laufen in einen Blattstiel herab, sind gefiedert-zerschnitten mit entfernten buchtig-gezahnten Abschnitten. Die Stengelblätter sind sitzend, die obern etwas herablaufend, an der Basis breiter, gegen die Spitze buchtig ausgerandet und gezahnt; alle sind mit ähnlichen Haaren wie der Stengel, und am Rande mit kleinen Dornen versehen.

Die Blüthen sitzen einzeln an der Spitze der Zweige, und sind von mehreren großen gezahnten Brakteen von verschiedener Gestalt umhüllt. Der gemeinschaftliche Kelch (periclinium) ist eiförmig, mit einer lockern spinnenwebartigen weißen Wolle bekleidet, und besteht aus dicht übereinander liegen-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0222-9

den grünen Blättchen. Die einzelnen Blättchen sind an dem hervorragenden obern Theile schön gelb; die unfruchtbaren im Strahle bestehen aus einem sehr zarten weißen Blumenrohre mit dreispaltigem Saume; die fruchtbaren Zwitter sind trichterförmig, an der Spitze ungleich fünfspaltig.

Der Saame ist etwas gekrümmt, gerippt, gelblichgrau, von oben mit einer Bürste von steifen Borsten umgeben, einen süßen weißen Kern enthaltend.

Es ist nicht gleichgültig, auf welchem Boden und auf welchem Standorte man diese wirksame Pflanze zieht. Sie wird, wie Wiegmann bemerkt, am heilkräftigsten auf sandigem und magerm, aber der Einwirkung des Sonnenlichts sehr ausgesetztem Boden. Die beste Zeit, das Kraut zu Species oder wohl gar zum Pulverisiren zu sammeln, ist dann, wenn es nur 4 große Blätter und noch keinen Trieb zur Bildung der Blüthe hat, weil es sonst stenglig und das Pulver haarig wird. Heilkräftiger und zum Extracte tauglicher wird es aber, wenn man es zur Zeit der Eröffnung der Blume abschneidet. Es verliert beim Trocknen bis $\frac{3}{4}$ an Feuchtigkeit. Der Geschmack ist im hohen Grade rein bitter. 8 Pfund getrocknetes Kraut geben 30 Unzen wäßriges Extract, aus welchem sich mit der Zeit Salpeterkrystalle auszuscheiden pflegen. Wiegmann erhielt durch Auskochen aus einem Pfunde von dem jungen saftigen Kraute 5 Unzen, aus einem Pfunde von dem bis zur Entwickelung der Blüthe gelangten Kraute nur 4—4½ Unze von dem vorigen durch mehr Bitterkeit und salzigen Geschmack verschiedenes Extract.

Der kalte Aufguß der Blätter läßt nach dem Verdunsten einen ansehnlichen Niederschlag fallen, der nach Soltmann's Versuchen (Berl. Jahrb. 1815. S. 86.) größtentheils aus Gyps besteht. Aus 1000 Gran trocknen Krautes erhielt Hr. S. 45 Gr. eines grünen weichen Harzes; 155 Gr. Extractivstoff; 83 Gr. Schleim und Gummistoff. S. = 283 Gran. Von Salzen enthält das Kraut noch eine ziemliche Menge essigsaures Kali, welches die Ursache ist, daß das aus dem Kraute bereitete Extract die Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.

Die Wirksamkeit dieser Pflanze liegt in den bittern extractiven und salzigen Theilen, daher schon ein kalter wäßriger Aufguß die wirksamen Theile auszieht. Die Abkochung soll dem Magen mehr widrig und bisweilen selbst brechenerregend seyn. Am gebräuchlichsten ist das Extract, welches die wirksamen Theile in sich vereinigt enthält.

Selten sind noch im Gebrauche die Blätter der Mariendistel (Carduus Marianus), die groß, breit, weiß gefleckt, sehr tief gezackt und am Rande stachlig sind. Die Blume besteht aus einzelnen purpurrothen Blümchen, und der Kelch aus lauter übereinandergelegten Schuppen. Die Saamen, Stechkörner oder Stichkörner (Semen Cardui Mariae) sind cylindrisch, platt und enthalten unter einer braunen glänzenden Rinde einen weißen und süßen Kern.

Carex arenaria. Die Wurzel. Sandriesgraswurzel.

Carex arenaria Linn. Eine ausdauernde in sandigen Stellen Deutschlands häufige Pflanze.

Eine sehr lange, kriechende, knotige Wurzel (Sprosse), zwischen den Knoten keine Wurzelzasern ausschickend, außen braunroth, innen weiß, von süßlichem mehlartigem Geschmacke und terpenthinartigem Geruche. Sie muß nicht verwechselt werden mit der Wurzel von Carex hirta, die ganz ohne Geruch ist, oft in den Internodien Wurzelzasern ausschickend. Im ersten Frühlinge einzusammeln.

Carex arenaria Linn. Sandriesgras. Sand-Segge.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 3. Triandria.
Juss. Cl. II. Ord. 3. Cyperoideae.

Diese Pflanze wächst in sandigen Gegenden, vorzüglich im Flugsande, auch am Ufer des Meeres. Man pflanzt sie an sandige Orte und Dünen, um den Boden dadurch einigermaßen zu befestigen.

Aus einer langen, kriechenden, gegliederten, mit braunen Schuppen bekleideten Wurzel kommen mehrere aufrechte, dreikantige, gestreifte, an den Kanten scharfe, 6—10 Zoll lange, größtentheils nackte Halme hervor. Die Blätter stehen auf kurzen, glatten Scheiden am Grunde des Halms beisammen, sind schmal, nierenförmig, oft länger als der Halm, am Rande scharf, und endigen sich in eine lange dreiseitige Spitze. Die Blüthenähre besteht aus 8—12 dicht beisammen stehenden, länglichen, zugespitzten kleineren Aehrchen, ist 1½—2 Zoll lang, und jedes Aehrchen am Grunde mit einem kurzen, scheidenartigen, in eine lange pfriemenförmige Spitze auslaufenden Deckblättchen versehen. Die untern Aehrchen sind weiblich, die mittlern unten weiblich, oben männlich, die obern männlich.

Die getrocknete Wurzel ist von der Dicke eines dünnen Federkiels, außen mehr schmutzig weiß, als braunroth, und mit großen, weiten, schwarzbraunen, mehr oder minder zerschlitzten Scheiden bekleidet; die grauen Wurzelfasern kommen nur an diesen Absätzen, nicht an den Internodien hervor. Der Querdurchschnitt zeigt ein durchaus weißes Mittelfeld, welches bloß von einem braunen Rande umschlossen wird, der mehrere, regelmäßig fortlaufende, leere Zwischenräume (Luftgänge), die aber nur unter dem Vergrößerungsglase deutlich wahrgenommen werden können, erkennen läßt. Die ächte Wurzel hat frisch einen eigenthümlichen, schwach aromatischen, terpenthinartigen Geruch, der sich beim Trocknen verliert.

Die haarfrüchtige oder rauhe Segge (Carex hirta) unterscheidet sich sehr deutlich durch die größtentheils mit Blättern bekleideten Halme, welche einfache, dem Geschlechte nach verschiedene Aehren tragen. Der Querdurchschnitt der hell röthlichbraunen, mit braunrothen Scheiden bekleideten, und mit kürzeren Internodien versehenen Wurzel zeigt ein weißes, von einem braunen, dicht anliegenden Rande umgebenes Feld, auf welchem in der Mitte ein kleineres von hell bräunlicher Farbe liegt, auf dem sich zerstreute dunklere Punkte zeigen. Häufig wird diese Wurzel eingesammelt, da sie gleichfalls auf sandigem Boden vorkommt, und die gebräuchliche Benennung: braune oder rothe Graswurzel, mehr auf diese zu passen scheint. Der ihr aber auch im frischen Zustande mangelnde terpenthinartige Geruch scheint ihre geringere Wirksamkeit zu beweisen.

Das über die frischen Wurzeln der Carex arenaria abgezogene Wasser zeigt Spuren eines ätherischen Oeles; außerdem enthält die Wurzel viel schleimigen Extractivstoff, sehr wenig Stärkemehl, einen kratzenden Extractivstoff und Balsamharz.

Die Sandriesgraswurzel, braune oder rothe Graswurzel, deutsche Sarsaparille, wird als blutreinigendes Mittel, wie die Sarsaparille, in der Abkochung gebraucht, und soll dieser an Wirksamkeit nicht nachstehen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0224-1

Caricae. Trockne Feigen.

Ficus Carica Linn. Ein im südlichen Europa und im Orient einheimischer Baum.

Fleischige Fruchtboden, kleine Saamen einschließend, von süßem und schleimigem Geschmacke.

Ficus Carica Linn. Die gemeine Feige.
Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 3. Trioecia.
Juss. Cl. XV. Ord. 4. Urticeae.

Der Feigenbaum wächst in ganz Asien, auf den Inseln des Archipelagus, auch in Spanien, Sicilien, Italien, überhaupt in den südlichen Ländern Europas. Man glaubt, daß ihn die Phönicier zuerst im südlichen Frankreich einführten, als sie ungefähr 600 Jahre vor Chr. Geb. in Marseille eine Colonie gründeten. In Deutschland wird er in Kübeln, auch in Gärten gezogen, hält aber die Winterkälte ohne Bedeckung nicht aus, und kann bei uns in erstern ohne hinlängliche Nahrung, und im Freien durch das jährliche Umbiegen und Bedecken eben kein sonderliches Ansehn erhalten. In den mittägigen, wärmern Ländern hingegen wird er 15—20 Fuß und drüber hoch. Der kühlende Schatten, den seine ausgebreitete dichte Krone gewährt, macht ihn in den heißen Gegenden zu einem gesuchten Baume, dessen vorzüglicher Werth aber in der Güte und Schmackhaftigkeit seiner Früchte besteht, wovon man durch Cultur viele Varietäten erhalten hat, die sich durch ihre Größe, Farbe und ihren Geschmack unterscheiden. Die Athenienser sahen diesen Baum als ein Geschenk der Götter an, widmeten ihn dem Mercur, und die Lacedämonier waren der Meinung, daß durch Bacchus ihnen der erste Feigenbaum gepflanzt worden sey. Auch glaubte man in früheren Zeiten, daß dieser Baum ohne vorhergehende Blüthen Früchte trage. Die Blumen aber sind in dem fleischigen, birnförmigen Blumenboden (der Feige), der nur Täger derselben ist, und den man gewöhnlich für die Frucht hält, verborgen. Nur die Saamen sind die eigentliche Frucht.

Der Stamm des Feigenbaums ist oft gekrümmt, hat eine graue, glatte Rinde, und die Aeste sind mit rauhen, sehr kurzen Haaren bedeckt. Das Holz ist schwammig und weiß, die Blätter sind groß, gestielt, abwechselnd, dick, herzförmig, ausgeschweift-gezahnt, geadert, oben rauh und dunkelgrün, unten feinhaarig und weißlich, und tief in drei bis fünf stumpfe Lappen getheilt. Der gemeinschaftliche Fruchtboden, die Feige, ist birnförmig, fleischig, hohl, unbehaart, und innerhalb überall mit Blüthen besetzt. Die männlichen Blüthen, welche in geringer Anzahl vorhanden sind, haben einen dreitheiligen aufrechten Kelch, keine Blumenkrone, einen Griffel und zwei Narben. Der von dem schiefen Kelche fast zur Hälfte bedeckte Saame ist klein, gelblich, rundlich und zusammengedrückt.

Die Befruchtung war lange ein Geheimniß, denn man sah niemals Blumen, sondern nur Früchte. Endlich überzeugte man sich, daß die Feige

nicht die Frucht, sondern der allgemeine Fruchtboden ist. Dieser enthält entweder weibliche und männliche Blumen zugleich, oder nur von einem Geschlechte. Die Befruchtung geht daher in dem Fruchtboden selbst vor sich, worauf ein Zufluß von Säften nach diesem Theile erfolgt, so wie dieses bei der Bildung der Saamenhülle anderer Früchte der Fall ist. Der Fruchtboden schwillt beträchtlich an, der ekelhafte Geruch und zurückstoßende unangenehme Geschmack der unreifen Feigen, welcher von dem bittern und scharfen milchartigen Safte herrührt, der in allen zarten Theilen des Feigenbaums, den Rinden und Blättern, auch selbst in den Fruchtböden vor der Reife, enthalten ist, verschwindet allmälig, je näher die Zeit der Reife heranrückt, durch eine Art verborgener Gährung wird eine große Menge Zucker entwickelt, und der vorher scharf und bitter schmeckende Fruchtboden in eine saftige, außerordentlich süße und angenehm schmeckende Substanz umgeändert.

Die bei uns gereiften Feigen sind nicht so schön und süß als die der wärmeren Gegenden, lassen sich auch nicht aufbewahren. Die Feigen aus dem südlichen Europa ꝛc. erhalten wir in Kisten, Fässern oder Körben eingepackt, wodurch sie in eine rundliche Form zusammengepreßt erscheinen. Sie sehen weißgelblich aus, und haben ein etwas schleimiges, zähes, sehr süßes, mit vielen kleinen gelblichen Saamenkörnern versehenes Fleisch. Man unterscheidet gewöhnlich dreierlei Sorten: 1) die Smyrnischen, welche groß, gelb, rund und meistens trockner als die andern sind. 2) Die Genuesischen, die größer, gelber, aber länglich sind. 3) Die Marseiller, welche kleiner, gelb und rundlich sind, am angenehmsten und süßesten schmecken, sich aber nicht länger als ein Jahr halten.

In der Levante wendet man eine besondere Operation, die Caprification, an, um die Feigen zu zeitigen und recht groß zu bekommen. Man nimmt Zweige von einer Art wilden Feigenbaumes, Caprificus genannt, und schüttelt dieselben über die cultivirten Feigenbäume, wenn diese blühen. Jene beherbergen nämlich eine Art von Gallinsecten (Cynips Psenes), welche auf die cultivirten Feigenbäume geschüttelt in die Fruchtböden hineinkriechen, und dadurch einen starken Zufluß der Säfte nach diesen Theilen veranlassen, welche nun, jedoch wahrscheinlich nicht ohne Erschöpfung des Baums, sehr viel größer werden, als ohne diese Caprification. Obgleich dadurch der Ernteertrag so bedeutend vergrößert wird, daß ein Baum bis 300 Pfund liefern soll, wogegen er in der Provence und Italien, wo man die Caprification nicht anstellt, selten über 25 Pfund trägt, so stehen jene Feigen doch auch an Güte und Süße bedeutend nach, weil sie, damit die hineingelegten Eier der Insecten nicht auskommen und die Früchte verderben, durch eine starke Ofenhitze getrocknet werden müssen, wodurch sie etwas an Annehmlichkeit verlieren.

Zum Arzneigebrauche wählt man gewöhnlich die weichen, klebrigen, sehr süßen, etwas durchscheinenden Feigen (Caricae pingues) aus. Die weiße, zuckerartige, die Oberfläche der Feigen überziehende Materie ist zwar ein Merkmal ihrer Güte und Reife, zugleich aber auch ein Zeichen ihres nahen Verderbens. Veraltete, harte, trockne, sehr dunkelgelbe, stark mit Zucker-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0226-2

staub überzogene, von Milben angefressene, geschmacklose oder bitterlich schmeckende Feigen sind verwerflich.

* Carlina. Die Wurzel. Eberwurzel.

Carlina acaulis Linn. Die stengellose Carlina, Eberwurzel.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.

Juss. Cl. X. Ord. 2. Cinarocephalae.

Man findet diese Pflanze in mehreren Gegenden Deutschlands auf trocknen Bergen. Aus der perennirenden, ästigen, fleischigen, im frischen Zustande gelblichen Wurzel kommen zahlreiche Wurzelblätter, die oft einen großen Rasen bilden, hervor. Diese Blätter sind ungefähr einen Fuß lang, gefiedert zerschnitten, mit einem nierenförmig-ausgehöhlten, am Grunde breiten und dornigen Blattstiele. Die Fiederblättchen sind aufgerichtet, steif, gefaltet und in zwei lancettförmige Lappen getheilt, die wieder in ungleiche mit dornigen Spitzen bewaffnete Zähne eingeschnitten sind. Zwischen diesen Blättern erscheint der Blumenkopf, der oft 3 Zoll und drüber im Durchschnitt beträgt. Die Kelchschuppen, welche die Blume umgeben, sind gleich breit, bleichgelb und glänzend wie Perlmutter. Die Scheibe der Blume ist weiß. Die Kelchschuppen der abgeblühten Blumen sind hygroskopisch; bei bevorstehendem Regen und feuchter Luft schließen sie sich, wogegen sie sich bei trocknem Wetter von einander entfernen.

Diese Eberwurzart variirt mit einem einen halben bis ganzen Fuß langen, mit Blättern besetzten rothbraunen Stengel. (Carlina acaulis caulescens.)

Die Wurzel ist einen Fuß lang und etwa einen Zoll dick, runzlig, faserig, und, wie sie im Handel vorkommt, in dünnere 3—4 Zoll lange Stücke zerschnitten, außerhalb braun, innerhalb hellgelb, fleischig, riecht unangenehm, etwas gewürzhaft, und hat einen scharfen, sehr bittern Geschmack. Im frischen Zustande giebt sie einen Milchsaft von sich.

Die Wurzel enthält ätherisches Oel; aus 2 Pfunden erhielt ich 20 Gran eines bräunlichgelben, dicklichen, im Wasser zu Boden sinkenden, ätherischen Oels von brennend gewürzhaftem, bitterlichem Geschmacke und unangenehmen Geruche. Die Abkochung der Wurzel röthet das Lackmuspapier, und braust mit Kali gelind auf. Salzsaure Kalkerde erzeugt darin Trübung und nach einigen Stunden einen Niederschlag, der durch Salpetersäure vollkommen wieder aufgelöst wird; auch essigsaures Blei erzeugte einen in Salpetersäure wieder auflöslichen Niederschlag, es war demnach Phosphorsäure vorhanden. Essigsaurer Baryt bewirkte einen Niederschlag, schwefelsaures Silber keine Trübung. Schwefelsaure Eisenauflösung macht die Farbe der Abkochung merklich dunkler und nach einiger Zeit setzt sich ein grauer Niederschlag ab; Galläpfeltinctur verursacht aber weder eine Farbenänderung noch einen Niederschlag. Die eingedickte Abkochung zeigt Spuren von Ammoniak und enthält auch Salpeter.

Sie wurde sonst als harn- und schweißtreibendes Mittel empfohlen, ist aber jetzt, vielleicht mit Unrecht, außer Gebrauch gekommen, und wird nur noch zur Viehartznei benutzt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0227-8

* Carthamus. Die Blumen. Saflor.

Carthamus tinctorius Linn. Gemeiner Saflor.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.

Juss. Cl. X. Ord. 2. Cinarocephalae.

Diese einjährige Pflanze, nicht weniger merkwürdig durch ihren zierlichen Wuchs und Schönheit ihrer Blumen, als durch ihren vielfachen Nutzen in mehreren Künsten, vorzüglich in der Färbekunst, wächst in Aegypten und Ostindien, auch in Krain und bei Istria auf sonnigen Wiesen, und wird in vielen Gegenden Europas in Gärten und Feldern gezogen. Bei uns sieht man sie zur Zierde in den Gärten.

Die Wurzel ist spindelförmig, etwas ästig und faserig. Der aufrechte, unten einfache, oben etwas ästige Stengel ist rund, hart, holzig, glatt und erreicht eine Höhe von beinahe 2 Fuß. Die Blätter sind abwechselnd, aufsitzend, einfach, ungetheilt, eiförmig, spitz, gezähnt, glatt, etwas scharf. Die am Ende der Zweige stehenden Blumen sind von gelbröthlicher Farbe. Der gemeinschaftliche Kelch ist einblättrig und schuppig. Die Zwitterblümchen sind gleichförmig, und die trichterförmige Krone derselben hat eine fünftheilige, aufrechte, fast gleichförmige Mündung.

Der Saflor blüht im Juli und August, und der Saame reift im Herbste.

Die Blüthen sind von schwachem aber eigenem Geruche und Geschmacke. Sie wurden früher als Arznei gebraucht, jetzt aber nur zur Färberei. Man zieht die ostindischen, die im Handel den Namen türkischer Saflor (**Flores Carthami turcici**) führen, den in Deutschland gebauten vor, weil erstere einen reichlichern und bessern Farbestoff enthalten, deswegen auch schon weit dunkler und gesättigter gefärbt sind.

Die Blumen enthalten zwei verschiedene Farbestoffe, einen gelben, in Wasser auflöslichen, und einen rothen, in Alkalien auflöslichen. Der erstere wird, als in der Färberei unbrauchbar, durch Wasser weggespühlt, der rothe aber mit Hülfe eines Alkali aufgelöst, und durch ein Pflanzensalz auf Seide, die er roth färbt, oder als Lack niedergeschlagen, welcher auch als Schminke benutzt wird. Dieser rothe Farbestoff ist Carthamin genannt worden, und ist eins mit Döbereiner's Carthaminsäure (Schw. J. XXVI. S. 266.)

Nach Dufour (Gmelin's Handb. II. S. 1587 und Gehlen 3. 499.) enthalten die Saflorblüthen in 100: Wachs 0,9; Harz 0,3; harziges Saflorroth 0,5; extractiven gelben Farbestoff nebst essigs., schwefels. und salzs. Kali und schwefels. Kalk 31,0; Holzfaser 49,6; Eiweißstoff 5,5; Theilchen der Pflanze und Sand 4,6; Bitter- und Alaunerde 0,5; Eisenoxyd 0,2; Wasser 6,2; Verlust 0,7.

Carvi. Das Oel. Kümmelöl.

Ein chemisches Präparat aus den Saamen von **Carum Carvi Linn.**, einer ausdauernden Pflanze Europas.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0228-4

Das ätherische Oel, frisch gelblich, hernach in eine braune Farbe übergehend, übelriechend. Spec. Gew. = 0,95.

Das Kümmelöl hat einen brennenden Geschmack. Mit rauchender Salpetersäure giebt es ein schmieriges, schwarzes Harz; Gren und Grotthuß haben durch Abziehen der verdünnten Salpetersäure darüber Kleesäure dargestellt.

Carvi. Der Saamen. Kümmelsaamen.

Carum Carvi.

Längliche, nach beiden Seiten verdünnte, gestreifte, glatte Saamen, bräunlichgrau, von gewürzhaftem Geruche.

Carum Carvi Linn. Der Kümmel.
Linn. Cl. V. Pentandria, Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der Kümmel findet sich auf Wiesen durch ganz Deutschland, wo er früher als andere Doldenpflanzen, schon im April und im Anfang des Mais zur Blüthe gelangt; wird auch häufig angebaut.

Die Wurzel ist zweijährig, ästig, fleischig, gelblichweiß und besitzt einen der gelben Möhre ähnlichen Geruch. Der Stengel ist aufrecht, 2—3 Fuß hoch, vom Grunde an ästig, ganz glatt und nach oben eckig und gefurcht. Die Blätter sind glatt, doppelt gefiedert, die Blattscheiden zeichnen sich durch ihren breiten weißen durchsichtigen Rand aus. Die weißen oder selten blaßröthlichen Blüthen bilden zusammengesetzte vielstrahlige, flache, oben etwas ungleiche Dolden.

Die kleinen Früchte, der Kümmel (Cremocarpia), sind oval, an den Seiten zusammengedrückt, auf dem gewölbten Rücken jedes Carpells sind drei erhabene Rippen von hellerer Farbe und zwei dergleichen an der Commissur; zwischen diesen sind etwas erhabene braune Thälerchen. Der Geschmack ist gewürzhaft, erwärmend, der Geruch angenehm, stark balsamisch.

Der Saame des gebauten Kümmels ist größer und ölreicher, auch von angenehmern Geschmacke als der wilde.

Das Wirksame liegt in dem ätherischen Oele. 30 Pfund Saamen geben nach Hagen 19 Unzen Oel.

Der Kümmel ist als Carminativum und als die Milchabsonderung beförderndes Mittel berühmt, und wird am besten in Pulverform gebraucht; am häufigsten aber zur Gewinnung des ätherischen Oeles und des gebrannten Kümmelwassers, auch als Gewürz benutzt.

Caryophyllata. Die Wurzel. Nelkenwurzel.

Geum urbanum Linn. Eine ausdauernde in Deutschland häufige Pflanze.

Eine kurze, 1—2 Linien dicke Wurzel (Wurzelstock), zahlreiche dünne lange Wurzelzasern ausschickend, mit einer außen braunen, innen rothen Rinde und weißem Holze, frisch gesammelt und getrocknet mit einem gewürzhaften etwas nelkenartigen Geruche und Geschmacke begabt. Sie werde im ersten Frühlinge von trocknen Orten gesammelt, und nicht über ein Jahr aufbewahrt.

Geum urbanum Linn. Das gemeine Geum, Benedictenkraut.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 5. Pentagynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Diese Pflanze findet sich durch ganz Europa, und ist ziemlich gemein in Gebüschen, an Waldwegen und ungebauten Orten.

Die Wurzel, welche jung bloß faserig ist, bildet später einen ziemlich dicken Wurzelstock, welcher mit braunen, dünnen, trocknen Schuppen bedeckt und mit vielen Fasern versehen ist. Der aufrechte Stengel, welcher eine Höhe von 1—2 Fuß und drüber erreicht, ist eckig, etwas rauh und zottig, oben ästig, etwas vorwärts gebogen, und am Grunde gewöhnlich von braunröthlicher Farbe. Die Wurzelblätter sind gestielt und gefiedert. Sie bestehen aus 5, 7, 9 oder 11 eiförmigen, etwas zugespitzten Fiederblättchen; die untern Blättchenpaare sind kleiner, und die drei an der Spitze, besonders das vorderste Blättchen, größer als die übrigen. Die abwechselnden Stengelblätter sind dreizählig, oft tief dreitheilig oder gelappt, die obersten gewöhnlich einfach ungetheilt und lancettförmig. Die Afterblätter am Grunde der Blätter sind groß, stiellos, umfassend und eiförmig-rundlich.

Die kleinen, gewöhnlich aufrechten, gelben Blumen stehen einzeln an der Spitze auf langen, zottigen, runden Stielen. Der Kelch ist einblättrig, zehnspaltig, die Blumenkrone fünfblättrig, rosenförmig geöffnet.

Die Pflanze blüht vom Mai bis Juli.

Die Wurzel wird im April und Mai, zu der Zeit, wo sich die Blätter zu entwickeln beginnen, von trocknen und bergigen Standorten eingesammelt. Sie ist auswendig dunkelbräunlichroth, inwendig gelbweiß, gewöhnlich mit einem rothen Kern versehen, von der Dicke eines Pfeifenstiels bis zur Dicke des kleinen Fingers. An ihrer Hauptwurzel befinden sich viele lange spindelförmige Fasern. Sie hat, besonders im frischen Zustande, einen balsamischen, schwach nelkenartigen Geruch, und einen ähnlichen, zugleich etwas zusammenziehenden und herb bitterlichen Geschmack. Sie muß vorsichtig getrocknet und gut aufbewahrt werden, damit sie nicht ihre Kräfte verliere.

Eine Verwechselung mit den viel längern und brauner gefärbten Wurzeln des Wassergaraffels, Wasserbenedictenkrautes (**Geum rivale Linn.**) läßt sich auch leicht an dem gänzlichen Mangel des gewürzhaften Geruchs erkennen.

Bei der Destillation mit Wasser giebt die Nelkenwurzel nur wenige Tropfen dickliches ätherisches Oel, welches nach Rinnmann im Wasser zu Boden sinkt und angenehm nelkenartig riecht. Außer den harzigen und

schleimigen Theilen enthält sie auch vielen Gerbestoff, so daß sie zum Gerben gebraucht werden kann.

Nach Trommsdorff (N. J. II. 1. S. 53.) enthalten 1000 Th. der trocknen Wurzel: flüchtiges Oel, grünlichgelb, butterartig, mulstrig riechend, 0,39; fast geschmackloses Harz 40,00; eisenbläuenden Gerbestoff, in absolutem Weingeiste und Aether 100,00; Gerbestoff, in Wasser, nicht in Weingeiste, löslich 310,00; durch Natron ausgezogenen gummiartigen Stoff 158,00; durch Natron ausgezogenen bassorinartigen Stoff 92,00; Holzfaser 300,00. S. = 1000,39.

Die Wurzel gehört zu den tonischen und adstringirenden Mitteln, ist auch als Chinasurrogat empfohlen worden. Sie wird in der Abkochung, auch in der Pulverform gegeben. Bei Bereitung dieser letztern ist es zweckmäßig, die frisch gesammelte und sorgfältig getrocknete Wurzel sogleich zu pulvern und das Pulver in sorgfältig verschlossenen Gläsern aufzubewahren, wo es dann die kräftigste Form der Anwendung seyn wird. Man zieht zum Arzneigebrauche den dicken Theil der Wurzel vor.

In einem Säckchen ins Bier gehangen, soll die Wurzel demselben einen angenehmen Geschmack ertheilen, auch das Sauerwerden desselben verhüten.

Caryophylli. Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus Linn. seu Eugenia caryophyllata Thunbergii. Ein Baum Ostindiens, auf den molukkischen Inseln häufig.

Die Blüthenknospen mit dem viergezähnten Kelche, braunschwarz, von scharfem aufs höchste gewürzhaftem Geschmacke und sehr angenehmen Geruche.

Caryophyllus aromaticus Linn. Der Gewürznelkenbaum.
Eugenia caryophyllata Thunb.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 7. Myrti.

Dieser schöne und zierliche Baum, den Rumpf „arbor omnium praestantissima, elegantissima et pretiosissima“ nennt, ist ursprünglich auf den molukkischen Inseln, und zwar besonders auf der kleinen Insel Makian einheimisch, von wo er zuerst auf andere ostindische Inseln, besonders Amboina verpflanzt wurde und später auch nach der Insel Bourbon, Mauritius, nach den Antillen und Cajenne gelangte, wo er aber eine sorgfältige Cultur fodert. Nach Rumpf's Berichte erlangt der Baum unter günstigen Umständen ein Alter von hundert Jahren.

Der Stamm erreicht die Höhe unserer Kirschbäume; seine Aeste, die schon in einer geringen Entfernung vom Boden entspringen, bilden eine immergrüne, pyramidenförmige, mit unzähligen schönen rosenfarbenen Blüthen geschmückte Krone; seine Wurzeln gehen gerade und sehr tief in den Boden. Die dünne glatte Rinde hängt dem schweren und dichten Holze fest an, sie

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0231-9

ist an den jungen Zweigen von graulichweißer Farbe. Die Blätter sind entgegengesetzt, länglich-lancettförmig, auf der obern Seite dunkelgrün, glänzend, auf der untern aber blässer grün, 3—4 Zoll lang und 10—15 Linien breit. Die Blüthen bilden dreitheilige Doldentrauben an der Spitze der Aeste. Die Kelche sind länglich, trichterförmig, an der Spitze in eine viereckige Scheibe erweitert, und mit vier kleinen Kelchzähnen besetzt, im Anfang grün, später roth. Die Blumenkrone besteht aus vier kleinen abgerundeten, concaven, hinfälligen, blaß rosenrothen Blumenblättern, die vor dem Aufblühen eine kopfförmige Knospe bilden. Die zahlreichen Staubfäden entspringen aus dem Kelche; sie sind länger als die Blumenblätter, an der Basis breiter, glatt, weiß; die Antheren sind oval, blaßgelb. Der längliche Fruchtknoten ist von dem Kelchrohre umgeben, welches mit ihm verwächst. Die Blüthen verbreiten einen sehr angenehmen durchdringenden Geruch, den sie auch nach dem Trocknen beibehalten. Die Frucht ist eine ovale, trockne, einsaamige Beerenfrucht.

Alle Theile dieses Baumes sind ausnehmend gewürzhaft, was aber bei den noch nicht entfalteten Blüthenknospen am hervorstechendsten ist. Diese werden daher sorgfältig gesammelt, und theils an der Sonne, gewöhnlich aber durch Rauch getrocknet, nachdem sie vorher in heißes Wasser getaucht worden; die Ernte fällt in die Monate October bis December. Es sind dies die bekannten Gewürznelken, Gewürznägelein. Ihr oberer Theil besteht aus den vier noch geschlossenen Blumenblättern, die eine Art von Kopf bilden, welcher leicht abfällt; unter dem gleichfalls vierblättrigen Kelche befindet sich der Fruchtknoten, der von dem Kelche eingeschlossen wird, welcher sich in eine lange Kelchröhre endigt, so daß das Ganze die Gestalt eines kleinen Nagels annimmt. Gute Gewürznelken haben eine dunkel rothbraune Farbe, sind auf dem Bruche rothbraun, leicht zerbrechlich, indem nur die äußere Rinde Widerstand leistet, und geben mit den Fingern gedrückt Oeltheilchen aus; ihr Geruch ist stark, eigenthümlich, angenehm, balsamisch, der Geschmack brennend gewürzhaft, etwas bitterlich scharf, auf der Zunge anhaltend.

Die vorzüglichsten Gewürznelken sind die molukkischen, die auf einem höchst dürren, heißen und beinahe verbrannten Boden wachsen; die cajennischen ꝛc., welche schlanker, spitziger, trockner und weniger gewürzhaft sind, werden weniger geschätzt.

Von neun-, zehn- bis zwölfjährigen Bäumen werden jährlich 400—500 Pfund Gewürznelken erhalten, und da jene ein Alter von 50, 100 bis 150 Jahren erreichen, so giebt es Bäume, die 1100 Pfund tragen.

Eine häufige Verfälschung der Gewürznelken geschieht durch Beimischung solcher, von denen das ätherische Oel abdestillirt ist, wie schon Boerhaave bemerkt hat. Am äußern Ansehen kann man sie kaum unterscheiden, und wenn sie lange zwischen andern guten Gewürznelken gelegen haben, so ziehen sie aus diesen selbst wieder ätherisches Oel an. Indessen lassen sie sich durch das mangelnde ätherische Oel beim Drucke mit den Fingern oder beim Stoßen

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0232-5

erkennen. Grobe Betrügereien durch nachgekünstelte Kreidenelken sind zu leicht zu entdecken, als daß sie noch vorkommen sollten.

Trommsdorff (J. XXIII. 2. S. 23.) erhielt aus 1000 Gran Kreidenelken durch ein erstes Abziehen von 32 Unzen Wasser 100 Gran Oel, das vollkommen weiß war. Das abgesonderte Wasser wurde nochmals über den Rückstand abdestillirt, wodurch noch 60 Gran Oel erhalten wurden. Dieses Oel war ungefärbt wie Wasser, wurde aber dem Lichte ausgesetzt bald gelblich, wie man es auch gewöhnlich erhält, besaß den Geruch der Gewürznelken, und einen hitzigen, angenehmen Geschmack, der aber bei weitem nicht so scharf war, wie der des Oeles, welches, von dunkler Farbe, sonst durch den Handel aus Holland bezogen wurde.

Das von der Destillation rückständige Decoct roch angenehm, aber durchaus nicht mehr nelkenartig, und war gelbbraun. Nach völligem Erschöpfen dnrch neunmal wiederholtes Auskochen betrug der getrocknete Rückstand 360 Theile. Er war hellbraun, fest zusammengebacken, ohne Geruch und ohne Geschmack. Die Decocte, welche ganz durchsichtig und hell waren, wurden nun bei sehr gelinder Wärme bis auf 8 Unzen abgedampft. Nach dem Erkalten setzte sich ein brauner Bodensatz ab, der abgespühlt und getrocknet 40 Gran wog, glänzend schwarz aussah, einen bitterlich gewürzhaften Geschmack wie Nelkenrinde, keinen Geruch hatte, sich nicht in Alkohol und Aether, aber in wäßrigem Weingeiste und Wasser vermittelst der Wärme vollkommen auflöste, Lackmuspapier etwas röthete, die Eisenauflösungen schwärzlich färbte, mit der Leimauflösung nur eine sehr geringe Trübung gab, und sich wie ein Extractivstoff mit etwas Gerbestoff verbunden verhielt. Die Flüssigkeit, aus der jener Stoff sich abgeschieden hatte, wurde zur Syrupsdicke abgeraucht, wobei sie klar blieb, und aus der, durch Zusatz von Alkohol, eine klümprige Masse abgesondert, diese auf einem Filtro gesammelt und noch mit Alkohol ausgewaschen wurde. Dieser Stoff wog nach dem Trocknen 130 Gran, stellte zerrieben ein blaßgrünes Pulver dar, hatte einen schwach zusammenziehenden, aber auch schleimigen, nicht bitterlichen Geschmack, und zeigte sich als eine Verbindung von Gummi mit etwas Gerbestoff.

Was der Alkohol aufgenommen hatte, war eine glänzende dunkelbraune Masse, 130 Gran an Gewicht, von zusammenziehendem, bitterlichem, etwas gewürzhaftem und säuerlichem Geschmacke, die im Alkohol selbst beim Sieden nicht, in heißem Wasser und wäßrigem Weingeiste aber leicht auflöslich war, Lackmustinctur röthete, von Leimauflösung reichlich niedergeschlagen, von Eisenauflösungen in eine dicke Tinte verwandelt wurde, und sich wie Gerbestoff verhielt, der jedoch vom Gerbestoffe der Galläpfel etwas verschieden ist.

Aus dem Kreidenelkenrückstande von der Destillation wurde nun durch Alkohol ein gelbes Harz abgeschieden, das bröcklich war, in der Wärme leicht zu einem zähen braunen Harze zusammenfloß, über glühenden Kohlen erhitzt einen angenehmen Geruch verbreitete, und eine voluminöse Kohle hinterließ, mit Alkohol eine gelbe fast geschmacklose Tinctur gab, und sich in Aether, Terpenthinöl und fetten Oelen in der Hitze leicht auflöste.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0233-1

Der Rückstand von der Behandlung mit Alkohol war hellgrau, theilte dem Aether, der ätzenden Kalilauge nichts (?) mit, verbrannte mit Glimmer und war der holzige Theil der Gewürznelken.

1000 Th. Gewürznelken sind nach dieser Analyse zusammengesetzt aus: ätherischem Oele 180; schwerauflöslichem Extractivstoffe mit etwas Gerbestoffe verbunden 40; Gerbestoffe eigner Art 130; Gummi oder Pflanzenschleime 130; eigenthümlichem Harze 60; Pflanzenfaser 280; Feuchtigkeit 180.

Der scharfe Geschmack und das Aromatische der Gewürznelken ist einzig und allein von dem ätherischen Oele, nicht aber vom Harze herzuleiten. Indessen hat die geistige Tinctur einen sehr brennenden Geschmack, und Trommsdorff meint, daß das Oel vielleicht durch den Gerbestoff mehr fixirt werde, und daß der Eindruck, den das Adstringens zugleich auf die Zunge macht, den Geschmack des Oels erhöhe.

Baget und Lodibert (Trommsd. N. J. 1825. XI. 1. S. 108.) haben bei den molukkischen Gewürznelken einen krystallinischen Anflug auf der Oberfläche des Kelches und den Blumenblättern gefunden, welcher durch Abspühlen mit Alkohol getrennt wurde. Bonastre (Ebend. S. 113.) bemerkt, daß die bourbonischen Gewürznelken viel weniger von diesem Stoffe, und die aus Cajenne gar nichts davon enthalten. Man könne daraus schließen, daß das Klima des Landes, wo die Nelkenbäume vorkommen, auf die Bildung dieser Substanz viel Einfluß habe, da die Länder, wo das Klima warm und trocken ist, viel davon geben, während die Nelkenbäume in Cajenne, wo das Klima warm aber feucht ist, nichts enthalten. Diese Substanz hat man als eine eigenthümliche mit dem Namen Caryophyllin bezeichnet. Dieses ist weiß, glänzend, seidenartig, und zeigt als regelmäßige Form runde Krystallgruppen von strahlenförmig auslaufenden, sich durchkreuzenden Krystallen. Von Oele befreit ist es geruch- und geschmacklos; es ist etwas rauh anzufühlen, jedoch nicht spröde, und ist trocken, wie das Unterharz, das Elemi, Alouchi ꝛc. Es löst sich bloß in kochendem Alkohol und Aether auf; kaustische Alkalien lösen wenig davon auf, auch ist es wahrscheinlich, daß es noch etwas auflösliches Harz enthält. Concentrirte Schwefelsäure färbt es feuerroth, dann etwas schwarz. Der Wärme ausgesetzt schmilzt es wie die Harze und verdampft, wobei es an den Rändern des Gefäßes verworrene, nadelförmige, außerordentlich zarte, sehr weiße Krystalle absetzt, also sublimirbar zu seyn scheint. Bonastre stellt das Caryophyllin zu der Classe der Unterharze, d. h. zu jenen Bildungstheilen, welche hinsichtlich ihrer chemischen Eigenschaften die Uebergangskette zwischen Alkaloid und Harz behaupten. (Sollte es sich nicht eher an die ätherischen Oele anschließen? D.)

Lodibert erhielt aus denselben Nelken, welche das Caryophyllin enthalten, ein fettes, scharfes, aromatisches, grünes Oel. Nach Bonastre (Trommsd. N. J. XII. 1. S. 195.) enthalten die Gewürznelken: Caryophyllin; ätherisches Oel; eine Säure, wahrscheinlich Gallussäure, weil sie mit einer Art Tannin verbunden ist, und die Eisensalze blau färbt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0234-7

Die Gewürznelken machen als ein erwärmendes, nervenstärkendes Mittel einen Bestandtheil mehrerer zusammengesetzten Arzneien aus, z. B. der Gewürztinctur, des Theriaks, der aromatischen Kräuter, des aromatischen Pflasters u. s. w.

Werden die Blumenkelche nicht vor Entwickelung der Blüthe abgepflückt, so wächst der Fruchtknoten allmälig größer, bis er endlich in einigen Wochen seine Vollkommenheit erhält, da er dann einen Zoll lang, in der Mitte bauchig, an beiden Seiten schmal zugehend wird, und unter einer dunkelbraunen dünnen Bedeckung einen schwarzen glänzenden Saamen enthält, der durch einen gebogenen Einschnitt der Länge nach in zwei Theile getheilt ist. Diese Früchte sind die sogenannten Mutternelken (Antophylli), die einen nicht so starken gewürzhaften Geschmack, als die Kreidenelken haben. In den Antophyllen hat Bollaert (Schw. N. J. XII. 1. S. 122.) Krystalle von Benzoësäure beobachtet, welche in der Höhlung zwischen der Schale und dem Kerne liegen.

Caryophylli. Das Oel. Nelkenöl.

Wird in Ostindien aus Kreidenelken durch Destillation bereitet.

Ein dickliches ätherisches Oel, frisch gelblich, hernach in eine braune Farbe übergehend, von brennendem gewürzhaftem Geschmacke. Spec. Gew. = 1,030 — 1,036.

Dieses im Wasser niedersinkende Oel muß einen reinen, starken, angenehmen Geruch, und stark erwärmenden, nicht allzu hitzigen, noch scharfen fressenden Geschmack haben. Es muß in Alkohol auflöslich seyn, auf Papier keinen Fettfleck hinterlassen, und mit rauchender Salpetersäure sich augenblicklich entzünden. Es kam sonst mit der geistigen Tinctur der Kreidenelken verfälscht vor, und hatte eine sehr braune Farbe. Das verminderte specifische Gewicht und die Auflöslichkeit des Weingeistes in Wasser, von dem man ein gleiches Gewicht zu dem Oele setzt, lassen die Verfälschung leicht erkennen. Das englische Nelkenöl soll mit in Alkohol aufgelöstem Ricinusöle verfälscht seyn, welches aber bei der Rectification des Nelkenöles im Rückstande bleibt, auch die Mischung mit Wasser milchig macht.

Das Nelkenöl gehörte früher zu den theurern Oelen, und erst seit der Zeit, wo man bemüht gewesen ist, den Nelkenbaum auf dem Continente Amerikas zu cultiviren, ist dasselbe im Preise gefallen, und steht jetzt gegen früher niedrig. Allein nach Martius's Angabe wird eine sehr beträchtliche Menge Nelkenöl nicht aus den Gewürznelken selbst, sondern aus dem sogenannten Nelkenholze (den Nelkenstielen) dargestellt, dessen Preis mit den Nelken selbst in gar keinem Verhältnisse steht, und das an Oele sehr ergiebig ist. Es sind die Blüthenstiele.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0235-2

Cascarilla. Die Rinde. Cascarillrinde.

Croton Eluteria Swartzii. Ein in Jamaika und andern Gegenden des wärmeren Amerikas einheimischer Strauch.

Eine am häufigsten zusammengerollte oder rinnenförmige Rinde, außen aschgrau, innen bräunlich-rostfarben, zerbrechlich mit ebenem glänzendem Bruche, von scharfem bitterm Geschmacke, auf Kohlen geworfen einen angenehmen Geruch verbreitend.

Croton Eluteria Sw. Wohlriechendes Croton.
Clutia Eluteria Linn.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Von diesem Gewächse leitet Wright die officinelle Cascarillrinde her, als deren Mutterpflanze sonst **Croton Cascarilla**, Cascarillcroton, angegeben wurde. Die Rinde dieser letztern Crotonart soll nach Wright weder den Geruch noch den Geschmack der Cascarillrinde haben, welche nur von **C. Eluteria** herkommen soll. Es mögen indessen die Rinden der verwandten Crotonarten der ächten Cascarille sehr nahe kommen, und bisweilen damit verwechselt werden.

Der baumartige Stamm des wohlriechenden Croton ist mit abwechselnden, gestielten, eiförmig zugespitzten, ganzrandigen Blättern besetzt. Sie sind glatt und nur auf der untern Seite mit kleinen silberfarbenen Schuppen bedeckt. Die Blüthen stehen in zusammengesetzten Trauben, und riechen beifußartig.

Der Cascarillcroton ist ein kaum 5—6 Fuß über den Boden sich erhebender Strauch mit holzigem, walzenrundem, in zahlreiche mit aschgrauer Rinde überzogene Aeste getheiltem Stamme. Die jüngern Zweige, so wie die Oberseite der Blätter, sind mit kleinen, kleienartigen, sternförmigen Schuppen von weißlichgelber Farbe bestreut. Die Blätter abwechselnd, ziemlich kurz gestielt, lancettförmig, ganzrandig, spitz, am Rande etwas gewellt, ungefähr 2 Zoll lang und kaum 4—6 Linien breit. Die unscheinbaren, grünlichen, einhäusigen Blüthen bilden am äußern Theile der Aeste verlängerte Aehren, deren Basis aus weiblichen Blüthen, die obere Hälfte aus männlichen besteht.

Wir erhalten die Cascarillrinde in 3—4 Zoll langen, $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll starken zusammengerollten Stücken, die fest, schwer, äußerlich weißlich aschgrau, mit einer runzligen Oberhaut überzogen, mit Querstrichen bezeichnet, und hin und wieder mit Flechten besetzt, inwendig bräunlich-rostfarben sind. Das Pulver hat eine bräunlich-graue Farbe.

Trommsdorff (J. III. 2. S. 113.) erhielt aus einem Pfunde Rinde bei der Destillation mit schon über andere Cascarillrinde abgezogenem Wasser 68 Gran, also etwa $\frac{1}{120}$, eines grünlichen Oels von 0,938 spec. Gew. bei 20 ° R., von dem stärksten Geruche der Rinde. Von Salpetersäure wird

es in ein hellgelbes angenehm riechendes Harz verwandelt. Weingeist über Cascarillrinde abgezogen, nimmt es nicht mit sich hinüber.

Der kalt bereitete wäßrige Auszug der Rinde ist bräunlichgelb, von dem angenehmen Geruche der Rinde und ihrem Geschmacke. Schwefelsaure Eisenauflösung macht die Farbe dunkler, und ist der Aufguß sehr verdünnt, so wird die Farbe dadurch braunroth; Kalkwasser und Brechweinsteinauflösung erzeugen keinen Niederschlag. Die Abkochung hat eine dunkel braunrothe Farbe, und den Geruch und Geschmack der Rinde. Um alle extractiven Theile auszuziehen, sind mehrfache Abkochungen erfoderlich. Von 8 Unzen Rinde erhielt Trommsdorff durch 7 Abkochungen 2 Unzen 3 Quentchen zerreiblich trocknes Extract von dunkel rothbrauner Farbe und von angenehmen, gewürzhaft bitterm, aber nicht zusammenziehendem Geschmacke. Dieses Extract durch Alkohol ausgezogen, gab eine dunkelrothe Tinctur von einem balsamischen, aber wenig bitterm Geschmacke; zugesetztes Wasser machte sie sogleich milchig. Nachdem der Weingeist abgezogen war, blieben 6 Quentchen eines dunkel rothbraunen Harzes zurück von balsamischem, wenig bitterm, nicht zusammenziehendem Geschmacke, das auf Kohlen einen angenehmen Geruch verbreitete. Die wäßrige Auflösung, in welcher dieses Harz schwamm, hatte den durch Alkohol mit ausgezogenen geringen Antheil von Extractivstoff zurückbehalten.

Der Rückstand des wäßrigen Extracts nach der Ausziehung durch Alkohol war trocken, zerreiblich, von einem ziemlich bittern, aber nicht balsamischen Geschmacke. Seine Auflösung in Wasser röthete die Lackmustinctur nicht, und wurde durch Eisenauflösungen und Galläpfeltinctur nicht verändert. Salpetersäure verwandelte es durch Abziehen darüber in reine Kleesäure. Bei der trocknen Destillation gab es kein Ammoniak, und war eine Verbindung von Schleim und bitterm Extractivstoffe.

Aus der nach den Abkochungen rückständigen Rinde wurde durch Behandeln mit Alkohol und Abziehen desselben ein sehr brüchiges, in kaltem Alkohol etwas schwer lösliches Harz von gewürzhaftem, kaum bitterlichem Geschmacke erhalten.

Die so erschöpfte Rinde wurde einer trocknen Destillation unterworfen, welche die gewöhnlichen Producte gab, und deren Kohle eine weiße Asche lieferte, die aus kohlens. Kali, Kalk und Talk, schwefels. Kali und ziemlich viel Braunsteinoxyd bestand.

Dieser Analyse zufolge enthalten 8 Unzen Rinde: Schleim und bittern Extractivstoff mit einer Spur von salzs. Kali 1 U. 4 Qt.; Harz 1 U. 1 Qt. 40 Gr.; wesentliches Oel 1 Qt. 8 Gr.; holzigen Rückstand 5 U. 2 Qt. S. = 8 Unzen 48 Gran.

Brandes (Berl. Jahrb. XXIII. S. 360.) erwähnt eines in der Cascarillrinde neu entdeckten Alkaloids, worüber jedoch später nichts bekannt geworden ist.

Die Cascarillrinde wird am besten in der Abkochung, oder im Extract, so wie in Pulverform, verordnet, auch der Weingeist zieht eine kräftige Tinctur

aus. Mehrere Aerzte stellen sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit gegen Wechselfieber und Durchfälle der China an die Seite.

Unter den Tabak wird sie gemischt, um demselben einen angenehmen Geruch zu ertheilen; in zu großer Menge ist sie aber betäubend.

Pfaff erwähnt einer im Handel vorkommenden von der gewöhnlichen Cascarillrinde sehr verschiedenen Rinde. Sie hat, nach ihm, die größte Aehnlichkeit mit einer Weidenrinde, bildet ganz dünne, biegsame, außen grünliche, innen mehr weiße, nur an den Rändern etwas umgerollte Rindenstücke von einem sehr kräftigen Cascarillgeschmacke. Sollte sie etwa die Rinde der ganz dünnen Zweige seyn?

Cassia cinnamomea. Zimmtcassia.

Laurus Cassia Linn. Ein Baum Ostindiens.

Die innere Rinde der Aeste, durch gewürzhaften Geruch und Geschmack dem wahren Zimmt zwar nahekommend, durch eine mehr gesättigte Farbe, durch Dicke und schärfern Geschmack aber zu unterscheiden.

Laurus Cassia Linn. Cassienlorbeer, Zimmtsortenlorbeer.
Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 4. Laurineae.

Das Vaterland des Cassienlorbeers ist Malabar, China, Cochinchina und vielleicht auch Sumatra. Dieser Baum erreicht eine Höhe von 12, 20 bis 25 Fuß, und ist oft kaum mit einem Arme zu umfassen. Er ist dem wahren Zimmtbaume (**Laurus Cinnamomum**) sehr ähnlich, und nach Thunberg d. A. bloß eine Varietät desselben. Nach oben bedeckt ihn eine graulichе, glatte, nach unten eine graubraune rissige Rinde. Die ihrer Schwere wegen weit herabhängenden Blätter sind öfter abwechselnd, als gegenüberstehend, kurz und dick gestielt, 5—9 Zoll lang und bis 3 Zoll breit, länglich stumpf, ganzrandig, hart, glänzend, oben sattgrün, unten graugrün, dreifach nervig. Die weißlichen, äußerlich behaarten Blüthen stehen auf traubenartigen kurzen Rispen, welche aus den Achseln der obern Blätter hervorkommen.

Dieser Baum blüht das ganze Jahr hindurch.

Die Zimmtcassia, Zimmtsorte, sinesischer Zimmt (**Cinnamomum indicum s. sinense**) ist die innere Rinde der Aeste, und hat mit der ächten Zimmtrinde in Ansehung des Geruches und Geschmackes sehr viel Aehnlichkeit. Wir erhalten sie durch die Engländer in pfundschweren, ¾ Ellen langen, an beiden Enden und in der Mitte zusammengebundenen Bündchen. Sie ist mit in der Länge theils gerade durchlaufenden, theils gewundenen, hellfarbigen Adern bezeichnet, von ebenem blässerm Bruche, bald in halbliniendicke platte Röhren zusammengerollt, bald in stärkern, über eine Linie dicken und 5—6 Linien breiten, platten Stücken. Sie behält ihren eigenthümlichen Geschmack und Geruch länger, läßt sich aber nicht zu einem so

feinen Pulver als der ächte Zimmt bringen. Bei der Destillation liefert sie über doppelt so viel ätherisches Oel, als der ächte Zimmt, welcher in einem bedeutend höhern Preise steht.

Diese Zimmtsorte wird bisweilen mit dem Mutterzimmt (Cassia lignea), der Rinde des in Ostindien, vorzüglich in Malabar wachsenden Mutterzimmtlorbeers (Laurus Malabathrum Lam.) verwechselt. Diese Rinde besteht, wie die Zimmtsorte, aus röhrigen und platten, auf frischem Bruche glatten, nicht faserigen Stücken, die sich auch durch ihre dunklere Farbe, rauhere Oberfläche, ihren weit schwächern Geruch und Geschmack, und vorzüglich durch den vielen Schleim, den sie beim Kauen und Kochen mit Wasser geben, unterscheiden. Der Aufguß oder Absud des Pulvers mit kochendem Wasser erkaltet zur Gallerte. Bei der Destillation erhält man zwar ein milchiges Wasser, aber es soll sich davon kein Oel absondern lassen. Es kommen davon im Handel verschiedene Sorten vor, die sich durch ihre größere und geringere Güte unterscheiden.

Von der Zimmtcassia hat Bucholz (Taschenb. 1814. S. 1.) eine sehr sorgfältige Analyse geliefert. Aus 1000 Gran Cassia wurden durch Destillation 8 Gran eines völlig ungefärbten und wasserhellen ätherischen Oels vom feinsten Zimmtgeruch und Geschmack gewonnen. Die rückständige, hellgelbbraun aussehende Flüssigkeit schmeckte fade, kaum merklich zimmtartig, doch roch sie noch stark darnach. Beim Abrauchen derselben bildete sich fortwährend eine Schleimhaut. Die rückständige gummige Materie war dunkel gelbbraun, auf der Oberfläche und dem Bruche glänzend, spröde, löste sich auf der Zunge bis auf einen kleinen Rückstand leicht auf, schmeckte dabei anfangs mild, beinahe wie arabisches Gummi, hintennach kaum merklich zusammenziehend und gewürzhaft, roch nur höchst schwach nach Zimmt, löste sich auch in 30fachem Gewicht Wasser nicht vollständig auf, sondern hinterließ $\frac{1}{8}$ unaufgelöst, woraus der Alkohol etwas Harziges aufnahm, und wovon endlich ein Theil in einem etwas aufgequollenen Zustande zurückblieb. Aus der Auflösung des vom Wasser aufgenommenen gummigen Extractivstoffes sonderte salzsaures Eisen einen grünlichbraunen Niederschlag ab.

Der Rindenrückstand gab nunmehr mit Alkohol ausgezogen einen wie ächte Zimmttinctur gefärbten Auszug, der aber nicht süß und brennend, wie diese, sondern eigenthümlich gewürzhaft und schwach zusammenziehend schmeckte. Nach völliger Erschöpfung der Rinde wurde der Weingeist mit einem Zusatze von Wasser aus einer Retorte abgezogen, der merklich nach Zimmt roch und schmeckte. Das trübe Gemisch wurde, da sich auch bei großer Concentrirung desselben nichts Harziges abscheiden wollte, bis zur Trockne abgeraucht, und durch wiederholtes Ausziehen mit kaltem Wasser in einen in diesem löslichen Theil und in Harz getrennt. Dieses sah dunkel gelbbraun aus, war ohne Glanz, von der Consistenz des grünen Harzwachses, und roch auch wie dieses mit einer kaum merklichen Beimischung von Zimmtgeruche, war ohne merklichen Geschmack, in verdünnter Aetzlauge mit Hülfe der Wärme, so wie in Alkohol und Aether vollkommen und leicht auflöslich. Die Auf-

lösung in Alkohol gab auf den Zusatz von vielem Wasser eine opalisirende, blaß leberfarbene, ins Violette spielende Mischung, aus welcher oxydirtes salzsaures Eisen einen gelbbraunen Niederschlag fällte.

Der Rindenrückstand von der Alkoholausziehung wurde nun noch stark und wiederholt ausgekocht. Die erste Abkochung war milchig, ins Braungelbe spielend, kaum noch zimmtartig schmeckend und riechend, die letzte war ganz ohne Geruch und Geschmack. Sie hinterließen abgeraucht einen gummigen Rückstand.

Die auf diese Art völlig erschöpfte Rinde, die auch dem Aether nichts mehr abgab, sah dunkel zimmtbraun, ins Graue fallend, aus; feucht ließ sie sich zwischen den Fingern leicht zerreiben, und fühlte sich dabei etwas schlüpfrig an; durchs Trocknen erhielt sie eine größere Härte, als vor dieser Behandlung. Verdünnte Aetzkalilauge nahm einen ansehnlichen Theil des mit der Holzfaser innig verbundenen färbenden Princips auf. In der Asche der Rinde fand sich viel Manganoxyd, und kaum eine Spur von kohlensaurem Kalke.

Dieser Analyse zufolge enthalten 1000 Th. der Zimmtcassia: ätherisches Oel 8; eigenthümliches Harz 40; besondern gummigen Extractivstoff 146; braungefärbten Rückstand tragantartiger Natur, und Holzfaser 643; Verlust, der wahrscheinlich in Feuchtigkeit (aber auch in ätherischem Oele, dessen Menge zu gering angesetzt wird) bestand, 163. S. = 1000.

Buchner (Repert. VI. S. 1.) erhielt aus einer Zimmtcassie, die etwas blässer, mehr gelb war, eine glättere Oberfläche, ebenern Bruch, größere Feinheit der Röhren und schärfern Geschmack als die gewöhnliche hatte, ein milchiges Zimmtwasser, aus dem sich kein Oel absetzte, das aber nach einigen Wochen eine weiße Substanz in glänzenden Nadeln absetzen ließ, die zwar einen zimmtähnlichen Geruch und reizenden Geschmack hatte, aber bei genauerer Untersuchung sich als Benzoësäure zeigte, die ihren Geruch und Geschmack den anhängenden Oeltheilchen zu verdanken hatte. Auch das Wasser reagirte noch sauer.

Die Zimmtcassia wird in Pulverform zur Bereitung der pharmaceutischen Präparate gebraucht.

* Cassia cinnamomea. Die Blüthen. Zimmtblüthen.

Die Zimmtblüthen wurden bald von **Laurus Cinnamomum**, bald von **L. Cassia** hergeleitet; die Gebrüder Nees v. Esenbeck halten es aber für wahrscheinlich, daß sie von **L. Malabathrum** kommen. Soviel läßt sich mit Gewißheit angeben, daß die sogenannten Zimmtblüthen die unreifen Früchte einer ostindischen, aber höchst wahrscheinlich nicht auf Ceilon vorkommenden Art von **Laurus** sind. Man hat dieselben für die unentwickelten von dem Kelche eingeschlossenen Blüthenknospen, den Kreidenelken ähnlich, gehalten, aber man findet im Innern des Kelchs die kleine, mehr oder weniger entwickelte Frucht.

Die Zimmtblüthen, wie sie im Handel zu uns kommen, sind von braun-

rother oder dunkelbrauner Farbe, und bestehen aus einem mehr oder weniger geöffneten oder kugelrunden, gerunzelten, festen Kelche, welcher sich allmälig bis zum Blumenstiele, der gewöhnlich noch gegenwärtig ist, verschmälert, und in seinem Innern die kleine Frucht, welche bitterlich, kugelrund, oben gelbröthlich und glatt, unten braun und runzlig ist, enthält. Geruch und Geschmack sind der Zimmtcassia ähnlich, doch ist der letztere minder zusammenziehend.

Ihr Pulver ist etwas dunkler als das des ächten Zimmts und selbst der Zimmtcassia. Man vermischt sie mit solchen, von welchen das ätherische Oel schon abdestillirt ist, die zwar in Farbe und Gestalt der ächten gleich kommen, aber fast ohne allen Geruch und Geschmack sind.

Mit Wasser destillirt geben sie ein milchiges, stark zimmtartig riechendes und schmeckendes Wasser, und ein Oel, welches die größte Aehnlichkeit mit dem Zimmtöle hat. Der wäßrige Aufguß ist gelblichroth, von Zimmtgeruche und einem süßlich aromatischen Geschmacke ohne alles Herbe. Die geistige Tinctur ist dunkel braunroth, von scharfem, etwas herbem Geschmacke, und hat den eigenthümlichen Zimmtgeruch.

Die Zimmtblüthen werden wegen ihres größern Oelgehaltes bisweilen zur Bereitung des Zimmtwassers gebraucht, welches dann einen schärfern Geschmack hat.

Th. Martius giebt als Ursache der jetzt im Handel vorkommenden schlechten Zimmtblüthen an, daß eine Sorte aus England gebracht werde, die nicht etwa bloß des ätherischen Oeles durch Destillation beraubt, sondern die gar keine Zimmtblüthen, vielmehr höchst wahrscheinlich die noch geschlossenen Kelche einer **Myrtus** sind, daher ihr Geruch unbedeutend pimentartig, und der Geschmack schwach cubebenartig bitterlich ist. Sie sind nicht so runzlig wie die ächten.

Cassia cinnamomea. Das Oel. Zimmtcassienöl.

Wird in Ostindien aus der Zimmtcassia durch Destillation bereitet.

Ein gelbes, hernach in die braune Farbe übergehendes ätherisches Oel, von angenehmen Geruche, süßem brennendem Geschmacke, schwerer als Wasser. Spec. Gew. = 1,071. Verwerflich ist das dünnere, aus den Zimmtblüthen destillirte Oel von weniger gesättigter Farbe und weniger angenehmen Geruche.

Dieses ätherische Oel hat den Zimmtgeruch in einem sehr hohen Grade, und einen sehr feurigen, scharfen Geschmack, doch mit einer bestimmten Süßigkeit. Ein sehr dunkel braunrothes Oel ist der Verfälschung mit Zimmttinctur verdächtig, was durch Mischen mit einem gleichen Gewichte Wasser, welches den Weingeist aufnimmt und die Mischung milchig macht, entdeckt wird. Nach Margueron gerinnt das Zimmtcassienöl bei einer künstlichen Kälte zu einem Klumpen, bei — 4 ° R. nimmt es aber seinen flüssigen Zu-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0241-5

stand wieder an, und ist nicht verändert. Slare bemerkte zuerst, daß in einem von ihm aufbewahrten Zimmtöle nach etwa 12 Jahren sich auf dem Boden allmälig etwas Krystallinisches abgesetzt hatte, dessen Menge mit jedem Jahre zugenommen. Es ist dieses das durch den Sauerstoff der Luft verdickte und in eine campherartige Substanz verwandelte ätherische Oel mit Benzoësäure (Du Menil in Schw. J. XXI. S. 224. u. Buchner Repert. VI. S. 1.), wie man dieses bei vielen ätherischen Oelen beobachtete.

Nach Göbel's Analyse besteht das Zimmtcassienöl aus 76,7 Kohlenstoff, 9,7 Wasserstoff und 13,6 Sauerstoff.

Castoreum. Bibergeil.

Castor Fiber Linn. Ein in Europa und im nördlichen Asien vorzüglich an den Ufern der Flüsse wohnendes Thier.

Eine animalische Substanz, frisch weichlich, gelb, ausgetrocknet fest, zerreiblich, bräunlich, mit dünnern Häutchen durchwebt, von eigenthümlichem widerlichem Geruche, von schärflichem bitterlichem Geschmacke, in zwischen dem After und den Geschlechtstheilen befindlichen Beuteln abgesondert. Es wird aus Rußland, auch aus Polen, Preußen oder Deutschland gebracht, in diesen fast kugelrunden Beuteln, von der Größe eines Hühnereies oder größer, getrocknet lederartig, in der Mitte hohl, braunschwarz. Es muß nicht vermengt werden mit dem weiter unten zu beschreibenden canadischen Bibergeile.

Castor Fiber Linn. Der Biber.

Er gehört zu den Nagethieren, und bewohnt mit mehreren gemeinschaftlich die öden Gegenden Sibiriens und Canadas. Man trifft auch in Rußland, Polen, Deutschland und Frankreich Biber an, sie haben aber in diesen Ländern keinen festen Aufenthalt, leben einsam und äußern jene gepriesene Kunstfertigkeit nicht, welche sie ohne Zweifel bei einem ruhigern Leben eben so gut entwickeln könnten, wie im Norden von Asien und Amerika. Dort leben die Biber den Sommer über einsam in Höhlen, welche sie sich in der Nähe der Flüsse in die Erde graben. Gegen den Winter versammeln sie sich aber in Haufen von 2—300, und suchen sich einen schicklichen Platz aus, um daselbst ihren gemeinschaftlichen Wohnsitz aufzuschlagen. Dieses geschieht immer gegen das Ufer hin in einem See oder Flusse, welcher so tief ist, daß er nicht bis auf den Grund zugefriert. Wenn es ein ruhiges stehendes Wasser ist, so errichten sie ohne weiteres ihre Wohnungen an dem Ufer; wenn es hingegen ein fließendes Wasser ist, welches zuweilen anschwillt, so führen sie vor allen Dingen querdurch einen starken Damm aus Baumstämmen, Zweigen, Steinen und gekneteter Erde auf, welches alles mit einem festen Ueberzuge überworfen wird. Dieser Damm steht immer

senkrecht gegen den Lauf des Flusses, und hat gegen die Strömung eine starke Böschung, so daß derselbe oben höchstens 2 Fuß im Querdurchmesser hat, auf dem Grunde aber 10—12 Fuß dick ist, wodurch er eine große Festigkeit erhält. Sobald der Damm fertig ist, bauen die Biber ihre Wohnungen darauf, welche aus den nämlichen Materialien bestehen, und mehrere Stockwerke enthalten, die groß genug sind, um 8—10 von ihnen aufzunehmen. Alle diese Arbeiten werden bloß des Nachts vorgenommen, und gehen mit erstaunenswürdiger Schnelligkeit vor sich, und doch haben die Biber keine andern Werkzeuge, als ihre Zähne, ihre Nägel und ihren Schwanz. Wenn sie ihre Hütten vollendet haben, so tragen sie einen Vorrath von Rinden für den Winter ein, und verschließen sich in denselben.

Die größten Biber messen von der Schnauze bis zur Spitze des Schwanzes 3—4 Fuß in der Länge, und gegen die Brust 12—15 Zoll in der Breite. Der Kopf ist gleichsam viereckig, die Schnauze verlängert; in jeder Kinnlade sitzen 10 sehr lange und scharfe, scheerenförmig gestellte Zähne, nämlich nach vorne 2 Schneidezähne und auf jeder Seite 4 Backenzähne. Die Haut ist mit zweierlei Haaren besetzt, zuerst mit grauen, kurzen, sehr feinen und dicht stehenden, dann mit braunen, längern, festern und dünner stehenden, welche bestimmt sind, die ersteren vor Koth und Schmuz zu schützen. An den Vorderfüßen sind die Zehen kurz, frei und mit starken Nägeln versehen; an den Hinterfüßen sind sie zwar diesen ähnlich, aber viel länger und durch eine Schwimmhaut verbunden. Der Schwanz ist platt, eiförmig und schuppig wie bei einem Fische. Dieser Schwanz dient dem Thiere zum Steuerruder beim Schwimmen, und zur Kelle, um die Erde zu kneten, welche es zum Bau seiner Wohnung braucht. Die Oeffnung für den Mastdarm, die Zeugungstheile und die Drüsen, welche das Bibergeil absondern, ist gemeinschaftlich.

Die Biberjagd geschieht gewöhnlich im Winter, wo sie den dicksten und schönsten Pelz haben. Wenn sie die Ankunft der Jäger hören, so flüchten sie sich unter das Wasser. Weil sie aber Luft schöpfen müssen, so sind sie gezwungen, an den Stellen über das Wasser zu kommen, wo man geflissentlich Löcher in das Eis gehauen hat, und hier werden sie alsdann gefangen. Ihr Fell wird zu Pelzen, und hauptsächlich zu Verfertigung von Hüten sehr geschätzt. Das Bibergeil befindet sich sowohl bei dem männlichen als weiblichen Biber in zwei besondern, am Bauche auf beiden Seiten zwischen dem After und den Geschlechtstheilen sitzenden Beuteln, deren jeder noch mit einem untern, kleinern, das Bibergeilfett (**Axungia Castorei**) enthaltenden Nebenbeuteln versehen ist. Bei dem lebenden Biber ist das Bibergeil weich, schmierig und doch nicht flüssig, von der Consistenz einer Salbe, klebt an den Fingern an, hat aber nichts eigentlich Fettiges an sich, im Handel erscheint es aber trocken. Die Beutel hängen noch, gleich einem Quersacke, zusammen, und der eine ist beständig größer als der andere.

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten des Bibergeils:

1) Das sibirische oder moskowitische (**Castoreum sibiricum s. moscowiticum**), mit welchem auch das preußische, polnische und deutsche über-

einkommt. (Buchner erhielt Bibergeil von Bibern, die in Baiern, und Stoltze von Bibern, die an der Elbe gefangen waren, welches dem besten russischen Bibergeil nicht nachstand). Wir erhalten es in einigermaßen kegelförmigen, an dem einen Ende stumpf rundlichen, gewöhnlich etwas plattgedrückten, 3—3½ Zoll langen, in ihrer größten Breite 1—1½ Zoll breiten und höchstens ¾ Zoll dicken, getrockneten, dunkelbraunen, etwas höckerigen, 3, 4 bis 5 Unzen schweren Beuteln, die auswendig mit einer dicken, starken, festen, glatten, häutigen Substanz, die sich leicht in verschiedene Blätter zertheilen läßt, umgeben sind. Wird ein solcher Beutel durchgeschnitten, so besteht derselbe im Innern aus einem dichten, von in Windungen sich schlängelnden, ziemlich dicken Blättchen zusammengesetztem Zellgewebe, in welchem die eigentliche Substanz des Bibergeils eingeschlossen und damit verwachsen ist. Diese Masse füllet den Beutel zwar aus, doch so, daß in der Mitte gewöhnlich eine Höhlung sich befindet, durch welche der innere Zusammenhang der Masse aufgehoben ist. Diese Höhlung wird als ein sicheres Kennzeichen der Aechtheit angegeben, sie scheint jedoch nur zufällig zu seyn, und davon abzuhängen, daß, wenn das noch sehr weiche Bibergeil schnell ausgetrocknet wird, die Masse an den Seiten sich sehr zusammenzieht, und in der Mitte eine Höhlung erzeugt, die in jedem Beutel hinsichts der Größe, Weite, des Umkreises und der Oberfläche sich verschieden zeigt.

Die eigentliche Substanz des Bibergeils, von dem dicken, häutigen Zellgewebe, womit sie durchflochten ist, abgesondert, ist dunkelbraun, trocken, doch nicht dünn, ohne Glanz, fest und bröcklich, leicht zerreiblich, von einem sehr starken, Gesunden meistens unangenehmen, Nervenschwachen dagegen angenehmen eigenthümlichem Geruche, und bitterlichem, etwas beißendem, aromatischem, im Munde anhaltendem Geschmacke. Die zwei Beutel, in welchen sich die Substanz befindet, sind an ihrem dünnern Ende mit einander verwachsen, und gewöhnlich sind noch Spuren der kleinern Beutel, in welchen sich das Bibergeilfett findet, vorhanden. Dies ist die vorzüglichste Sorte.

2) Eine geringere Sorte ist das englische oder canadische Bibergeil (Castoreum anglicum s. canadense). Die Beutel sind kleiner, schmäler, mehr länglich, birnförmig, sich allmälig verschmälernd, eingeschrumpft, mehr schwarz; die äußere Haut ist dünner, loser und läßt sich nicht in Blätter zertheilen. Im Innern findet man eine viel größere Menge von Zellgewebe, das aus feinern und durchsichtigen Häutchen besteht. Die innere Masse ist heller von Farbe, mehr orangengelb, auch wohl mehr talgartig, doch auch bisweilen dürr und trocken. Die Höhlung in der Mitte fehlt. Der Geruch ist mehr widrig, doch gleichfalls sehr stark, etwas ammoniakalisch, der Geschmack ähnlich.

Diese Sorte Bibergeil bietet aber sehr oft große Verschiedenheiten dar, so daß es früher fast allgemein für ein Kunstproduct galt, und z. B. Thiemann (Berl. Jahrb. 1796. S. 54.) behauptete, daß alles im Handel und in Apotheken vorkommende englische Bibergeil, selbst wenn es aus der Quelle bezogen würde, eine trügliche nachgemachte Waare sey. Diese Behauptung

ist, besonders in neuern Zeiten, von vielen Seiten bestritten und widerlegt worden; so hat Pfaff (Syst. d. Mat. med. IV. S. 384. und VII. S. 279.) ächtes canadisches Bibergeil unter den Händen gehabt und untersucht; Buchner (Repert. XII. S. 160.) bemerkt, daß ihm neben nachgekünsteltem auch ächtes vorgekommen sey, und aus einer Nachricht, von Herrn Jobst (Buchn. Repert. XVII. S. 52.) mitgetheilt, geht hervor, daß gewiß nicht alles englische Bibergeil als Kunstproduct zu betrachten sey, wenn gleich die große Verschiedenheit der Beutel, hinsichts der Größe und der darin enthaltenen Masse, die bald gelbbräunlich, bald rothbraun, bald schwärzlich, ja bisweilen in zwei zusammenhängenden Beuteln nicht einerlei ist ꝛc., dafür zu sprechen scheint. Hr. Jobst hat in London selbst die Ueberzeugung gewonnen, daß sämmtliches canadisches Bibergeil, als ein ausschließliches Eigenthum der Hudsonsbay-Compagnie, von ihr wieder unverfälscht in den Handel gebracht werde. Nach seiner Meinung wird der große Unterschied zwischen den beiden Arten Bibergeil begründet durch Klima, Nahrungsmittel, Naturbeschaffenheit, Gesundheitszustand der canadischen Biber, und durch die Zeit, in welcher die Thiere erlegt werden.

Buchner (Ebend. S. 37.) erhielt einmal Beutel von canadischem Bibergeil, welche größtentheils (durch Krankheit des Thieres entstanden) Concremente aus kohlensaurer und phosphorsaurer Kalkerde mit wenig thierischem Stoffe waren. Buchner (Repert. XXIV. 2. S. 293.) glaubt durch Versuche (Repert. XVII. S. 37. und XXIV. S. 107.) hinreichend bewiesen zu haben, daß das Castoreum von verschiedenen Bibern in seiner Mischung sehr ungleich seyn könne, daß z. B. der in allen Sorten vorhandene kohlens. und phosphors. Kalk manchmal, und wahrscheinlich in Folge einer Krankheit des Thieres, überwiegend wird, und so die Beutel in Gestalt steiniger Concremente ausfüllt, oder daß dieser erdige Gehalt sammt den membranösen Theilen bisweilen beinahe zum Verschwinden kommt, während der harzartige Bestandtheil das Uebergewicht erlangt, oder auch, daß selbst in einem zusammenhängenden Beutelpaare manchmal eine auffallende Ungleichheit zwischen dem Inhalte beider Beutel angetroffen werden kann. Von solchen merkwürdigen Abweichungen führt nun Buchner einige Beispiele an, indem er verschiedene fremdartige Substanzen, als Wurzel- und Holzfasern, Haare und Sand im canadischen Bibergeil fand, was nicht für absichtliche Verfälschung gehalten werden konnte.

Auch Martius (Ebend. S. 78.) erklärt sich dahin, daß es ächtes canadisches Bibergeil gebe. Trautwein (Ebend. S. 101.) besitzt zwei noch ursprünglich verbundene Geilen canadischer Waare, wovon die eine auf ihrer Bruchfläche nach jeder Richtung hin mit Häuten durchzogen, die andere aber durchaus glatt, mit einer harzartig glänzenden Masse von der Consistenz eines dicken Terpenthins angefüllt und nicht durchwachsen ist. Auch Buchner beschreibt die beiden ihm von Trautwein zugesandten Geilen. Die eine enthielt zwischen weißem Zellgewebe eine orangengelbe, trockne, glanzlose Masse, welche jedermann als ächtes canadisches Castoreum erkannte, die an-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0245-8

dere war mit der erwähnten harzartig glänzenden Masse angefüllt, oben aber, wo der Beutel schmäler zugeht, zeigte sich wieder einiges weiße Zellgewebe in der Masse.

Buchner spricht nun seine Meinung dahin aus, daß das meiste, wo nicht alles canadische Castoreum ächt und ungekünstelt sey, und zieht mit Rücksicht auf seine chemischen Untersuchungen nachstehende Folgerungen: 1) daß das Castoreum sehr verschieden an Consistenz, Farbe, Glanze, spec. Gewichte, Geruche und Geschmacke, physiologischer Entwickelung und chemischer Mischung vorkommen, und dessenungeachtet ganz ächt und natürlich seyn kann. 2) Daß die Verschiedenheiten unstreitig von verschiedenen äußern Einflüssen, unter welchen das Thier lebt, vom Alter und Klima, von der Nahrung, von der Jahreszeit, in welcher der Biber erlegt wird u. s. w., dann noch ganz vorzüglich von der Art und Weise, wie und wie lange die Beutel getrocknet und aufbewahrt werden, herrühren. 3) Daß sehr schlechtes und medicinisch unbrauchbares Castoreum im Handel vorkommen kann, ohne daß es durch Menschenhände verfälscht oder nachgekünstelt sey.

Noch führt Buchner einige Beispiele an von inländischem Castoreum, von an der Isar gefangenen Bibern, welches in der Masse dicht wie eine geschmolzene Harzmasse mit einzelnen kleinen Höhlungen, leicht zerreiblich, röthlich und gelblichbraun, harzartig glänzend, und gröblich zerstoßen dem Körnerlack täuschend ähnlich ist, übrigens aber einen sehr starken Bibergeilgeruch und Geschmack besitzt.

Das Aufbrausen mit Salzsäure, welches Brandes als ein charakteristisches Kennzeichen des ächten erklärte, kann nach Buchner nicht dafür gelten, da ein sonst sehr schlechtes Castoreum stark mit Salzsäure brausen könne, ein anderes gutes dagegen nicht. Aus dem einen Beutel von Trautwein brauste das Bibergeil stark, dasjenige aus dem andern größeren Beutel entwickelte nur wenige Gasbläschen. Die Güte des Castoreums könne nur nach der Auflöslichkeit in Alkohol, und nach der Stärke an Geruche und Geschmacke beurtheilt werden.

Batka führte (Brandes's Archiv XII. S. 274.) mehrere Umstände und Versuche an zur Unterstützung seiner Behauptung, daß das meiste canadische Bibergeil Kunstproduct sey, und hält besonders die mit einer gelben (orangenfarbigen) zähen oder harten glänzenden Masse angefüllten Beutel für verdächtig.

Auch Brandes (Archiv XVI. 2. u. 3. und Buchn. Repert. XXIII. S. 441.) erklärt sich dahin, daß bei weitem der größte Theil canadisches Bibergeil ächt sey, jedoch dem moskowitischen weit nachstehe, und gewiß wird darin Jeder, der größere Quantitäten canadisches Bibergeil durchmustert hat, beistimmen, ohne sich von der bei diesem Castoreum so häufig vorkommenden großen und auffallenden Verschiedenheit, die bei dem moskowitischen nicht bemerkt wird, Rechenschaft ablegen zu können.

Wenn es demnach nun ferner nicht bestritten werden kann, daß es ächtes canadisches Bibergeil gebe, so ist es doch auch eben so unbestritten, daß

selbst dieses ächte Bibergeil dem moskowitischen weit nachstehe, und diesem niemals untergeschoben werden dürfe, wozu der so sehr bedeutende Unterschied des Preises für beide Sorten (14 Rthlr. und 216 Rthlr. für das Pfund) verleiten könnte. Der physische Unterschied beider Sorten ist aber auch von der Art, daß es Jedem, der beide Sorten öfter gesehen hat, leicht seyn wird, mit Bestimmtheit anzugeben, ob er canadisches oder moskowitisches Bibergeil vor sich habe, da schon der kräftige, um vieles stärkere Geruch und Geschmack beinahe allein hinreichend ist, das moskowitische Castoreum zu erkennen, welches sich überdem durch die bedeutend auffallende Form der Beutel, und durch die Beschaffenheit der inneren mit Häutchen durchwebten Masse, welche bröcklich und glanzlos, bei dem canadischen dagegen mehr harzartig und glänzend ist, unterscheidet. Das von Kohli (Taschenb. 1824. S. 192. und Brandes's Archiv II. S. 113.) angegebene Unterscheidungszeichen, daß der in dem geistigen Auszuge durch Wasser erzeugte Niederschlag beim canadischen Bibergeil mehr Zusammenhang und ein gelblicheres Ansehn habe, und daß zugesetztes Ammoniak diesen Niederschlag noch vermehre, wogegen der Niederschlag von russischem Bibergeil weiß bleibe und in einem Ueberschusse von Ammoniak sich vollkommen wieder auflöse, bewährt sich nicht als brauchbar, denn es kommt hier nicht allein auf die Beschaffenheit des Bibergeils, sondern auch auf die quantitativen Verhältnisse zwischen Tinctur, Wasser uno Ammoniak sehr vieles an. Auch der Unterschied in der Farbe der Tincturen rührt von den früher angeführten Ursachen, aber auch von der Methode des Trocknens her.

Das Bibergeil hält sich ziemlich unverändert an der Luft, ohne zu zerfallen, oder Feuchtigkeit anzuziehen, nur verriecht es immer mehr. Wird es einer allmälig zunehmenden Wärme ausgesetzt, so kommt es nicht, wie ein Harz, in Fluß, es bläht sich auch nicht auf, wie ein Gummi, sondern es verbreitet anfangs stärker den Bibergeilgeruch, und später einen dicken Rauch, welcher einen stechenden empyreumatischen Geruch hat, der mit dem Rauche thierischer häutiger Theile übereinkommt; es erweicht sich dabei, zuletzt bleibt eine halbglänzende, feste, schwarze Kohle zurück. Mit Wasser zusammengerieben vermischt es sich einigermaßen mit demselben, indem es ihm seinen Geruch und Farbe mittheilt, in der Ruhe fällt aber der größte Theil der Substanz zu Boden. Auch in Weingeist löst es sich nicht vollständig auf. Mit Mineralsäuren braust es auf, löst sich aber auch darin nicht auf.

Thiemann (a. a. O.) erhielt durch Destillation mit Wasser ein gewürzhaftes nach Bibergeil riechendes Wasser, wogegen der über Bibergeil abgezogene Weingeist einen unangenehmen, nichts weniger als nach Bibergeil riechenden Geist lieferte, welcher keine Spur von ätherisch-öligen Theilen zeigte. Wasser zog 10 Proc. Leim (aus dem Zellgewebe) mit einer Spur von freiem Laugensalze, der Weingeist 25 Proc. harzigen Stoff und etwas Leim aus.

Vollständiger ist die Analyse von Bohn (Trommsd. J. XVII. 2. S. 168).

1) Der eigentlich wirksame Bestandtheil des Bibergeils, namentlich des russischen, ist ein ätherisches Oel. Durch bloßes Verdunsten an der Luft verliert das Bibergeil neben seinem Geruche beinahe $\frac{1}{5}$ seines Gewichtes, ein Verlust, der jedoch nicht bloß dem ersteren zuzuschreiben ist. Durch eine erste Destillation von 1000 Gran Wasser über 100 Gran des besten Bibergeils erhielt Bohn ein etwas trübes (Pfaff ein bestimmt milchiges) Wasser, von dem starken Geruche des Bibergeils, und einem bittern, etwas scharfen Geschmacke. Auf demselben erschien von Zeit zu Zeit ein klarer Tropfen Oel. Eine neue Quantität Wasser über dasselbe Bibergeil abgezogen, war schon heller und schwächer von Geruche und Geschmacke. Bei der Cohobation des ersten Wassers über neue 100 Gran frischen Bibergeils wurde eine größere Menge ätherisches Oel erhalten. Das Daseyn des Oels in dem abgezogenen Wasser gab sich auch deutlich dadurch zu erkennen, daß oxygenirte Salzsäure den Geruch desselben zerstörte, und sich nach einiger Zeit ein weißer, sehr dünner, aber häufiger Niederschlag von harziger Natur an den Wänden der Gefäße anlegte. Zugleich fand sich in dem abgezogenen Wasser eine Spur von Ammoniak.

Das ätherische Oel selbst ist weißlichgelb, es schwimmt auf dem Wasser, hat eine sehr fette Beschaffenheit, so daß es wie Baumöl an den Fingern hängen bleibt, einen starken durchdringenden Geruch, doch ohne ein Zimmer so zu erfüllen, wie das Bibergeil selbst, und einen scharfen, bittern, ausdauernden Geschmack. Destillirtes Wasser löst es zum Theil auf, Alkohol leicht und vollständig.

2) Bibergeil wiederholt mit kaltem Wasser gerieben, theilte demselben seinen ganzen Geruch und Geschmack mit. Der wäßrige Auszug zeigte gleichfalls durch die Probe mit oxygenirter Salzsäure seinen Gehalt an ätherischem Oele. 100 Gran hatten 34 verloren. Da das Wasser überdestillirt wurde, blieb nur ein geringer Antheil von Harz und Fettwachs zurück. Bei diesem Reiben des Bibergeils mit Wasser theilt sich dasselbe in zwei Pulver: a) in ein feines, sehr leichtes, darin vertheiltes, das sich langsam mit braungelber Farbe absetzt, und b) in ein mehr dunkelbraunes und schweres Pulver, das schnell zu Boden sinkt. Jenes beträgt von 100 Gran 50, dieses nur 16.

3) Das Pulver a) war fast ganz geruch- und geschmacklos. Vermittelst der Hitze wurde alles Lösliche durch Alkohol ausgezogen, der eine dunkelrothe Tinctur damit gab. Beim Erkalten setzte sich eine Menge glänzender und sehr leichter Schuppen von heller Farbe ab, die einen dicken Bodensatz bildeten, der sich bei der Wärme in Alkohol wieder auflöste, in ätzenden Alkalien vollkommen auflöslich war, sich nicht zu einem spröden Harze eintrocknen ließ, sondern mehr eine fettwachsartige Consistenz behielt, und sich in jeder Hinsicht wie Fettwachs verhielt. In Pfaff's Versuchen sonderte sich dieser Bestandtheil beim Erkalten der Alkohollösung, theils in Körnern, theils als ein mehr lockerer Bodensatz mit grauer Farbe ab; er findet sich auch in den Standgläsern guter Bibergeiltinctur, und ist ein empirisches

Kennzeichen für ihre Aechtheit. Nach Abziehen des Alkohols blieb nur noch eine extractförmige Masse zurück, die sich gleichfalls nicht zu einem spröden Harze eintrocknen ließ, aber doch diesem schon mehr nahe kam, dabei eine rothbraune Farbe hatte, und die Bohn für ein Gemisch von Fettwachs, Harz und färbender Materie erklärt. Das Ganze, das auf diese Weise vom Alkohol aufgenommen worden war, betrug 23 Gran, die übrigen 27 Gran lösten sich bis auf 5 Gran mit Aufbrausen in verdünnter Salpetersäure auf, und sollen bloßer kohlensaurer Kalk gewesen seyn. Die unauflöslichen 5 Gran verhielten sich als Zellstoff.

4) Das Pulver b) bestand, mit Ausnahme von etwas Fettwachs und kohlensaurem Kalke, aus gewöhnlichem Zellstoffe, der sich von der Bibergeilmaterie nie ganz abtrennen läßt.

Nach dieser Analyse enthalten 100 Th. Bibergeil: ätherisches Oel 34; Fettwachs und harzähnlichen Stoff 23; kohlens. Kalk 24; Zellstoff 19. Dieser bedeutende Gehalt wird von Pfaff als das sicherste und am meisten entscheidende Kennzeichen der Aechtheit des Bibergeils angesehen, wobei jedoch das vorhin Vorgetragene zu berücksichtigen ist.

Bohn nimmt in Folge anderer Versuche an, daß das Bibergeil kein eigentliches Harz enthalte, sondern daß sich dieses erst aus dem ätherischen Oele durch Alkohol bilde. Bei der Destillation der alkoholischen Tinctur erhielt er keine Spur von ätherischem Oele oder riechendem Princip, aber im Rückstande eine extractförmige, rothbraune, zähe, nach Bibergeil, jedoch etwas scharf riechende Masse, von scharfem, heißem, bitterlichem, gewürzhaftem, bibergeilartigem, andauerndem Geschmacke, die sich in Wasser nicht auflöste. War dagegen das ätherische Oel vorher mit Wasser abdestillirt worden, so erhielt er durch Ausziehen des Rückstandes mit Alkohol ein kaum harziges Fettwachs.

Pfaff bemerkt noch, daß der wäßrige Rückstand von der Destillation des Oels durch kleesaures Kali stark getrübt wird; das salpetersaure oxydulirte sowohl als oxydirte Quecksilber giebt einen reichlichen weißen Niederschlag, der sich aber bald auffallend röthet, und sich in zugesetzter Salpetersäure leicht auflöst; eben so verändert die ganze Flüssigkeit ihre vor der Zumischung des Quecksilbersalzes hellbräunliche Farbe ins dunkel Blutrothe. Ohne Zweifel spielt hierbei eine Oxydation des im Wasser enthaltenen ätherischen Oeles eine Hauptrolle. Mit den Eisenauflösungen giebt diese Abkochung des Bibergeils theils graue, theils gelbe Niederschläge.

Bohn sieht das Ammoniak, das färbende Princip und andere Bestandtheile für zufällig, und aus dem Rauche beim Trocknen sich beimischend an, da frisches Bibergeil keine Spur von Ammoniak giebt. Dieses entwickelt sich aber auch bei dem nicht völlig ausgetrockneten Bibergeil durchs Aufbewahren, wie bei andern thierischen Substanzen.

Bei der trocknen Destillation erhielt Bohn Wasser, ätherisches Oel, eine Säure, wahrscheinlich Fettsäure, empyreumatisches Oel, Ammoniak, gekohltes Wasserstoffgas und kohlensaures Gas. In der Kohle waren vorhan-

den: Kohlenstoff, Natron, Kalkerde, wahrscheinlich etwas Phosphorsäure und ein wenig Eisenoxyd.

Nach Bouillon Lagrange und Laugier enthält das Bibergeil ein riechendes flüchtiges Oel, Benzoësäure, ein Harz, einen fettwachsartigen Stoff, einen röthlichen Farbestoff, thierischen Schleim, basisch kohlensaures Kali, Kalkerde, Ammoniak und etwas Eisen. Batka (Brandes's Archiv XII. S. 274.) hat gleichfalls Benzoësäure und phosphorsauren Kalk gefunden.

Bizio (Berl. Jahrb. XXVII. 1. 1825. S. 245.) sieht die Substanz, die er durch Kochen des Bibergeils mit dem sechsfachen Gewichte Alkohol, durch Absetzen aus der heiß filtrirten Flüssigkeit erhielt, als eine neue und eigenthümliche an, die er mit dem Namen Castorin bezeichnet. Sie hatte keine regelmäßige Gestalt, war außerordentlich leicht, und ließ sich mit den Fingern in Pulver zerdrücken. Kaltes Wasser löste fast gar nichts, heißes nur einen kleinen Theil auf; in kaltem Alkohol ist sie wenig, in heißem dagegen mehr auflöslich; beim langsamen Verdampfen des Alkohols erhielt Bizio kleine prismatische, nadelförmige, weiße durchsichtige Krystalle von einigen Linien Länge. In Aether lösten sich diese sehr schnell auf. In der Hitze schmolzen sie und schienen zu kochen, stießen auch Dämpfe aus, die unter Zutritte der Luft mit glänzender Flamme brannten. In verschlossenen Gefäßen gaben sie die gewöhnlichen Producte einer vegetabilischen Substanz, und nichts wies auf ihre animalische Abstammung hin. Die Alkalien äußerten keine Wirkung darauf. Hr. Dr. Winkler (Geiger's Magazin, Februar 1826. S. 171.) bemerkt, daß bei dem Sedimentiren der frisch bereiteten Tincturen das Castorin sich abscheide, daß es aber aus den heiß filtrirten Tincturen nach einigen Tagen Ruhe sich in kleinen unregelmäßig gestalteten Massentheilchen auf dem Boden und an den Seitenwänden abscheide, daher, wenn das Castorin, welches in Aether, schwerer in absolutem Alkohol, löslich ist, in den Tincturen aufgelöst erhalten werden solle, ein Zusatz von Aether nützlich sey. Aus dem moskowitischen Bibergeil war das Castorin mit einer violetten, schmierigen, viel Stärkstoff haltigen Substanz verunreinigt, aus dem canadischen Bibergeil wurde es reiner erhalten.

Aus den angeführten Eigenschaften des Castorins geht aber noch nicht hervor, daß dasselbe als eine eigenthümliche Substanz angesehen werden müsse, vielmehr scheint es mit dem von Bohn und Pfaff dargestellten Fettwachs übereinzukommen, und die Eigenschaft, von den Alkalien nicht aufgelöst zu werden, theilt es mit mehreren Fettsubstanzen, z. B. der des Hirnmarkes und der Cholestearine (dem Gallensteinfett), welcher letztern das Castorin wohl am nächsten zu stehen scheint.

Aus dem canadischen Bibergeil erhielt Pfaff ähnliche Resultate, wie aus dem moskowitischen, nur bei weitem weniger ätherisches Oel und viel mehr Zellstoff. Eine sehr ausführliche Analyse dieses Bibergeils hat uns aber Brandes (Archiv XVI. 2. u. 3. und Buchn. Repert. XXIII. 3. S. 441.) gegeben.

1000 Gran des canadischen Bibergeils wurden mit Alkohol behandelt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0250-5

Die Tincturen trübten sich und setzten einen weißlichen Stoff ab. Beim weitern Verdunsten schied sich noch ein krystallinischer Stoff ab, und nach Absonderung desselben gaben die geistigen Auszüge nach Verdunstung des Alkohols eine harzartige Masse. Die erste dieser Ausscheidungen verhielt sich ganz wie Cholestearine; die zweite war das Castorin Bizio's. Es war weiß, roch eigenthümlich wachsartig, schwach nach Castoreum, und hinterließ dann eine Empfindung, die Bizio sehr richtig mit der eines Kupfersalzes vergleicht. Es stellt eine zerreibliche körnige Masse dar, welche unter gewissen Verhältnissen sich krystallinisch zeigt; schmilzt in gelinder Wärme, und wird in stärkerer, ohne Rückstand zu lassen, zerstört. Kaltes Wasser wirkt nicht darauf, das in der Siedhitze Aufgelöste scheidet sich beim Erkalten wieder aus. Gewöhnlicher Alkohol und Aether zeigen in der Kälte sehr wenig Wirkung, beim Erhitzen aber lösen sie diese Substanz auf, nach dem Erkalten scheidet sich jedoch das Aufgelöste in dicken gallertartigen und feinfaserigen Flocken größtentheils wieder aus. Absoluter Alkohol und Aether wirken kräftiger darauf, besonders bei Unterstützung von Wärme. Aetzkali und Aetzammoniak wirkten beim Erwärmen auflösend darauf, obwohl nur in geringem Grade. Aetherische und fette Oele nehmen das Castorin beim Kochen auf, beim Erkalten schied sich das Aufgelöste größtentheils wieder ab. Verdünnte Schwefel- und Salzsäure, so auch Essigsäure, lösten diese Substanz auf; Salpetersäure zerstörte sie erst nach langer Einwirkung, und bildete eine Säure daraus, die Brandes für eigenthümlich hält und Castorinsäure nennt. Diese Säure ist auflöslich in Wasser, krystallisirt, bildet mit Ammoniak ein lösliches krystallisirbares Salz, schlägt bei starker Verdünnung die Auflösungen von Bittererde, Kalk, Baryt und Strontian nicht nieder, wohl aber die Auflösungen von Silber weiß, Blei gelblichweiß, Eisenoxyd weiß, nachher bräunlichweiß werdend, Kupfer grünlichweiß.

Die harzartige Substanz des Castoreums nennt Brandes Castoreum-Resinoid. Sie besitzt alle Eigenschaften der Resinoide, hat eine bräunliche Farbe, riecht schwach nach Castoreum, ist fast geschmacklos, aber unter gewissen Umständen, wie in ihrer Auflösung in Alkohol, schmeckt sie sehr bitter und scharf. Sie wird schon in geringer Wärme weich, in größerer zerstört. Kaltes Wasser wirkt nicht darauf, kochendes nimmt aber etwas davon auf. Alkohol löst sie leicht, so auch gewöhnlicher Aether, absoluter Aether zeigt aber keine Wirkung darauf. Aetherische Oele zeigen auch in der Wärme kaum eine Lösungskraft, fette Oele wirken stärker darauf. Ammoniak und Aetzkaliflüssigkeit lösen diese Substanz auf, auch concentrirte Essigsäure. Durch Verdünnen mit Wasser scheidet sich das Aufgelöste aber wieder ab. Schwefel- und Salzsäure wirkten nicht darauf.

Nach der Ausziehung mit Alkohol wurde der Rückstand mit Aether behandelt, und noch etwas weniges Castoreum-Resinoid erhalten, worauf der Rückstand nach und nach mit Wasser, Salzsäure und Aetzkalilauge behandelt wurde.

1000 Th. canadisches Bibergeil enthalten hiernach: ätherisches Oel 10,0; Castorin 7,0; Castorin mit kohlens. und harns. Kalke 13,5; Castoreum-

Resinoid 120,0; Castoreum-Resinoid mit Spuren von benzoës. und harns. Kalke 16,0; Castoreum-Resinoid durch Aether ausgezogen 1,0; aufgelösten Eiweißstoff mit Spuren von phosphors. Kalke 0,5; osmazomartige, thierische, in kaltem Wasser lösliche Materie, mit Spuren von milchs. Natron, salzs. Natron, salzs. Kali, phosphors. und schwefels. Kalke, 2,0; Castoreum-Resinoid, beim wäßrigen Auszuge erhalten 1,5; phosphors. Kalk mit organischer Materie 14,0; kohlens. Kalk 336,0; kohlens. Bittererde 4,0; schwefels. Kali, schwefels. und phosphors. Kalk 2,0; thierischen Mucus, eiweißstoffartig, der Harn- und Knorpelsubstanz ähnlich, 18,0; dieselbe Substanz im auflöslichen Zustande 5,0; thierische Substanz, wahrscheinlich durch Einwirkung der kochenden Kalilauge auf den eiweißstoffartigen Schleim gebildet, 23,0; kohlens. Ammoniak 8,2; Hautsubstanz, verbunden mit einem Theile verschiedener Salze, 192,0; Feuchtigkeit und Verlust 226,3. S. = 1000,0.

Auffallend ist die große Menge kohlensauren Kalkes, welche der Biber in dem Castoreum secernirt, so wie die vielen andern organischen Beimischungen desselben. Das kohlens. Ammoniak rührt vielleicht größtentheils von dem Räuchern her. Das ätherische Oel, ohne Zweifel sein wirksamster Bestandtheil, ist schwerer als Wasser, und ertheilt dem Wasser einen höchst-durchdringenden Geruch.

Das Bibergeil wird als eins der geschätztesten antihysterischen Mittel in Pulver- und Pillenform, oder als geistige und ätherische Tinctur angewendet. Ein die wirksamen Theile ungeschwächt enthaltendes Pulver wird dadurch erhalten, daß man das in Scheiben geschnitttene Bibergeil der Frostkälte aussetzt, im Kalten zu Pulver reibt, und dieses in wohl verschlossenen Gläsern aufbewahrt. Der jährlich höher steigende Preis des moskowitischen Bibergeils erschwert zwar dessen Anwendung, doch ist es für den Apotheker unerläßliche Pflicht, nur dieses zu dispensiren, wenn nicht ausdrücklich das canadische vorgeschrieben worden ist.

Catechu, gemeiniglich Terra japonica. Catechu.

Das wäßrige trockne Extract, aus dem Holze der Acacia Catechu Willd. und anderer Acaciaarten in Ostindien bereitet.

Feste, zerbrechliche, schwarzbraune, oft mit blässeren Lagen gemischte, auf dem Bruche glänzende, geruchlose Stücke, von zusammenziehendem Geschmacke, in rectificirtem Weingeiste und in heißem Wasser gleich auflöslich, größtentheils aus adstringirendem Principe bestehend. Verwerflich sind die kubischen, aus Thon zusammengefügten, mit irgend einem adstringirenden Decocte getränkten Stücke.

Acacia Catechu Willd. Catechuacacie.
Mimosa Catechu Linn. Catechu-Sinnpflanze.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0252-6

Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 1. Monoecia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Dieser Baum wächst auf den Gebirgen bei Bengalen. Er wird 3—5 Fuß hoch, hat eine dicke, braune, schuppige Rinde, unter welcher ein weißer Splint sitzt, der das feste und harte Holz einschließt, welches eine mehr oder weniger dunkelrothe, bisweilen schwarze Farbe besitzt. Die Blätter des Baumes sind doppelt gefiedert, und bestehen aus 15—30 Paaren Blättern, und diese sind wieder aus 40 Paaren Blättchen zusammengesetzt. An den Winkeln der Blätter stehen Stacheln, und aus den Winkeln kommen die Blumenähren hervor. Der Kelch der Blumen ist fünfspaltig, die Krone fünfblättrig und weiß, die Frucht 3—4 Zoll lang, flach, 5—6saamig.

Aus den unreifen Früchten und dem innersten Kerne des Holzes dieser und anderer Acacienarten wird ein Extract bereitet, welches das im Handel vorkommende Catechu ist. Viel Catechu soll aber auch aus den Früchten der Catechupalme (**Areca Catechu Linn.**) (**Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. VI. Hexandria. Juss. Cl. III. Ord. 1. Palmae.**) bereitet werden. Diese schöne Palme, deren aufrechter, einfacher, gerader Stamm eine Höhe von 30—50 Fuß erreicht, deren Blätter sehr groß, an 15 Fuß lang und gefiedert sind, ist in Ostindien, besonders auf den Küsten von Coromandel und Malabar zu Hause, und wird in jenen Gegenden der Früchte wegen sehr hoch geschätzt, die in großer Menge in ganz Ostindien zur Bereitung des Betels angewendet werden. Von dieser Palme soll das Catechu von Bombay, von **Acacia Catechu** dagegen das Catechu von Bengalen herstammen.

Nach einer von *Nees v. Esenbeck* d. J. (Buchn. Repert. XXII. 1825. S. 185.) mitgetheilten Beschreibung der englischen Naturforscher *Hunter* und *Wallich* ist es wahrscheinlich, daß das Catechu von **Nauclea Gambir** bereitet werde. Diese Pflanze ist ein kletternder Strauch mit runden Aesten; die Rinde rauh und braun, Blätter eiförmig, glatt, punktirt, Blüthenstand kopfförmig, aus sehr zahlreichen Blüthen zusammengesetzt. Aus den Blättern dieses Strauchs wird das sogenannte **Gutta Gambir** (der malayische Name der **Terra japonica**) nach 2 Methoden bereitet. Die erstere ist das Auskochen der Blätter. Wenn das Decoct zur Consistenz eines sehr dünnen Syrups eingedickt ist, wird es vom Feuer genommen und zur Abkühlung hingestellt. Es gesteht zu einer festen Masse, und wird dann in kleine viereckige Stücke geschnitten, die unter öfterm Umdrehen an der Sonne getrocknet werden. Das nach dieser Methode bereitete Gambir ist von einer braunen Farbe. Von denselben Theilen der malayischen Küste und von Sumatra wird aber auch ein beinahe ganz weißes in kleinen runden Kuchen gebracht. Nach Dr. *Campbell* wird dieses aus den klein geschnittenen Blättern und jungen Zweigen bereitet, welche man einige Stunden mit Wasser übergießt, bis sich ein Bodensatz ausscheidet, der durch die Sonnenwärme eingedickt und zu runden Kuchen geformt wird.

Die erstere Sorte ist diejenige, welche wir jetzt beinahe ausschließlich als **Terra japonica** in Europa erhalten. Dieses Gambir schmeckt anfangs

stark bitter und adstringirend, hinterläßt aber nachher einen süßlichen Geschmack, der lange bleibt. Die Hauptorte, wo es bereitet wird, sind Malakka, Siam und Shio. Die Methode des Kochens wird am häufigsten angewendet, so daß die Mehrzahl der Arbeiter von der Existenz einer andern Sorte gar nichts weiß.

Diesen Nachrichten zufolge ist wohl das in kleinen viereckigen Stücken vorkommende Catechu nicht durchweg für aus Thon gemacht zu halten, und es zeigt auch die Eigenschaften, freilich in geringerm Grade, als die früher häufig, jetzt selten vorkommenden Sorten Catechu. Man unterschied vorzüglich Catechu von Bombay und Catechu von Bengalen. Das erstere bestand in Kuchen von 3—4 Unzen Schwere, auf der Oberfläche viele dem Hanfsaamen ähnliche Saamen (untergestreut, um beim Trocknen das Ankleben zu verhüten), die Masse von braunrother Farbe, durch und durch gleichförmig; sie läßt sich leicht zerbeißen, zerfließt ganz im Munde und erzeugt darin einen eigenthümlichen, zusammenziehenden, nicht bittern Geschmack, der hintennach angenehm süß wird. Das Catechu von Bengalen kommt in runden ganz plattgedrückten Kuchen von 2—3 Unzen Schwere, wie die erstere Sorte mit Saamen bestreut. Es ist härter, weniger zerreiblich, äußerlich von Chocoladenfarbe, auf dem Bruche glänzend, chocoladenfarbene und braunrothe Adern zeigend; der Geschmack ist zusammenziehend bitter, und zeigt kaum den angenehmen Nachgeschmack. Beide Sorten stimmen in ihrem chemischen Verhalten überein: je reiner nämlich das Catechu ist, desto mehr verhält es sich als reiner Gerbestoff.

Das Wasser zieht aus dem Catechu eine Tinctur von schön dunkelrother Farbe aus. Die stärksten Catechuaufgüsse wirken auf die Säuren und reinen Alkalien auf ähnliche Art, wie der Galläpfelauszug, mit der concentrirten Schwefel- und Salzsäure geben sie Niederschläge von blaßfahler Farbe, durch die concentrirte rauchende Salpetersäure verlieren sie ihre Eigenschaft, die Leim- und Eisenauflösungen zu fällen. Kalk-, Baryt- und Strontianwasser bilden reichliche hellbraune Niederschläge, die überstehende Flüssigkeit behält nur eine blasse rothe Farbe, und hat die Eigenschaft, die Gallerte zu fällen, verloren. Kohlensaures Kali, Natron und Ammoniak trüben den Catechuaufguß nur sehr wenig, ertheilen ihm eine dunklere Farbe, und berauben ihn der Eigenschaft, auf die Gallerte zu wirken, welche er aber durch zugesetzte Säure wieder erhält. Mehrere Neutralsalze, namentlich salzsaurer Baryt und salzsaures Ammoniak, fällen den Catechuaufguß eben so wie den Galläpfelaufguß. Der Catechuaufguß bildet mit denselben Metallsalzauflösungen, welche den Galläpfelaufguß reichlich niederschlagen, gleichfalls reichliche Niederschläge von hellrother oder braunrother Farbe, mit den Kupferauflösungen von dunkelbrauner Farbe. Die Auflösung des oxydirten schwefelsauren Eisens verändert die Farbe des Catechuaufgusses in ein sehr schönes Dunkelgrün; es sondert sich bald ein schmutzig schwarzer Niederschlag ab; durch salzsaures und salpetersaures Eisen wird die Farbe mehr olivengrün, ins Braune sich ziehend. Mit keiner der Eisenauflösungen konnte Pfaff eine blaue oder

violette Farbennuance hervorbringen, wodurch sich also das Catechu wesentlich von den Galläpfeln unterscheidet. Sowohl Eiweißlösung als Gallertlösung wird durch Catechu niedergeschlagen, doch ist der Niederschlag nicht so reichlich wie durch Galläpfel. Dieser Niederschlag besteht nach Davy aus 41 Th. Gerbestoff und 59 Th. Leim.

In einer großen Menge Wasser ist das Catechu fast gänzlich auflöslich, der Rückstand ($\frac{1}{14}$) besteht vorzüglich aus Kalkerde, Thonerde und feinem Sande. In Alkohol ist es fast eben so auflöslich. Die Tinctur hat eine schöne dunkelrothe Farbe, wird durch Wasser nicht getrübt, und verhält sich völlig wie der wäßrige Auszug. Was der Alkohol nicht auflöst, ist eine ganz besondere Art von Schleim, der aus der wäßrigen Auflösung durch Metallsalze niedergeschlagen wird, auf die Gallerte aber nicht mehr wirkt. Davy erkannte außer diesem Schleime noch eine eigenthümliche Art von Extractivstoff, der in Wasser weit weniger auflöslich ist, als der Gerbestoff. Der Auszug aus viel Catechu mit wenig Wasser enthält viel mehr Gerbestoff als Extractivstoff, welcher auch im heißem Wasser auflöslicher ist als in kaltem, daher aus der im Sieden gesättigten Auflösung beim Erkalten ein Theil Extractivstoff im reinen Zustande zu Boden fällt. Wird fein gepulvertes Catechu so lange mit kaltem Wasser ausgezogen, bis die letzten Aufgüsse die Leimauflösung nicht mehr fällen, so bleibt dieser Extractivstoff ziemlich rein zurück. Er ist schwach braunroth, geruchlos, schmeckt schwach zusammenziehend mit süßlichem Nachgeschmack, ist in Wasser und Alkohol auflöslich.

Wird ätzendes Kali mit Catechu zusammengerieben, so entwickelt sich ein ammoniakalischer Geruch. Im Feuer bläht das Catechu sich auf, schmilzt und verkohlt sich. Die Asche ist weiß, leicht und enthält schwefels. und kohlens. Kalk, salzs. Kali, Eisenoxyd und ein wenig Kieselerde. Bei der trocknen Destillation giebt es eine saure Flüssigkeit, essigs. Ammoniak, durch welches schwefels. Eisen schön dunkelblau wird.

Nach Davy (Gehlen's J. IV. S. 362.) enthält das Catechu von Bombay, von 1,39 spec. Gew.: Gerbestoff 54,5; einen eigenthümlichen oxydirten Extractivstoff 34,0; Gummi 6,5; Kalk, Alaunerde und Sand 5,0. Das bengalische Catechu, von 1,28 spec. Gew. enthält: Gerbestoff 48,5; von dem eigenthümlichen Extractivstoffe 36,5; Gummi 8,0; Kalk, Alaunerde und Sand 7,0.

Trommsdorff (J. II. 2. S. 60.) giebt folgende Bestandtheile von 960 Gran an: adstringirenden Stoff 680; Gummi 240; Holzfaser und zufällige Bestandtheile 40.

Von der jetzt im Handel vorkommenden Sorte Catechu ist noch keine Analyse vorhanden. (Von den Früchten der Areca Catechu, den Arecanüssen) findet sich eine Analyse von Morin in Buchner's Repert. XV. S. 243. Er fand: Gallusäure; sehr viel Gerbestoff; eine besondere, der in den Hülsengewächsen vorkommenden ähnliche, vegetabilische Substanz; eine rothe, gerbestoffähnliche, in Alkohol größtentheils, in Wasser und Aether aber nicht auflösliche Materie; flüssiges und talgartiges fettes Oel, flüchtiges

Oel; Gummi; essigsaures Ammoniak; sauerkleesauren Kalk und Holzfaser.)

Das Catechu wurde besonders früher häufig gebraucht, und ist gewiß ein sehr wirksames Adstringens, das zum innerlichen Gebrauche Vorzüge vor den Galläpfeln hat, da es nicht so stark adstringirend ist, und gleichsam den Uebergang zu den Chinarinden macht.

Centaurium minus. Das Kraut. Tausendgüldenkraut.

Erythraea Centaurium Richardi. Eine einjährige auf Wiesen vorkommende Pflanze Deutschlands.

Das blühende Kraut, mit eckigem, nach oben hin ästigem Stengel, mit gegenüberstehenden, ovalen, stumpfen, dreifachgerippten, ganzrandigen, sitzenden Stengelblättern, rothen Blumen, von bitterm scharfem Geschmacke. Es werde im Monat Juli eingesammelt.

Erythraea Centaurium Richardi. Gemeine Erythräe, Tausendgüldenkraut.

Gentiana Centaurium Linn. Chironia Centaurium Willd.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 13. Gentianeae.

Diese niedliche Pflanze hat einen einfachen, aufrechten, ungefähr fußhohen, oben getheilten Stengel, mit schmalen, stumpfen, aufsitzenden, gegenüberstehenden, dreirippigen glatten Blättern, die am Stengel herunter laufen, und durch diese häutigen Fortsätze dem Stengel ein beinahe viereckiges Ansehen ertheilen. Die Wurzelblätter sind keilförmig länglich, stumpf, zusammengehäuft, etwas saftig. Die pfirsichblüthrothen, kleinen, trichterförmigen, fünftheiligen Blumen bilden einen flachen Blumenstrauß mit Zweigen, an denen gewöhnlich drei Blumen sitzen. Der Stengel und die Blätter haben eine scharfe Bitterkeit; die Blumen sind beinahe ganz geschmacklos. Es würde daher zweckmäßig seyn, das Kraut vor dem Blühen im Juni einzusammeln.

Beim Trocknen verliert das Kraut $\frac{3}{4}$ seines Gewichtes. Das Pulver ist gelbgrünlich. Der Aufguß wird von essigs. Blei und oxydulirtem salpeters. Queckſilber in reichlichen Flocken niedergeschlagen, und durch Eisenauflösungen wird die Farbe ins Braungrüne verändert. Beim Einkochen entwickelt sich ganz derselbe Geruch, wie bei dem Gentianaaufguß. Hagen erhielt von 8 Pfunden getrockneten Krautes gewöhnlich $2\frac{3}{4}$ Pfund Extract. Der Weingeist zieht eine braungelbe Tinctur aus.

Das Tausendgüldenkraut wird in der Abkochung, jedoch nicht häufig, verordnet, mehr das daraus bereitete Extract.

Cera alba. Weißes Wachs.

Wird aus dem gelben Wachse durch Bleichen an der Sonne bereitet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0256-9

Es ist fest, weiß, in dünner Scheibe durchscheinend, härter und weniger leicht am Feuer schmelzend als das gelbe Wachs. Zwischen den Zähnen gekaut hängt es nicht an. In zwanzig Theilen siedenden Alkohols wird es aufgelöst, beim Erkalten aber fast ganz am Boden sich ausscheidend. Das mit Talg verfälschte, durch den Geruch sich verrathend, werde verworfen.

Das gelbe Wachs kann von den fremdartigen Theilen, welche von den gewürzhaften riechenden und färbenden Stoffen der Pflanzen herrühren, dadurch befreit werden, daß man es bei gelinder Wärme schmelzt, in dünnen Fäden auf eine Walze ausgießt, welche wagerecht unter dem Wasser liegt, und sich beständig um ihre Achse dreht. Auf diese Weise wird das Wachs in Körner oder Streifen zertheilt, und so setzt man es auf einem Rasenplatze, einen Schuh hoch von der Erde über ausgespannte Leinwand ausgebreitet, der freien Luft aus. Jeden Abend wird es schwach begossen, und man läßt es so lange der Einwirkung der Sonne und der Kühle der Nacht ausgesetzt, bis es ganz weiß geworden ist. In diesem Zustande schmilzt es erst bei 155 ° R. und ist sehr trocken und zerreiblich; man schmelzt es daher mit etwas Talg oder mit etwas venetischem Terpenthin zusammen, um ihm wieder mehr Zusammenhang zu geben, und gießt es in runde Scheiben aus.

Zeichen für die Reinheit des weißen Wachses sind, daß es spröde, hart und fest ist, daß es mit einer Art von Geräusch zwischen den Zähnen zerspringt, nicht nach Talg riecht und schmeckt, und auf seidenes Zeuch getröpfelt keinen Fettfleck hinterläßt.

Cera flava. Gelbes Wachs.

Wird aus den Wachsscheiben der **Apis mellifica Linn.**, eines zu den Hautflüglern gehörigen Insectes, ausgeschmolzen.

Es ist fest, fettig, in der Kälte zerbrechlich, durch die Wärme der Hand zu erweichen, gesättigt gelb, auf dem Bruche beinahe körnig, im Feuer schmelzend, von eigenthümlichem Geruche. Man hüte sich vor Verfälschungen.

Die Biene (Apis mellifica L.) ist mit vier durchsichtigen und feingaderten Flügeln versehen, und lebt schwarmweise in hohlen Bäumen und in künstlich erbauten Wohnungen, den sogenannten Bienenkörben, wobei die Bienen die einzigen Insecten sind, welche die Pflege der Menschen genießen. In jedem Schwarme unterscheidet man:

1) Die weibliche Biene oder die Königin. Sie ist am größten, und die einzige vollkommen ausgebildete weibliche Biene. 2) Die kleinen mit der Königin den Winter hindurch im Stocke verbleibenden Arbeitsbienen; diese

sind ihre Männchen. Zur Zeit des Frühjahres erzeugen diese beiden Geschlechter noch zwei andere Bienenarten, nämlich Drohnenmütter und Drohnen. Erstere, weiblichen Geschlechts, aber nicht so vollkommen ausgebildet, wie die Königin, werden ebenfalls von den männlichen Arbeitsbienen, jedoch nicht zu jeder Zeit befruchtet, und legen nur Eier zu Drohnen; sie selbst können, wenn ein Stock weisellos wird oder schwärmen will, in einer Weiselzelle zu einer Königin erzogen werden. Die Drohnen sind geschlechtlos, oder vielmehr zur Geschlechtsfunction unfähig, und müssen dies seyn, weil die Befruchtung der Königin und der Drohnenmütter den Arbeitsbienen obliegt, und gäbe es männliche oder weibliche Drohnen, so müßte aus deren Begattung auch eine eigene Frucht hervorkommen, die aber noch nie bemerkt worden ist. Die Königin hat die Bestimmung, Eier männlichen und weiblichen Geschlechts zu legen, die Drohnen sind bestimmt, diese auszubrüten und die junge Brut zu pflegen. Die Befruchtung scheint nur einmal statt zu finden, und man glaubt, daß die Mutterbiene nach einer einzigen Begattung mit einer männlichen Biene zwei Jahre hindurch fruchtbare Eier legen könne. *Hoffmann* (Kastn. Archiv III. 4. S. 397.) führt aber gegen diese allgemeine Meinung an, daß zu jeder Frucht eine Befruchtung nöthig sey.

Das Schwärmen hat nicht im Fortpflanzungstriebe der Bienen seinen Grund, sondern geht aus ihrem Haushalte hervor, der dahin zielt, daß ihre Völkerschaft mit dem vorhandenen und zu erwartenden Vorrathe von Honig und Blumenstaub und von junger Brut immer in einem gewissen Verhältnisse stehe. Wird dieses gestört, so entstehen Schwärme.

Sobald der Schwarm in einem Bienenkorbe anlangt, fangen die Arbeitsbienen damit an, daß sie alle Löcher, durch welche das Licht und die Insecten eindringen könnten, mit einem eigenthümlichen Stoffe, dem sogenannten Vorwachse, verkleben. Dieser Stoff ist harziger Natur, braun, von einem besondern Geruche, und scheint durch die Bienen von dem Harze, welches die Knospen der Pappeln, Kiefern und Tannen überzieht, bereitet zu werden. Dieses Vorwachs, Stopfwachs, Bienenharz (**Propolis**) wurde früher in den Apotheken geführt. Wenn diese Arbeit vollbracht ist, fangen die Bienen an die Wachstafeln zu verfertigen, welche aus vielen senkrechten Blättern verfertigt sind, ohngefähr 15 Linien von einander abstehen, und auf jeder Seite mit unzählig vielen sechseckigen Zellen bedeckt sind, welche zur Aufnahme der von der Königin gelegten Eier, und zur Aufbewahrung des Honigvorrathes dienen. Eine Wachsscheibe von 15 Zoll Länge und 10 Zoll Breite enthält 9000 Zellen für die Brut. Die Zellen für die Königin, deren man gewöhnlich 2—3 findet, sind ganz verschieden, und eine wiegt so viel wie 100 gemeine Zellen. Das Wachs nun, aus welchem diese Tafeln bestehen, wird durch besondere bloß den Arbeitsbienen eigene Organe, die mit 8 unter den letzten Einschnitten des Hinterleibes liegenden Bläschen in Verbindung stehen, zubereitet.

Sobald die in die Zellen abgesetzten Eier ausgeschlüpft sind, so werden die Larven von den Drohnen mit einer Art Brei gefüttert, welcher in dem

Magen der letztern zubereitet wird, der aber von dem Wachse und Honig verschieden ist. Man bemerkt auch, daß sie jene Larven, welche zu Mutterbienen erzogen werden sollen, mit besonderer Sorgfalt verpflegen, und ihnen eine reichlichere Nahrung geben, welche von anderer Beschaffenheit und ohne Zweifel dazu geeignet ist, bei diesen die Geschlechtsorgane zu entwickeln. Einige Tage, nachdem die Larven ausgekrochen sind, spinnen sich dieselben in ein Gehäuse, worin sie 8—10 Tage als Puppe bleiben, und dann als vollkommene Bienen zum Vorschein kommen.

Durch diese junge Brut wird der Bienenkorb zu voll, so daß sich die Bienen in zwei Haufen theilen, deren jeder eine einzige Königin an der Spitze hat. Die älteste verläßt gewöhnlich den Korb — der Haufen schwärmt — gewöhnlich im Mai oder Juni, und sucht sich eine neue Wohnung. Sie sammelt ihre Arbeitsbienen an dem Aste eines Baumes in einem bald größern, bald kleineren Schwarme um sich her, wo man denselben behutsam und allmälig in einen schon in Bereitschaft stehenden Korb schüttelt.

Auf diese Weise geschieht die Vermehrung der Bienen. Ein Stock, welcher 6 Pfund wiegt, enthält 1500 Männchen und 20,000 Arbeiter. Diese bereiten in einem Jahre 2½ Pfund Wachs und 25—30 Pfund Honig. Nach der Ausscheidung des Honigs, dessen Gewinnung unten (siehe **Mel**) beschrieben werden soll, werden die Wachsscheiben in Wasser geschmolzen, um sie von allem Honig zu befreien, und das Wachs in irdene oder hölzerne Gefäße gegossen.

Daß das Wachs als ein alleiniges Product aus dem Saamenstaube der Blumen angesehen werden müsse, welcher, nach *Reaumur's* Ansicht, von den Arbeitsbienen eingesammelt, in kleinen an ihren Hinterfüßen befindlichen Vertiefungen nach dem Stocke getragen, und dort von andern Arbeitsbienen verschluckt würde, welche ihn bald darauf wieder als einen flüssigen Brei von sich gäben, und aus diesem ihre Wachsscheiben bauten: dagegen streitet nicht bloß die von *Bonnet* bekannt gemachte Bemerkung, daß das Wachs von den Bienen unter den Bauchringen abgesondert werde, sondern *Huber* hat auch geradezu bewiesen, daß der Blumenstaub zur Bildung des Wachses unnöthig sey, indem er einen frischen Bienenschwarm 5 Tage lang in einem Korbe einschloß und ihm bloß Honig und Wasser geben ließ. Nach Verlauf dieser Zeit hatten die Bienen fünf Scheiben verfertigt, welche aus schönem, vollkommen weißem und leicht zerbrechlichem Wachse bestanden. Doch ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß diese Absonderung des Wachses, welches nach *Hunter's* Beobachtungen unter den schuppigen Ringen hervordringt, welche den hintern Theil des Körpers bei den Bienen bedecken, durch den Pollen der Blumen bedingt werde, da nicht allein dieser, sondern sehr viele andere vegetabilische Stoffe ein nur wenig verschiedenes Wachs enthalten. So bildet es den glänzenden Ueberzug der Blätter mancher Bäume und Pflanzen, als des Kohles, des Mohnes u. s. w., den Ueberzug vieler Früchte, als der Pflaumen, Feigen, Weintrauben, Pomeranzen, Citronen; es ist im grünen Satzmehle des **Sedum acre**, des Kohles ꝛc.,

in den grünen und den reifen Gerstenstengeln, im Mehlthau u. s. w. enthalten. Bei einer Palmenart (Ceroxylon andicola), welche Humboldt in Südamerika entdeckt hat, setzt es sich mit Harz verbunden als ein rindenartiger Ueberzug ab; ferner in den Beeren des Wachsbaumes (Myrica cerifera), aus denen es durch Kochen gewonnen werden kann. Diese verschiedenen Arten von vegetabilischem Wachse weichen nicht nur von dem Bienenwachse, sondern auch unter sich in manchen äußern Eigenschaften ab, z. B. der grünen Farbe, doch zeigt ihr chemisches Verhalten wesentliche Uebereinstimmung, wenn gleich auch hierin Modificationen eintreten.

Gutes gelbes Wachs hat eine mehr oder weniger hochgelbe Farbe, einen angenehmen honigartigen Geruch, einen schwachen Geschmack, hängt sich beim Kauen nicht an die Zähne an, hat eine etwas zähe Consistenz, ein spec. Gew. von 0,960 und schmilzt bei 142 ° F. Es ist in Wasser unauflöslich. Kalter Alkohol äußert fast keine Wirkung, kochender löst etwa $\frac{1}{20}$ davon auf, beim Erkalten der Auflösung scheidet sich aber der größte Theil aus, und der Ueberrest wird gleichfalls durch einen Zusatz von Wasser gefällt. Schwefeläther nimmt im Sieden etwas mehr auf, welches beim Erkalten gleichfalls zu Boden fällt. Mit den fetten Oelen, den Fetten des Thierreiches und dem Wallrath verbindet es sich in allen Verhältnissen. Durch Natronlauge wird es nur langsam in eine harte Seife verwandelt. Diese ist in heißem natronhaltigen Wasser, selbst wenn es Kochsalz enthält, löslich, beim Erkalten trübt sich die Lösung. Mit reinem kalten Wasser gewaschen, bildet die Seife mit heißem Wasser eine milchige Flüssigkeit, welche beim Erkalten schleimig, gallertartig gesteht. In Weingeiste, selbst wäßrigem, ist sie leicht löslich, die Lösung erstarrt zu einem opalisirenden gallertartigen Magma, welches weit weniger feste Consistenz hat, als die aus Talgseife bereitete. Die mit Salzsäure ausgeschiedene, mit Wasser und wäßrigem Weingeiste gereinigte Wachssubstanz hat keine Aehnlichkeit mit der Talgsäure; sie ist glanzlos, weiß, knetbar, zähe wie unverändertes weißes Wachs. Diese von Geiger gemachte Beobachtung, daß nämlich bei der Verseifung des Bienenwachses sich nicht, wie bei der Verseifung des Talges, Talgsäure bildet, ist auch von Frommherz bestätigt worden; das Bienenwachs verbindet sich demnach mit den Alkalien, ohne eine chemische Veränderung zu erleiden. Das Wachs von Myrica cerifera aber bildet nach Chevreul durch Saponification Stearinsäure. Aetzammoniak verbindet sich gleichfalls mit dem Wachse zu einer Art Seife, und mit Hülfe desselben läßt sich das Wachs am leichtesten aus den frischen Pflanzentheilen, in welchen es enthalten ist, ausziehen; nach Bostock zeigt es sich aber dadurch etwas verändert.

In der Wärme wird das Wachs völlig flüssig, bei erhöhter Temperatur geräth es ins Kochen und verdunstet. Der sich davon erhebende Dampf entzündet sich bei Annäherung eines glühenden Körpers und brennt mit heller Flamme. Bei der Destillation geht neben kohlensaurem, Kohlenwasserstoff- und Oelgas, ein aus Wasser, Essigsäure und brenzligem Oele beste-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0260-0

hendes Destillat über, und ein fettiges Destillat, welches anfangs flüssig ist, Wachsöl, dann butterartig, Wachsbutter, und in der Retorte bleibt eine schwierig brennende Kohle zurück. Prof. Frommherz (Geiger's Magazin 1826. Juli. S. 61.) fand in dem brenzligen Wachsöle, welches in einem kalten Zimmer stand, perlmutterglänzende Blättchen, welche alle charakteristischen Eigenschaften der Talg- oder Stearinsäure hatten. Diese konnte nur dadurch in das brenzlige Wachsöl gekommen seyn, daß sie sich zugleich mit demselben bei der Destillation des Wachses bildete, und es wurde hieraus wahrscheinlich, daß die sogenannte Wachsbutter nichts anderes sey, als Talgsäure. Diese Vermuthung wurde durch einen angestellten Versuch vollkommen bestätigt, wo das Wachs nur so weit erhitzt wurde, daß es kaum zum gelinden Sieden kam; hier wurde sehr viel Talgsäure gebildet, und nur Spuren der bekannten gasförmigen und flüssigen Producte. Bei höherer Temperatur bilden sich mehr Essigsäure, ätherisches Wachsöl und brenzliges Oel und weniger Talgsäure.

Das Wachs zeigt überhaupt in chemischer Hinsicht sehr viel Aehnlichkeit mit den Fettarten, so daß es wohl nicht als eine eigene organische Gattung, sondern als eine Art der Gattung Fett anzusehen ist. Die Bildung der Talgsäure bei seiner Destillation liefert nun eine Analogie mehr mit den Fetten, welche bei der Destillation Talgsäure und Oelsäure erzeugen. Das Wachs unterscheidet sich aber dadurch, daß es gar keine Oelsäure giebt, auch daß es keine Benzoësäure oder Thenard'sche Fettsäure liefert.

Die Salpetersäure zersetzt das Wachs nur bei längerer Digestion in Klee- und Essigsäure. Chlor zeigt nur bleichende Kraft. Kaltes Vitriolöl löst es nicht auf, erhitztes bildet damit eine dunkelbraune, durchsichtige, beim Erkalten undurchsichtig und dicklich werdende Auflösung, aus der durch Wasser ein bräunliches klebenderes Wachs, welches mit warmen Wasser eine Milch bildet, abgeschieden wird.

John (chemische Schriften IV. S. 38.) hat das Wachs in zwei nähere Bestandtheile zerlegt, und diese Cerin und Myricin genannt. Bucholz und Brandes (Buchn. Repert. IV. S. 145.) haben nachher durch sorgfältigere Versuche die Eigenthümlichkeiten derselben bestimmt. Zur Darstellung wurde ganz reines schön gelb gefärbtes Bienenwachs in einer reinen silbernen Schale zur Verjagung aller Feuchtigkeit so lange geschmolzen, bis es nicht mehr schäumte, dann durch dichte Leinwand colirt, und darauf mit heißem absoluten Alkohol wiederholt ausgezogen. Die ersten Aufgüsse gerannen beim Erkalten zu einer vollkommen gleichartigen Gallerte, die letzten ließen das Aufgelöste in Gestalt von in einander gewebten Flocken absetzen. Um nun zu verhindern, daß der anfänglich aus dem Wachse ausgeschiedene Stoff (Cerin) von dem zuletzt ausgezogenen (Myricin) und umgekehrt nicht verunreinigt werde, so wurden die mittleren Auszüge, welche beide Stoffe gemischt zu enthalten schienen, unbenutzt gelassen, und das aus den 2 ersten Auszügen abgesetzte Cerin, so wie das aus den 5 letzten Auszügen abgesetzte Myricin durch Pressen zwischen Leinwand abgesondert erhalten. Der Alkohol

hielt einen balsamisch fettigen Stoff aufgelöst, welcher durch Abdestilliren des Alkohols erhalten wurde, sich entfernt wie ein Weichharz verhielt, von entfernt wachsartigem fettig-bitterlichem Geschmacke, und angenehmen stark wachsartigem Geruche.

Vergleichende Zusammenstellung der beobachteten Eigenschaften des Cerins und Myricins.

Farbe.

Cerin	Myricin
Nach dem Ausziehen mit absolutem Alkohol beinahe ungefärbt, nach dem Schmelzen zu einer Masse aber gelblichweiß.	Nach dem Ausziehen mit Alkohol schmutzig weiß, jedoch nach dem Schmelzen bräunlichgelb.

Geruch.

Schwach wachsartig.	Nicht merklich verschieden.

Consistenz.

Gewöhnliche Wachshärte, und übrige Beschaffenheit des Wachses.	Besaß eine merklich weichere Beschaffenheit als das Cerin; im übrigen kam es überein.

Eigenschwere.

0,969.	1,000.

Löslichkeit in siedendem absoluten Alkohol.

1 Th. erfodert davon 16 Th. zu seiner Lösung und beim Erkalten nimmt die Lösung eine gallertartige körnige Beschaffenheit an.	1 Th. wird erst durch $122\frac{2}{3}$ Th. Alkohol gelöst, und nach dem Erkalten scheidet sich das Gelöste in einzelnen Flocken aus.

Löslichkeit in kaltem absoluten Aether.

1 Th. erfodert davon zu seiner Lösung $41\frac{2}{3}$ Th.	1 Th. erfodert 99 Th. zu seiner Lösung.

Schmelzungsfähigkeit.

Bei der Temperatur des siedenden Wassers schmolz das Cerin in 4 Zeittheilen.	Bei gleicher Behandlung schmolz das Myricin in 3 Zeittheilen.

Vermöge der verschiedenen Löslichkeit dieser beiden Stoffe, verglichen mit der Löslichkeit des Wachses, bestimmten Bucholz und Brandes die Zusammensetzung des gelben Wachses dahin, daß es in 100 Th. enthält: Cerin 90; Myricin 8; balsamisch fettigen Stoff 2.

Das gelbe Wachs ist vielfachen Verfälschungen unterworfen, als mit Ochererde, Erbsenmehl ꝛc. Delpech hat Kartoffelstärkemehl bis auf $\frac{2}{3}$ des Gewichts gefunden. Eine solche Verfälschung verräth der Geschmack, die matte Farbe, das Zerbröckeln in krümlige Stücke, da das unverfälschte Wachs leicht in größere Stücke zerspringt, und der erdige oder mehlige Satz im Seihezeuge, wenn man das geschmolzene oder in Terpenthinöl aufgelöste Wachs colirt. Ein mit Harz verfälschtes Wachs ist weniger spröde, hängt an den Zähnen an, und kalter Weingeist zieht die harzigen Theile aus. Eine

Verfälschung mit Schwefel verräth der Schwefelgeruch des erwärmten oder noch mehr des brennenden Wachses; auch wird ein Papier, welches damit überzogen ist, bei dem Lichte wie ein gestirnter Himmel glänzen.

Das Wachs macht nicht nur einen Bestandtheil fast aller Salben und Pflaster aus, sondern findet auch innerliche Anwendung, besonders bei der Ruhr, wo es im geschmolzenen Zustande mit erwärmtem Traganthschleime gemischt in flüssiger Form verordnet wird.

Cerasa acida. Saure Kirschen.

Eine Varietät von Prunus Cerasus Linn., welche in unserer Muttersprache: schwarze, saure Kirsche, heißt; ein in den Obstgärten sehr häufiger Baum.

Schwarze Steinfrüchte, mit einer angenehmen Säure begabt.

Prunus Cerasus Linn. Der gemeine Sauer-Kirschbaum.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Dieser Baum, welcher ursprünglich im Orient wild wächst, und zuerst durch Lucullus gegen das Jahr 680 von Cerasunte im Pontus nach Italien gebracht wurde, wird jetzt auch in Europa uud fast durch ganz Deutschland gezogen. Er wird 20—25 Fuß hoch, der Stamm kann eine Dicke von 4—6 Fuß erreichen. In 25 Jahren erreicht er seine Vollkommenheit; er zeichnet sich durch seine hängenden Zweige aus.

Der Stamm ist gerade und schlank, hat zahlreiche Aeste und ist mit einer grauen, glatten, glänzenden, inwendig röthlichen Rinde bedeckt, das Holz roth, und zu Drechslerarbeit gesucht. Die Blätter sind abwechselnd, gestielt, zugespitzt, an den Rändern sägeförmig gezahnt, auf beiden Seiten glatt, oben glänzend und von fester Substanz. Die weißen, gestielten Blüthen bilden Büschel oder Sträußer, die am Grunde von Blüthenknospenschuppen umgeben sind. Der glockenförmige Kelch mit kurzen und zugerundeten Lappen fällt leicht ab. Die Blumenkrone besteht aus fünf großen, rundlichen, rosenförmig geöffneten und im Kelche befestigten Blumenblättern. Die 20—30 pfriemenförmigen Staubfäden haben zweilappige kurze Staubbeutel. Die Frucht, eine Steinfrucht, ist glatt, kugelrund, fleischig, von lebhaft rother Farbe und mit einer Längsfurche bezeichnet.

Die Blüthezeit ist April und Mai mit dem Ausbruche der Blätter. Die Früchte reifen im Juni bis August.

Von den mancherlei Kirscharten werden nur die sauren Kirschen zum Arzneigebrauche angewendet. Sie haben bei der Reife eine dunkelrothe Farbe und ein sehr sauer schmeckendes Fleisch mit einem blutrothen Safte; sie enthalten einen rundlich-länglichen, zugespitzten, etwas gedrückten, mit einem hervorstehendem Rande versehenen Stein, der einen öligen, bitterlich-schmeckenden Kern einschließt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0263-8

Der ausgepreßte Saft der Kirschen wird zur Bereitung des Kirschsyrups, die Kerne aber werden zum Kirschwasser gebraucht.

* Cerasus. Das Gummi. Kirschgummi.

Das aus dem Stamme mehrerer bei uns cultivirter Steinobstarten, z. B. des Zwetschen-, Kirschen- und Aprikosenbaums, ausschwitzende Gummi.

Es hat in einzelnen Stücken sehr viel Aehnlichkeit mit dem arabischen Gummi, denn die Stücke desselben sind durchsichtig, weiß, gelblich, bisweilen röthlich; in chemischer Hinsicht ist es jedoch verschieden. Es giebt mit Wasser eine Auflösung von stärkerer Consistenz, oder vielmehr es schwillt, indem es weniges Wasser in sich aufnimmt, zu einer voluminösen Masse auf, und löst sich nur unvollkommen auf. Zwölf Gran machen eine Unze Wasser sehr dick, indem sie stark darin aufschwellen. Das mit drei Unzen Wasser verdünnte Gemisch ist gelb, durchsichtig, und noch sehr klebrig; es bleiben weiche, durchsichtige, unauflösliche Stücke zurück. Nach dem Filtriren behält die Flüssigkeit nur noch wenig Klebrigkeit, und giebt mit Alkohol nur einen sehr schwachen Niederschlag. Der auf dem Filtrum unaufgelöst bleibende Rückstand ist getrocknet im äußern Ansehen dem Gummi sehr ähnlich, erweicht aber nur in kaltem Wasser, nimmt davon das 50fache Gewicht auf und bildet damit eine steife, durchsichtige, schlüpfrige Gallerte, ohne sich eigentlich darin aufzulösen. Auf der Zunge erweicht es und bildet damit eine körnig-schlüpfrige Masse, ohne zu zergehen. Durch anhaltendes Kochen mit Wasser löst es sich endlich auf, und verhält sich dann wie arabisches Gummi. In wäßrigem Kali und Natron ist es auflöslich. Diesem Stoffe, der mit dem Traganthstoffe ganz übereinstimmt, ist der Name Bassorin, Cerasin, Prunin beigelegt worden; er wurde zuerst von Vauquelin im Bassoragummi bemerkt.

Durch Auswaschen des getrockneten und gepulverten Kirschgummis, Traganths ꝛc., mit vielem kaltem Wasser, Trocknen, Ausziehen der harzigen Theile durch Weingeist, erhält man das Bassorin, welches im reinen Zustande farblos, schmutzigweiß oder gelblich, durchsichtig oder durchscheinend, von muschligem Bruche, leicht pulverisirbar, geschmack- und geruchlos ist. In kaltem Wasser ist es unauflöslich. Durch Kochen mit Wasser erleidet es eine Veränderung, und dieses wird beschleunigt durch Zusatz von etwas Schwefel-, Salz-, Salpetersäure, oder Ammoniak oder Kali.

Nach Bostock (Gehlen's J. VIII. S. 578.) bewirkt in der Auflösung des Kirschgummis essigsaures Blei zwar im ersten Augenblick keinen Niederschlag, wohl aber eine schwache Neigung zur Gerinnung, und nach 24 Stunden scheint sich das Gummi in sehr feinen Fäden aus seiner Auflösung zu trennen; das salpetersalzsaure Zinn verwandelt dieses Gummi in eine feste gelbe Gallerte; das schwefelsaure Eisenoxyd bewirkt eine schwärzlichbraune Färbung ohne alle Gerinnung (von zufälliger Gallussäure?), das salpetersalzsaure Gold eine braune Färbung und Undurchsichtigkeit ohne Niederschlag;

das saure essigsaure Blei und das salpetersaure Queckſilber ſind ohne Wirkung; Alkohol veranlaßt bloß die Bildung einiger Fäden, der größte Theil des Gummis ſcheint ſich unverändert mit ihm zu verbinden.

Cerussa. Carbonas plumbicus. Bleiweiß.

Wird in chemiſchen Fabriken aus dem durch Eſſigdämpfe zerfreſſenen Blei, oder aus dem baſiſchen (eſſigſauren) Blei durch Hülfe der Kohlenſäure bereitet.

Zuſammenhängend, zerreiblich, weiß, die Finger beſchmutzend, ſchwer, aus Bleioxyd und Kohlenſäure beſtehend. Es ſey nicht mit Kreide verfälſcht, welche daran erkannt wird, daß ſie mit Salpeterſäure verbunden in Alkohol aufgelöſt wird; auch nicht mit ſchwefelſaurem Baryt, welcher nach der Auflöſung des Bleiweißes in Salpeterſäure zurückbleibt.

Das Bleiweiß war ſchon den ältern Griechen bekannt; ſpäter führt Plinius das rhodiſche Bleiweiß als ſehr berühmt an.

Das Bleiweiß iſt eine Verbindung des Bleioxyds mit Kohlenſäure; dieſe Verbindung kommt zwar auch natürlich vor, als Bleiſpath, in meiſtens weißen, diamantglänzenden Kryſtallen; das im Handel vorkommende Salz wird aber in Fabriken bereitet. Früher geſchah dieſes beinahe ausſchließlich in Venedig, dann in Holland, jetzt aber wird das Bleiweiß in mehreren Ländern, als England, Deutſchland, Frankreich ꝛc. bereitet.

Es giebt zwei Bereitungsarten. Die älteſte, auch jetzt noch am häufigſten in Holland, Oeſtreich, in Freiberg, im Erzgebirge ꝛc. befolgte Methode beſteht darin, daß man zu Platten von 6 Fuß Länge, 6 Zoll Breite und $\frac{1}{10}$ Zoll Dicke geſchlagenes Blei in großen irdenen Töpfen aufhängt, oder auf ein Kreuz von Holz ſtellt, in jene wird ſo viel Eſſig gegoſſen, daß die Platten dieſen nicht berühren. Dieſe Töpfe werden mit Bleiplatten verſchloſſen, und dann in Kaſten geſchichtet, welche in Lohe oder friſchen Dünger gegraben werden. (Letzteres iſt nicht ſo gut, weil hier, wenn die Fäulniß bis zu einem gewiſſen Punkte vorgeſchritten iſt, Schwefelwaſſerſtoffgas entwickelt wird, welches das Fabricat gelblichſchwarz färbt.) Bei der durch die Gährung dieſer Subſtanzen erzeugten höheren Temperatur wird der Eſſig langſam verflüchtigt, und hierdurch die Oxydation des Bleies ſo wie die Verbindung dieſes Oxydes mit Kohlenſäure bewirkt. Verſuche, die im Großen angeſtellt worden ſind, haben gezeigt, daß, je beſſer hiebei die Luft ausgeſchloſſen iſt, deſto ſchöner das Bleiweiß ausfällt. Man hat alſo Urſache zu vermuthen, daß der Eſſig ſowohl den Sauerſtoff, als die Kohlenſäure für das Bleiweiß liefert, wobei er vermuthlich in dieſelbe ätherartige Flüſſigkeit verwandelt wird, die man erhält, wenn eſſigſaure Metallſalze deſtillirt werden; denn es iſt noch nicht ausgemittelt, wie der Eſſig dabei wirkt. Nach ungefähr 4 Wochen iſt die Oberfläche des Bleies mit einer Rinde von Blei-

weiß bedeckt, die durch Aufrollen des Bleies losgebrochen und darauf mit einer Metallbürste abgekratzt wird. Das unzersetzte Blei wird wieder eingesetzt, bis es völlig in kohlensaures Blei verwandelt ist. Es ist dabei für die Reinheit der Farbe höchst wesentlich, daß die Bleiplatten so dünn sind, daß sie völlig durchfressen werden, denn sonst wird die Farbe vom unangegriffenen Metalle, welches sich als eine graue Rinde mit der innern Lage von Bleiweiß mischt, verunreinigt.

Die zweite Bereitungsart gründet sich auf die Eigenschaft des basisch essigsauren Bleies, durch die Kohlensäure zersetzt zu werden; sie ist zuerst von Thenard angegeben und wird in Frankreich und in Schweden befolgt. Eine wäßrige Lösung von Bleizucker wird anhaltend mit $\frac{1}{2}$ Th. Glätte gekocht, und dadurch eine Auflösung des basisch-essigsauren Bleies erhalten, durch welche man so lange kohlensaures Gas, welches aus brennenden Kohlen entwickelt wird, hindurch streichen läßt, bis sich kein Niederschlag mehr in derselben bildet. Das niedergeschlagene kohlensaure Bleioxyd wird ausgewaschen und getrocknet. Die Flüssigkeit, welche durch die Kohlensäure wieder in neutrales essigsaures Blei verwandelt worden ist, wird abermals mit Bleiglätte gesättigt, und wie vorhin durch Kohlensäure niedergeschlagen. Es bildet sich auch Bleiweiß, wenn feingepulverte Glätte mit wäßriger Lösung von kohlens. Kali und etwas Essig lange der Luft ausgesetzt wird.

Das nach der ersteren Art bereitete Bleiweiß ist eine matte, lose zusammenhängende oder pulverige schwere Masse, das nach der zweiten ist mehr pulverig. Es färbt an den Fingern und auf dem Papier stark ab. Wenn man das damit bestrichene Papier an einem Lichte anzündet, so läßt es beim Verbrennen Kügelchen von durch die Kohle des Papiers reducirtem Blei fallen. Wird das Bleiweiß mit wenig Stärke und Wasser zu einem Teige gemacht, und in längliche Scheiben geformt, so erhält es den Namen Schieferweiß (**Schifera alba, Armentum album, Cerussa in lamellis**), welches das Ansehen weißer harter Scherben hat. Das Kremnitzer- oder Kremserweiß soll mit Gummiwasser angerührt seyn. Das reinste Bleiweiß ist leicht zerbrechlich, in feinen kleinsten Theilen staubartig, geschmack- und geruchlos, im Wasser unauflöslich, in Salpeter- und Essigsäure unter Aufbrausen auflöslich; im Glühfeuer verwandelt es sich, nach dem Verluste der Kohlensäure, in Masticot, in einem stärkern Feuer fließt es, wie alle Bleioxyde, endlich zu einem durchsichtigen sehr flüssigen Glase, welches wie Wasser durch den Tiegel dringt, und Bleiglas (**Vitrum plumbi, V. Saturni**) genannt wird.

Nach Klaproth wird das kohlensaure Bleioxyd vom kaustischen Kali im Kochen aufgelöst, und die Auflösung setzt während der Abkühlung kleine silberweiße Schuppen ab, die vom Lichte grau gefärbt werden. Abgedampft giebt es eine braunrothe schuppige glänzende Masse, die bei der Auflösung im Wasser eine Menge kleiner, glänzender, zinnoberrother Schuppen unaufgelöst zurückläßt. Salpetersaure Kalkerde wird von kohlensaurem Bleioxyd im Kochen zersetzt; man erhält kohlensaure Kalkerde und salpetersaures Bleioxyd.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0266-5

Das Bleiweiß enthält kein Wasser, und besteht nach Berzelius aus 83,5 Bleioxyd und 16,5 Kohlensäure.

Das im Handel vorkommende Bleiweiß ist häufig, das holländische fast immer, verfälscht mit Schwerspath, Gyps, oder Kreide. Erstere beide bleiben bei der Auflösung in Salpeter- oder Essigsäure zurück, letztere Verfälschung erkennt man auf die im Texte angegebene Weise, weil von den beiden durch Auflösen des mit Kreide verfälschten Bleiweißes in Salpetersäure und durch Abdampfen der Auflösung in trockner Gestalt erhaltenen Salzen, dem salpetersauren Blei und dem salpetersauren Kalke, nur das letztere in Alkohol auflöslich ist und nach Verdampfen desselben erhalten wird. Man erkennt diese Verfälschung aber auch, wenn die concentrirte Auflösung des verdächtigen Bleiweißes mit Salzsäure oder Kochsalzauflösung versetzt wird, wodurch das Blei als Chlorblei bis auf einen kleinen Hinterhalt gefällt wird; hinterläßt nun die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit beim Abdampfen ein zerfließliches Salz, salzsauren Kalk, so enthielt das Bleiweiß Kreide. Schlägt man aus der salpetersauren Auflösung das Bleioxyd mit Ammoniak nieder, so bleibt der Kalk aufgelöst, und wird dann durch kohlensaures Kali als ein weißer Niederschlag gefällt. Derselbe Niederschlag wird durch kohlensaures Kali gebildet werden, wenn vorher das Blei durch Schwefelwasserstoffgas ausgefällt worden. Es sollen auch weißgebrannte Knochen dem Bleiweiße beigemischt werden. Diese Verfälschung wird dadurch erkannt, daß das zur Fällung angewandte Ammoniak sich mit der Phosphorsäure aus den Knochen verbindet, und aufgelöst bleibt. Wird die Auflösung zur Trockne verdunstet, und der Rückstand geglüht, so bleibt zuletzt verglaste Phosphorsäure zurück. 40 Th. Phosphorsäure zeigen 100 Th. weißgebrannte Knochen an. Bisweilen soll sogar schwefelsaures Bleioxyd oder Chlorblei anstatt Bleiweiß im Handel vorkommen; diese unterscheiden sich sogleich durch ihre Unauflöslichkeit oder Schwerauflöslichkeit in Salpetersäure; löst sich der Rückstand in Salzsäure auf, so ist er schwefelsaures Blei. Aschoff hat auch ein Bleiweiß von schönem Ansehen kupferhaltig gefunden, was durch die blaue Farbe des mit dem Bleiweiße digerirten Ammoniaks erkannt wird.

In der Pharmacie wird das Bleiweiß vorzüglich zur Bereitung von Bleipflastern und Bleisalben, bisweilen auch äußerlich als Pulver gebraucht, und es darf nur das reinste Bleiweiß zum Gebrauch gezogen werden. In der Technik dient es als Malerfarbe, und das Bleiweiß ist die einzige weiße Farbe, die man in der Oelmalerei braucht, wobei es aber sowohl für den Farbenreiber, als für den Maler große Beschwerden nach sich zieht. Es ist sogar ungesund, in einem Zimmer zu wohnen, in welchem das Getäfel mit dieser Farbe frisch angestrichen ist. Hauptsächlich wirkt es auf das Verdauungssystem, und verursacht eine Krankheit, die unter dem Namen der Malerkolik bekannt ist, und welche endlich, wenn sie öfters wiederkehrt, die Gesundheit der daran Leidenden gänzlich untergräbt. Aus demselben Grunde ist auch die äußerliche Anwendung in Pulverform zum Bestreuen der beschädigten Haut bei Kindern gefährlich.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0267-1

Cervus. Das Horn. Hirschhorn.

Das Horn von Cervus Elaphus Linn., einem in Deutschland häufigen Thiere.

Eine knochenartige Materie, entweder in sehr dünnen Schnitzeln oder Stücken, durchs Kochen eine Gallerte gebend.

Der Edelhirsch, zu den wiederkäuenden Säugethieren gehörig, ist kleiner als das Pferd, und hat ästige jährlich abfallende Geweihe, die aber dem Weibchen, der Hirschkuh oder Hindin, fehlen. Zur Begattungszeit, im September und October, werfen die Männchen die Geweihe ab, und im Frühlinge wachsen wieder neue, die anfangs mit einer Haut (Bast) überzogen sind, von denen sich aber diese Haut, wenn sie ausgewachsen sind und sich zu verknöchern anfangen, ablöst.

Diese Geweihe bestehen aus phosphorsaurer und kohlensaurer Kalkerde, enthalten aber auch viel Gallerte, welcher sie ihre Aufnahme in den Arzneischatz verdanken. Sie kommen gewöhnlich schon geraspelt in den Handel, doch werden ihnen auch sehr häufig, ohne Nachtheil, die Knochen anderer Säugethiere, welche dieselben Bestandtheile enthalten, untergeschoben.

Eine durch anhaltendes Kochen bereitete concentrirte Abkochung gesteht beim Erkalten zu einer Gelée, welche mit Wein, Zucker und einigen gewürzhaften Zusätzen zu einem sehr erquickenden Arzneimittel gemacht werden kann, sehr häufig aber auch in den Haushaltungen bereitet wird.

Cetaceum, gemeiniglich Sperma Ceti. Wallrath.

Wird aus den oberhalb der Hirnschale befindlichen Höhlen und den unter der Haut im Leibe sich verbreitenden Kanälen der Physeter, vorzüglich des Ph. macrocephalus Linn., durch Ausschmelzen und Reinigen erhalten.

Eine talgartige, härtliche, weiße, etwas durchsichtige, blättrige, im Anfühlen schlüpfrige Materie, von mildem Geschmacke, in heißem Weingeiste und in Aether auflöslich.

Der großköpfige Pottfisch, Pottwall, dessen schon bei Ambra grisea gedacht ist, bewohnt den nördlichen Ocean, besonders zwischen Norwegen und Amerika, bei Grönland, Spitzbergen u. s. w. Er erreicht eine Länge von 60 Fuß und eine Dicke von 30 Fuß; der Kopf ist übermäßig groß und unförmlich, so daß er fast die Hälfte seines kegelförmigen Körpers einnimmt. Die Luftröhre scheint aus zweien zusammengesetzt zu seyn, und liegt vorne auf der Nase vor den Augen. Das Maul ist klein, der Schlund aber so groß, daß er einen Ochsen verschlingen könnte. Der Kopf erhält seine ungeheure Größe durch eine an seinem obern Theil aufliegende Höhle, die durch Knochenlamellen geschieden, aber mit der gemeinschaftlichen Haut be-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0268-7

deckt ist. Diese Höhle enthält ein milchweißes Oel in großer Menge, so daß bisweilen aus dem Kopfe eines einzigen Pottfisches bis 24 Tonnen erhalten werden sollen. Dieses Oel wird aber auch von den übrigen Pottfischarten, als Physeter Catodon, Ph. microps etc. aus gleichen Höhlen gewonnen.

Es ist dieses Oel, Wallrathöl genannt, dem Thrane ähnlich, verhält sich auch chemisch ähnlich, ist jedoch reiner, und enthält den Wallrath, welcher sich, wenn das Oel der freien Luft ausgesetzt wird, als eine weiße krystallinische Masse abscheidet. Man reinigt ihn dadurch, daß man ihn auspreßt, wodurch das in ihm zurückgebliebene Oel ausgeschieden wird, ihn dann noch mit schwacher Kalilauge behandelt, hierauf bei gelinder Wärme schmelzt, und ihn ruhig wieder erkalten läßt, damit er von neuem krystallisire.

Der Wallrath ist auch, wiewohl in geringerer Menge, in dem Thrane des Wallfisches und in noch geringerer Menge in dem Fette der anderen Fische enthalten, und setzt sich mit der Zeit daraus ab, doch ist dieser unreiner und bedarf mehrfacher Reinigung.

Der gereinigte Wallrath, wie er im Handel vorkommt, hat eine weiße Farbe und ein festes krystallinisches blättriges Gefüge. Die Blättchen haben einen eigenthümlichen Glanz, sind durchscheinend, spröde, sanft und schlüpfrig, jedoch nicht fettig anzufühlen. Der Geschmack ist mild und fade, der Geruch eigenthümlich wildpretartig, jedoch schwach. Spec. Gew bei 15 ° = 0,943. Er ist härter als Talg, schmilzt bei 40 ° R.; in höherer Temperatur entzündet er sich leicht, und brennt mit einer sehr lebhaften Flamme ohne Geruch. Auf Tuch macht der geschmolzene Wallrath keinen Fettfleck, sondern läßt sich beim Erkalten erhärtet als ein staubartiges Pulver leicht wieder davon abbringen. Er läßt sich, ohne merklich verändert zu werden, überdestilliren, durch wiederholte Destillation wird er aber in ein flüssiges gelbes Oel, in saures Wasser und wenig Kohle verwandelt. Von kochendem Alkohol wird der Wallrath bis auf einen kleinen Theil ($\frac{1}{70}$) aufgelöst, der in der Wärme wie ein fettes Oel in Tropfen auf dem Boden erscheint, in der gewöhnlichen Temperatur aber zu Talg erhärtet; beim Erkalten der alkoholischen Auflösung fällt jedoch der Wallrath größtentheils nieder. Beinahe 150 Th. Alkohol sind erfoderlich, um einen Theil Wallrath aufzulösen. Schwefeläther löst ihn schon in der Kälte auf, mehr noch in der Wärme; beim langsamen Erkalten krystallisirt der Wallrath in glänzenden silberfarbigen Blättchen, beim schnellen Erkalten verwandelt sich das Ganze in eine feste Masse. Auch flüchtige und fette Oele lösen den Wallrath auf.

In concentrirter Salpetersäure löst sich der Wallrath ruhig auf und scheidet sich, wie der Campher, beim Zusatz von Wasser wieder unverändert heraus. Die übrigen Säuren zeigen keine merkliche Wirkung auf ihn. Mit den kaustischen Laugensalzen vereinigt sich der Wallrath leicht zu einer sehr spröden, zerreiblichen Seife, die im Wasser keine ganz klare Auflösung giebt. Durch diese Behandlung mit Laugensalzen werden aber die Eigenschaften des Wallraths wesentlich verändert; er verliert seine Krystallisirbarkeit. Wird

die Seife durch Weinsteinsäure zersetzt, so werden Essigsäure, ein fade und schleimig schmeckender Syrup, und eine fettige gelbliche Masse erhalten, welche aus Talgsäure, Oelsäure und einem nicht sauren modificirten Wallrathfette besteht. Mit Ammoniak bildet der Wallrath in der Wärme eine Emulsion, welche weder durch Erkalten noch durch Wasser zersetzt wird, bei dem Zusatze einer Säure fällt aber der Wallrath sogleich nieder.

Der Wallrath löst Schwefel auf.

Nach Chevreul soll der Wallrath doch noch einen kleinen Theil Wallrathöl zurückhalten, von welchem er dadurch befreit werden kann, daß man den Wallrath in kochendem Weingeiste auflöst, aus welchem dann das reine Wallrathfett, Cetine, beim Erkalten, in zarten, weißen, perlmutterglänzenden Blättchen herauskrystallisirt. Die Cetine ist nach Chevreul klingender, glänzender und weniger fett anzufühlen als Wallrath.

Nach Berard besteht der Wallrath aus 81 Kohlenstoff, 13 Wasserstoff und 6 Sauerstoff.

Der atmosphärischen Luft ausgesetzt wird der Wallrath leicht gelb und ranzig, und nimmt alsdann einen unangenehmen, thranig-ranzigen Geschmack an.

Pfaff (System der Mat. med. VII. S. 52.) giebt Nachricht von einer besondern Art von Wallrath, welche aus Brasilien gekommen ist, und von dem gewöhnlichen Wallrath etwas abweicht. Er kommt nach ihm in Massen vor, die nicht aus größern Blättchen wie der gewöhnliche, sondern aus ganz feinen Schuppen zusammengesetzt sind, die auch keinen so auffallenden Perlmutterglanz wie der ächte Wallrath haben. Uebrigens sind diese Massen durchscheinend und vollkommen weiß. Auch das chemische Verhalten ist übereinstimmend.

Zum pharmaceutischen Gebrauche wähle man den frischen und ganz weißen aus. Er wurde früher auch innerlich in Emulsion, mit Gummi oder Eigelb abgerieben, oder auch in Pulverform gegeben, und hierzu muß er vorher mit einigen Tropfen Weingeist besprengt werden; jetzt wird er mehr zu Salben und Pflastern, häufiger aber zum technischen Gebrauche, zur Bereitung der Wallrathlichter, benutzt.

Eine etwanige Verfälschung mit Wachs würde die mattweiße Farbe und das nicht so blättrige Gefüge anzeigen; auch ist ein solcher Wallrath weniger zerreiblich, und giebt mit Schwefeläther eine milchige, trübe Auflösung.

Chaerophyllum sylvestre. Das Kraut. Kälberkropfkraut.

Chaerophyllum sylvestre Linn. Eine zweijährige in Deutschland an Zäunen sich häufig findende Pflanze.

Vielfach zusammengesetzte, an der Basis etwas haarige Blätter, mit lancettförmigen, spitzigen, an Rand und Nerven scharfen Einschnitten. Sie müssen im zweiten Jahre vor der Blüthezeit

genommen werden. Man hüte sich vor einer Verwechselung mit dem gefleckten Schierlinge.

Chaerophyllum sylvestre Linn. Gemeiner Kälberkropf.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der Stengel dieser sehr gemeinen Pflanze ist 2—4 Fuß hoch, dick, hohl, gefurcht, an den Gelenken aufgetrieben und unten weichhaarig, oben glatt. Die untersten Blätter sind dreifach-, die obern doppelt-gefiedert, gegenüberstehend, oben glatt, unten am Rande und an den Nerven gewöhnlich behaart, mit Blattstielen, von denen die unteren röhrig und haarig sind, versehen. Die Blättchen sind eingeschnitten-sägeartig, die Dolden sind vielstrahlig, flach und gestielt. Die allgemeine Doldenhülle fehlt; die besondere besteht aus 5 eirund-lancettförmigen, mit Haaren eingefaßten röthlichen Blättern. Die Kronblätter sind flach, ausgerändelt und weiß.

Diese Pflanze hat einen eigenen widerlichen Geruch, und man schreibt ihr schädliche Eigenschaften zu, besonders sind auf den Genuß der weißen rübenartigen Wurzel Schwindel und Betäubung gefolgt; dem Rindvieh soll sie tödtlich seyn.

Man hat den aus dem frischen Kraute ausgepreßten und eingedickten Saft gegen venerische Krankheiten empfohlen, doch scheint er sich nicht besonders wirksam bewiesen zu haben und wird daher nur noch selten verordnet.

Chamomilla romana. *Die Blüthen. Römische Kamillen.*

Anthemis nobilis Linn. Eine perennirende Pflanze des mittägigen Europas.

Zusammengesetzte strahlige Blumen, mit einem fast ebenen, spreutragenden Fruchtboden, mit gemeiniglich wuchernden Blümchen der Scheibe und ähnlichen Blümchen des Strahls, von aromatischem Geschmacke und durchdringendem Geruche. Sie müssen nicht verwechselt werden mit den durch kurze Strahlenblümchen und durch Geruch unterschiedenen Blumen von Achillea Ptarmica Linn. Sie werden im Monat Juni und Juli eingesammelt.

Anthemis nobilis Linn. Die römische Kamille.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese Pflanze ist nicht bloß in Italien, wie der Name andeutet, sondern überhaupt in den südeuropäischen Ländern, Frankreich, Spanien ꝛc. einheimisch.

Der 8—10 Zoll hohe Stengel ist niederliegend, ästig, an den Enden der Zweige, von denen jeder eine Blüthe trägt, aufgerichtet, walzenrund, gestreift, behaart. Die Blätter, die an dem untern Theile des Stengels

gewöhnlich fehlen, oder verwelkt und abgestorben sind, sind kurz, sitzend, unregelmäßig doppelt-gefiedert, schwach behaart, mit sehr kleinen, spitzen, pfriemenförmigen Blättchen. Die Blüthenköpfe stehen einzeln. Der gemeinschaftliche Kelch besteht aus dicht übereinander liegenden Schuppen. Die Strahlenblümchen sind weiß, an der Spitze dreizähnig, zurückgebogen und viel länger als die gewölbte gelbe Scheibe. Der gewölbte Fruchtboden ist mit durchsichtigen und behaarten Spreublättchen (paleae) besetzt. Die länglichen Achenien (Saamen) sind mit einem kleinen häutigen Fortsatze gekrönt.

Die Blumen dieser Pflanze werden durch die Cultur in unsern Gärten häufig gefüllt, und gewinnen dadurch ein ganz verschiedenes Ansehen; sie werden den einfachen zum Arzneigebrauch vorgezogen. Obgleich alle Theile dieser Pflanze, die im Juni und Juli blüht, einen starken, angenehmen, aromatischen Geruch haben, so wendet man doch nur die Blüthenköpfe unter dem Namen der römischen Kamille an. Ihr Geruch ist stärker, durchdringender und angenehmer, als bei der gemeinen Kamille; ihr Geschmack ist aromatisch und bitter. Sie enthalten ein ätherisches Oel von gelber, etwas ins Bräunliche oder ins Grünliche fallender Farbe; einige wollen ein blaues Oel erhalten haben. Die Ausbeute an ätherischem Oele ist um vieles reichlicher als bei den gemeinen Kamillen, Hagen erhielt aus acht Pfunden römischen Kamillen drei Quentchen Oel. Außerdem enthalten sie einen bittern harzigen Extractivstoff und einen kleinen Theil Gerbestoff.

Die römischen Kamillen werden sowohl zum innerlichen Gebrauche, im Aufgusse oder Thee, als auch äußerlich zu Umschlägen verordnet. Bei reizbaren Personen erfodert ihr Gebrauch Vorsicht, weil sie Erbrechen erregen können.

Chamomilla vulgaris. Die Blüthen. Gemeine Kamillen.

Matricaria Chamomilla Linn. Eine einjährige in Deutschland häufige Pflanze.

Zusammengesetzte strahlige Blumen, mit kegelförmigem, nacktem, innen hohlem Fruchtboden, mit gelben, bittern und angenehm riechenden Scheibenblümchen, und weißen geschmacklosen Strahlenblümchen. Sie müssen nicht verwechselt werden mit den Blumen von Anthemis Cotula Linn., deren spreutragende Fruchtboden innen nicht hohl sind. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Matricaria Chamomilla Linn. Kamillen-Mutterkraut.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese treffliche Arzneipflanze findet sich durch ganz Deutschland auf Feldern unter den Saaten, wo sie den ganzen Sommer hindurch blüht.

Die Wurzel ist faserig, der Stengel aufrecht ästig, 1—2 Fuß hoch, glatt, gestreift, und an Größe und Wuchs sehr verschieden. Die Blätter

sind ungefähr 2 Zoll lang, sitzend, ganz glatt, dreimal gefiedert, mit sehr schmalen fast fadenförmigen Fiederblättchen. Die Blumen stehen einzeln an der Spitze der Zweige auf platten, nackten, etwas gefurchten Blüthenstielen. Der gemeinschaftliche Kelch (periclinium) besteht aus dachziegelförmig übereinander liegenden, stumpfen, mit einem weißen häutigen Rande umgebenen Blättchen. Die weißen Strahlenblümchen zeigen an der Spitze drei kleine stumpfe Zähne; im Anfange stehen sie horizontal, später sind sie abwärts gebogen; die kleinen röhrenformigen Scheibenblümchen sind gelb. Der Fruchtboden ist kegelförmig, ganz glatt, innen hohl. Die Achenien (Saamen) sind viereckig, schwarzbraun und runzlig.

Die officinellen Blumen müssen bei trocknem Wetter, gleich nach dem Aufblühen, gesammelt und sorgfältig getrocknet werden, dann behalten sie ihren angenehmen aromatischen Geruch und bitterlichen Geschmack.

Von zwei sehr ähnlichen Pflanzen, **Anthemis arvensis** und **A. Cotula**, die zuweilen mit der ächten Kamille verwechselt werden, unterscheidet sich die Kamille durch die sehr fein zertheilten glatten Blätter, durch den starken angenehmen (bei **A. Cotula** unangenehmen) Geruch der Blüthen, besonders aber durch den nackten, kegelförmigen Fruchtboden. Beinahe noch ähnlicher als die genannten Pflanzen ist **Chrysanthemum inodorum**, welches sich aber durch folgende Merkmale unterscheidet: 1) Die ganze Pflanze ist größer. 2) Die Blätter haben verhältnißmäßig längere und schmälere Abschnitte, ihr Geschmack ist stark und unangenehm bitter. 3) Die Blumen sind fast noch einmal so groß als die der ächten Kamille. 4) Der gemeinschaftliche Kelch ist mehr halbkugelförmig gestaltet, seine Schuppen sind breiter und braun gerandet. 5) Die Strahlenblümchen sind nicht zurückgeschlagen, und deutlich dreizähnig. 6) Die Scheibe ist weniger gewölbt. 7) Der Fruchtboden ist während der Blüthezeit zwar gewölbt, aber nicht kegelförmig, innen dicht, nicht hohl.

Als die vorzüglich wirksamen Bestandtheile der Kamillen sind ein ätherisches Oel und ein bitterlicher Extractivstoff anzusehen, obgleich die Menge des ätherischen Oeles, welches man gewinnen kann, nur sehr gering ist. Der wäßrige Aufguß ist gelbröthlich, von dem eigenthümlichen Kamillengeruche, und einem eben so eigenthümlichen schwach bitterm Geschmacke. Die Farbe desselben wird durch oxydirte Eisenauflösungen dunkler, und ins Braune verändert, ohne daß im geringsten eine Nuance von Grün zu bemerken wäre; auch bildet sich in den ersten 24 Stunden kein Niederschlag. Brechweinsteinauflösung, Galläpfeltinctur, Leimauflösung bringen keine Veränderung darin hervor. Blei-, Zinn-, Queckſilberauflösungen schlagen ihn reichlich nieder und entfärben ihn.

Aus einer Unze Blumen erhielt Pfaff etwas über 3 Quentchen Extract. Aus diesem zieht absoluter Alkohol nur sehr wenig aus, auch Weingeist von 80 Procent wirkt nicht stark darauf. Es ist größtentheils eine Art gummiger Extractivstoff, ohne Beimischung von Gerbestoff, und enthält essigsaures und etwas salzsaures Kali. Aus den durch Wasser erschöpften Kamillen,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0273-3

und zwar aus einer Unze, zog Weingeist noch ein Quentchen eines gelbbraunen Harzes aus. Die Versuche von Freudenthal (Berl. Jahrb. XXIII. S. 313.) sind unvollständig, und die angegebene Ausbeute, von 3 Pfund Blumen eine Drachme und einige Gran ätherisches Oel, viel zu hoch.

Die Kamillenblumen, als ein sehr gebräuchliches nützliches Hausmittel bekannt, werden im Aufgusse oder auch als Pulver verordnet, aber auch zu pharmaceutischen Zubereitungen, als Wasser, Oel, Extract, Syrup verwendet.

Chelidonium majus. Das Kraut. Schöllkraut.

Chelidonium majus Linn. Eine ausdauernde auf Schutthaufen und an schattigen Orten in Deutschland häufige Pflanze.

Das Kraut mit gefiederten Blättern, die Fiederblättchen gestielt, eiförmig, gekerbt-eingeschnitten, dünn, mit vorzüglich unterhalb weichhaarigen Nerven, von unangenehmen Geruche, mit einem gelben scharfen Safte angefüllt. Im Monat Mai einzusammeln.

Chelidonium majus Linn. Das gemeine Schöllkraut.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 2. Papaveraceae.

Diese Pflanze wächst durch ganz Deutschland, so wie überhaupt in ganz Europa, und wird häufig an Hecken, alten Mauern, auf Schutthaufen und andern unangebauten, schattigen Stellen angetroffen.

Die Wurzel ist cylindrisch, ästig, langzaserig, braunröthlich und inwendig weiß. Die Stengel sind aufrecht, rund, dünn, schwach, ästig, zweitheilig, röthlich, unten stark zottig, und 1—2 Fuß hoch. Die Blätter sind abwechselnd, groß, weich, gefiedert, und in rundliche, oben hellgrüne, glatte, unten weichhaarige, weißgrüne und stark geaderte, stumpfe, in einander fließende Lappen ausgeschnitten. Der äußerste Lappen ist dreitheilig und größer. Die Rippen und Blattstiele sind dreieckig und haarig. Die gelben Blumen stehen vereinigt am obern Theile der Stengelverzweigungen. Jede Blume zeigt einen zweiblättrigen hinfälligen Kelch, der nur vor dem Aufblühen vorhanden ist, und eine vierblättrige große Blumenkrone. Die Frucht ist eine schotenähnliche Kapsel mit vielen kleinen rundlichen, glänzenden, schwärzlichen Saamen.

Die Blüthezeit dieser Pflanze ist April bis Juni.

Sonst war auch die Wurzel, jetzt ist nur das Kraut officinell; die erstere wird im April eingesammelt, ist nach dem Trocknen schwarz, und noch wirksamer als das Kraut, welches im Mai eingesammelt wird. Beide, besonders die Wurzel, enthalten frisch einen gelben Saft, und besitzen einen scharf bittern, brennenden Geschmack und unangenehmen Geruch, die aber beide durch das Trocknen meistens vergehen. Der Saft der beim Durchschneiden des Stengels und der Blattstiele in Tropfen hervordringt, ist ätzend und bitter. Dieser Milchsaft ist von goldgelber Farbe, hat einen anfangs

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0274-9

süßlichen, gleich darauf aber scharfen Geschmack. Er reagirt weder alkalisch noch sauer, und trocknet an der Luft zu einer braunen Masse ein. Das Wasser löst davon einen großen Theil auf, und färbt sich stark gelb; Weingeist fällt daraus eine geringe Menge fast farblosen Schleims. Den ausgetrockneten Saft löst der Weingeist bis auf einen geringen braunen Rückstand mit goldgelber Farbe auf; Wasser fällt nur weniges Harziges daraus, ohne die goldgelbe Farbe zu verändern.

Das über frisches Kraut abdestillirte Wasser ist ohne Schärfe.

Godefroy (Trommsd. N. J. XI. 1. S. 83., Geiger's Magazin März 1825. S. 274. und Buchn. Repert. XXI. S. 403.) hat einige Versuche über das Schöllkraut, die keineswegs erschöpfend genannt werden können, angestellt. Er erhielt dadurch, daß er den ausgepreßten Saft oder auch die Abkochung mit Ammoniak versetzte, einen leichten, flockigen Niederschlag von dunkelgrauer Farbe, der aber zuletzt mehr braun wurde. Alkohol wurde von demselben citronengelb gefärbt, und ließ beim freiwilligen Verdunsten kleine körnige Krystalle niederfallen. Die Lösung sowohl als die Krystalle hatten einen rein bittern Geschmack, dem des Chinins gleichend, obgleich etwas davon verschieden, auch fühlten sich diese Krystalle ganz anders an, als das Chinin. Ob sie alkalisch reagirten, wurde nicht geprüft, mit Säuren gaben sie aber braun oder orangegelb gefärbte, sehr sauer und bitter schmeckende krystallisirbare Verbindungen. Diese Substanz konnte ohne alle Gefahr eingenommen werden. Dagegen zeigten sich das scharfe, flüchtige Princip, welches das bei der Destillation des frischen Krautes übergehende concentrirte Destillat milchig färbte, und ihm einen beißend scharfen Geschmack ertheilte, so wie auch das durch Digeriren des ausgepreßten Krautes mit Alkohol erhaltene dunkelgrüne Harz allein gefährlich, indem auch die extractartige Substanz, eben so wie die durch Ammoniak niedergeschlagene Materie ohne Gefahr verschluckt werden konnten. Außerdem enthält die Pflanze noch Stärkemehl und eine bassorinartige Substanz.

Eine ausführliche Analyse dieser Pflanze verdanken wir Herrn L. Meier (Berl. Jahrb. XXIX. 2. 1827.), nach welcher als Bestandtheile von 2500 Gran gefunden wurden: Pflanzeneiweiß 85; Gummi, sich dem gummigen Extractivstoffe nähernd, mit kohlensaurem, salzsaurem, schwefelsaurem Kali, phosphorsaurer Magnesia, schwefelsaurem Kalke und Kieselerde 80; Bassorin 48; thierisch-vegetabilische Materie 50; süßer Extractivstoff mit salpeters., schwefels. und salzs. Kali, citronens. Kalkerde, freier Aepfelsäure, äpfels. und phosphors. Kalkerde und Magnesia 227; muriatischer Stoff mit salpers., salzs. und äpfels. Kali 780; reiner muriatischer Stoff 74; Harz 140; Holzfaser 925; salzs., schwefels., kohlens. Kali, salzs. kohlens. Kalkerde, phosphors. Magnesia, Eisenoxyd, Manganoxyd, Kieselerde und Thonerde 74; Verlust 17. S. = 2500 Gran.

Der muriatische Stoff zeichnet sich durch eine rothgelbe Farbe aus, zerfließt an der Luft, ist in der gewöhnlichen Temperatur der Luft geruchlos, in der Wärme aber stößt er einen höchst betäubenden Geruch aus; sein Ge-

schmack ist intensiv bitter. In Wasser und in Weingeist von jeder Stärke, so auch in Aether ist er leicht auflöslich. Durch Salpetersäure wird er in Kleesäure verwandelt. Seine letzten Bestandtheile sind Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff.

Uebrigens scheint diese gelbrothe Substanz nur der Träger eines muriatischen Princips, und dieses selbst flüchtiger Natur zu seyn.

Aehnlich in seiner arzneilichen Wirkung ist das im südlichen Europa einheimische, sonst auch in den Officinen vorhandene **Chelidonium Glaucium Linn.**, oder **Glaucium flavum Decand.** Nach einer Analyse der Herren Chevallier und Lassaigne (Buchn. Repert. IV. 1818. S. 399.) enthält diese Pflanze: 1) eine harzige Substanz von bitterm Geschmacke und dunkelgelber Farbe; 2) einen gummiharzigen Stoff von einer orangerothen Farbe und einem bittern, ekelhaften Geschmacke; 3) citronensauren Kalk; 4) phosphorsauren Kalk; 5) freie Aepfelsäure; 6) salpetersaures und salzsaures Kali; 7) eine schleimige Substanz; 8) Kieselerde; 9) Eiweißstoff.

Das Schöllkraut wird fast nur im frischen Zustande zur Bereitung des Extracts benutzt.

Chenopodium ambrosiacum sive Botrys mexicana. Das Kraut. Mexikanisches Taubenkraut.

Chenopodium ambrosioides Linn. Eine einjährige mexikanische Pflanze, die bei uns in Gärten gezogen wird.

Das blühende Kraut von unangenehmem Geruche und aromatischem Geschmacke, mit einfachen beblätterten Blüthentrauben, lancettförmigen, entfernt gezähnten, scharfen Blättern. Im Monat Juli einzusammeln.

Chenopodium ambrosioides Linn. Wohlriechender Gänsefuß.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 6. Chenopodeae.

Diese Pflanze ist ursprünglich in Mexiko zu Hause, kommt aber auch in unsern Gärten gut fort.

Aus einer einjährigen, weißen, ästigen, fasrigen Wurzel erhebt sich ein ebenfalls ästiger, 1—2 Fuß hoher, nach oben gefurchter und mit einzelnen weißen Haaren besetzter Stengel. Die Blätter laufen in einen kurzen Blattstiel herab, sind lancettförmig und buchtig-gezahnt; die obere Seite ist glatt, auf der unteren finden sich zerstreute, glänzende, punktirte Drüsen und einzelne kurze Haare auf den Rippen. Die Blätter an den Aestchen sind viel kleiner und ganzrandig. Die Blüthen sind sehr klein, und sitzen, in dichte Köpfchen zusammengehäuft, in den Winkeln der Blätter, sowohl am Stengel, als an den Aesten desselben. Der kleine grüne Kelch (die einfache Blüthenhülle) ist aus fünf Blättchen gebildet. Die Frucht ist einsaamig.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0276-1

In günstigem Boden wird die Pflanze über 2 Fuß hoch und treibt dann vom Grunde an zahlreiche sparrigabstehende Aeste, die bis in den Spätherbst mit Blüthen bedeckt sind.

Die vor dem Aufblühen der Pflanze eingesammelten Blätter besitzen einen starken, durchdringenden und ganz eigenthümlichen angenehmen Geruch und einen schwach aromatischen Geschmack. Sie geben bei der Destillation ein ätherisches Oel von blaßgelber Farbe und starkem gewürzhaftem Geruche, dem des Pfeffermünzöls ähnlich, welches in der Kälte zu einer campherartigen Masse gesteht. Außerdem enthalten sie ein weiches Harz von dunkelgrüner Farbe, Extractivstoff, Gummi, Schleim und viel Salpeter, welcher aus dem Extracte herauskrystallisirt.

Früher sind auch die Blätter von dem eichenblättrigen Gänsefuß (**Chenopodium Botrys L.**), einer im mittägigen Europa einheimischen Pflanze, die länglich ausgeschweift, hellgrün, mit kurzen Haaren besetzt und runzlig sind, im Gebrauche gewesen, jetzt aber durch das vorhergehende Kraut fast ganz verdrängt. Sie haben gleichfalls einen aromatisch-flüchtigen, aber schwächern Geruch, und einen schwach bittern und weniger scharfen Geschmack, enthalten ein ähnliches ätherisches Oel und viel Salpeter.

Das Kraut wird im Aufgusse verordnet, giebt aber auch mit Weingeist ausgezogen eine kräftige Tinctur.

Chinarinden *).

Unter Chinarinden versteht man im eigentlichen Sinne allein die Rinden der zu dem Geschlechte **Cinchona** *gehörenden Bäume, welche bis jetzt nur auf dem festen Lande von Südamerika gefunden sind; uneigentlich führen auch die Rinden der dem* **Genus Cinchona** *verwandten Geschlechter,* **Exostemma, Cosmibuena** *u. s. w. den Namen Chinarinden und kommen als* **China nova etc.** *im Handel vor.*

Der Chinabaum soll von den Eingebornen Perus **Guannanaperis** und **Gannaparis** genannt werden. Von den Spaniern wurde der Baum, oder auch vielleicht die Rinde, in den ersten Zeiten **Palo de Calenturas** oder **Legno de Calenturas de Lima in Peru** genannt, welches in den andern Sprachen mit **Lignum febrium, Lignum febris, Lignum antifebrile, Bois de fièvres,** Fieberholz, wiedergegeben wurde. Zu La Condamine's

*) Dieses für die Arzneikunde so äußerst wichtige Mittel ist zwar seit vielen Jahren mit großer Vorliebe von den ausgezeichnetsten Naturforschern bearbeitet worden, dennoch müssen wir gestehen, daß noch viele Ungewißheiten hierüber obwalten. Ohne Mittel zu einem eigenen Urtheile, hielt ich es für das Gerathenste, bei Abfassung dieses Artikels durchweg die Monographie der China von Herrn von Bergen zum Grunde zu legen, welche nicht nur das neueste Werk über diesen Gegenstand, sondern auch in wissenschaftlichem Geiste und mit großen praktischen Kenntnissen abgefaßt ist. Wegen ausführlicherer Nachricht, Literatur u. s. w. muß ich daher auf dieses Werk verweisen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0277-7

Zeit (um 1738) war jene Benennung Palo de Calenturas nicht mehr gebräuchlich, und man nannte damals den Chinabaum Arbol de la Cascarilla, d. h. Rindenbaum.

Die Zeit, in welcher die China zuerst nach Europa gebracht worden, wird gemeiniglich von den ältesten Schriftstellern, denen auch Alex. v. Humboldt folgt, in das Jahr 1640 gesetzt; v. Bergen hat es wahrscheinlich gemacht, daß die China schon im Jahre 1632 nach Spanien gekommen, aber kein Versuch zu einer medicinischen Anwendung mit ihr gemacht worden sey. Ueber die Art aber, wie die Heilkraft der China zuerst entdeckt worden sey, ist keine Gewißheit vorhanden. De la Condamine erzählt eine alte Sage, nach welcher amerikanische ungemähnte Löwen die erste Ursache der Entdeckung gewesen seyn sollen, indem sie, mit einer Art Wechselfieber behaftet, instinctmäßig von dieser Rinde gekaut hätten und geheilt worden seyen. Humboldt bemerkt aber, daß der die Wärme liebende große amerikanische Löwe (Felis concolor) sich gar nicht in der Region der Fieberbaumwälder fände, die Annahme auch gewagt sey, daß dieser Löwe an dem Fieber erkranken könne. Godefroy sagt, es wären einige Fieberrindenbäume vom Winde umgeworfen in einen Sumpf gefallen, und hätten dem Wasser eine solche Bitterkeit mitgetheilt, daß niemand davon trinken konnte, bis endlich ein Eingeborner, am heftigsten Fieber leidend und kein anderes Wasser findend, seinen Ekel überwunden, und von diesem Wasser getrunken habe, hierauf geheilt worden sey, und seine Mitbrüder mit den Heilkräften der Fieberrinde bekannt gemacht habe. Den Eingebornen sey daher, nehmen Sebastian Badus und Arrot an, die Heilkraft der China gegen Wechselfieber bekannt, und von ihnen gegen diese in ihrem Lande sehr häufige Krankheit gebraucht, aus Haß gegen ihre spanischen Unterdrücker aber geheim gehalten worden. Dieser Annahme pflichtet auch La Condamine bei, wobei er jedoch bemerkt, daß die China in ihrem Vaterlande ungemein gering geachtet und wenig benutzt werde, womit auch die 60 Jahre später angestellten Nachforschungen Alex. v. Humboldt's ziemlich übereinstimmen. Dieser Gelehrte sagt ferner, es herrsche in Loxa nicht nur keine Tradition, welche die Entdeckung der Heilkraft der China den Eingebornen zuschreibe, sondern es sey auch nicht einmal wahrscheinlich, daß solche den amerikanischen Urvölkern angehöre, welche mit unabänderlicher Beharrlichkeit an ihren Speisen und Heilmitteln hängen, und in Loxa, Guancabamba und weit umher den Gebrauch der Fieberrinde ganz und gar nicht kannten, so daß selbst in den tiefen und heißen Gebirgsthälern von Catamajo, wo die Wechselfieber überaus gemein sind, die Einwohner lieber sterben, als daß sie den Entschluß fassen sollten, China zu nehmen, welche sie mit den brauderregenden Giften in eine Classe setzen. Humboldt berichtet ferner, daß in Loxa die alte Sage ginge, die Jesuiten hätten beim Holzfällen nach Landessitte die verschiedenen Baumarten durch das Kauen ihrer Rinden unterschieden, und wären dabei auf die große Bitterkeit der Chinarinden aufmerksam geworden. Da nun unter den Missionarien immer Arzneikundige waren,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0278-2

so hätten diese den Aufguß der Rinde bei der gewöhnlichen Krankheit der Gegend, dem Tertianfieber, versucht.

De la Condamine und nach ihm Hippolit Ruiz, welcher letztere im Jahr 1777 auf Befehl des spanischen Hofes eine botanische Entdeckungsreise nach Peru unternahm, erzählen dagegen über das Bekanntwerden der lange angewandten Fieberrinde Folgendes, welches sie von glaubwürdigen Personen sehr oft gehört hätten. Im Jahr 1636 habe ein Indianer der Provinz Lora dem Corregidor von Lora, Don Juan Lopez de Cannizares, der an einem kalten Fieber krank lag, die guten Eigenschaften der Chinarinde angerühmt. Der Corregidor, sich nach baldiger Wiederherstellung sehnend, ließ sich von diesem Indianer etwas von der Rinde, nebst der Verfahrungsart sie zu gebrauchen, geben. Er befolgte die gegebene Vorschrift, welche darin bestand, daß die Rinde mit einer beliebigen Menge kaltem Wasser übergossen oder darin gekocht, und hievon zu wiederholten Malen getrunken werden sollte, und genas in wenigen Tagen von seiner langwierigen Krankheit.

Als der Corregidor hierauf im Jahr 1638 vernahm, daß die Vicekönigin von Peru an einem dreitägigen Fieber krank liege, schickte er ihrem Gemahl Don Geronimo Fernandez de Cabrera, Bombadilla y Mendoza, Grafen von Chinchon, von dieser Rinde, nebst einer Anzeige ihrer Wirkung und der Verfahrungsart, sie zu gebrauchen. Der Vicekönig ließ in den Hospitälern von Lima mehrere Versuche damit anstellen, und da alle dem eingeschickten Berichte entsprachen, ließ er auch seine Gattin davon gebrauchen, welche vollkommen genas. Von den damals wunderbaren Heilkräften der Rinde überzeugt, ließ nun die Gräfin einen großen Vorrrath von Lora kommen, und unentgeltlich austheilen, woher zuerst das Pulver dieser Rinde den Namen „Pulver der Gräfin", Pulvis Comitissae (del Chinchon) erhielt. Durch Zusammenstellung mit dem Worte Cortex ist hieraus Cortex Chinchonae, Cortex Cinchonae gebildet worden, und auch Linné bezeichnete das Geschlecht der Fieberrindenbäume mit dem Namen Cinchona (eigentlich Chinchona).

Nach der Rückkehr des Grafen von Chinchon nach Europa, der eine bedeutende Quantität Fieberrinde mitbrachte, scheint nach Villerobel's Behauptung dieselbe doch nicht sehr schnell in Ruf gekommen zu seyn, obgleich die erste im Jahr 1639 mit der China gemachte Probe gut ausfiel. Doch erschien schon 1642 eine eigene Schrift über die Fieberrinde, vielleicht die erste über diesen Gegenstand, von Barba, Professor der medicinischen Facultät zu Valladolid. Die erste allgemeine Verbreitung der China kann wohl den spanischen Jesuiten zugeschrieben werden, welche von ihren Ordensbrüdern bedeutende Quantitäten dieser Rinde zugeschickt erhielten, und den Ruf derselben begründeten. Dieses Verdienst theilten sehr bald die Jesuiten in Italien, und besonders der Cardinal Juan de Lugo, ein Spanier von Geburt, so daß Rom für eine Zeitlang der allgemeine Stapelplatz für das neue Fiebermittel wurde. Als nun im Jahr 1649 und 1650 der

Pater-Provincial der Jesuiten einen starken Vorrath Rinde aus Amerika mitbrachte, und gerade zu derselben Zeit ein Conventikel des ganzen Ordens gehalten wurde, so fehlte es nicht an Gelegenheit, durch die in ihre Heimath zurückkehrenden Ordensbrüder Chinapulver über ganz Europa zu verbreiten, welches nun die Namen Pulvis Cardinalis, Cardinalspulver, Pulvis Jesuiticus, Pulvis Patrum führte. Doch war in Rom auch der Name China febris gebräuchlich.

Der durch diese weitere Verbreitung immer mehr und mehr begründete Ruf der China wurde im Jahr 1653 von Chifletius, erstem Leibarzte des Erzherzogs von Oestreich, Leopold, Gouverneurs der Niederlande, welcher letztere von einem doppelten Quartanfieber befallen, und durch die China nur temporär geheilt worden war, mit Heftigkeit angegriffen, und das von ihm über diesen Vorfall verfaßte Werk mit großem Beifall aufgenommen. Als Vertheidiger der China traten zwar Sebastian Badus und Roland Sturm auf, doch fehlte es auch nicht an neuen Gegnern, so daß der Gebrauch der China sich fast nur auf den Kirchenstaat beschränkte. Dieser beschränkte Gebrauch wurde aber auch durch die Seltenheit, durch den früheren starken Verbrauch herbeigeführt, und durch den damit im Zusammenhange stehenden hohen Preis der China begründet, und nach Sturm stand sie im Jahr 1650 so hoch im Preise, daß sie kaum mit Gold aufgewogen werden konnte. In Rom selbst wurde das Pfund Rinde mit einem Pfunde Silber bezahlt. Gegen Ende des Jahres 1658 wurde indessen schon öffentlich angezeigt, daß ein antwerpner Kaufmann, J. Thompson, die Fieberrinde mitgebracht habe und solche verkaufe. Im Jahr 1664 findet sich schon zu Lyon der Zoll auf die China mit 3 Sous für das Pfund festgesetzt, woraus hervorgeht, daß dieser im Zolltarif aufgenommene Artikel nicht mehr zu den Seltenheiten gehört habe.

Der Engländer Robert Talbor, der Anfangs Lehrling bei einem Apotheker war, nachher aber, jedoch wahrscheinlich nur kurze Zeit, zu Cambridge studirte, verhalf durch sein geheimes Fiebermittel, welches eigentlich aus nichts als aus China bestand, dieser zu erneuertem großen Ruhme, sich selbst aber zu einem sehr großen Vermögen. Talbor begann seine Fiebercuren zuerst an der Seeküste in Essex mit solchem Erfolge, daß er bald nach London berufen wurde, wo er sich 1671 förmlich niederließ. Der Ruf des Talbor'schen Fiebermittels lenkte nun wieder die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die durch Verfälschung mit andern Rinden in Mißcredit gerathene Chinarinde, welches noch mehr der Fall war, als Talbor'n am französischen Hofe die Heilung des fieberkranken Prinzen Condé und des Finanzministers Colbert glücklich gelang. Zweifelhaft ist die Angabe, daß um das Jahr 1679 der Dauphin, Sohn Ludwig's XIV., am kalten Fieber gelitten habe, und kein pariser Arzt ihn habe heilen können; man habe also Talbor'n nach Paris berufen, welcher den Dauphin hergestellt habe.

Der Ruf der China wurde durch dergleichen glückliche Curen so vollkommen wieder hergestellt, daß La Fontaine im Jahr 1682 ein Gedicht

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0280-2

über die China (Poëme du Quinquina) herausgab, in welchem ausdrücklich der Heilung Condé's und Colbert's, jedoch nicht des Dauphins, Erwähnung geschieht, was ohne Zweifel geschehen wäre, wenn die Sache sich wirklich so verhalten hätte. Nach einigen Schriftstellern wurde Talbor'n von Ludwig XIV. das Geheimniß seines Fiebermittels, Behufs der öffentlichen Bekanntmachung, für 2000 Louisd'or und eine Jahresrente von 2000 Livres abgekauft, auch dem Erfinder die Ritterwürde ertheilt, und ein zehnjähriges Monopol zum Verkaufe seines Heilmittels bewilligt, wovon eine einzige Dosis zu Paris einen Louisd'or, ein Pfund 100 Louisd'or gekostet haben soll. Hierdurch wird es leicht erklärlich, daß Talbor, der im Jahr 1681 starb, außerordentliche Schätze hinterließ.

Die botanische Kenntniß des Chinabaums beginnt erst mit La Condamine, also 100 Jahre nach ihrer Einführung in Europa. Dieser Gelehrte, eigentlich Mathematiker, war mit einigen andern Gelehrten von der französischen Regierung nach Südamerika gesandt worden, um dort die Länge einiger Grade des Meridians von Quito zu messen, umfaßte aber, wie Humboldt sagt, alle Theile des menschlichen Wissens mit unbeschreiblicher Lebhaftigkeit. La Condamine reiste am 29. Mai 1737 von Quito nach Lima ab, und die erste ziemlich vollständige Beschreibung des Chinabaums, welche auch Linné bei seiner Aufstellung des Genus Cinchona zum Grunde legte, erschien von diesem Gelehrten 1738 in den Memoiren der königl. Akademie der Wissenschaften. Er leitet übrigens den Namen Quina aus der sogenannten Quichoasprache (der Sprache der alten Peruaner zur Zeit der Inkas) ab, in welcher das Worte Quina mit dem spanischen Worte Mantenilla gleichbedeutend sey, bei der Armuth jener Sprache aber vermuthlich, wenn von einem Baume die Rede gewesen sey, die Rinde — den Mantel des Baumes — bedeutet habe; Quina Quina heiße demnach so viel als die Rinde aller Rinden, vortreffliche Rinde.

Auf La Condamine folgte 1739 Joseph v. Jussieu, welcher gleichfalls die Gegenden um Loxa besuchte, auch seine botanischen Excursionen etwas nordwestlich von Loxa ausdehnte. Jacquin, welcher sich in den Jahren 1754 bis 59 in Westindien aufhielt, entdeckte außer den bis dahin aufgefundenen zwei Arten von Cinchona, nämlich die jetzige Condaminea Humb. und die cordifolia Mutis, welche beide damals aber zusammen von Linné unter der Benennung Cinchona officinalis begriffen waren, auf Cuba und St. Domingo eine neue Art, die er C. caribaea nannte. Diese und C. floribunda Swartzii sind die beiden merkwürdigsten der auf den Antillen vorkommenden Arten. Nach und nach boten die westindischen Inseln, die Südsee und selbst Ostindien mehrere Chinaarten dar, die jedoch später von den eigentlichen Chinabäumen getrennt, und deren Rinden auch zur arzneilichen Anwendung als Chinarinden unbrauchbar befunden worden sind. Im südlichen Amerika sind jedoch nach und nach manche neue Arten aufgefunden worden, welche als sehr wirksam anerkannt sind.

Nach v. Humboldt's Versicherung kam von 1738 bis 1776 keine an-

dere Fieberrinde in den Handel, als die des Corregiments von Loxa und der zunächst gelegenen Gegenden. Man ahnete gar nicht, daß es in dem nördlich vom Aequator befindlichen Theile Südamerikas auch Chinabäume geben könne, bis ein glücklicher Zufall einen Mann, der lange Zeit wegen der ökonomischen Verhältnisse des Chinaschälens in Loxa gelebt hatte, auf seinem Rückwege nach Spanien über Popayan nach Santa Fe de Bogota führte. Es war dies der Obermünzdirector Don Miguel de Santistevan, der ohne alle botanischen Kenntnisse nach dem bloßen Habitus die Chinabäume von Loxa ab bis zu $2\frac{1}{2}$ ° N. B. entdeckte.

Im Jahre 1772 entdeckte Don Jozè Celestino Mutis die Chinarinde um Santa Fe, welche Entdeckung er zwar noch ausdehnte, jedoch nicht ahnete, daß die Chinabäume bald bis zum 10 ° N. B. würden aufgefunden werden. Die entdeckten neuen Arten wurden von ihm botanisch untersucht und beschrieben, nämlich C. lancifolia, cordifolia, oblongifolia und ovalifolia. Durch diese und andere in Neu-Grenada entdeckten Cinchonen wurde nicht nur dem Mangel an China abgeholfen, sondern auch die Verschiffung nach Europa, welche früher allein aus den Häfen der Südsee um das Cap Horn herum geschehen konnte, dadurch erleichtert, daß diese China aus den Häfen von Carthagena und Santa Marta, also auf geradem Wege, verschifft werden konnte.

Ruiz und Pavon, die Herausgeber der Flora Peruviana, besuchten die schönen Thäler von Tharma, Xauxa und Huamalies, und bestimmten 1779 die botanischen Charaktere der nordperuanischen Species. Zu der im Jahr 1792 von Ruiz herausgegebenen Quinologia schrieben Ruiz und Pavon im Jahr 1801 einen Supplementband.

Seit dem Jahre 1780 wurde nun Europa auf allen Seiten mit Fieberrinden von allen Sorten überströmt, unter welche theils Rinden von westindischen Cinchonaarten, theils mit Brasilienholzdecoct gefärbte Rinden von Bäumen, die gar nicht einmal zu dem Genus Cinchona gehörten, gemengt worden.

In der neuern Zeit hat vorzüglich Alexander v. Humboldt zur Erweiterung und Berichtigung unserer Kenntnisse über die Chinaarten beigetragen, und die Ergebnisse seiner mit Bonpland in den Jahren 1799 bis 1803 unternommenen Bereisung Südamerikas zum Theil in seinem großen Werke, zum Theil in dem Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1807 niedergelegt. In der neuesten Zeit sind von Aug. Saint Hilaire auch in einigen Gegenden Brasiliens wahre Cinchonen aufgefunden worden, nämlich C. ferruginea, Vellozii und Remijiana, welche auf den Hochebenen von Minas Geraës, 3000 Fuß hoch, im gemäßigten Klima, zwischen dem 18. und 22. Grade S. B. wachsen. Wo sie erscheinen, sieht man sie, was sehr merkwürdig ist, als sichere Vorboten von Eisenlagern an. Auch soll Dr. Chapotin eine Art Cinchona auf Isle de France entdeckt und unter dem Namen C. Mauritiana beschrieben haben.

Merkwürdig ist es hiebei, daß man bis auf den heutigen Tag keine

einzige Cinchone, ja nicht einmal ein Exostemma, weder auf den Bergen von Silla de Caracas, noch auf den waldbewachsenen Bergen von Caripé des französischen Guajana gefunden hat. Daß man auch, bis jetzt wenigstens, gar nichts von den Gattungen Cinchona und Exostemma auf den Hochebenen Mexikos und in den östlichen Provinzen von Südamerika, nördlich vom Aequator, angetroffen hat, muß um so mehr auffallen, da doch Exostemma auf den Antillen gefunden ist. Die Cinchonen der Cordilleren rücken auf dem nördlichen Theile nicht weiter nach Osten, als bis zum 72 ° W. L. von Paris, also bis zum Glimmerschiefergebirge der Sierra Nerada von Merida vor.

Ueber die Region, in welcher die Chinabäume vorkommen, ist nach Humboldt zu bemerken, daß, wenn von der Meeresfläche ab bis etwa 3000 Fuß hinauf die Region der Palmen und Pisanggewächse angenommen werden muß, in welcher auch viele schöne Lilien, Windenarten, Cactus, der Balsambaum und eine Menge anderer tropischer Pflanzen gedeihen, unmittelbar auf diese bis etwa zur Höhe von 4800 Fuß die Region der baumartigen Farrnkräuter folgt, welche zugleich die der Fieberinden ist, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Cinchonen zum Theil bis zur Höhe von 9600 Fuß hinaufsteigen. So scheuen die orangefarbene und gelbe Fieberrinde (Cinchona lancifolia (?) und cordifolia Mutis) die Bergkälte so wenig, daß sie bis 9050 Fuß über der Meeresfläche angetroffen werden, wo das Thermometer fast bis zum Eispunkte herabsinkt. Dagegen ertragen die rothe China (C. oblongifolia?), die ungleichblüthige (C. dissimiliflora) und die prachtvolle C. longiflora das heiße Klima am leichtesten.

Die Cinchonaarten sind 700 Meilen lang, vom 20 ° S. B. bis zum 11 ° N. B., auf der Andeskette gruppenweise vertheilt. (Nach von Humboldt ist der eigentliche Name nicht Andes sondern Antis, von Anta, was in der Quichoasprache Kupfer bedeutet.) Der ganze östliche Abfall dieser Ketten, südlich von Huanuco, ist ein zusammenhängender Chinawald. Von den hohen Gebirgsebenen von La Paz verbreitet sich das Chinagebüsch nördlich durch die peruanischen Provinzen Guailas und Huamalies bis Huancabamba und Loxa. Ein Arm dieses Gebüsches läuft gegen Osten durch die Provinz Jaen, wo die Uferhügel des Maranon mit Cinchonenstämmen bekränzt sind. Von den anmuthigen Thälern um Loxa an, dem Garten der andesischen Gebirge, erstreckt sich die Fieberrinde durch das Königreich Quito, Cuenca und Alausi. Der westliche Abhang des Chimborasso ist reichlich damit bedeckt, aber auf dem hohen Plateau von Rhiobamba und Quito, wie auf dem der Provinz Pasta bis Almaguer hin scheint dieses köstliche Product gänzlich zu fehlen. Nördlich von Almaguer, in der Provinz Popayan, findet man beide Abhänge der Andeskette auf einmal wieder mit Chinagebüschen geschmückt. Fast ununterbrochen verbreiten sie sich bis zu dem meernahen Gebirge von Santa Marta und Merida, in dem heiße Schwefelquellen unter ewigem Schnee hervorbrechen.

Linné kannte nur zwei Species, Cinchona officinalis und caribaea,

welche aber durch die seitdem gemachten Entdeckungen so vermehrt worden sind, daß v. Bergen in seiner Monographie 27 Cinchonen und 17 Exostemmen aufführt. Doch ist es noch nicht als entschieden anzusehen, daß alle diese Species wirklich eigene Arten sind, indem, wie Humboldt bemerkt, ihm kein Baum bekannt ist, der in der Gestalt seiner Blätter so sehr variirt, als die Cinchona; so habe er Cinchona pubescens Vahl zugleich foliis ovatis, oblongis, ovato-lanceolatis und ovato-cordatis gefunden.

Die Cinchonen gehören in

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XI. Ord. 2. Rubiaceae.

1) Cinchona Condaminea Humb. et Bonpl. Condamine'scher Fieberrindenbaum.

Dieser hohe, zierliche, immergrüne Baum wächst in Peru auf den Bergen Caranuma, Urituſinga, del Montje bei Loxa ꝛc., ferner bei Huancabamba und Ayavaca, in einer Höhe von 5400 bis 7200 Fuß; er liebt ein etwas mildes Klima, eine Temperatur von ungefähr 16 ° R. Aus jedem Einschnitte in den Baum quillt ein gelber zusammenziehender Saft. Der Stamm ist aufrecht, 12—18 Fuß und drüber hoch, ungefähr einen Fuß im Durchmesser. Er trägt gegenüberstehende, aufrechte, rundliche Aeste, und ist mit rauher, narbiger, aschgrauer, in die Quere rissiger Rinde bedeckt. Die gestielten gegenüberstehenden, drüsigen Blätter sind länglich, an beiden Enden spitz, ganzrandig, auf beiden Flächen grün, mit einigen rothen Adern, etwas lederartig glänzend. Die Blätter variiren außerordentlich, ehe der Baum zur Blüthe kommt. Bei einem Baume, der zum erstenmale blüht, sind die recht ausgewachsenen Blätter, ohne den Blattstiel, 4 Zoll 3 Linien lang und 1 Zoll 9 Linien breit. Die jungen Blätter erreichen aber oft die Länge von 5 Zoll und die große Breite von 4 Zoll 7 Linien. Je älter der Baum wird, desto schmälere Blätter trägt er. Auch nach der Region, in welcher der Baum wächst, variiren die Blätter, und erscheinen oft ganz verschiedenartig, so daß selbst die Chinaschäler getäuscht werden würden, wenn sie den Baum nicht an den Drüsen erkennten. Die Blüthen stehen in dreitheiligen Rispen; der Kelch ist becherförmig, fünfzähnig; die Blumenkrone präsentirtellerförmig, seidenartig, einblättrig, rosenfarbig oder roth, mit fünfseitiger Röhre, und fünf-, sehr oft nur vierspaltigem Rande. Die Frucht ist eine zweifächerige, vielsaamige Kapsel.

Dieser Baum ist Jahrhunderte lang von den Chinaschälern auf das unbedachtsamste verfolgt, und dadurch, wie Humboldt berichtet, so selten geworden, daß man selbst in den berufenen Chinawäldern von Caranuma und Urituſinga während einer Tagereise oft nur wenige Stämme davon sieht. Jetzt (1807) werden auf Befehl der Regierung nur wenige Bäume dieser Species (vielleicht kaum 900) jährlich gefällt, während man vor 1779 oft in einem Jahre 25,000 zerstörte.

2) Cinchona lancifolia Mutis. Lancettblättriger Fieberrindenbaum.

Quina Naranjanda. Quinquina orangé.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0284-5 DFG

Bei keiner Cinchona weichen die Meinungen der Botaniker, ob sie als Art oder Abart anzusehen sey, so sehr von einander ab, als bei dieser. V. Humboldt sagt von derselben, daß sie nächst der C. Condaminea die fieberheilendste aller Chinaarten sey. Sie liebt ein rauhes Klima, und wächst zwischen dem 4. und 5. Grade N. B. auf Gebirgsabhängen, die 4200 bis 9000 Fuß hoch sind, bei einer mittlern Temperatur von 13 ° R. Sie gehört mit der C. Condaminea zu den seltneren Chinaarten. Der Stamm ist 30—40 Fuß hoch, die Rinde braunröthlich, meist in die Quere rissig, innen gelbröthlich. Die Blätter sind länglich, spitz, nach der Basis verschmälert, ganz kahl, glänzend; die Blumenrispe armförmig, der Kelch glockenförmig, die Blumenkrone weiß oder rosenfarben.

Die Beschreibungen der hier folgenden C. lanceolata und nitida sind aus der Flora Peruviana genommen.

α) **Cinchona lanceolata Ruiz et Pavon.** Wächst auf hohen, kalten und waldbewachsenen Bergen der Andeskette in der Gegend von Muña, Panao, Pillao und Cuchero; ist 36 Fuß hoch, glatt und hat eine weit ausgebreitete sehr belaubte Krone. Die Rinde ist auf der Außenseite braun, etwas gescheckt, kaum scharf, auf der Innenseite gelblich, von Geschmack sehr bitter, säuerlich, nicht unangenehm. Die Blätter sind gestielt, gegenüberstehend, länglich-lancettförmig und eirundlänglich, ganzrandig, auf beiden Flächen ganz kahl, unten geadert mit rothen Adern. Die zusammengesetzte Blumenrispe ist groß, armförmig; der Kelch ins Purpurrothe, fünfzähnig und bleibend; die Blumenkrone rosenroth ins Purpurrothe.

β) **Cinchona nitida Ruiz et Pavon.** Wächst auf kalten, hohen und waldbewachsenen Bergen der Andeskette, in den Gegenden um Pampamarca, Chacahuassi, Casape, Casapillo ꝛc. und auf den Bergen der Provinzen Huamalies, Tarma und Xauxa. Der Stamm ist 20—80 Fuß hoch, nur dann und wann einzeln, gewöhnlich 3—5 Stämme aus einer Wurzel, aufrecht, von einander stehend. Die Rinde glatt, scharf, braun ins Schwärzliche, oft braun und aschfarbig gescheckt, innen gelbbraun, von Geschmack sehr bitter, säuerlich, nicht unangenehm. Die Blätter sind verkehrt-eiförmig, ganzrandig, sehr glänzend, flach, unten geadert; einige sind elliptisch-länglich oder eiförmig-länglich, 1—2 Handbreit lang. Die Blumenrispe etwas traubenförmig, 2—3 Handbreit groß; der Kelch purpurroth, die Blumenkrone weiß, nach Außen schwach purpurroth.

3) **Cinchona cordifolia Mutis.** Herzblättriger Fieberrindenbaum.

Sehr verwandt mit C. pubescens Vahl.

Dieser Baum wächst auf den bergigen Waldungen um Loxa im Königreiche Quito, und im Königreiche Neu-Grenada, wo Mutis ihn fand, in der Höhe von 5400—8700 Fuß. Die Blätter rundlich-eiförmig, spitz, an der Basis herzförmig oder verschmälert.

4) **Cinchona rotundifolia Pavon.** Rundblättriger Fieberrindenbaum.

In den Waldungen um Loxa im Königreiche Quito. Die Blätter rundlich, auf der Oberfläche nackt und glänzend, auf der Unterfläche behaart.

5) Cinchona ovalifolia Humb. et Bonpl. Ovalblättriger Fieberrindenbaum.

Wächst auf den Anden in Peru bei Cuenca, in der Höhe von 4200—9300 Fuß und in bergigen Waldungen um Loxa im Königreiche Quito. Dieser Baum bildet in der Provinz Cuenca ganze Wälder. Der Stamm ist 18 Fuß hoch, die Rinde, von Humboldt selbst gesammelt, außen aschgrau, beinahe glatt, innen hellgelb, glänzend, und mit einem gelblichen, fast klebrigen Safte überzogen, 2—3‴ dick, und von Geschmack herbe und adstringirend. Sie wird in ihrem Vaterlande nicht sehr geschätzt, man zieht die Rinde der gelben China (C. cordifolia Mut.), welche in derselben Provinz sehr häufig ist, vor. Die Blätter sind eiförmig, 3—6 Zoll lang, auf der Oberfläche nackt und glänzend, auf der Unterfläche geadert und weichhaarig. Die Blumenrispe blendend weiß.

6) Cinchona purpurea Ruiz et Pavon. Purpurfarbiger Fieberrindenbaum.

Cinchona scrobiculata Humb. et Bonpl.

Wächst auf den Anden in waldigen Gegenden um Chinchao, Pati, Muña ꝛc. und auf den peruanischen Anden bei der Stadt Jaen de Bracomoros, in der Höhe von 3000 Fuß, wo er nach Humboldt unermeßliche Wälder bildet. Der Stamm ist 24 Fuß hoch, mit stark belaubter Krone. Die Rinde braun, glatt, nach innen schwach, gelbbraun, bitter, säuerlich, nicht widrig. Von allen Chinarinden, die daselbst wachsen, ist dies die gemeinste, aber auch zugleich die, welche am meisten geschätzt, und womit der meiste Handel getrieben wird. Man giebt ihr den Namen China fina, feine China. Die Blätter sind länglichoval oder eiförmig, ganzrandig, meistentheils drei Handbreit groß, auf der Oberfläche glänzend, auf der Unterfläche geadert, purpurfarbig; auch die Blattstiele purpurfarbig.

7) Cinchona pubescens Vahl. Vahl'scher Fieberrindenbaum.

Cinchona ovata Ruiz et Pavon.

Wächst auf den warmen, niedrigen, waldigen Gebirgen der Andeskette in der Gegend von Pozuzo und Panao, und auch in den Waldungen von Huanuco in Peru, wird 36 Fuß hoch, mit sehr belaubter, abstehender Krone. Die Rinde ist aschfarbiggelblich, wenig dicht, glatt, selten gescheckt, innen dunkel gelbbraun, sehr bitter, säuerlich, sehr widrig. Die Blätter eiförmig, spannenlang, eine Hand breit, ganzrandig, auf der Oberfläche glänzend, auf der Unterfläche filzig mit purpurfarbigen Adern; die Blattstiele purpurfarbig. Der Kelch purpurfarbig, die Blumenkrone außen purpurroth, weichhaarig, innen weiß.

8) Cinchona micrantha Ruiz et Pavon. Kleinblüthiger Fieberrindenbaum.

Wächst auf den hohen, kalten und waldbewachsenen Bergen der Andeskette, in der Gegend des Fleckens St. Anton de Playa Grande; er erreicht eine Höhe von 20—30 Ellen, mit sehr belaubter Krone. Die Rinde ist scharf, braun ins Aschfarbige, sehr bitter, säuerlich; bei den Aesten ist sie

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0286-6

braunschwärzlich. Die Blätter verkehrt eirundoval, ganzrandig, stumpf, undeutlich zugespitzt, meistentheils eine Handbreit lang, oben glänzend, unten purpurfarbig geadert, an den Adern etwas weichhaarig.

9) **Cinchona Humboldtiana Lambert.** Humboldt'scher Fieberrindenbaum.

In den Waldungen bei der Stadt Jaen de Bracamoros in Quito. Blätter lancettförmig, nach beiden Enden spitz, auf der Oberfläche nackt, auf der Unterfläche zottig.

10) **Cinchona Pavonii Lambert.** Pavon'scher Fieberrindenbaum. (sehr ähnlich der *C. macrocarpa* Vahl.)

In den Waldungen bei Loxa in Quito, mit kreisrunden oder herzförmigen, oben nackten, unten rostfarbigfilzigen Blättern, rostfarbigfilzigen Doldentrauben und großen Blumenkronen.

11) **Cinchona macrocarpa Vahl.** Großfruchtiger Fieberrindenbaum.

In den Waldungen bei Loxa, Huaquilla und Cuença, und im Königreiche Grenada. Blätter mehr als handbreit, länglich, fast lederartig, auf der Oberfläche glänzend kahl, auf der Unterfläche dicht scharffilzig, gerippt mit zottigfilzigen Rippen. Kelch weichhaarig, Blumenkrone lederartig, filzig; die Frucht eine zweizollige, filzige, birnförmige Kapsel.

12) **Cinchona Mutisii Lamb.** Mutis'scher Fieberrindenbaum. **Cinchona glandulifera Ruiz et Pavon?**

Bei Loxa in Quito; mit ovalen, an beiden Enden fast spitzen, oben nackten, glänzenden, unten sehr behaarten Blättern.

13) **Cinchona hirsuta Ruiz et Pavon.** Behaarter Fieberrindenbaum.

Auf den waldigen Gebirgen der Andeskette an hohen, kalten Orten um Pillao und Acomajo. Ein 5 Ellen hoher, dünner Baum. Die Rinde auf der Außenseite grauschwarz, braun und aschfarbig gescheckt und scharf; innen gelbbraun, sehr bitter, säuerlich, nicht widerlich. Die Blätter oval, dick, ganzrandig, oben glänzend, unten sehr weichhaarig. Die Blumen doldentraubig, ins Purpurrothe.

14) **Cinchona magnifolia Ruiz et Pavon.** Großblättriger Fieberrindenbaum.

Dieser fast 40 Ellen hohe glatte Baum, mit sehr belaubter aufrechtabstehender Krone, wächst in sehr warmen Waldungen der Anden, an Strömen, sehr häufig um Chinchao, Cuchero und Chacahuasi. Die Rinde beinahe glatt, bräunlich-aschfarbig, innen gelbbraun, bitter, säuerlich, nicht widrig, an den ältesten Aesten braun, an den jüngeren schwach röthlich. Blätter breit, länglich oder oval, ganzrandig, blaßgrün, oben glänzend, unten ins Purpurfarbene fallende Adern mit weißlichen Borstenbüscheln. Die größten Blätter sind 1—2 Fuß lang. Die Blumenrispe sehr groß, fast einen Fuß lang. Der Kelch purpurroth, die Blumenkrone fast zolllang, weiß, wohlriechend.

15) **Cinchona caduciflora Humb. et Bonpl.** Hinfälligblüthiger Fieberrindenbaum.

Humboldt hat diesen 100 Fuß und drüber hohen Baum nur einmal

bei Jaen de Bracomoros gefunden, und bemerkt, daß die Rinde dieses Baumes kein Gegenstand des Handels sey, obgleich sie eine Menge Harz enthalte.

16) **Cinchona oblongifolia Mutis.** Länglichblättriger Fieberrindenbaum.

In den Waldungen der Gebirge um Lora und bei Mariquita in Neu-Grenada, in der Höhe von 1800 bis 7800 Fuß; mit länglichen oder herzförmigen, auf beiden Flächen sehr dicht scharfhaarigen Blättern. (Rothe Chinarinde.)

17) **Cinchona acutifolia Ruiz et Pavon.** Spitzblättriger Fieberrindenbaum.

Ein 20 Fuß hoher Baum, dessen Aeste nur etwas weichbehaart sind, und der in den niedrigen Waldungen der peruanischen Anden am Chicoplayaflusse, Taso genannt, wächst. Blätter ganzrandig, wellenförmig oder fast buchtig, auf der Oberfläche spiegelnd, auf der Unterfläche mit zottigen Rippen.

18) **Cinchona stenocarpa Pavon.** Schmalfrüchtiger Fieberrindenbaum.

Diese Species hat nach Lambert das Ansehn der C. Condaminea, ist aber davon ganz verschieden. Wächst in den Waldungen bei der Stadt Jaen de Bracomoros in Quito; mit lancettförmigen, an beiden Enden spitzen, oben nackten, unten an den Adern behaarten Blättern, und linealen runden Kapseln.

19) **Cinchona dichotoma Ruiz et Pavon.** Gabelspaltiger Fieberrindenbaum.

Ein 18 Fuß hoher, glatter Baum mit gabelspaltigen Aesten. Wächst in den Waldungen der Anden gegen Pueblo nuevo in den Umgebungen des Chicoplaya. Die Rinde braun, etwas scharf, mit weißen Flecken gescheckt, so wie die übrigen Theile des Baumes sehr bitter, säuerlich, nicht widrig. Die Blätter länglich-lancettförmig, flach, ganzrandig, geadert.

20) **Cinchona grandiflora Ruiz et Pavon.** Großblüthiger Fieberrindenbaum.

In den heißen Waldungen der Anden, häufig an den Ufern des Flusses Pozuzo, und im Königreiche Neu-Grenada in der Gegend der Besitzung La Quebrada larga, und an mehrern andern Orten. Ein 18 Fuß hoher, ganz glatter Baum. Die Rinde außen aschfarbig-braun, innen gelblich, etwas bitter. Die Blätter oval oder verkehrt-eirund, sehr stumpf, ganzrandig, lederartig, auf der Oberfläche glänzend, hellgrün, auf der Unterfläche weißlich. Die Doldentraube fast dreißigblüthig, die Blumenkrone glänzend weiß, fast dreizollig, kahl.

21) **Cinchona acuminata Ruiz et Pavon.** Einzelnblüthiger Fieberrindenbaum.

Dieser 5—6 Ellen hohe Baum, mit aschfarbiger, an den Aesten grünlicher Rinde, wächst in den niedrigen Waldungen der peruanischen Anden, in der Gegend des Chicoplaya. Die Blätter länglich, nur etwas gestielt, 2—3 Zoll lang, einen Zoll breit, mit rundlicher Basis und kahl. Die Blumen wohlriechend, schön rosenroth.

22) **Cinchona rosea Ruiz et Pavon.** Rosenblüthiger Fieberrindenbaum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0288-8

Ein 60 Fuß hoher, vollbelaubter, zur Zeit der Blüthe sehr schöner Baum. Wächst in den niedrigen Waldungen der Anden, sehr häufig um Pozuzo und St. Antonio de Playa grande. Die Rinde ist glatt, braun, hin und wieder aschgrau und braun gescheckt, innerhalb fast leberbraun, sehr zusammenziehend, kaum bitter. Blätter länglich, stumpf-zugespitzt, ganzrandig, kahl, glänzend und auf der Unterfläche geadert. Die Blumenrispe vielblüthig, fast traubig, die Blumenkrone 4 Linien lang, rosenroth.

23) **Cinchona ferruginea Aug. de St. Hilaire.** Rostfarbiger Fieberrindenstrauch.

Wächst in Brasilien in der Provinz Minas auf hohen, unfruchtbaren Bergen in der Gegend von St. Joao-del-Rey, Villa-Ricca, Serro-dos-Piloes, St. Miguel-de-Mato-Dentro ꝛc., in der Höhe von 2000—4000 Fuß; erreicht selten mehr als 4—5 Fuß Höhe. Alle äußere Theile, bis auf den untern Theil des Stammes und die Oberfläche der Blätter, finden sich mit rostfarbigen Haaren bedeckt. Blätter gestielt, 5—8 Zoll lang, $1\frac{1}{2}$—2 Zoll breit, länglich-lancettförmig, an beiden Enden spitz, ganzrandig, lederartig.

24) **Cinchona Vellozii Aug. de St. Hilaire.** Velloz'scher Fieberrindenstrauch.

Standort wie bei dem vorigen; unterscheidet sich von demselben durch seine ovalen, 3—4 Zoll breiten Blätter, durch die gewöhnlich kürzeren Blattstiele und durch längere und häufigere Blumen.

25) **Cinchona Remijiana Aug. de St. Hilaire.** Remijianischer Fieberrindenstrauch.

Standort wie die vorigen; kommt im Ganzen sehr mit C. ferruginea überein, unterscheidet sich nur durch ungefähr 3—4 Zoll breite, elliptische, stumpfe, fast an dem Blattstiele herablaufende, und mit einer kurzen Spitze versehene Blätter. St. Hilaire ist der Meinung, daß sowohl die C. Vellozii als Remijiana, ungeachtet der Unterschiede, welche die Form ihrer Blätter darbietet, als Varietäten der C. ferruginea angesehen werden könnten, und das um so eher, da die Blätter der Fieberrindenbäume im Allgemeinen sehr abzuändern pflegen.

26) **Cinchona brasiliensis Willd.** Brasilianischer Fieberrindenbaum.

Wächst am Ausflusse des Amazonenstromes in der Nähe von Gran Para; mit länglichen zugespitzten Blättern, deren Adern unten weichbehaart sind, und kleinen Blüthen.

27) **Cinchona excelsa Roxb.** Hoher Fieberrindenbaum. (?)

Wächst in Ostindien; mit länglichen, an beiden Enden zugespitzten, auf der Unterfläche weichbehaarten Blättern. Humboldt ist geneigt, diesen Baum für gleich mit der C. Kattakambar zu halten, welche mit Nauclea Gambir übereinzustimmen scheint, aus welcher das Catechu gewonnen wird.

Außer diesen 27 Arten werden noch folgende erwähnt: **Cinchona parviflora Mutis**; **C. Kattakambar Retz. jun.**, auf Malakka vorkommend; **C. Afro-Inda Willemet**, eine ungewisse Species aus Isle de France und Madagaskar; **C. scandens Tafalla** bei Guajaquil; **C. vanillodora Tafalla**;

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0289-6

C. rubicunda Tafalla. In der Synonymik der Fieberrinden kommen endlich noch vor C. thyrsiflora Roxb. und C. laccifera Ruiz et Pavon.

Den Cinchonen verwandt sind: 1) Exostemma caribaeum Willd. (Cinch. caribaea Jacq.), in Westindien, auf den caraibischen Inseln; 2) E. longiflorum Roem. et Sch. (C. longiflora Lamb.), in Gujana; 3) E. floribundum Willd. (C. floribunda Swartz, C. St. Luciae David, Quinquina Piton), auf den Inseln Jamaika, Hispaniola, St. Lucia, Guadeloupe und Martinique; 4) E. brachycarpon Roem. et Sch. (C. brachycarpa Swartz.), in Jamaika; 5) E. peruvianum Humb. (C. peruviana Poiret), auf den peruvianischen Anden; 6) E. capitatum Sprengel, in Südamerika; 7) E. philippicum Roem. et Sch. (C. philippica), auf den philippinischen Inseln; 8) E. corymbiferum Roem. et Sch. (C. corymbifera), auf den Südseeinseln Tongatubu und Eaove; 9) E. lineatum Roem. et Sch. (C. lineata Vahl), auf St. Dominique; 10) E. coriaceum Roem. et Sch. (C. coriacea Poiret), auf St. Domingo; 11) E. angustifolium Willd. (C. angustifolia Swartz), auf Hispaniola; 12) E. corymbosum Sprengel (Portlandia corymbosa Ruiz et Pavon), auf den Anden; 13) E. dissimiliflorum Roem. et Sch. (C. dissimiliflora Mutis) in Südamerika; 14) E. parviflorum Rich., in Westindien; 15) E. cuspidatum Aug. de St. Hilaire, in Brasilien; 16) E. australe Aug. de St. Hilaire, in Brasilien; 17) E. triflorum Lamb. (C. triflora Wright), auf Jamaika.

Nach dieser Aufführung sämmtlicher bis jetzt bekannt gewordenen Chinaarten lassen wir noch Einiges über die Gewinnung der Fieberrinden folgen.

Die Gewinnung der Chinarinden ist mit weit größern Schwierigkeiten verknüpft, als man sich in Europa vorzustellen pflegt. Schon der den Fieberrindenbäumen eigenthümliche Standort bietet des Unbequemen genug dar, denn es ist nicht allein die Höhe, bis zu welcher die Chinabäume vorkommen, was den Zugang zu den Cinchonen oft so sehr erschwert, sondern auch der auf der Andeskette nicht seltene Wechsel zwischen erhabenen ausgebreiteten Bergrücken und tiefen unermeßlichen Schluchten, zwischen ewig belaubten Urwäldern, grünen Ebenen, Wüsten und Moorästen. Hierzu kommt, daß während des größten Theils des Jahres in jenen Gegenden Regenwetter herrscht, daß die Chinabäume nicht immer gesellig wachsen, sondern oft nur hin und wieder unter zahllosen andern Gewächsen zerstreut angetroffen, und von den Indianern, von den Anhöhen gesehen, nur an den rosenfarbenen Gipfeln, welche in der Entfernung als Blüthenbüschel aus dem dunklen Grün der Umgebung hervorragen, erkannt werden können.

Die Zeit, wann die Rinde, abgesehen von ihrer nöthigen Reife und Vollkommenheit, geschält werden muß, scheint, obgleich dabei trocknes Wetter erfodert wird, dennoch an keine bestimmten Monate gebunden zu seyn. Um zu erkennen, ob die Rinde die gehörige Reife habe, werden mit einem Messer ein oder zwei Streifen von der Rinde abgelöst; wird der innere Theil der Rinde an der freien Luft röthlich, so ist dieses ein Zeichen der Reife,

zeigt sich aber nach 3—4 Minuten diese Röthe nicht, so ist die Rinde noch nicht zeitig. Dieser Zeitpunkt muß abgewartet werden, denn eine unreife Rinde hat eine abgestorbene Farbe, einen weniger angenehmen Geruch und Geschmack, wird locker und leicht zerbrechlich.

Ist ein Fleck angetroffen worden, wo sich viele Chinabäume finden, so beginnen die Arbeiter damit, die nöthigen Hütten zu errichten, sowohl kleinere für sich selbst, als auch eine größere, um darin die Rinden einstweilen aufbewahren und vor Nässe schützen zu können. Dann hauen sie durch die Waldungen einen oft mehrere Meilen langen Weg, der bis zu der niedrigeren Gegend eines Pflanzortes oder einer Pächterwohnung führt, wohin die Rinde, sobald als es der Regen erlaubt, zum Trocknen gebracht wird.

Sind diese Vorkehrungen beendigt, so werden entweder die Bäume umgehauen oder nicht, und im ersten Falle von den größern Aesten und von den an ihnen sich hinaufschlingenden Pflanzen befreit. Nun wird der Baum gewöhnlich einen oder zwei Tage liegen gelassen, indem, wenn er gleich geschält wird, die Rinde beim Trocknen Risse bekommt und abspringt; auf hohen und kalten Gebirgen muß aber das Schälen am folgenden Tage geschehen. Tritt Regenwetter ein, so wird das Schälen bis zum heitern Wetter verschoben; denn man muß sehr besorgt seyn, daß die Rinde nicht naß wird, weil sie dann weniger leicht zusammenrollt, eine dunklere Farbe, einen üblen Geruch und einen sehr ekelhaften Geschmack erhält und leicht schimmelt. Das Schälen selbst geschieht auf folgende Weise. Der Chinarindenschäler (Cascarillero) hält den Stamm oder Ast mit der linken Hand fest, setzt dann mit der rechten Hand ein Messer quer in die Rinde bis an den Splint, hebt die Rinde etwas auf, und zieht nun schnell einen so viel als möglich langen Streifen ab. Diese Streifen kommen sodann auf ausgebreitete Decken und Tücher, jedoch stets so, daß jeder frei liegt, damit die Luft von allen Seiten Zutritt habe, indem auf dem schnellen Trocknen das charakteristische Zusammenrollen beruht. Doch geht dieses Trocknen auf den Bergen selten so gut von statten, als in den Ebenen; auch stellen sich dort zu oft Gewitter ein. Die getrocknete Rinde kommt in Säcke, und wird in die Magazine weiter geschafft, wo sie in Kisten und Surons (Zeronen) verpackt, und als Handelsware nach Europa gebracht wird. Die Verpackung darf jedoch nicht eher geschehen, als bis die Rinde völlig trocken ist.

Bei den Rinden überhaupt unterscheiden wir: die Oberhaut (Epidermis), die eigentliche Rinde (Cortex) und den Bast (Liber). Unter der Epidermis befindet sich die eigentliche Rinde, die oft nach dem Alter des Gewächses verschiedene Schichten bildet, und aus einem gewöhnlich grünen Zellgewebe besteht. Unter der Rinde liegt der Bast, von einigen Autoren auch die Saftlage genannt. Dieser Bast zeigt sich in frischem Zustande als eine mehrentheils weißliche Schicht, die sich durch einen scheinbar fasrigen Bau, und durch große Dehnbarkeit und Zähigkeit auszeichnet. Die scheinbaren Fasern sind übrigens nichts anders als Saftröhrchen, die theils parallel laufen, theils auseinander weichen, und sich wieder zusammendrängen, in deren

Zwischenräumen sich gedrängtes Zellgewebe der Rinde in horizontalen Fortsätzen befindet. Die Dehnbarkeit und Zähigkeit des Bastes ist die Ursache, daß sich dieser Theil bei einigen Bäumen, z. B. Linden und Ulmen, rinnenförmig ablösen läßt, welcher der im gemeinen Leben sogenannte Bast ist. Mit einer neuen Splintlage, welche sich im Frühjahre von dem Baste trennt, sich an die ältern Holzlagen anschließt, und den neuen Holzring bildet, erzeugt sich auch jährlich eine neue, aber ungleich dünnere Bastlage, die durch die zwischen Holz und Rinde durchströmenden Säfte von dem Splinte getrennt wird, und die nun sich der Rinde anschließt.

Bei den Chinarinden findet sich zwar auch die Oberhaut, aber nicht überall. Die Rinde einiger feinen und mittlern Röhren ist freilich oft noch ganz damit bedeckt, bei andern mittlern und manchen dicken Röhren ist sie hingegen nur noch auf einigen Stellen oder fleckweise vorhanden. Bei den sogenannten flachen Stücken fehlt sie zuweilen ganz. Die Rinde fehlt nur bei der sogenannten **China regia** ganz; bei allen andern Fieberrinden ist sie vorhanden, oder doch nur auf einzelnen Flecken abgesprungen oder abgerissen, bisweilen sogar, nämlich bei der faserigen **China flava**, absichtlich abgerieben oder abgeschält. Der Bast findet sich bei jeder China, welche mit der Rinde versehen ist, und fehlt nur da, wo diese fehlt, weil er sich mit ihr, nicht mit dem Splinte verbindet. Er erscheint äußerst selten als eine eigene kenntliche Schicht, sondern ist gewöhnlich mit der Unterfläche der Rinde so verwachsen, daß man ihn nur hin und wieder, bei einem scharfen schrägen Abschnitte, von der Rinde an seinem mehrentheils weißgelben Fasergewebe erkennen kann, am deutlichsten noch bei einigen Stücken der **China Huamalies.**

Diese drei Theile, nehmlich Oberhaut, Rinde und Bast, zusammen bezeichnet v. Bergen mit dem Namen Borke, welcher bei den Chinarinden noch der Splint anhängt, und dieser ist bei den meisten Fieberrinden der wesentlichste Theil, indem seine Dicke jene der aus Oberhaut, Rinde und Bast bestehenden Borke, oft um 3, 4 bis 5mal, ja nicht selten um noch mehr, übertrifft; eine Sorte, die unbedeckte **China regia**, besteht sogar aus nichts, als aus Splint.

Von den übrigen Bedingungen des Vorkommens, von den Unterschieden, welche durch Standort, Alter, Zeit der Schälung u. s. w. verursacht werden, wissen wir bis jetzt eigentlich noch gar nichts.

Nach langer und sorgfältiger Prüfung aller der Chinarinden, die man entweder durch ihre Benennungen unterscheidet, oder von denen man glaubt, daß sie von botanisch verschiedenen Bäumen abstammen, hat v. Bergen nicht mehr als acht gefunden, welche sich so sehr auszeichneten, daß sie die nöthigen Merkmale zur Constituirung eigenthümlicher Arten darboten. Unsere Pharmakopöe unterscheidet nur die braune Chinarinde, die Königschinarinde und die rothe Chinarinde, unter welche Abtheilungen wir die v. Bergen unterschiedenen Sorten zu bringen versuchen wollen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0292-2

China. Die braune oder officinelle Rinde. Peruanische Rinde. Braune Chinarinde.

Cinchona Condaminea Humboldtii? Ein in Peru einheimischer, auf Bergrücken wachsender Baum.

Die Rinde in auf beiden Seiten zusammengerollten Stücken, von der Dicke eines Gänsekiels bis zu der eines kleinen Fingers, eine halbe Linie dick, bräunlichgrau, mit weißer staub- oder kleienartiger Epidermis, häufigen nicht tiefen Querrissen, mit nach innen äußerst dünner rostfarbiger Lage, unter welcher ein schwärzlicher etwas glänzender Ring, mit ebenem braunrothen mittleren Theile und innerstem etwas fasrigem ein wenig blässeren Theile. Vorzuziehen ist die Rinde von Guanuco oder Huanuco genannt. Von schlechterer Beschaffenheit sind die Rinden, welche der Querrisse völlig entbehren, mit keinem schwärzlichen Ringe, von nach innen zu blässerer Farbe, die dickern und auch die dünnsten, von weder kleien- noch staubartiger Epidermis, sondern mit Lichenen überzogen.

Als braune Chinarinden kommen im Handel vor:

1) China Guanuco oder Huanuco, die Quinquina gris der Franzosen, graue China.

Diese China wurde in Spanien zuerst im Jahre 1799 bekannt, in welchem Jahre 180 Kisten nach Santander kamen. Ruiz erhielt den Auftrag, diese Sendung zu untersuchen, und fand in den Kisten eine dicke Rinde vermischt mit den Rinden der C. nitida und lanceolata, und noch einer andern von Tafalla, als ähnlich der Calisaya, benannten Art. Die folgenden Sendungen waren von schlechterer Qualität, und mehr mit andern Rinden vermischt. Es giebt aber auch im Handel eine ganz nutzlose Huanucorinde. Die ächte Huanuco kommt meistens in Kisten von circa 150 Pfund netto; wir haben sie jedoch in neueren Zeiten über England auch in Seronen von 80 — 100 Pfund erhalten, welche jedoch, wenn gleich ächt und frisch, auffallend leichter ist, auch weniger Alkaloid enthält, als die alte Waare.

Hayne leitet diese Rinde von C. cordifolia her, Virey und Fée fragweise von C. glandulifera, die aber von Ruiz und Pavon nur als ein 12 Fuß hoher Strauch beschrieben wird, von welchem solche dicke Röhren, wie in der Huanuco, nicht herkommen können. Es ist demnach ungewiß, ob der Baum, von welchem wir die Huanucorinde erhalten, sich schon unter der Zahl der bis jetzt bekannten Cinchonen befinde, oder ob es eine ganz neue Species sey. Nach den Mittheilungen eines sehr erfahrenen cadizer Kaufmanns an v. Bergen kommt die Huanuco aus zwei Provinzen, Huanuco und Huamalies, und daher rührt auch wahrscheinlich die in Spanien nicht seltene Verwechselung beider Namen. Die Bäume, von welchen

man die Huanuco- und die Huamaliessorte erhält, müssen übrigens nahe und unter einander vermischt wachsen, denn v. Bergen fand eine Huanucorinde, um welche eine Huamalies gerollt war, welche Zusammenrollung nur statt gefunden haben konnte, als beide noch frisch waren, denn sie waren so in einander und zusammengetrocknet, daß ohne Zerstörung derselben keine Trennung möglich war.

Die Huanuco bildet feine, mittlere und sowohl ganze, als der Länge nach zerbrochene dicke Röhren von 2 Linien bis 1—1½ Zoll Durchmesser, 3—15 Zoll lang, 3—5 Linien dick. An dem Rande der meisten ganzen zusammengerollten Röhren bemerkt man deutlich einen scharfen schrägen Messerschnitt, welcher wahrscheinlich gemacht wurde, um die Rinde etwas zu lösen, und sie nachher leichter abreißen zu können; bei andern Sorten kommen die Spuren solcher schrägen Messerschnitte nur selten vor. Eigentlich flache Stücke finden sich unter der Huanuco nicht, wohl aber der Länge nach zerbrochene Mittel- und dicke Röhren. Gewöhnlich sind bei dieser Sorte Oberhaut, Rinde, Bast und Splint vorhanden, doch fehlen auch, bisweilen die Oberhaut allein, weit seltener die Borke. Diese ist im Verhältniß zum Splinte ziemlich dünn, sie beträgt bei feinen und Mittelröhren ⅓ oder ⅙, bei dicken Röhren ⅓ oder ¼ der ganzen Dicke.

Die Oberfläche der feinen und Mittelröhren ist gewöhnlich mit zarten, der Länge nach laufenden Runzeln, und mit fast flachrandigen, oft sehr feinen Querrissen versehen. Diese Querrisse laufen aber nie ganz um die Röhre, sondern nur auf ¼ oder ½ des Umfangs, auch stehen sie sehr unregelmäßig bald hier, bald dort übereinander; selten kommen feine Röhren vor, die gar keine Querrisse haben. Die dicken Röhren haben sowohl Längsrunzeln als Querrisse, außer diesen aber auch häufig so starke Längsfurchen, daß die Form der Röhren dadurch etwas eckig wird.

Diese Längsfurchen sind oft so tief, daß sie die Borke ganz theilen, sie lassen zuweilen sogar auf dem Splinte Eindrücke nach. Ueberhaupt sind bei der Huanuco die starken Längsfurchen ein charakteristisches Kennzeichen, weil sie den häufig vorkommenden dicken Röhren fast nie fehlen, da hingegen die Querrisse oft sparsam genug vorkommen, oft ganz mangeln.

Die Farbe der Oberhaut ist milchweiß oder grau, mit einzelnen schwärzlichen oder aschgrauen Flecken von verschiedenen, dicht aufliegenden Flechten. Da wo die Oberhaut fehlt, ist die Borke bei feinen und Mittelröhren meistens rehgrau, bei dicken Röhren mehr oder weniger dunkel zimmtbraun. Die Unterfläche ist bei feinen und Mittelröhren oft ziemlich eben, häufig jedoch auch, besonders bei den Mittelröhren, uneben, grobfaserig oder splittrig. Die dicken Röhren sind mit wenigen Ausnahmen auf der Unterfläche ganz uneben, und entweder sehr grobfaserig oder splittrig, bisweilen auch noch ansitzende Holzsplitter von gelblichweißer Farbe. Die Farbe der Unterfläche ist im Allgemeinen mehr rostbraun als zimmtbraun, bisweilen ins Röthliche übergehend.

Der Längenbruch ist bei der Huanuco selten eben, ohne gerade splittrig

zu seyn; im Querbruche ist die Borke beinahe eben, der Splint hingegen theils faserig, theils splittrig. Jeder Bruch, deutlicher aber ein scharfer Querschnitt, zeigt, daß die Huanuco oft ziemlich viel Harz enthält.

Der Geruch der Huanuco ist thonartig, etwas süßlich; welcher Geruch dieser Rinde eigenthümlich ist. Der Geschmack ist anfangs säuerlich, zusammenziehend, etwas gewürzhaft, dann bitter und reizend, lange anhaltend.

Das Pulver ist gesättigt zimmtbraun.

Flechten kommen im Ganzen nicht viel vor, doch ist die Zahl der Arten größer, als man bei einer so wenig von ihnen bedeckten Rinde erwarten sollte.

Es sind gewöhnlich folgende: **Glyphis tricosa; Graphis duplicata; Porina granulata; Pyrenula discolor, mastoidea und Pupula; Lecanora punicea; Parmelia melanoleuca; Sticta aurata und Usnea florida δ Cinchonae.**

2) **China Huamalies. Braune China.**

Die Huamalieschina ist sehr wahrscheinlich entweder gleichzeitig mit der Huanuco am Ende des vorigen, oder doch nur wenig später zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts in den Handel gekommen, woher sie auch noch jetzt in Spanien mit der Huanuco hinsichts der Namen verwechselt wird.

Die Abstammung der Huamalies ist bis jetzt unbekannt.

Auch diese Sorte bildet feine, mittlere und dicke Röhren von 3 Linien bis anderthalb Zoll Durchmesser. Die Dicke der Rinde ist eine halbe bis vier Linien, ihre Länge 5—16 Zoll. Röhren von 10—13 Zoll Länge kommen häufig vor. Die dicken Röhren sind bisweilen der Länge nach zerbrochen, und bilden dann beinahe flache Stücke.

Gewöhnlich sind bei der Huamalies Oberhaut, Rinde, Bast und Splint vorhanden; einzelne Stücke finden sich indessen auch, wo die Oberhaut oder die ganze Borke fleckenweise fehlen. Man trifft wohl auch dicke Röhren an, die allein aus Borke bestehen. Bei dieser China ist oft der Bast sehr kenntlich, so daß er sich nach dem Einweichen der Rinde, als ein faseriges, zähes Gewebe von der eigentlichen Rinde trennen läßt. Bei keiner andern Sorte kommt der Bast von solcher Stärke vor. Die zerbrechliche, auffallend weiche, mehr schwammige als korkartige Borke hat oft nur eine geringe Dicke, nämlich bei feinen und Mittelröhren kaum $\frac{1}{6}$, bei dicken Röhren $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{3}$ der Dicke des Splints.

Die feinen und Mittelröhren sind größtentheils der Länge nach wellenförmig gerunzelt, doch kommen auch solche vor, die beinahe glatt und nur hin und wieder mit Warzen besetzt sind. Diese Warzen finden sich nicht auf allen feinen Röhren, hingegen an den mittlern und dicken Röhren so häufig, daß sie die wellenförmigen Runzeln stellenweise, ja bisweilen die ganze Fläche völlig bedecken. Diese bald rundlichen bald länglichen Warzen gehen größtentheils auf den Splint, und die Stellen, wo sie gesessen haben, sind dann als ungleiche Vertiefungen leicht zu erkennen. Die Oberfläche des Splints sieht daher, wenn man die Borke ganz ablöst, immer sehr uneben aus. Querrisse finden sich bei der Huamalies nur selten, und auch dann fast nur auf dicken Röhren.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0295-0

Die Farbe der feinen und Mittelröhren erscheint, wenn die Oberhaut durch die Warzen nicht zerstört wurde, rehgrau ins Rostbraune übergehend, bei den dicken Röhren zwischen kastanienbraun und leberbraun. Die Stellen, wo die Warzen oder die Oberhaut abgerieben sind, haben eine oft ziemlich gesättigte Ocherfarbe. Die nur sehr zartfaserig gestreifte Unterfläche ist ziemlich eben, hin und wieder sogar fast glatt, bei einzelnen Röhren jedoch auch etwas splittrig. Ist der Splint nicht vorhanden, so ist der Bast sehr faserig. Die Farbe der Unterfläche ist mehr oder weniger gesättigt rostbraun, zuweilen mit etwas Roth verbunden; zuweilen hat sie auch ein schmutzig zimmtbraunes Ansehn. Ist aber die Unterfläche faserig oder splittrig, so hat sie fast immer eine kräftig ochergelbe Farbe.

Bei dem Längenbruche, der bald eben, bald uneben, bald splittrig ist, noch mehr aber bei einem scharfen Schnitte, erkennt man die verhältnißmäßig geringe Dicke der Rinde und die starken Eindrücke der Warzen auf dem Splinte. Der Querbruch ist bei feinen Röhren oft eben, oft aber auch, soweit es den Splint betrifft, etwas faserig. Daß der Splint nach der Oberfläche hin einiges Harz enthält, zeigt ein scharfer Querschnitt, wo dieses Harz gewöhnlich als ein schwacher, dunkler als der übrige Theil gefärbter Ring erscheint.

Der Geruch der Rinde ist schwach chinaartig, angenehm; der Geschmack vorübergehend gewürzhaft, dann etwas bitter, wenig zusammenziehend, nicht reizend. Das Pulver hat eine gesättigte Zimmtfarbe.

Auf der Huamalies kommen folgende Flechten vor: **Opegrapha enteroleuca**; **Graphis duplicata**; **Verrucaria phaea**; **Porina papillata**; **Pyrenula discolor, mastoidea** und **verrucarioides**; **Lecanora punicea**; **Parmelia melanoleuca** und **Usnea florida δ Cinchonae.**

Die Huamalies kommt nur in Kisten von verschiedener Größe, nie in Seronen zu uns. Diese Kisten enthalten, wenn sie aus dem Lande selbst kommen, immer unausgesuchte oder die sogenannte naturelle Waare. Deren findet man indessen wenig, weil sie gewöhnlich nach der Feinheit ihrer Röhren sortirt wird. Die Kisten mit natureller Huamalies enthalten gewöhnlich 118 bis 125 Pfund netto, die sortirten 135 bis 150 Pfund.

5) **China Loxa. Kronchina. Quina de Loxa; Quina de Loxa Corona; Q. fina de Uritusinga.**

Seitdem Humboldt die Identität seiner **Cinchona Condaminea** mit der von La Condamine beschriebenen Species erwiesen hatte, wurde diese von den meisten Schriftstellern als die Mutterpflanze der Kronchina oder **Cascarilla fina de Uritusinga** angenommen. Auch Hayne trat dieser Meinung bei, machte aber einen Unterschied zwischen der eigentlichen **Uritusinga** und der **China Loxa** des Handels. Jene verblieb der **C. Condaminea**, die Loxachina leitete er dagegen von **C. scrobiculata Humb.** ab, weil es nicht möglich sey, daß die im Handel vorkommende Masse von Kronchina von einem Baume abstammen könne, welchen Humboldt als so sparsam vorkommend beschrieben hat. V. Bergen ist aber der Meinung, daß nicht

nur die sogenannte Uritusinga, sondern auch ein großer Theil der im Handel als Kronchina oder China Loxa im Handel vorkommenden Fieberrinde von der C. Condaminea Humb. abstamme, denn früher wurden nur die feinsten Röhren für den spanischen Hof bestimmt, die bei weitem größere Menge in mittlern und dicken Röhren sey in den Handel gebracht; jetzt aber könne man wohl annehmen, daß seit den Jahren, nämlich von 1779, wo diese Chinabäume in so großer Menge, nämlich oft in einem Jahre 25,000, umgehauen worden, aus den Wurzeln derselben eine Menge ertragsfähiger Bäume wieder erwachsen seyn können. Doch sey hier nur von einem großen Theile der Loxachina die Rede, und es wird nicht in Abrede gestellt, daß unserer jetzigen Sorte auch Rinden von andern ihr verwandten Species beigemischt seyn können.

Die Loxachina war, wenn nicht die erste, doch eine der ersten Fieberrinden, die man nach Europa brachte, denn ihr Name kommt schon bei La Condamine als Cascara de Loxa vor. Eben so wahrscheinlich ist es auch, daß ein Theil der seit La Condamine's Zeiten in den Handel gekommenen Fieberrinden nichts anders als Loxachina gewesen ist, und sie war in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts die geschätzteste von allen zu der Zeit existirenden feinröhrigen Sorten. Auch unter den directen Zufuhren von China, welche seit 1804 in Hamburg ankamen, war die Loxachina, weil sie sich eine geraume Zeit hindurch von allen Sorten am sparsamsten fand, immer sehr geschätzt. Erst in der neuesten Zeit ist sie wieder öfter, endlich aber so häufig vorgekommen, daß nun fast alle nach Europa kommenden Zufuhren aus dieser Sorte bestanden.

Die Loxachina kommt in Röhren von allen Durchmessern vor, von 2 Linien bis einen Zoll. Dicke $\frac{1}{3}$—2 Linien, Länge 6—15 Zoll. Flache Stücke und solche, denen die Borke ganz fehlt, kommen gar nicht vor. Von den Schichten: Oberhaut, Rinde, Bast und Splint, fehlt nur hin und wieder fleckenweise, selten ganz, die Oberhaut, die übrigen sind immer vorhanden. Die Borke nimmt bei feinen und Mittelröhren $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{2}$, bei dicken Röhren aber oft kaum $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{6}$ der ganzen Dicke ein. Auf der Oberfläche der feinen und Mittelröhren finden sich viele, oft nur 1—$1\frac{1}{4}$ Linien von einander entfernte Querrisse, welche gewöhnlich die Borke in lauter Ringe theilen, deren Ränder etwas erhöht sind. Unter den feinen Röhren finden sich auch einige, denen die Querrisse fast ganz fehlen; diese sind dann gewöhnlich der Länge nach etwas gerunzelt. Auf den dicken und auch auf einigen Mittelröhren stehen die Querrisse nicht so nahe, sind auch selten so ringförmig, gewöhnlich mehr unterbrochen. Man findet auch einzelne dicke oder Mittelröhren, bei denen die Borke fast aus nichts als unregelmäßigen, gedrängten, beinahe eine Reihe bildenden Runzeln besteht, (wo dann stellenweise die Borke bis auf den Splint ganz abgesprungen ist). Andere zeigen hin und wieder einzelne Knoten oder Warzen.

Die Farbe der Rinde ist sehr verschieden. Die feinen, mit der Oberhaut und Querrissen versehenen Röhren schiefergrau, aschgrau oder rehgrau. Die

schiefergraue Farbe ist im Ganzen die vorherrschende; einzelne milchweiße, graue oder schwärzliche Flecken rühren meistens von fest aufliegenden Lichenen her. Die mittleren und dicken Röhren weichen in der Farbe noch mehr von einander ab, denn es kommen nicht nur schiefergraue, aschgraue und rehgraue, sondern auch schwarzgraue und solche vor, welche hin und wieder in das Leberbraune fallen. Die Unterfläche der Lora ist bei allen Dimensionen sehr eben, und kann, ungeachtet der sie bezeichnenden zarten, unregelmäßigen Längsfasern, in der Regel glatt genannt werden. Die Grundfarbe der Unterfläche ist zimmtbraun, sie erscheint aber selten rein, sondern oft etwas bestäubt, auch wohl mit mehr Braun gemischt, als ihr sonst eigenthümlich. Hin und wieder wieder findet man auch Röhren, wo die Farbe etwas matt aussieht, oder einen schwachen röthlichen Anflug hat.

Der Längenbruch ist bei den meisten feinen Röhren ganz eben, nur im Splinte etwas uneben und wenig splittrig. Die Borke und der mit Harz durchdrungene Theil des Splints zeigen sich im Bruche kastanienbraun, das Uebrige ist gewöhnlich zimmtbraun, und oft merklich heller als die Unterfläche. Auch der Querbruch ist bei den feinen Röhren gewöhnlich ganz eben; einzelne brechen jedoch auch etwas faserig oder feinsplittrig. Bei den mittlern und dicken Röhren bricht die Borke eben, da diese aber im Verhältnisse nur dünn ist, so hat oft der ganze Bruch ein kurz- oder feinsplittriges Ansehn.

Der Splint selbst ist nicht so weich und zerreiblich, als bei der Huanuco, aber auch nicht so spröde, als bei der regia, und ganz frei von den kleinen stechenden Splitterchen. Schon der Bruch, noch mehr der Querschnitt, zeigt, daß diese Chinasorte ziemlich viel Harz enthält.

Der Geruch ist stark lohartig, der Geschmack anfangs etwas zusammenziehend und säuerlich, nachher stark und anhaltend zusammenziehend, und zugleich etwas bitter, nicht reizend. Das Pulver ist matt zimmtfarbig.

Die Lorachina kommt in Kisten und Suronen; erstere enthalten bis circa 110 Pfund, letztere von 60 bis 90 Pfund netto. In den Kisten befindet sich entweder sogenannte naturelle (nicht ausgesuchte) oder, was häufiger der Fall ist, ausgesuchte Waare in feinen Röhren. Die naturelle Waare kommt durch directe Zufuhr, die ausgesuchte über Spanien. Die in Seronen verpackte Lora ist nach vielen Jahren zuerst wieder 1824 über England nach Hamburg gekommen, und ist ebenfalls größtentheils naturelle Waare.

Die auf der Kronchina vorkommenden Flechten sind folgende: **Lecidea russula; Graphis duplicata; Verrucaria Cinchonae; Porina granulata; Pyrenula mastoidea und Pupula; Lecanora caesio-rubella; Parmelia cetrata und melanoleuca; Sticta durata und Usnea florida δ Cinchonae.**

4) **China Jaen. Blasse Ten-China.**

Der corrupte Name Ten-China ist in Hamburg entstanden, und zwar durch eine Verwechslung mit dem eigentlichen Namen China Jaen. Die Zeit der ersten Einführung dieser Sorte läßt sich nicht bestimmen, wahrscheinlich ist sie, gleich der Lora, eine von denen, die am frühsten in den eu-

ropäischen Handel kamen. Sie wurde ihres blassen Ansehens wegen immer zu den schlechtesten Sorten gezählt, und ist jetzt wegen ihres beinahe gänzlichen Mangels an Alkaloid noch mehr gesunken.

Hayne hat angenommen, daß diese Rinde von C. lancifolia gewonnen werde, v. Bergen hält es aber nicht für wahrscheinlich, daß eine aus Peru zukommende Sorte von einem vorzüglich in Neu-Grenada wachsenden Baume abstammen solle; durch Vergleichung mit der Ruiz'schen Chinarindensammlung ist ihm die Gewißheit geworden, daß die blasse Ten-China von C. ovata Ruiz et Pavon, welcher C. pubescens Vahl als Synonym zugesellt ist, abstamme.

Die blasse Ten-China hat feine, mittlere und dicke Röhren, letztere jedoch nicht häufig und selten sehr dick, von 2½ Linien bis 1 Zoll Durchmesser. Dicke der Rinde ½—2 Linien, Länge 4—16 Zoll. Die oft schiefe, oft bogenförmige, hin und wieder auch gewundene Form vieler Röhren ist nur dieser und der folgenden Species eigen. Flache Stücke finden sich gar nicht.

Die Schichten, Oberhaut, Rinde, Bast und Splint, sind hier selten vollkommen vorhanden; am meisten fehlt die Oberhaut, vorzüglich bei solchen Stücken, deren Borke übrigens noch ganz vorhanden ist; oft fehlt aber auch ein Theil der Borke. Auf der Oberfläche der Röhren finden sich gewöhnlich einzelne, sehr unregelmäßig stehende, und weder tiefe noch breite Querrisse mit etwas erhöhtem Rande. Eigentliche Längsfurchen kommen bei dieser Sorte nicht vor; bisweilen aber wellenförmige, nicht sehr erhöhte Längsrunzeln, hin und wieder auch wohl einige Warzen. Weil indessen die Borke dieser Chinasorte sehr weich ist, so sind die beschriebenen Merkmale selten vollkommen; die Rinde ist nämlich gewöhnlich fleckenweise mehr oder weniger abgerieben, auch finden sich Röhren, wo sie überall fast ganz abgerieben ist.

Die Farbe wechselt bei den mit der vollkommnen Oberhaut und Rinde versehenen Röhren gewöhnlich zwischen Aschgrau, Weißgrau und Bleichgelb, auch kommen hin und wieder schwärzliche und bräunliche Flecke vor, die zum Theil von einigen dicht aufliegenden Flechten oder ihren Ueberresten, zum Theil auch von andern zufälligen Umständen herrühren. In Masse betrachtet hat diese Sorte etwas Gelbliches oder Strohfarbiges, was sie den Röhren der Flavasorten ziemlich nahe stellt. Bei den abgeriebenen Röhren tritt das Gelbliche noch mehr hervor, weil bei ihnen die Farbe hauptsächlich nur zwischen aschgrau und schmutzig bleichgelb abwechselt; es finden sich aber auch auf diesen Röhren viele gelblichweiße, schiefergraue und bräunliche Flecke. Hinsichts der Form der Unterfläche findet sich bei keiner andern Chinasorte so viel Verschiedenheit, als bei dieser, denn sie findet sich bald eben, bald uneben, bald splittrig, so daß sich kein allgemeiner Charakter angeben läßt. Als Farbe der Unterfläche herrscht im Ganzen die zimmtbraune vor, doch findet sich auch diese mannigfaltig nuancirt, matt und gesättigt, gewöhnlich etwas bestäubt. Bei manchen ist die Farbe auch ganz abweichend, nämlich entweder dunkel rostfarbig, oder ganz schmutzig purpurfarbig; bei manchen geht auch das Zimmtbraune ins Ochergelbe über.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0299-6

Der Längenbruch ist in der Regel auffallend uneben, oft auch ziemlich faserig, zuweilen ins Splittrige übergehend; der Querbruch ändert etwas ab, je nachdem die Röhren dünner oder dicker sind; die ersteren brechen mehr eben, die letzteren mehr splittrig; es ist auch hier keine allgemein geltende Regel aufzustellen. Wenn man viele Röhren scharf in der Quere durchschneidet, so kommen auch einige vor, die einen dunkler gefärbten harzigen Ring zeigen.

Der Geruch der Rinde ist schwach lohartig, etwas süßlich, der Geschmack schwach säuerlich, wenig zusammenziehend, ziemlich rein bitter, nicht unangenehm.

Das Pulver ist zimmtbraun.

Diese Chinasorte kommt in Kisten von 110 bis 140 Pfund, seltener in Seronen von 70 bis 100 Pfund netto vor.

Flechten finden sich auf dieser China selten, weil die Rinde so oft abgerieben ist, doch sind es folgende: **Graphis sculpturata**; **Porina granulata**; **Pyrenula verrucarioides**; **Lecanora punicea**; **Parmelia melanoleuca** und **Usnea florida δ Cinchonae.**

5) **Pseudo-Loxa.** Dunkle Ten-China.

Die dunkle Ten-China ist erst seit einigen Jahren im Handel als eine eigene Sorte angesehen, und als solche zuerst in Hamburg unterschieden worden; sie mag schon früh und oft genug als ächte Kronchina vorgekommen seyn. Daher denn auch v. Bergen die Benennung **Pseudo-Loxa** für die passendste hält.

Ueber die Abstammung dieser Rinde hält sich v. Bergen nach genauer Vergleichung der Ruiz'schen Sammlung für berechtigt, anzunehmen, daß die **C. lancifolia Mutis** oder, um sich bestimmter auszudrücken, die im System ihr zugesellten **C. nitida** und **C. lanceolata** diese Rinde liefern, woraus denn auch hervorginge, daß man nicht Unrecht gehabt hat, diese drei Bäume in eine botanische Species zu vereinigen.

Die dunkle Ten-China hat feine und mittlere, seltener dicke Röhren, von 2 Linien bis $\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser. Dicke $\frac{1}{3}$ bis 2 Linien, Länge 4—12 Zoll. Auch bei diesen Röhren findet sich die bezeichnende schiefe oder bogenförmige Biegung. Selten trifft man ganz gerade Röhren an, oft genug aber solche, die mit jener Biegung auch noch in der Mitte verdickt erscheinen, und daher eine ziemliche unförmliche Gestalt haben. Wieder andere finden sich, vorzüglich unter den Mittelröhren, die an einem Ende dicker sind, als an dem andern, und daher auffallend ungleich gerollt erscheinen. Eigentlich flache Stücke kommen gar nicht vor. Die Schichten, Oberhaut, Rinde, Bast und Splint, finden sich, mit wenig Ausnahmen, sämmtlich und immer zusammen. Von allen grauen Fieberrinden hat diese die dünnste Borke, denn in der Regel nimmt sie nur $\frac{1}{6}$ oder $\frac{1}{7}$, oft sogar nur $\frac{1}{8}$ der ganzen Dicke ein. Auf der Oberfläche kommen Querrisse und Längsrunzeln, die bald stärker, bald schwächer sind, vor. Die Querrisse bilden auch wohl hin und wieder Ringe, welche indessen selten so regelmäßig als bei der ächten Loxa erscheinen, und

gewöhnlich mehr unterbrochen sind. Uebrigens sind manche Röhren in Ansehung ihrer äußern Beschaffenheit der Loxachina so ähnlich, daß jene allein kein sicheres Kennzeichen zur Unterscheidung beider Sorten darbietet. Die Rinde der dunklen Ten gehört keineswegs zu den spröden und harten, sondern nähert sich merklich dem Weichen, ist jedoch selten abgerieben; Röhren ohne alle Borke kommen gar nicht vor. Eine eigentliche vorherrschende Farbe läßt sich nicht angeben, weil die Oberhaut sehr selten rein erscheint, sondern gewöhnlich durch die auf dieser Fieberrinde häufig vorkommenden Flechten ein scheckiges Ansehen erhält. Im Allgemeinen wechselt die Farbe zwischen Milchweiß und Aschgrau, hin und wieder fällt sie aber auch ins Rehgraue und Schwärzliche, und wird auch in dieser Hinsicht der ächten Loxa oft ähnlich genug.

Die Unterfläche ist in der Regel uneben, faserig oder splittrig, das Splittrige nimmt gewöhnlich mit der Dicke der Röhren zu. Die Farbe der Unterseite ist fast durchgängig mehr rostbraun als zimmtbraun, und ändert, im Allgemeinen genommen, nur wenig ab. Gewöhnlich ist sie auch ziemlich rein, selten bestäubt; einzelne Stücke sind mit einem schwachen Purpurschimmer überzogen; bei noch andern hat die rostbraune Farbe ein mattes oder verblichenes Ansehn.

Der Längenbruch ist im Allgemeinen etwas splittrig, nur bei einzelnen ziemlich eben. Der Querbruch ist nur bei einzelnen feinen Röhren eben, gewöhnlich faserig und zugleich etwas splittrig. Ein scharfer Querschnitt zeigt ziemlich häufig, daß es dieser Sorte nicht ganz an Harz fehle, doch ist sie nicht reich daran.

Der Geruch ist durchdringend lohartig, der Geschmack anfangs etwas säuerlich, nachher stark und anhaltend zusammenziehend; etwas bitter, nicht reizend.

Das Pulver ist matt zimmtbraun.

Diese Chinasorte kommt in Kisten von 100 bis 150 Pfund, seit einiger Zeit auch häufig in Seronen von etwa 80 bis 100 Pfund netto vor.

Von allen Chinasorten ist diese am meisten mit Flechten besetzt, oft ganz damit überzogen. Es finden sich auf ihr: Opegrapha scaphella; Graphis sculpturata; Porina granulata; Thelotrema terebratum; Pyrenula verrucarioides; Lecanora punicea und miculata; Parmelia melanoleuca; Sticta aurata und Usnea florida δ Cinchonae. Diese letztere kommt so häufig vor, daß oft einzelne Röhren fast ganz damit besetzt sind.

China. Königsrinde. Königschinarinde.

Cinchona angustifolia Ruiz seu Cinchona lancifolia Mutis? Ein auf den Bergrücken Südamerikas wild wachsender Baum.

Die Rinde in fast flachen oder gewölbten, gemeiniglich nicht zusammengerollten Stücken, 2—4 Linien dick, mit mehlartiger,

weißer, daher sich abtrennender Oberhaut, mit häufigen Querrissen, einer ziemlich dicken, außen braunen, innen rostfarbenen äußeren, und einer dickeren, faserigen, rothen, hineinwärts ins Gelbe übergehenden inneren Rindenlage, einer öfters gelbrothen Unterfläche. Die sogenannte Calisayachina, mit einer äußern Rindenlage bedeckt, werde vorgezogen. Sie werde nicht verwechselt mit der China, welche gemeiniglich gelbe China genannt, und an dem Mangel der Querrisse, an der dünneren, oft fehlenden, äußern und einer nicht ganz, sondern nur an dem innersten Theile ins Gelbe übergehenden innern Rindenlage erkannt wird.

---

1) China regia. Königschina.

Die Periode, in welcher die Königschinarinde zuerst nach Europa gekommen ist, fällt am wahrscheinlichsten in die Jahre 1788 und 1789. In Peru und in Spanien ist sie unter dem Namen Cascarilla de Calisaya oder Quina de Calisaya bekannt, welcher Name auch zu den Portugiesen, Franzosen und Italienern übergegangen ist. Etwa im Jahr 1790 kam sie aus London unter der Benennung Cortex Chinae regius und Cortex Chinae flavus. Sie ist häufig mit der gelben China verwechselt worden.

Nach Humboldt kommt die Calisaya aus der Provinz gleiches Namens im südlichsten Peru, in der Intendencia de la Paz. Mutis hatte diese Rinde seiner C. lancifolia zugeschrieben, zu welcher Meinung auch Humboldt sich hinneigte; Hayne leitet sie von dem Stamme und den dicken Aesten der C. cordifolia ab; v. Bergen hat sich durch Vergleichung der Chinarinden aus der Ruiz'schen Sammlung überzeugt, daß die Rinde der C. lancifolia Mut. von unserer Regia durchaus verschieden sey, er tritt also der Meinung derer bei, welche behaupten, daß die Species, von welcher die Regia herkomme, noch unbekannt sey.

Diese China kommt vor in Röhren und in flachen Stücken.

a) Feine, mittlere und dicke Röhren von 2 Linien bis 1¼ Zoll Durchmesser, einzeln, jedoch sehr selten, auch bis zwei Zoll. Die Dicke beträgt ½ bis 6 oder 7 Linien, ihre Länge etwa 3 bis 18 Zoll. Manche dicke und sehr dicke Röhren kommen auch in einer kaum gerollten Form vor. Sind sie zusammengerollt, so zeigen sie häufig mehrmalige Windungen.

b) Flache Stücke. Diese sind größtentheils ziemlich flach oder doch nur sehr wenig gebogen, und, weil die Regia der Länge nach ziemlich leicht bricht, von unregelmäßiger, mannigfaltiger Gestalt. Diese flachen Stücke bestehen fast immer nur aus Splint, und haben daher auch den Namen unbedeckte Regia erhalten. Oft findet es sich bei dieser Form, daß die Unterfläche etwas convex, die Oberfläche hingegen etwas concav ist, was offenbar durch die Trocknung entstand. Diese flachen Stücke sind gewöhnlich 1—2 Zoll breit, 8—15 Zoll lang (in einzelnen Ausnahmen sogar bis 2 Fuß), und

1—4 Linien dick; letztere steigt indeß, jedoch selten, auch wohl bis auf 5 oder 6 Linien.

Die Schichten, Oberhaut, Rinde, Bast und Splint, sind bei den meisten Röhren sämmtlich vorhanden, jedoch kommen auch manche vor, denen stellenweise entweder die Borke oder nur die Oberhaut allein fehlt; es finden sich aber auch dicke und sehr dicke Röhren ganz ohne Borke (unbedeckt). Die flachen Stücke bestehen größtentheils nur aus Splint. Bei feinen und Mittelröhren erreicht die Borke etwa $\frac{1}{3}$, bei dicken aber oft die Hälfte der ganzen Dicke. Bei einigen sehr dicken Röhren und rinnenförmigen Stücken findet sich zuweilen sogar, daß die Borke $\frac{2}{3}$, der Splint hingegen nur $\frac{1}{3}$ der ganzen Dicke beträgt. In einem solchen Falle kann man an der Borke oft deutlich 6 bis 8 verschiedene Lagen bemerken.

Die Oberfläche ist in der Regel bei allen Röhren sowohl mit Längsrunzeln und Längsfurchen, als mit Querrissen bezeichnet; im Ganzen herrschen aber immer die Querrisse vor. Diese Querrisse, welche oft ganze Cirkel um die Röhren bilden und nie fehlen, haben gewöhnlich einen ziemlich aufgeworfenen Rand, und gehen bei vielen mittlern und allen dicken Röhren und flachen Stücken so tief, daß sie meistens auf dem Splinte noch zu bemerken sind. Auf den feinen und einigen Mittelröhren sind die Querrisse oft nur schwach, stehen aber einander meist sehr nahe. Daß bei der Regia die Borke leicht abspringt, beweisen die so häufigen unbedeckten Stücke, welche zugleich zeigen, daß außer den Querrissen auch die Längsfurchen zuweilen Spuren hinterlassen.

Die Farbe wird bei der Regia theils durch die Oberhaut, theils durch die häufig darauf vorkommenden Flechten bestimmt; die der Oberhaut wechselt zwar zwischen Milchweiß und Bläulichgrau; im Ganzen dominirt aber das letztere. Auf solchen Stellen, denen die Oberhaut fehlt, hat die Borke gewöhnlich eine etwas rußbraune oder fast leberbraune Farbe. Die Oberfläche des Splintes wechselt in der Färbung, sowohl bei den Röhren, wo die Borke fehlt, als bei den unbedeckten flachen Stücken zwischen dem Zimmtbraunen und dem dunkel Rostbraunen ab. Die auf der Regia vorkommenden Kryptogamen geben dieser Sorte hin und wieder ein sehr scheckiges Ansehen, und färben solche abwechselnd und stellenweise gelblichweiß, weißlichgrau, aschgrau und schwärzlich.

Die Unterfläche des Splintes ist bei allen Dimensionen eben, und oft beinahe glatt zu nennen. Sie zeigt feine, der Länge nach laufende, sehr gedrängte Fasern, welche nie merklich hervortreten, und also auch keine Unebenheit veranlassen können. Der Splint muß sich sehr leicht vom Holze trennen, weil sich die bei andern Sorten hin und wieder vorkommenden, fest ansitzenden Holzsplitter bei der Regia niemals finden. Die vorherrschende Farbe der Unterfläche ist meistens ein ziemlich dunkles oder gesättigtes Zimmtbraun. Diese Farbe geht aber hin und wieder auch wohl ins Rostbraune über, ja es kommen Stücke vor, wo sich beide Farben streifig in einander verlieren; seltener ist ein röthlicher Anflug. Manche Stücke finden sich auch mit etwas schmutziger Unterfläche.

Der Längenbruch ist bei allen Röhren und flachen Stücken ziemlich uneben, und an dem Splinte mehr oder weniger splittrig. Die **Regia** bricht von allen Chinasorten der Länge nach am leichtesten, daher finden sich auch bei ihr viele und selbst sehr dicke Röhren, welche häufig sowohl in der Mitte als an den Enden Spalten und Risse haben. Die innere Farbe der Borke ist fast durchgängig ein mehr oder weniger dunkles Kastanienbraun. Der Querbruch ist bei der Borke ziemlich eben, bei dem Splinte hingegen theils faserig, theils splittrig. Bei feinen und Mittelröhren erscheint der Bruch oft ziemlich fein und langfaserig, bei dicken Röhren geht das Faserige schon mehr ins Splittrige über und wird kürzer; bei flachen Stücken ist gewöhnlich der ganze Bruch ziemlich kurzsplittrig. Der Querbruch, noch deutlicher aber ein schräger Querschnitt, zeigt, daß der **Regia** das Harz (der sogenannte Extractring) nicht fehle, obwohl es nicht überall in gleicher Menge vorhanden scheint. Es ist vorzüglich in dem unteren Theile der Borke und dem obern Theile des Splintes verbreitet, und veranlaßt, vorzüglich bei einigen feinen Sorten, den fast ganz ebenen Bruch derselben. Bei flachen unbedeckten Stücken ist es gewöhnlich dieses Harz, was die Oberfläche derselben so dunkel färbt.

Schon bei dem Anfassen der **Regia**, noch mehr aber bei dem Zerbrechen derselben, bleiben in der Haut sehr oft ganz kleine scharfe Splitterchen zurück, welche auf dem Längenbruche gewöhnlich als längliche glänzende Theilchen erscheinen. Ueberhaupt hat der Splint etwas Sprödes und fast Glasartiges, was sich bei keiner andern Sorte so auffallend findet.

Der Geruch der **Regia** ist sehr schwach lohartig; der Geschmack schwach säuerlich, stark aber nicht unangenehm bitter, etwas gewürzhaft und reizend, zugleich etwas zusammenziehend, ziemlich lange anhaltend.

Das Pulver hat eine gesättigte Zimmtfarbe.

Die Königschinarinde kommt in ganzen und sogenannten Drittel-Seronen, in Kossern und Kisten vor. Ganze Seronen von **circa 125 bis 135 Pfund**, Drittel-Seronen von **45 bis 50 Pfund**, und Kosser und Kisten von **circa 150 Pfund netto**. Am gewöhnlichsten enthalten diese Packungen die Rinden in dem naturellen Zustande oder in Sorten. Es finden sich darunter wenig feine und Mittelröhren, mehr dicke bedeckte und unbedeckte, am meisten aber flache Stücke von mittlerer Größe, Fragmente, Grus und Staub. Andere Packungen enthalten größtentheils unbedeckte flache Stücke und dicke Röhren. Diese Waare ist, seitdem das Chinasalz Handelsartikel geworden ist, die theuerste, und unter den unbedeckten Sorten sind im Allgemeinen die dicken, fast knüppelartigen Röhren die geschätztesten. Endlich kommen noch Seronen vor, welche lauter ausgesuchte feine und fein mittel, meistentheils ganz bedeckte Röhren enthalten; diese Waare ist aber, nicht zu ihrem Vortheil, leichter als die sonstige gefunden worden.

Außer der hier beschriebenen **China regia** kommt im Handel noch eine andere Sorte unter dem Namen der leichten, braunen oder huamaliesartigen **Regia** vor, die sich durch ihre sehr geringe Schwere und durch ihren gerin-

geren Gehalt auszeichnet; auch ist ihr Werth gewöhnlich um 25 Procent geringer.

Die auf der Regia häufig vorkommenden Flechten sind folgende: Opegrapha striatula; Graphis duplicata und sculpturata; Glyphis labyrinthica; Chiodecton sphaerale; Thelotrema bahianum; Pyrenula discolor und leucostoma; Porina granulata; Lecanora miculata und punicea; Parmelia melanoleuca und Usnea florida δ Cinchonae.

2) China flava dura. Harte gelbe China.

Diese Rinde führt auch den Namen: Carthagenachina, Quina de Carthagena dura, Quina de Santa Fe.

Als Mutterpflanze dieser Chinasorte ist von den meisten neuern Schriftstellern die C. cordifolia Mutis angenommen, und v. Bergen hat durch Vergleichung mit der Ruiz'schen Sammlung die völlige Ueberzeugung gewonnen, daß diese Annahme richtig sey.

Diese China bildet Röhren und flache Stücke.

a) Feine, mittlere und dicke Röhren von 3—8 Linien Durchmesser. Die Dicke der Rinde beträgt $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Linien, die Länge 5—9 Zoll, einzeln, jedoch selten, auch wohl bis 15 Zoll.

b) Flache Stücke von $\frac{1}{2}$—2 Zoll, meistens $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ Zoll Breite, 2—7 Linien Dicke, und 4—8, selten bis 12 Zoll Länge. Diese Stücke sind oft etwas gedreht oder verbogen, oft auch so durch das Trocknen gekrümmt, daß die Oberfläche etwas rinnenförmig, die Unterfläche etwas erhaben erscheint.

Die Schichten, Oberhaut, Rinde, Bast, Splint, finden sich bei manchen Röhren und auch bei einzelnen flachen Stücken sämmtlich. Sehr oft fehlt aber die Oberhaut und ein Theil der Borke, und noch öfter fehlt diese bis auf kleine Reste ganz. Im Allgemeinen verhält sich die Borke gegen die Dicke des Splints nur wie 1 gegen 6 bis 8; bei Röhren nimmt die Borke hingegen ungefähr $\frac{1}{4}$ der ganzen Dicke ein. Auf den Röhren, welche seltener als die flachen Stücke vorkommen, zeigt die Oberhaut der Borke, wenn diese noch vorhanden ist, gewöhnlich einige, obgleich nur schwache Längsfurchen, seltner einige ebenfalls nur schwache Querrisse, und ist im Ganzen genommen ziemlich eben. Nur hin und wieder finden sich Stücke, auf welchen einzelne harte Warzen oder Knoten vorkommen. Uebrigens ist die Borke ziemlich weich, ohne jedoch merklich korkartig zu seyn. Flache Stücke mit vollkommner Rinde kommen sehr selten vor. Finden sie sich aber, so ist die Borke etwas korkartig, aus mehreren Lagen zusammengesetzt, und mit sehr unregelmäßigen schwachen Querrissen und ebenfalls nur schwachen Längsfurchen versehen. Den gewöhnlich vorkommenden flachen Stücken fehlt bis auf einige kleine Reste die Borke ganz, und so erscheint nur der nackte, mit unregelmäßigen, nicht sehr tiefen Längsfurchen versehene Splint.

Die Farbe der Oberfläche fällt am meisten zwischen Gelblichweiß und Aschgrau, und wird theils durch die Oberhaut, theils durch die hin und wieder vorkommenden Flechten bestimmt, welche beide bald die eine, bald die andere Farbe zeigen. Wenn die Oberhaut fehlt, so wechselt die Farbe der

Borke gewöhnlich zwischen dem dunkel Zimmtbraunen und Braungelben ab. Eben so erscheint sehr oft die Oberfläche des Splintes, doch findet sich diese auch wohl noch dunkler gefärbt. Die Unterfläche ist bei den Röhren gewöhnlich ziemlich eben, bei den flachen Stücken aber uneben oder schwach gefurcht, auch wohl zugleich gefurcht und splittrig. Die Farbe der Unterfläche ist fast immer unrein oder bestäubt, und wechselt zwischen dem hell Zimmtbraunen und dem matt Ochergelben ab, jedoch so, daß im Ganzen immer das letztere vorherrscht. Dann nnd wann finden sich auch wohl Stücke, bei welchen die genannten Farben mit Rostbraun oder sogar mit Rehgrau abwechseln, und wieder andere, wo die Unterfläche unrein bleichgelb erscheint.

Die harte Flava bricht, ihrer oft beträchtlichen Dicke und ziemlich dichten Consistenz wegen, der Länge nach nicht leicht. Die Bruchfläche ist gewöhnlich uneben, auch wohl kurz und grobsplittrig. Der Querbruch ist, selbst bei den dicksten Stücken, oft auffallend kurzsplittrig, zuweilen auch beinahe faserig. Nur bei einem scharfen Querschnitte kann man das wenige, oft kaum bemerkbare Harz als einen schmalen Streifen in dem obern Theile des Splintes erkennen.

Der Geruch der Rinde ist flüchtig chinaartig, dann schwach erdig; der Geschmack ziemlich rein, aber nicht stark bitter, wenig zusammenziehend.

Das Pulver ist zimmtfarbig.

Diese Sorte kommt meistens in trommelartigen Seronen von circa 80 Pfund, doch auch in halben Kisten von circa 70 Pfund netto vor. Am häufigsten ist die Waare in flachen Stücken, welche mit Fragmenten, Grus und Staub vermischt ist; es finden sich indessen auch, jedoch selten, Packungen, die nichts als Röhren von verschiedener Dicke enthalten, und im Handel am geschätztesten sind.

Auf dieser Fieberrinde kommen nur wenig Flechten vor, als: **Trypethelium variolosum**; **Thelotrema bahianum**; **Pyrenula porinoides** und **discolor**; **Parmelia melanoleuca**, und **Usnea florida** ∂ **Cinchonae**.

3) **China flava fibrosa.** Holzige gelbe China.

Diese beiden Sorten gelber China sind schon seit geraumer Zeit im Handel als verschieden angesehen und unter mancherlei Namen aufgeführt worden, als: **China Bogotensis**, **China von Santa Fe**, **China de Carthagena**, **Havana-China**, **China amarilla**, **China naranjada**, **China lutescens** und andere mehr, welche sämmtlich den hier aufgeführten beiden Sorten unterzuordnen sind.

Die gelbe China ist in kleinen Quantitäten wahrscheinlich schon gleichzeitig mit der **China regia** nach Europa, als Handelsartikel aber wohl nicht früher, als gegen Ende des vorigen und zu Anfange des jetzigen Jahrhunderts gekommen. Beide Sorten sind immer zugleich und zwar ungefähr von der letzteren noch einmal so viel als von der **Flava dura** zugeführt. Die **Flava fibrosa** erhalten wir auf demselben Wege wie die vorige, sie scheint also ebenfalls von einer in Neu-Grenada vorkommenden Cinchona abzustammen, die dem Obigen zufolge sich noch häufiger als die **C. cordifolia Mut.** finden muß. In der Ruiz'schen Sammlung fand v. Bergen diese

Rinde zwar auch, aber nicht den Baum bezeichnet; er glaubt daher annehmen zu müssen, daß die Species, welcher diese Rinde angehört, bis jetzt noch unbekannt sey.

Diese China kommt in Röhren und flachen Stücken.

a) Feine, mittlere und dicke Röhren von 3—7 Linien Durchmesser. Die Dicke der Rinde beträgt $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Linie, die Länge 6—15 Zoll.

b) Flache Stücke, welche aber immer noch etwas rinnenförmig oder schwach gebogen sind. Ihre Breite fällt gewöhnlich zwischen $\frac{3}{4}$ und $1\frac{1}{2}$ Zoll, die Dicke zwischen 2 und 6 Linien, die Länge 6 und 12 Zoll.

Von den Schichten ist die Oberhaut und Borke selten ganz vorhanden. Bei Röhren beträgt die Borke, wenn sie noch da ist, $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{4}$ der Splintdecke; bei flachen Stücken ist gewöhnlich das Verhältniß des noch übrigen Theiles der Rinde zum Splinte wie 1 zu 4 oder 5.

Die Oberfläche der Röhren ist, wo die Rinde noch vorhanden ist, hin und wieder mit schwachen sehr unregelmäßigen Querrissen und Längsfurchen versehen; man trifft indessen auch Röhren, die beinahe glatt sind. Flache Stücke mit vollkommener Rinde finden sich nur sehr einzeln. Die Borke ist alsdann von ziemlich weicher, etwas korkartiger, aus mehreren Lagen zusammengesetzter Substanz, und mit schwachen, sehr unregelmäßigen Querrissen und Längsfurchen versehen. Die Farbe wechselt, wo die Oberhaut oder Reste derselben noch vorhanden sind, zwischen Gelblichweiß und Aschgrau, neigt sich aber hin und wieder auch wohl zum Schiefergrauen. Einzelne Farbenänderungen werden durch die auf der Oberhaut befindlichen Flechten bestimmt. Wenn die Oberhaut fehlt, oder absichtlich abgeschabt ist, und also die Farbe der eigentlichen Rinde hervortritt, dann herrscht überall eine fast rein ochergelbe Farbe vor. Die Oberfläche des Splintes kommt bei dieser Art nur hin und wieder bei den Röhren zum Vorschein, wo stellenweise die Borke fehlt. Sie ist entweder sehr dunkel zimmtbraun oder dunkel ochergelb, und gewöhnlich schmutzig oder bestäubt.

Die Unterfläche besteht aus ziemlich feinen Längsfasern und ist eben; bisweilen geht jedoch das Ebene in das Unebene und Splittrige über. Die Unterfläche fühlt sich immer etwas scharf an, und läßt dann sehr leicht einige kleine stechende Splitterchen in der Haut zurück. Die Farbe der Unterfläche kommt ziemlich mit der überein, welche die Borke im Innern zeigt, sie ist nämlich ein beinahe reines Ochergelb, aber gewöhnlich etwas matter, auch wohl bestäubt, hin und wieder etwas verblichen.

Der Längenbruch ist, wodurch sich diese Rinde von der vorigen und von allen andern überhaupt unterscheidet, ganz auffallend faserig und ein in dieser Richtung durchbrochenes flaches Stück hängt fast immer noch durch einige oft ziemlich dicke Fasern zusammen. Diese Sorte bricht auch beinahe niemals in gerader, sondern fast immer in schiefer Richtung. Der Querbruch ist sehr lang- und dünnsplittrig oder faserig. Die Splittern und Fasern sind sehr biegsam, fast weich zu nennen, jedoch keinesweges glasig. Von Harz kommen keine merklichen Spuren vor.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0307-2

Der Geruch der Rinde ist schwach lohartig, etwas reizend, der Geschmack anfangs holzig und fade, dann nur wenig bitter und zusammenziehend, überhaupt schwächer, als bei allen übrigen Chinasorten.

Das Pulver hält das Mittel zwischen Zimmtfarbe und Ochergelb.

Diese Sorte kommt wie die vorige in trommelartigen Seronen und halben Kisten. Röhren finden sich nur selten, desto mehr flache Stücke, Fragmente, Grus und Staub.

Es kommt im Handel noch eine hiezu gehörige Sorte vor, die eine weit dunklere Farbe hat, nämlich eine mehr röthliche, die bis ins hell Kastanienbraune übergeht; auf der Unterfläche ist die Farbe mehr zimmtbraun. Die Rinde hat eine etwas festere Consistenz, sonst ist sie nicht verschieden.

Die nur in geringer Menge vorkommenden Flechten sind: **Thelotrema bahianum; Pyrenula porinoides und discolor; Parmelia melanoleuca und Usnea florida ∂ Cinchonae.**

China. Rothe Rinde. Rothe Chinarinde.

Cinchona angustifolia Ruiz? Ein Baum des südlichen Amerikas.

Eine der vorigen sehr ähnliche Rinde, nur durch die rothe Farbe der innern Lage verschieden, so daß sie von einer Varietät genommen zu seyn scheint.

Die Chinarinden seyen von einem eigenthümlichen nur durch Uebung zu erkennenden Geschmacke, und von einem gleichsam dumpfigen jedoch gewürzhaften Geruche. Das mit kaltem Wasser bereitete Infusum der braunen Rinde sey von der Farbe des weißen Franzweines, niemals ins Braune übergehend, aus der rothen Rinde von gelbrother Farbe; das erkaltete Decoct werde milchig. Das Infusum werde von Brechweinsteinauflösung mehr oder weniger getrübt, desgleichen von der Galläpfeltinctur; von der Auflösung des trocknen salzsauren Eisenoxyduls werde es smaragdgrün gefärbt.

Es ist sehr möglich, daß unsere jetzige rothe China dieselbe Art ist, deren schon die ältesten Reisenden in Südamerika erwähnt haben. La Condamine erklärte die rothe Fieberrinde für besser als die gelbe, und Joseph v. Jussieu bemerkt, daß die rothe China diejenige sey, welche zuerst in Gebrauch gekommen und in Peru am meisten geschätzt werde. Wenn das Jahr 1779 als der Zeitpunkt angegeben wird, in welchem die rothe China zuerst nach Europa gekommen, so ist diese Annahme viel zu spät, denn aus den von v. Bergen gesammelten Nachrichten geht hervor, daß man diese China schon seit mehr als 100 Jahren in Europa gehabt, solche aber in früheren

Zeiten zum Theil ganz verkannt habe. Doch hat mit dem Jahre 1779 erst eigentlich unsere nähere Kenntniß dieser Rinde angefangen.

Als Mutterpflanze der rothen Fieberrinde wurde von den meisten Autoren sehr bestimmt die Cinchona oblongifolia Mutis angegeben, welcher Angabe selbst Hayne beistimmte. V. Bergen spricht als bestimmt die Meinung aus, daß es noch unbekannt sey, von welcher Species die rothe China abstamme.

Diese Chinasorte kommt vor in Röhren und flachen Stücken:

a) Feine, mittlere und dicke Röhren von 2 Linien bis 1¼ Zoll Durchmesser. Dicke der Rinde ½—2 Linien, Länge 2—12 Zoll und drüber. Röhren von 9—12 Zoll Länge kommen aber nicht häufig vor. Die geschlossenen Röhren sind oft spiralförmig gewunden.

b) Mehr oder minder etwas gebogene oder ganz flache Stücke von unregelmäßiger Form. Größtentheils Rinden vom Stamme oder von starken Aesten. Diese Stücke finden sich von allen Dimensionen, von 1—5 Zoll Breite, 2 Zoll bis 2 Fuß Länge; und ⅜—¾ Zoll Dicke. Die Schichten, Oberhaut, Rinde, Bast und Splint, finden sich alle, und in der Regel fehlt keine ganz. Sehr selten kommt die Borke allein ohne den Splint vor. Etwas häufiger fehlt hin und wieder die Borke, wo dann stellenweise der Splint unbedeckt erscheint. In der Dicke verhält sich die Borke gegen den Splint gewöhnlich wie 1 gegen 3.

Die Oberfläche der feinen und Mittelröhren zeigt gewöhnlich viele der Länge nach laufende, mehr oder weniger genäherte, oder in einander übergehende, wellenförmige Runzeln. Bei den dicken Röhren und flachen Stücken gehen diese Runzeln, zwischen denen sich hin und wieder auch Längsfurchen zeigen, oft in Erhöhungen über, die zum Theil als rundliche, mehr aber als etwas längliche Warzen erscheinen, welche von leicht zerreiblicher, gewöhnlich etwas körniger Consistenz sind, und auf Mittelröhren äußerst selten, auf feinen gar nicht vorkommen. Querrisse kommen auf der rothen China nur sehr selten vor. Die Farbe der feinen und der meisten Mittelröhren wechselt zwischen dem Rehgrauen, hell Eichelbraunen und matt Rothbraunen ab, indessen sind die beiden ersten Farben die vorherrschenden. Bei den dicken Röhren (auch einigen mittlern) und flachen Stücken ändert sich die Farbe vom Rothbraunen bis zum Kastanienbraunen, oft mit etwas Purpurschimmer verbunden. In der Regel nimmt bei Waaren von gleicher Frische mit der Dicke der Röhren und flachen Stücke auch die stärkere Färbung derselben zu. Sowohl die Röhren, als die flachen Stücke sind oft entweder nur stellenweise, oder beinahe überall mit einem weißlichgrauen oder gelblichweißen Ueberzuge versehen, welcher entweder aus der Oberhaut, oder den sie bedeckenden Flechten besteht; wo die Borke stellenweise fehlt, da zeigt die Oberfläche des Splintes gewöhnlich eine schmutzige, oft etwas röthliche Zimmtfarbe.

Die Unterfläche ist bei feinen und Mittelröhren zartfaserig, wird aber immer grobfaseriger, bis ins Splittrige übergehend, je mehr die Röhren an Dicke zunehmen. Am gröbsten erscheinen die Fasern und Splitter bei den

flachen Stücken, wobei auch die Fläche immer mehr und mehr uneben und endlich auffallend grobsplittrig wird. Die Farbe der Unterfläche nimmt im Allgemeinen an Kraft ziemlich regelmäßig so zu, daß sie bei den feinen Röhren am schwächsten und hellsten, bei den dicken Röhren und flachen Stücken am gesättigtesten und dunkelsten erscheint. Am allerkräftigsten sind die freilich nur selten vorkommenden dicken Rinden der Wurzel gefärbt. Die feinen Röhren sind auf der innern Seite gewöhnlich von rostbrauner Farbe, welcher aber doch schon etwas Roth beigemischt ist. Bei den Mittelröhren findet sich im Ganzen dieselbe Färbung, es tritt dabei indessen das Rothe noch mehr hervor. Die dicken Röhren und flachen Stücke endlich zeigen im Allgemeinen mehr oder weniger die gesättigte braunrothe Farbe, welche dieser Sorte eigenthümlich ist. Ganz rein kommt diese braunrothe Farbe indessen sehr selten vor, weil sich gewöhnlich nicht nur ein gelblicher oder bräunlicher Farbenton mit einmischt, sondern die Unterfläche überhaupt oft etwas schmutzig erscheint, welches von einem fast schimmelartigen Ueberzuge herrührt, von dem sie durch Abreiben oder Abschaben befreit werden kann. Fährt man mit der Fläche des Fingernagels oder mit einem andern glatten und harten Körper über den Splint hin, so zeigt sich die dadurch polirte Stelle weit dunkler, als das Uebrige.

Der Längenbruch, bei allen Dimensionen nach Verhältniß der Dicke mehr oder weniger uneben, zeigt deutlich sowohl die verschiedene innere Farbe der Borke und des Splintes, als auch die Harzlage, welche sich in dem untern Theile der Borke und in dem obern Theile des Splintes gesammelt hat. Der Querbruch ist bei feinen Röhren meistens eben, bei Mittelröhren schon etwas faserig, bei dicken Röhren und flachen Stücken zugleich faserig und splittrig. Alles Fasrige und Splittrige ist aber nur dem Splinte eigen, denn die Borke bricht bei allen Dimensionen entweder ziemlich eben, oder doch nur hin und wieder auf ungleichen Stellen etwas körnig. Bei dieser und bei allen andern harzreichen Chinasorten zeigt die Borke gewöhnlich einen ebenen, fast glasigen, etwas schimmernden Bruch.

Der Geruch der Rinde ist schwach lohartig, erdig, etwas reizend; der Geschmack stark, aber nicht unangenehm bitter, zugleich etwas gewürzhaft und reizend, nicht lange anhaltend.

Das Pulver ist matt braunroth.

Die rothe China kommt nur in ganzen Kisten, nie in Seronen vor. Die flachen Stücke sind im Handel die geschätztesten.

Diese Sorte gehört zu denen, welche im Ganzen am wenigsten mit Flechten besetzt sind. Folgende kommen darauf vor: **Chiodecton sphaerale**; **Thelotrema terebratum**; **Pyrenula verrucarioides**, **mastoidea** und **discolor**; **Lecanora punicea**; **Parmelia melanoleuca** und **Rhizomorpha Cinchonae**; letztere findet sich aber nur auf dicken Stamm- und Wurzelrinden.

Außer den hier aufgeführten kommen auch noch einige andere unter dem Namen der Chinarinde vor, die gar nicht zu diesen gehören, auch gar nicht

von einer Cinchona abstammen, sich daher nicht nur in chemischer Hinsicht, daß sie nämlich kein Alkaloid enthalten, sondern auch schon durch ihr Aeußeres so wesentlich von den Chinarinden unterscheiden, daß sie sogleich erkannt werden können. Dahin gehören: **China nova**, von braunrother Farbe, die von **Portlandia grandiflora**, einer auf Jamaika und Surinam wachsenden Pflanze, abgeleitet wird; China von St. Lucie, von **Exostemma floribundum**; **China Pitou**, **C. Pitoya**, welche unlängst von Brera als eine neue Chinarinde unter dem Namen **China bicolorata** wieder aufgeführt worden, wahrscheinlich aber auch mit der schon früher bekannten **C. Tecamez** oder **Atacamez** identisch ist, die nach v. Jacquin von **Croton febrifugum** abstammt, nach Andern eine Angusturarinde ist u. s. w. Die letztere gilt für ein Brech- und Purgirmittel, und soll nicht ganz frei von giftigen Eigenschaften seyn. Guibourt (Pharm. Waarenk. 1823. I. S. 409.) hat einen gelben krystallinischen Stoff daraus abgeschieden. Nach einer vollständigen Analyse von Pelletier und Petroz (Trommsd. N. J. XII. 1. 1826. S. 139.) enthält sie an auflöslichen Substanzen: 1) Chlorophyll; 2) Wachs; 3) eine fette Materie; 4) eine wegen ihrer geringen Menge nicht bestimmbare vegetabilische Säure; 5) eine in Wasser unlösliche harzige Materie; 6) eine kleine Menge einer bittern Substanz, welche sich auch in der Columbowurzel findet; 7) eine gummige Materie.

Als äußere Kennzeichen einer guten Chinarinde lassen sich im Allgemeinen angeben: eine lebhafte, nicht matte, blasse, Farbe der äußern und innern Seite; regelmäßige Querrisse auf der Oberfläche; der eigenthümliche gewürzhaft dumpfige Geruch, welcher den Flechten zuzuschreiben ist, und daher zum Belege dient, daß die China nicht zu veraltet ist, und der bittere, jedoch nicht widrige Geschmack. Der warme Aufguß der braunen China ist rein hell und gering röthlich gefärbt, das Decoct ist heiß dunkelbraunroth, erkaltet zeigt es eine starke Milchtrübung. Der Aufguß giebt mit dem schwefelsauren Eisenoxyd eine schöne blaugrüne Farbe, das Decoct eine schmutzig grüne Trübung. Das Infusum der Königschina ist beinahe farbenlos, etwas wenig getrübt, das Decoct ist warm röthlichbraun, erkaltet trübe von Milchkaffeefarbe, und sich dabei nach oben wieder aufhellend. Die rothe China giebt ein Infusum von gelber, ins Röthliche schielender Farbe; das Decoct ist warm durchscheinend und roth, erkaltet trübe ins Orangefarbene übergehend, mit einem absetzenden ziegelrothen Bodensatze. Die wäßrigen Auszüge guter Chinarinden werden von geistigem und wäßrigem Galläpfelaufgusse niedergeschlagen (der Niederschlag ist gallussaures Cinchonin und Chinin); mit Brechweinstein erfolgt ein reichlicher, flockiger, weißgelblicher Niederschlag, aber auch mit Leimauflösung erfolgt ein sichtlicher, jedoch geringerer Niederschlag; mit kleesaurem Kali gleichfalls Niederschlag. Die Chinasäure prädominirt bloß in den bessern Chinasorten, daher auch alle ächten Chinasorten das Lackmuspapier röthen.

Hinsichts der ältern chemischen Arbeiten auf die meisterhafte Zusammenstellung in Pfaff's **Materia medica** verweisend, gehen wir hier gleich zu den in der chemischen Geschichte der Chinarinden Epoche machenden Abhand-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0311-3

lungen der Herren Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 5. und VI. 2. S. 3.; Buchn. Repert. XII. 1. S. 1.; Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 41.; Schweigg. N. J. II. S. 413. u. III. S. 62.), mit gleichzeitiger Benutzung der weiter unten erwähnten Analyse von Bucholz. Die Arbeiten ihrer Vorgänger, vorzüglich Vauquelin's benutzend, unterwarfen sie zuerst die graue Chinarinde (welche die Verf. von C. Condaminea abstammen lassen, die aber von Batka, der von Pelletier eine Probe dieser China erhielt, mit Wahrscheinlichkeit für eine Huanuco mit Huamalies vermischt erklärt wird) einer neuen Analyse, und entdeckten als den eigentlich wirksamen Bestandtheil der Rinde krystallisirbare Alkaloide, die sie Cinchonin und Chinin nannten. Als der erste Entdecker derselben ist indeß Gomez, ein Portugiese anzusehen, der diesen Grundstoff der Chinarinden in einem fast reinen Zustande kannte; doch gebührt den Herren Pelletier und Caventou die Ehre, die Eigenschaften des reinen Cinchonins und dessen Verbindungen zuerst nachgewiesen zu haben. Ihr Verfahren war folgendes: Zwei Kilogramme zerstoßener Chinarinde behandelten sie mit 6 Kilogrammen starken Alkohols in der Wärme, welches viermal wiederholt wurde. Die alkoholischen Tincturen wurden mit einem Zusatze von 2 Kilogrammen destillirten Wassers der Destillation unterworfen. Die ausgeschiedene, durch ein Filtrum von der wäßrigen Flüssigkeit geschiedene Substanz war von einer röthlichen Farbe und von harzartigem Ansehn; in diesem Zustande wurde sie auf dem Filtrum selbst mit schwachem Kaliwasser ausgelaugt, bis die alkalischen Flüssigkeiten wasserklar abliefen, dann noch mit einer hinreichend beträchtlichen Menge destillirten Wassers ausgewaschen. Sie war dann grünlichweiß, sehr schmelzbar, in Alkohol auflöslich und gab Krystalle. Es war das Cinchonin des Dr. Gomez, und zeigte einige Eigenschaften der harzigen Substanzen. Als man sie in einer sehr mit Wasser verdünnten Salzsäure auflöste, ließ sie eine beträchtliche Menge fetter Materie von grüner Farbe (Chlorophyll) fallen. Die saure Flüssigkeit, goldgelb, und sehr bitter schmeckend, wurde mit gebrannter Magnesia in gelinder Wärme behandelt, und der Magnesianiederschlag auf einem Filtrum mit Wasser ausgewaschen, bis dieses farblos abfloß. Der im Marienbad ausgetrocknete Niederschlag wurde dreimal mit 40gradigem Alkohole ausgezogen. Die sehr bittere und gelbe Flüssigkeit gab beim Verdunsten nadelförmige Krystalle von einem schmutzigen Weiß, die durch Umkrystallisiren ganz weiß erhalten wurden, was auch durch Waschen mit kaltem Aether bewirkt werden konnte.

Außer dem Chinaalkaloid erhielten die Verfasser:

2) die bereits erwähnte fette Materie von grüner Farbe. Bucholz (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 94.) hat diese besonders rein erhalten. Feinröhrige braune China wurde so lange mit Weingeist von 85 Procent ausgezogen, als dieser noch etwas aufnahm, der größte Theil des Weingeistes abgezogen, und dann bei gelinder Wärme in der Porzellanschale verdunstet. Hier schied sich nun an den Wänden des Gefäßes und in der Flüssigkeit schwimmend eine namhafte Menge eines angenehm grünen Stoffes aus, der

durch Abspühlen mit rectificirtem Weingeiste und Auflösen in kaltem Aether, wobei Spuren von anhängendem Chinaharze zurückblieben, und nachheriges Verdunsten des Aethers möglichst rein erhalten wurde. Er ist in der gewöhnlichen Temperatur ziemlich weich, in heißem Alkohol und kaltem Aether leicht löslich, bildet mit Aetzkalilauge und Aetzammoniak seifenartige Verbindungen, hat einen angenehmen Chinageruch, aber keinen Geschmack, und verdankt ohne Zweifel seine Farbe dem Chlorophyll, welches in der Königschinarinde nicht vorhanden ist, denn der bei Zerlegung derselben von Pelletier und Caventou durch Ausziehen mit Aether erhaltene fette Stoff (Weichharz?) hatte keine grüne Farbe.

3) Einen in kaltem Wasser unauflöslichen rothen Farbestoff (Hartharz der Chinarinden). Die rückständige von der fetten Materie befreite Flüssigkeit war braunroth schielend und sehr bitter, und ließ röthliche Flocken fallen. Durch Verflüchtigung des Weingeistes wurde ein dunkelbrauner harziger Bodensatz erhalten, welcher von der braunrothen Flüssigkeit getrennt wurde. Ersterer wurde mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser digerirt, wodurch wieder ein Auszug von braunrother Farbe, der vorigen Flüssigkeit ähnlich, erhalten wurde; hiermit wurde so lange fortgefahren, bis der Auszug sich gegen Gallapfeltinctur und Hausenblasenlösung völlig indifferent verhielt. Der harzige Rückstand war nach und nach bedeutend spröder geworden und zuletzt von pulverförmiger Beschaffenheit. Diese unauflösliche rothe Materie ist nach P. und C. geschmacklos, geruchlos, und doch löst das kochende Wasser einen kleinen Theil davon auf. (Von einem Gran, in sechs Unzen Wasser gekocht, blieb der größte Theil unaufgelöst, jedoch trübte sich die Auflösung beim Erkalten). Die Säuren befördern die Auflösung in Wasser; concentrirte Essigsäure löst sie sehr gleich auf, allein durch Wasser, in reichlicher Menge zugesetzt, wird der größte Theil niedergeschlagen. Diesen Eigenschaften nach gehört sie zu den Hart- oder Halbharzen, denn auch manche andere Harze, z. B. der Koloquinthen, des Sternanis, der Jalappe ꝛc. sind in Essigsäure auflöslich; die Auflöslichkeit in kochendem Wasser ist unbedeutend. Nach Bucholz zeichnete sich diese Materie durch eine unangenehme Bitterkeit aus, welche von der der Chinaalkaloide ganz verschieden ist, war zum Theil in Aether auflöslich, der eine dunkelbraune Farbe annahm, und ganz mit dem unangenehmen Bitter beladen war. Nach Verdunstung des Aethers blieb ein schmutzig brauner Rückstand von weicher Beschaffenheit, dem siedenden Wasser und verdünnten Säuren weder Farbe noch Geschmack mittheilend, und als ein eigenthümliches bitteres Weichharz sich verhaltend. Das nach dieser Behandlung mit Aether verbliebene rothbraune Pulver hatte alle von P. und C. angegebenen Eigenschaften. Diesem Hartharze, welches in der Wärme zu größern und kleinern Massen zusammenschmolz, kommt nun die Eigenschaft zu, den Brechweinstein zu fällen, wenn seine geistige Auflösung mit einer Auflösung desselben versetzt wird.

4) Einen in Wasser auflöslichen rothen Farbestoff (eigenthümlichen Gerbestoff). Die mit den auflöslichen Grundstoffen der harzartigen Materie

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0313-5

beladene braunrothe Flüssigkeit, welche von dem Hartharze getrennt worden, war von angenehm bitterm, säuerlich zusammenziehendem Geschmacke, dumpfig aromatischem Geruche, und röthete das Lackmuspapier. Sie wurde mit den gesäuerten Auszügen zusammengegossen und bis auf $\frac{2}{3}$ verdunstet, wobei sich der eigenthümliche aromatische Chinageruch entwickelte, und beim Erkalten eine Trübung und ein Bodensatz von dem rothen Hartharze entstand. Die Flüssigkeit schlug den thierischen Leim, die Galläpfeltinctur und den Brechweinstein nieder. Sie wurde mit Bittererde gekocht, wobei sie die rothe Farbe ganz verliert, und außer dem Alkaloid auch der Farbestoff abgeschieden wird. Die von der Magnesia abfiltrirte Flüssigkeit verhielt sich jetzt gegen die drei Reagentien indifferent (Gallusdecoct wurde kaum getrübt), und war von goldgelber Farbe. Die blaßroth gefärbte Magnesia wurde mit destillirtem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Mit starkem Alkohol wiederholt in der Wärme behandelt, wurden Auszüge von angenehm rein bitterm Geschmacke, das Alkaloid enthaltend, erhalten; die Bittererde aber blieb mit dem rothen auflöslichen Farbestoffe (Gerbestoff), und mit unauflöslichem Farbestoffe (Hartharz) verbunden zurück. Erstere Verbindung wird von verdünnter Essigsäure leicht aufgenommen, und es bleibt eine blaßrothe Substanz zurück, welche von concentrirter Essigsäure aufgelöst, aus dieser aber durch Wasser niedergeschlagen wird, welcher Niederschlag vorzüglich aus dem unauflöslichen rothen Farbestoffe besteht. Um den auflöslichen Farbestoff, den wahren Gerbestoff der Rinde, zu erhalten, wird die essigsaure Auflösung so lange mit Bleiessig versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht, das entstandene Blei-Tannat getrennt, mit großen Quantitäten Wasser ausgewaschen, in Wasser zertheilt und durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die von dem entstandenen Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit ist von rothbrauner Farbe, röthet das Lackmuspapier, und giebt nach dem Abdampfen einen rothen Rückstand, der besonders aus der braunen China im Wesentlichen mit dem Gerbestoffe des Catechu und Kino übereinstimmte, aber noch ein wenig Essigsäure zurückhielt. Er schlägt das schwefel- und salzsaure Eisen dunkelgrün nieder, und erzeugt in der Leim- und Stärkemehlauflösung Niederschläge. Pelletier und Caventou schreiben ihm auch die Eigenschaft zu, den Brechweinstein zu fällen, Pfaff ist aber der Meinung, daß er dieselbe nur einem damit verbundenen Antheile von Hartharze verdanke. P. und C., welche im Allgemeinen die verschiedenen Gerbestoffe des Pflanzenreichs als zusammengesetzte und veränderliche Substanzen, entsprungen aus der Vereinigung einer vegetabilischen Materie und einer Säure, ansehen, halten, wie mir es scheint, mit Recht den Chinagerbestoff nur für eine natürliche Abänderung des Chinaroths (Hartharzes), da der Unterschied zwischen beiden Materien hauptsächlich in dem Grade der Auflöslichkeit besteht.

5) Gelbe färbende Substanz. Die von der Magnesia abfiltrirte Flüssigkeit und die Abwaschwasser werden zur klaren Syrupsconsistenz verdunstet; mehrere Tage sich selbst überlassen, gesteht das Ganze zu einem körnigen Magma. Wenn man dieses Magma mit sehr starkem Alkohol behan-

delt, so erhält man ein beinahe weißes Salz fast ohne Bitterkeit. Der in Alkohol und in Wasser gleich auflösliche gelbfärbende Grundstoff, der das Salz begleitete, bleibt nebst dem durch die Aussüßwasser der Bittererde etwa entzogenen Alkaloid in Weingeiste aufgelöst. Verdunstet man die alkoholische Tinctur zur Trockne, behandelt den Rückstand mit Aether, und überläßt denselben einem langsamen Verdunsten in einem Gefäße mit sehr enger Oeffnung, so schlägt sich der größte Theil des Alkaloids nieder, während der noch nicht verdunstete Aether die gelbe Materie zurückhält. Diese hat keinen ausgezeichneten Geschmack, ist auflöslich in Wasser, Alkohol, selbst Aether, wird von dem essigsauren Blei niedergeschlagen, und schlägt weder den Leim, noch den Brechweinstein, noch den Galläpfelaufguß nieder. Bucholz erhielt nur einen Antheil von Hartharz mit noch etwas Cinchonin verbunden.

6) Chinasäure. Das weiße Salz, welches von dem Magma durch den Alkohol nicht aufgelöst worden war, in Wasser auflöslich und schwer zu krystallisiren, von frischem wenig bitterm Geschmacke ist, besteht aus Magnesia und Chinasäure, die von Vauquelin in der China entdeckt worden, wo sie an Kalk gebunden ist. Nach Bucholz war auch etwas salzsaure Magnesia vorhanden. Um die Chinasäure von der Magnesia zu scheiden, wird das Salz mit Kalk zersetzt, die Flüssigkeit filtrirt, der überschüssige Kalk durch Kohlensäure entfernt, verdunstet und zum Krystallisiren hingestellt. Das erhaltene Salz, chinasaurer Kalk, wird durch ein richtiges Verhältniß Sauerkleesäure zersetzt, und dann durch Verdunsten der von dem kleesauren Kalke geschiedenen Flüssigkeit die Chinasäure erhalten. Sie wird durch Auflösen in Alkohol, wobei sich einige Flocken Gummi abscheiden, gereinigt. Sie ist sehr auflöslich, gleichwohl kann sie zu einer theils blättrigen, theils körnigen Krystallmasse anschießen. Ihr Geschmack ist sehr sauer, leicht bitter; ihre erdigen und alkalischen Salze sind auflöslich und krystallisirbar; sie schlägt die Salze von Blei, Quecksilber und Silber nicht nieder, doch wird das basische essigsaure Blei gefällt; mit dem Kalke bildet sie ein in rhomboidalen Tafeln krystallisirendes Salz; bei der trocknen Destillation giebt sie unter Aufblähen und Schwarzwerden eine weiße brenzlige Säure, welche auch sehr verdünnte Eisenauflösungen grün färbt.

7) Gummi, Stärkemehl, chinasaurer Kalk. Die durch Alkohol erschöpfte China wird mit kaltem Wasser macerirt, das Fluidum zur Syrupsconsistenz verdunstet, und mit Alkohol behandelt. Der auflösliche rothe Farbestoff (Gerbestoff), vermöge dessen das kalte Infusum auf den Leim und Brechweinstein reagirt, wurde durch Alkohol ausgezogen, wogegen die in Alkohol unauflösliche Materie, ein Gemenge aus chinasaurem Kalke (nach Bucholz auch salzsaurem Kalke) und gummiger Materie, jetzt ausgezogen worden. Ersterer kann durch Krystallisation geschieden werden. Durch Auskochen würden dann die vorigen Stoffe, und außerdem (nach Bucholz wenig) Stärkemehl erhalten, welches nach P. und C. mit dem Gerbestoffe eine besondere Verbindung bildet. Verdünnte Säuren zogen aus der erschöpften Rinde nichts mehr aus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0315-7

Beim Einäschern lieferten die holzigen Theile einige Spuren einer aus kohlensaurem Kalke bestehenden Asche (nach B. mit Spuren von Kieselerde und kohlensaurem Kalke.)

Nach Pelletier und Caventou hat die braune Chinarinde folgende Bestandtheile: Cinchonin an Chinasäure gebunden; grüne fette Materie; rothen unauflöslichen Farbestoff (Chinaroth); rothen auflöslichen Farbestoff (Gerbestoff); gelbe färbende Materie; chinasauren Kalk, Gummi, Stärkemehl und Holzfaser; später fügten sie noch das Chinin hinzu.

Nach Bucholz d. Sohn enthält die braune Chinarinde in 16 Unzen an auflöslichen Bestandtheilen: fettige Materie mit Chlorophyll 1 Drachme; bitteres Weichharz 2 Dr.; Hartharz 12 Dr.; Gerbestoff mit etwas Essigsäure 3 Dr.; Cinchonin 28 Gran, gebunden an Chinasäure 1 Dr. 30 Gr.; Hartharz mit Phyteumacolla 47 Gran (Phyteumacolla hat B. nicht besonders dargestellt, sondern er schließt nur darauf aus dem Geruche bei Zersetzung durchs Feuer); Gerbestoff mit salzsaurem Kalke 4 Dr. 25 Gr.; Gummi 5 Dr. 40 Gran; chinasauren Kalk 1 Dr. 40 Gr.; Amylum geringe Menge. S. = 4 Unzen 30 Gran.

In der Königschinarinde fanden Pelletier und Caventou: chinasaures Chinin; Chinaroth; rothen auflöslichen Farbestoff (Gerbestoff), der sich von dem in der grauen China enthaltenen nur dadurch unterscheidet, daß er die Eisensalze, statt sie grün zu fällen, braun niederschlägt; gelben Farbestoff; fette Materie, dieselbe wie in der grauen China, bis auf die Farbe, welche orangegelb ist; chinasauren Kalk, Stärkemehl (keine gummige Materie) und Holzfaser.

In der rothen Chinarinde fanden sie: chinasaures Cinchonin; chinasaures Chinin; Chinaroth; Gerbestoff; gelben Farbestoff; chinasauren Kalk; Stärkemehl und Holzfaser. Sie fanden in dieser Chinarinde eine weit beträchtlichere Menge von Alkaloiden als in den andern.

Als die vorzüglichsten Bestandtheile der Chinarinden sind die beiden Alkaloide, das Cinchonin und das Chinin, anzusehen, von denen das erstere vorzugsweise in den braunen Chinaarten, das letztere in den gelben enthalten ist. Sie sind als bewährte Heilmittel in ihren salzigen Verbindungen in den medicinischen Gebrauch übergegangen, die Bereitung derselben wird daher im 2ten Theile ihre Stelle finden; hier muß jedoch der Alkaloide selbst Erwähnung geschehen.

Das Cinchonin bildet im reinen Zustande weiße durchsichtige Nadeln, ist geruchlos und hat einen schwach bittern Geschmack. In Wasser ist es wenig auflöslich, 2500 Th. kochenden Wassers lösen einen Theil auf, und die Auflösung opalisirt beim Erkalten, in gewöhnlicher Temperatur werden 5500 Th. erfodert. In Alkohol aber löst es sich leicht auf, die Auflösung ist sehr bitter, und bläuet geröthetes Lackmuspapier; die in der Siedehitze des Weingeistes gesättigte Auflösung läßt beim Erkalten Krystalle anschießen. Aether löst viel weniger davon auf, als Weingeist. Terpenthinöl und fette Oele lösen sehr wenig davon auf. Mit den Säuren geht es Verbindungen nach

bestimmten Proportionen ein, sättigt dieselben vollkommen, und bildet damit sehr bitter schmeckende, größtentheils in Wasser und Alkohol auflösliche Salze. Bei 6000facher Verdünnung macht die Galläpfeltinctur, bei 1000facher Verdünnung das Ammoniak noch eine bemerkliche Trübung. Die letzten Bestandtheile des Cinchonins sind Kohlenstoff 76,97; Stickstoff 9,02; Wasserstoff 6,22; Sauerstoff 7,79.

Das Chinin ist schwer krystallisirbar, und stellt gewöhnlich eine schmutzig weiße poröse Masse dar von sehr bitterm Geschmacke, wird es aber im luftleeren Raume geschmolzen, so nimmt es beim langsamen Erkalten eine krystallinische Textur an. Später gelang es Pelletier, das Chinin zum Krystallisiren zu bringen, indem er es in einem Alkohol von 40 — 42° B. auflöste und an einem sehr trocknen und kalten Orte zur freiwilligen Verdunstung hinstellte. Es bildeten sich Büschel seidenartigglänzender Krystalle, die einzelnen Strahlen erschienen unter dem Mikroskope als verlängerte Prismen. Ist der Weingeist von geringerer Stärke, so tritt ein Zeitpunkt ein, wo er zu wäßrig wird, um das Chinin in Auflösung erhalten zu können, und statt regelmäßig zu krystallisiren, scheidet es sich als Hydrat in einer harzähnlichen unförmlichen Masse aus, welche nur bei längerem Schmelzen ihr Wasser verliert. Robiquet hat noch eine andere Methode angegeben: wenn eine gehörig verdünnte wäßrige Auflösung des schwefelsauren Chinins durch ein Alkali zersetzt wird, so geht bei höherer Temperatur die Flüssigkeit klar durch das Filtrum, beim Erkalten aber scheidet sich das Chinin in schwarzen Flittern oder Blättchen ab, welche sich zweigförmig oder zu kleinen Wölbungen gruppiren. Wird das Chinin geschmolzen, so zeigt es sich idioelektrisch, und erhält mit Tuch gerieben eine starke Harzelektricität. In Wasser ist es nicht sehr löslich, doch soll es in der Siedhitze nur 200 Th. erfodern; in Weingeist und Aether ist es leicht löslich, und zwar leichter als das Cinchonin. Terpenthinöl und fette Oele nehmen nur sehr wenig davon auf. Es geht mit allen Säuren Verbindungen nach bestimmten Proportionen ein, und vermag die stärksten Säuren zu neutralisiren. Die sehr bitter schmeckenden Chininsalze zeigen oft Perlmutterglanz, sind leichter krystallisirbar und weniger in Wasser löslich als die Cinchoninsalze. Sie werden durch sämmtliche Alkalien und durch Bittererde gefällt, wobei sich das Chinin in weißen Flocken abscheidet und durch Galläpfeltinctur noch bei 6000facher Verdünnung niedergeschlagen. Das Chinin enthält als letzte Bestandtheile: Kohlenstoff 75,02; Wasserstoff 6,66; Stickstoff 8,45; Sauerstoff 10,40. S. = 100,53.

Durch diese Kenntniß der Bestandtheile der Chinarinden wird es erklärlich, wie auch das Verhalten der Chinaaufgüsse gegen die vorher angegebenen Reagentien verschieden wird ausfallen müssen, und hierüber finden sich sehr belehrende Versuche von Schrader im Berl. Jahrb. XXI. 1820. S. 81., bei denen wir jedoch uns nicht in völliger Gewißheit befinden, welche Chinasorte zum Versuche gedient hat. Auch Michaelis (Hufel. J. April 1824. S. 112.) hat verschiedene Chinarinden auf ihren Gehalt an Alkaloid

geprüft, und Resultate erhalten, die mit denen in der beigefügten Tabelle sehr gut übereinstimmen. Es ist daher aus den dem v. Bergen'schem Werke beigegebenen Tafeln beiliegende Tafel ausgezogen, welche die wichtigsten Resultate der chemischen Versuche enthält. Aus der dem erwähnten Werke gleichfalls beigefügten Abhandlung des Herrn Prof. Pfaff theile ich nur noch folgende Bemerkungen mit:

1) **China Huanuco** enthält bloß Cinchonin. Unverändert durch Leimauflösung, gefällt durch Brechweinstein und Galläpfeltinctur, durch salzsaures Eisenoxyd nur schwach ins Gelbgrüne verändert.

2) **China Huamalies.** Etwas getrübt durch Brechweinstein und Leimauflösung (bei andern in diese Tabelle nicht aufgenommenen Rinden), stärker getrübt durch Galläpfeltinctur. Mehr oder weniger grün gefärbt durch salzsaures Eisen.

3) **China de Loxa.** Arm an Alkaloid, enthält beide, doch mit Uebergewicht des Chinins. Vorzüglich stark getrübt durch Brechweinstein, dann auch durch thierischen Leim und salzsaures Eisen; wenig getrübt durch Galläpfeltinctur.

4) **Ten-China.** Ohne merklichen Antheil an Alkaloid. Merklich getrübt durch Leimauflösung, kaum getrübt durch Galläpfeltinctur.

5) **China regia** enthält bloß Chinin. Nicht verändert durch Leimauflösung, stark getrübt durch Brechweinstein und Galläpfeltinctur; wenig ins Grüne verändert durch salzsaures Eisen.

6) **China flava** enthält beide Alkaloide in veränderlichem Verhältnisse, doch mit Uebergewicht des Cinchonins. Fast unverändert durch Brechweinstein, Leimauflösung und salzsaures Eisen; ziemlich stark getrübt durch Galläpfeltinctur.

7) **China rubra** enthält beide Alkaloide mit Uebergewicht des Cinchonins. Unverändert durch Leimauflösung, stark getrübt durch Brechweinstein und Galläpfeltinctur, nur hellgrün gefärbt durch salzsaures Eisenoxyd, ohne Trübung.

Ordnet man die verschiedenen Arten von Chinarinden nach dem Werthe, den ihnen ihr verschiedener Gehalt an Alkaloid ertheilt, so folgen sie in dieser Ordnung:

Huanuco	mit dem Maximum von		43,750	℥	Cinchonin auf 100 Pfund.
China-rubra	—	—	40,208	℥	(Cinchonin 38,333, Chinin 1,875.)
China regia	—	—	33,75	℥	(aus einer hier nicht aufgeführten Sorte.)
Huamalies	—	—	19,792	℥	(gleichfalls.)
China flava	—	—	13,333	℥	(gleichfalls.)
China de Loxa	—	—	11,104	℥	(7,083 Cinchonin u. 6,250 schwefelsaures Chinin.)
Ten-China	—	—	—	—	schwefelsaurem Chinin.

Wenn man auf die Verwandtschaft und die Uebergänge der verschiedenen

Chinarinden in einander nach ihrem chemischen Gehalte Rücksicht nimmt, so möchten sie sich in folgende Stellung bringen lassen:

China Huanuco.	China flava.	China regia.
China Huamalies.		China de Loxa.
China rubra.		Ten-China.

Ein sehr wichtiges Resultat ist, daß der Vorzug, den man den dünnern und feinern Röhren fast zu geben gewohnt war, keinen Grund in dem etwa denselben zukommenden größeren Gehalte an wirksamen Bestandtheilen hat. Wenn nun auch nicht behauptet werden soll, daß alle arzneilichen Kräfte der Chinarinden in den Alkaloiden liegen, so ist es doch durch Erfahrung außer Zweifel gesetzt, daß diejenige arzneiliche Kraft, welche den Chinarinden eigenthümlich ist, nämlich ihre fiebervertreibende Kraft, in den Alkaloiden ihren Sitz habe. Ihre Wirksamkeit muß sich also, wenigstens in dieser Hinsicht, nach dem größeren oder geringeren Gehalte an Alkaloiden richten. Die Loxachina aber, die sich gerade vor allen andern Fieberrinden durch Feinheit der Röhren auszeichnet, ist nebst der Ten-China gerade am ärmsten daran; dagegen geben die platten breiten Stücke der China regia, die vom Stamme herzurühren scheinen, das meiste schwefelsaure Chinin; eben so gaben die dicken, warzigen, starken Röhren und platten Stücke der Huamaliesrinde mehr Cinchonin als die feineren Röhren; ferner waren auch bei der China flava fibrosa die dickeren Stücke reicher an Alkaloid, als die dünneren Röhren. Nur die China rubra machte insofern eine Ausnahme, daß die Röhren sich reicher an Alkaloid zeigten, als die platten Stücke.

Im Allgemeinen sind die dichteren und schwereren Stücke von allen Arten der Chinarinden reicher an Alkaloid als die leichteren; diejenigen, welche vorzüglich aus Splint bestehen, reicher als die mehr holzigen Rinden.

Ueber das Verhalten gegen die Reagentien ist zu bemerken:

1) Die Trübung durch den Brechweinstein ist ganz unabhängig von dem Gehalte an Alkaloid; sie zeigte sich bei der Ten- und bei der Loxa-China besonders stark, bei den an Alkaloiden reichen Rinden — Huanuco und Regia — sehr schwach, und fehlte zum Theil gänzlich. Diese Trübung hängt zwar einerseits von dem Gerbestoffe der China ab, aber nicht ausschließlich, denn Bucholz hat diese Eigenschaft auch an dem Hartharze erkannt. Daß der Gerbestoff der Chinarinden an dieser Fällung durch den Brechweinstein wesentlichen Antheil habe, erhellet daraus, daß die Chinaarten, welche den Brechweinstein stark fällen, auch die Leimauflösung mehr oder weniger fällen, (bis auf die rothe China) und die salzsaure Eisenauflösung grün färben und trüben, doch halten beide Reagentien nicht gleichen Schritt, es muß daher auch noch ein anderer Bestandtheil, wie schon bemerkt worden, an der Trübung durch Brechweinstein Antheil haben. Die Reaction mit der Leimauflösung hängt offenbar von dem Gerbestoffe der Chinarinden ab; wo aber dieser überwiegend ist, da ist der Gehalt an Alkaloid verhältnißmäßig sehr gering. Auffallende Trübung durch die Leimauflösung ist also in der Regel kein gutes Zeichen für die Wirksamkeit der Fieberrinden, wenigstens als sol-

cher. Gleichen Schritt mit der Reaction auf die Leimauflösung hält im Ganzen die auf das salzsaure Eisenoxyd. Eine starke Grünfärbung des Aufgusses durch dieses letztere, besonders wenn auch Trübung damit verbunden ist, kann also nicht zur Empfehlung einer Chinarinde gereichen.

Galläpfeltinctur und kleesaures Kali halten gleichen Schritt, weil die Bestandtheile, die sie anzeigen, in den Fieberrinden gleichen Schritt in ihrer Menge mit einander halten, und gleichsam als die einander wechselseitig bedingenden Gegensätze eines und desselben Vegetationsprocesses zu betrachten sind. Die Reaction des kleesauren Kalis hängt von dem chinasauren Kalke, die der Galläpfeltinctur von dem chinasauren (?) Alkaloid ab. Diese beiden Reagentien werden also die Tauglichkeit einer Rinde als Fiebermittel anzeigen, welche, wie erwähnt, von dem Gehalte an Alkaloiden abhängt, deren Bildung durch den Vegetationsproceß auf Kosten der durch Brechweinstein und Leimauflösung gefällt werdenden Bestandtheile, des adstringirenden Principes, des Harzes, zu erfolgen scheint, indem, wie wir gesehen haben, die an Alkaloid reichere Chinarinde weniger adstringirend als die an Alkaloid ärmere ist, was auch umgekehrt gilt.

Berücksichtigung verdient noch die hiebei gemachte Erfahrung, daß die Chinarinden durch sehr langes Liegen auffallende Einbuße an dem Gehalte der Alkaloide erleiden, wonach es scheint, daß die Alkaloide, die doch ihrer chemischen Constitution nach als ziemlich fixirte Bestandtheile erscheinen, doch mit der Zeit eine allmälige Zersetzung erleiden. So lieferte eine wenigstens 80 Jahre alte abgeblaßte rothe Chinarinde achtmal weniger Alkaloid, als die mehr frischen Rinden.

Die Chinarinden sind als äußerst kräftige Heilmittel sehr geschätzt; sie werden häufig in der Abkochung verordnet. Diese enthält noch heiß, nach Pelletier und Caventou, außer chinasaurem Cinchonin oder Chinin, noch fette Materie, Chinaroth, gerbestoffartigen Farbestoff, Gummi, Stärkemehl und chinasauren Kalk. Beim Erkalten fällt die Verbindung des Gerbestoffs mit dem Stärkemehle, da sie nur in heißem Wasser löslich ist, nieder, und nimmt zugleich einen Antheil des Alkaloids, des Chinaroths und der fetten Substanz mit sich. Das Niederfallen des Cinchonins läßt sich dadurch einigermaßen verhüten, daß man eine bedeutende Menge Wasser zur Auskochung anwendet, indem aus einer sehr verdünnten Abkochung beim Erkalten kein Cinchonin niederfällt, wohl aber die Verbindung des Gerbestoffs mit dem Stärkemehle. Ein hievon durchs Filtriren befreites Decoct kann nun weiter eingedunstet werden, und ist dann, obgleich eben so wirksam, dennoch lange nicht so trübe, wie ein auf die gewöhnliche Art bereitetes. Kalien dürfen aber niemals den Abkochungen zugesetzt werden, weil sonst die Chinabasen niedergeschlagen werden. Ein Gleiches findet bei einem Zusatze von reiner Bittererde statt. Ein Säurezusatz, z. B. Citronensaft, ist aber bei den Abkochungen zu empfehlen, weil dadurch die Basen besser aus den Substanzen, welche sie umhüllen, ausgezogen werden.

Kommen China und Brechweinstein mit einander in Wechselwirkung, so

verbindet sich die gerbestoffartige Substanz der ersteren mit dem Spießglanzoxyd des letzteren zu einer Verbindung, die nicht mehr brechenerregend ist, und die Chinabasen bleiben unverändert. Eine in einem angemessenen Verhältnisse bewirkte Mischung der China mit Brechweinstein wirkt daher nicht mehr brechenerregend, wohl aber fiebervertreibend.

Bisweilen wird auch die China mit Wein digerirt. Werden hiezu rothe Weine verwendet, so werden diese dadurch entfärbt. Henry (Schweigg. J. N. R. XV. 1825. S. 326.) hat diesen Erfolg durch Versuche aufgeklärt, indem er schwefelsaures Chinin zu verschiedenen Weinen mischte. Der aus den entfärbten Weinen sich absetzende Niederschlag ist ein Chinintannat, in welchem das Chinin nicht durch einen bittern Geschmack erkannt werden kann, man mag es in Alkohol oder in Säuren auflösen. Am besten wird dieses Chinintannat dadurch zersetzt, daß man es mit essiggesäuertem Wasser und einer Auflösung von Gallerte sieden läßt, welche letztere mit dem Tannin ein unauflösliches Tannat bildet, während das Chinin sich mit der Säure verbindet. Ist viel Säure im Ueberschuß, so tritt die Bitterkeit erst bei einem geringen Zusatze von Ammoniak hervor. Doch wird durch den Gerbestoff des Weins nicht alles Chinin gefällt, sondern ein Theil bildet mit der Schwefelsäure ein saures Salz, und bleibt im Weine gelöst. Wird das schwefelsaure Chinin durch Gallustinctur gefällt, so nimmt der Niederschlag im Entstehen etwas in der Tinctur befindliche freie Gallussäure auf, der größte Theil der freien Säure bildet mit der Schwefelsäure und dem Chinin ein saures Salz. Denn reine Gallussäure schlägt das Chinin nicht nieder, die Gallustinctur wirkt also durch den in ihr enthaltenen Gerbestoff. Der Gerbestoff ist demnach das empfindlichste Reagens für die Chinaalkalien, welches die einzigen Bestandtheile der Chinarinden sind, die durch Galläpfel gefällt werden. Wenn der Niederschlag auf die obige Weise zersetzt worden, so besitzen die Chinaalkalien doch nicht mehr ihre primitiven Eigenschaften, sie krystallisiren nicht mehr u. s. w.

Nach diesen interessanten Erfahrungen werden die weißen Weine den rothen zur Digestion der Chinarinden vorgezogen werden müssen, da durch den Gerbestoff der letzteren das wirksame Princip der Rinde als unauflöslicher Niederschlag ausgeschieden wird. Selbst gegen die weißen Weine ist noch zu erinnern, daß nach der von Pelletier bestätigten Behauptung Laugier's auch der Weinstein das im Weine aufgelöste schwefelsaure Chinin fällt, mithin durch den auch im weißen Weine (vorzüglich dem Rheinweine) enthaltenen Weinstein weinsteinsaure Alkaloide gefällt werden, welche als weiße wenig lösliche Pulver zu Boden fallen.

Die China zeigt sich aber auch vorzüglich wirksam in Pulverform. Pelletier und Caventou erinnern hierbei, daß das zuerst abgestoßene Pulver weniger Cinchonin als das spätere harzigere Pulver enthalte; es muß daher gleichförmig gemischt werden. Dieses Pulver muß fein und staubförmig seyn, doch vermögen wir es nicht, dasselbe auf den Grad der Feinheit zu bringen, welchen das in England in besondern Maschinen gebeutelte

besitzt, dessen Anwendung aber der Verdacht der Verfälschung entgegensteht.

Eben so wird die China in einfachen und zusammengesetzten Tincturen, im Aufgusse und im Extracte verordnet.

Bei dem starken Verbrauche der Chinaalkaloide soll die China jetzt bisweilen mit solcher vermischt vorkommen, die schon mit Wasser und Säure ausgezogen, getrocknet und mit Chinapulver bestreut unter ungebrauchte China gemischt worden. Solche Stücke sind aber leicht dadurch zu erkennen, daß sie, von dem Chinapulver befreit, und zwar bei allen Chinasorten, um vieles dunkler gefärbt, daß die weißlichen Flechten beinahe ganz verschwunden sind und sie einen starken salzigen Geschmack besitzen. Auch bemerkt man in den Rissen der Rinde Spuren eines Salzes, welche mit der Loupe noch deutlicher erkannt werden. Doch ist hier hier nicht außer Acht zu lassen, daß der faserige Splint der China regia an sich schon viele glasartig glänzende Punkte zeigt, welche hier also keinen Verdacht begründen.

* China. Die Wurzel. Chinawurzel.

Smilax China Linn. China-Smilax.

Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 4. Hexandria.

Juss. Cl. III. Ord. 2. Asparagineae.

Der Chinastrauch wächst in China, Japan, Persien, und hin und wieder in Jamaika. Eine Abart davon kommt in Meriko und in verschiedenen anderen Ländern von Amerika vor. Die Wurzeln von beiden sehen sich so ähnlich, daß man sie leicht mit einander verwechselt; die asiatische Chinawurzel soll jedoch schwerer seyn, auch mehr Haltbarkeit und Festigkeit haben.

Der Stengel dieses Strauchgewächses ist rundlich, mit Stacheln besetzt. Die Blätter sind eiförmig-herzförmig mit drei Adern versehen. Der Kelch ist sechsblättrig; die Blumenkrone fehlt.

Die Wurzel ist gewöhnlich etwas weniger als faustdick, gegliedert, mit einer rothbraunen Rinde bedeckt und glatt; innen ist sie bald schwammig, leicht, röthlichweiß, und läßt sich leicht schneiden und pulvern, bald sehr schwer, hart, fest, gleichsam harzig oder gummiartig, und besonders gegen die Mitte hin von brauner Farbe. Diese letztere verdient den Vorzug. Beide Sorten besitzen nur einen schwachen mehligen Geschmack. Sie enthalten sehr viel Stärkemehl, Gummi und einen rothen in Wasser auflöslichen Farbestoff.

Sie sind sehr dem Wurmfraße unterworfen, und um dieses zu verdecken, soll man die Löcher mit Bolus, ja sogar mit Bleiglätte ausfüllen.

Die Chinawurzel ist vormals gegen venerische Krankheiten und Podagra berühmt gewesen; jetzt ist sie mit Recht außer Gebrauch gekommen, und wird nur noch selten mit den übrigen schweißtreibenden Mitteln in der Abkochung verordnet.

* Cichorium. Die Wurzel. Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus Linn. Die gemeine oder wilde Cichorie. Gemeiner Wegwart.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0322-5

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.
Juss. Cl. X. Ord. 1. Cichoreae.

Die gemeine Cichorie, eine ausdauernde, nach Andern nur zweijährige Pflanze, wächst in ganz Europa und findet sich fast durch ganz Deutschland an ungebauten Orten, an den Wegen und andern freien Gegenden. Man baut sie häufig auf Feldern und in Gärten, wo sie stärker und größer wird.

Die gerade in die Erde gehende Wurzel ist lang, spindelförmig, oben ästig, fast fingersdick, mit kleinen Fasern besetzt, außen bräunlichgelb, inwendig weiß fleischig. Der Stengel ist aufrecht, eckig, steif, etwas rauh, abwechselnd ästig, und erreicht eine Höhe von 2—4 Fuß. Die dunkelgrünen Blätter sind rauh, oft auch glatt, und werden kleiner, je mehr sie sich der Spitze des Stengels nähern. Die lancettförmigen Wurzelblätter liegen in einem Kreise, die Stengelblätter sind abwechselnd und umfassend. Die fast stiellosen, großen, schön himmelblauen Blumen stehen einzeln, sehr oft auch gepaart in den Blattwinkeln, der Länge nach an den Stengeln und Zweigen. Sie öffnen sich am Morgen und schließen sich gegen Abend. Auch giebt es Varietäten mit röthlichen, mit weißen, und mit gestielten Blumen. Der gemeinschaftliche Kelch ist doppelt; die einförmig flache Blumenkrone ist zusammengesetzt aus kreisförmig geordneten Zwitterblümchen, und mit zungenförmigverlängerten, abgestutzten und fünfzahnigen Blumenblättchen.

Die Cichorie blüht vom Juni bis September.

Die ganze Pflanze, besonders die Wurzel, schmeckt sehr bitter und leicht zusammenziehend. Sie enthält einen milchig-schleimigen Saft. Zum Arzneigebrauche wird nur die wildwachsende Wurzel im März und April eingesammelt; sie ist kräftiger und bitterer als die von der cultivirten Pflanze, welche milder von Geschmack, auch dicker und schleimiger ist.

Buchner (Repert. II. S. 345.) fand diese Wurzel einmal mit den Wurzeln des Bilsenkrautes vermengt, äußerlich waren sie kaum zu unterscheiden, nur im Innern war die Verschiedenheit sehr merklich, da die erstern fleischig waren, beim Zerschneiden einen weißen Milchsaft lieferten, und bitter schmeckten, die inwendig holzigen Bilsenkrautwurzeln hingegen einen scharfen Geschmack hatten.

Wie die Cichoriemwurzel in den Apotheken vorkommt, ist sie in dünne, 3—4 Zoll lange Stücke zerschnitten, außerhalb braunröthlich, inwendig fleischig, weißlich, hat keinen Geruch, aber einen starken bittern Geschmack.

Nach John (chemische Tabellen der Pflanzenanalysen S. 81.) enthalten 1000 Th. wäßriges bitteres Extract 250; Harz 30; etwas Zucker und Salmiak, Faser. Nach Planche enthält sie auch viel Salpeter und salzsaures und schwefelsaures Kali, wahrscheinlich aber auch Schleim.

Stoltze (Berl. Jahrb. XXIII. S. 300.) hat Mittel angezeigt, die oben angeführte Vermengung mit Bilsenkraut auch noch im wäßrigen Auszuge zu erkennen. Der Aufguß der reinen Cichoriemwurzel röthet das Lackmuspapier nicht, ätzendes Ammoniak scheidet daraus nichts ab, und Galläpfeltinctur wird erst nach wenigen Stunden leicht getrübt, und es setzen sich später

nur wenige weißgraue Flocken ab. Sind hingegen Bilsenkrautwurzeln beigemischt, so röthet der Auszug das Lackmuspapier, Aetzammoniak scheidet weiße Flocken ab, und Galläpfeltinctur trübt den Auszug schon nach kurzer Zeit stark, und nach 24 Stunden setzt sich ein verhältnißmäßig bedeutender bräunlichrother Niederschlag ab.

In der Medicin gilt die Cichorienwurzel als ein die Verdauung beförderndes Mittel. Der Gebrauch der gebrannten Wurzel als Kaffeesurrogat ist bekannt.

* Cicuta virosa. Das Kraut. Wasserschierling.

Cicuta virosa Linn. Der Wasserschierling.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Man findet diese giftige Pflanze in vielen Gegenden Deutschlands in stehendem oder langsam fließendem Wasser.

Die Wurzel besteht aus einem eiförmigen, sehr dicken, fleischigen, grünen Wurzelstocke, der mit ringförmigen Absätzen bezeichnet ist, und viele starke weiße Wurzelfasern in horizontaler Richtung ausschickt. Im Innern ist dieser Wurzelstock weiß, in mehrere Fächer abgetheilt, und enthält einen gelben, harzigen Saft, der einen starken narkotischen Duft verbreitet. Der Stengel ist aufrecht, 4—5 Fuß hoch, rund, gestreift, innen hohl, grün, zuweilen röthlich, mit abstehenden langen Aesten. Die Wurzelblätter sind sehr groß, 2—2½ Fuß lang, sie stehen aufrecht auf runden, gestreiften, hohlen Blattstielen, die an dem längern untern Theile nackt sind, an der Spitze aber dreimal gefiedert erscheinen. Die Fiederblättchen der ersten Ordnung sind gestielt, und entspringen paarweise auf der innern mit einer kleinen Rinne versehenen Seite des gemeinschaftlichen Blattstiels; die Fiederchen der dritten Ordnung sind schmal lancettförmig, scharf gesägt. Die Stengelblätter sind abstehend, und nehmen gegen die Spitze der Zweige hin sehr an Umfang ab; die obersten sind nur noch doppelt gefiedert. Die weißen Blüthen stehen in 12—15strahligen, zusammengesetzten, vielblüthigen Dolden, die vor der Blüthe überhängen. Die gemeinschaftliche Hülle (involucrum) ist hinfällig, besteht aus einem schmalen linienförmigen Blättchen, oder fehlt ganz; die besondere Hülle ist aus 10—12 ausdauernden Blättchen gebildet. Der Kelch ist klein, fünfzähnig; die Blumenblätter sind alle von gleicher Gestalt und weiß. Die Frucht ist rundlich, an den Seiten etwas zusammengedrückt, mit dem Kelche, der sie bekleidet, und den Griffeln gekrönt.

Alle Theile sind ganz glatt, und besitzen frisch einen eigenthümlichen starken nicht unangenehmen Geruch; der Geschmack ist zuerst süßlich, dann scharf. Die Pflanze gehört zu den narkotisch-scharfen Giften, und die Wurzel, die manchmal statt der Pastinak- und Selleriewurzel gegessen worden, ist besonders gefährlich, nächstdem sind es die Wurzelblättter und der Stengel.

Aus dem ausgepreßten Safte des frischen Krautes wird das gebräuchliche **Extractum Cicutae virosae** bereitet. Die Wirkung des Wasserschierlings ist dem Fleckenschierling ähnlich, nur noch heftiger.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0324-6

Cinae seu Santonici Semen. Zittwersaamen. Wurmsaamen.

Artemisia Contra Linn.? Ein kleiner Strauch in Palästina.

Kleine, längliche, grün-gelbe Saamen, mit den walzenförmigen dachziegelförmigen Kelchen und Blumenstielchen gemischt, von bitterlich-scharfem Geschmacke und gewürzhaftem Geruche. Verwerflich sind die mit den sehr leicht an ihrer Gestalt zu erkennenden Blumen des Rainfarrns verfälschten. Der Saamen von Aleppo ist vorzuziehen.

Artemisia Contra L. Der persische Beifuß.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.

Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Früher wurde **Artemisia Santonica L.** und **A. judaica L.** als die Mutterpflanze des Wurmsaamens angegeben, jetzt aber stimmen Treviranus, Nees v. Esenbeck u. A. darin überein, daß dieser Saame von der oben angegebenen **A. Contra** abstamme.

Das Vaterland ist Persien, wahrscheinlich ist er aber auch in den angrenzenden Ländern einheimisch.

Der Stengel ist strauchartig und in lange Aeste getheilt, die gegen die Spitze hin mit vielen kurzen abstehenden, mit Blüthen bedeckten Aestchen besetzt sind. Die Blätter fehlen an dem untern Theile des Stengels, und stehen mehr gegen oben büschelförmig beisammen; sie sind sehr klein, 2—3‴ lang und fast eben so breit, gefiedert zerschnitten, graugrün. Die kleinen eiförmigen Blüthen sind sitzend und büschelförmig an den Aesten zusammengehäuft. Diese Blümchen stellen diejenige Sorte des sogenannten Wurmsaamens dar, die unter dem Namen des levantischen oder aleppischen bekannt ist. **Semen Cinae in granis** sind die rein ausgelesenen Blümchen; der gewöhnliche ist mehr oder minder rein, mit Staub, zerbrochenen Stielchen und vielen trocknen Blättchen, wahrscheinlich Blumenkelchblättern, vermischt. Er ist grünlichbraun oder gelbgrün, und hat einen eigenthümlichen, starken, widrig gewürzhaften, der Zittwerwurzel sehr entfernt ähnlichen, mehr campheravtigen Geruch, und einen etwas kratzenden, hitzigen, gewürzhaften, jedoch widrigen und ziemlich bittern Geschmack. Bei dem Kauen erregt er ein Gefühl von Erwärmung, dem hintennach Kälte folgt, fast so wie die Pfeffermünze. Die Körnchen werden uneigentlich Saamen genannt, denn beim aufmerksamen Betrachten und Oeffnen derselben unterscheidet man deutlich einen schuppigen Kelch und Röhrenblümchen; es sind also die noch nicht aufgeblühten und mit zerschnittenen Blumenstielen vermengten Blumen.

Prof. delle Chiaje (Salzb. med. chir. Zeitung 1824. S. 333.), der den levantischen Wurmsaamen untersuchte, hat zwei Arten davon aufgefunden und beschrieben. Die am häufigsten darunter befindlichen Saamen sollen

einer neuen Beifußart angehören, die gleichfalls strauchartig ist. Die ruthenförmigen, häufigen, aufrechten, gestreiften, schwach filzigen Aeste tragen abwechselnde, aufsitzende, linien-lancettförmige Blätter. Die Blüthenköpfe sind aufrecht, sitzend, die Kelche eiförmig, die Schuppen oval, filzig. Diese levantische Pflanze ist wohlriechend; besonders aber besitzen die Blüthen völlig den Geruch und Geschmack der Zittwersaamen.

Außer diesem levantischen Wurmsaamen, welcher auch aleppischer oder alexandrinischer heißt (**Semen Cinae levanticum, s. halepense, s. alexandrinum**), kommt auch eine zweite Sorte im Handel vor, nämlich der barbarische oder afrikanische Wurmsaamen (**Semen Cinae barbaricum s. africanum**). Dieser besteht größtentheils aus kleinen Bruchstücken von graulich-filzigen Stielchen mit sehr kleinen und ganz unausgebildeten Blüthenknospen. Nicht selten färben die Droguisten diese Sorte grün und geben ihr dann auch wohl wieder einen andern Namen. Die Mutterpflanze dieser Sorte ist bis jetzt nicht mit Sicherheit zu bestimmen, weil man keine ausgebildeten Blüthen darin findet, gewiß aber ist es nicht **A. Contra**. Die Blüthen der **A. nutans Marsch. v. Bieberstein**, wohin wahrscheinlich die zweifelhafte **A. Santonica Linn.** gehört, sind dieser Sorte ähnlicher, doch auch verschieden; auch wächst diese Pflanze am Kaukasus und nicht in der Barbarei, woher diese Sorte kommen soll. Dieser Wurmsaamen ist weit schwächer an Geruch und Geschmack.

Bisweilen werden dem Wurmsaamen die Blumen von einheimischen Beifußarten, und besonders von dem Feldbeifuß (**Artemisia campestris und A. palmata L.**) untergeschoben, oder auch von dem Rainfarrn. Sie sind aber leicht von dem Wurmsaamen nach den angegebenen Kennzeichen zu unterscheiden, besonders nach dem Gewürzhaften in Geruche und Geschmacke.

Eine sehr sorgfältige chemische Analyse des Wurmsaamens verdanken wir Hrn. Prof. Trommsdorff (N. J. III. 1. S. 309.).

Durch Destillation mit Wasser wurde ein ätherisches Oel erhalten, welches weiß, ins Gelbliche spielend, von höchst durchdringendem Geruche, wie der Saamen, aber mehr campherartig, von scharf bitterlichem Geschmacke, anfangs erwärmend, hintennach eine kühlende Empfindung zurücklassend ist. Es ist leichter als Wasser, ungemein flüchtig, in Aether und Alkohol leicht löslich, auch lösten 2 Unzen Wasser einen Tropfen Oel vollkommen auf.

Alkohol von 95 Procent zog eine grüngelbe, stark riechende und widrig bitter schmeckende Tinctur aus, welche nach dem Abziehen und Verdunsten des Alkohols eine weiche, schmierige, schwarzgrüne Masse zurückließ, die nicht weiter austrocknete. Sie wurde daher mit destillirtem Wasser gekocht, wobei die Masse ganz flüssig wurde, der harzige Theil sich wie ein schwaches Oel absonderte, das auf dem Boden liegen blieb, und das Wasser sich grünlichgelb färbte. Das Harz war dunkel grüngelb, an den Kanten und in kleinen Fäden durchsichtig, spröde, leicht zerreiblich, von etwas scharfem, aber nicht kratzendem, dem Saamen ganz ähnlichem Geschmacke, in absolutem Aether, Alkohol, Aetzkalilauge, Aetzammoniak, Rosmarinöle und Pfeffermünzöle auflös-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0326-8

lich, in Terpenthinöl und in Olivenöl unauflöslich. Die von dem Wasser aus dem geistigen Extract aufgenommene Substanz war nach dem Verdampfen der wäßrigen Theile dunkelgelb, etwas ins Grünliche spielend, geruchlos, von kratzendem, bitterm, etwas salzigem Geschmacke, zog aus der Luft Feuchtigkeit an, war in Aether unauflöslich, in Alkohol und Wasser auflöslich, wurde von essigsaurem Blei, salpeters. Queckſilberoxydul und salzs. Zinn niedergeschlagen; salzs. Eisen erzeugte eine graugrüne, grünes schwefelsaures Eisenoxydul eine schmutzig lauchgrüne Trübung. Sie ist als ein eigenthümlicher Extractivstoff mit einer Spur von äpfelsaurem Kalke anzusehen.

Der Saamenrückstand, der die grüne Farbe verloren hatte und schmutzig hellgrau aussah, wurde erst mit kaltem Wasser behandelt, und ein eigenthümlicher gummiger Extractivstoff, gleichfalls mit einer Spur von äpfelsaurem Kalke, erhalten, von welchem durch kochendes Wasser noch mehr ausgeschieden wurde. Die Behandlung mit Aetzlauge gab noch einen von dem vorigen nicht sehr verschiedenen Extractivstoff.

Hiernach gaben 500 Th. Wurmsaamen: flüchtiges Oel 4; Harz 55; eigenthümlichen Extractivstoff 105; gummigen Extractivstoff 180; durch Aetzlauge geschiedenen Extractivstoff 100; holzige und faserige Theile 60. S. 504.

Die 60 Gran faserige Theile hinterließen nach dem Einäschern 4 Gran einer weißen Asche, die aus kohlensaurem Kali, schwefels. und salzs. Salzen (Kali), Kieselerde, phosphors. Kalke und kohlens. Kalke bestand.

Es ergiebt sich hieraus, daß der Wurmsaamen am zweckmäßigsten in Substanz als Pulver verordnet wird, weil der holzige Theil gegen die auflöslichen etwa $\frac{1}{3}$ beträgt. Der vielen flüchtigen Theile wegen ist das Kochen zu vermeiden und nur noch der heiße Aufguß zu empfehlen.

Cinnabaris. Bisulphuretum Hydrargyri. Zinnober.

Ein Präparat chemischer Fabriken aus dem Queckſilber und Schwefel durch Sublimation.

Fest, strahlig, zerbrechlich, von bleiartiger beim Reiben rother Farbe, schwer, im Feuer völlig flüchtig. Man nehme den festen, keinesweges den gepulverten Zinnober.

Der Zinnober war schon den Griechen bekannt. Nach Theophrastus Eresius, der 321 v. Chr. Geb. lebte, soll er, damals Minium genannt, durch Kallias, einen Athenienser, 500 J. v. Chr. erfunden worden seyn. In der Folge fand man ihn sehr häufig in der Erde (natürlicher Zinnober, Bergzinnober, Cinnabaris nativa), und benutzte ihn zur Abscheidung des Queckſilbers.

Der natürliche Zinnober kommt sehr häufig vor, hauptsächlich in dem vormaligen Herzogthum Zweibrücken, zu Almaden in Spanien, zu Idria in Friaul, zu Guenca-Velica in Peru u. s. w. Zuweilen ist er in regelmäßigen

sechsseitigen Säulen krystallisirt, sonst auch faserig und staubartig, häufiger in unförmlichen, mehr oder weniger unreinen dunkelrothen Massen. Da er sehr selten rein ist, so darf er nicht zum medicinischen Gebrauche angewendet werden, indem er oft Arsenik, Wismuth und mehrere andere Metalle enthält; er wird nur zur Ausscheidung des Queckſilbers benutzt. Bisweilen findet man jedoch auch den natürlichen Zinnober von einer außerordentlichen Schönheit; so wird zu Almaden in Spanien der krystallisirte reine Zinnober für sich eingesammelt, um als Malerfarbe angewandt zu werden, und er ist von Siegellakfabrikanten besonders gesucht.

Der künstliche Zinnober wird folgendermaßen bereitet. 4 Theile Schwefel werden in einem irdenen unglasirten Geschirre geschmolzen, und dazu unter stetem Umrühren und in kleinen Portionen 25 Theile vorher in einem Schmelztiegel oder eisernen Löffel stark erwärmtes Queckſilber zugegossen. Beide verbinden sich unter Wärmeentwickelung, und die Masse entzündet sich, wobei man sie, um den Zutritt der Luft abzuhalten, mit einem bereit gehaltenen Deckel bedecken muß. Diese Entzündung muß aber abgewartet werden, weil sie sonst bei der Sublimation unter heftiger Explosion und Zerschmetterung der Gefäße erfolgen würde. Man erhält dann eine schwarze nicht metallische Masse, die man, um den etwa überflüssig darin enthaltenen Schwefel abzuscheiden, zum feinen Pulver reibt, und in einer Theetasse auf einer Sandkapelle erhitzt, wobei der mit dem Queckſilber nicht verbundene Schwefel abdampft. Das erhaltene schwarze Pulver wird darauf in einen kleinen gläsernen Kolben eingelegt, dessen Hals nur unvollkommen verschlossen ist, und bei der Glühhitze in einem Tiegelbade sublimirt. Doch muß die Flamme nicht an den obern Theil des Kolbens schlagen, weil sonst das Sublimat sich völlig verflüchtigen, auch wohl das Glas eine Schmelzung erleiden könnte. Dies kann man dadurch vermeiden, daß man vorher auf den Rand des Tiegels entweder platte Ziegelstücke oder Scherben so aufkittet, daß dieselben nicht nur den Raum zwischen dem Kolben und dem Tiegelrande bedecken, sondern auch nach Verhältniß der Größe des Tiegels ein $1\frac{1}{2}$—3 ″ breites, kreisförmiges Dach außerhalb des Tiegels bilden, woran die Flamme sich bricht, und zugleich von dem obern aus dem Tiegel hervorragenden Theile des Kolbens entfernt wird. Die Kohlen dürfen nicht ganz bis an den Rand des Tiegels reichen. Während der Sublimation hat man darauf zu sehen, daß der Hals des Kolbens von dem sich anhäufenden Zinnober nicht völlig verstopft werde, indem man von Zeit zu Zeit mit einem vorher erwärmten eisernen Stabe die Oeffnung untersucht. Da der untere Theil des Kolbens glüht, so muß man durch eine gelassene Oeffnung sehr gut beobachten, wenn die Sublimation beendigt ist, indem dann auf dem Boden des Kolbens wenig oder gar nichts mehr vorhanden ist. Man kann jetzt das Glühen noch einige Zeit fortsetzen, wodurch die Röthe des Zinnobers erhöht wird. Man erhält dann eine dunkelrothe, grauviolett metallisch glänzende, im Bruche krystallinische Masse, die durch Feinreiben hochroth wird.

Die fabrikmäßige Bereitung des Zinnobers geschieht besonders in Holland,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0328-0

und die Sublimation wird in großen irdenen beschlagenen Töpfen über freiem Feuer vorgenommen. Je größer die Quantität Zinnober ist, die man auf einmal darstellt, desto schöner wird die Farbe. Es ist außerdem nöthig, bei dieser Bereitung reines Quecksilber und reinen Schwefel anzuwenden, und den freien Schwefel abzudampfen, welcher sich sonst während der Sublimation in den Zinnober mit einmischt und seine Farbe verdirbt.

Wenn Quecksilberchlorid (ätzender Quecksilbersublimat) durch einen Strom von Schwefelwasserstoffgas zersetzt wird, so erhält man einen Niederschlag von gleicher Zusammensetzung wie der Zinnober, er ist aber schwarz, voluminös, pulverförmig, und gleicht dem Ansehen nach den Zinnober nicht im mindesten; bei der Sublimation giebt er jedoch Zinnober, ganz so wie die schwarzbraune Masse, welche man durch Zusammenschmelzung des Quecksilbers und des Schwefels erhält. Die Farbe hängt hier also gänzlich von der Aggregation der Theile ab. Das Rothwerden der Verbindung hat man auch dem Verluste einer geringen Portion Wasserstoff zugeschrieben, und Payssé behauptet, daß der nicht ganz rothe Zinnober diese Farbe annimmt, wenn er zum feinen Pulver gerieben und mit Wasser übergossen, während vier Wochen an einen feuchten Ort gestellt und unter dieser Zeit oft umgerührt wird. Die Ursache, daß erst bei der Sublimation die rein rothe Farbe hervortritt, kann aber auch darin liegen, daß die durch Zusammenschmelzen erhaltene Masse noch unverbundenes Quecksilber und unverbundenen Schwefel enthält, welche höchst fein durch die Masse vertheilt ihr eine schwärzliche Farbe ertheilen, und daß nur der unter Feuererscheinung erfolgenden chemischen Verbindung des Quecksilbers und des Schwefels die rothe Farbe zukomme.

Es könnte scheinen, als wäre die Sublimation eine nothwendige Bedingung zur Entstehung der rothen Farbe, man hat indessen mehrere Methoden, sie auch auf dem nassen Wege hervorzubringen. Die sicherste ist nach Kirchhoff folgende: 300 Theile Quecksilber werden in einem Mörser von Porzellan mit 68 Th. Schwefel gerieben, welches mit etwas kaustischem Kali angefeuchtet ist, bis das Quecksilber geschwefelt wird. Es werden hierauf 160 Th. in eben so viel Wasser aufgelöstes Kali zugesetzt, und die Masse unter stetem Umrühren über der Flamme einer Lampe während zwei Stunden erhitzt, wobei das abdampfende Wasser wieder durch neues ersetzt wird. Nach Verlauf dieser Zeit wird nicht mehr Wasser zugesetzt, sondern man läßt die Masse unter fortgesetztem Reiben sich concentriren. Sie wird nun allmälig röther, nimmt eine gelatinöse Consistenz an, und erhält sehr schnell eine vorzüglich schöne rothe Farbe. Das Gefäß wird dann sogleich vom Feuer genommen, weil beim fortgesetzten Erwärmen die Farbe wieder in ein schmutziges Braun verwandelt wird.

Der Zinnober besteht nach Sefström's Versuchen aus 86,29 Quecksilber und 13,71 Schwefel. Beim Glühen in offener Luft wird er zersetzt, giebt metallisches Quecksilber und schwefligsaures Gas aus. Mit kaustischen, feuerfesten Alkalien, alkalischen Erden, mit den meisten andern Metallen, oder mit ihren Oxyden geglüht, wird er zersetzt und in allen diesen Fällen

destillirt metallisches Quecksilber über. Er wird weder von Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, noch von den Auflösungen kaustischer Alkalien angegriffen, aber in Königswasser wird er aufgelöst, und mit Chlor verbindet er sich unter Feuererscheinung, wobei sich Quecksilberchlorid und Chlorschwefel bilden.

Der im Handel vorkommende Zinnober erscheint in mehr oder weniger ansehnlichen Massen, die aus strahlig auseinanderlaufenden Nadeln von einem grauvioletten metallischen Glanze bestehen, welcher durch Pulvern und Reiben ins Hochrothe übergeht. Das spec. Gew. ist 10,218. Die Schönheit der rothen Farbe soll durch etwas während des Reibens zugesetzte sehr verdünnte Salpeter- oder Essigsäure sehr erhöht werden. Die größte Vollkommenheit seines äußeren Ansehens erhält er durch das Präpariren auf dem Reibsteine mit Wasser oder Weingeist, und in diesem Zustande giebt er unter dem Namen Vermillon eine schöne rothe Malerfarbe ab, wobei der aus China in Päcken uns zugeführte, die wieder 10 kleine mit chinesischen Figuren bezeichnete Päckchen enthalten, sich durch eine sehr hohe und schöne Farbe besonders auszeichnet. Seine Farbe wird gemeiniglich um so schöner, je feiner er zertheilt ist.

In der Medicin wurde er sonst zum Färben verschiedener Arzneimittel angewandt; auch ist er zum Räuchern bei syphilitischen Krankheiten empfohlen.

Wenn der Zinnober rein und gut ist, so muß er die erwähnten äußern Kennzeichen haben, ferner sich, ohne sich zu zersetzen und ohne den geringsten Rückstand zu lassen, sublimiren. Verfälschungen, die jedoch nur bei dem präparirten Zinnober vorkommen können, mit Mennige oder Drachenblut oder dergleichen fremdartigen Substanzen würden sich hierdurch leicht erkennen lassen. Ein mit Mennige verfälschter Zinnober hat zum Theil schon an sich nicht eine so schön rothe Farbe, sie schielt mehr ins Pomeranzenfarbige, diese wird aber durch Salpetersäure, die braunes Hyperoxyd bildet, sehr viel dunkler gemacht. Der damit gekochte Essig nimmt einen süßen Geschmack an, und wird durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser schwarz niedergeschlagen; vor dem Löthrohr bleibt auf der Kohle ein Bleikorn. Drachenblut färbt den mit dem Zinnober digerirten Weingeist roth, und verbreitet auf Kohlen einen balsamisch-harzigen Geruch. Braunroth und Ziegelmehl färben die Salzsäure gelb, und sind feuerbeständig. Rother Arsenik giebt auf glühenden Kohlen Knoblauchsgeruch, welche Verfälschung auch sicherer dadurch entdeckt wird, daß man einen Theil mit 5 Th. Salzsäure, der etwas Salpetersäure zugemischt worden, digerirt, die Auflösung filtrirt, mit kohlensaurem Kali das Quecksilberoxyd abscheidet, und die neutrale filtrirte Flüssigkeit auf Arsenik mit Schwefelwasserstoff, Kupfersalmiak ꝛc. prüft.

Cinnamomum acutum. Zimmt.

Laurus Cinnamomum Linn. Ein Baum Ostindiens.

Die innere Rinde der Aeste, von braunrother Farbe, sehr ange-

nehmen Geruche, und süßlich gewürzhaftem Geschmacke. Man wähle die dünneren Rinden.

Laurus Cinnamomum Linn. Zimmtlorbeer.
Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 4. Laurineae.

Die Herrn Gebrüder Nees v. Esenbeck (De Cinnamomo Disputatio etc. Bonnae 1823.) leiten den Namen des Zimmts aus der chinesischen Sprache ab. Sie nehmen an, daß die Griechen und Römer ganze Aeste des Zimmtbaums mit Holz und Rinde gehabt hätten, von denen man die letztere, weil sie zu trocken war, nicht mehr abziehen konnte. Als später die von dem frischen Baume abgeschälte Rinde in den Handel gekommen sey, so habe man dieselbe für einen Theil eines ganz andern Gewächses angesehen. Die Unterschiede der Rinden, entlehnt von ihrer Dicke, Farbe und andern Merkmalen seyen erst weit später üblich geworden, als keine ganzen getrockneten Aeste mehr in den Handel kamen u. s. w.

Der Zimmtbaum wächst auf der Insel Ceylon ursprünglich wild, und wird auch dort angebaut; er ist auch auf die Antillen, Cajenne, Isle de France u. s. w. verpflanzt. Bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts sah man in Europa von dem Zimmtbaum nichts weiter, als dann und wann ein Blatt, oder Fragmente von Aesten; erst Hieronymus v. Beverningk verpflanzte mehrere Bäumchen in seinen Garten in Holland, wo sie aber in dem harten Winter von 1669 zu Grunde gingen.

Der Stamm erhebt sich in gutem Boden bis zu einer Höhe von 25—30 Fuß, und hält zuweilen 18 Zoll im Durchmesser. Die Rinde ist äußerlich graulich, innen röthlich. Die Blätter sind gegenüberstehend, kurzgestielt, eiförmig-elliptisch, 4—6 Zoll lang und ungefähr 2 Zoll breit, aderartig, oben grün und glänzend, unten aschfarben, grünlich-grau. Die weißlichen Blüthen sitzen mit behaarten Stielen auf einer Art von schlaffen end- oder achselständigen Rispen. Die eiförmige Frucht hat die Gestalt einer kleinen Eichel, und ist am Grunde von dem Kelche umgeben.

Der Zimmt ist die von ihrer Oberhaut befreite Rinde. Er kommt in dünnen, glatten, zusammengerollten Stücken vor, von eigenthümlicher gelbröthlicher (gelbrothbräunlicher), dem venetianischen Golde nahe kommender Farbe. Er ist zähe, auf dem Bruche faserig; der Geschmack ist angenehm aromatisch, erwärmend, mit etwas Süßem gemischt. Das in den Mund genommene Stückchen erweicht in demselben und zerfließt gleichsam.

Die Güte der verschiedenen Zimmtsorten wird von der verschiedenen Einsammlungs- und Zubereitungsart, von der Witterung zur Zeit der Zimmternte, dann besonders von dem Standorte der Bäume abgeleitet. An trocknen sonnigen Orten wächst der beste, an sumpfigen Plätzen eine nur wenig aromatische Rinde. Diese ist dunkler gelb, wie Curcuma, zerreiblich, die Textur schlaff, körnig, gleichsam sandig. Im Allgemeinen ist der ceylonsche

Zimmt der vorzüglichste, der aus China und von den Antillen kommende ist von geringerer Güte.

Der vorzüglich wirksame Bestandtheil ist das ätherische Oel; außerdem enthält die Rinde, nach Bauquelin, Gerbestoff, Schleim, einen Farbestoff und eine Säure.

Es werden jährlich 4—5000 Ballen, zu 80 Pfund, in drei Sorten in den Handel gebracht; vormals unter den Holländern nur 1500 Ballen.

Cinnamomum acutum. Das Oel. Zimmtöl.

Wird durch Destillation aus der Rinde des Laurus Cinnamomum Linn. in Ostindien bereitet.

Ein frisch gelbes, hernach in die braune Farbe übergehendes ätherisches Oel, von angenehmen Geruche und süßlich brennendem Geschmacke. Spec. Gew. = 1,044.

Zur Destillation dieses Oeles werden die zu starken Zimmtrinden und der übrige Abfall bei der Sortirung der Rinden angewendet. Die Destillation wird bloß in einem Gebäude des Hospitals zu Colombo vorgenommen, wo dazu zwei Blasen von 200 und von 90 Gallonen Inhalt bestimmt sind. Die rohen Rinden nebst dem Abfalle, welcher viel Unreinigkeiten enthält, werden gepülvert, hierauf 24 Stunden in Meerwasser eingeweicht. Dann bringt man in die große Destillirblase 280 Pfund Zimmtpulver mit 125 Gallonen Meerwasser und 30 Pfund Kochsalz, und füllt die kleinere Blase nach demselben Verhältniß. Das Product der Destillation sieht milchig aus. Man läßt es in gläsernen Schalen sich setzen, und erst nach einigen Tagen scheidet sich das Oel aus. Dieses ist ein zweifaches, ein leichtes, welches oben schwimmt, und ein schweres, das sich zu Boden setzt. Das leichte schöpft man mit kleinen Löffeln ab, das schwere zapft man durch eine im Boden befindliche Oeffnung ab. Die große Blase giebt bei jeder Destillation 20—24 Unzen Oel. Das Wasser wird zu ferneren Destillationen verbraucht.

Nach Leschenault de la Tour läßt das Gouvernement jährlich etwa 100 Gallonen (?) Zimmtöl bereiten. Die Unze kostet in England aus der ersten Hand 10—12 Schillinge.

Man destillirt auch Zimmtblätter, welche ebenfalls in Meerwasser eingeweicht werden, das Oel ist aber dem Nelkenöle ähnlich, und die Unze kostet 4—5 Schillinge.

Citrus. Das Oel der Schale. Oleum de Cedro. Citronenöl. Cedroöl.

Es wird im mittägigen Europa aus den Schalen der Früchte von Citrus medica Linn., einem im Orient einheimischen, bei uns in Gewächshäusern cultivirten Baume, durchs Auspressen bereitet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0332-1

Ein ätherisches ausgepreßtes dünnes, gelbliches Oel, von angenehmen Geruche und nicht brennendem Geschmacke. Spec. Gew. = 0,856.

Dieses Oel wird in Italien, vorzüglich in Sicilien auf die bei Bergamottae oleum angegebene Weise durch Auspressen bereitet, und findet seines lieblichen Geruches wegen häufige Anwendung, wird auch mit Zucker abgerieben als Oelzucker innerlich verordnet. Eine Verfälschung mit Weingeist wird durch Schütteln mit gleichen Theilen Wassers entdeckt; dieses nimmt nämlich den Weingeist auf, die Menge des Oels zeigt sich vermindert, und der Weingeist, der noch ätherisches Oel aufgelöst hält, wird durch mehr zugemischtes Wasser milchig gemacht. Nach Vauquelin taugt jedoch diese Probe nur dann, wenn das ätherische Oel einen gewissen Antheil Alkohol enthält, unter welchem Verhältnisse sich dasselbe wie reines Oel verhält; eine kleinere Menge Alkohol wird nämlich von dem Oele so aufgelöst, daß er durch das Wasser dem Auflösungsmittel nicht entzogen werden kann.

Nach Saussure bestehen 100 Th. des durch Auspressen aus frischen Citronen erhaltenen Oels aus 86,899 Kohlenstoff, 12,326 Wasserstoff und 0,775 Stickstoff.

Citrus. Die Früchte. Citronen.

Citrus medica Linn.

Citrus medica Linn. Gemeine Citrone.
Linn. Cl. XVIII. Polyadelphia. Ord. 3. Icosandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 9. Aurantieae.

In den ältesten Zeiten hieß die Citrone der medische Apfel, später der assyrische Apfel, und zuletzt Kitrion, woraus Citrone gemacht worden ist. Zu den Zeiten des Plinius konnte man in Italien den Citronenbaum noch nicht im freien Felde ziehen, ja er gedieh damals kaum bei der sorgfältigsten Wartung in Kästen, in denen man ihn aus seinem Vaterlande kommen ließ. Hundert Jahre nach Plinius, zu den Zeiten des Palladius, wuchs er schon auf freiem Felde um Neapel und in Sardinien, allein die Frucht war noch nicht so veredelt, daß sie auch hätte können gegessen werden. Erst abermals hundert Jahre später, zu den Zeiten des Athenäus, war die Citrone eßbar geworden.

Der Citronenbaum wächst ursprünglich vorzüglich in Medien, Persien und Assyrien, ist jetzt aber auch in der Barbarei, Sicilien, Portugal, Spanien und im südlichen Frankreich angebaut. Bei uns erreicht er in den Gewächshäusern nur eine mittelmäßige Größe, in seinem Vaterlande hingegen und im wilden Zustande soll er sich zuweilen zu einer Höhe von 60 Fuß erheben. Seine Wurzeln sind stark und ästig, inwendig weiß, und äußerlich mit einer gelblichen Rinde bedeckt. Der Stamm ist aufrecht, die Rinde desselben von blaßgrüner Farbe, das Holz weiß und sehr hart. Die Aeste sind

zahlreich, lang, ausgebreitet, zurückgebogen, und gewöhnlich mit kleinen Dornen versehen. Die immergrünen, kurz und gleich breit gestielten Blätter sind abwechselnd, steif, oval-lancettförmig, glatt, glänzend und von bleichgrüner Farbe. Die Blumen sind weiß, bisweilen auswendig röthlich, sehr wohlriechend. Der Kelch ist einblättrig, fünfzähnig; die Krone hat fünf Blumenblätter, meistentheils 20 Staubfäden unter sich in mehrere oder wenigere Bündel verwachsen.

Die Frucht ist eine längliche, oben und unten zugespitzte Beere, mit einer fleischigen, runzligen, blaßgelben Rinde bedeckt, und durch häutige Zwischenwände in 9 Fächer getheilt, wovon jedes zwei fast eirunde harthäutige Saamen enthält. Sowie diese Früchte, Citronen (**Poma Citri**), welche vor ihrer völligen Reife abgenommen worden sind, zu uns kommen, sind sie mit einer mehr oder weniger dicken hellgelben Schale bekleidet, die durch unzählige kleine, mit dem ätherischen Oele angefüllte Behältnisse uneben und höckerig, innerlich aber weiß, schwammig und geschmacklos ist. Diese Schale schließt ein saures, aus vielen kleinen Saftbläschen bestehendes Fleisch in sich. Die dünnschaligen von Messina kommenden, welche saftreicher sind, verdienen vor den dickschaligen aus Genua, St. Remo ꝛc. kommenden den Vorzug.

Die im Handel vorkommenden Citronenschalen (**Cortices Citri**) sind die getrockneten Schalen dieser Früchte. Sie sehen jetzt dunkelbräunlich-gelb aus, sind inwendig noch mit dem weißen markigen Theile versehen, von angenehmen Geruche, der jedoch geringer ist als im frischen Zustande, und von bitterlichem, balsamisch erwärmendem Geschmacke. Wenn sie zum medicinischen Gebrauche gezogen werden sollen, was jedoch selten der Fall ist, so müssen sie, wie die Pomeranzenschalen, von dem kraftlosen Marke befreit werden, und geben dann das Gelbe der Citronenschalen (**Flavedo Corticum Citri**), wobei man darauf zu achten hat, daß die Schalen nicht schwarzgefleckt, wurmstichig und veraltet sind. Die Wirksamkeit derselben scheint vom ätherischen Oele abzuhängen. Wasser und Weingeist ziehen ungefähr gleich viel Extract von gelbbrauner Farbe aus, nämlich aus einer Unze des von dem schwammigen Marke soviel als möglich befreiten Gelben zwei Quentchen.

Von diesem Baume hat man durch Cultur viele Varietäten erhalten, welche sich durch die Gestalt, den Geruch und Geschmack der Früchte, und zuweilen auch durch die Form der Blätter von einander unterscheiden. Die Limonien sind kleiner, länglicher, haben eine dünnere Schale, und ein saftiges, mehr saueres Fleisch; sie werden, nachdem sie 40 Tage hindurch mit Seewasser übergossen gehalten worden, eingesalzen verschickt. Auch der Saft derselben, der ungleich saurer als der Citronensaft ist, wird unter dem Namen Limoniensaft aus Indien gebracht. Die Citronaten haben ein festes, süßes, eßbares Fleisch. Wenn diese zerschnitten und unter gehörigen Handgriffen mit Zucker eingemacht worden, so geben sie den sogenannten grünen Citronat oder Sukade (**Confectio carnis Citri, Succata, Citronata**), der inwendig klar und durchsichtig, oben mit einer dunkelgrünen Rinde, unten

mit einer Kruste von candisirtem Zucker bedeckt, trocken und ohne alle schwarze Flecken seyn muß. Er wird von Italien und dem südlichen Frankreich verschickt.

Eine andere Varietät giebt nach Hrn. Risso (Geiger's Magazin, Mai 1825. S. 119.) Früchte von 8 Kilogrammen. Eben daselbst findet man auch die verschiedenen officinellen Arten der Gattung Citrus von Hrn. Prof. Dierbach abgehandelt.

Citrus. Der Saft. Citronensaft.

Wird im südlichen Europa aus den Früchten von Citrus medica Linn. durchs Auspressen bereitet.

Eine gelbliche Flüssigkeit, von angenehm saurem Geschmacke und Geruche, größtentheils Citronensäure enthaltend. Er sey rein, nicht mit andern Säuren verfälscht, und wenigstens so sauer, daß drei Unzen hinreichen, um eine Drachme kohlensaures Kali zu sättigen. Wenn die Vorschrift des Arztes es verlangt, so muß der Saft aus den frischen Früchten ausgepreßt werden.

Der Citronensaft wird aus den völlig reifen und geschälten Citronen, nach Absonderung der Kerne, ausgepreßt und abgeklärt. Er hat eine etwas schleimige Consistenz, ist aber beinahe wasserklar. Um ihn aufzubewahren, läßt man ihn durch ruhiges Hinstellen sich vollkommen aufklären, füllt ihn auf Bouteillen, welche, am besten umgelegt, in einem Keller aufbewahrt werden. Die Oberfläche des Saftes mit einem fetten Oele zu bedecken, um dadurch den Zutritt der Luft abzuhalten, ist weder nothwendig, noch empfehlenswerth, weil das mit der Zeit ranzig werdende Oel dem Safte einen unangenehmen Geruch und Geschmack mittheilt. Beim Gebrauche wird die obere Haut abgenommen, und das Klare vorsichtig abgegossen. Den klaren Saft vertheilt man zweckmäßig in mehrere kleine Gläser von 3—6 Unzen, und zieht nun jedesmal ein solches Gläschen zum pharmaceutischen Gebrauche.

Der Citronensaft, dem der Limoniensaft gleich kommt, enthält viele schleimige Theile, welche das Verderben des Saftes herbeiführen. Um diese abzuscheiden, rieth Brugnatelli, dem durch Leinwand durchgeseihten Safte etwas vom stärksten Alkohol beizumischen, ihn mehrere Tage in wohl verstopften Flaschen stehen zu lassen, von dem reichlichen schleimigen Bodensatze durch Filtriren durch Löschpapier abzusondern, und den Weingeist durch gelindes Verdunsten wieder davon zu trennen. Indessen wird diese Trennung nicht vollständig geschehen, und noch etwas Weingeist beigemischt bleiben, welcher bisweilen in medicinischer Hinsicht nicht gleichgültig seyn dürfte. Courat empfiehlt, den Saft, nachdem die gröbern schleimigen Theile sich abgesetzt haben, mit Milch zu versetzen, wobei die Milch gerinnt, und mit ihrem Coagulum die trübenden Theile des Saftes mit abscheidet, worauf dieser filtrirt wird. Der Saft wird hierdurch aber sehr verdünnt.

Proust fand in dem Citronensafte: Citronensäure, Bitterstoff, Gummi, Aepfelsäure und Wasser. Die Citronensäure, die von Scheele zuerst dargestellt worden, und die auch in vielen andern Fruchtsäften, jedoch nicht so reichlich, enthalten ist, kann auch aus dem schon mit Schimmel überzogenen Citronensafte durch folgendes Verfahren dargestellt werden. Dem ins Kochen gebrachten Citronensafte wird bis zur Sättigung kohlensaure Kalkerde (Kreide) zugesetzt. Ein Theil Kalkerde bleibt mit der Aepfelsäure als äpfelsaurer Kalk in der Flüssigkeit aufgelöst, die Citronensäure aber giebt mit der Kalkerde den citronensauren Kalk als Niederschlag, welcher abgewaschen und getrocknet wird. Auf 2 Th. citronensauren Kalk nimmt man 1 Th. reine concentrirte Schwefelsäure, die mit dem zehnfachen Gewichte Wasser verdünnt worden, und digerirt, wodurch die Citronensäure frei wird, die Schwefelsäure aber mit dem Kalke den Gyps bildet. Von diesem wird die überstehende Säure durch Filtriren getrennt, zur Syrupsconsistenz abgeraucht, und zur Krystallisation hingestellt. Die Citronensäure krystallirt dann theils in rhomboidalen Säulen, die an beiden Enden mit vierseitigen, meist abgestumpften Pyramiden versehen sind, theils in doppelt vierseitigen an beiden Enden abgestumpften Pyramiden, von vollkommen weißer Farbe, die an der Luft etwas verwittern. Sie ist völlig geruchlos, in Wasser und Alkohol auflöslich, schmeckt stark und angenehm sauer, und giebt ein viel angenehmeres Limonadenpulver (1 Th. Säure mit 6 Th. Zucker und etwas Citronenöl), als die Weinsteinsäure. Auch zur Bereitung der Brausepulver empfiehlt sie sich vor der Weinsteinsäure; letztere giebt mit der Magnesia ein unauflösliches, erstere dagegen ein im Wasser leicht zergehendes Salz.

Der Citonensaft ist als Gegenstand des Handels vielfachen Verfälschungen unterworfen. Ein durchs Schimmeln verdorbener Citronensaft hat einen bitterlichen widerlichen Geruch und Geschmack. Ein unverdorbener und nicht absichtlich mit Wasser verdünnter Saft ist gewöhnlich so stark, daß eine halbe Drachme Kali von einer Unze Saft gesättigt wird. Ist der Saft mit Essig verfälscht, so nimmt er beim Sättigen mit Kali eine braune Farbe an. Noch deutlicher erkennt man diese Verfälschung, wenn auf die zur Trockne abgedampfte neutrale Verbindung concentrirte Schwefelsäure getröpfelt wird, wo sich dann die entweichende Essigsäure durch den Geruch deutlich zu erkennen geben wird. Wäre Salpetersäure beigemischt gewesen, so würde das Salz verpuffen. Salzsäure wird durch Silberauflösung (schwefelsaures Silber wird jedoch durch frisch ausgepreßten Citronensaft schwarz und ganz anders als Hornsilber niedergeschlagen), Schwefelsäure durch salpetersaures Blei erkannt. Weinsteinsäure giebt sich dadurch zu erkennen, daß beim Sättigen des Saftes mit Kali Weinstein erzeugt wird. Würde ein äpfelsäurehaltender Fruchtsaft für Citronensaft ausgegeben, so würde der beim Zusatze von Kalkerde mangelnde Niederschlag des citronensauren Kalkes diese Verfälschung anzeigen. Saft von unreifen Trauben ist durch Ansehn und Geschmack sehr verschieden, und läßt sich nicht nur durch Vergleichung mit ächtem Citronensafte, sondern auch durch den Gehalt an Weinstein erkennen. Doch

kommt der Citronensaft wohl hiermit vermischt im Handel vor, so wie er auch oft eine widrige Bitterkeit durch unvorsichtiges Auspressen erlangt hat.

Der Citronensaft findet in der Medicin häufige Anwendung, zu Saturationen, zur Bereitung des Kali citrati, des Syrupi succi Citri u. s. w.

Clematis erecta seu Flammula Jovis. Das Kraut. Brennkraut.

Clematis erecta Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Das blühende, sehr scharfe Kraut, mit gefiederten Blättern, nicht klimmenden Blattstielen, fast herzförmigen, dreirippigen, länglich-lancettförmigen, ganzrandigen Blättchen, mit vier- oder fünfblättrigen, weißen, außen nicht filzigen Blumenkronen. Im Monat Juli einzusammeln.

Clematis erecta Linn. Die aufrechte Waldrebe.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 6. Polygynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Diese Pflanze ist in Spanien, Frankreich, der Schweiz, so wie auch in einigen Gegenden Deutschlands, in Ungarn ꝛc. zu Hause, bei uns wird sie als Zierpflanze in Gärten gezogen.

Der aufrechte holzige Stengel ist gestreift, glatt, ästig und erreicht eine Höhe von 2—6 Fuß. Die Blätter sind gegenüberstehend, und ungepaartgefiedert, die kleinen Blättchen gleichfalls gegenüberstehend, gestielt, auf der Oberfläche von dunkelgrüner, auf der untern Fläche von blasser, hellgrüner Farbe; die jüngern etwas feinhaarig. Die Blätter an den Blüthen sind auch gefiedert, aber kleiner. Die kleinen, weißen, wohlriechenden Blumen bilden an den Spitzen der Zweige ästige, aufrecht stehende Rispen, beinahe doldenförmig. Der Kelch fehlt. Die Blumenkrone besteht aus 4 oder 5 Blumenblättern.

Das mit den Blüthen eingesammelte Kraut ist geruchlos, besitzt aber frisch einen sehr brennenden scharfen Geschmack, erregt im Munde Hitze und Brennen, und oft wird die Zunge mit Bläschen bedeckt, die zuletzt in Geschwüre übergehen. Diese Eigenschaften sind an der getrockneten Pflanze weit geringer; diese schmeckt mehr zusammenziehend, säuerlich süß und nur wenig brennend.

Ganz ähnlich verhalten sich die Blätter der gemeinen Waldrebe (**Clematis Vitalba Linn.**), welche zuweilen statt der ersteren eingesammelt werden, an welchen aber die Blättchen mehr herzförmig, dicker, lederartig, meistens etwas lappig eingeschnitten und mit einer weißen Wolle bedeckt sind. Die Blätter der Kriechwaldrebe (**Clematis Flammula Linn.**) sind unten am Stengel zwar auch gefiedert, gewöhnlich aber nur in drei Lappen zertheilt; die obersten sind lancettförmig und ganz ungetheilt. Die sehr scharf und bren-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0337-9

nend schmeckenden einfachen, nicht gefiederten Blätter des Sumpfhahnenfußes (Ranunculus Flammula Linn.) sollen ebenfalls Gelegenheit zur Verwechselung geben; sie sind lancettförmig, gerippt, ganzrandig, zuweilen sägeartig gezähnt, nur die Wurzelblätter gestielt, die obern aber am Stengel herunterlaufend. Die Blumen sind einzeln, gelb und glänzend.

Das Wirksame der Waldrebe scheint in der flüchtigen, den Anemonen und Ranunkeln gleichfalls zukommenden Schärfe zu liegen, die auch noch im getrockneten Kraute merklich ist, welches daher am besten im Aufgusse angewendet wird. Der frische Saft entwickelt alle Symptome der Vergiftung. Müller will außer einem brennenerregenden destillirten Wasser, welches wie das über Anemone pulsatilla abgezogene roch, auch ein ätherisches Oel erhalten haben. Der Aufguß wird durch schwefelsaures Eisen schwarzgrün gefärbt. Das Pulver wird in krebsartige Geschwüre eingestreut.

Coccionella. Cochenille.

Die getrockneten Weibchen von Coccus Cacti Linn., einem zu den Rhyngoten Fab. gehörigem Insect, welches im merikanischen Reiche auf dem Cochenillcactus, Cactus coccinellifer, sich aufhält.

Kleine, in der Quere runzlige, außen röthlich-schwärzliche, mit einem weißen Reife besprengte, beim Reiben purpurfarbige Körnerchen, ein färbendes Princip enthaltend.

Die Cochenille wurde gegen das Jahr 1526 in Europa bekannt. Sie wurde anfangs für ein Saamenkorn gehalten und führt auch wohl noch bei den Färbern diesen Namen. Sie ist aber, wie die Naturforscher schon frühzeitig entdeckten, ein zur Ordnung der Halbdeckflügler mit gleichen Flügeln, und zur Familie der Schildläuse gehöriges Insect. Es hat nur ein Gelenk an den Füßen und einen einzigen Haken an deren Wurzel. Das Männchen ist schmal und roth, hat keinen Stachel und zwei Flügel, welche sich wagerecht über den Körper zusammenlegen; der Leib endigt sich in zwei Borsten. Das Weibchen ist ungeflügelt, länglich, unten und oben etwas flach, und hat einen Saugrüssel; die Fühlhörner sind fadenförmig oder borstenförmig und haben meistens 11 Gelenke. Die Farbe ist bald blaß, bald braunroth, wird aber bei dem trächtigen Weibchen mit einer feinen Wolle bedeckt.

Die Cochenille hält sich eigentlich auf mehreren Bäumen in den Wäldern von Meriko auf, erlangt aber daselbst bei weitem nicht die Güte, zu welcher sie die Einwohner durch Cultur zu bringen wissen. Zu diesem Zwecke legen sie um ihre Wohnungen Pflanzungen von Cactus- oder Fackeldistelarten an, welche Pflanzen sich am besten zur Nahrung des Insectes zu eignen scheinen, besonders die gemeine Fackeldistel oder der Cochenillcactus, welcher auch in Europa (und selbst im südlichsten Deutschland) wildwachsend,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0338-5

bei uns aber in Gewächshäusern, unter dem Namen: indianische Feige, gefunden wird.

Die Einwohner holen die Weibchen aus den Wäldern, ehe diese ihre Eier legen, und setzen diese, oder die bei der letzten Sammlung zurückgelassenen, und den Winter über auf den saftigen Blättern des Cactus in ihren Häusern erhaltenen, zu 10 oder 12 bei einander in kleine, aus den Fasern der Cocosnuß oder aus Baummoos gemachte Nesterchen, welche sie auf den Stacheln der Cactuspflanzen befestigen. Das Insect legt dabei seine Eier und stirbt; sein Körper trocknet aus, und verwandelt sich in eine harte Schale, welche die Eier umgiebt, und gegen äußere Zufälle schützt. Nachdem die Eier auf diese Weise gleichsam ausgebrütet worden, schlüpfen die Jungen aus, bedecken zu Tausenden die Pflanze, hängen sich darauf fest, und machen alle ihre Verwandlungen durch. Zuletzt bleiben die Weibchen unbeweglich sitzen, die Männchen bekommen Flügel, nähern sich den Weibchen, befruchten sie und sterben bald darauf. Jetzt werden die Weibchen, welche allein auf der Pflanze zurückgeblieben sind, eingesammelt, indem man sie mit einem Pinsel auf ein untergelegtes Tuch abkehrt; man läßt aber eine gewisse Anzahl auf der Pflanze zurück, damit sie eine zweite Brut und diese eine dritte erzeuge, welche noch in demselben Jahre eingesammelt werden. Die Cochenille von der ersten Ernte ist die beste, und die von der letzten die schlechteste. Diese durch Cultur erhaltene Cochenille hat Vorzüge vor der wilden in den Wäldern gesammelten Cochenille, welche kleiner ist und eine viel schwächere, nicht so feste Farbe giebt. Die Akklimatisation der Cochenille ist neuerlichst in Spanien und namentlich in Malaga vollkommen gelungen, wo die Cactus in so großer Menge wild wachsen, wie in Amerika, und ganze Cactuspflanzungen angelegt werden.

Es finden sich im Handel zwei Sorten von cultivirter Cochenille, wovon man die eine mit dem Namen der schwarzen, die andere mit dem der grauen oder der gefurchten Cochenille belegt. Die zwischen beiden befindlichen Unterschiede leitet man von den verschiedenen Methoden ab, welche man zur Tödtung des Insects nach seiner Einsammlung anwendet. Die eine derselben soll darin bestehen, daß die gesammelte Cochenille in ein Säckchen gebunden, dann in siedendes Wasser getaucht und hierauf getrocknet wird. Nach der andern wird das Insect auf Horden ausgebreitet, und durch Anwendung von Ofenwärme, oder auch auf geheizten eisernen Platten ausgetrocknet. Das erstere Verfahren liefert die schwarze oder rothbraune, das zweite die aschgraue oder gefleckte Cochenille. Der silberartige Schein, welchen die letztere besitzt, rührt von einer weißlichen Materie her, welche in den Zwischenräumen der Ringe oder der Querrunzeln des Thieres sich befindet. Die Schwierigkeit, diese Materie von den Insecten abzusondern, verbunden mit der noch größeren, sich eine graue Cochenille, bevor sie irgend eine Veränderung erlitten hat, zu verschaffen, hindern die Erkenntniß derselben; vielleicht ist sie eiweißartiger Natur.

Die gefleckte Cochenille wird gewöhnlich der schwarzen vorgezogen, ob-

gleich Versuche gelehrt haben, daß die letztere eben so viel Farbestoff liefert, als die erstere. Um also der schwarzen Cochenille das beliebte Ansehen zu geben, soll häufig der venetianische Talk benutzt werden, welche Substanz durch ihr perlmutterartig glänzendes Ansehen sehr gut zu diesem Betruge paßt. Um nämlich der schwarzen Cochenille das silberartige Ansehn zu ertheilen, wird sie 36—48 Stunden in den Keller gesetzt; die geringe Feuchtigkeit, welche die Substanz während dieser Zeit anzieht, ist hinreichend, um zu bewirken, daß der feingepulverte venetianische Talk beim Durchschütteln in einem Sacke der Cochenille das silberartige Ansehn verschafft, wonächst diese getrocknet und der überflüssige Talk durch ein Sieb abgesondert wird. Früher soll man sich bisweilen des Gypses und Bleiweißes bedient haben, welche schädlichen Beimischungen aber durch ein mattes Ansehn sich zu erkennen geben.

So wie die Cochenille im Handel vorkommt, hat sie kaum noch einige Aehnlichkeit mit einem Insect; wenn man sie aber in Wasser taucht, so werden die Füße und Ringe des Insectes sichtbar. Der Geschmack ist scharf, bitterlich und zusammenziehend; durchs Alter vergeht ihre Farbe nicht, denn man hat gefunden, daß Cochenille, die 130 Jahre alt war, noch eben so gut als frische zum Färben gebraucht werden konnte. Von dieser Waare kommen jährlich wenigstens 800,000 Pfund nach Europa und zu jedem Pfunde gehören wenigstens 70,000 Insecten.

Von dieser Cochenille ist die deutsche oder polnische verschieden (**Coccionella polonica**). Man findet dieselbe in Preußen, Polen und ganz Deutschland, in Gestalt purpurrother und violettröthlicher Bläschen von der Größe des Hanfsaamens, an den Wurzeln verschiedener Kräuter, und besonders des perennirenden Knauels (**Scleranthus perennis**), woran sie sich vornehmlich um Johannis zeigen. Es ist ein dem vorigen sehr ähnliches Insect.

Die Cochenille ist von den Herren Pelletier und Caventou analysirt worden. Ihr Verfahren ist folgendes: Die Cochenille wird mit kochendem Schwefeläther behandelt, bis alle auflöslichen Theile ausgezogen sind. Der Aether nimmt hierbei einen pomeranzengelben, riechenden, fetten Stoff auf, welcher aus etwas Carminium, Talg- und Oelstoff, dann aus einem sauren, riechenden Stoffe besteht. Wird die mit Aether ausgezogene Cochenille mit kochendem absoluten Weingeiste behandelt, so erhält man eine gelblichrothe Tinctur. Bei dem Erkalten und durch freiwilliges Verdunsten läßt die Flüssigkeit einen körnigen, gewissermaßen krystallinischen Stoff von einer sehr schönen rothen Farbe fallen, welcher sich in Wasser vollständig, in kaltem rectificirten Weingeiste aber nur unvollkommen auflöst. Durch den letzteren wird ein bräunlicher thierischer Stoff ausgeschieden. Der von dem Alkohol aufgelöste Antheil des rothen Stoffes ist noch nicht reines Carminium; wenn man nämlich die Flüssigkeit mit gleichen Theilen Schwefeläther vermischt, so fällt der reine Carmin zu Boden, und der Aether hält sodann noch etwas weniges von dem fetten Stoffe, welcher schon vom Anfange durch denselben ausgezogen wurde. Der Rückstand von den Abkochungen mit Ae-

ther und Weingeist ist noch sehr gefärbt, weil das Carminium durch den thierischen in Alkohol unauflöslichen Stoff geschützt ist. Man kann daher auch wäßriges Cochenillendecoct zuerst durch salpetersaures Silber fällen, wo thierische Materie mit etwas Farbestoff gefällt wird, dann durch essigsaures Blei, wo das reine Carminium mit dem Bleioxyd niederfällt, und von diesem durch Hydrothionsäure abgeschieden werden kann. Der Rückstand von den Abkochungen der Cochenille, welche allen Farbestoff aufgenommen haben, ist eine durchscheinende gallertartige Substanz, welche eine bräunliche Farbe besitzt und nur an einigen Stellen farblos ist. Diese ist das Gerippe des Insectes.

Der ausgeschiedene Farbestoff, Carminium, nach John Carminstoff, ist (Gmelin's Handb. d. Ch. 2te Aufl. S. 1305.) purpurroth, fein krystallinisch, körnig und luftbeständig; schmilzt ungefähr bei 50 ° C., liefert bei höherer Temperatur kein Ammoniak, auch beim Glühen mit Kupferoxyd keine Spur von Stickgas. Durch Chlor wird er schnell, durch Jod langsamer gelb. Er löst sich leicht in Wasser; die carminrothe Lösung giebt beim Abdampfen einen Syrup, aber keine Krystalle. Säuren ändern die Farbe in Gelb um; Weinstein und Sauerkleesalz bewirken scharlachrothe Färbung, die leicht löslichen Alkalien aber eine violette, welche Färbung aber schon mit einer schwachen Zersetzung verknüpft ist. Die Alaunerdesalze, selbst die säuerlichen, färben die wäßrige Lösung carmoisinroth, besonders in der Hitze ohne alle Fällung. Salzsaures Zinnoxydul wird scharlachroth gefärbt ohne Fällung; fügt man Alaunerdehydrat hinzu, so entsteht ein schön rother Lack, der beim Erhitzen nicht carmoisinroth wird.

Auf diese Eigenschaften gründet sich die Bereitung des Carmins, einer der feinsten Lackfarben von glänzendem Hochroth. Zu 3—4 Maaß in einem kupfernen wohl verzinnten Kessel befindlichen siedenden Wassers setzt man eine Unze fein geriebene Cochenille (Einige setzen noch ein Quentchen feingeriebene Weinsteinkrystalle zu, John nimmt gleich auf 2 Unzen Cochenille 1½ Quentchen Zinnsolution und ein Quentchen Natron hinzu), und läßt höchstens 8 Minuten sieden, worauf man zwei Scrupel reinen gepulverten römischen Alaun (nach John) hinzustreut, wovon die Tinctur sogleich eine angenehme Röthe erhält. Nach einigen Minuten Aufwallen läßt man eine Stunde hindurch das Cochenillpulver sich gänzlich zu Boden setzen, gießt dann bei der behutsamsten Neigung des Kessels, damit das Pulver nicht aufgerührt werde, das rothe Decoct durch zartes Nesseltuch, und verwahrt selbiges in großen und wohlbedeckten Zuckergläsern oder Porcellanschalen. Nach drei Tagen hat sich der Carmin abgesetzt, welcher sorgfältig und vorsichtig von der Flüssigkeit durch weißes Druckpapier geschieden, mit warmen Wasser gut ausgesüßt, und dann getrocknet wird. Aus der Flüssigkeit kann durch Zinnauflösung noch mehr Carmin niedergeschlagen werden, der aber hinsichts der Schönheit und Dauer dem vorigen nachsteht. Aus der rückständigen Cochenille kann durch nochmaliges Kochen mit 1½ Unzen gereinigter Pottasche, und nach dem Durchseihen, durch Zusatz von 5 Unzen in reinem Wasser auf-

gelösten Alaun der florentiner Lack (Lacca florentina) bereitet werden. Das Kali verbindet sich nämlich mit der Schwefelsäure des Alauns, und die Alaunerde fällt in Verbindung mit dem Farbestoffe nieder.

Durch Eintauchen feiner Leinwandlappen in die wäßrige Abkochung der Cochenille erhält man die rothen Schminkläppchen, Tournesol, Bezetta rubra.

Die Cochenille enthält nach Pelletier und Caventou Fett, aus fettem Oele, Talg und einer riechenden flüchtigen Säure (der Buttersäure ähnlich) zusammengesetzt; Coccusroth, Carminium; schleimartige Materie, verschieden von der Gallerte; durchscheinende häutige Materie; in der Asche kohlensaures Kali, früher mit der organischen Säure verbunden; salzs. und schwefels. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk. Nach John (Chem. Schrift. IV. S. 210.): wachsartiges Fett 10,0; Farbestoff nebst Wasser 50,0; Thierleim 10,5; Thierleim, nur in Kali löslich, 14,0; häutige Theile 14,0; salzs. Kali und Ammoniak, Kali, Kalk und Eisen mit Phosphorsäure vereinigt 1,5.

Die Cochenille wird in der Pharmacie nur selten, um Zahnlatwergen, Tincturen ꝛc. zu färben, häufig aber in der Färberei und zur Bereitung des Carmins benutzt.

* Cocculus indicus. Der Saamen. Kokkelskörner.

Menispermum Cocculus Gaertn. Fischtödtender Mondsaamen.
Menispermum lacunosum Lam.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 10. Dodecandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 17. Menispermeae.

Sprengel (Berl. Jahrb. XXIII. 1822. S. 70.) hat schon früher gezeigt, daß die Früchte, welche wir unter dem Namen Cocculi indici kennen, schon von den Arabern eingeführt, und von Avicenna und Serapion unter dem Namen Maheradsch beschrieben wurden.

Die erste genauere Nachricht über die Mutterpflanze dieser Früchte ist von Hrn. Dr. Wallich, Director des botanischen Gartens in Calcutta. Das Vaterland derselben ist Amboina, Celebes und besonders das südliche Malabar, wo sie in der Nähe der Seeküste vorkommt. Die Wurzel ist stark, ästig, holzig, innen gelb und grubig. Der strauchartige Stengel steigt mit seinen rankenden Blattstielen bis zur Spitze der höchsten Bäume empor. Die Blätter sind am Stamme zerstreut, an den Aesten genähert, rundlich-herzförmig mit kurzer Spitze, ganzrandig und sehr groß, 8—12 Zoll lang, und fast eben so breit; sie sind immergrün, fest und lederartig. Die weiblichen Blüthen stehen in hängenden, gewöhnlich zu 3—4 vereinigten, 1—2 Fuß langen, zusammengesetzten sparrigen Trauben. Die Menge der Trauben mit ihren zahllosen weißen Blüthen, von hohen Bäumen herabhängend, soll einen schönen Anblick gewähren. Diese Blüthen verbreiten einen starken, dem der Berberitzen ähnlichen Geruch. Die Frucht, deren jede Traube oft zwei bis dreihundert bringt, ist eine bei der Reife purpurrothe Beere, die unter der weichen fleischigen Hülle einen rundlich nierenförmigen braunen Saamen bringt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0342-6

Diese Früchte sind schon von alten Zeiten her unter dem Namen Cocculi indici, Cocculi piscatorii, in den Officinen gehalten worden; doch wurden sie fast nie als Heilmittel angewandt. Sie besitzen einen sehr starken bittern Geschmack und gehören zu einer eigenen Classe der narkotischen Gifte, die das Bittergift (Pikrotoxin) enthalten, welches seine Wirkungen vorzugsweise auf das Rückenmark äußert.

Boullay (Schweigg. J. VII. 1813. S. 365.), der die Kokkelskörner zum Gegenstande chemischer Untersuchungen machte, hat schon im Jahre 1812 diesen giftigen Bitterstoff rein und isolirt dargestellt, und ihn mit dem Namen Pikrotoxin belegt, und die wichtigsten Resultate, die er bei dieser ersten Untersuchung erhielt, sind 1) daß die holzige Hülle der Kokkelskörner aus Holzfaser und einem gelben brechenerregenden Stoffe besteht; 2) daß der Kern etwa aus der Hälfte eines butterartigen Oeles, feinem Eiweiß (thierisch-vegetabilischer Materie), gelber Farbesubstanz; etwa 0,2 einer bittern krystallisirbaren Substanz; 0,5 Faserstoff, Pflanzensäure, die sich als Aepfelsäure zu erkennen gab, schwefels. und salzs. Kali, phosphors. Kalk, Kieselerde und Eisen besteht. Im Jahr 1818, nachdem die Alkalität des Morphiums durch Sertürner festgestellt war, erklärte Boullay (Taschenbuch 1820. S. 122. und Gilberts Annalen 33. 1819. S. 315.) auch das Pikrotoxin für ein Alkaloid, welches an eine eigenthümliche Säure, die er früher für Aepfelsäure gehalten, gebunden sey, für welche Säure er den Namen Menispermsäure in Vorschlag brachte.

Diese Angaben Boullay's wurden von Pettenkofer (Buchn. Repert. VII. S. 76.) größtentheils bestätigt.

Später wurden die Versuche Boullay's auch von Casaseca (Buchn. Repert. XXIII. 3. 1826. S. 454.; Trommsd. N. J. XII. 2. S. 123. und Geiger's Magazin, April 1826. S. 67.) wiederholt. Er bereitete von zerquetschten Kokkelskörnern mit destillirtem Wasser ein starkes Decoct, filtrirte und dampfte zur Extractconsistenz ab, wobei soviel als möglich das Fett, welches auf der Oberfläche der Flüssigkeit erschien, abgenommen wurde. Das so erhaltene Extract wurde mit heißem Alkohol behandelt, welcher die bittere Substanz auszog, und eine braune Materie zurückließ.

Die geistige Auflösung mußte das menispermsaure Pikrotoxin enthalten, weil die unaufgelöste Substanz nicht mehr bitter war. Die Flüssigkeit wurde abgedunstet; gegen die Mitte der Operation röthete sie das Lackmuspapier und am Ende sonderten sich Tröpfchen von grünlichem Fett ab. Dieses Fett röthete Lackmus und war ein Gemisch von Oel und Margarinsäure. Der extractartige Antheil war im Wasser auflöslich. Diese Auflösung war nicht sauer, und es konnte aus ihr auch keine Säure abgeschieden werden, und Casaseca glaubt, daß die Wirkungen, die Boullay der Menispermsäure zuschrieb, wohl von einem Gemische von Schwefelsäure mit der besonderen in Alkohol unauflöslichen Substanz herrühren dürften. Vauquelin hat nun auch wirklich die von B. bereitete Menispermsäure untersucht, und sie für ein

Gemisch von Aepfelsäure mit wenig Schwefelsäure und bitterer vegetabilischer Farbesubstanz erkannt.

Die in Alkohol unauflösliche Materie war Boullay's eiweißartige, thierisch-vegetabilische Substanz, und besteht aus thierischer Materie, Farbestoff, einer an Kali und Kalk gebundenen Pflanzensäure, und den in der Asche gefundenen Bestandtheilen, nämlich kohlens., schwefels. und salzs. Kali, Eisen, Kieselerde, phosphors. und kohlens. Kalk.

Casaseca suchte nun das Pikrotoxin darzustellen. Das Kokkelskörnerextract wurde mit heißem Alkohol ausgezogen. Die geistigen Flüssigkeiten wurden langsam abgedampft, die früher erwähnten Fettsäuren abgesondert, das Extract mit einem Ueberschusse von Bittererde versetzt und dann 24 Stunden hindurch mit absolutem Alkohol behandelt. Es wurde eine ziemlich gefärbte, bittere Flüssigkeit erhalten, welche sehr kleine, außerordentlich bittere Krystalle hinterließ, die Casaseca für Pikrotoxin erkannte. Sie wurden gewaschen und in Alkohol aufgelöst. Die geistige Auflösung reagirte aber nicht im mindesten alkalisch, und konnte nicht die mindeste Menge verdünnter Schwefelsäure sättigen. Es ist also anzunehmen, daß das Pikrotoxin kein Alkaloid, sondern, wie Boullay in seiner erstern Abhandlung angegeben hatte, eine besondere bittere Substanz ist.

Boullay, der zur Darstellung des Pikrotoxins dasselbe Verfahren beobachtet, die alkoholische Auflösung aber noch mit thierischer Kohle entfärbt hatte, fand jedoch neuerlich, daß, obgleich das Pikrotoxin nur saure und keine neutralen Salze liefert, essigsaures Pikrotoxin, so lange gewaschen, bis es feuchtes Lackmuspapier nicht mehr röthete, mit doppelt kohlensaurem Kali zusammengerieben bald zerfließt, und auf Zusatz von concentrirter Schwefelsäure Essigsäure ausstößt, mithin die Eigenschaft besitzt, sich mit Säuren zu verbinden, mithin seine Stelle in der Reihe der Alkaloide behaupte.

Auch Nees v. Esenbeck (Buchn. Repert. XXIV. 1826. S. 55.) hat es durch belehrende Versuche bestätigt, daß die bittere Substanz der Kokkelskörner, Menispermin, Cocculin, durchaus nicht alkalisch reagire, und selbst nicht die geringste Menge Schwefel- oder Essigsäure neutralisiren könne, ob es gleich mit den Säuren Verbindungen eingeht, und daher wohl zu den Pflanzenalkaloiden zu zählen seyn möchte. Zugleich ergab sich, daß das von Boullay (Trommsd. N. J. XII. 1. S. 293.) und Casaseca befolgte Verfahren zur Darstellung dieses Stoffes in jeder Hinsicht zu empfehlen, und daß ein wiederholtes Auskochen der Kokkelskörner nöthig sey. Um das Menispermin von der Talgsäure zu befreien, braucht man es nur in kaltem Weingeist zu lösen. Eine eigenthümliche Säure wurde auch nicht gefunden, sondern diese ist Aepfelsäure. Außerdem enthalten die Kokkelskörner auch Salzsäure und einen braunen gummigen Extractivstoff.

Herr Apotheker Marder (Brandes Archiv XVI. S. 264.) erhielt aus einer filtrirten Flüssigkeit, die zur Ausscheidung des Pikrotoxins eingeengt und noch heiß hingestellt war, beim Erkalten einen unschmackhaften, krystallinischen, in kaltem und kochendem Wasser wie in Alkohol nicht löslichen,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0344-8

von verdünnter Schwefel- und Salpetersäure nicht angegriffen werdenden, weder alkalisch noch sauer reagirenden Stoff, der etwas von ätzendem Kali verändert wird, in einem Löffel bis zum Glühen erhitzt zusammenfließt, und mit einem Geruche verbrennt, der dem des verbrennenden Flachses nahe kommt.

Das Pikrotoxin, oder in engerer Bedeutung Cocculin, Menispermin, ist hiernach als der eigenthümliche, wirksame Bestandtheil der Kokkelskörner anzusehen; es ist im reinen Zustande vollkommen weiß, glänzend, halb durchsichtig und nadelförmig krystallisirt. Unter der Loupe erscheinen die Krystalle als vierseitige Säulen. Es besitzt keinen Geruch, dagegen einen unerträglich bittern Geschmack. Es reagirt nicht alkalisch, geht jedoch mit Säuren Verbindungen ein. Auf glühenden Kohlen bläht es sich auf, verbreitet einen weißen, harzig riechenden Rauch, und verkohlt, ohne zu schmelzen und sich zu entflammen. Bei der trocknen Destillation gewinnt man saures Wasser, saures gelbes brenzliges Oel, Kohlensäure und Kohlenwasserstoffgas, aber keine Spur von Ammoniak. Das beste Auflösungsmittel ist der Alkohol, weniger der Aether, Wasser zeigt nur eine schwache Wirkung.

(Vergleiche noch die Uebersicht von Dr. Meißner in Berl. Jahrb. XXVIII. 1. 1826. S. 132.)

In der Medicin werden die Kokkelskörner nicht gebraucht; sonst hat man sie wohl gegen Kopfungeziefer angewendet. In Indien dienen sie als Lockspeise für die Fische, welche von dem Genusse in eine Art Betäubung fallen.

Cochlearia. Das Kraut. Löffelkraut.

Cochlearia officinalis Linn. Eine zweijährige am Meeresstrande des nördlichen Europas häufige, bei uns in Gärten gezogene Pflanze.

Das blühende saftige Kraut, mit herzförmigen, rundlichen Wurzelblättern, sitzenden, länglichen, buchtig-gezähnten Stengelblättern, mit einem scharfen flüchtigen Princip begabt. Es werde nur im frischen Zustande angewandt. Im Frühlinge einzusammeln.

Cochlearia officinalis Linn. Das gemeine Löffelkraut.
Linn. Cl. XV. Tetradynamia. Ord. 1. Siliculosa.
Juss. Cl. XIII. Ord. 3. Cruciferae.

Diese häufig im nördlichen Europa, in Holland, England, Grönland, Island ꝛc. am Meeresstrande wachsende Pflanze wird bei uns in Gärten gezogen.

Die Wurzel ist spindelförmig, einfach, lang, von der Dicke einer Schreibfeder. Der Stengel vom Grunde aus ästig, walzenrund, grün, glatt, mit einigen Längsrippen versehen. Die langgestielten, sehr stumpfen, ganzrandigen, dunkelgrünen, glänzenden, zahlreichen Wurzelblätter bilden einen Busch; die untern Stengelblätter sehr wenig gestielt, in den Blattstiel sich endigend,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0345-4

die obern auffitzend, umfassend. Die weißen kleinen Blumen bilden am Ende des Stengels und der Aeste mehr oder weniger dichte Trauben. Der Kelch ist glatt, abfallend und vierblättrig; die Krone, fast noch einmal so groß als der Kelch, aus vier eiförmigen Blumenblättern bestehend. Die Frucht ist ein kleines Schötchen mit ausgerandeten Saamen.

Die Blüthezeit dieser Pflanze ist Mai bis August.

Man benutzt entweder die ganze blühende Pflanze, oder auch nur die Wurzelblätter, die dann am kräftigsten sind, wenn die Pflanze anfängt zu blühen. Sie hat einen eigenen, kressenartigen, bitterlich-salzigen, beißenden Geschmack, und beim Zerreiben einen eigenthümlichen, scharfen, balsamischen Geruch. Beim Trocknen verliert sie größtentheils Geruch und Geschmack und wird beinahe unwirksam. Zwei Pfund frisches Kraut geben etwa nur fünf Loth trocknes.

Bisweilen sollen die Blätter des Feigwarzenkrautes (Ranunculus Ficaria Linn.) untergeschoben werden; diese haben aber eine mehr herz-, nierenförmige, rundliche Gestalt, sind ungleich, in der Mitte oft mit einem schwarzen Flecke bezeichnet, und besitzen einen mehr unangenehm bittern, als kressenartigen scharfen Geschmack. In Buchn. Repert. V. S. 424. wird angeführt, daß die Kräutersammler zu ganzen Centnern Alisma Plantago einsammeln und trocknen.

Außer Gutret's Versuchen (siehe Armoracia) verdanken wir Herrn Josse (Trommsd. VI. 2. S. 127.) mehrere Bemerkungen über das Löffelkraut. Durch die Destillation mit Wasser erhielt er zuerst eine etwas opalisirende Flüssigkeit, die stark roch und beißend, jedoch hintennach krautartig schmeckte. Josse bemerkte, was Einhoff am Meerrettigwasser bemerkt hatte, daß das in verschlossenen Gefäßen aufbewahrte vorher milchige Wasser nach einigen Monaten ganz klar geworden war, und auf dem Boden sich eine ansehnliche Menge kleiner, platter, zarter, glänzender Krystalle abgesetzt hatte, die aber nicht gesammelt werden konnten, da sie durch das Seihezeug gingen (Löffelkrautcampher?). Ein wesentliches (flüssiges) Oel konnte auch von großen Quantitäten Kraut nicht erhalten werden. Fr. Hoffmann hat aber ein wesentliches Löffelkrautöl erhalten, und dieses war im reinsten Zustande hellgelb, vom durchdringendsten Geruche des Krauts und einem sehr scharfen Geschmacke, specifisch schwerer als Wasser, und doch so außerordentlich flüchtig, daß es selbst aus wohl verstopften Gläsern entweicht. Auch Bucholz bestätigt, daß 2 Drachmen Löffelkrautöl aus einem mit Kork und Blase wohl verschlossenen Gläschen innerhalb 40 Jahren gänzlich verflogen waren, ohne den geringsten Rückstand zu hinterlassen.

Aus eilf Pfunden frisch gepreßten Saftes von bitterm und beißendem Geschmacke erhielt Josse drei Quentchen grünes Satzmehl. Nach dem Durchseihen hat der Saft eine dunkelgelbe Farbe; in der Wärme setzt sich ein schmutzig grauer Satz ab, der sich als Kleber verhält. An der Luft erhält der Löffelkrautsaft mit der Zeit einen deutlich sauren Geschmack, und setzt immer mehr von jenem glutinösen Stoffe ab. Das aus dem Safte erhal-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0346-9

tene Extract wog 16 Loth, war durchscheinend, schwarzbraun, zerfloß an der Luft, blähte sich auf Kohlen auf, wobei der darin enthaltene Salpeter verpuffte. Dieses Extract war zusammengesetzt aus gummigem Extractivstoffe, bitterm Extractivstoffe und bitterm Harze; außerdem enthielt es einen reichlichen Antheil an Salzen, die der Verf. zum größten Theil für Salpeter, dann für schwefels. und salzs. Ammoniak und für schwefels. Kalkerde erklärt.

Braconnot fand das aus dem ausgepreßten Safte des Löffelkrautes erhaltene Extract zusammengesetzt, aus: 1) einer in Alkohol unauflöslichen thierisch-vegetabilischen Materie, die durch Galläpfelaufguß reichlich niedergeschlagen wurde; 2) aus einem in kaltem Alkohol unauflöslichen, in der Wärme aber von ihm aufgenommenen zuckrigen Extractivstoffe, dessen Auflösung durch das essigsaure Blei nicht getrübt, jedoch gleichfalls durch Galläpfelaufguß gefällt wurde; 3) einem Natronsalze mit einer Pflanzensäure, die am meisten Aehnlichkeit mit der Aepfelsäure hatte, doch ohne damit identisch zu seyn; 4) ein Kalksalz mit eben dieser Säure; 5) schwefels. und salzs. Kali. Von Salpeter fand B. keine Spur. Dieser ist jedoch auch von Tordeux (Schweigg. N. J. II. 1821. S. 333.) bestätigt, der ihn aus einem lange aufbewahrten Extracte des Löffelkrautes in Menge herauskrystallisirt fand, und ihn als die muthmaßliche Ursache der diuretischen Eigenschaften des Krautes ansieht.

Döbereiner hat den eigenthümlichen scharfen, mit dem ätherischen Oele verbundenen Stoff des Löffelkrautes Cochlearin genannt.

Das Löffelkraut ist im frischen Zustande eins der kräftigsten antiscorbutischen Mittel. Um es also frisch zu erhalten, macht man es mit 3 Th. Zucker zur Conserve ein. Sehr wirksam ist auch der daraus bereitete Löffelkrautspiritus.

* Coffea. Die Bohnen. Kaffeebohnen.

Coffea arabica Linn. Der gemeine Kaffeebaum.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XI. Ord. 2. Rubiaceae.

Der Kaffeebaum ist ursprünglich in Aethiopien zu Hause, wo er seit undenklichen Zeiten bekannt, und jetzt auch mit Erfolg cultivirt wird. Von Aethiopien wurde er nach Arabien verpflanzt, wo er einheimisch geworden ist und nirgends besser gedeiht, als in der Provinz Jemen, bei Mocha und Aden. Im Jahr 1710 wurde der erste Kaffeebaum durch Witzen, Consul in Amsterdam, nach Europa verpflanzt (nach Andern sollen ihn die Holländer schon im Jahr 1690 aus Mekka nach Holland gebracht haben), und aus den Treibhäusern von Amsterdam in die von Paris und Deutschland verpflanzt, von wo er endlich 1716 nach Amerika gelangte, so daß er jetzt in Ost- und Westindien verbreitet, und besonders auf der Insel Bourbon, in Java, Martinique, St. Domingo, Guadeloupe, überhaupt auf den Antillen ꝛc. angebaut wird. Er ist sehr zärtlich und verlangt viele Wärme, jedoch bringt er auch in den deutschen Gewächshäusern Früchte.

Die Wurzel dieses 15—20 Fuß hohen, immergrünen, das ganze Jahr hindurch Blüthen, unreife und reife Früchte tragenden Baumes ist rothbräunlich, geht gerade in die Erde und ist wenig faserig. Der Stamm erhebt sich in gerader Linie bis zu der erwähnten Höhe, obwohl er kaum 3 Zoll im Durchmesser hat; er ist mit einer feinen graulichen Rinde bedeckt, die vertrocknet rissig wird. Das Holz ist fest und hart.

Die Blätter sind kurzgestielt, gegenüberstehend, länglich-eiförmig, 2 Zoll breit, 4—5 Zoll lang. Die kurzgestielten weißen Blumen stehen in großer Anzahl gehäuft in den Achseln der oberen Blätter; sie sind dem großblüthigen Jasmin ähnlich, verbreiten einen außerordentlich angenehmen Geruch und verblühen sehr schnell. Der Kelch ist einblättrig, fünfzähnig; die Blumenkrone einblättrig, trichterförmig, in fünf lancettförmige Einschnitte getheilt. Die Frucht ist eine anfangs grüne, dann rothe, bei der Reife dunkler (violett) gefärbte, rundlich-eiförmige, mit einem kleinen Nabel versehene saftige, zweifächrige, zweisaamige Beere von der Größe einer Kirsche. Das schleimige, weiche Mark derselben ist unschmackhaft, und wird durchs Trocknen etwas säuerlich. Die Saamen sind knorpelartig, 3—4 Linien lang und 2—3 Linien breit, hart, mäßig schwer, grau, gelblich oder grünlich, bald rund, bald und öfter eiförmig, auf dem Rücken gewölbt, mit der andern entgegengesetzten platten, der Länge nach mit einer Furche versehenen Fläche zusammenliegend und mit einer eigenen Haut umgeben. Von dem ausgetrockneten sie umgebenden Marke werden sie durch darüber hingerollte hölzerne oder steinerne Walzen befreit. Sie haben einen etwas mehligen, kaum merklich bittern Geschmack, und in größern Quantitäten einen eigenthümlichen nur schwachen Geruch; sie sind sehr zähe und darum schwer zu pulverisiren.

Man unterscheidet im Handel vorzüglich drei Sorten: 1) den arabischen oder levantischen Kaffee, dessen Bohnen am kleinsten und vergleichungsweise am dunkelsten von Farbe sind. 2) Den javanischen oder ostindischen, mit großen gelben Bohnen, und 3) den westindischen (dessen vorzüglichste Sorte der Martiniquekaffee ist), dessen Bohnen von mittlerer Größe und von Farbe grünlich sind. Verwerflich sind die sehr leichten, vollends die auf dem Wasser schwimmenden, mißfarbigen, schwarzen, dumpfig riechenden Bohnen. Auch giebt es gefärbte Bohnen, die sich durch eine stark ins Bläuliche fallende Farbe verrathen. Ein Kennzeichen guter Bohnen ist, daß sie nach dem Rösten stark und angenehm riechen, und das Decoct der rohen Bohnen beim Erkalten allmälig eine schöne grüne Farbe annimmt.

Das über Kaffeebohnen abgezogene Wasser hat den eigenthümlichen nicht starken Geruch der Kaffeebohnen, opalisirt etwas, röthet nach 24 Stunden das Lackmuspapier, und nimmt von der oxydirten schwefelsauren Eisenauflösung einen grünlichen Schein an. Die Abkochung guter Kaffeebohnen wird durch die Einwirkung der Luft grün, welches schneller geschieht, wenn man das Decoct auf eine flache Schale ausgießt und etwas stehen läßt. Abgekochte Bohnen, die noch mit etwas Feuchtigkeit bedeckt sind, färben sich grasgrün.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0348-1

Die ältern Arbeiten von Chenevix, Payssé und Cadet finden sich zusammengestellt in Gehlen's J. VI. S. 522. Chenevix stellte einen eigenthümlichen Kaffeestoff dadurch dar, daß er einem Aufgusse von ungebrannten Kaffeebohnen salzsaure Zinnauflösung zusetzte, wodurch er einen Niederschlag erhielt, den er wusch und durch Schwefelwasserstoffgas zersetzte. Die obenstehende Flüssigkeit enthielt das eigenthümliche bittere Princip des Kaffees. Zur Trockne abgedampft war er gelb und durchsichtig wie Horn, in Wasser und Alkohol auflöslich, ohne Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen. Die Auflösung hatte einen angenehmen bittern Geschmack, nahm mit den Alkalien eine granatrothe Farbe an, gab mit Eisenauflösung einen grünen Niederschlag; Gallerte bewirkte aber keine Fällung. Pfaff (Mat. med. III. S. 2.) stellte diesen Kaffeestoff durch Auskochen der gestoßenen Kaffeebohnen, Abrauchen zur Syrupsconsistenz, Ausziehen dieses Extracts mit Alkohol von 80 Procent dar, wobei die schleimigen Theile ungelöst blieben. Dem durch Abziehen des Weingeistes erhaltenen Rückstande wurde durch absoluten Alkohol das beigemischte Harz entzogen, und das Zurückbleibende in Wasser aufgelöst. Nach Cadet enthalten 8 Unzen Kaffee ungefähr: Schleim 1 Unze; Harz 1 Drachme; färbenden Extractivstoff 1 Drachme; Galläpfelsäure 3½ Drachme; Eiweißstoff 10 Gran; rückständige Faser 5 Unzen 3½ Drachme. Payssé sieht seine Kaffeesubstanz für eine Säure an, und nennt sie Kaffeesäure. Nach einer Untersuchung von Schrader (Gehlen's J. VI. S. 544.) bestehen 8 Unzen rohe Martiniquekaffeebohnen aus: eigenthümlicher Kaffeesubstanz 1 Unze 3 Drachmen 15 Gran; gummigem und schleimigem Extract 2 Dr. 20 Gr.; Extractivstoff 24 Gr.; Harz 16 Gr.; talgartigem Oel 20 Gr.; trocknem Rückstand 5 Unzen. 2 Dr. 40 Gr.; Verlust wahrscheinlich an Wasser 6 Dr. 45 Gr. S. = 8 Unzen.

Payssé weicht in den quantitativen Verhältnissen etwas ab, und fand auch noch Eiweißstoff. Schrader untersuchte auch die gerösteten Kaffeebohnen. Beim Rösten schwellen die Kaffeebohnen auf, und verlieren an Gewicht (auf 2 Unzen 2—3 Drachmen). So wie die Bohnen anfangen braun zu werden, dringt das in ihnen enthaltene Oel auf die Oberfläche, es entwickelt sich ein sehr angenehmer aromatischer Dunst; auch zeigt der Aufguß jetzt einen angenehmen aromatischen Geschmack ohne Bitterkeit, welcher sich jedoch bei zu lange fortgesetztem Rösten in einen empyreumatischen und stark bittern verwandelt. Das über gebrannte Kaffeebohnen destillirte Wasser reagirt sauer, die Kaffeesubstanz ist nun mehr braun geworden und zieht auch die Feuchtigkeit aus der Luft stärker an. Schrader erhielt aus 8 Unzen gerösteter Bohnen: Kaffeesubstanz 1 Unze; Extractivstoff 3 Dr. 4 Gr.; Gummi und Schleim 6 Dr. 40 Gr.; Oel und Harz 1 Dr. 20 Gr.; trocknen Rückstand 5 Unzen 4 Dr.; Verlust 16 Gr. S. = 8 Unzen.

Die Entstehung des angenehm gewürzhaften Bestandtheils, den Schrader für eine flüchtige Säure hielt, ist wohl vorzüglich einer Veränderung der Kaffeesubstanz zuzuschreiben, welche hier eine ähnliche Veränderung erlei-

det, als das Osmazom beim Braten des Fleisches, wozu auch die anderen Bestandtheile, z. B. das talgartige Oel, mitwirken möchten.

Seguin (Trommsd. N. J. 1. 2. 1817. S. 98.) entdeckte das Kaffeegrün, und erklärte es für eine Verbindung des Eiweißes mit dem Kaffeestoffe. Als ein kalt bereiteter concentrirter Auszug der gemahlenen ungebrannten Kaffeebohnen von bräunlicher Farbe ins Kochen gebracht wurde, so änderte er seine Farbe in dunkelgrün um, und es sonderten sich eine Menge grünlichgrauer Flocken aus, die gesammelt und wohl ausgewaschen sich wie Eiweiß, ohne Zweifel mit etwas Kaffeestoff innig verbunden, verhielten. Beim Abrauchen schied sich eine neue Menge dieses Eiweißes ab. Die Säuren und Alkohol schlagen gleichfalls solche Flocken nieder. Auch der mit Alkohol ausgezogene Kaffee theilt dem Wasser die grüne Farbe mit, die gleichfalls die Verbindung des Eiweißes mit dem Kohlenstoffe enthält. Daß dem wirklich so sey, fand Seguin dadurch bestätigt, daß, als er gelben Kaffeestoff mit vollkommen weißem Eiweißstoffe zusammenrieb, die Mischung eine bouteillengrüne Farbe annahm, die an der Luft noch dunkler wurde. Gießt man Kalkwasser in den kalt bereiteten wäßrigen Auszug, so entsteht ein grünlicher Niederschlag, der aus Kalk, Kaffeestoff und Eiweißstoff besteht. Seguin untersuchte auch die Veränderungen, die der Kaffee durch das Brennen erleidet. Es vernichtet nach ihm einen großen Theil des Eiweißes, vermehrt verhältnißmäßig die Menge des Kaffeestoffes, dehydrogenirt denselben zum Theil, und verstärkt dadurch seinen Geschmack, macht ihn auch in Alkohol weniger auflöslich. Der durch die Hitze zerstörte Eiweißstoff ist auch die Ursache, warum die gebrannten Kaffeebohnen nicht mehr jenes merkwürdige Grün entwickeln, und der Aufguß derselben nicht mehr die grünen Flocken, durch Säuren und Alkohol gerinnbar, zeigt.

Brugnatelli (Trommsd. J. XXV. 2. 1816. S. 282.) bestätigte Seguin's Beobachtungen über das Kaffeegrün, als eine innige Verbindung des Kaffeestoffes mit dem Eiweiße. Der Aufguß und die Abkochung des rohen Kaffees färben sich mit Eiweiß versetzt in einigen Stunden grün. Eben so bringt der Alkohol, den man 8 Tage hindurch mit rohem Kaffee in Berührung gelassen hat, und der kaum etwas gelblich gefärbt ist, Eiweiß zum Gerinnen, und nach einigen Stunden bekommt die Tinctur und das Eiweiß eine schöne smaragdgrüne Farbe. Kaffeebohnen, welche man in rothes Menschenblutserum legt, schlagen nach einigen Stunden den färbenden Theil sehr hellroth nieder, und das überstehende Serum bekommt eine schöne grüne Farbe. Ammoniak mit Kaffeebohnen in Berührung färbt sie gelb und immer gesättigter; verdunstet das Ammoniak an der Sonne, so wird die Flüssigkeit schön grün.

Runge (Neueste phytochemische Entdeckungen 1ste Lieferung. S. 144.) hat auf seine Weise den Kaffee behandelt. Er schüttelte die Bohnen mit kaltem Wasser, schlug den filtrirten Auszug erst durch Bleizucker, dann durch Bleiessig nieder und zersetzte den Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas. Aus der überstehenden Flüssigkeit will Runge durch Abrauchen und Wieder-

auflösen in Alkohol zwei besondere Säuren erhalten haben. Die Base, mit welcher die Säuren verbunden gewesen waren, mußte sich bei der aus dem essigsauren Blei freigewordenen Essigsäure befinden, und wirklich erhielt Runge, nach Entfernung des überschüssig zugesetzten Bleies durch Schwefelwasserstoffgas, durchs Verdampfen und nach dem Erkalten eine krystallinisch geronnene Masse, die in der Wärme wieder schmolz, und ganz eingetrocknet eine bröckliche Substanz darstellte, die man, um das Fremdartige abzusondern, mit Alkohol digerirte, der die (essigsaure) Kaffeebase aufnimmt, und durch langsames Verdunsten dieselbe in der Form von farblosen krystallinischen Blättchen zurückläßt.

Giese (Schweigg. J. N. R. 1. S. 208.), der diese Base gleichfalls aus der essigsauren Auflösung darstellte, bemerkt, daß sie ein essigsaures Alkaloid sey, das in über einen Zoll langen, sehr feinen, aus einem Mittelpunkte auslaufenden Spießchen anschieße, einen bittern etwas kaffeeartigen Geschmack habe, und zum Theil verflüchtigt werden könne. Schwefelsäure und Salzsäure entwickeln daraus die Essigsäure. Aus der essigsauren Auflösung wird das Alkaloid durch Kali als eine in Wasser und Weingeist schwer lösliche Substanz abgeschieden. Nach Runge soll dagegen die (noch essigsaure) Kaffeebase weder stechend, noch bitter, sondern süßlich herb und ekelhaft schmecken, einen eigenthümlichen eckelhaften Geruch haben, in Aether auflöslich seyn, aus seiner wäßrigen Lösung durch Ammoniak und Kalkwasser in weißen Flocken gefällt werden, farblos, nicht flüchtig, krystallinisch seyn, bei der Hitze des siedenden Wassers in eine bittere Substanz verwandelt werden, und in der Volta'schen Säule zum negativen Pole gehen u. s. w.

Die beiden Kaffeesäuren konnten nicht krystallinisch und weiß dargestellt werden. Die eine, die schon durch den gewöhnlichen Bleizucker niedergeschlagen wird, gab mit der salzsauren Eisenauflösung eine intensiv grasgrüne Färbung, nahm mit Aetzkali eine gelbe und mit Ammoniak eine gelbgrüne Farbe an, fällte auch in sehr geringem Grade den thierischen Leim und das Eiweiß. Die zweite Kaffeesäure, durch das basische essigsaure Blei fällbar, kommt fast in allen Eigenschaften mit der ersteren überein, und die kleinen Abweichungen hängen wahrscheinlich von einer geringen Beimischung eines andern Stoffes ab. Wenn die mit kaltem Wasser wiederholt ausgezogenen Kaffeebohnen mit Wasser ausgekocht werden, so bekommt man eine grünliche Flüssigkeit, die weder Geruch noch Geschmack hat, beim Verdampfen noch intensiver grün wird, die Ursache des Grünwerdens der Bohnen an der Luft, und die schon erwähnte Eigenschaft besitzt, dem Eiweiß an der Luft nach einigen Stunden eine intensiv grüne Farbe zu ertheilen. Diese Substanz nennt Runge die grüne Kaffeefarbe, wofür Pfaff den passenden Namen: „das grünfärbende Pigment der Kaffeebohnen" wählt. Auf die Eisenauflösungen reagirte jene Flüssigkeit wie die Kaffeesäure.

Die französischen Chemiker Robiquet, Pelletier und Caventou haben, ohne von den früheren Arbeiten der deutschen Chemiker Notiz zu nehmen, den Kaffeestoff gleichfalls dargestellt, ihn Coffein genannt und ge-

nauer untersucht. Nach der Entdeckung des Chinins suchten diese Chemiker in dem im natürlichen Systeme der China so nahe stehenden Kaffee nach einem ähnlichen Alkaloid. Von Robiquet ist keine besondere Abhandlung erschienen, und seiner Arbeit ist nur im Dictionnaire de médecine erwähnt. Pelletier und Caventou (Geiger's Magazin, Juli 1826. S. 66.; Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 75. und Trommsd. N. J. XIII. 2. S. 124.) stellten gleichzeitig das Coffeïn dar, wobei folgendes Verfahren beobachtet wurde. Die nicht gerösteten Kaffeebohnen werden mit Alkohol ausgezogen, die geistigen Auszüge verdampft, das Extract mit Wasser ausgezogen, mit gebrannter Magnesia erhitzt, aus dieser das Coffeïn mit vielem Wasser wieder ausgewaschen, wieder verdunstet, wobei besonders gegen das Ende die Wärme sehr gelind seyn muß, das Extract nun mit Alkohol ausgezogen, welcher das Coffeïn ohne die gummigen ꝛc. Theile aufnimmt, und woraus, nachdem die Auflösung durch gereinigte thierische Kohle filtrirt worden, es krystallinisch erhalten werden kann. Da das Coffeïn nicht, wie sie früher glaubten, alkalische Eigenschaften zeigt, so begünstigt hier die Magnesia die Arbeit nur durch ihre Affinität zum färbenden Stoffe. Garrot (Geiger's Magazin u. Trommsd. N. J. ebend.) wendet das schon von Runge befolgte Verfahren an; er extrahirt nämlich den zerkleinerten Kaffee zweimal mit kochendem Wasser, präcipitirt mit neutralem essigsaurem Blei, entfernt das überschüssige aus der filtrirten Flüssigkeit durch Hydrothiongas, sättigt die Säure mit Ammoniak, concentrirt die Flüssigkeit durch Abdampfen, worauf das Coffeïn herauskrystallisirt, und durch Umkrystallisiren gereinigt wird.

Aus concentrirten Lösungen krystallisirt das Coffeïn in weißen, seidenartigen, biegsamen undurchsichtigen Nadeln; es ist in kaltem Wasser wenig, bedeutend in kochendem, auch in Alkohol auflöslich, in Säuren löst es sich zwar auf, sättigt diese aber nicht, verhält sich also gegen dieselben indifferent; es ist flüchtig. Hinsichts seiner Zusammensetzung ist es das seltsamste; es ist nämlich die stickstoffreichste vegetabilische Substanz, die bekannt ist, und enthält selbst mehr Stickstoff, als mehrere thierische Substanzen. Nach einer Zerlegung von Dumas nnd Pelletier (Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 122. und Schw. N. J. X. 1. S. 95.) besteht es aus: Kohlenstoff 46,51; Stickstoff 21,54; Wasserstoff 4,81 und Sauerstoff 27,14. S. = 100.

Als Bestandtheile der Kaffeebohnen sind demnach anzusehen: 1) Coffeïn; 2) eine Säure, welche von Einigen als eine eigenthümliche Säure, von Andern als Gallussäure angesehen wird; 3) ein geruchloses Oel, etwas Harz, Eiweiß, Gummi, Faserstoff ꝛc.

Die rohen Kaffeebohnen sind auch in den medicinischen Gebrauch gezogen worden, zum Theil im concentrirten Aufgusse, als tonisches Mittel, gegen Gift u. s. w.; im gepulverten Zustande standen sie eine Zeitlang als fiebervertreibendes Mittel in großem Ansehen. Da sie, wie schon erwähnt, schwer zu pulvern sind, so müssen sie zu diesem Zwecke mit soviel Wasser, daß sie bedeckt sind, übergossen, dann zum Sieden erhitzt, und nun in gelinder Wärme unter stetem Umrühren beinahe ganz ausgetrocknet werden, welches nach-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0352-2

her völlig in einem gelind erwärmten Ofen geschieht. Die Bohnen haben jetzt eine hellgrüne Farbe, und lassen sich leicht zu Pulver stoßen.

Der Gebrauch der gebrannten Kaffeebohnen ist in Constantinopel schon im Jahr 1554 bekannt gewesen, und im folgenden Jahrhundert im übrigen Europa eingeführt. Er ist ein die Nerven mächtig aufregendes Mittel, und ein vorzügliches Gegengift aller narkotischen Pflanzengifte, namentlich des Kirschlorbeerwassers, des Mohnsaftes, Bilsenkrautes u. s. w. Als Kaffeesurrogat sind die Cichorienwurzeln allgemein bekannt, nach Trommsdorff's (Taschenbuch 1826. S. 35.) Analyse und Vorschlag würde aber der Saame des Astragalus baeticus hierzu sehr anwendbar seyn.

* Colchicum. Die Wurzel. Zeitlosenwurzel.

Colchicum autumnale Linn. Die Herbstzeitlose.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. III. Ord. 6. Colchiceae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst fast durch ganz Europa, und in sehr vielen Gegenden Deutschlands auf feuchten Wiesen und in Gärten, wo sie auch zur Zierde gezogen wird.

Die Blätter, die nur im Frühling und im Sommer vorhanden sind, entspringen unmittelbar aus der Wurzel, sind meistens zu 3—4 vereinigt, groß, lancettförmig, von schön grüner Farbe, 6—10 Zoll lang und 1 Zoll breit. Die blaßrothen Blumen bestehen aus einer langen Röhre, die aus der Zwiebel hervorkommt, und sich in eine glockenförmige Mündung endigt, welche 6 tiefe Einschnitte hat. Staubfäden und Griffel ragen über die Röhre hervor. Die Blumen erscheinen allein bei Annäherung des Herbstes, in den Monaten August und October, und erst im folgenden Frühjahr entwickeln sich die Blätter, und dann erst erscheint zwischen diesen die Frucht, welche in einer großen dreifächerigen, dreiklappigen Kapsel besteht, die viele kleine runde runzlige Saamen enthalten. In den Gärten findet man diese Pflanze auch mit gefüllten und mit weißen Blumen, und die Frühlingszeitlose (Colchicum vernum) ist nur eine Varietät derselben.

Die Wurzel ist eine eiförmige oder rundliche, etwas zusammengedrückte, an ihrem Grunde mit Wurzelfasern versehene, fleischige, saftige Zwiebel von der Dicke eines Daumens. Sie ist außerhalb gelblich und mit einer besondern, doppelten, äußerlich lederartigen, braunen, innerlich dünnen, blassen, glänzenden Haut umgeben, inwendig ist sie weiß. Ihr Geschmack ist mehlig, scharf-bitterlich, der Geruch widerlich. Die Zwiebel, welche die Blumen und Früchte getragen hat, stirbt jedes Jahr ab, und wird durch eine andere ersetzt, die sich ihr zur Seite bildet, und da diese Verjüngung immer auf derselben Seite vor sich geht, so entfernt sich die Pflanze jedes Jahr um ihre Zwiebeldicke, oder ungefähr um einen Zoll, von ihrem Standorte. Zum medicinischen Gebrauche muß also die frische Zwiebel im Anfange des Sommers eingesammelt, und die alte welke Zwiebel weggeworfen werden. Sie ist nur im frischen Zustande als ein wirksames Arzneimittel anzusehen, da durch das

Trocknen viel von der Schärfe verloren geht. Getrocknet ist sie von der Größe einer Kastanie, auf der einen Seite convex mit einer Narbe von dem Stengel, auf der andern der Länge nach ausgehöhlt, gleichförmig gefurcht, ohne Geruch, aber noch von etwas scharfem Geschmacke.

Hinsichtlich der Jahreszeit, in welcher die Zeitlosenwurzel am kräftigsten seyn soll, herrscht eine auffallend verschiedene Meinung. Viele wollen sie im Herbste ganz geschmack- und kraftlos gefunden haben, und es wurde daher ziemlich allgemein die größere Wirksamkeit der Wurzel im Frühjahre angenommen. Stoltze (Berl. Jahrb. 1818. S. 107. und 1819. S. 135.) fand gerade im Gegentheil, daß die Anfangs October ausgegrabene Wurzel kräftiger, als die Ende März ausgegrabene war.

Das bei der von Stoltze unternommenen Analyse über frische Wurzel abgezogene Wasser war schwach opalisirend, roch stark rettigartig, schmeckte etwas scharf, zeigte aber mit keinem Reagens eine Veränderung. 16 Unzen frischer Wurzel, Ende März ausgegraben, von den braunen Häuten befreit, waren zusammengesetzt aus: Wasser 12 Unzen 7 Drachmen 44 Gran; Stärke 1 Unze 1 Dr. 33 Gr.; krystallinischem Zucker 31 Gr.; süßem mit etwas bitterm verbundenen Extractivstoffe 7 Dr. 34 Gr.; schwerlöslichem Extractivstoffe 1 Dr. 40 Gr.; weichem Harze 3 Gr.; durch Kali ausgezogenem extractivartigem Stoffe 1 Dr. 2 Gr.; Pflanzenfaser 2 Dr. 58 Gr.; Verlust 8 Gran. S. = 16 Unzen.

16 Unzen frischer, Anfangs October gesammelter Wurzel bestanden aus: Wasser 12 Unzen 6 Dr. 48 Gr.; Stärke 1 Unze 4 Dr. 57 Gr.; krystallinischem Zucker 9 Gr.; Schleimzucker 3 Dr. 28½ Gr.; bitterm Extractivstoffe 2 Dr. 47 Gr.; schwerlöslichen Extractivstoffe 40 Gr.; weichem Harze 4½ Gr.; durch Kali ausgezogener extractartiger Substanz 39½ Gr.; traganthähnlichem Stoffe 2 Dr. 7 Gr.; Wurzelfaser 2 Dr. 4 Gr.; Verlust 15½ Gr. S. = 16 Unzen.

Der wäßrige Weingeist ist dieser Analyse zufolge ein sehr gutes Lösungsmittel der in der Wurzel vorhandenen wirksamen Bestandtheile, und zwar erhält man eine sehr wirksame Tinctur aus einem Theile frischer (nach Stoltze) im Herbste gesammelter, zu einem Breie zerriebener Wurzel mit 8 Theilen Weingeist von 60 Procent, gelinde digerirt und filtrirt. Der Zeitlosenessig könnte eben so bereitet werden. Den Zeitlosensauerhonig räth St. nicht zu kochen, wegen der flüchtigen Bestandtheile, sondern 1 Th. Zeitlosenessig mit 2 Th. festem weißen Honig zu mengen. Daß also ein aus der getrockneten Wurzel bereiteter Zeitlosenessig noch weniger wirksam seyn könne, leuchtet ein.

Pelletier und Caventou (Schweigg. N. J. I. 2. S. 172. fanden in der Zeitlosenwurzel: eine fette Materie, zusammengesetzt aus Elaïne, Stearine und einer flüchtigen Säure; saure gallussaure Veratrine (ein in den Colchiceen, als **Helleborus albus, Sabadilla etc.** von ihnen aufgefundenes Alkaloid); gelbe färbende Materie, Gummi, Stärkemehl, Inulin in Menge und Faserstoff.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0354-3

Nach Thomson soll die Wurzel Kleber enthalten, und davon die Eigenschaft derselben abhangen, die Guajaktinctur blau zu färben, welche sie verliert, wenn sie zu stark getrocknet wird, wegen der Zerstörung des Klebers.

Von Copland (Gerson und Julius Magazin 1823. 2. S. 308.) werden die frischen und auch die getrockneten Blumen für den wirksamsten und zugleich mildesten Theil der Pflanze erklärt.

Die Herbstzeitlose ist ein kräftiges Mittel gegen Gicht und Rheumatismus.

* Colchicum. Der Saame. Zeitlosensaame.

Die Saamen der Herbstzeitlose sind klein, rundlich, frisch weiß, getrocknet gelbbräunlich, durch einen ringsum gehenden Wulst gleichsam in zwei Hälften getheilt, von einem etwas bitterlichen nicht scharfen Geschmacke.

Der Saame soll noch wirksamer seyn, als die Wurzel, denn er scheint nicht nur weniger unwirksame Nebenbestandtheile als die Wurzel zu enthalten, sondern auch, im reifen Zustande eingesammelt, immer von gleicher Beschaffenheit zu seyn. Ein weiniges Infusum von dem Saamen empfiehlt sich durch seine Wirksamkeit und durch leichte Anwendung.

Colocynthis. Die Aepfel. Koloquinte.

Cucumis Colocynthis Linn. Eine einjährige orientalische Pflanze.

Die von der äußeren Rinde gereinigte Frucht, von der Größe und Gestalt eines Apfels, weißliche Saamen in einem weißen, leichten, schwammigen, sehr bittern Marke einschließend.

Cucumis Colocynthis Linn. Die Koloquintengurke.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Syngenesia.
Juss. Cl. XV. Ord. 2. Cucurbitaceae.

Das Vaterland der Koloquinte ist Syrien und die Inseln des Archipels; auch soll sie an dem Vorgebirge der guten Hoffnung gefunden werden.

Aus einer einjährigen, aber starken und fleischigen Wurzel kommen mehrere niederliegende, rankende, krautartige Stengel hervor. Diese Stengel sind rund, und mit kurzen, steifen, weißen Haaren besetzt. Die Blätter sind abwechselnd, langgestielt, herzförmig, stumpf zugespitzt, am Rande in längliche, stumpfe, buchtig-gezahnte Lappen getheilt, und auf beiden Flächen, so wie die Blattstiele, mit sehr rauhen kurzen Haaren bekleidet. Den Blättern gegenüber entspringen lange, ästige, fadenförmige, behaarte Ranken (cirrhi). Die Blüthen sind einhäusig; der Kelch fünfspaltig, blaßgrün; die Blumenkrone noch einmal so lang als der Kelch, und an der Basis mit demselben verwachsen; die Krone einblättrig, glockenförmig mit länglichen, stumpfen, blaßgelben Abschnitten. Die Frucht ist eine gelbe runde Kürbisfrucht. Die Fruchtschale ist fast lederartig, glatt, das Mark trocken, schwammig, weiß und enthält zahlreiche ovale zusammengedrückte Saamen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0355-9

Wir erhalten diese Frucht ohne die äußere gelbe Fruchtschale, so daß nur an einzelnen Stellen eine Spur derselben übrig ist. Die Wirksamkeit ruht in dem Marke, welches äußerst bitter, scharf und widrig schmeckt, und einen schwachen, süßlichen, ekelhaften Geruch hat. Die ziemlich großen, sehr weißen, noch unversehrten, recht trocknen Koloquinten sind vorzuziehen.

Pfaff (Syst. der Mat. med. VII. S. 183.) warnt vor einer Frucht, die den Koloquinten untergeschoben werden könnte. Sie scheint nach ihm von einer verwandten Art Cucumis abzustammen. Die Früchte haben die Größe von kleinen Exemplaren der Koloquinten, sind aber von außen allenthalben mit ovalen Erhabenheiten umgeben, die von der Hervorragung der Saamen herrühren, und regelmäßige Zonen bilden; sie sind licht-gelbbraun, haben wenig Mark im Innern, kommen aber an Geschmacke und dem chemischen Verhalten nach fast ganz mit der ächten Koloquinte überein.

Wasser und Weingeist lösen aus den Koloquinten eine sehr bittere Materie auf, und die Lösung erhält eine schwache gelbe Farbe. In diesem bittern Princip liegt die ganze Wirksamkeit der Koloquinte. Aus Meißner's Analyse (Trommsd. N. J. II. 1. 1818. S. 22.) ergaben sich folgende Bestandtheile in 200 Gran Koloquinten: fettes Oel $8\frac{1}{2}$; Hartharz (bitteres) $26\frac{1}{2}$; bitterer Extractivstoff $28\frac{5}{6}$; thierisch-vegetabilische Materie $1\frac{1}{6}$; Extractivstoff (von scharfem, eigenthümlichem, extractartigem Geschmacke, ohne auffallende Bitterkeit, in Wasser und nur in sehr verdünntem Weingeiste auflöslich) 20; Gummi 19; gummiger Extractivstoff 34; Traganthstoff 6; phosphorsaurer Kalk $5\frac{1}{4}$; phosphors. Bittererde 6; Faser $38\frac{1}{2}$; Feuchtigkeit 10. S. = $203\frac{3}{4}$. Braconnot stellte reines Koloquintenbitter dadurch dar, daß er das Mark wiederholt mit Wasser auskochte, zur Trockne abdampfte, mit Weingeist wiederholt auszog, wo das Gummi zurückblieb, den Weingeist verdampfte, den Rückstand mit Wasser auszog, wo das Harz zurückblieb, die wäßrige Lösung wieder abdampfte, dieses Extract mit wenigem Wasser behandelte, wobei sich essigsaures Kali löste; der Rückstand war nun reines Koloquintenbitter.

Wenn man nach Vauquelin (Berl. Jahrb. XXVII. 1. S. 174.) das geistige Extract mit Wasser übergießt, so theilt es sich in zwei Theile, in einen löslichen und einen andern, anfangs aus weißen durchsichtigen Fäden bestehenden, welche nach der Vereinigung eine gelbliche halb durchsichtige und gleich einem weichen Harze dehnbare Masse bilden. Setzt man die hierbei erhaltene wäßrige Lösung der Hitze aus, so wird sie augenblicklich getrübt, und es scheiden sich auf der Oberfläche und am Boden des Gefäßes gelbe Tröpfchen aus, welche einem geschmolzenen Harze gleichen. Läßt man die Tröpfchen erkalten, so erhärten sie und werden zerbrechlich. Wird die davon geschiedene Flüssigkeit wieder erhitzt, so trübt sie sich aufs neue und verhält sich auf dieselbe Weise, bis sie fast ganz verdampft ist.

Die Materie, welche das Wasser nicht gelöst, könnte, wenn man bloß die ersten Versuche in Betracht zöge, für ein Harz gehalten werden, sie ist aber ganz dieselbe, welche gelöst und durch die Hitze niedergeschlagen wurde.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0356-5

Wirklich löst sie sich auch in einer hinreichenden Menge Wasser vollständig auf, und diese wenig gefärbte Lösung trübt sich auch beim Erhitzen, jedoch geringer, als das erstemal. Hieraus ergiebt sich die Vermuthung, daß die beträchtliche Lösungsfähigkeit des ersten Antheils Wasser von einer in dem Extracte vorhandenen Säure herrührt, die dieselbe befördert. Dieses Product enthält zugleich eine gelbbraune extractartige Materie, denn die erste Lösung ist weit stärker gefärbt, als die zweite, und auch nach dem Eintrocknen liefert diese zweite Lösung ein helleres Product als die erste. Wirklich geben auch, wenn man durch wiederholte Verdampfungen die harzähnliche Materie abgeschieden hat, die letzten Antheile Flüssigkeit einen Rückstand, der sich in einer sehr kleinen Menge Wasser ohne Rückstand löst. Dieses Extract hat einen der schwerlöslichen Materie ähnlichen, aber schwächern bittern Geschmack. Die harzähnliche Materie ist nicht sehr löslich in Wasser; die Auflösung wird durch Galläpfelaufguß gefällt, aber nicht, was sehr merkwürdig ist, durch essigsaures Blei. In der Wärme entwickelt sie einen bitter schmeckenden Rauch, und läßt wie die Harze eine sehr voluminöse leichte Kohle zurück. In Salpetersäure löst sie sich ohne Rückstand unter Zersetzung der Säure schnell auf. Wenn man aber, bevor die Einwirkung der Säure beendet ist, Wasser dem Gemenge zusetzt, so fällt ein Theil der Materie in weißen sehr bittern Flocken daraus nieder. Es ist schwer, sie durch Salpetersäure zu zerstören.

Diese Substanz, welche vorzüglich die starke Bitterkeit besitzt, wird von Vauquelin für eine eigenthümliche gehalten, und mit dem Namen Colocynthin belegt. Es ist löslich in Weingeist, weniger löslich in Wasser, dem es jedoch eine ausnehmend starke Bitterkeit mittheilt, und die letzte Lösung schäumt beim Schütteln, so schwach sie auch ist, wie Gummiwasser. Durch Galläpfel wird sie weiß gefällt, und diese Verbindung ist nur sehr wenig löslich.

(Die sonst sich findende Uebereinstimmung in den Gliedern einer Pflanzenfamilie wird bei den Cucurbitaceen auf eine auffallende Weise vermißt. Die Melone und Wassermelone sind süß; der Kürbis, der runde Kürbis und die Gurke sind fast geschmacklos; der Eselskürbis, die Zaunrübe und Koloquinte sind bitter und drastisch.)

Den angeführten Analysen zufolge ist der geistige Auszug der Koloquinten die zweckmäßigste Zubereitung. Außerdem kommen sie auch als **Colocynthis praeparata** (siehe den 2. Theil) zu manchen drastischen Purgirmitteln, immer erfodern sie aber, eben ihrer drastischen Wirkung wegen, große Vorsicht.

Colombo. Die Wurzel. Colombowurzel.

Menispermum palmatum Lamarck. seu Cocculus palmatus De Candoll. Eine zweihäusige Pflanze des östlichen Afrikas.

Die in die Quere in Scheiben geschnittene, außen bräunliche, runzlige, innen grünlichgelbe, aus (Rinden-) Ringeln zusammengesetzte Wurzel, in dem mittlern Parenchym sehr faserige Holz-

bündel enthaltend, von einem sehr bittern Geschmacke und etwas gewürzhaftem Geruche. Die von Würmern durchbohrten müssen verworfen werden.

Menispermum palmatum Lam. Der handförmige Mondsaame.
Cocculus palmatus De Cand.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 10. Dodecandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 10. Menispermeae.

Diese Pflanze wächst in den Küstenländern von Ostafrika, besonders in den schattigen dicken Wäldern von Mozambique.

Die rankenden, windenden, einfachen Stengel sind einjährig, lang, rauchhaarig und von der Dicke einer Gänsefeder. Die Blätter sind beinahe rund, am Grunde etwas herzförmig, die kleinen aufsitzenden Blümchen stehen in zusammengesetzten Trauben in den Winkeln der Blätter.

Die Wurzel perennirt. Von der stark faserigen und unwirksamen Stammwurzel werden nur die Wurzelansätze von hinreichender Größe in der trocknen Jahreszeit ausgegraben. Die Eingebornen treiben damit beträchtlichen Handel nach Trankebar und andere Orte europäischer Besitzungen in Ostindien. Die Portugiesen bringen sie von Mozambique, auch kommt sie von der Insel Ceylon (Hauptstadt Colombo) nach Europa.

Im Handel erhalten wir die Colombowurzel in runden Scheiben von 1—3 Zoll Breite und überhaupt von ungleicher Dicke und Größe. Auch findet man darunter runde, kleinere oder größere, längliche Stücke, die wahrscheinlich von den dünneren Enden, den dünneren Wurzelansätzen herkommen, mehr bitter und gewürzhaft schmecken, und für kräftiger gehalten werden als die Scheiben. Außen sind diese sowohl als jene mit runzliger, brauner oder braungrünlicher, 1—2 Linien dicker, innen hellgelblicher Rinde bedeckt. Die beiden Flächen sind ungleich, runzlig, gelb oder gelbgrünlich, strahlenförmig gestreift, und durch schwärzliche, kreisförmige Linien auf denselben erscheint der holzige, dichtere Theil der Wurzel von der Rinde und von dem den Mittelpunkt einnehmenden, zusammengeschrumpften, weicheren, schleimigen, mehligen Marke geschieden. Dickere Stücke findet man, vielleicht des Trocknens wegen, mit kleinen Löchern durchbohrt. Der Geruch ist schwach, dem Mutterkümmel etwas ähnlich; der Geschmack stark anhaltend bitter, etwas aromatisch und schleimig. Die Wurzel ist sehr dem Wurmfraße unterworfen, und verliert in freier Luft ihre Kräfte. Sie muß daher in einem wohl verschlossenen Glase aufbewahrt werden.

Das Pulver ist gelbgrünlich, zieht an der Luft Feuchtigkeit an und wird unwirksam.

Stolze (Berl. Jahrb. 1820. S. 481.) machte auf eine unächte amerikanische Colombowurzel aufmerksam, die ihrer Form nach ganz mit der ächten übereinkommt, nur finden sich mehr der Länge nach zerschnittene Stücke als scheibenförmige vor. Aeußerlich ist sie hellbraun, innerlich weißlichgelb, gepulvert hellgelb; sie ist innerlich auch nur aus zwei Schichten zusammen-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0358-7

gesetzt, die durch keine schwarzen Linien getrennt sind. Ihr Geruch ist zwischen dem des Liebstöckels und der Pimpinelle innestehend, der Geschmack Anfangs süßlich, später bitterlich und etwas nauseös. Guibourt (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 191.) beschreibt wahrscheinlich dieselbe Wurzel, die in Frankreich unter dem Namen Colombo von Afrika so häufig vorkomme, daß fast keine andere Wurzel zu haben sey.

Der concentrirte wäßrige Aufguß der ächten Colombowurzel ist schmutzig bräunlichgelb, ins Grüne sich ziehend, bleibt trübe, auch wenn er durch feines Seihepapier filtrirt wird, hat einen etwas widrig und stark bittern Geschmack, und den eigenthümlichen nicht ganz angenehmen Kümmelgeruch der Wurzel. Die oxydirten Eisensalze erhöhen die Farbe des Aufgusses, und ein lockerer röthlicher Niederschlag setzt sich ab. Galläpfeltinctur macht einen mehr oder weniger reichlichen weißgelben Niederschlag; mit essigsaurem Blei, oxydulirtem salpetersauren Queckſilber und oxydulirtem salzsauren Zinn erfolgen reichliche flockige Niederschläge. Laugensalze stumpfen die Bitterkeit ab, und heben sie fast ganz auf, wobei die Flüssigkeit durchsichtiger und die Farbe verstärkt wird. Durch Säuren wird die Bitterkeit eher erhöht, besonders durch Essig. Der Aufguß geht in warmen Tagen bald in Verderbniß über, überzieht sich mit einer zähen Haut, setzt Bodensatz ab, wird zähe und schal.

Pfaff erhielt durch bloßes Ausziehen mit kaltem Wasser aus vier Unzen Wurzel 5 Quentchen und 9 Gran eines schwärzlich braunen, in hohem Grade widrig bittern und unangenehm riechenden gleichförmigen Extractes. Der Alkohol zieht eine rothbräunlich-gelbe trübe Tinctur aus, die durch Wasser nicht getrübt wird, und beim Abdampfen eine braungelbe Masse von stark bitterm, gelind balsamisch scharfem Geschmacke und einem angenehmen balsamischen Geruche zurückläßt.

Nach einer Analyse von Planche (Trommsd. J. XXII. 2. S. 158.) enthalten 100 Th.: ätherisches Oel, Spuren; bittern gelben Extractivstoff 13; thierisch-vegetabilische Materie 6; Stärkemehl 33; Schleim 9; holzigen Rückstand 39. S. = 100. Das schnelle Verderben der Abkochung und des Extractes, wenn es nicht zur Trockne abgeraucht ist, rührt demnach von dem großen Antheile Stärkemehl und Schleim her.

Buchner (Repert. XXIV. 2. 1826. S. 257.) bemerkt, daß der gelbe bittere Bestandtheil der Colombowurzel nicht nur in Wasser und Alkohol, sondern auch in Aether auflöslich ist, und aus der wäßrigen Auflösung des geistigen Extractes durch essigsaures Blei nicht gefällt wird, woraus hervorzugehen scheint, daß er ebenfalls zu den Alkaloiden gehöre. Da die Mutterpflanze der Colombowurzel, eben so wie die der Kokkelskörner ein Menispermum ist, so steht zu vermuthen, daß auch in dieser Wurzel Pikrotoxin sich werde finden lassen. Für die starke Wirkung der Colombowurzel zeugt folgender Versuch, von Buchner angestellt: ein Gran von dem trocknen mit Aether ausgezogenen und durch Wiederauflösung in Wasser von dem wachsartigen Bestandtheile gereinigten Colomboextract wurde einem Kaninchen in eine Wunde gebracht und er bewirkte nach 10 Stunden den Tod.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0359-5

Man giebt die Colombowurzel in Pulverform, im wäßrigen, auch weinigen Aufgusse, in der Abkochung und im Extract, wenn es zugleich um die schleimigen Theile zu thun ist. Der Aufguß der Colombo hat die merkwürdige Eigenschaft, den Geruch verdorbener Galle zu verbessern, und wirklich ist sie auch besonders heilsam in Gallenkrankheiten, vorzüglich in solchen, welche von der Ergießung einer sehr reizenden und einigermaßen zur Fäulniß hinneigenden Galle herrühren, z. B. in der Gallenruhr.

Colophonium. Geigenharz.

Wird aus dem Harze von Pinus sylvestris Linn., einem Baume des nördlichen Europas bereitet.

Ein festes, zerreibliches, etwas durchscheinendes Harz, von bernsteingelber oder pomeranzengelber Farbe.

Die Harze kommen vorzüglich im Pflanzenreiche, selten im Thierreiche oder Mineralreiche vor. Sie kommen entweder schon durch die Natur von den Pflanzen ausgeschieden und erhärtet vor (und viele von diesen hießen früher Gummi), oder sie werden durch Verflüchtigung des ätherischen Oeles aus natürlichen Balsamen bereitet. Die Harze werden fast bloß in perennirenden Pflanzen, besonders im Holze und der Rinde sehr vieler Bäume, aber auch in der Wurzel, in den Blättern und in den Saamenbehältern angetroffen, aus welchen Theilen sie zum Theil von selbst ausfließen, zum Theil durch Weingeist oder Aether ausgezogen werden können.

Die natürlichen Balsame und die Harze sind als aus dem ätherischen in den Pflanzen vorhandenen Oele unter Zutritt des Sauerstoffs der Luft gebildet anzusehen. Wir sehen diesen Erfolg bei den ätherischen Oelen, welche nicht völlig von der atmosphärischen Luft abgeschlossen, allmälig in einen dickflüssigen Zustand übergehen, und die natürlichen Balsame bilden, welche als Gemische von ätherischem Oele und Harz anzusehen sind, und bei fortwährendem Luftzutritte vollständig zu Harzen verhärten. Sauſſure erklärt diesen Erfolg dadurch, daß der Sauerstoff der Luft den ätherischen Oelen Kohlenstoff und Wasserstoff entziehe, mit dem ersteren Kohlensäure, mit dem zweiten Wasser bildend, welches letztere häufig mit dem erzeugten Harze in chemische Verbindung trete, so daß im Allgemeinen bei den ätherischen Oelen ein größerer Gehalt an Kohlen- und Wasserstoff, bei den Harzen aber ein größerer Gehalt an Sauerstoff angenommen werden könne. Auch die austrocknenden fetten Oele verändern sich an der Luft auf gleiche Art. Ob die durch Einwirkung der Salpeter- oder Schwefelsäure auf Weingeist, Aether, flüchtige Oele und Fette hervorgebrachten harzigen Substanzen zu den eigentlichen Harzen gezählt werden dürfen, scheint zweifelhaft, da die angewandte Säure immer in die harzige Verbindung einzugehen scheint; doch sehen wir, daß die Säuren zum Theil zersetzt, und eines Theils ihres Sauerstoffs beraubt werden, so daß auch hier der den Säuren entzogene Antheil

Sauerstoff die Bildung der Harze zu bedingen scheint, welche nun mit dem noch unzersetzten Theile der Säure eine Verbindung eingehen.

Als allgemeine Eigenschaften der Harze lassen sich folgende angeben. Sie sind bei der gewöhnlichen Temperatur entweder fest, hart und spröde, oder elastisch zähe oder weich, entweder schmierig, oder elastisch klebend, farblos oder gelb, braun oder anders gefärbt, durchsichtig oder durchscheinend, bis fast undurchsichtig. Das spec. Gew. ist dem des Wassers sehr nahe, zwischen 0,93 und 1,2, sie sind nämlich etwas leichter, meistens aber etwas schwerer als Wasser. Sie sind Nichtleiter der Elektricität, und werden durch Reiben elektrisch. Im reinen Zustande sind sie geruchlos (der Geruch der meisten Harze kommt von beigemischtem ätherischen Oele her), theils geschmacklos, theils bitter oder scharf schmeckend. In der Wärme werden sie weicher, schmelzen bei höherer Temperatur, ohne sich zu zersetzen, zu einer verschiedenen dicken, zähen, fadenziehenden Flüssigkeit, deren Consistenz die des geschmolzenen Fettes übertrifft, liefern bei der trocknen Destillation an flüchtigen Producten kohlensaures und viel Kohlenwasserstoffgas, und hinterlassen eine leichte, lockere, glänzende Kohle. An der Luft entzündet brennen sie für sich fort mit heller, stark rußender Flamme. Im Wasser sind sie unlöslich; mit den Alkalien bilden sie die Harzseifen. Auch einige Säuren, wie Schwefel-, Salz- und Essigsäure, lösen manche Harze auf. Weingeist und Aether sind die allgemeinen Auflösungsmittel.

Unverdorben (Trommsd. N. J. VIII. 2. S. 154.) hat die Ansicht aufgestellt, daß die Harze, als minus elektrische Körper, als im Wasser unauflösliche Säuren zu betrachten seyen; indessen läßt sich diese Ansicht keineswegs durchführen, da, wie wir das so häufig bei chemischen Verbindungen sehen, das Verhalten der Stoffe häufig durch den Gegensatz, mit welchem sie in Verbindung gesetzt werden, bestimmt wird. Wenn daher die Harze mit den Alkalien Verbindungen eingehen, und wir die Harzseifen auch als salzartige Verbindungen der (positiv elektrischen) Alkalien mit den (minus elektrischen) Harz (=säuren) ansehen wollen, so finden wir doch auch, daß, wie bereits erwähnt, manche Harze auch mit den Säuren Verbindungen eingehen, hier also gleichsam als Basen auftreten.

Bonastre (Trommsd. N. J. VIII. 1. S. 21.) sieht die Harze nicht als einfache Körper an, sondern als zusammengesetzt: 1) aus einem flüchtigen Oele; 2) aus einer Säure, die bald Benzoësäure, bald Bernsteinsäure, bald eine eigenthümliche Säure (wie im Elemi) sey; 3) aus einem wirklichen Harze, welches in kaltem Alkohol auflöslich ist; 4) aus einer harzartigen Substanz (Unterharz, sous-résine) und 5) aus bitterm Extractivstoffe, welcher einige Salze enthält. Den Unterharzen schreibt B. folgende Eigenschaften zu: a) sie enthalten kein ätherisches Oel; b) sie enthalten keine Säure, reagiren aber deshalb doch nicht alkalisch; c) sie sind nur in kochendem Weingeist, Aether und den ätherischen Oelen löslich; d) einige Arten haben die Eigenschaft, deutlich zu krystallisiren; e) sie saponificiren sich nicht mit kau-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0361-2

stischen Alkalien; f) einige haben die Eigenschaft, beim Erwärmen und Reiben im Dunkeln zu phosphoresciren.

Wenn nun auch das als Bestandtheil der Harze von Bonastre angeführte ätherische Oel und die Säure, zum Theil wenigstens (wie beim Bernstein), als Producte anzusehen seyn möchten, so scheint doch der Unterschied zwischen dem wirklichen Harze und der harzartigen Substanz, dem Unterharze, mehr begründet. Einige Harze bestehen ganz aus dem ersteren, andere enthalten dagegen nur sehr wenig davon, wie Mastix, Copal, welcher letztere, feingerieben und mit Aether übergossen, sein Volumen um 5 bis 6mal vermehrt, so daß die Mischung in Gestalt einer Gallerte oder eines dicken Schleimes erscheint; nur wenig wird vom Aether aufgelöst. Das meiste unauflösliche Harz aber enthält das Kaoutschuk, nämlich 94 Procent, daher dieses selbst in siedendem Alkohol sich unauflöslich zeigt, in der Kälte den Aether verschluckt, aufschwillt, und nur in geringer Menge sich auflöst. Zur Unterstützung seiner Ansicht führt Bonastre noch an, daß auch von andern Substanzen analogisch sich auf eine solche Zusammensetzung der Harze schließen lasse; so besteht der Traganth aus 43 Th. Bassorin und 57 Th. auflöslichem Gummi; so bestehen die fetten Oele aus Elaïne und Stearine u. s. w.

Das Geigenharz wird aus der Fichte (Pinus sylvestris Linn.), welche den Terpenthin liefert, gewonnen. Die Löcher nämlich, welche man zur Sommerzeit in die Rinde des Fichtenstammes bis ins Holz einhaut, werden im nächstfolgenden Winter von dem ausfließenden Harze, welches erhärtet, wie mit einer Rinde überzogen. Wird dieses, nachdem es gesammelt worden, oder der Rückstand von dem Terpenthin, von welchem durch Destillation das Terpenthinöl geschieden worden, nur so lange über dem Feuer gehalten, bis es geschmolzen, und die Unreinigkeiten davon abgesondert sind, so giebt es das gemeine oder schlechte Harz, Fichtenharz (Resina communis), welches hart, sehr zerbrechlich, schmutzig, braun oder röthlich, beim Brennen von unangenehmen Geruche ist und zwischen den Fingern leicht zähe wird. Hält man aber dieses Harz ohne alles hinzugegossene Wasser so lange über dem Feuer, bis es durchsichtig und rothgelb geworden, und allen Terpenthingeruch verloren hat, so heißt es Geigenharz, Colophonium. Gießt man während des Schmelzens und Kochens kaltes Wasser allmälig zu, und läßt es so lange über dem Feuer, bis es die Farbe des gelben Wachses hat, worauf es durchgeseiht wird, so erhält man das weiße Harz (Resina alba, Pix alba), welches einen schwachen Terpenthingeruch, aber keinen Geschmack hat. Aus dem Rückstande von der Destillation des Terpenthinöls, dem sogenannten gekochten Terpenthin, wird das Geigenharz dadurch bereitet, daß man denselben über dem Feuer bis zum Braunwerden flüssig erhält.

Das Geigenharz ist je nach der Hitze, welche es ausgehalten hat, hell bräunlichgelb, oder dunkelbraun, undurchsichtig, in dünnen Stücken und Splittern gelb oder rothgelb durchscheinend, glasglänzend, von flach muschligem Bruche, spröde, von weißgelblichem Striche, ohne merklichen Geruch und Geschmack. Auf glühenden Kohlen verbreitet es einen starken Rauch von

eigenthümlichem Geruche. Es löst sich vollkommen in Weingeist, Aether, fetten und ätherischen Oelen auf. Mit Aetzkalilauge bildet es eine durchsichtige, dunkel pomeranzenfarbige Flüssigkeit, welche eingedickt eine braune, in dünnen Stücken durchscheinende, zähe, ausgetrocknet aber leichtbrüchige Harzseife liefert. Doch ist diese Seife verhältnißmäßig viel weniger auflöslich in Wasser als andere Harzseifen, und wird aus ihrer Auflösung in Wasser durch einen Ueberschuß von Aetzkali niedergeschlagen. Das Geigenharz löst sich leicht in kaltem Vitriolöl auf und fällt beim Vermischen mit Wasser in Verbindung mit Schwefelsäure nieder. Nach Saussure ist das Geigenharz wenigstens aus zwei verschiedenen Harzen zusammengesetzt, da sich nur ein Theil desselben in Steinöl auflöst. Diese Auflösung liefert beim Abdampfen eine verwirrt krystallisirte klebrige Masse, welche erst nach längerem Aussetzen an der Luft fest wird. Nach Saussure besteht es aus: Kohlenstoff 77,402; Wasserstoff 9,551; Sauerstoff 13,047. Baup fand in dem französischen Colophonium, wahrscheinlich von Pinus maritima, eine krystallisirbare, in fast 4 Theilen Alkohol auflösliche und im Wasser unauflösliche Substanz; eine ähnliche in dem Harze von Pinus Abies, gleichfalls krystallisirbar, in Wasser unauflöslich, aber in 7½ Th. Alkohol von 88 Procent auflöslich. Beide reagirten sauer, und bildeten mit Alkalien wahre Salze, von denen einige in Wasser, Alkohol, andere hingegen nur in Aether auflöslich waren. Die ersteren nennt er Acide pinique, die letztern Acide abiétique.

Eine Verunreinigung des Geigenharzes mit Sand oder gar mit Pech läßt der Augenschein und der Geruch erkennen.

Das Geigenharz macht häufig einen Bestandtheil der gebräuchlichsten Pflaster und Salben aus.

Aus der Fichte und andern Nadelbäumen wird auch durch eine absteigende Destillation der Theer (Pix liquida) gewonnen. Trocknes Kienholz, die Strohfilter von Terpenthin, vom gemeinen Harze, nebst den Holzspähnen, werden nämlich in große Haufen aufgethürmt, mit Moos und Erde beworfen, und rund herum Feuer gemacht, wo dann das dicke brenzlige Oel oder der Theer in das darunter in die Erde eingegrabene Faß abfließt. An einigen Orten geschieht dies in besondern Oefen. Er besteht aus brenzligem Oel, Harz und Terpenthinöl. Das anfangs nebst einer gelben säuerlichen wäßrigen Flüssigkeit — Schweiß, Theergalle, Sauerwasser — übergehende, flüssige, gelbe, auf dem später übergehenden dicken und schwarzen Theer schwimmende Oel wird gelber Theer genannt. Wird der Theer über offnem Feuer so lange unter beständigem Umrühren gehalten, bis er hart wird, so giebt er das schwarze oder braune Pech, Schiffspech (Pix solida, navalis, atra). Bisweilen wird das Pech auch sogleich als solches aus sehr harzigem Holze erhalten.

Durch eine ähnliche absteigende Destillation verfertigt man aus der Birkenrinde (Betula alba Linn.) in Polen und Rußland das Birkenöl, Dagget (Oleum Rusci, betulinum). Es ist ein in Rußland seit langen Zeiten sehr gebräuchliches Volksmittel, und wird sowohl innerlich als äußer-

lich angewandt. Von diesem empyreumatischen Oele rührt der eigenthümliche Geruch des russischen Juchtenlederes her.

Das burgundische Pech (Pix burgundica) wird dadurch bereitet, daß man Harz mit etwas Wasser im Kessel zergehen läßt, es in einen Filtrirsack gießt und auspreßt. Es kann durch ein reines Geigenharz sehr gut ersetzt werden.

Auch der Kienruß (Fuligo) wird durch Verbrennung des von der Reinigung rückständigen Terpenthins, Harzes und der übrigen harzigen Producte der Kiefern in einem Ofen gewonnen, dessen Rauchfang in eine Kammer ausgeht, welche nur eine einzige mit einem kegelförmigen Hute von Leinwand bedeckte Oeffnung hat.

Conchae. Austerschalen.

Ostrea edulis Linn. Ein Weichthier des deutschen Meeres.

Die größtentheils kohlensauren Kalk enthaltenden Schalen. Sie müssen von jedem Schmutze gereinigt seyn.

Ostrea edulis Linn. Die gemeine Auster. Austermuschel.

Gehört zur Classe der Weichthiere, zur Ordnung der Muscheln und zur Familie der Austern; bewohnt das deutsche Meer, auch an den Küsten des nordwestlichen Europa, im mittelländischen und adriatischen Meere, so wie in den indischen Meeren zu finden. Sie liegen in den Austerbänken zu ganzen Bergen auf einander, vermehren sich stark, sind sehr schmackhaft und werden deshalb gehegt.

Die Schale der Austern besteht aus zwei unregelmäßigen, ungleichen, blättrigen, auswendig höckerigen, inwendig glatten und perlmutterglänzenden Klappen. Sie setzt sich mit der converen Klappe an den Felsen und andern Meerkörpern fest, und bleibt, so lange sie lebt, daran hängen. Die Schalen werden in der Medicin gebraucht, und bestehen, wie die Krebssteine, die weißen und rothen Korallen, hauptsächlich aus kohlensaurer Kalkerde, enthalten aber auch, nach Vauquelin's Analyse, etwas phosphorsaure Kalkerde, Eisen und Talkerde, und Gallerte. Werden sie, so wie die Krebssteine, mit verdünnter Salpetersäure übergossen, so hinterlassen sie eine gallertartige Haut, welche die Figur der aufgelösten Schalen hat.

Vor dem Gebrauche müssen sie gereinigt werden, damit sie als Conchae praeparatae (siehe den 2ten Theil) in den Arzneischatz kommen können.

Conium maculatum. Das Kraut. Cicutae Herba. Erdschierlingskraut.

Conium maculatum Linn. Eine doldentragende zweijährige in Deutschland häufige Pflanze.

Das gänzlich unbehaarte Kraut, mit zusammengesetzten Blättern, die letzten Einschnitte länglich, der Stengel und die größeren

Zweige leicht gestreift, mit purpurrothen Flecken besprengt, einen mäuseähnlichen Geruch aushauchend. Das Kraut werde im zweiten Jahre gesammelt, wenn die Pflanze zu blühen anfängt, und nicht über ein Jahr aufbewahrt. Es werde nicht verwechselt mit dem gemeinen Kälberkropf (Chaerophyllum sylvestre), dessen Stengel beinahe gefurcht, die Blätter gegen die Basis hin etwas haarig und die Einschnitte scharf sind; auch nicht mit dem knolligen Kälberkropf und dem Taumelkörbel (Chaerophyllum bulbosum et temulum), deren Stengel am Grunde hackrig oder weichhaarig, und die Blätter borstig oder weichhaarig sind, endlich auch nicht mit dem Gartengleiß (Hundspetersilie, Aethusa Cynapium), dessen Blätter gesättigter grün, unterhalb glänzend, die kleinen Blumenhüllen halb, lang, hängend sind. Bewahre es sorgfältig.

Conium maculatum Linn. Der gefleckte Schierling.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der Fleckenschierling ist als Giftpflanze schon sehr lange bekannt. Es ist wahrscheinlich, daß er den Athenienſern einen Bestandtheil jenes Gifttrankes lieferte, dessen sie sich bedienten, um die vom Areopagus zum Tode Verurtheilten hinzurichten. Auch scheint die Natur die schädlichen Eigenschaften desselben schon durch den warnenden Anblick, durch den widerlichen Geruch und die bräunlich-purpurfarbigen schwärzlichen Flecken seiner Rinde, ähnlich denen einer Schlangenhaut, anzudeuten.

Der gefleckte Schierling wächst allenthalben in Deutschland und in andern Ländern Europas, und findet sich an ungebauten, trocknen, öden Stellen, auf Schutthaufen, an verfallenen alten Mauern, an Wegen, Gräben, Dämmen. Die Wurzel gleicht in etwas der Petersilienwurzel, ist weiß, spindelförmig, fast gar nicht ästig, oben gewöhnlich von der Dicke eines Daumens, 8—10 Zoll lang, läuft unten in ein paar Abtheilungen aus, und ist mit einigen Seitenfasern besetzt. Sie enthält, wenn sie jung ist, einen milchweißen Saft, und hat anfangs einen süßlichen, nachher aber scharf werdenden Geschmack. Die runden, ästigen, 3—4 Fuß hohen Stengel sind hohl, glatt, nicht behaart, schwach gestreift, von hellgrüner Farbe, und überall, besonders an ihrem untern Theile, mit rothen, rothbraunen, purpurfarbigen oder schwärzlichen Flecken bezeichnet, so wie auch die glatten, dicken, rinnenförmigen Blattstiele. Die Blätter sind groß, lang, abwechselnd, etwas weich, zwei-, drei- bis viermal gefiedert, und mit etwas dicken am Grunde umfassende Scheiden bildenden Stielen versehen. Die Blättchen sind klein, lancettförmig, eingeschnitten-gezahnt, glatt, spitzig, oben dunkelgrün, etwas glänzend, unten blaßgrün mit hervorstehenden Mittelrippen. Die Wur-

zelblätter sind drei- bis vierfach gefiedert, sehr vielfach zusammengesetzt, und größer als die Stengelblätter. Beide stehen abwechselnd, und laufen nach der Spitze zu in ein einzelnes zugespitztes Blättchen aus. Die obersten Blätter stehen gewöhnlich gegenüber, sind zwiefach gefiedert, und nicht selten hängend. Die weißen Blumendolden kommen zahlreich oben an den Spitzen der Zweige, und aus den Winkeln der Blätter hervor. Die allgemeinen sowohl als die kleineren Dolden sind vielstrahlig, etwas flach und haben eine mehrblättrige Hülle, aus fünf oder drei zurückgeschlagenen kurzen ungleichen Blättchen bestehend. Die einzelnen Blüthen sind weiß, und bestehen aus einer kurzen kaum merklichen Blumendecke, fünf ungleichen Blumenblättern. Die kurze, fast kugelförmige Frucht besteht aus zwei auf einer Seite flachen, auf der andern halbrunden, erhabenen, der Länge nach gestreiften, und in die Quere gekerbten Saamen.

Der Schierling blüht in den Monaten Juni bis August; die Saamen reifen im August bis September.

Das officinelle Kraut wird ohne die unwirksamen Stengel von wildwachsenden Pflanzen eingesammelt. Gequetscht oder zerrieben geben die Blätter einen eigenthümlichen, besonders widrigen, dem Katzenurin oder den spanischen Fliegen ähnlichen Geruch von sich; der Geschmack ist süßlich, etwas scharf und ekelhaft. Zuweilen findet man auch einzelne völlig ächte Pflanzen, welchen der bemerkte eigenthümliche Geruch mangelt, die aber als unwirksam verworfen werden müssen.

Verwechselt kann der gefleckte Schierling werden mit dem knolligen Kälberkropf (**Chaerophyllum bulbosum**). Diese Blätter sind sattgrün, glänzend, glatt, dreifach gefiedert, an den Rippen rauh; die Fiederchen sind auch fein zertheilt, die Spitzen und Einschnitte derselben sind knorpelartig. Die Blattstiele sind rauh und entspringen aus langen, gestreiften und mit einem häutigen Rande versehenen Scheiden. Der Stengel ist zwar auch roth gefleckt, aber er ist gegliedert, an den Knoten zwischen den Gliedern aufgeschwollen, und an den drei untersten Gliedern ganz rauh und borstig. Die Wurzel ist birnförmig, kurz und dick. Die Saamen sind nach oben zu dünner, länglich, glatt und gestreift. Die Blätter des wilden Körbels (**Chaerophyllum sylvestre**) sind groß, schwarz- oder graugrün, oft gefleckt, dreifach gefiedert und mit lancettförmigen, scharf zugespitzten, in Querstücke zertheilten Blättchen, gestreiften Blattscheiden, und haarigen Stielen versehen. Der Stengel ist gefurcht, ungefleckt, unten etwas scharf anzufühlen, oben glatt. Die Wurzel ist dick, lang, weiß und gewürzhaft scharf. Die Saamen sind schwarz-glänzend, glatt und lancettförmig. Die Blätter der Hundspetersilie (**Aethusa Cynapium**) sind glatt, schwarzgrün, auf der untern Fläche stark glänzend, dreimal gefiedert, mit eingeschnittenen, strichförmigen Blättchen. Die Wurzel ist spindelförmig, der Stengel ästig, rund, glatt, gestreift, zuweilen wie angehaucht violettfarbig. Die Blattstiele kommen aus gestreiften, am Rande häutigen, an der Spitze zwiefach gezahnten Scheiden hervor. Die allgemeine Blumendecke hat keine Hülle; die der kleineren Dol-

den besteht aus drei sehr langen schmalen, an einer Seite herabhängenden Blättchen. Die ganze Pflanze hat, wenn sie nicht gequetscht ist, keinen und dann einen Schierlingsgeruch.

Außer diesen Pflanzen soll der Schierling noch verwechselt werden mit dem wohlriechenden Körbel (Scandix odorata Linn.), dem Wasserfenchel (Phellandrium aquaticum), mit dem berauschenden und rauhen Körbel (Chaerophyllum temulentum et hirsutum), mit dem peloponnesischen Liebstöckel (Ligusticum peloponnense), mit der röhrigen und safrangelben Rebendolde (Oenanthe fistulosa et crocata) und mit dem Wasserschierling (Cicuta virosa), welche Pflanzen aber sämmtlich durch Vergleichung von dem wahren Erdschierling leicht unterschieden werden können.

Der ausgepreßte Saft des frischen Schierlings ist grün; von dem darin zertheilten Satzmehl durch ein wollenes Tuch und durch graues Löschpapier abfiltrirt, behält er seine grüne Farbe bei, seiht man ihn aber durch feines Filtrirpapier (Josephspapier) durch, so bleibt das grüne Satzmehl gänzlich auf dem Filter zurück. Aus dem nun beinahe wasserhell, nur wenig bräunlich gefärbt durchgelaufenen Safte scheidet sich beim Erhitzen der Eiweißstoff im geronnenen Zustande ab. Dieser dann von Satzmehl und Eiweißstoff befreite Saft giebt mit dem oxydirten salpetersauren Quecksilber einen Niederschlag, der sich später schön rosenroth färbt. Oxydirte Eisenauflösung zeigt keine Spur von Gerbestoff oder Gallussäure darin an; die gelbgrünliche Farbe, welche die beinahe bis zur Wasserhelle verdünnten Auflösungen erhalten, rührt von Weinstein- oder Aepfelsäure her, welche der Saft theils frei, theils mit Kalkerde verbunden enthält. Andere Reagentien deuteten in Pfaff's Versuchen auf die Gegenwart von äpfelsauren und phosphorsauren Kalksalzen, so wie von salzsauren Salzen. Barytwasser und Kalkwasser machen einen reichlichen, flockigen, gelbbräunlich gefärbten Niederschlag, der sich sehr leicht in Salzsäure wieder auflöst. Ammoniak schlägt nach Döbereiner phosphorsaures Talkerdeammoniak nieder, wenn die Auflösung nicht mit zu vielem Wasser verdünnt ist.

Sechs Pfund Saft geben ein Pfund Extract.

Nach Schrader's Analyse (Berl. Jahrb. 1805. S. 152.) geben zwei Pfund Schierling: schleimig-gummiges Extract 6 Qt. 30 Gr.; Seifenstoff 5 Qt. 10 Gr.; Harz 30 Gr.; grüne Substanz 56 Gr.; Eiweißstoff 50 Gr. 16 Unzen frisches Kraut hinterließen nach dem Trocknen 2 Unzen 5 Quentchen und 40 Gran.

Der Schierling enthält außerdem noch Essigsäure, schwefels., salzs. und salpeters. Kali (Tömlich in Brandes Archiv II. S. 91.), äpfels. und phosphors. Kalk, phosphors. Bittererde, Eisen und Mangan.

Bertrand (Froriep's Notizen II. 22. S. 343.) giebt als Bestandtheile des ausgezogenen Saftes folgende an: 1) einen braunen Extractivstoff; 2) ein nicht giftiges Harz; 3) Schleim; 4) Eiweißstoff; 5) ein flüchtiges durch Destillation erhaltenes Oel von beträchtlicher Schärfe und dem starken Geruche der Pflanze. Außerdem wird noch das von Brandes entdeckte Coni-

cin, hier Cicutin genannt, aufgeführt. Bertrand fand auch noch salzsaures Kali. Brandes hat den eigenthümlichen wirksamen Bestandtheil des Schierlings dargestellt, und ihn Conicin genannt. Dieses besitzt nach ihm (Kastn. Archiv IV. 2. S. 248.) den widerlichen Geruch des Schierlings in hohem Grade, und ist, wie alle diese Stoffe, in Wasser, Alkohol und Aether auflöslich. Der Geruch verliert sich, wenn die Stoffe mit einer Säure versetzt werden, tritt aber wieder hervor, wenn man die Verbindung durch Bittererde zersetzt. Innerlich genommen bewirkte die ätherische Auflösung des Conicins die stärksten, mehrere Tage ausdauernden Dilatationen der Pupille.

Auch Peschier will eine Spur einer basischen Substanz gefunden haben, die auf eine Unze Extract nur einen Gran betrug. Pfaff hat kein Alkaloid entdecken können. Eben so will Peschier eine eigenthümliche Säure, die in sechsseitigen Prismen krystallisirt, mit Baryt ein auflösliches Salz giebt, und die Kalksalze zersetzt, gefunden haben. Trommsdorff (dessen N. J. XII. 2. 1826. S. 49.) konnte auch aus dem frischen Safte kein Alkaloid erhalten, dagegen scheinen auch seine Versuche die Eigenthümlichkeit der von Peschier angegebenen Coniumsäure zu bestätigen, doch wurde in Tr. Versuchen essigsaurer Kalk von dieser nicht getrübt, auch selbst, nachdem diese mit Kali neutralisirt worden war, entstand kein Niederschlag.

Der Schierling wird zur Bereitung des eingedickten Saftes und auch im trocknen Zustande zu Umschlägen gebraucht.

Bei Vergiftungen durch Schierling sind Brechmittel, und später verdünnte vegetabilische Säuren, z. Essig, Citronensaft u. s. w. anzuwenden; auch der Wein ist nützlich.

* Consolida. Die Wurzel. Schwarzwurz.

Symphytum officinale Linn. Gemeine Schwarzwurz. Beinwell. Wallwurzbeinwell.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 9. Asperifoliae.

Diese perennirende Pflanze wächst fast in ganz Deutschland, an Gräben, feuchten Orten, Wiesenbächen u. s. w. Die Stengel sind aufrecht, saftig, 1—2 Fuß hoch, kantig, sehr ästig, mit steifen Haaren bedeckt. Die Blätter stehen wechselsweise, sind ziemlich groß, ei-lancettförmig, spitz, am Rande etwas gewellt, und laufen am Grunde an dem Stengel herab. Die weißen oder purpurfarbenen Blüthen stehen in getheilten Aehren am Ende der Aeste und sind schneckenartig eingebogen. Der Kelch ist tief fünftheilig, die Blumenkrone einblättrig, glockenförmig, die Röhre dick, walzenrund, oben und außen mit fünf Spalten versehen, welche die Mündungen der fünf Anhänge des Schlundes sind. Der krugförmige Saum zeigt fünf zurückgeschlagene Zähne. Die fünf Anhänge des Schlundes sind glatt, lancettförmig, am Rande drüsig und wechseln mit den Staubfäden.

Die Wurzel wird zum medicinischen Gebrauche im April eingesammelt. Sie ist ziemlich lang, 1—2 Finger dick, ästig, auswendig schwarz oder

dunkelbraun, innerhalb weiß-fleischig, bricht sehr leicht glatt ab, läuft auf dem Bruche schmutzig braun an, besitzt einen süßlich-wäßrigen, sehr schleimigen, dann schwach zusammenziehenden Geschmack und ist ohne Geruch. Bei gelinder Wärme getrocknet, und eine Zeitlang aufbewahrt, zeigt sie sich inwendig weiß, schwammig, mehlig und ist im Munde sehr klebrig. Sie enthält viel zähen Schleim, dieser ist aber mit Zucker, Eiweißstoff und einem zusammenziehenden Stoffe verbunden, und die Abkochung nimmt während des Kochens eine rothbraune Farbe an, welche auch nach dem Eindicken das schleimige Extract behält. Dieses röthet Lackmuspapier, wird in der wäßrigen Auflösung durch Weingeist und Säuren verdickt, durch schwefelsaure Eisenauflösung schwärzlich niedergeschlagen. Aus 16 Unzen gepulverter Schwarzwurzel zieht Weingeist 5½ Unze aus und dieser Auszug enthält, außer wenigen Harztheilen, freie Gallussäure und Zuckerstoff.

Die Beinwellwurzel gehört zu den einwickelnden, reizmindernden Mitteln, und besitzt zugleich gelind adstringirende Kräfte. Ehedem wurde sie auch zu verschiedenen äußerlichen Arzneimitteln genommen, die zum Vernarben und Zusammenheilen (Consolidiren) der Wunden bestimmt waren, woher sie den Namen **Consolida** erhalten hat.

* Contrajerva. Die Wurzel. Giftwurzel.

Dorstenia brasiliensis Linn. Die wurmtreibende Dorstenie.

Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Nach den neueren Bestimmungen der Herren v. Spix und v. Martius ist diese **Dorstenia brasiliensis** die Mutterpflanze, und nicht die **D. Contrajerva**, welche bis jetzt dafür galt. Die erstere Pflanze, die in der Sprache der Eingebornen Brasiliens **Cajapia** heißt, wächst auf starkem Thonboden in den gebirgigen Gegenden von St. Paul und Minas, während die übrigen Arten der **Dorstenia** den Schatten feuchter Wälder und fette Dammerde lieben. Auch bei dieser Pflanze bemerkt man, wie in Europa bei mehreren, welche in Niederungen und auf Höhen zugleich vorkommen, daß jene aus dem Gebirge bedeutend kräftiger sind.

Die Wurzel besteht aus einem länglichen, gleichsam gegliederten, 4—5 Linien dicken Wurzelstocke, aus dem zahlreiche, dünne und ästige Wurzelfasern hervorkommen. Die Farbe ist gelblich, mehr oder weniger ins Braune neigend. Ihr Geschmack ist bitterlich, adstringirend, etwas aromatisch, beim Kauen gelind brennend. Der Geruch ist nicht stark, aber gewürzhaft. Das wäßrige Decoct ist schleimig, der geistige Auszug aber scharf. Diese Wurzel, welche wie die Serpentaria gegen Nervenfieber und allgemeine Schwäche, so wie gegen den Schlangenbiß angewendet wird, soll im frischen Zustande noch kräftiger wirken als die Serpentaria, aber ihre Eigenschaft schneller verlieren. Daß die **Contrajerva** der Officinen den Ruf, welchen sie sonst besaß, verloren hat, hängt nach den Herren v. Spix und v. Martius davon ab, daß die Pflanze häufig mit andern Arten der Dorstenie

verwechselt wird, welche ihr an Heilkraft insgesammt weit nachstehen, und weil statt der brasilianischen häufig die schwächeren mexikanischen und westindischen Arten in den Handel kommen.

Der Name Contrajerva ist spanischen Ursprungs, und bedeutet Gegengift.

Convallaria majalis seu Lilium convallium. Die Blumen. Maiblumen.

Convallaria majalis Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands.

Glockenförmige, sechsspaltige, weiße, so lange sie frisch sind wohlriechende Blumenkronen, getrocknet und zerrieben Niesen erregend.

Convallaria majalis Linn. Die gemeine Maiblume.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 2. Asparagineae.

Diese allgemein bekannte, ihres Wohlgeruchs und der zierlichen Gestalt wegen sehr beliebte Pflanze wächst sehr häufig durch ganz Deutschland und in den übrigen Ländern Europas, in schattigen Wäldern.

Die Wurzel ist kriechend, ästig, gegliedert, faserig und weiß; der Schaft ist aufrecht, nackt, glatt, eckig und fast so lang als die Blätter, welche meistens zu zweien aus der Wurzel kommen, und am Grunde scheidenförmig sind; die Gestalt derselben ist eirund-lancettförmig. Die Blüthen sind klein, sehr wohlriechend, kurz gestielt, von weißer Farbe und einseitig in traubenförmiger Aehre nach einer Seite überhangend. Der Kelch fehlt, die Blumenkrone ist einblättrig, glockenförmig und sechsspaltig. Die Frucht ist eine rothe Beere, die bald mehr bald weniger rundliche Saamen enthält.

Die Maiblume blüht im Mai und Juni; der Saame reift im September.

Die frischen Blüthen wurden ehedem zur Bereitung des destillirten Wassers benutzt. Beim Trocknen, welches schnell geschehen muß, nehmen sie eine gelbliche Farbe an, und verlieren ihren angenehmen Geruch. Der Geschmack derselben ist leicht bitter, etwas scharf und ekelhaft. Der wäßrige Aufguß ist röthlich-gelb, wird durch schwefelsaures Eisen gesättigt roth; die geistige Tinctur von goldgelber Farbe hat mehr Schärfe als der wäßrige Auszug, dabei auch mehr Bitterkeit. Das geistige Extract ist weniger scharf, aber um so bitterer, und hat einen balsamischen Geruch, wie gelbes Wachs, welchen Pfaff einem wahrscheinlichen Gehalte von Pollen zuschreibt. Der niesenerregende Bestandtheil der Blumen ist wahrscheinlich ein scharf harziger, daher sie als kräftiges Niesemittel gebraucht werden.

Die Blätter dieser Pflanze geben mit Kalk eine dauerhafte grüne Farbe.

Copaiva. Der Balsam. Copaivabalsam.

Der aus dem Stengel der Copaifera multijuga Hayne, und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0370-2

anderer Arten dieses Geschlechts im südlichen Amerika, vorzüglich in Brasilien, tröpfelnde Saft.

Ein natürlicher klarer Balsam, gelblich, etwas dicker als ein fettes Oel, von angenehmen Geruche und bitterlichem etwas scharfem Geschmacke. Er sey unverfälscht, weder mit Terpenthin noch mit Mandelöl vermischt. Der erstere verräth sich, wenn der Balsam auf ein glühendes Eisen getröpfelt wird, durch den eigenthümlichen Geruch, das andere bleibt zurück, wenn der Balsam in 8 Theilen höchstrectificirten Weingeistes aufgelöst wird. Die verschiedenen Arten, nur durch eine mehr oder weniger braune Farbe, nicht aber durch den Geruch unterschieden, können in Gebrauch gezogen werden.

(**Copaifera multijuga Hayne** ist in dessen Arzneigewächsen Bd. X. Anm. unter Nr. 19. folgendermaßen definirt: „mit gleich-gefiederten Blättern, sechs- bis zehnpaarigen etwas gekrümmten ungleichseitigen, in eine lange abgesetzte Spitze ausgehenden durchsichtig punktirten Blättchen, von denen die untern eiförmig länglich, die obern lancettlich;" auch auf t. 17. fig. c. ein Blatt abgebildet. Da jedoch das Gewächs noch nicht mit Blüthen oder Früchten gefunden, auch sonst nicht näher beschrieben worden ist, so sehe ich mich genöthigt, die bisher als Mutterpflanze des Copaivabalsams beschriebene **Copaifera officinalis** hier noch aufzunehmen.)

Copaifera officinalis Linn. Der officinelle Copaivabaum.

Copaifera Jacquini Desfont.

Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Ein großer, dichtbelaubter Baum von zierlicher Gestalt, der im südlichen Amerika, Brasilien, Cajenne, besonders in der Nähe von Tolu wild wächst, und der nach Jacquin mit **Myroxylon peruiferum** vermischt vorkommt. Die Blätter sind abwechselnd und bestehen aus 5—8 eiförmigen, zugespitzten, ganzrandigen, völlig glatten und etwas glänzenden, punktirten, fast sitzenden Blättchen. Die weißen Blüthen bilden zusammengesetzte achselständige Trauben von der Länge der Blätter. Der Kelch ist vierlappig, die Lappen sind etwas ungleich ausgebreitet. Die Krone fehlt.

Nach den Herren v. Spix und v. Martius gewinnen jedoch die Einwohner der Provinz St. Paul in Brasilien den Copaivabalsam, welchen sie bei ihren Krankheiten anwenden, aus zwei andern Copaivaarten, nämlich aus der **Copaifera Langsdorffii Desf.** und **Copaifera coriacea Mart.** Es ist indessen nicht gewiß, ob dieser Balsam auch in den Handel kommt. Hiermit übereinstimmend ist die Meinung Stolze's, daß die kleinen Abweichungen, welche einer Verfälschung nicht zuzuschreiben sind, durch die Annahme sich erklären lassen, daß, wie in Europa der Terpenthin von mehreren Fichtenarten,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0371-7

so der Copaivabalsam von mehreren Arten Copaifera gewonnen werde. Der verwundete Stamm giebt in reichem Maße den Copaivabalsam. Aus erwachsenen Stämmen fließt nach einem gemachten Einschnitte der Balsam in solcher Menge, daß in drei Stunden zehn, zwölf und mehrere Pfunde gesammelt werden. Der Einschnitt verwächst nachher von selbst, oder wird auch wohl mit Wachs oder Thon verklebt. Die Einschnitte können 2—3 mal im Jahre wiederholt werden.

Der so gewonnene Balsam hat die Consistenz eines dünnen Zuckersaftes, ist blaßgelb, vollkommen durchsichtig, von einem eigenthümlichen, nicht unangenehmen Geruche, und einem ölig-milden, schwach gewürzhaften, hintennach etwas scharfen und bitterlichen Geschmacke. Er hat ein spec. Gew. von 0,95, schwimmt also auf dem Wasser. Durch das Alter wird er zähe, dick, trübe, nimmt eine mehr bräunliche Farbe an, und ist dann schwächer an Geruch und Geschmack; und sinkt dann in Wasser in kugeliger Gestalt zu Boden.

Eine schlechte Sorte kommt, wiewohl selten, von den Antillen, und wird wahrscheinlich durchs Auskochen der Aeste erhalten. Sie ist dicker, von der Consistenz des Honigs, weißlich, undurchsichtig, von widerlichem Geruche und Geschmacke, und hat gewöhnlich eine wäßrige Feuchtigkeit am Boden. Sie ist zum Arzneigebrauch gänzlich zu verwerfen. Schönberg (Berl. Jahrb. 1806. S. 56.) hat eine recht gute Arbeit über den Copaivabalsam geliefert. Neuerlichst jedoch hat Stolze (Berl. Jahrb. XXVII. 2. 1826. S. 179.) von diesem Balsam eine mehr befriedigende Analyse gegeben. Ein Tropfen dieses Balsams sinkt im Wasser nach der Höhe des Falles mehr oder weniger tief in Kugelgestalt nieder, erhebt sich aber schnell auf die Oberfläche und vertheilt sich auf derselben. Damit geschüttelt, theilt er dem Wasser den Geschmack des Balsams in geringem Maße mit. Mit wasserfreiem Weingeiste ist er in allen Verhältnissen mischbar; ein Theil des Balsams mit zwei Theilen Weingeist geben eine vollkommene Auflösung. Bei einer größeren Menge Weingeist opalisirt die Auflösung höchst gering, wird erst nach einiger Zeit klar, nachdem sich eine kaum merkbare Menge eines Niederschlages abgesetzt hat. Auch Weingeist von 90 ° löst den Balsam leicht und vollkommen auf. Aether verhält sich eben so. Auch ätherische Oele nehmen ihn in allen Verhältnissen auf. Mit den fetten Oelen verbindet er sich gleichfalls in allen Verhältnissen, und diese werden dadurch in Weingeist in bestimmter Menge auflöslich; durch mehr Weingeist aber werden sie abgeschieden. Zur Prüfung des Balsams auf beigemischte fette Oele mit Weingeist ist daher wenigstens die achtfache Menge Weingeist von 90 ° erfoderlich; doch kann das in Weingeist leicht lösliche Ricinusöl auf diese Weise nicht entdeckt werden.

Verhalten des Balsams gegen reines Kali. Tröpfelt man unter beständigem Umschütteln eine wasserklare reine Aetzkalilauge, die genau $\frac{1}{3}$ Kalihydrat enthält, zum Copaivabalsam, so wird das Gemisch schon beim ersten Zusatze opalisirend, hellt sich nach Hinzufügung von mehr Aetzkalilauge und

bei fortdauerndem Schütteln immer mehr und mehr auf, wird fast ganz hell, wenn das Verhältniß der Aetzlauge ein Viertel des Gewichtes des Copaivabalsams beträgt, und erhält bei $\frac{1}{3}$, also dem vierten Theile des Ganzen, die völligste Klarheit, wobei Wärme frei wird. Mehr Aetzlauge macht die Mischung erst trübe, dann milchig, und je größer der Zusatz von Aetzlauge, desto schneller scheidet sich das Ganze in 2 Theile: in eine obere Lage, die ganz das Ansehen des Copaivabalsams hat, nur etwas dunkler von Farbe ist, und in eine untere, fast farblose wäßrige Flüssigkeit. Jene obere Lage ist aber nicht, wie man bisher irrig glaubte, reiner Balsam, sondern eine wahre Copaivaseife, ganz übereinstimmend mit der aus 1 Th. Lauge und 3 Th. Balsam erhaltenen klaren Lösung, auf der schweren Aetzlauge sich erhebend. Diese Seife hat die Consistenz eines Syrups, bleibt bei Zusatz einer sehr geringen Menge Wasser klar, wird aber durch mehr Wasser milchig, und bildet bei starker Verdünnung eine opalisirende Flüssigkeit. Die unter Anwendung von Wärme bereitete Seife ist nur wegen des dabei verflüchtigten ätherischen Oeles härter, als die vorige. Zersetzt man die Seife durch Säure, so wird der Balsam erst nach langer Ruhe wieder vollständig abgeschieden, und zwar in einem etwas veränderten Zustande. Die Lösung der Seife in wasserfreiem Weingeiste setzt nach einigen Stunden weiße Flocken ab, in Weingeist von 90 bis 75 ° ist sie dagegen vollkommen löslich. Eine durch bloßes Schütteln des Ricinus- oder eines andern fetten Oeles mit Aetzlauge erhaltene Seife ist aber in Weingeist von 75 ° nicht vollkommen löslich, und es giebt dieses Verhalten nach Stolze ein Prüfungsmittel auf die genannten Oele ab. Um jede Beimischung von Ricinus- oder einem andern fetten Oele zu erkennen, setzt man zum Copaivabalsam so viel von einer reinen Aetzlauge, daß in der Kälte eine vollkommen klare Seife entsteht, und löst diese in Weingeist von 75 Procent auf. War der Balsam rein, so wird sich die Seife mit schwach gelblicher Farbe klar lösen, und auch nach 12 Stunden nur eine Spur eines Niederschlages abgesetzt haben; enthält aber der Balsam nur $\frac{1}{12}$ Ricinus- oder eines andern fetten Oeles, so ist die Lösung gleich anfangs etwas opalisirend, und nach mehreren Stunden setzen sich weiße Flocken ab. Aetznatron wirkt ganz wie Aetzkali. Kalk- und Barytwasser wirken sehr wenig ein. Aetzammoniak von 0,96 spec. Gew. wirkt wie Aetzlauge. $\frac{1}{5}$ des Ganzen Aetzammoniak macht das Gemisch völlig klar, und dieses bleibt es bis auf $\frac{1}{4}$ des Ganzen, dann entsteht eine opalisirende, keinesweges jedoch eine stark milchige Trübung. Doch scheidet sich nichts aus, weil die specifischen Gewichte nicht verschieden sind. Die klare Seife läßt sich mit Wasser mischen; steigt aber der Zusatz über das eigene Gewicht der Seife, so entsteht eine opalisirende, und bei noch größerer Verdünnung eine milchige Flüssigkeit, die Seife wird zersetzt, der größte Theil des Ammoniaks verbindet sich mit etwas Balsam und löst sich auf, während der übrige Balsam mit einem schwachen Ammoniakgehalte ausgeschieden wird. Planche hat das Aetzammoniak als Prüfungsmittel empfohlen auf fette Oele; nämlich 1 Th. mit 3 Th. Balsam, wo eine klare Seife entsteht; ist aber ein fettes

Oel vorhanden, so bleibt die Seife weiß; diese Prüfung ist nach Stoltze nur anwendbar, wenn die Menge des fetten Oeles über $\frac{1}{5}$ beträgt. Salpetersäure von 1,250 spec. Gew. wirkt in der Kälte auf den Balsam langsam ein, heftig aber in der Siedehitze und verwandelt ihn unter Entwickelung von salpetriger Säure in ein gelbes Harz. Mit der größten Heftigkeit aber wirkt die rauchende Salpetersäure. Mit concentrirter Schwefelsäure nimmt er unter Erhitzung eine hyacinthrothe Farbe an.

Der Copaivabalsam läßt für sich destillirt sein ätherisches Oel sehr langsam fahren; leichter geschieht dieses bei der Destillation mit Wasser, doch ist auch hier eine 5—6malige Wiederholung erfoderlich. Das destillirte Oel hatte ein spec. Gew. von 0,91, den eigenthümlichen Geruch des Balsams, war wasserhell, reagirte säuerlich, mischte sich in allen Verhältnissen mit wasserfreiem Weingeiste und Aether, auch mit Weingeist von 90 Procent. Mit concentrirter Schwefel- und Salpetersäure erfolgt eine sehr starke Erhitzung. Durch zugemischtes Aetzammoniak wurde zwar die saure Reaction des Oeles gehoben, doch konnte nach dem Auswaschen und Abdampfen keine Spur von Essig-, Benzoë- oder Bernsteinsäure entdeckt werden. Die saure Reaction ist also nach Stoltze einem Harzgehalte zuzuschreiben, den es, obgleich es wasserklar war, dennoch mit übergeführt hatte.

Der Rückstand von der Destillation hatte das Ansehen eines steifen gelben Harzes, welches in der Auflösung sauer reagirte, und ein braunes schmieriges Harz absetzen ließ, übrigens gegen die Alkalien und Säuren sich wie der Balsam verhielt. Wurde die geistige Auflösung mit Bittererde gekocht, so hörte die saure Reagenz bald auf, doch konnte keine Säure (weder Essig-, noch Benzoë-, noch Bernsteinsäure) abgeschieden werden, Stoltze hält also die saure Reagenz des Harzes für eine Eigenschaft desselben, und nicht als von einer anhängenden fremden Säure abhängig. Durch Kochen mit Bittererde war eine Bittererden-Copaivseife bereitet worden, aus welcher das Harz durch jede Säure unverändert abgeschieden werden konnte, welches wie vorher sauer reagirte.

Stoltze zieht aus seiner Arbeit nachstehende Folgerungen:

1) Es ist wahrscheinlich, daß der im Handel vorkommende Balsam von mehreren Arten der Gattung Copaifera kommt, und daß davon einige Abweichungen herrühren, die Copaivabalsame gegen einander zeigen, deren Aechtheit man übrigens anerkennen muß.

2) Ein Gemisch aus Copaivabalsam und den in Weingeiste schwer löslichen fetten Oelen läßt sich mit einer bestimmten Menge wasserfreien Weingeistes, ja selbst mit einem solchen von 90 Procent mischen, ohne daß eine Trübung entsteht (der Weingeist wird von dem Balsam aufgelöst); wird aber die Menge des Weingeistes bedeutend vorherrschend, so scheidet sich das fette Oel aus. Man muß daher, wenn man den Copaivabalsam auf diese Art prüfen will, wenigstens 8 Th. Weingeist gegen 1 Th. Balsam anwenden, und am besten ist es, dazu nur einen Weingeist von 90 Procent zu benutzen. Ricinusöl läßt sich auf diese Art nicht entdecken, da dessen Löslichkeit in

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0374-5

Weingeist von 90 Procent durch den Balsam noch beträchtlich vermehrt wird.

3) Neun Theile Copaivabalsam und ein Theil Kalihydrat, in zwei Theilen Wasser gelöst, bilden durch bloßes Schütteln in der Kälte eine klare Seife, die sich in wenigem Wasser klar löst, mit mehrerem eine milchige Lösung giebt. Nimmt man mehr Aetzkalilauge, so scheidet sich die entstandene klare Seife oben ab, und das überflüssige Aetzkali ist in der untern Lage vorhanden. Die nach der obigen Weise gebildete reine Copaivaseife löst sich in Weingeist von 75 Procent vollkommen auf und erst nach 12 Stunden setzt sich am Boden eine Spur eines Niederschlages an; enthält aber der Copaivabalsam nur $\frac{1}{12}$ eines fetten Oeles, sey es auch Ricinusöl, so setzen sich nach einigen Stunden weiße Flocken ab, die um so häufiger sind, je mehr fettes Oel mit dem Balsam gemischt war. Enthält der Balsam über $\frac{1}{6}$ fettes Oel, so liefert er mit der Aetzlauge keine ganz klare Seife mehr.

4) Drei Theile Copaivabalsam und ein Theil Aetzammoniakflüssigkeit von 0,96 spec. Gew. bilden ebenfalls durch bloßes Schütteln in der Kälte eine klare Seife, die sich in wenigem Wasser klar löst, mit mehrerem eine milchige Mischung giebt und durch vieles Wasser zerlegt wird, indem der größte Theil des Copaivabalsams mit etwas Ammoniak sich abscheidet, und das übrige Ammoniak einen kleinen Antheil Balsam in Lösung behält. Setzt man zu der nach obigem Verhältnisse bereiteten Ammoniakseife noch mehr Aetzammoniak, so entsteht eine nach Verhältniß des Ueberschusses an letzterem mehr oder weniger opalisirende Mischung. Ist die Aetzammoniakflüssigkeit von ziemlich gleicher specifischer Schwere, so hält sich die Mischung längere Zeit, ist aber die erstere beträchtlich leichter, so scheidet sich letztere bald unten am Boden ab.

5) Die Resultate der Analyse sind: ätherisches Oel, durch Destillation mit Wasser erhalten, 38,0; braunes schmieriges Harz 1,66; gelbes brüchiges Harz 52; dasselbe Harz mit Spuren von Extractivstoff 0,75; ätherisches Oel in destillirtem Wasser vorhanden, Verlust bei der Austrocknung des Harzes an Wasser und flüchtigem Oele 7,59. S. = 100.

6) Die bei der Analyse erhaltenen Bestandtheile sind keine Producte, sondern Educte; denn mit Ausnahme des Wassers, welches nicht gut wieder in Mischung zu bringen ist, kann man alle übrigen Bestandtheile in mäßiger Wärme wieder in eine Mischung vereinigen, die alle Eigenschaften des rohen Balsams hat, nur eine etwas dunklere Farbe besitzt.

7) Das flüchtige Oel des Copaivabalsams reagirt in seinem gewöhnlichen, wenn auch wasserhellen Zustande (auch gleich nach einer gelinden Rectification?) etwas sauer, welches von keiner fremden Säure, sondern von Spuren mit übergeführten Harzes herrührt. Es hat viele Eigenschaften mit dem Terpenthinöle gemein, so wie überhaupt der Copaivabalsam dem klaren Terpenthine nahe steht.

8) An dem gelben brüchigen Harze ist vorzüglich die schwache saure Reagenz merkwürdig, die von keiner fremden Säure herrührt, sondern eine

Eigenschaft des Harzes ist. Deshalb verbindet es sich auch so leicht mit den Basen, selbst den schwächeren, z. B. der Bittererde und dem Bleioxydhydrat.

Nach dieser erschöpfenden Bearbeitung des Copaivabalsams von dem verstorbenen Hrn. Prof. Stoltze, die zugleich die Mittel zur Entdeckung etwaniger Verfälschungen vollständig angiebt, können wohl die älteren Vorschriften hierzu um so mehr übergangen werden, als sie großentheils auf unrichtigen Angaben beruhen. So nahm man früher allgemein an, daß der Copaivabalsam wenigstens in der Kälte keine Verbindung mit der concentrirten Kalilösung eingehe, und man betrachtete dies als ein Zeichen seiner Aechtheit. Die Mischbarkeit des Copaivabalsams mit den fetten Oelen setzt ihn der Verfälschung mit diesen auch am meisten aus, und es werden hierzu vorzüglich Mandel-, Mohn- und Nußöl benutzt, dennoch ist ein reiner Balsam im Handel nicht so selten, als man hiernach befürchten könnte. Das Verhalten des Copaivabalsams gegen Aetzkali ist auch von andern Chemikern so gefunden worden, wie es Stoltze angiebt. Nach Müller's Versuchen (Brandes Archiv VIII. S. 74.) löst sich der ächte Copaivabalsam in seinem gleichen Gewichte Aetzkalilauge, nach der Vorschrift der preuß. Pharmakopöe bereitet, vollkommen auf, die Lösung ist ganz hell, und mischt sich ohne Trübung mit Wasser. Enthält der Balsam $\frac{1}{8}$ Mandelöl, so entsteht zwar, nach Müller's Angabe, mit gleichen Theilen Aetzkalilösung ebenfalls eine klare Verbindung, Zusatz von Wasser macht sie aber milchig. Ein Balsam, der mehr als $\frac{1}{8}$ Mandelöl enthält, giebt keine klare Lösung mit Aetzlauge. Werden andere Verhältnisse, als gleiche Theile Balsam und Aetzkalilauge genommen, so entsteht keine klare Verbindung. Leichte und vollkommene Löslichkeit des Balsams in Weingeist und Aether ist auch nach Müller das beste Prüfungsmittel. Die Ausmittelung der gewöhnlichen fetten Oele hat, wie wir gesehen haben, keine Schwierigkeiten; diese finden sich aber bei dem gleichfalls in Weingeist auflöslichen Ricinusöle, daher hier, außer der von Stoltze angegebenen, noch einige Verfahrungsweisen erwähnt werden sollen. Planche (Trommsd. N. J. 1825. XI. 1. S. 179.) hat folgendes Verfahren, um den Balsam auf Ricinusöl zu prüfen, empfohlen: in ein kleines Glasgefäß thue man 3 Tropfen Copaivabalsam und einen Tropfen concentrirte Schwefelsäure. Ist der Balsam rein, so wird an den Berührungsstellen der beiden Flüssigkeiten sogleich eine hellgelbe Farbe bemerkbar (bleiben sie einige Minuten in Berührung, so geht die gelbe Farbe in eine blutrothe über, was auch bei dem mit Ricinusöle verfälschten geschieht), und beim Durcheinanderrühren mit einem Glasstäbchen wird die Masse etwas zähe, nimmt bald darauf eine hyacinthgelbe Farbe an und behält sie auch einige Zeit hindurch. Ist der Balsam mit Ricinusöl verfälscht, so wird sich auch an der Berührungsstelle der beiden Flüssigkeiten eine gelbe Farbe zeigen, sobald sie aber vermischt sind, wird die Farbe immer schwächer, bis sie endlich ganz verschwindet; die Masse, weniger zähe als die mit unverfälschtem Balsam, hat nun das Ansehn des schönsten weißen Honigs. Das Ricinusöl scheint den Copaivabalsam gleichsam einzuhüllen und gegen die Schwefelsäure zu

schützen. Dieser Versuch kann aber wohl schwerlich zu den beweisenden gerechnet werden, da die mehr oder minder gelbe Färbung von der Zeit, während welcher die beiden Flüssigkeiten vor der Vermischung in Berührung gestanden haben, eben so auch von dem mehr oder minder starken Durcheinanderrühren abhängig ist. Nicht besser steht es um folgende Methode: wenn man 3 Tropfen Balsam mit einem Tropfen Aetzammoniak schüttelt, so entstehen anfangs einige weißliche Streifen, welche jedoch bald verschwinden, so daß die Mischung klar wird; bleibt diese aber weiß, so enthält der Balsam Ricinusöl. Bei hoher Temperatur der Luft, wo das Ammoniak leicht entweicht, entsteht jedoch auch mit reinem Balsam eine undurchsichtige weiße Mischung. Die Probe ist daher in einem verstopften Gläschen und in mehrfacher Menge beider Flüssigkeiten anzustellen.

Nach Henry wird ein reiner Copaivabalsam, nachdem man ihn mit Wasser gesotten hat, zerreiblich; wenn er aber mit Ricinusöl auch nur in geringen Quantitäten verfälscht ist, so bleibt er nach dem Sieden in Wasser immer etwas weich.

Ancelin giebt folgende Probe an: mischt man in einer Kapsel drei Tropfen Copaivabalsam mit einem Tropfen concentrirter Schwefelsäure, so färbt sich die Mischung bedeutend, der Balsam mag rein seyn oder nicht. Bringt man die Materie in ein Glas, und schüttelt sie mit 4 oder 6 Drachmen Alkohol von 36 Graden, so zeigt, wenn der Copaivabalsam rein war, der Alkohol keine Wirkung darauf, ist aber der Balsam mit Ricinusöl verfälscht, so löst sich die Mischung leicht auf, und dieses Verfahren ist, wie Ancelin sagt, noch brauchbar, wenn der Copaivabalsam auch nur den 15. Theil Ricinusöl enthält. Guibourt und Boisel bestätigen die Richtigkeit dieser Angaben, und die Brauchbarkeit dieses Verfahrens (?).

Blondeau giebt an, daß man dem Copaivabalsam den vierten Theil seines Gewichts kohlensaure Magnesia beimischen solle. Diese Substanz löst sich darin vollständig auf, und die Mischung wird nach einigen Stunden klar, wenn der Copaivabalsam rein ist. Im Gegentheil, je mehr der Balsam verfälscht ist, um so trüber bleibt die Mischung. Dieses Verfahren scheint nach Guibourt und Boisel an seiner Genauigkeit mit der Erniedrigung der Temperatur zu verlieren, denn in der Kälte wurde sonst durchaus reiner Balsam mit der Magnesia nicht ganz durchsichtig.

Der Copaivabalsam wird jetzt vorzüglich gegen Blennorrhöe der Harnröhre angewendet, und hier entweder für sich tropfenweise, oder in Mixturen verordnet, in welchen er aber durch Eidotter oder Mimosenschleim gebunden werden muß, und zwar erfodert eine halbe Unze Balsam wenigstens zwei Eidotter oder ein Quentchen Mimosengummi. In Pillenmassen läßt er sich selten gut binden, drückt sich aus den Pillen leicht aus, und es kann überhaupt nur wenig Balsam auf diese Weise gegeben werden.

* Copal. Kopal.

Rhus copallinum Linn. Der Kopalbaum. Kopalsumach.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Dieser hohe in Mexiko und Nordamerika einheimische Baum wird als die Mutterpflanze desjenigen Kopals angegeben, der als westindischer im Handel vorkommt, wogegen

Vateria indica Linn. Der Kopal-Oelfruchtbaum.
Elaeocarpus copallifera Retz.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 8. Guttiferae.

ein in Asien einheimischer Baum, den ostindischen, orientalischen oder levantischen Kopal liefern soll. Nach einer Nachricht des Hrn. v. Martius (Richard's medic. Botanik S. 1258.) liefert die Pflanze, welche von ihm in seiner Reise als die Mutterpflanze des Animeharzes bezeichnet worden, dasjenige Harz, welches die Engländer Anime nennen. Die Engländer geben aber allgemein jenem hellen, klaren, in großen Kuchen oder in Stücken von unregelmäßig großmuschligem Bruche zu uns kommenden Harze, welches man bei uns Kopal nennt, den Namen Anime. In Brasilien nennt man das Harz promiscue Copal, Resina de Jatobà oder litaisica. Unter letzterer Benennung kommen einige sehr schöne, gold- oder weingelbe Sorten von Kopal aus Parà in den Handel, welche wahrscheinlich auch Hymenäen angehören, und in England zu feinen Firnissen verwendet werden.

Die von Martius bezeichnete Pflanze ist:

Hymenaea Courbaril Linn. Der Heuschreckenbaum.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Dieser Baum, der in Brasilien, wo er Jatobà (sprich Schatoba) und Jatai heißt, auf den Antillen und in Neuspanien wild wächst, erreicht eine außerordentliche Größe und Dicke, hat eine braune Rinde, und ein äußerst hartes, schweres Holz. Die Blätter sind zweipaarig, glatt, vollgrün, lancettförmig, spitz, von oben nach unten zu gekrümmt. Die Blumen sind geruchlos, schmetterlingsförmig und gelb. Die Früchte sind längliche, zusammengedrückte, holzige, einen halben Fuß lange Hülsen. Sie sind mit einem gelblichen etwas markigen Mehl erfüllt, welches süß und genießbar ist, und enthalten wenig Saamen.

Von dieser Pflanze, ferner von Hymenaea verrucosa und einigen andern noch unbeschriebenen Arten derselben Gattung, kommt nach v. Martius der westindische Kopal.

Der ostindische Kopal stand sonst, als die feinste Sorte, in höherem Preise, jetzt ist er in den schlechteren Sorten mit dem westindischen in gleichem Preise, in den feineren Sorten aber um die Hälfte des Preises zu beziehen.

Der westindische Kopal besteht aus sowohl der Größe als der Form nach sehr verschiedenen Stücken von einem Quentchen bis vier Unzen, die in der besten Sorte, dem sogenannten geschälten Kopal, von weißgelblicher

Farbe und beinahe so durchsichtig wie Glas sind. Die Oberfläche ist gewöhnlich etwas matt, der Bruch aber glasglänzend. Er ist so hart, daß er kaum von dem Messer angegriffen wird, und er wird desto höher geschätzt, je härter er ist. Er ist geruch- und geschmacklos, und nur erst in der Hitze verbreitet er einen gewürzhaften Geruch.

Der ostindische Kopal besteht aus citronengelben oder röthlichgelben Stücken von mancherlei Gestalt und Größe, die gleichfalls klar und durchsichtig, im Bruche glatt und glasig, überhaupt dem Bernstein ähnlich sind. Die Oberfläche ist nicht bloß matt, sondern häufig rauh, mit kleinen Punkten besäet, wahrscheinlich von der Baumrinde, an der er erhärtet ist. Der Geruch ist nicht stark, aber etwas gewürzhaft, dem Copaivabalsam ähnlich; der Geschmack gewürzhaft, nicht bitter. Er ist ziemlich leicht zerreiblich, und läßt sich leicht mit der Messerspitze schaben. Diese Zerreiblichkeit behält er auch bei den Firnissen bei, und wird deswegen geringer geschätzt, als der vorige. Da die Indianer fast alle durchsichtigen Baumharze Copalli nennen, so ist auch der Kopal oft sehr verschieden.

Der Kopal wird am Feuer weich und etwas elastisch, schmilzt nur bei sehr starker Hitze und nicht ohne Zersetzung, und verbreitet dann einen gewürzhaften Geruch, giebt aber bei der trocknen Destillation keine Bernsteinsäure. Er ist in absolutem Alkohol wenig löslich, seine Löslichkeit wird vermehrt, wenn man ihn gepulvert mehrere Monate an einem luftigen Orte liegen läßt; desgleichen vermehrt ein Zusatz von Campher seine Löslichkeit; so auch zeigt sich der Kopal löslicher, wenn man ihn in Stücken den Weingeistdämpfen aussetzt. Steinöl löst kaum 0,01 auf; Rosmarinöl und Terpenthinöl verhalten sich ähnlich, sie lösen jedoch mehr auf, wenn sie entweder in Dampfgestalt einwirken, oder mit dem Kopal in einem verschlossenen Gefäße über den Siedepunkt erhitzt werden, oder wenn wäßriges Ammoniak beigefügt wird (doch giebt letzteres Verfahren einen schwierig trocknenden Firniß). In fetten Oelen, wie Leinöl, scheint der Kopal erst dann auflöslich, wenn er so lange geschmolzen wird, bis er keine sauren gewürzhaften Dämpfe mehr ausstößt.

Der Kopal ist kein einfaches Pflanzenproduct. Wenn man denselben mit absolutem Alkohol behandelt, so löst sich schon in der Kälte ein Theil davon auf, und die Flüssigkeit wird durch hinzugegossenes Wasser stark milchig. Behandelt man ihn dann mit Aether, so löst sich ein anderer Antheil desselben auf, und der abgegossene Aether giebt in Alkohol einen Niederschlag; zuletzt bleibt ein in beiden Auflösungsmitteln unlöslicher Theil. Auch andere harzähnliche Substanzen enthalten neben dem leichtlöslichen Antheile ähnliche auflösliche, z. B. Mastix, Sandarak, das Masticin, Sandaricin ꝛc.

Der Gebrauch des Kopals schränkt sich bloß auf die Bereitung der Lackfirnisse ein. Bei der Bereitung des geistigen Firnisses ist es nützlich den fein gepulverten Kopal in Papierkapseln flach aufgestreut mehrere Wochen lang der Luft auszusetzen, und ihm dadurch Gelegenheit zu geben, sich gleichsam zu oxydiren, wodurch er auflöslicher wird. Auf 4 Unzen Kopal nimmt man 12 Unzen absoluten Alkohol mit einem geringen Zusatze von Campher, etwa

ein Quentchen, schüttelt das Gemenge eine Zeit lang, und erhitzt es dann allmälig bis zum Sieden. Der klar abgegossenen Flüssigkeit setzt man eine halbe Unze venetianischen Terpenthin zu und schüttelt um. Man erhält auf diese Weise einen guten brauchbaren Firniß. Tremlich (Buchn. Repert. XXIV. S. 428.) giebt folgende sehr zu empfehlende Vorschrift: man übergiebt die auserlesenen Stücke Kopal kochend wallendem Wasser, ungefähr ¼ Stunde lang, sondert dann den staubigen zum Theil schmutzigen Ueberzug, der sich auf den mehresten Stücken eingestellt haben wird, ab, und trocknet sie. Dieser Kopal wird pulverisirt, und mit ebenfalls gestoßenem, gewaschenem und wieder getrocknetem Asbest zu gleichen Theilen gemischt. Mit 6mal soviel, als man Kopal in Arbeit genommen, absolutem Alkohol übergossen, digerire man das Gepulverte unter öfterm Umschütteln bei + 22 ° R. einige Tage, gieße ab, und gebe von neuem halb so viel als das erstemal absoluten Alkohol hinzu, um die Procedur zu wiederholen.

Zur Bereitung des fetten Kopalfirnisses wird der Kopal in einem eisernen bedeckten Topfe, in dessen Deckel ein Loch ist, so lange bei gelindem Feuer geschmolzen, bis der Schaum zu fallen anfängt. Er wird dann vom Feuer entfernt, und mit halb so viel gekochtem noch warmen Leinöle vermischt, wo die Auflösung schon zu erfolgen pflegt, ohne daß die Mischung von neuem aufs Feuer käme. Dann wird noch eben so viel Terpenthinöl, als Kopal genommen worden, zugemischt und der fertige Firniß aufbewahrt.

Coriandrum. Der Saamen. Koriandersaamen.

Coriandrum sativum Linn. Eine einjährige im südlichem Europa einheimische, bei uns angebaute Pflanze.

Die kugeligen, fast gestreiften, glatten, bleichgelblichen Früchte, von gewürzhaftem nicht unangenehmen Geschmacke und Geruche.

Coriandrum sativum Linn. Der gemeine Koriander.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der gemeine oder Würzkoriander ist in Griechenland, in Italien, überhaupt im südlichen Europa einheimisch, wird aber in mehreren Gegenden Deutschlands, in Thüringen ꝛc. angebaut.

Die Wurzel ist dünn, spindelförmig, weiß; der Stengel aufrecht, glatt, gestreift, rund, ästig, 2—3 Fuß hoch. Die Wurzelblätter beinahe ungetheilt oder eingeschnitten, keilförmig; die untern Stengelblätter doppeltfiederspaltig mit geschlitzten, die obern mit schmalen, linienförmigen, offenstehenden Abschnitten. Die röthlich-weißen Blüthen bilden eine aus ungefähr 5—6 ungleichen Strahlen bestehende Dolde. Das Doppelakenium (die Frucht) ist eiförmig-kugelig, von den ungleichen Kelchzähnen und den beiden Griffeln gekrönt, fein gestreift, von graugelblicher oder gelbbräunlicher Farbe. Bei vorgeschrittener Reife und Austrocknung spaltet es sich in zwei halbkugelförmige Schließfrüchte.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0380-7

Die Blüthezeit ist Juni und Juli, die der Fruchtreife August und September.

Die frische und blühende Pflanze hat einen stinkenden, wanzenartigen Geruch, daher auch ihr Name entstanden ist. Die getrockneten Früchte aber riechen aromatisch und angenehm, was erst beim Pulvern recht bemerklich wird. Der Geschmack ist süßlich, etwas scharf gewürzhaft. Der vorzüglich wirksame Bestandtheil scheint das ätherische Oel zu seyn, wovon man $\frac{1}{477}$ erhalten soll.

Der Koriander war als blähungstreibend früher häufiger im Gebrauche, besonders als Zusatz zu Laxirtränkchen aus den Sennesblättern. Bisweilen wird noch der überzogene Koriander (**Confectio Coriandri**) verlangt; häufiger ist der Gebrauch desselben als Küchengewürz.

Creta alba. Weiße Kreide.

Ein ganze Berge Europas darstellendes Mineral.

Eine zusammenhängende, zerreibliche, abfärbende, weiße Erde, hauptsächlich aus kohlensaurem Kalke bestehend. Man wähle die weißeste aus und verwerfe die gelbliche und härtere.

Aus diesem Mineral sind ganze Gebirgsketten in England, Frankreich Italien, Spanien, Dänemark, Norwegen u. s. w. gebildet. Es ist demnach eine sehr häufig vorkommende Art von kohlensaurer Kalkerde, die undurchsichtig, weiß, sehr weich, und ohne den geringsten bemerkbaren Glanz auf dem Bruche ist. Spec. Gew. nach Kirwan = 2,4 bis 2,6. Sie enthält etwas Kieselerde und an 2 Procent Thon. Die meisten Exemplare enthalten auch etwas Eisen, und Bergmann behauptet, daß salzsaure Kalk- oder Talkerde oft in ihr angetroffen werde. Deshalb soll man das Kreidenpulver mehrmals in destillirtem Wasser auskochen.

Die Kreide wird hauptsächlich benutzt, um aus ihr die Kohlensäure zu entbinden, nämlich durch Zusatz von Salz- oder Schwefelsäure, welche als mächtigere Säuren sich mit der Kalkerde verbinden, und die Kohlensäure in Gasform frei machen.

Crocus. Safran.

Crocus sativus Linn. Eine ausdauernde, im Orient einheimische, im südlichen Europa angebaute Pflanze.

Die aus den Blumen ausgezogenen Narben, von rothgelber Farbe, mit gelber Basis, in drei Einschnitte gespalten, mit etwas gerissenen Spitzen, von gewürzhaftem süßlichem Geschmacke, und einem angenehmen narkotischen Geruche, mit einem gesättigt gelben, in Weingeist und in Wasser gleich auflöslichen Farbestoffe begabt. Man hüte sich vor verschiedenen untergemischten fremdar-

tigen Dingen, die durch ihre Gestalt sich erkennen lassen, so auch vor Safran, dem das färbende Princip entzogen ist.

Crocus sativus Linn. Aechter Safran.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 8. Irideae.

Der Safran ist ein ausdauerndes Zwiebelgewächs, welches in mehreren Ländern des Orients, auch in Sicilien und in einigen Gegenden Italiens, auf den thracischen, helvetischen und pyrenäischen Alpen, in Spanien und Portugal, der Türkei u. s. w. auf Bergen und in Thälern wild wächst. In Spanien, Frankreich, Sicilien, Böhmen, Niederöstreich an der Donau, Baiern, Schlesien und andern mittägigen Provinzen Deutschlands wird er in Gärten und auf Feldern mit vielem Fleiße angebaut und durch Cultur vervollkommnet. Bei uns wird er häufig als Zierpflanze in Gärten gezogen, wo er durch Verschiedenheit und mannigfache Abänderung der Farbe der Blumen einen angenehmen Anblick gewährt.

Die Wurzel ist eine rundliche Zwiebel von der Größe einer Nuß, mit langen Wurzelfasern an ihrem untern Theile. Die spitzigen, aufrechten, dachrinnenförmigen Blätter sind alle Wurzelblätter und erscheinen nach den Blumen. Fast in der Mitte der Blätter erhebt sich ein sehr kurzer Schaft, welcher eine schöne, große, hell-violette Blume trägt. Die lange und dünne Röhre derselben erweitert sich in eine glockenförmige regelmäßige Krone, die aus sechs gleichen, ovalen Abtheilungen besteht. Der Kelch fehlt, und statt desselben umfaßt eine einblättrige häutige Scheide die Blumenkrone. Die drei Staubfäden mit pfeilförmigen Staubbeuteln befestigen sich am Ende der Röhre. Auf dem Fruchtknoten, der unten befindlich und rundlich ist, erhebt sich ein fadenförmiger Griffel, welcher sich an seinem obern Theile in drei dicke dunkel orangefarbige Narben endigt. Diese sind zuweilen hornförmig zusammengerollt, oft gezahnt oder kammförmig ausgeschnitten, und länger als die Staubfäden. Die Frucht besteht in einer ovalen dreilappigen Kapsel.

Der Safran blüht im September und October. Die Fortpflanzung desselben geschieht durch die Zwiebeln. Er vermehrt sich durch die Wurzelbrut sehr stark, besonders wenn er an demselben Orte einige Jahre stehen bleibt. Er kommt in jedem Boden, in einem offenen und ebenen Lande sehr gut fort. So zieht man in Sicilien in der Nähe von St. Filippo den Safran auf wohlgepflügtem und gedüngtem Sandboden, und pflanzt ihn in jedem Monate, außer dem November und December, legt den Saamen sehr nahe an einander und jätet alles Unkraut aus. Die erste Ernte erfolgt nach acht oder zehn Monaten.

Zur Einsammlung der officinellen Narben werden die Blumen im Herbste, eben da sie aufbrechen, oder auch kurz vorher, am frühen Morgen abgepflückt, in Säcken nach Hause gebracht, und die Fäserchen oder Narben mit einem ziemlichen Theile des Griffels selbst ausgezogen. Das Uebrige von

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0382-9

den Blumen wird als unnütz weggeworfen. Hierauf wird in einem besonders eingerichteten Ofen das Trocknen mit der größten Vorsicht vorgenommen, wobei anfänglich eine größere, nachher aber eine sehr gelinde Hitze angewendet wird. Durch dieses Trocknen erhält man von fünf Pfunden frischen Safrans nur vier Pfund trocknen. Zu einem Grane von diesem werden 14—15, und zu 16 Unzen 107,520, nach andern 203,920 Blumen erfodert.

Der Safran, wie er im Handel vorkommt, besteht nun aus den auf mancherlei Weise gekrümmten und in einander gedrehten Fäden, wovon die einzelnen, wenn man sie entwickelt, zolllang, an dem einen Ende dünn, nach dem andern Ende zu keilförmig erweitert, häutig, an diesem Ende abgestumpft und dreigekerbt, dabei dunkelroth oder rothgelb von Farbe, glänzend, an beiden Enden und zwar am dünnern Ende in einer etwas längeren Strecke, weißgelblich sind. Meistens sind einige helle Fäden mit untergemischt. Sie haben ein geringes Gewicht, sind weder feucht noch ganz trocken, sondern zähe und biegsam, lassen sich weich und etwas fettig anfühlen, und sind schwer zu pulvern. Beim Reiben färben sie die Finger, und beim Kauen den Speichel stark dunkel-gelbroth, und in geringer Menge vieles Wasser goldgelb. Der Geruch eines guten Safrans ist stark, gewürzhaft, eigenthümlich, etwas betäubend; der Geschmack bitterlich, balsamisch, etwas scharf.

Man unterscheidet im Handel verschiedene Sorten Safran, und hielt sonst den orientalischen, der aus Aegypten, Natolien und andern Gegenden des Orients bezogen wurde, für den besten. Jetzt wird er jedoch seines hohen Preises und seiner häufigen Verfälschungen wegen nicht mehr so geachtet, als der französische, bairische, östreichische; und von diesen wird vorzüglich der, welcher in der Landschaft Gatinois gebaut wird, und daher **Crocus de Gatinois** genannt wird, geschätzt. Der italienische Safran ist blässer, färbt aber doch sehr stark; der englische ist sehr trocken, leicht zu pulvern, und daher gewöhnlich schlecht. Am schlechtesten ist der spanische, welchen man meistens mit einem fetten Oele zu erhalten und schwerer zu machen sucht, er macht daher auch beim Anfühlen die Finger ölig.

Der Safran verliert durchs Alter viel an Kraft, und muß in fest zu verschließenden, steinernen oder zinnernen Gefäßen oder Büchsen fest eingedrückt und mit Blase verbunden aufbewahrt werden.

Das Pulver hat eine dunkel gelbrothe Farbe, wird durch Zerstoßen in einem gelind erwärmten Mörser bereitet, und muß nur auf kurze Zeit vorräthig gehalten werden.

Der Safran ist vielfältigen Verfälschungen unterworfen. Er wird mit Saflorblumen, lang geschnittenen Granatblumen, Ringelblumen u. s. w. vermischt, die gewöhnlich erst in einem Auszug von ächtem Safran eingeweicht werden. Man erkennt eine solche Verfälschung an den dünnen weißlichen, hellgelben oder rothgelben, aber nicht mit den charakteristischen weißgelblichen Endspitzen versehenen, sondern gleichförmig gefärbten Fäden, die sich darunter befinden. Deutlicher noch erkennt man diese Verfälschung, wenn man den Safran in Wasser aufweicht, wodurch die Gestalt der genannten Blu-

mentheile erkennbar wird, die nicht die stumpfen dreitheiligen Narben des Safrans erkennen lassen. Auch sollen die Ringelblumen eine gesättigtere röthere Tinctur geben, als ächter Safran. Bei einer groben Verfälschung des Safrans mit gekochtem geräucherten Rindfleisch finden sich schwärzliche Fäden darunter, die beim Verbrennen auf Kohlen einen Geruch wie von verbranntem Horn verbreiten. Ein mit Weingeist bereits ausgezogener Safran ist blässer von Farbe, schwächer von Geruch, färbt weniger stark, und die Farbe der einzelnen Fäden ist gleichförmig. Ein solcher Betrug ist durch Vergleichung mit ächtem Safran bald zu erkennen, etwas schwieriger aber, wenn ein solcher Safran mit ächtem vermischt worden.

Bouillon Lagrange und Vogel (Trommsd. J. XXI. 1. S. 206.) haben den Safran zerlegt. Durchs Trocknen verliert der Safran 10 Procent.

1) Flüchtige Theile. Durch Destillation mit Wasser wird ein milchiges Wasser erhalten, welches einen gewürzhaften dem des Safrans gleichen Geruch, einen bittern, scharfen und brennenden Geschmack besaß, und schwach die Lackmustinctur röthete. Es waren zwei Arten von Oel erzeugt worden: das eine war concret, weiß und schwamm auf dem Wasser, das andere flüssig, gelb und zu Boden liegend. Dieses Oel hatte den scharfen Geschmack des destillirten Wassers, aber weit stärker. Seine specifische Schwere unterschied sich wenig vom Wasser; denn die geringste Erschütterung führte es auf die Oberfläche, und es setzte sich dann nur sehr langsam ab. Dieses Oel scheint sich leichter im Wasser aufzulösen, als die andern flüchtigen Oele. Nach einiger Zeit wird es fest und bekommt ein weißes krystallinisches gleichsam glimmerartiges Ansehn, und wird dann leichter als das Wasser. Jene weiße concrete, auf dem Wasser schwimmende Materie, die gleichfalls bei der Destillation erhalten wurde, scheint demnach verändertes Safranöl zu seyn. Die Menge des Oeles läßt sich nicht angeben, da es von dem Safran sehr hartnäckig zurückgehalten wird. Weingeist über Safran abgezogen nimmt nichts vom Geruche mit über.

2) Extractive Theile. Kaltes Wasser wird in dem Augenblicke gefärbt, wo es mit dem Safran in Berührung kommt; nach 24 Stunden ist die Farbe dunkler, beinahe röthlich, die Tinctur besitzt dann einen faden, hinterher schwach bittern Geschmack. Sie röthet das Lackmuspapier, und diese Farbe läßt sich durch Abwaschen nicht abbringen. Salpetersäure in kleiner Menge macht die Farbe der Flüssigkeit dunkler, in größerer Menge hellgelb. Wenig Chlor zerstört die Farbe augenblicklich. Kalkwasser schlägt gelbliche Flocken nieder. Barytwasser erzeugt einen röthlichen sehr häufigen Niederschlag, der in Salpeter- und Salzsäure, und zum Theil in destillirtem Wasser auflöslich ist, daher denn auch die überstehende Flüssigkeit etwas gefärbt bleibt. Das krystallisirte essigsaure Blei erzeugt beinahe keinen Niederschlag, das basische hingegen einen sehr häufigen gelben. Das salpetersaure Quecksilber und das salzsaure Zinn bilden einen röthlichen Niederschlag. Alkohol schlägt weiße Flocken nieder, Aether bleibt ungefärbt über der Flüssigkeit schwimmen. Erhitzt man die wäßrige Tinctur bis zum Sieden, so sondern

sich kleine weiße Fäden ab, die sich zu Boden setzen, und die sich in allen Stücken wie Eiweiß verhalten. Raucht man die Tinctur ab, so bleibt eine röthliche glänzende Masse zurück, welche die Feuchtigkeit der Luft anzieht. Mit Alkohol behandelt wird dieses Extract in zwei Substanzen zerlegt: a) in den färbenden eigentlichen Safranstoff, der sich sowohl in Alkohol als in Wasser löst, und b) in eine gummige Materie, die man jedoch nicht von aller braunen Farbe befreien kann, und die mit Salpetersäure Schleimsäure giebt. Von 20 Grammen Safran blieben nach 15 Abkochungen nur 2 Grammen zurück, aus denen siedender Alkohol noch eine wachsartige Materie auszog.

Um die färbende Materie des Safrans, welche schon von Boerhaave als in Weingeist und Wasser auflöslich erkannt worden ist, zu erhalten, wurde derselbe mit absolutem Alkohol ausgezogen, und nach dem Abdampfen der geistigen Auszüge eine gelbröthliche Masse erhalten, die, so lange sie heiß war, glänzend und durchsichtig war, und die man in Schuppen losmachen konnte; sobald sie zu erkalten anfängt, zieht sie die Feuchtigkeit der Luft an und bekommt eine klebrige Consistenz, was aber nicht von einem Gehalt von zerfließlichen Salzen, deren sie keines enthält, herrührt. Diese Materie nannten sie Polychroit (Vielfärber, von πολυς viel und χροα die Farbe), und bezeichnen sie durch folgende Eigenschaften:

a) Sonnenlicht und Chlor zerstören das Polychroit gänzlich.

b) Eine kleine Menge färbt eine große Menge Wasser safrangelb.

c) An der Luft zerfließt es, ohne zerfließliche Salze beigemischt zu enthalten.

d) Die weingeistige Lösung wird durch Wasser nicht gefällt.

e) Einige Tropfen Schwefelsäure theilen der auf den Wänden des Glases ausgebreiteten Lösung des Polychroits eine indigblaue Farbe mit, die dann ins Lila übergeht. Dasselbe blaue Farbenspiel zeigt unter gleichen Umständen auch die geistige Safrantinctur, und die safranhaltige Opiumtinctur, weshalb die Schwefelsäure als Reagens für den Safran in dieser Tinctur benutzt werden kann.

f) Die Salpetersäure ändert die gelbe Farbe der Lösung in Grasgrün um. Alle diese Farbeänderungen werden durch mehr Säure abgeändert, und durch vieles Wasser zum Verschwinden gebracht.

g) Anhaltende Berührung des Safrans mit Terpenthinöl bleicht denselben, ohne daß das Oel gefärbt wird.

h) Kali, Kalk und Baryt bilden mit dem Polychroit theils lösliche, theils unlösliche salzartige Gemische.

i) Zeuchfaser bindet dasselbe und wird dadurch gelb gefärbt.

k) Mit dem goldgelben ätherischen Oele des Safrans bildet das Polychroit eine innige, durch Schwefelsäure unter Aufbrausen zersetzbare Verbindung.

l) In Aether ist es höchst wenig, im Fette, in den fetten und flüchtigen Oelen gar nicht löslich.

m) Der Geruch ist lieblich, dem Honig ähnlich, sein Geschmack ist bitter und stechend, wie der des Safrans, aber in höherem Grade.

n) Die Kohle des Polychroits giebt mit Kali geglüht etwas Blausäure; die Asche derselben kohlens., schwefels. und salzs. Kali, kohlens. Kalk- und Talkerde und etwas Eisen.

In 100 Theilen Safran sind nach der Analyse der Herren Bouillon Lagrange und Vogel enthalten: Wasser 10; wesentliches Oel (nach Lewis) 1,04; Gummi 6,50; Eiweiß 0,50; Polychroit, Safranstoff 65,00; wachsartige Materie 0,50; parenchymatöser Stoff 10,00; Verlust 6,46. S. = 100.

Henry (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 65. und Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 160.) stellte eine neue Untersuchung an, und fand das Polychroit noch zusammengesetzt aus einer färbenden Materie und einem flüchtigen Oele, welchem letzteren man weit mehr die arzneilichen Eigenschaften des Safrans zuschreiben müsse. Setzt man nämlich zu einer concentrirten wäßrigen Auflösung des Polychroits etwas Aetzkali oder Aetznatron, so scheidet sich der größte Theil des färbenden Stoffes in Flocken ab, und nur ein kleiner Theil bleibt mit dem flüchtigen Oele und dem Kali vereint in der Flüssigkeit. Auch in dem Safran ist das flüchtige Oel in so inniger Verbindung mit der färbenden Materie, daß es sich durch bloße Destillation nicht abscheiden läßt. Man erhält es am besten, wenn man eine Unze trocknen Safran mit 8 Unzen gesättigter Kochsalzlauge und 4 Unzen ätzender Kalilauge destillirt und für eine gute Abkochung sorgt. Auf der übergegangenen Flüssigkeit schwimmt das gelbliche, sehr stark riechende Oel des Safrans, das $\frac{1}{31}$ desselben beträgt.

Das von Henry durch Digestion des durch Kochen erhaltenen Safranextracts mit absolutem Alkohol, wodurch Gummi und Eiweißstoff ausgeschieden wurde, und dann auf die oben angegebene Weise bereitete färbende Princip hat nun folgende Eigenschaften: es ist pulverig, trocken scharlachroth, angefeuchtet gelblich, geruchlos, ein wenig bitter schmeckend, färbt den Speichel gelb, ist nur gering löslich in kaltem, etwas mehr in heißem Wasser, aber sehr löslich in starkem Weingeiste. Diese letztere Lösung wird durch Wasser nach einiger Zeit getrübt. Es löst sich in fetten und flüchtigen Oelen, in Aether und in kalischen Laugen und zwar in diesen letzteren vorzüglich dann sehr leicht, wenn sie concentrirt sind. Diese letztere Lösung hat eine schöne gelbe Farbe, und sättigt man sie mit Säuren, so scheidet sich der Farbestoff in sehr schönen gelben Flocken wieder ab. Die vegetabilischen Säuren lösen davon eine kleine Menge, und ihre Wirkung wird durch die Wärme vermehrt. Diese Lösungen haben eine dunkelrothe Farbe. Die Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure verhalten sich damit eben so, wie nach Bouillon Lagrange und Vogel das Polychroit sich damit verhielt. Bei der Behandlung mit Kupferoxyd wird bloß Wasser und Kohlensäure, und kein Stickstoffgas gebildet. Im Safran sind von diesem Farbestoffe 42 Proc. enthalten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0386-2 DFG

Durch Digestion mit Aether kann man aus dem Safran, außer flüchtigem Oel und Wachs, auch etwas Aepfelsäure ausziehen, die daher, nach Henry, zu den übrigen bekannten Bestandtheilen desselben mit hinzugefügt werden muß.

Der Safran wird sowohl äußerlich als erweichendes und schmerzlinderndes Mittel, als auch innerlich, und zwar im geistigen Auszuge oder wäßrigen Extract oder auch zweckmäßig in Pulverform gegeben, da er nur sehr wenig unauflösliche Theile enthält. Ueberdem ist er ein Bestandtheil vieler zusammengesetzten Arzneimittel.

* Croton. Das Oel. Krotonöl.

Es ist das aus den Saamen des **Croton Tiglium** (siehe **Grana Tiglii**) durch Auspressen erhaltene fette Oel. Es hat eine bernsteingelbe Farbe, die jedoch nach dem Grade der Röstung, welcher die Kerne unterworfen worden sind, etwas verschieden ausfällt. Der Geruch desselben ist stark nauseös, der Geschmack ist heiß und brennend, und das Oel bringt eine bedeutende und schmerzhafte Reizung in dem Schlunde hervor, welche oft mehrere Stunden anhält. Es ist in Alkohol und Aether schwer (Buchn. Repert. XXIV. 2. S. 309.) löslich, mit andern fetten Oelen aber in allen Verhältnissen mischbar.

Dieses Oel ist neuerlichst als ein sehr drastisches Purgirmittel wieder in Gebrauch gezogen worden. Das drastisch wirkende Princip ist aber nicht das Oel selbst, sondern begleitet nur dasselbe und kann ihm durch Alkohol entzogen werden. Es soll dieses scharfe Prinzip, nach Versuchen von Pope, in den Schalen, vorzüglich aber in der Epidermis oder der Haut, welche den Kern unmittelbar umgiebt, und auch in dem Keime enthalten seyn. Wird das Oel nach Entfernung dieser Theile aus dem Marke ausgepreßt, so soll ein sicheres und wirksames Purgirmittel, frei von dem scharf reizenden Princip, welches eine besondere Gegenanzeige gegen den Gebrauch dieses Oeles abgiebt, gewonnen werden.

Dr. Nimmo (Gräfe und Walther's J. IV. 1. S. 186. und Buchn. Repert. XV. 2. S. 234.) fand in dem Krotonöle 45 Th. eines scharfen laxirenden Stoffes und 55 Th. sehr reinen Oeles, wie Olivenöl, ohne alle abführenden Eigenschaften. Es scheint nach ihm, daß dieser scharfe Stoff (den Caventou und Brandes für eine Säure zu halten geneigt sind, vergl. **Grana Tiglii**) seinen Sitz in einer bittern, harzigen, in Alkohol und Aether löslichen Materie habe, wie in den fetten und flüchtigen Oelen. Man finde zwischen dieser Substanz und dem Elaterin (einem sehr heftigen Purgirmittel aus den Früchten der **Momordica Elaterium**, vergl. Brandes Archiv V. S. 190.; Schweigg. N. J. II. S. 329; Trommsd. N. J. VI. 1. S. 350.; Buchn. Repert. XIII. S. 271.; Pfaff's Syst. der Mat. med. VII. S. 183. und Richard's med. Botanik S. 574.) eine große Aehnlichkeit, und könnte sie also Tiglin nennen. Sie besitzt die Eigenschaft der salzbildenden vegetabilischen Substanzen nicht. Diese drastische Substanz könne in Alkohol aufgelöst als **Tinctura Tiglii** angewandt werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0387-8

Das Krotonöl soll verfälscht vorkommen, nämlich ein bloßes Kunstproduct, vielleicht Jalappenharz in kanadischem Balsam aufgelöst, oder Ricinusöl, welches mit Euphorbium digerirt worden. Buchner räth daher, das Oel aus den granis Tiglii selbst zu pressen.

Das Krotonöl wirkt schon in sehr geringen Gaben; so reichen ein, höchstens zwei Tropfen zu einer vollständigen Abführung hin, und wegen der erwähnten reizenden Eigenschaft wird empfohlen, einen Tropfen Oel in einer Drachme Alkohol aufzulösen, wodurch es auf einer großen Fläche ausgebreitet, und seine purgirende Wirkung um so sicherer werde. Caventou hat eine Seife aus Krotonöl und Natron bereitet, wodurch die Schwierigkeiten der therapeutischen Anwendung, hinsichts der genauen Bestimmung der Tropfen, vermieden werden. Die Bereitung geschieht in der Kälte, so daß man 2 Theile Oel mit einem Theile sogenannter Seifensiederlauge zusammenreibt. Wenn die Verbindung Consistenz erhalten hat, so gießt man sie in Pappdeckel, und nach einigen Tagen schneidet man die Seife in Scheiben, welche man in einem Glase mit weiter Mündung gut verstopft aufbewahrt. Diese Seife wird in der Gabe von 2 Gran verordnet. Vier Tropfen Krotonöl auf den Nabel eingerieben bringen dieselbe Wirkung hervor, wie der innerliche Gebrauch, es entsteht zugleich ein kleiner Ausschlag.

Man hat von dem Krotonöle gerühmt, daß es zu gleicher Zeit heftigen Stuhlgang, vermehrte Absonderung des Urins und Schweiß errege. Auch soll es in wiederholten Gaben mit Erfolg gegen den Bandwurm angewandt worden seyn.

Cubebae. Kubeben.

Piper Cubeba Linn. oder Piper caudatum Bergii. Ein Strauch Ostindiens.

Die getrockneten, harten, gestielten, kugeligen, netzartig runzligen Beeren, von aschgrauer Farbe, von der Größe und Gestalt des Pfeffers, einfächrig, mit einem einzelnen Saamen, von angenehmen Geruche und scharfem gewürzhaftem Geschmacke.

Piper Cubeba Linn. Der Kubebenpfeffer.
Piper caudatum Bergii. Der geschwänzte Pfeffer.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Der Kubebenpfeffer ist auf der Insel Java, Mauritius, Prinz Wales-Insel, auf Isle de France und in Guinea einheimisch. Der Stengel ist strauchartig, rundlich, gegliedert, und steigt kletternd an Baumstämmen auf. Die Blätter sind alle gestielt, aber von sehr verschiedener Gestalt; an dem untern Theile des Stengels sind sie vollkommen herzförmig-spitz, an dem obern Theile eiförmig-länglich, spitz, unten blaßgrün, 1—3 Zoll lang und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0388-4

8—12 Linien breit. Die Blüthen stehen in Kätzchen in den Winkeln der Blätter und sind getrennten Geschlechts.

Die unreifen getrockneten Früchte dieses Strauches kommen unter dem Namen Kubeben in den Handel; sie bilden runde Körner, von der Größe kleiner Erbsen, mehr oder weniger runzlig, mit dem ansitzenden dünnen 3—4 Linien langen Blüthenstielchen, von grau-schwärzlicher oder dunkelbrauner Farbe. Ihre äußere, leicht zerbrechliche, dünne, aderig-netzförmige Schale umschließt einen unausgebildeten, runden, glatten, harten, braunen oder schwärzlichen, innerhalb gelblich-weißen öligen Saamenkorn. Die Schale riecht angenehm, hat aber wenig Geschmack, der Kern hingegen hat einen bitterlichen, scharfen, pfefferartig-gewürzhaften Geschmack, der hinterdrein etwas Kühlendes hat.

Da in der neuesten Zeit der Verbrauch der Kubeben sich etwas vermehrt hat, so ist auch Klage geführt worden über Verfälschung derselben, namentlich mit Piment und mit Kreuzbeeren. Die erstere Verfälschung ist leicht zu bemerken, etwas schwieriger die andere. Die Kubebe ist eine einsaamige Beere mit einem Stiele, den man nicht abbrechen kann, ohne daß sich an der Beere eine Bruchfläche zeigt; die Kreuzbeere dagegen ist viersaamig, der Stiel gewöhnlich länger, etwas gekrümmt, und sitzt so, daß man ihn abbrechen kann, ohne daß die Beere verletzt wird. Der Geschmack unterscheidet sie überdem am bestimmtesten.

Trommsdorff (dessen J. XX. 1. S. 69.) erhielt durch Destillation mit Wasser ein völlig weißes ätherisches Oel, von einem schwachen gewürzhaften Geschmacke, der sehr erwärmend, nicht bitter, sondern campherartig war. Der Rückstand von der Destillation wurde wiederholt ausgekocht, die abgeklärten Abkochungen zur Syrupsdicke abgeraucht, und mit dem sechsfachen Gewicht Alkohol vermischt, worauf sich reichlich eine braune Substanz abschied, welche gummiger Extractivstoff war. Der geistige Auszug gab ein Extract, das zwar nach Kubeben, jedoch mehr bitterlich als gewürzhaft schmeckte, an der Luft zerfloß (von essigsaurem Kali), und sich wie gewöhnlicher Extractivstoff verhielt. Da er mit dem oxydulirten salzsauren Eisen einen reichlichen, grünlich-grauen Niederschlag gab, auch mit der Galläpfeltinctur ein starkes Präcipitat lieferte, das nach dem Trocknen glänzend und spröde ward, und auf glühenden Kohlen nach verbranntem Horn roch, so schloß Trommsdorff auf einen eigenthümlichen thierischen Stoff, der aber von Eiweiß und Kleber verschieden seyn müsse, weil er sich sonst beim Aufkochen und Abrauchen abgesondert haben würde, und der also wohl mehr der Gallerte ähnlich seyn möchte. (Die Eigenschaft den Galläpfelaufguß niederzuschlagen, ist jedoch nicht, wie Pfaff bemerkt, ein untrügliches Zeichen eines den thierischen Stoffen analogen Pflanzenstoffes.)

Aus dem getrockneten Rückstande von den Abkochungen zog Alkohol eine gelbgrüne Tinctur aus, die den aromatischen Geschmack der Kubeben noch in hohem Grade besaß. Nach dem Verdunsten blieb eine schmierige Masse von schöner grüner Farbe zurück, die auch stärker ausgetrocknet weich blieb, in

der Wärme leicht flüssig wurde, und einen sehr beißenden gewürzhaften Geschmack hatte. In der Asche des Rückstandes werden kohlensaurer und schwefelsaurer Kalk als mit einander bestehend aufgeführt.

Nach dieser Zerlegung bestehen 16 Unzen Kubeben aus: eigenthümlichem Extractivstoffe von bitterm aromatischen Geschmacke, vermischt mit einer besonderen thierischen Materie (?) und etwas essigsaurem Kali, 4 Unzen 4 Drachmen; gummigem Extractivstoffe 1 Unze 4 Dr.; schmierigem braungrünen Harze 2 Unzen 4 Dr.; wasserhellem ätherischen Oele $2\frac{2}{3}$ Dr.; holzigem Rückstande 8 Unzen. S. = 16 Unzen $6\frac{2}{3}$ Drachmen. Der Ueberschuß ist auf Rechnung von anhängender Feuchtigkeit zu schreiben.

Vauquelin (Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 162 und Taschenb. 1822. S. 195.) hat gleichfalls die Kubeben analysirt, und in denselben gefunden: ein flüchtiges dickliches Oel; ein dem Kopaivabalsam sehr ähnliches Harz; eine geringe Menge eines andern gefärbten Harzes; eine gummiartige gefärbte Materie; ein dem Extractivstoffe der Hülsenfrüchte ähnliches Princip und einige Salze.

Das flüchtige Oel wurde durch Destillation der Kubeben mit Wasser erhalten. Es war von stärkerer Consistenz als die gewöhnlichen Oele, und von einem beißenden Geschmacke, wie Pfeffermünzöl. Von $12\frac{1}{2}$ Pfunden Kubeben wurden 1 Unze und 1 Drachme erhalten; (wogegen Baume aus $2\frac{1}{2}$ Pfund 2 Unzen 1 Drachme, und Schönwald aus 10 Pfunden Kubeben $22\frac{1}{2}$ Loth Oel, also aus jedem Pfunde 9 Drachmen erhalten haben will. Schönwald hatte die Kubeben dreimal nach einander, jedesmal mit 40 Pfunden Wasser destillirt. Das Oel war von der Consistenz des Mandelöls, von dunkelgelber Farbe und mildem Geschmacke). Das destillirte Wasser hatte alkalische Eigenschaften, die bei näherer Untersuchung von Ammoniak herrührten. (Das von Trommsdorff erhaltene Destillat verhielt sich wie reines Wasser, woraus nebst der Verschiedenheit des Oeles, welches bei Trommsdorff erst dicklich wurde, als dasselbe in einem unverstopften Glase in der Nähe des Stubenofens der Luft ausgesetzt wurde, Stoltze schließt, daß Trommsdorff frischere, und Vauquelin ältere Kubeben untersucht habe.)

Das dem Kopaivabalsam ähnliche Harz wurde aus den mit Wasser ausgekochten Kubeben durch Ausziehung mit starkem Weingeiste in der Siedehitze erhalten. Beim Verdunsten blieb eine grüne flüssige Materie von unangenehmen Geruche, und bitterm, dem des Kopaivabalsams ähnlichem Geschmacke zurück, die auf Papier einen Fleck gleich den fetten Oelen machte. Erwärmt man dasselbe, so entweicht etwas flüchtiges Oel, aber das Papier behält den Flecken. Wasser zieht aus derselben etwas extractive Materie aus, die der Weingeist mit aufgelöst hatte.

Aus den von der äußeren Schale befreiten Kubeben erhält man durch Ausziehung mit Aether die balsamische Materie von viel weißerer Farbe. (Die Färbung rührt demnach, wie Stoltze vermuthet, von Chlorophyll her, welches vorzugsweise in der äußern Haut der Pflanzenkörper enthalten

ist.) Durch Sieden mit schwacher Schwefelsäure wird die Schärfe der balsamischen Materie nicht verändert, aber die Seiten des Gefäßes, worin dieses geschieht, erhalten, wo sich etwas von der Materie anhängt, eine rosenrothe bis zum Violetten sich hinüberziehende Farbe. Copaivabalsam so wie Terpenthin auf dieselbe Art behandelt, verhielten sich eben so. Diese Materie ist übrigens in den Kernen in größerer Menge vorhanden, als in der äußeren Schale.

Behandelt man das wäßrige Extract der Kubeben mit starkem Weingeiste, so zieht dieser daraus eine schön gelb gefärbte extractive Materie aus. Der übrige Theil des Extracts löst sich fast ganz in Wasser auf, Bleizucker bewirkt darin einen Niederschlag, der Aepfelsäure und Farbestoff enthält, und demnächst wird durch Bleiessig eine gummiartige Materie gefällt. Gelöst bleibt das dem Extractivstoffe der Hülsenfrüchte ähnliche Princip, oder die eigenthümliche thierisch-vegetabilische Materie, von einem ekelhaften Geruche und dem der rohen Erbsen ähnlichen Geschmacke, die die Galläpfeltinctur reichlich niederschlug, und aus Gummi und Eiweiß zusammengesetzt sich zeigte.

1000 Th. Kubeben gaben 65 Th. Asche, die aus kohlens., phosphors. und salzs. Kali, phosphors. Talkerde und Spuren von Eisen und Mangan bestand.

Die Kubeben werden in Pulverform gegen Blennorrhöe in Gaben von 10—30 Gran verordnet; auch machen sie einen Bestandtheil der aromatischen Kräuter aus. Der Nutzen, den die Kubeben beim innerlichen Gebrauche gezeigt haben, ist wohl der balsamartigen Materie zuzuschreiben.

* Cucumis. Der Saamen.

Cucumis sativus Linn. Die gemeine Gurke.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Syngenesia.
Juss. Cl. XV. Ord. 2. Cucurbitaceae.

Das Vaterland dieser jetzt so allgemein verbreiteten und bekannten Pflanze ist nicht bekannt; die ersten Saamen derselben sollen aus Ostindien gekommen seyn.

Die Pflanze hat einen sehr langen, eckigen, rauh und zottig anzufühlenden, liegenden Stengel, welcher gabelförmige Ranken treibt. Die Blätter sind eckig, an der Basis herzförmig. Der Kelch ist glockenförmig, fünfzähnig; die goldgelbe Blumenkrone gleichfalls glockenförmig, fünftheilig. Die Früchte sind anfangs grün oder weißlich, und werden bei der völligen Reife dunkel oder heller gelb; inwendig sind sie in drei Fächer getheilt, welche viele eiförmige, platte, spitze, weiße, lederartige Saamen, mit einem milchigen Kerne einschließen. Diese Saamen, die Schleim und ein fettes Oel enthalten, geben mit Wasser zerstoßen eine Emulsion, die noch bisweilen als kühlendes Mittel bei Entzündungen der Nieren, der Harnröhre und Harnblase verordnet wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0391-2

* Culilabanum. Die Rinde. Kulilabanrinde.

Laurus Culilaban Linn. Der Kulilabanlorbeer. Der bittere Zimmtlorbeer.

Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VI. Ord. 4. Laurineae.

Dieser ansehnliche Baum, der auf den molukkischen Inseln, Amboina ꝛc. einheimisch ist, hat große, dreifach nervige, entgegengesetzte Blätter. Die Rinde kommt in flachen Stücken, die kaum gebogen sind, oft noch mit einigen Spuren der grauen runzligen Oberhaut, von welcher sie befreit worden, 1—2 Zoll breit und etwa ¼ Zoll dick sind. Die Farbe ist mehr oder weniger braun, die Structur faserig, der Geschmack sehr gewürzhaft, eigenthümlich, etwas nelkenartig, so auch der Geruch.

Herr Schloß (Trommsd. N. J. VIII. 2. 1824. S. 106.) erhielt geistige Auszüge von sehr angenehmen Geruche, und bitterscharfem, gewürzhaftem Geschmacke. Das aus 6 Unzen Rinde abgeschiedene Harz wog 2 Drachmen 12 Gran, und hatte den Geruch und Geschmack der Tinctur, nur in einem höheren Grade. Die geistige Auflösung desselben röthete die Lackmustinctur. In Aether war das Harz nicht völlig löslich.

Außerdem wurde aus den wäßrigen Abkochungen durch Niederschlagung mit essigsaurem Blei u. s. w. eine braune Substanz erhalten, die für einen eigenthümlichen bittern Extractivstoff erklärt wird.

Bei der Destillation mit Wasser gaben 12 Unzen Rinde reichlich eine Drachme eines ätherischen Oeles, von weißer oder hellgelber Farbe, und einem eigenthümlichen Geruche, fast wie ein Gemisch aus Nelken- und Cajeputöl. (Hagen erhielt aus 3 Pfund Rinde nur 1½ Quentchen Oel). Es ist schwerer als Wasser, wird aber durch rauchende Salpetersäure nicht entzündet, sondern unter heftiger Erhitzung in eine carmoisinrothe Flüssigkeit verwandelt, aus welcher Wasser einen harzartigen Stoff ausschied, welcher auf glühenden Kohlen den Geruch des Bernsteins verbreitete.

Der Gebrauch dieser Rinde in der Wassersucht und als magenstärkendes Mittel ist jetzt nur noch selten.

Cuminum. Der Saamen. Mutterkümmel oder römischer Kümmel.

Cuminum Cyminum Linn. Eine einjährige orientalische in Europa angebaute Pflanze.

Längliche, gestreifte, gelblichgraue, ein wenig rauhe Saamen, von gewürzhaftem etwas widerlichem Geschmacke und Geruche.

Cuminum Cyminum Linn. Der feinblättrige Kreutzkümmel. Der ägyptische Kümmel.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0392-8

Diese Pflanze ist in Aegypten und Aethiopien einheimisch, wird aber besonders in Italien, auf Malta und im südlicheren Europa angebaut.

Der Stengel ist einjährig, rund, gestreift, ästig, und erreicht eine Höhe von 1—1½ Fuß. Die Blätter stehen abwechselnd auf kurzen, scheidenartigen, am Rande weißen Blattstielen; sie sind dreizählig, die Blättchen sind sehr schmal, fast haarförmig und glatt. Die Blumendolden, gewöhnlich von rother, zuweilen auch von weißer Farbe, stehen auf seitlich entspringenden glatten Blüthenstielen. Die Frucht ist länglich, an beiden Enden verdünnt, an den Seiten etwas eingedrückt, ungefähr drei Linien lang, und in der Mitte eine Linie breit, von gelblichgrauer Farbe. Die beiden Karpellen sind an einem borstenförmigen bis an den Grund gespaltenen Saamenhalter befestigt; auf dem Rücken derselben sind drei schmale, etwas erhabene, fast glatte Rippen, zwei andere bilden den Rand, zwischen diesen liegen die vier breiteren, ebenfalls erhabenen, mit gekrümmten borstenförmigen Haaren besetzten Thälerchen (Juga secundaria), unter denen sich die Streifen (Vittae) finden.

Diese Früchte, die gewöhnlich durch Abreiben einen großen Theil der Behaarung verloren haben, sind unter dem Namen Kram- oder Mutterkümmel bekannt, sie besitzen einen starken, ganz eigenthümlichen, aber unangenehmen aromatischen Geruch und bitterlichen Geschmack. Sie enthalten bisweilen ½ ätherisches Oel.

Der Mutterkümmel wird bisweilen als Carminativum, häufiger in den Haushaltungen, als Gewürz zum Brote, oder wie in Holland, zum Käse, oft auch als Thierarznei benutzt, wo er unter den Hafer gemischt den Pferden Freßlust erregen soll.

Cuprum. Kupfer.

Wird in den Bergwerkshütten aus den Erzen ausgeschmolzen.

Ein dehnbares rothes Metall, von beinahe 9,0 spec. Gew. Aufgelöst wird es von der eisenblausauren Kaliflüssigkeit mit braunrother Farbe niedergeschlagen, und von zugegossener Aetzammoniakflüssigkeit himmelblau gefärbt.

Dieses Metall war seit den ältesten Zeiten, weit früher als das Eisen bekannt. Es machte den Hauptbestandtheil in den Waffen und schneidenden Werkzeugen der ältesten Völker aus, welche gewöhnlich aus Kupfer mit Zinn versetzt bestanden. Die Griechen und Römer erhielten die größte Menge ihres Kupfers von der Insel Cypern, woher es den Namen Cyprium bekam, welches nachher in Cuprum umgeändert worden.

Das Kupfer kommt ziemlich häufig vor, und zwar gediegen, oder als Oxydul oder Oxyd, am häufigsten aber durch Schwefel vererzt. Gediegen kommt es in den reichen Kupfergruben Nordamerikas oft in großer Menge vor. Die bei weitem größte Menge Kupfer wird aber aus dem Schwefelkupfer, welches gewöhnlich noch andere Schwefelmetalle, als Schwefeleisen ꝛc., bei-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0393-4

gemischt enthält, dadurch gewonnen, daß dieses wiederholt geröstet und geschmolzen wird, wobei sich Arsenik und Schwefel verflüchtigen, das Kupfer aber ausgeschmolzen und nachher noch vielfach gereinigt wird. Aus den Cämentwassern (schwefelsaures Kupfer enthaltend) wird es durch Eisen metallisch ausgeschieden.

Dieses Metall hat eine eigenthümliche rothbraune Farbe, ist stark glänzend, hart, klingend, sehr hämmerbar und streckbar, von beträchtlicher Zähigkeit und 8,667 bis 8,723 spec. Schwere. Es hat einen etwas adstringirenden Geschmack, und läßt beim Reiben einen beschwerlichen eigenen Geruch erkennen, der sich auch zeigt, wenn man es mit schweißigen Händen anfaßt. Bei einem Grade der Wärme, der noch lange nicht an die Glühhitze reicht, bemerkt man auf dem polirten Kupfer verschiedene Reihen prismatischer Farben. Das rothe Farbenbild jeder Reihe wird man immer dem Ende zunächst bemerken, welches am meisten erhitzt worden ist. Ohne Zweifel muß diese Wirkung der Oxydation zugeschrieben werden, denn bei einem größeren Grade der Hitze geht dieselbe rascher von statten, so daß sich dünne pulverige Schuppen auf der Oberfläche bilden, die man leicht abreiben kann (Kupferasche, Kupferhammerschlag). Zu gleicher Zeit erhält die Flamme der Feuerung eine schöne bläulichgrüne Farbe. Bei einem noch größeren Hitzgrade, bei + 788, schmilzt das Kupfer mit bläulichgrüner Farbe, kocht und wird zum Theil im metallischen Zustande verflüchtigt. Bei langsamen Erkalten krystallisirt es.

Das Kupfer hat zum Sauerstoffe nur eine schwache Verwandtschaft; zwar rostet es schon an der Luft etwas, doch ist die gebildete Rostschicht äußerst dünn, und beschützt das darunter liegende Metall. Die Verbindungen des Kupfers mit dem Sauerstoffe werden von dem Wasserstoffgase bei einer Temperatur aufgehoben und das Metall reducirt, welche bei weitem noch nicht zum Glühen reicht. Erhitzt man Kupferoxyd auf einem kleinen eisernen, an einem Korke befestigten Löffel, und taucht ihn schnell in eine mit Wasserstoffgas gefüllte Flasche, welche dabei durch den Kork verschlossen wird, so wird das Oxyd augenblicklich glühend, scheint zu brennen, und die inneren Wände der Flasche beschlagen sich mit Wasser. Nach dem Erkalten findet man das Kupfer reducirt.

Wir kennen vom Kupfer drei Oxydationsstufen: das Oxydul, das Oxyd und das Hyperoxyd.

a) Das Oxydul kommt in der Natur unter dem Namen Rothkupfererz vor; künstlich wird es dadurch gewonnen, daß 5 Th. Kupferoxyd mit 4 Th. feinen Kupferfeilspänen vermischt und in einem bedeckten Tiegel geglüht werden, wobei der früher an 5 Th. Kupferoxyd gebundene Sauerstoff sich gleichförmig den 4 Th. metallischen Kupfers mittheilt, und hierdurch alles Kupfer in den Zustand des Oxyduls versetzt wird. Dieses hat eine kupferrothe Farbe. Es wird auch zum Theil gebildet, wenn kaustisches Ammoniak mit metallischem Kupfer digerirt wird. Diese Auflösung erhält sich in verschlossenen Gefäßen ungefärbt, aber an der Luft wird sie oxydirt und nimmt eine blaue Farbe an. Dieses geschieht mit einer solchen Geschwindigkeit, daß, wenn

man in einenr etwas feinen Strahl die Flüssigkeit ein paar Fuß hoch in ein offenes Gefäß hineingießt, die ausgegossene ungefärbte Flüssigkeit blau wird, ehe sie in das Gefäß herunter kommt. Legt man in die blau gewordene Flüssigkeit ein Kupferblech hinein und verstopft das Gefäß, so verliert die Flüssigkeit nach einiger Zeit ihre Farbe wieder dadurch, daß das Oxyd des Kupfers zum Oxydul wieder hergestellt wird, und dieses kann wechselsweise wiederholt werden, so lange das Ammoniak nicht gesättigt ist. Das Kupferoxydul besteht aus 88,78 Kupfer und 11,22 Sauerstoff.

b) Das Oxyd. Man erhält dasselbe sowohl, wenn Kupfer beim freien Zutritte der Luft oder des Sauerstoffgases verbrennt, als wenn salpetersaures oder kohlensaures Kupferoxyd durch Glühen zersetzt wird. Es ist kohlschwarz und behält seine Schwärze im feinsten Pulver bei. Es bildet die Basis der gewöhnlichen Kupfersalze. Wird eine Auflösung von Kupfer durch Eintröpfeln in eine kalte Lauge von kaustischem Kali gefällt, so entsteht ein blauer, voluminöser Niederschlag, welcher das Hydrat des Oxyds ist (d. h. gebundenes Wasser enthält), welches sich zwar in der Luft erhält, bei der Wärme des kochenden Wassers aber zersetzt wird, und schwarzes Oxyd giebt. Dieses Kupferoxydhydrats bedient man sich, wegen seiner schönen blauen Farbe, als Malerfarbe.

Das Kupferoxyd wird leicht und mit Wärmeentwickelung von den Säuren aufgelöst. Im Glühen verbinden sich auch die Alkalien und alkalischen Erden damit. Kaustisches Ammoniak löst die Salze des Kupferoxyds mit einer schönen dunkelblauen Farbe auf. Von den Oelen wird es mit grüner Farbe aufgelöst, so daß Oel in kupfernen Gefäßen aufbewahrt, sich davon grün färbt. Das Kupferoxyd besteht aus 79,825 Metall und 20,175 Sauerstoff. Der Kupferhammerschlag besteht der Hauptsache nach aus Oxyd, enthält aber auch noch oxydulirtes und metallisches Kupfer.

c) Das Hyperoxyd. Es ist von Thénard vermittelst des Wasserstoffhyperoxyds dargestellt worden, und hat eine dunkel gelbbraune Farbe. Es enthält nach Thénard doppelt so viel Sauerstoff als das Oxyd. Es ist noch als problematisch anzusehen.

Das Kupfer verbindet sich aber nicht nur mit dem Sauerstoffe, sondern auch mit vielen andern einfachen Stoffen, als mit dem Chlor, Jod, dem Phosphor, dem Schwefel und den meisten Metallen. Die Verbindung mit dem Chlor erfolgt flammend, wenn man nämlich Kupferfeilspähne in Chlorgas hineinträgt. Von den Legirungen des Kupfers mit andern Metallen sind viele in der Oekonomie und den Künsten von der größten Wichtigkeit. Wird Zinn mit Kupfer zusammengeschmolzen, so entsteht die unter dem Namen Bronze bekannte Zusammensetzung. Die specifische Schwere der zusammengeschmolzenen Masse ist immer größer, als man der Berechnung der Quantitäten und der specifischen Gewichte ihrer Bestandtheile nach annehmen müßte. Die zur Benutzung gebräuchlichen harten, klingenden und dauerhaften Compositionen aus Kupfer und andern Metallen (vergl. Zincum) werden gewöhnlich nicht von Kupfer und Zinn allein gemacht, sondern er-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0395-6

halten noch andere Zusätze, nämlich Blei, Zink oder Arsenik. Mit dem Arsenik bildet das Kupfer eine weiße spröde Composition, die unter dem Namen Tombak (Weißkupfer) bekannt ist; mit dem Zinke das Messing, welches noch nach den Verhältnissen der beiden Bestandtheile verschiedene andere Namen führt.

Das Kupfer ist sehr geneigt, im oxydirten Zustande mit allen Säuren Verbindungen einzugehen, und die Kupfersalze zu bilden, welche sonst **Sales Veneris** genannt wurden, denn **Venus** war der mythologische Name des Kupfers. Diese Salze zeichnen sich im Allgemeinen durch folgende Eigenschaften aus: a) sie sind meistens auflöslich in Wasser, und ihre Auflösungen haben eine grüne oder blaue Farbe, oder erlangen erst an der Luft eine dieser Farben; b) setzt man diesen Auflösungen Ammoniak im Ueberschusse zu, so nehmen sie eine dunkelblaue Farbe an; c) das eisenblausaure Kali schlägt die Kupfersalze röthlich braun nieder; d) Gallusäure giebt einen braunen Niederschlag; e) Schwefelwasserstoffgas und Schwefelwasserstoffkali erzeugen einen braunen Niederschlag; f) senkt man eine Eisenplatte in die Kupfersalzauflösungen, so schlägt sie metallisches Kupfer nieder, und zwar sehr rasch, wenn ein Ueberschuß an Säuren vorhanden ist.

Diese Eigenschaften der auflöslichen Kupfersalze werden die Gegenwart des Kupfers in einer verdächtigen Substanz leicht erkennen lassen, welches Verfahren dadurch noch genauer gemacht wird, daß man die verdächtige Substanz einäschert, und die gewonnene Asche theils mit Ammoniak, theils mit Säure (am besten Salpetersäure) digerirt, wo dann die blaue Färbung des Aetzammoniaks und das Verhalten der gewonnenen salpetersauren Kupferauflösung gegen die angegebenen Reagentien die Gegenwart des Kupfers mit Gewißheit darthun werden. Das Kupfer gehört nämlich, wie bekannt, zu den dem menschlichen Organismus äußerst schädlichen Stoffen, denn wenn es gleich im metallischen Zustande von keiner Wirksamkeit seyn mag, so wird es doch, seiner leichten Auflöslichkeit wegen, von dem Magensafte sehr bald zerfressen, und in ein schädliches Kupfersalz umgeändert. Der frühere Gebrauch der Kupferfeile gegen die Wasserscheu ist daher mit Recht, als ein überdem unsicheres Mittel, ganz außer Gebrauch gekommen.

Bei Vergiftungen mit Kupfer sind Brechmittel in der Regel nicht nöthig, weil die Kupfersalze schon an sich Erbrechen erregen, und größtentheils schon dadurch aus dem Magen gebracht werden, und es ist nur nöthig, das Erbrechen durch Trinken warmen Wassers zu erleichtern, und die Schärfe des Giftes durch ölige Mittel, Butter, Milch und Schleim abzustumpfen. Ist nun der größte Theil ausgeworfen, so werden Alkalien, Schwefelkalk, oder besser, stark mit Schwefelwasserstoff angeschwängertes Wasser, die letzten Theile des Kupfersalzes zersetzen, und weniger schädlich machen. Der von **Duval** und **Orfila** als unzweifelhaftes Gegenmittel empfohlene Zucker ist noch nicht anderweitig als solches bestätigt worden. **Ure** meint, daß, so wie der Alkohol die Kraft besitzt, in den Aethern die stärkste Salzsäure und Jodinewasserstoffsäure zu neutralisiren, so auch der Zucker die Kupfer- und Bleioxyde zu neutralisiren vermöge. (Vergl. **Aerugo** S. 26.)

Das Kupfer ist die Basis mehrerer in der Medicin und in den Gewerben gebräuchlicher Salze, bisweilen wird auch zu Versuchen ein chemisch reines Kupfer erfodert, welches man durch Niederschlagung aus einer Kupferauflösung, z. B. aus einer Lösung des blauen Vitriols, vermittelst einer Eisenplatte erhalten kann. Doch bei weitem häufiger wird das Kupfer zur Verfertigung von Geschirren und Gefäßen gebraucht, bei deren Benutzung jedoch die größte Vorsicht nöthig ist, damit kein Nachtheil für die Gesundheit daraus entstehe, da, wie bereits erwähnt, das Kupfer nicht nur an der Luft sich oxydirt, sondern auch mit allen Säuren leicht lösliche Salze bildet, durch welche nicht nur säuerliche und salzige, sondern auch süße und ölige Flüssigkeiten, besonders wenn sie darin erkalten, verunreinigt werden. Dasselbe gilt, wenn gleich in geringerem Grade, von den aus Messing gefertigten Geschirren. Der Gebrauch kupferner und messingener Geschirre zu pharmaceutischen Zwecken ist daher sehr eingeschränkt, und niemals muß die darin erhitzte Flüssigkeit bis zum Erkalten stehen bleiben.

Durch die Eigenschaft des Kupfers, mit dem Zinn bei einer weit niedrigern Temperatur, als zur Schmelzung des Kupfers erfoderlich ist, sich zu verbinden, ist uns ein Mittel an die Hand gegeben, die schädlichen Wirkungen des Kupfers zu verhüten; es gründet sich nämlich hierauf die Methode, Kupfergefäße zu verzinnen. Zu diesem Behufe werden die neuen kupfernen Geschirre erst geschabt oder rauh gemacht, die gebrauchten recht blank gescheuert, hierauf erhitzt, mit Salmiak gerieben, dem häufig noch etwas Harz zugesetzt wird, und diese Stelle sogleich mit dem geschmolzenen, und zwar dem reinsten englischen Zinne durch neue Wischlappen in Berührung gebracht, und hiermit fortgefahren, bis alle Stellen mit Zinn gehörig bedeckt sind. Der Salmiak dient zur Auflösung des beim Erhitzen gebildeten Kupferoxyduls, und das Harz wird zugesetzt, um es durch seinen Kohlenstoff zu reduciren. Das überflüssige Zinn wird abgestrichen und ausgegossen. Es adhärirt eine außerordentlich geringe Menge Zinn an dem Kupfer, und zwar ist sie so gering, daß man sie beinahe für unzureichend halten möchte, den schädlichen Wirkungen des Kupfers vorzubeugen, wenn es nicht allein darauf ankäme, die Berührung der Flüssigkeiten mit dem Kupfer durch eine wenn auch noch so dünne Schicht eines andern Metalles zu verhindern. Doch müssen auch selbst die gut verzinnten kupfernen Geschirre niemals zur Bereitung saurer, säuerlicher, salziger oder öliger, zum innern Gebrauche bestimmter Arzneien benutzt werden, weil auch selbst bei vollständiger Verzinnung durch das dem Zinn etwa beigemischte Blei eine Verunreinigung herbeigeführt werden kann. Bei unvollkommener Verzinnung, wo also beide Metalle mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, kann man diese als eine galvanische Kette bildend ansehen, wodurch zwar die Auflöslichkeit der Metalle befördert wird, doch kann sich diese größere Auflöslichkeit nicht, wie man befürchten zu müssen glaubt, auf das Kupfer erstrecken, da sich dieses im negativ-elektrischen Zustande (d. h. im Zustande einer Säure), das Zinn aber im positiv-elektrischen Zustande (d. h. im Zustande einer Base), wie schon

bei völliger Verzinnung, befinden muß, dieses letztere demnach nur leichter aufgelöst werden wird. Der Erfolg muß hier derselbe seyn, als bei der durch Davy gemachten Entdeckung, das Zerfressen des Kupferbeschlages der Schiffe durch das Seewasser dadurch zu verhindern, daß es mit Zinkplatten an verschiedenen Stellen in Berührung gesetzt wird, wodurch, wie in der galvanischen Kette, das Kupfer in den negativ-elektrischen Zustand gesetzt wird. Das Zinn verhält sich aber gegen Kupfer ganz ähnlich, wie das Zink, ersteres wird + elektrisch, letzteres — elektrisch, und ist nur hinsichts der Stärke des Gegensatzes verschieden, da es wie bekannt dem Zink nachsteht. Die Wirkung kann mithin nicht an sich, sondern nur hinsichtlich der Stärke verschieden seyn. Um zu sehen, wie diese Ansicht mit der Erfahrung übereinstimme, wurden in einer kupfernen und in einer schlecht verzinnten Pfanne, an welcher das Kupfer schon an mehreren Stellen sichtlich war, Gemische aus 6 Unzen Wasser mit einer Unze rohen starken Essigs gleichzeitig erhitzt, und eine gleiche Zeit hindurch im Sieden erhalten, und dann sogleich ausgegossen. Die Flüssigkeit A aus der kupfernen Pfanne zeigte schon durch eine grünliche Färbung sich als sehr kupferhaltig, welches durch Aetzammoniak und eisenblausaures Kali leicht außer allen Zweifel gesetzt werden konnte. Die Flüssigkeit B aus der schlecht verzinnten kupfernen Pfanne zeigte nur eine gelbliche Färbung von dem Essig, die durch Aetzammoniak zwar etwas dunkler, aber nicht ins Grünliche verändert wurde; eisenblausaures Kali färbte sich nicht rothbraun, sondern schmutzig grünlich, und es setzte sich ein eben so gefärbter Niederschlag ab; Goldauflösung aber brachte sogleich die schöne Farbe von Cassius Goldpurpur zum Vorschein, wodurch die Gegenwart des Zinnes aufs deutlichste dargethan wurde. Die schmutzig grünliche Färbung durch eisenblausaures Kali konnte vielleicht von einem zu starken Zusatze des Prüfungsmittels entstanden seyn. Es wurde daher in die übrige, deutlich sauer reagirende Flüssigkeit eine blanke Messerklinge gestellt, und das Ganze einige Zeit in der Wärme der Ruhe überlassen; hier aber zeigte die Messerklinge einen unverkennbaren Kupferüberzug, so daß der Essig beide Metalle, Zinn und Kupfer, letzteres jedoch in geringerem Grade als in der gar nicht verzinnten Kupferpfanne, aufgelöst hatte. Es geht demnach hieraus hervor, daß niemals schlecht verzinnte kupferne Geschirre in Gebrauch gezogen werden dürfen, wenn gleich das Zinn in einem auflöslicheren Zustande sich befindet, als das Kupfer.

Cuprum sulphuricum venale. Vitriolum Cupri seu coeruleum. Sulphas cupricus. Kupfervitriol. Cyprischer oder blauer Vitriol.

Wird in Bergwerkshütten mehrentheils aus dem Schwefelkupfer bereitet.

Ein Salz in himmelblauen, durchscheinenden, mit der Zeit unscheinbar werdenden Krystallen oder krystallinischen Stücken, zer-

rieben weißlich, von herbem Geschmacke, in zwei Theilen Wasser auflöslich, in Alkohol unlöslich, aus Kupferoxyd, Schwefelsäure und Wasser bestehend. Es sey mit Zink und vorzüglich mit schwefelsaurem Eisen nicht zu sehr verunreinigt; letzteres wird durch Auflösung in Aetzammoniakflüssigkeit erkannt.

Der Kupfervitriol, auch blauer Galizenstein genannt, scheint schon den Griechen und Römern bekannt gewesen zu seyn. Galenus, der in der letzten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt lebte, kannte die Hauptbestandtheile desselben. Den Namen Cyprischer Vitriol hat er von der Insel Cypern, auf welcher er zuerst bereitet worden ist.

Man findet dieses Salz in Höhlungen von Kupferbergwerken aus Kupferkiesen natürlich ausgewittert, oft ist es auch im Wasser aufgelöst, welches dann Cämentwasser genannt wird, und aus welchem es durchs Verdunsten gewonnen werden kann. Solche Cämentwasser giebt es in Ungarn, Schweden, Irland und in verschiedenen Theilen Englands in so großer Menge, daß sie nicht zur Darstellung des blauen Vitriols verbraucht werden können, sondern durch hineingeworfene Stücken alten Eisens zersetzt, und zur Gewinnung des metallischen Kupfers benutzt werden.

Man gewinnt dieses Salz aber auch im Großen durchs Verwittern und Rösten des Kupferkieses, welcher nachher ausgelaugt, und die Lauge krystallisirt wird. Da aber, wie bei Cuprum erwähnt, die Kupferkiese auch andere Metalle, und vorzüglich Eisen enthalten, so ist der auf diese Weise gewonnene Kupfervitriol auch mit den Salzen der andern Metalle, als schwefelsaurem Zink, vorzüglich aber mit Eisenvitriol sehr verunreinigt, durch welche Verunreinigungen die schöne blaue Farbe des Salzes oft in eine grünlichblaue oder schmutzig blaue umgeändert wird. Bisweilen sind auch noch Nickel, Kobalt und wohl gar Arsenik beigemischt. Bei der angegebenen Probe mit Aetzammoniakflüssigkeit, welche im Uebermaße zugesetzt Kupfer- und Zinkoxyd auflöst, bleibt das Eisen im oxydirten Zustande unaufgelöst.

Die Bereitung eines reinen schwefelsauren Kupferoxyds gehört in den 2ten Theil.

Curcuma. Die Wurzel. Gilbwurzel. Kurkume.

Curcuma longa Linn. Eine ausdauernde Pflanze Ostindiens.

Die walzenförmige oder längliche, höckerige, runzlige, schwere, zähe Wurzel (Wurzelstock), außen gelblichbraun, innen gesättigt gelb, glänzende Punkte erkennen lassend, von bitterm und gewürzhaftem Geschmacke.

Curcuma longa Linn. Die lange Kurkume. Die lange Gilbwurzel. Amomum Curcuma Jacq.

Linn. Cl. I. Monandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IV. Ord. 2. Scitamineae.

Diese Pflanze wächst in Ostindien in feuchten Gegenden theils wild, theils angebaut, vorzüglich in China, Cochinchina, Malakka, Java u. s. w.

Die Wurzel ist knollig und knotig, dicht, länglich, geringelt, etwas ästig, faserig, umgebogen, von der Dicke eines Fingers, außen von blaßgelber, getrocknet braungelber, inwendig dunkler gelber Farbe, ins Röthliche übergehend. Sie treibt keine Stengel. Die Wurzelblätter sind fast 1½ Fuß lang, glatt, glänzend, breitlancettförmig, spitzig und mit langen Stielen versehen, welche am Grunde mit ihren Scheiden sich umgeben und einen Stengel zu bilden scheinen. Aus der Mitte der Blätter erhebt sich auf einem dünnen Schafte eine dicke, längliche, fast eiförmige Aehre, welche dachziegelförmig mit länglichen, spitzigen, etwas zurückgebogenen Schuppen bedeckt, die weißgelblichen, stiellosen Blumen enthält. Der Kelch ist einblättrig, trichterförmig und unregelmäßig. Die Wurzel pflegt man nach der Blüthezeit einzusammeln. Frisch besitzt sie einen etwas stärkeren ingwerartigen Geruch, und der etwas bitterliche, gewürzhafte, ein wenig scharfe Geschmack derselben bringt im Munde eine angenehme Wärme hervor. Beim Kauen färbt sie den Speichel gelb, auch theilt sie dem Wasser und dem Weingeiste ihre Farbe mit.

Außer dieser langen Kurkume kommt im Handel auch noch eine andere Sorte, nämlich die runde Kurkume vor, welche rundlich, birnförmig, knollig, fast von der Größe einer welschen Nuß ist, und von einer andern gleichfalls in Ostindien einheimischen Art derselben Gattung abstammt.

Der gelbe Farbestoff dieser Wurzel ist Kurkumin, harziges Kurkumagelb genannt worden. (John in s. chem. Schriften IV. S. 116. und Vogel in Schweigg. J. XVIII. S. 212.) Er ist für sich dargestellt bräunlichgelb, in Weingeist auflöslich, in wäßrigen Alkalien wird er mit rother Farbe aufgelöst; die meisten Säuren machen die gelbe Farbe desselben etwas blässer, die Alkalien braunroth, Boraxsäure gelbroth. Diese letztere Färbung ist mit verglaster Boraxsäure viel schwächer, als mit unverglaster; auch wird das durch Boraxsäure geröthete Kurkumepulver durch Zusatz von Vitriolöl oder einer andern starken Mineralsäure dunkelroth. Fügt man zu dieser dunkelrothen Flüssigkeit überschüssiges Ammoniak oder Kali, so erfolgt violette Färbung, die jedoch bald einer braungelben Platz macht.

Die Bestandtheile der Wurzel sind nach John: gelbes flüchtiges Oel 1; harziges Kurkumagelb (Kurkumin) 10—11; extractives Kurkumagelb 11—12; graues Gummi 14; Holzfaser, nebst in Wasser und Weingeist nicht, aber in Kali löslicher Materie, 57; Wasser nebst Verlust 5—7.

Vogel und Pelletier destillirten mit Wasser, von der abgedampften Abkochung nahm Alkohol eine bräunlichrothe Farbe an; aus dem geistigen Extract zog Aether den gelben Farbestoff aus, welcher der beträchtlichste Theil ist; Wasser wirkt wenig auf diesen. Der Rückstand ist ein brauner Farbestoff. Nach ihrer Analyse enthält die Gilbwurzel: Holzfaser; Stärke-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0400-8

mehl; einen gelben Farbestoff, der sich in Alkohol, Aether, in den fetten und ätherischen Oelen leicht auflöst und von den Alkalien geröthet wird; einen andern braunen Farbestoff, etwas weniges Gummi, ein scharfes, flüchtiges Oel von starkem Geruche, und etwas weniges salzsauren Kalk.

Die Gilbwurzel wird in Indien als Gewürz gebraucht. In der Medicin ist sie als tonisches, harntreibendes, reizendes und antiscorbutisches Mittel gebraucht worden; jetzt wird sie nur noch zur Färbung einiger Salben und Oele benutzt. Der mit Wasser ausgezogene Farbestoff dient als bekanntes Reagens auf Alkalien.

Cydonia. Der Saamen. Quittenkörner.

Cydonia vulgaris Persooni. Ein orientalischer, in Gärten und Weinbergen angebauter Baum.

Längliche, fast zusammengedrückte, braune, mit vielem Schleime überzogene Saamen, welchen sie dem Wasser mittheilen.

Cydonia vulgaris Pers. Gemeiner Quittenbaum.
Pyrus Cydonia Linn.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 4. Pentagynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Der Quittenbaum, seit lange bekannt und jetzt in Europa einheimisch, ist ursprünglich auf der Insel Kreta zu Hause. Nach Plinius's Zeugniß war er bei der alten Stadt Cydon, wovon er seinen Namen hat, sehr häufig. Er ist ein niedriger Baum von 10—12 Fuß Höhe, der keine große Stärke erhält und zuweilen auch strauchartig ist. Sein Stamm wächst meistens krumm, erhebt sich wenig, und zertheilt sich in viele unbewaffnete, abwechselnde, ausgebreite Aeste. Die jüngeren Aeste sind filzig, die älteren dunkel rothbraun und mit kleinen zerstreuten Warzen besetzt. Die Rinde des Stammes ist schwärzlich-braun. Die Blätter sind abwechselnd, kurzgestielt, weich, ganz ungetheilt, eiförmig, oben hellgrün und glatt, unten weißlich und filzig, so wie auch die Blattstiele. Die kurzgestielten, großen, röthlichweißen, wohlriechenden Blüthen stehen einzeln an den Spitzen der jungen Triebe. Der Kelch ist bleibend, einblättrig, weißfilzig, in fünf Einschnitte getheilt. Die Blumenkrone besteht aus fünf vertieften, etwas rundlichen Blumenblättern. Die Frucht, Quitte, ist nach den Arten äpfel- oder birnähnlich, sehr wohlriechend, kurzgestielt, filzig, mit dem Kelche gekrönt, von verschiedener Größe, eckig, an der Spitze tief eingedrückt, anfangs von grüner, bei der Reife von gelber Farbe, und enthält in der Mitte eines festen und fleischigen Markes fünf knorpelartige Fächer, in welchen die Saamenkerne enthalten sind.

Der Quittenbaum blüht im Mai und Juni und bringt im October reife Früchte.

Die Saamen, den Aepfelkernen ähnlich, sind länglich, zusammengedrückt,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0401-3

Tafel.

Zu Seite 290.

	Sorte, Form und äußeres Ansehen.	Farbe der kalten Infusion.	Decoct.		Reactionsversuche mit						Gehalt an Alkaloid	
			Farbe.	Absatz.	Brechweinstein.	thierischem Leim.	Galläpfeltinctur.	neutralem kleesaurem Kali.	schwefelsaurem Eisen.	salzsaurem Eisen.	in einem Pfunde.	in hundert Pfunden.
Huanuco.	Schwere Mittelröhren.	Schwach gelblich.	Gesättigte Milchtrübung; gelbröthlich braun.	Gering. Farbe des dunklen Ochers.	Sehr wenig getrübt.	Keine Veränderung.	Weiße flockige Ausscheidung.	Kaum getrübt.	Ganz blaßgrünlich.	Dunkel gelbgrün.	Cinchonin 210 Gran.	43,750 Unzen.
	Mittelröhren mit einzelnen dicken untermischt, von mäßiger Schwere.	Ebenso.	Ebenso.	Etwas dunkler.	Ebenso.	Ebenso.	Geringe weiße flockige Ausscheidung.	Ebenso.	Etwas weniges dunkler.	Hell gelbgrün.	Cinchonin 100 Gran.	20,833 Unzen.
Huamalies.	Feine und mittelfeine Röhren und flachere Stücke.	Wie ganz heller Franzwein.	Etwas mehr röthlich, als bei den Flavasorten; nicht so milchig.	Unbedeutend. Schmutzig gelbbraun.	Keine Veränderung.	Ebenso.	Schwach gelblich. Opalisirend.	Wenig opalisirend.	Keine Veränderung.	Ganz hellgrün gefärbt.	Cinchonin 60 Gran.	12,500 Unzen.
	Dicke warzige Röhren und flache Stücke.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Wenig opalisirend.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 75 Gran.	15,625 Unzen.
Loxa.	Feine rehgraue Röhren von ziemlich frischem Ansehn. Fast ohne Querrisse.	Ebenso.	Von braungelber Farbe. Wie gesättigte Regiadecocte.	Nicht bedeutend. Zimmtfarben.	Getrübt.	Schwach getrübt.	Schwach getrübt.	Schwach getrübt.	Kaum gefärbt.	Hellgrün.	—	—
	Ziemlich dicke Röhren und Stücke, von mäßiger Schwere und gewöhnlicher Farbe.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Stark getrübt.	Stark getrübt.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Grün.	Cinchonin 4⅓ Gran. Schwefelsaures Chinin 12 Gran.	0,972 u. 2,500 u. 3,472 u.
China Jaen, Blasse Ten-China.	Größtentheils feine und Mittelröhren. Eine Sorte in dicken Röhren durchweg eben so.	Ebenso.	Von schönem gesättigtem Ansehn; ein wenig heller als das der Loxa.	Nicht bedeutend. Zwischen Zimmt- und Kermesfarbe.	Getrübt.	Stark getrübt.	Kaum getrübt.	Schwach getrübt.	Ebenso.	Hellgrün.	—	—
China Pseudo-Loxa.	Naturelle Waare von frischem Ansehn.	Etwas dunkler als heller Franzwein.	Ebenso.	Ebenso.	Schwach opalisirend.	Weiße flockige Ausscheidung.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Grün.	—	—
China Regia.	Unbedeckte große und breite, flache Stücke.	Wie heller Franzwein.	Sehr gesättigte Milchtrübung; gelbröthlichbraun.	Nicht bedeutend; helle Kermesfarbe.	Etwas getrübt.	Keine Veränderung.	Gelblichweiße Fällung.	Geringer schmutzigröthlicher pulveriger Niederschlag.	Ganz hellgrau-grün. Getrübt.	Hell bouteillengrün. Klar.	Cinchonin eine Spur. Schwefelsaures Chinin 150 Gran.	31,250 Unzen.
	Bedeckte breite und flache Stücke. (Stammrinden.)	Ebenso.	Ebenso.	Nicht bedeutend. Farbe, nicht ganz so hell.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Etwas geringerer Niederschlag; sonst ebenso.	Ebenso.	Farbe ebenso, aber opalisirend.	Schwefelsaures Chinin 134 Gran.	27,917 Unzen.
	Unbedeckte flache, sehr leichte Stücke.	Wie sehr heller Franzwein. Kaum gefärbt.	Sehr gesättigt, wie von der besten Regia.	Nicht bedeutend. Dunkel gelbbraun.	Ebenso.	Ebenso.	Schmutzig gelblichweißer Absatz. Flockig.	Kaum getrübt.	Graugrünliche Färbung.	Hell bouteillengrüne Färbung.	Cinchonin 5 Gran. Schwefelsaures Chinin 67 Gran.	1,042 u. 13,958 u. 15,000 u.
China flava dura.	Feine, mittelfeine und Mittel-Röhren und flache Stücke, von sehr frischem Ansehn.	Deutlich röthlich.	Etwas mehr röthlich, nicht so milchig, als die Decocte von Regia.	Unbedeutend. Beinahe kermesfarbig.	Keine Veränderung.	Ebenso.	Getrübt.	Opalisirend.	Keine Veränderung.	Ganz hellgrün.	Cinchonin 30 Gran. Schwefelsaures Chinin 32 Gran.	6,250 u. 6,667 u. 12,917 u.
China flava fibrosa.	Mittelfeine scheckige (chagrinirte) Röhren von frischem Ansehn.	Kaum gefärbt	Ebenso.	Unbedeutend. Etwas dunkler.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 20 Gran. Schwefelsaures Chinin 11 Gran.	4,167 u. 2,292 u. 6,459 u.
	Flache chagrinirte (mit Flechten besetzte) Stücke.	Ebenso.	Ebenso.	Unbedeutend. Beinahe kermesfarbig.	Opalisirend.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 30 Gran. Schwefelsaures Chinin 25 Gran.	6,250 u. 5,208 u. 11,458 u.
China rubra.	Feine Röhren von frischem Ansehn.	Wie dunkler Graveswein.	Ochergelb ins Röthliche.	Nicht bedeutend stark; dunkel schmutziggelb ins Röthliche.	Schmutzig pomeranzenfarbiger starker Niederschlag.	Keine Veränderung.	Gelbliche Fällung.	Schmutzig pomeranzenfarbige Fällung.	Schmutzig gelbe Trübung.	Gelbgrünliche klare Färbung.	Cinchonin 70 Gran. Schwefelsaures Chinin 77 Gran.	14,583 u. 16,042 u. 30,625 u.
	Dicke Mittelröhren von bedeutender Schwere.	Wie heller Graveswein.	Von schmutzig dunkler Ockerfarbe.	Geringe. Braun.	Hellgelber starker Niederschlag.	Ebenso.	Milchweiße Fällung.	Weißliche Trübung.	Etwas dunkler gefärbt.	Hell bouteillengrüne Färbung.	Cinchonin 184 Gran. Schwefelsaures Chinin 9 Gran.	38,333 u. 1,875 u. 40,208 u.
	Große und breite flache Stücke, von frischem braunrothem Ansehn.	Wie dunkler Gravesswein.	Wie Goldschwefel.	Sehr bedeutend. Farbe des Goldschwefels.	Röthlichweißer starker Niederschlag.	Ebenso.	Röthliche Fällung.	Pfirschblüthfarbige Fällung.	Aschgraue Trübung.	Hellgrüne Färbung.	Cinchonin 90 Gran. Schwefelsaures Chinin 15 Gran.	18,750 u. 3,125 u. 21,875 u.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0403-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0404-1
DFG

eckig, ungleich gestaltet, an einem Ende stumpf, am andern spitzig, auf einer Seite glatt, auf der andern bauchig, auswendig braun, glänzend, inwendig weiß. Sie sind geruchlos, haben aber einen schleimigen, milden Geschmack, und enthalten vielen Schleim. Dieser ist in der äußern Schale enthalten, und wird aus den unzerquetschten Saamen von kaltem Wasser leicht aufgenommen. Ein Theil Saamen macht 40 Th. Wasser bei anhaltendem Schütteln sehr schleimig, wobei weder Zerstoßen der Saamen, noch Digestionswärme nöthig ist, welches sogar von baierischen Pharmakopöen verboten wird, damit nicht die Blausäure aus den Schalen mit ausgezogen werde.

Der Quittenschleim ist durchsichtig und wird von dem essigsauren Blei reichlich in hellen weißen Flocken niedergeschlagen; derselbe Erfolg ist von oxydulirtem salzsauren Zinn, nur ist der Niederschlag noch reichlicher; salzsaures Eisen färbt ihn bläulichgrün (von Gerbestoff, wie Pfaff vermuthet, oder Blausäure). Werden die Saamen zerstoßen, so geht etwas Eiweißstoff und fein zertheiltes Stärkemehl in den Quittenschleim über.

Die Quittensaamen werden allein zur Bereitung des Quittenschleimes benutzt, welcher als linderndes Mittel, besonders in Augenentzündungen, oft mit dem Bleizucker, von dem er jedoch niedergeschlagen wird, vereint, empfohlen wird.

Aus den Früchten, die roh ungenießbar sind, werden wohlschmeckende Gelées u. s. w. bereitet.

Daucus. Der rohe eingedickte Saft. Roher Mohrrübensaft.

Wird aus den Wurzeln von **Daucus Carota Linn.**; einer zweijährigen angebauten Pflanze Europas, durch Ausziehen des Saftes und Eindicken bereitet.

Eine dicke Flüssigkeit, von der Consistenz eines dicken Honigsaftes, von brauner Farbe und süßem Geschmacke. Man sehe darauf, daß er nicht sauer, auch nicht mit Kupfer verunreinigt sey, was durch ein hineingestecktes polirtes Eisen entdeckt wird, endlich daß er nicht angebrannt schmecke.

Daucus Carota Linn. Die gemeine Mohrrübe.
Linn. Cl. V. Pentandria: Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese allgemein bekannte Pflanze wächst gewöhnlich auf trocknen Wiesen, an Feldern, Wegen und Zäunen, wird aber besonders häufig in Gärten und auf dem Felde cultivirt.

Die Wurzel ist weißgelblich, hart, dünn, spindelförmig, geht tief in den Boden, und macht hin und wieder kleine Wurzelfasern. Die abwechselnden Blätter umfassen den Stengel, sind groß, weich, 2—3mal gefiedert. Die weißen oder blaßröthlichen Blümchen stehen in zusammengesetzten Dolden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0406-2

Tafel.

Zu Seite 290.

	Sorte, Form und äußeres Ansehen.	Farbe der kalten Infusion.	Decoct.		Reactionsversuche mit						Gehalt an Alkaloid	
			Farbe.	Absatz.	Brechweinstein.	thierischem Leim.	Galläpfeltinctur.	neutralem kleesaurem Kali.	schwefelsaurem Eisen.	salzsaurem Eisen.	in einem Pfunde.	in hundert Pfunden.
Huanuco.	Schwere Mittelröhren.	Schwach gelblich.	Gesättigte Milchtrübung; gelbröthlich braun.	Gering. Farbe des dunklen Ochers.	Sehr wenig getrübt.	Keine Veränderung.	Weiße flockige Ausscheidung.	Kaum getrübt.	Ganz blaßgrünlich.	Dunkel gelbgrün.	Cinchonin 210 Gran.	43,750 Unzen.
	Mittelröhren mit einzelnen dicken untermischt, von mäßiger Schwere.	Ebenso.	Ebenso.	Etwas dunkler.	Ebenso.	Ebenso.	Geringe weiße flockige Ausscheidung.	Ebenso.	Etwas weniges dunkler.	Hell gelbgrün.	Cinchonin 100 Gran.	20,833 Unzen.
Huamalies.	Feine und mittelfeine Röhren und flachere Stücke.	Wie ganz heller Franzwein.	Etwas mehr röthlich, als bei den Flavasorten; nicht so milchig.	Unbedeutend. Schmutzig gelbbraun.	Keine Veränderung.	Ebenso.	Schwach gelblich. Opalisirend.	Wenig opalisirend.	Keine Veränderung.	Ganz hellgrün gefärbt.	Cinchonin 60 Gran.	12,500 Unzen.
	Dicke warzige Röhren und flache Stücke.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Wenig opalisirend.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 75 Gran.	15,625 Unzen.
Loxa.	Feine rehgraue Röhren von ziemlich frischem Ansehn. Fast ohne Querrisse.	Ebenso.	Von braungelber Farbe. Wie gesättigte Regiadecocte.	Nicht bedeutend. Zimmtfarben.	Getrübt.	Schwach getrübt.	Schwach getrübt.	Schwach getrübt.	Kaum gefärbt.	Hellgrün.	—	—
	Ziemlich dicke Röhren und Stücke, von mäßiger Schwere und gewöhnlicher Farbe.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Stark getrübt.	Stark getrübt.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Grün.	Cinchonin 4⅓ Gran. Schwefelsaures Chinin 12 Gran.	0,972 u. 2,500 u. 3,472 u.
China Jaen, Blasse Ten-China.	Größtentheils feine und Mittelröhren. Eine Sorte in dicken Röhren durchweg eben so.	Ebenso.	Von schönem gesättigtem Ansehn; ein wenig heller als das der Loxa.	Nicht bedeutend. Zwischen Zimmt- und Kermesfarbe.	Getrübt.	Stark getrübt.	Kaum getrübt.	Schwach getrübt.	Ebenso.	Hellgrün.	—	—
China Pseudo-Loxa.	Naturelle Waare von frischem Ansehn.	Etwas dunkler als heller Franzwein.	Ebenso.	Ebenso.	Schwach opalisirend.	Weiße flockige Ausscheidung.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Grün.	—	—
China Regia.	Unbedeckte große und breite, flache Stücke.	Wie heller Franzwein.	Sehr gesättigte Milchtrübung; gelbröthlichbraun.	Nicht bedeutend; helle Kermesfarbe.	Etwas getrübt.	Keine Veränderung.	Gelblichweiße Fällung.	Geringer schmutzigröthlicher pulveriger Niederschlag.	Ganz hellgrau-grün. Getrübt.	Hell bouteillengrün. Klar.	Cinchonin eine Spur. Schwefelsaures Chinin 150 Gran.	31,250 Unzen.
	Bedeckte breite und flache Stücke. (Stammrinden.)	Ebenso.	Ebenso.	Nicht bedeutend. Farbe, nicht ganz so hell.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Etwas geringerer Niederschlag; sonst ebenso.	Ebenso.	Farbe ebenso, aber opalisirend.	Schwefelsaures Chinin 134 Gran.	27,917 Unzen.
	Unbedeckte flache, sehr leichte Stücke.	Wie sehr heller Franzwein. Kaum gefärbt.	Sehr gesättigt, wie von der besten Regia.	Nicht bedeutend. Dunkel gelbbraun.	Ebenso.	Ebenso.	Schmutzig gelblichweißer Absatz. Flockig.	Kaum getrübt.	Graugrünliche Färbung.	Hell bouteillengrüne Färbung.	Cinchonin 5 Gran. Schwefelsaures Chinin 67 Gran.	1,042 u. 13,958 u. 15,000 u.
China flava dura.	Feine, mittelfeine und Mittel-Röhren und flache Stücke, von sehr frischem Ansehn.	Deutlich röthlich.	Etwas mehr röthlich, nicht so milchig, als die Decocte von Regia.	Unbedeutend. Beinahe kermesfarbig.	Keine Veränderung.	Ebenso.	Getrübt.	Opalisirend.	Keine Veränderung.	Ganz hellgrün.	Cinchonin 30 Gran. Schwefelsaures Chinin 32 Gran.	6,250 u. 6,667 u. 12,917 u.
China flava fibrosa.	Mittelfeine scheckige (chagrinirte) Röhren von frischem Ansehn.	Kaum gefärbt	Ebenso.	Unbedeutend. Etwas dunkler.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 20 Gran. Schwefelsaures Chinin 11 Gran.	4,167 u. 2,292 u. 6,459 u.
	Flache chagrinirte (mit Flechten besetzte) Stücke.	Ebenso.	Ebenso.	Unbedeutend. Beinahe kermesfarbig.	Opalisirend.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Ebenso.	Cinchonin 30 Gran. Schwefelsaures Chinin 25 Gran.	6,250 u. 5,208 u. 11,458 u.
China rubra.	Feine Röhren von frischem Ansehn.	Wie dunkler Graveswein.	Ochergelb ins Röthliche.	Nicht bedeutend stark; dunkel schmutziggelb ins Röthliche.	Schmutzig pomeranzenfarbiger starker Niederschlag.	Keine Veränderung.	Gelbliche Fällung.	Schmutzig pomeranzenfarbige Fällung.	Schmutzig gelbe Trübung.	Gelbgrünliche klare Färbung.	Cinchonin 70 Gran. Schwefelsaures Chinin 77 Gran.	14,583 u. 16,042 u. 30,625 u.
	Dicke Mittelröhren von bedeutender Schwere.	Wie heller Graveswein.	Von schmutzig dunkler Ockerfarbe.	Geringe. Braun.	Hellgelber starker Niederschlag.	Ebenso.	Milchweiße Fällung.	Weißliche Trübung.	Etwas dunkler gefärbt.	Hell bouteillengrüne Färbung.	Cinchonin 184 Gran. Schwefelsaures Chinin 9 Gran.	38,333 u. 1,875 u. 40,208 u.
	Große und breite flache Stücke, von frischem braunrothem Ansehn.	Wie dunkler Gravesswein.	Wie Goldschwefel.	Sehr bedeutend. Farbe des Goldschwefels.	Röthlichweißer starker Niederschlag.	Ebenso.	Röthliche Fällung.	Pfirschblüthfarbige Fällung.	Aschgraue Trübung.	Hellgrüne Färbung.	Cinchonin 90 Gran. Schwefelsaures Chinin 15 Gran.	18,750 u. 3,125 u. 21,875 u.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0403-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0404-1
DFG

eckig, ungleich gestaltet, an einem Ende stumpf, am andern spitzig, auf einer Seite glatt, auf der andern bauchig, auswendig braun, glänzend, inwendig weiß. Sie sind geruchlos, haben aber einen schleimigen, milden Geschmack, und enthalten vielen Schleim. Dieser ist in der äußern Schale enthalten, und wird aus den unzerquetschten Saamen von kaltem Wasser leicht aufgenommen. Ein Theil Saamen macht 40 Th. Wasser bei anhaltendem Schütteln sehr schleimig, wobei weder Zerstoßen der Saamen, noch Digestionswärme nöthig ist, welches sogar von baierischen Pharmakopöen verboten wird, damit nicht die Blausäure aus den Schalen mit ausgezogen werde.

Der Quittenschleim ist durchsichtig und wird von dem essigsauren Blei reichlich in hellen weißen Flocken niedergeschlagen; derselbe Erfolg ist von oxydulirtem salzsauren Zinn, nur ist der Niederschlag noch reichlicher; salzsaures Eisen färbt ihn bläulichgrün (von Gerbestoff, wie Pfaff vermuthet, oder Blausäure). Werden die Saamen zerstoßen, so geht etwas Eiweißstoff und fein zertheiltes Stärkemehl in den Quittenschleim über.

Die Quittensaamen werden allein zur Bereitung des Quittenschleimes benutzt, welcher als linderndes Mittel, besonders in Augenentzündungen, oft mit dem Bleizucker, von dem er jedoch niedergeschlagen wird, vereint, empfohlen wird.

Aus den Früchten, die roh ungenießbar sind, werden wohlschmeckende Gelées u. s. w. bereitet.

Daucus. Der rohe eingedickte Saft. Roher Mohrrübensaft.

Wird aus den Wurzeln von **Daucus Carota Linn.**; einer zweijährigen angebauten Pflanze Europas, durch Ausziehen des Saftes und Eindicken bereitet.

Eine dicke Flüssigkeit, von der Consistenz eines dicken Honigsaftes, von brauner Farbe und süßem Geschmacke. Man sehe darauf, daß er nicht sauer, auch nicht mit Kupfer verunreinigt sey, was durch ein hineingestecktes polirtes Eisen entdeckt wird, endlich daß er nicht angebrannt schmecke.

Daucus Carota Linn. Die gemeine Mohrrübe.
Linn. Cl. V. Pentandria: Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese allgemein bekannte Pflanze wächst gewöhnlich auf trocknen Wiesen, an Feldern, Wegen und Zäunen, wird aber besonders häufig in Gärten und auf dem Felde cultivirt.

Die Wurzel ist weißgelblich, hart, dünn, spindelförmig, geht tief in den Boden, und macht hin und wieder kleine Wurzelfasern. Die abwechselnden Blätter umfassen den Stengel, sind groß, weich, 2—3mal gefiedert. Die weißen oder blaßröthlichen Blümchen stehen in zusammengesetzten Dolden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0406-2

Die Blüthezeit ist Juni bis August, die Zeit der Saamenreife der September.

Durch Cultur wird die Wurzel dicker, fleischiger, saftig und schmackhaft. Es giebt davon einige Varietäten von verschiedener Farbe und Güte, mit gelber, goldgelber, dunkelgelber und weißer aber unschmackhafter Wurzel.

Zum pharmaceutischen Gebrauche dient die Gartenmöhre im frischen Zustande; sie besitzt einen eigenthümlichen, wenig gewürzhaften Geruch und süßen, etwas schleimigen Geschmack. Aus dem frisch gepreßten Safte wird durch Eindicken der gebräuchliche Möhrensaft bereitet, welcher zwar auch auf dem Wege des Handels zu beziehen ist, der aber, da die Gelbmöhre überall zu Hause ist, zweckmäßig in jeder Apotheke selbst bereitet wird, um vor schlechter Bereitung und Verunreinigung sicher zu seyn. Der käufliche muß, ehe er in den Gebrauch gezogen werden kann, auf die angezeigte Weise vorher geprüft werden. Der frisch ausgepreßte Saft enthält nach Einhoff: Wasser 86,38; Eiweiß 0,86; Schleimzucker 8,13; Pflanzenfaser 4,63. Nach Bouillon Lagrange enthalten die Möhren: rothen unkrystallisirbaren Zucker, Stärkemehl, sauren äpfelsauren Kalk und einen gelben Farbestoff.

Die zum Brei zerriebenen Möhren sollen als Aufschlag in carcinomatösen Geschwüren den Gestank und selbst den Schmerz sehr vermindern.

Bisweilen werden auch noch die Saamen, **Semen Dauci vulgaris s. sylvestris**, in Gebrauch gezogen. Diese müssen von der wilden Möhre eingesammelt werden, weil die Saamen der Gartenmöhre geringere Kräfte besitzen sollen. Die Saamen sind auf der einen Seite, flach, auf der andern erhaben, gefurcht, grau, kurzborstig und von gewürzhaft bitterlichem Geschmacke. Sie enthalten ätherisches Oel, Gummi und Gerbestoff. Sie werden in Pulverform verordnet.

* Dictamnus. Die Wurzel. Weiße Diptamwurzel.

Dictamnus albus Linn. Der weiße Diptam.

Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 21. Rutaceae.

Diese schöne ausdauernde Pflanze wächst in den Wäldern und bergigen Gegenden des mittägigen Europas, in Italien, Frankreich, der Schweiz, im südlichen Deutschland, und wird auch häufig in Gärten zur Zierde gezogen. Sie verbreitet einen starken durchdringenden, der Citrone ähnlichen, jedoch nicht so angenehmen Geruch, welcher von dem in den unzähligen, über alle Theile der Pflanze verbreiteten Drüsen oder Bläschen enthaltenen flüchtigen Oele herrührt. Sie ist daher auch, vorzüglich in den südlicheren Ländern, bei heitern warmen Tagen mit einem ätherischen brennbaren Dunste umgeben, der sich entzündet, sobald man ein brennendes Papier in die Nähe der Pflanze bringt, und alsdann besonders in stillen dunkeln Sommernächten eine große lichte Flamme bildet, die aber keineswegs die Pflanze beschädigt. Die Wurzel ist weiß, dick und ästig; der Stengel aufrecht, rund, nicht ästig, 2—3 Fuß und drüber hoch, röthlich, gestreift, rauh und drüsig. Die abwechselnden Blätter sind ungepaart-gefiedert, den Eschenblättern

ähnlich (daher die Pflanze auch Fraxinella heißt); die Blättchen gegenüberstehend, eiförmig, dunkelgrün, glänzend, hin und wieder mit durchsichtigen Punkten bezeichnet. Die wohlriechenden Blumen sind blaßroth, dunkel oder purpurroth gestreift, oder ganz weiß, und bilden eine schöne große zusammengesetzte Traube am Ende des Stengels. Der Kelch ist fünfblättrig und schwarzröthlich; die große Blumenkrone öffnet sich unregelmäßig und ist fünfblättrig. Die zehn Staubfäden sind pfriemenförmig, so lang als die Blumenkrone, und mit vierseitigen Staubbeuteln versehen.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli.

Die frische Wurzel, welche im April und Mai eingesammelt wird, ist länglich, fingersdick, saftig, fleischig, weiß, in der Mitte holzig, von einem bittern scharfen, gewürzhaften Geschmacke, und einem starken, widrigen, bocksartigen Geruche, welche aber beide durchs Trocknen fast gänzlich verloren gehen. In den Apotheken wird bloß die von ihrem mittleren, holzigen, unwirksamen Theile befreite, liniendicke, sich von selbst in fingerslange und bisweilen auch fingersdicke röhrenförmige Stücke aufrollende Rinde der Wurzel aufbewahrt. Je dünner dieselbe ist, um desto wirksamer soll sie seyn. Sie muß nicht zu alt und wurmstichig seyn.

Der Aufguß ist bitter, und wird von schwefelsaurem Eisen nicht verändert.

Digitalis. Das Kraut. Purpurfingerhutskraut.

Digitalis purpurea Linn. Eine zweijährige auf Bergen in der Schweiz und in Deutschland wachsende Pflanze.

Die länglichen oder länglich-lancettförmigen, an der Basis verdünnten, sitzenden, scharf gekerbten, runzligen, mehr oder weniger filzigen Blätter, von bitterlich scharfem Geschmacke. Es ist in der ersten Blüthezeit von in bergigen Gegenden wild wachsenden, nicht von im Garten gezogenen Pflanzen zu sammeln. Es werde im Schatten und in vom Lichte entfernten Behältern getrocknet, auch nicht über ein Jahr aufbewahrt. Vorsichtig aufzubewahren. Die Gabe bis auf zwei Gran.

Digitalis purpurea Linn. Der rothe Fingerhut.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 2. Angiospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 7. Scrophulariae.

Der purpurrothe Fingerhut wächst in mehreren Gegenden Deutschlands, in der Schweiz, überhaupt im südlichen Europa. Man findet ihn häufig in steinigen, sandigen, bergigen und waldigen Gegenden, an Wegen, an den Rändern der Wälder und an Feldern. Seiner schönen Blumen wegen wird er auch in Gärten zur Zierde gezogen.

Die Wurzel ist zaserig, und treibt einen aufrechten, einfachen, 2—3 Fuß hohen, dicken, runden und rauhen Stengel. Die Blätter, besonders

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0408-4

die unteren, sind ziemlich groß, abwechselnd, oben dunkelgrün und runzlig, unten blässer. Die großen, schönen, purpurrothen, zuweilen auch weißen, inwendig etwas haarigen, und buntfleckigen, zolllangen Blumen bilden, an ihren kurzen Stielen einzeln abwärts hängend, und fast alle nach einer Seite hin gerichtet, eine aufrechte, einen Fuß und drüber lange Blumenähre am Ende des Stengels. Die Stiele sind etwas haarig, und an ihrer Basis mit einem kleinen Blatte in Gestalt eines Nebenblättchens versehen. Der Kelch ist einblättrig, fünftheilig; die Blumenkrone einblättrig und glockenförmig. Die Frucht ist eine eiförmige Kapsel mit vielen kleinen Saamen.

Diese zu den scharfen Giftpflanzen Deutschlands gehörende Pflanze blüht im Juni bis August.

Die der Vorschrift gemäß nur von der wildwachsenden Pflanze beim Anfange der Blüthe und bei trocknem Wetter gesammelten Blätter besitzen einen unangenehmen, ekelhaften, scharf bitterlichen Geschmack, und gequetscht einen eigenen widrigen Geruch, der sich aber beim Trocknen verliert. Die getrockneten Blätter dürfen ihre grüne Farbe nicht verloren haben, und es möchte zweckmäßig seyn, nach Buchner's Vorschlag sie zerkleinert in verstopften Flaschen vor der Sonne geschützt aufzubewahren, so wie auch das sogleich nach dem Trocknen bereitete Pulver, da der wirksame Bestandtheil, wie wir weiter unten sehen werden, aus der Luft Feuchtigkeit anzieht, und leicht zersetzt werden kann.

Zuweilen sollen die Blätter des Fingerhutes verwechselt werden mit den Blättern des Wollkrautes (**Verbascum Thapsus Linn.**), welche aber dicker, auf beiden Seiten wollig, viel weicher anzufühlen, und weißlich oder graugrün sind; so auch mit den scharf anzufühlenden, am Rande ungekerbten, mit kleinen Borsten besetzten Blättern des Beinwells (**Symphytum officinale L.**).

Der gesättigte kalte Aufguß des rothen Fingerhutes ist braun, geruchlos, von sehr scharfem bitterm Geschmacke. Vier Unzen Wasser nehmen von einer halben Unze Kraut durch eine kalte Digestion von 36 Stunden beinahe alles Auflösliche und Schmeckbare auf. Schwefelsaure Eisenauflösung verändert die Farbe des beinahe zur Wasserklarheit verdünnten Aufgusses ins Grüne, der gesättigte Aufguß wird dann schwarzgrün; salpetersaure Quecksilberauflösung bringt darin einen fleischfarbigen Niederschlag hervor, ähnlich demjenigen, welchen dieses Reagens auch in der Auflösung des Extractstoffes des Schierlings bewirkt. Die Abkochung des rothen Fingerhutes wird vom schwefelsauren Eisen beinahe schwarz wie Tinte. Der rectificirte Weingeist zieht in der Digestionswärme eine sehr gesättigt grüne, sehr bitter, scharf und widrig schmeckende Tinctur aus, die von zugesetztem Wasser nicht milchig wird.

Déstouches (Trommsd. J. XVIII. 2. S. 419.) erhielt aus 4 Unzen Kraut durch Infusion 2 Unzen eines sehr braunen und glänzenden Extracts, das viel essigsaures Kali enthielt. Das rückständige Kraut wurde mit Alkohol ausgezogen; dieser Auszug bis auf einige Unzen concentrirt, setzte beim Erkalten einen Niederschlag von 75 Granen ab, der eine dunkelgrüne Farbe,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0409-2

einen unangenehmen giftigen Geruch, und die Consistenz des Talges hatte, jedoch klebriger war, und im Uebrigen alle Eigenschaften des grünen färbenden Harzes der Pflanzen besaß, das wahrscheinlich dem stark anhängenden narkotischen Princip seinen Geruch verdankte. Die überstehende geistige Flüssigkeit war braungelb, und gab abgeraucht ein Extract, dem noch etwas grünfärbende Materie beigemischt war.

Haase (Dissert. de Digitali purp. Lips. 1812.) erhielt aus 100 Th. der getrockneten Blätter: Faserstoff, mit etwas verhärtetem Eiweiß verbunden, 52,0; gummige und schleimige Substanz, mit sehr wenig Kali und Weinstein, 15,0; sauerkleesaures Kali 2,0; harzige Substanz 5,5; Extractivstoff 15,0; Wasser, vom Geruche des Heues, 5,5; Verlust 5. Haase hält die harzige Substanz für den vorzüglich wirksamen Bestandtheil.

Le Royer (Schweigg. N. J. XII. 1824. S. 110.) behandelte ein Pfund Digitalis, wie das Kraut im Handel vorkommt, erst in der Kälte, dann in der Wärme mit Aether, und erhielt eine gelblichgrüne Tinctur von bitterm Geschmack. Verdampft gab sie einen Rückstand, welcher das Ansehn eines Harzes, eine unerträgliche Bitterkeit hatte, und beim Kauen auf der Zunge eine betäubende Empfindung erregte. Wurde dieser Rückstand der Luft ausgesetzt, so zog er begierig Feuchtigkeit an, und theilte sich bei Behandlung mit Wasser in zwei Theile, von denen der eine aufgelöst blieb, der andere sich niederschlug, und alle Eigenschaften des Chlorophylls hatte. Dieses war jedoch nicht rein, sondern hielt noch einige Antheile der bittern Materie zurück, von welcher man es, selbst durch öfters wiederholte warme Auswaschungen, nicht ganz befreien konnte. Die wäßrige Auflösung des Aetherrückstandes röthete das Lackmuspapier. Um nun die angezeigte freie Säure zu sättigen, und den wahrscheinlich mit ihr verbundenen bittern Stoff zu trennen, wurde die Auflösung mit Bleioxydhydrat versetzt. Das entstandene Bleisalz war auflöslich, und konnte folglich von dem Bitterstoffe nicht getrennt werden. Die ganze Auflösung wurde daher zur Trockniß abgeraucht, und die Masse mit rectificirtem Aether behandelt. Durch Verdampfung des Aethers erhielt man eine braune schmierige Substanz, welche, wiewohl langsam, die blaue Farbe des gerötheten Lackmuspapiers wieder herstellte. (Diese konnte aber auch von der braunen Farbe der Auflösung herrühren und es wäre wohl das Verhalten gegen Säuren zu untersuchen gewesen.) Durch diese letzte Eigenschaft, so wie durch ihre Bitterkeit, schließt sie sich an die Alkaloide an, weicht jedoch durch ihre außerordentliche Zerfließbarkeit wieder ab, welche auch eine deutliche Krystallisation verhindert. (Diese große Zerfließbarkeit möchte vielleicht einem Gehalte an auflöslichen Salzen zugeschrieben werden können.) Wird jedoch ein Tropfen einer alkoholischen Auflösung auf einer Glastafel über der Weingeistlampe vorsichtig verdampft, so kann man unter einem Mikroskop mit 200facher Vergrößerung zahlreiche, deutliche, verschieden geformte Krystalle erkennen. Diese Substanz wird Digitalin genannt, und als der wirksame Bestandtheil der Pflanze angesehen, indem physiologische Versuche die große Wirksamkeit derselben dargethan haben. Ein Gran

reichte hin, ein Kaninchen zu tödten, ja schon ein halber Gran tödtete ein anderes Kaninchen nach 15 Minuten, indem bei beiden die Respiration sich verminderte, der Puls bis auf 60 Schläge herunterfiel und unregelmäßig wurde. Alle Lebensäußerungen nahmen nach und nach ab, und die Thiere starben ohne Unruhe und Beklemmung, gleichsam als wenn sie von dem Wachen zum Schlaf übergingen.

Die Digitalis wird im wäßrigen Aufgusse, in der geistigen und ätherisch-geistigen Tinctur, im Extract, und auch zweckmäßig in Pulverform verordnet, da sie die Hälfte auflösliche Theile enthält. Als Gegenmittel gegen die schädlichen Folgen des Fingerhuts hat man Milch, in welcher Foenum graecum abgekocht worden, und Opium, äußerlich Vesicatorien angewendet.

Nach den Erfahrungen der Engländer soll das Pulver und der Aufguß in der Wassersucht und die Tinctur in der Schwindsucht den Vorzug haben.

Dulcamara. Die Stengel. Bittersüßstengel.

Solanum Dulcamara Linn. Ein klimmender, in waldigen und sumpfigen Gegenden Deutschlands häufiger Strauch.

Runde Zweige von der Dicke eines Federkieles, mit einer leichten graulichbräunlichen Rinde bedeckt, von einem süßlichen bitterlichscharfen Geschmacke, und etwas narkotischem Geruche. Im Späthherbste oder im ersten Frühlinge einzusammeln.

Solanum Dulcamara Linn. Der kletternde Nachtschatten. Bittersüß. Alfranken.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Dieser Strauch wird durch ganz Deutschland und im übrigen Europa an feuchten sumpfigen Orten, in unfruchtbaren Gebüschen, an schattigen Ufern, an Teichen, Gräben, Hecken ꝛc. angetroffen. Er erreicht eine Höhe von 10—15 Fuß, und windet sich an Bäumen und Sträuchern auf.

Die dünne, ästige und faserige Wurzel treibt einen rebenartigen, kletternden oder liegenden, hin- und hergebogenen, runden, etwas eckigen, biegsamen, glatten, holzigmarkigen, mehrere Fuß langen Stengel ohne Stacheln. Die Rinde der ältern Stengel ist bräunlichgrün, rissig und runzlig, die der jüngern Zweige blaßgelb oder grünlich. Die gestielten abwechselnden Blätter sind ganz ungetheilt, spitzig, glatt auf beiden Flächen, unten zuweilen etwas weichhaarig; die untern eiförmig-herzförmig, die obern spießförmig, oft an ihrem Grunde in Lappen geschnitten. Die Blumen, gegen das Ende der Zweige in kleine, kurze, seitwärts überhängende, den Blättern gegenüberstehende Doldentrauben geordnet, sind von violettblauer Farbe. Der Kelch ist einblättrig, bleibend, in fünf stumpfe Einschnitte getheilt. Die radförmige einblättrige Blumenkrone theilt sich in fünf etwas schmale, spitzige, zurückgeschlagene Lappen. Die fünf Staubbeutel von schön gelber Farbe, sind etwas

zusammengewachsen. Die Frucht ist eine glatte, länglichrundliche, zur Zeit der Reife rothe saftige Beere.

Die Blüthezeit ist Juni bis August.

Die Wurzel, die Stengel und die Zweige geben frisch gequetscht oder stark gerieben einen widrigen, ekelhaften, betäubenden Geruch von sich, welcher sich aber durchs Trocknen verliert; sie schmecken anfangs merklich bitter, lassen aber einen weichlich-süßlichen Geschmack im Munde zurück. Man sammelt die Stengel zu den angegebenen Jahreszeiten bei trockner Witterung und so viel wie möglich von Pflanzen, die auf trocknem Standorte wachsen. Unter der blaßgelben Oberhaut befindet sich eine grüne Rinde, und die mit schwammigem Marke angefüllte Röhre ist bei ganz jungen Zweigen hohl. Man wählt zum Arzneigebrauche die zwar noch jungen, aber doch schon markigen Stengel, von der Dicke eines Gänsekiels und drüber. Auch müssen sie jährlich frisch gesammelt werden, da sie durch die Länge der Zeit austrocknen, und Geschmack und Kräfte verlieren.

Die Stengel des gemeinen Nachtschattens sind kürzer, ungefähr nur einen Fuß lang und eckig; auch haben sie weder den eigenthümlichen Geruch noch Geschmack.

Der wäßrige Auszug der Alfranken hat eine dunkelbraune Farbe, den Geruch derselben, und einen bittern ekelhaften Geschmack, der bald in einen lange anhaltenden süßen Nachgeschmack übergeht. Lackmuspapier wird geröthet.

Pfaff (Syst. d. Mat med. VI. S. 505.) hat eine Analyse veranstaltet. Die mit Wasser, vermittelst der Compressionspresse, gemachten Auszüge wurden zum Sieden erhitzt, wobei sich eine geringe Menge grüner Flocken abschied, welche auf einem Filter gesammelt, getrocknet und durch Essigsäure in Kleber und grünes Harz zerlegt wurden. Die klar abfiltrirte Flüssigkeit gab ein dunkel schwarzbraunes Extract, das hart, brüchig, auf dem Bruche glänzend, undurchsichtig war, aus der Luft schnell Feuchtigkeit anzog, und mit Alkohol von 95 Proc. behandelt wurde. Die geistigen Auszüge wurden heiß filtrirt, sie trübten sich beim Erkalten, und setzten ein weißgelbliches Pulver ab, welches auf einem Filter gesammelt, aus der Luft schnell Feuchtigkeit anzog und dadurch zu einem Extract zerfloß, das sich in Wasser leicht auflöste. Die Auflösung schmeckte anfangs fade, hernach wenig scharf, wurde durch Galläpfeltinctur, Blei- und Quecksilberauflösungen reichlich gefällt, und verhielt sich als eine thierisch-vegetabilische Materie. Die jetzt klare geistige Flüssigkeit hatte einen balsamischen Geruch, beim Abziehen des Weingeistes und Verdampfen schied sich jedoch noch etwas von jener gelblichweißen Substanz aus. Nach dem gänzlichen Verdunsten blieb eine zähe, fadenziehende Masse, fast wie ein Balsamharz zurück, die nicht völlig zur Trockne zu bringen war. Sie hatte eine gelbbraune Farbe, war fast durchsichtig, von sehr bitterm Geschmacke mit dem bestimmten süßen Nachgeschmacke, von einem balsamischen, dem des Honigs ähnlichen Geruche. In Wasser löste sie sich leicht bis auf einen kleinen Rückstand auf. Galläpfeltinctur bewirkte einen sehr reichlichen, weißen, flockigen Niederschlag, eben so salpeterfaures Queck-

silberoxydul. Sie gehört also, nach Pfaff, zu jener Gattung des Extractivstoffes, welcher sich der thierisch-vegetabilischen Materie nähert. Der von dem Alkohol nicht aufgenommene Antheil des wäßrigen Extracts war gummiger Extractivstoff; er löste sich mit Hinterlassung eines Rückstandes in Wasser auf, der oxydirter Extractivstoff zu seyn schien.

Der Rückstand der Bittersüßstengel von der Ausziehung mit Wasser, von hellerer aber lebhaft grüner Farbe, wurde mit Alkohol von 81 Procent erschöpft, und eine vollkommen klare hell braungrüne Flüssigkeit von schwach bitterm Geschmacke erhalten. Als sie zur Syrupsdicke abgeraucht war, zeigte sie sich aus zwei Substanzen bestehend, die sich zu einander verhielten, wie ein fettes Oel und ein dicker Zuckersaft. Gegen das Ende der Abdampfung wurde die Masse wieder mehr gleichförmig, und nach dem Erkalten wachsartig, aber klebrig, von bedeutend bitterm, myrrhenartigem, hintennach etwas scharfem Geschmacke, und hatte einen auffallenden Geruch nach einem ranzigen Oele. Alkohol von 75 Procent färbte sich schon in der Kälte gesättigt grün, und ließ einen Theil davon von schmutziger Olivenfarbe unaufgelöst. Verdünnte Salzsäure nahm in der Hitze von 5 Gran 2 Gran auf, und ließ das Uebrige mit einem starken Geruch nach Gurken und im Alkohol mit brauner Farbe auflöslich zurück. Durch Sättigung der Salzsäure mit Ammoniak wurde das davon Aufgelöste zum Theil in Flocken ausgeschieden, die den Weingeist braun färbten, aber sich nicht ganz auflösten. Die salzsaure Ammoniakflüssigkeit wurde abgeraucht, und aus dem Rückstande zog Alkohol einen Antheil aus, der stark nach Benzoësäure roch, und die salzsaure Eisenauflösung schwach trübte.

Der Rückstand der Bittersüßstengel von dem Ausziehen mit Weingeist wurde nun mit dem 12fachen Gewichte Wasser dreimal ausgekocht, und nach dem Abrauchen der Flüssigkeiten ein dunkelbraunes Extract erhalten, das keine Feuchtigkeit anzog, einen bestimmten vanilleartigen Geruch, und einen anfangs schwach bittern, hintennach vanilleartigen Geschmack hatte, und durch Jod Spuren von Stärkemehl zeigte. Kleesaures Ammoniak bewirkte in seiner Auflösung einen reichlichen Niederschlag.

Der Stengelrückstand wurde nun noch mit Salzsäure ausgekocht, und dadurch noch ein Antheil Extractivstoff nebst einer ziemlichen Menge phosphorsauren und kleesauren Kalkes mit Spuren von einem gleichen Talkerdesalz erhalten.

Durch Destillation der Bittersüßstengel mit Wasser wurde nach den Stengeln riechendes Destillat, aber keine Spur eines ätherischen Oeles oder Blausäure oder einer andern Säure erhalten.

Dieser Analyse zufolge enthalten 1000 Gran getrockneter Bittersüßstengel: 1) eigenthümlichen bittern Extractivstoff, von honigartigem Geruche, und einem auffallend süßen Nachgeschmacke (Pikro-Glycion) 218,17; thierisch-vegetabilische Materie 31,25; gummigen Extractivstoff 120,29; Kleber mit grünem Wachs 14,00; grünes Wachs, myrrhenartiges Balsamharz mit einer Spur von Benzoësäure, 27,4; gummigen Extractivstoff mit vanilleartigem

Geschmacke, etwas Stärkemehl, und einem Kalksalze aus Schwefelsäure und einer Pflanzensäure, 20,0; kleesauren und phosphorsauren Kalk mit Extractivstoff 40,0; Holzfaser 620,0. S. = 1091,11. Der bedeutende Ueberschuß rührte von der Schwierigkeit her, die Bestandtheile 1, 2 und 3 im vollkommen trocknen Zustande darzustellen.

Das narkotische Princip scheint bloß in einem sehr flüchtigen Riechstoffe zu bestehen, der eigentlich wirksame Bestandtheil ist das Pikro-Glycion.

Desfosses (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 73. u. Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 107.) hat in der Familie der Nachtschatten ein eigenthümliches Princip entdeckt, welches er Solanin nennt. Er erhielt dasselbe aus dem Safte der Beeren vom schwarzen Nachtschatten (**Solanum nigrum**), als er diesen mit Ammoniak niederschlug, den graulichen Niederschlag auf einem Filter sammelte, ihn aussüßte, und dann mit kochendem starken Weingeiste auszog. Dieser hinterläßt beim Verdampfen das Solanin mit weißer Farbe, wenn die Beeren vollständig reif waren; waren hingegen die Beeren noch grün, so ertheilt ihm das Chlorophyll eine grüne Farbe, die man nur mit vieler Mühe davon entfernen kann.

Ist das Solanin ganz rein, so stellt es ein weißes Pulver dar, das der Cholesterine (der in der Galle befindlichen fettwachsartigen Materie) sehr ähnlich ist, keinen Geruch, aber einen gering bittern und ekelerregenden Geschmack besitzt. Verschluckt man davon einige Atome, so erregt es im Halse einen starken Reiz. Erhitzt man dasselbe bis über 100 ° C., so fließt es, und erscheint nachher beim Erkalten als eine durchsichtige gelbe Masse. Bei noch stärkerer Hitze wird es zersetzt, es giebt dabei dieselben Producte, welche die andern keinen Stickstoff enthaltenden Pflanzenkörper liefern, und hinterläßt dabei in verschlossenen Gefäßen einen geringen kohligen Rückstand. Es ist unlöslich in kaltem, schwerlöslich in heißem Wasser, hingegen leichtlöslich in Weingeist. Aether löst davon nur eine geringe Menge, und Olivenöl so wie Terpenthinöl lösen gar nichts Merkliches davon auf. Das Kurkumepapier verändert es nicht, wohl aber das geröthete Lackmuspapier, dessen blaue Farbe es wiederherstellt. Mit den Säuren vereinigt es sich selbst in der Kälte leicht, und es giebt damit neutrale Lösungen, aus welchen es durch die Kalien in gallertartigen Flocken abgeschieden wird. Die Schwefel-, Salpeter-, Salz- und Essigsäure sind die einzigen Säuren, mit welchen Desfosses versucht hat, das Solanin zu verbinden, aber keine dieser Verbindungen lieferte ein krystallisirbares Salz, sondern sie trocknen alle zu gummigen, durchsichtigen, nicht zerfließenden und leicht zu pulvernden Massen ein. Bei der Verbindung mit Säuren entwickelt sich die Bitterkeit des Solanins mehr, weil es nun auflöslicher ist, und die Verbindung mit der Essigsäure ist von allen die bitterste. Es bedarf, wie alle Pflanzenbasen, nur einer geringen Menge Säure zur Sättigung. Das neutrale schwefelsaure Solanin ist zusammengesetzt aus 100,00 Solanin und 10,951 Schwefelsäure; das neutrale salzsaure Solanin aus 100,00 Solanin und 6,666 Salzsäure.

Die Beeren des schwarzen Nachtschattens enthalten das Solanin mit

Aepfelsäure verbunden, welche Säure sich in allen Solaneen findet, und daher auch in den Beeren der Kartoffel, die viel davon enthalten. Baup fand das Solanin auch in den Erdäpfeln; die Knollen enthalten weniger als die Sprossen, welche auch einen viel schärferen Geschmack haben. Auch die Stengel und Blätter der Kartoffelpflanze enthalten Solanin, und ein daraus bereites Extract soll in Gaben von $\frac{1}{2}$—2 Gran Uebelbefinden und Zittern verursachen, und überhaupt so stark wirken, wie Extractum Cicutae.

Das Solanin macht nun hiernach auch einen Bestandtheil der Bittersüßstengel aus und zwar sollen nach Desfosses die Stengel weniger davon enthalten, als die Blätter. Der zuckrige Geschmack des Bittersüß rührt nach ihm von einer anderen Materie her, die viel Aehnlichkeit mit derjenigen hat, die nach Robiquet in den Süßholzwurzeln enthalten ist, jedoch unterscheidet sie sich davon durch einen weniger süßen Geschmack und durch eine alkalische Eigenschaft. Er nennt sie Dulcarine. Pelletier glaubt jedoch, daß sowohl der mehr bittere Geschmack, als auch die alkalischen Eigenschaften dieser Substanz von etwas ihr anhängendem Solanin herrühren. Sie ist wahrscheinlich mit Pfaff's Pikro-Glycion identisch.

Die Alfranken werden als blutreinigendes Mittel in einer gelinden Abkochung, im Extract oder als Thee verordnet, besonders bei Hautausschlägen, indem sie auf die Ausleerungen wirken. Die Beeren sollen so stark abführen, daß 30 einen Hund innerhalb 20 Minuten tödten. Die ganze Pflanze wird auch von den Schafen verschmäht.

Wegen ihrer stark wuchernden Wurzel ist die Pflanze von Gleditsch zum Austrocknen der Sümpfe und zur Befestigung der Ufer und Dämme empfohlen worden.

Elemi. Elemi. Elemiharz.

Der an der Luft erhärtete Saft von **Amyris elemifera Linn.**, einem im südlichen Amerika einheimischen Baume.

Ein festes, zähes Harz, mit der Hand geknetet erweichend, von citronengelber Farbe, beim Reiben weiß, fast durchscheinend, von einem beinahe fenchelartigen Geruche.

Amyris elemifera Linn. Elemi-Amyris.
Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Es ist ein in Carolina und in Südamerika vorkommender Baum mit glatter, aschgrauer Rinde. Die ungleich gefiederten Blätter bestehen aus 5—7 lancettförmigen, lederartigen, unten filzigen Blättchen. Die grünlichweißen Blüthen sitzen wirtelförmig in den Blattachseln. Die granatfarbene olivenförmige Steinfrucht enthält ein aromatisches Mark.

Aus den in die Rinde des Stammes gemachten Einschnitten fließt das jetzt fast ganz allein nur im Handel vorkommende westindische Elemi, und

wird an der Luft härter. Es kommt in 200—300 Pfund schweren Kisten, und bildet größere Massen, die oft mit Rindenstückchen und Holzspähnen vermengt, theilweise halbdurchsichtig, blaß citronengelb, auch wohl etwas grünlichgelb und undurchsichtig weiß sind. Frisch ist es weich und klebrig, besonders in der Sommerwärme, durchs Alter wird es hart, zerbrechlich, zerreiblich, und hat dann einen matten splittrigen Bruch. Der Geruch ist angenehm, ganz eigenthümlich balsamisch, nach Einigen dill- oder fenchelartig, eher vielleicht aus Campher und Citronen gemischt. Der Geschmack ist scharf bitter balsamisch. Unter den Zähnen wird es weich und zähe. Spec. Gew. = 1,083. Erwärmt leuchtet es im Finstern, und man bemerkt das Phosphoresciren am deutlichsten, wenn man mit einem spitzen Instrument darüber hinfährt.

Früher war eine Gattung Elemi im officinellen Gebrauche, die jetzt gar nicht mehr im Handel vorkommt, nämlich das ostindische oder orientalische Elemi, welches von der in Aethiopien und Ostindien wachsenden **Amyris zeylanica** abstammt. Dieses Elemi kam in länglichrunden oder auch in ganz runden Stücken, gleichsam in Broden, von 2—4 Pfund schwer, mit Schilf- oder Palmblättern umwickelt, von weißgelblicher etwas grünlicher Farbe, halb durchsichtig, auswendig hart, inwendig zähe und weich, von angenehmerem fenchelartigen Geruche, und einem balsamischen gewürzhaften Geschmacke. Es wird gleichfalls mit der Zeit hart, spröde und zerreiblich, und ist in Weingeist und in den Oelen bis auf die beigemengten holzigen Theile völlig auflöslich. Diese Sorte galt für die vorzüglichere.

Bisweilen kommt auch ein Kunstproduct vor, aus Elemi, gelbem Harze und Terpenthin, welche Verfälschung aber leicht durch den Terpenthin- und Harzgeruch beim Reiben und Erwärmen erkannt wird; auch an dem Mangel des vorhin erwähnten Phosphorescirens. In Italien soll auch in einigen Gegenden das Harz des Oelbaums (**Olea europaea Linn.**) statt des Elemiharzes gesammelt werden, welches sich aber leicht durch Vergleichung erkennen läßt.

Bonastre (Schweigg. N. J. VI. S. 366.; Trommsd. N. J. VII. 1. S. 368. und Hänle's Magazin, Februar 1823. S. 156.) hat das westindische Elemi untersucht. Durch Destillation mit Wasser, durch Ausziehen mit kaltem und kochendem Alkohol erhielt er folgende Bestandtheile: ätherisches Oel 12,5; Harz, das sich in kaltem Alkohol auflöst, 60,0; ein anderes modificirtes Harz von milchweißer Farbe, welches sich nicht in kaltem, wohl aber in kochendem Alkohol, in Aether und Oelen auflösen läßt (dem Myricin ähnlich), 24,0; bitteres Extract 2,0; Unreinigkeit 1,5. S. = 100. Auch nimmt er darin eine eigenthümliche Säure an.

Baup fand, ähnlich wie im Kolophonium, im Elemi eine krystallisirbare, im Wasser unauflösliche und im Alkohol schwer auflösliche (ungefähr in 20 Th.) Substanz, die er Elemine nannte.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0416-8

Eruca. Der Saame. Weißer Senf.

Sinapis alba Linn. Eine einjährige auf Feldern wild wachsende und angebaute Pflanze Deutschlands.

Kleine, kugelige, gelbe Saamen von einem sehr scharfen Geschmacke.

Diese auch in den andern Ländern Europas, als England, Frankreich, Italien, der Schweiz ꝛc., einheimische Pflanze wird in manchen Gegenden angebaut.

Die etwas dicke Wurzel ist weißlich, gerade und zaserig; der Stengel aufrecht, ästig, gestreift, eckig, etwas haarig, und 2—3 Fuß hoch. Die abwechselnden gestielten Blätter sind siederförmig getheilt, etwas rauh, die Lappen stumpf buchtig und ungleich gezahnt. Die kleinen gelben ungeaderten Blumen stehen in lockern, langen, aufrechten Endtrauben. Der Kelch ist vierblättrig und abfallend, die Blumenkrone besteht aus vier gleich großen, ins Kreuz stehenden Blumenblättern. Die Frucht ist eine längliche, steif borstige, aufgeblasene und gleichsam gegliederte Schote, die zweifächrig, zweiklappig ist, und an den Rändern der Scheidewand sitzen abwechselnd mehrere Saamen.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli, die der Saamenreife August.

Der Saame ist klein, kugelig, gelblich oder weißgelb, von flüchtigem Geruche, und dem eigenthümlichen, sehr scharfen Geschmacke, der aber etwas schwächer ist, als bei dem schwarzen Senfsaamen.

Der Saame des Raukekohls (**Brassica Eruca Linn.**) ist an Geschmack dem vorigen ähnlich, zugleich aber etwas rettigartig.

Der weiße Senf steht an Wirksamkeit dem schwarzen Senfe nach, daher auch der letztere vorzüglich von den Chemikern beachtet worden ist, und die chemischen Ergebnisse dort angegeben werden sollen. (siehe **Sinapis.**)

Euphorbium. Euphorbium.

Der an der Luft erhärtete Milchsaft von **Euphorbia officinarum Linn.** und einigen andern Euphorbiumarten, Sträuchern des mittägigen Afrikas.

Eine dem Gummiharze verwandte Substanz, in unförmlichen, schmutziggelblichen oder bräunlichen, undurchsichtigen, zerreiblichen, Dornensprößchen umgebenden, oder an deren Stelle mit kleinen Löchern versehenen Stücken, von einem sehr scharf brennenden ekelhaften Geschmacke, auf Kohlen geworfen einen nicht unangenehmen Geruch verbreitend. Es muß vorsichtig den Verordnungen gemäß verwahrt werden.

Euphorbia officinarum Linn. Die officinelle Wolfsmilch.

Linn. Cl. XI. Dodecandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XV. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Diese strauchartige Pflanze wächst im heißesten Afrika und in Aethiopien, auch in Aegypten, Arabien und auf den canarischen Inseln. Sie hat ihren Namen nach dem Leibarzte des Königs Juba in Lybien, der Euphorbus hieß, und welchem zu Ehren der König diese Pflanze Euphorbia nannte, erhalten.

Die Wurzel derselben ist dick, länglich, fleischig und an ihrem untern Theile in große Zweige getheilt. Der Stengel erhebt sich zu einer Höhe von 3—4 Fuß. Er ist gerade, sehr dick, fleischig, saftig, nackt und auf seiner ganzen Länge tief gefurcht, wodurch sehr hervorstechende Winkel gebildet werden, an deren Ecken, statt der Blätter, sich steife, weißliche, pfriemenförmige, krumme Stacheln befinden, die aus einem kleinen, ovalen Knötchen entspringen und zu zweien beisammen stehen. An dem Stengel bilden sich hier und da eiförmige, stumpfe, gefurchte Knospen, die sich in der Folge in Aeste verlängern. Die Blüthen sind klein, von gelbgrüner Farbe, und sitzen auf den Winkeln am Ende des Stengels und der Aeste. Der Kelch ist einblättrig, 4—5zähnig; die Krone besteht aus 4—5 Blumenblättern. Die Frucht ist eine dreifächerige Saamenkapsel. Die Saamen sind einzeln, fast rund, glatt oder genarbt.

Der aus der geritzten Rinde der Euphorbia fließende scharfe und dann an der Pflanze erhärtete Milchsaft giebt das officinelle Euphorbium.

Wir bekommen es aus der Berberei in dichten ledernen Säcken. Es besteht aus erbsengroßen, auch wohl etwas kleineren oder größeren Stücken von verschiedener, kugeliger, länglicher, eckiger, oder ästiger Gestalt. Die Stücke sind von dem Ansetzen und Eintrocknen des Saftes an den Stacheln der Pflanze häufig ausgehöhlt, und daher mit zwei kleinen Löchern versehen, oder sie halten noch die Stacheln eingeschlossen. Auswendig haben sie eine schmutzig gelbliche oder rothbräunliche, inwendig weißliche Farbe, sind trocken, zerreiblich, leicht, und insgemein mit fremdartigen Theilen, besonders auch mit Bruchstücken jener Stacheln verunreinigt. In gewöhnlicher Temperatur ist das Euphorbium ohne Geruch, angezündet verbreitet es einen eben nicht unangenehmen Geruch und brennt mit heller Flamme. Beim Kauen scheint es anfänglich geschmacklos zu seyn, nachher aber verursacht es einen äußerst ätzenden und brennenden Geschmack, der sehr lange anhält, und der sich nur durch Ausspühlen des Mundes mit Oel mildern läßt. Der beim Pulvern aufsteigende Staub erregt, wenn man sich nicht sehr sorgfältig durch ein vorgebundenes nasses Tuch davor schützt, ein sehr heftiges und anhaltendes Niesen, und entzündet das Gesicht.

Die größeren, trocknen, weißlichen Stücke sind die besten.

Laudet (Trommsd. J. VIII. 1. S. 394.) schied aus 1000 Th. Euphorbium: Harz 640; Gummi 233; unaufgelöster Rückstand 93; Verlust 3.

In Braconnot's Zerlegung (Trommsd. J. XVIII. 2. S. 175.) verlor das Euphorbium durchs Trocknen in gelinder Wärme $\frac{1}{10}$ seines Ge-

wichts an Feuchtigkeit. Von 4 Grammen blieben nach dem Kochen mit vielem Wasser 3 Grammen unaufgelöst. Die wäßrige Auflösung zeigte Aepfelsäure und Kalkerde. 20 Gr. Euphorbium wurden wiederholt mit heißem Alkohol ausgezogen. Die concentrirten Tincturen trübten sich beim Erkalten, und nach 2 Tagen hatte sich ein gleichsam gallertartiger weißer körniger Stoff abgelagert, der 3,4 Gr. wog, und sich gänzlich wie Wachs verhielt. Nur hatte er eine leichte Schärfe behalten. Was der Alkohol unaufgelöst gelassen hatte, wurde nun mit Wasser ausgekocht, und so blieben endlich 2,7 Holz und Dornenreiser zurück. Die wäßrige Auflösung bildete beim Verdunsten auf der Oberfläche eine Firnißhaut, und zuletzt blieb ein brüchiger Stoff in glimmerartigen Blättern zurück, welcher sich als äpfelsaurer Kalk zeigte, und welchen Laudet für Extractivstoff genommen hatte. Aus der geistigen Tinctur stellte Braconnot das Harz dar, das eine röthliche Durchsichtigkeit und außerordentliche Schärfe besaß, aber von der Schwefel- und Salpetersäure vollkommen aufgelöst wurde. Dieser Analyse zufolge enthalten 100 Th. Euphorbium: Wasser 5,0; Wachs 19,0; holzigen Stoff 13,5; äpfelsauren Kalk 20,5; äpfelsaures Kali 2,0; Harz 37,0; Verlust 3,0.

Später hatte John (chem. Schriften II. S. 19.) in dem frischen Safte der Euphorbia Cyparissias eine kautschukartige Substanz aufgefunden; dieses veranlaßte Hrn. Mühlmann (Berl. Jahrb. 1818. S. 141.), diesem Bestandtheile auch in dem Euphorbium nachzuspüren, und er fand ihn wirklich. Nach seiner Analyse bestehen 500 Th. des ausgesuchten Euphorbiums aus: gelblichem scharfem Harze 270; Wachs 70; Kautschuk 16; äpfelsaurem Kalke 96; äpfels. Kali 10; holzigem Rückstand 30; Verlust 6. S. = 500.

Eine noch ausführlichere Analyse verdanken wir Hrn. Brandes (Buchn. Repert. VI. S. 145.). Bei der Behandlung mit Alkohol in der Digestionswärme zerging, schon ehe sie angewandt wurde, ein großer Theil des Euphorbiums zu äußerst feinen zusammenhängenden weißlichen Flocken, und nach der Digestion hatte sich über dem körnigen Bodensatze ein feinerer mehr flockiger abgelagert, der auf einem Filter besonders gesammelt wurde. Diese Ausscheidung von Flocken zeigte sich beim wiederholten Ausziehen mit absolutem Alkohol auch dann noch, als dieser sich nicht mehr färbte. Bei der Vereinigung der concentrirten und der weniger gefärbten Tincturen, um sie gemeinschaftlich der Destillation zu unterwerfen, fand eine Trübung statt, die beim Kochen der Flüssigkeit sich anfänglich in Flocken auflöste und zuletzt verschwand, woraus man schon mit ziemlicher Sicherheit auf einen Wachsgehalt schließen konnte. Dieser wurde aus dem Rückstande der Destillation durch kochenden Alkohol gewonnen, und auf seinen Gehalt an Cerin und Myricin geprüft. Die gleich im Anfange aus dem Euphorbium ausgeschiedenen Flocken waren nicht, wie zu vermuthen stand, Wachs, sondern ein Gemisch von äpfelsaurem Kalke mit einem geringen Antheile von schwefelsaurem Kalke und Kautschuk. Die dem in Weingeist aufgelösten Harze bei-

gemischten Substanzen wurden durch Wasser geschieden und durch Versuche geprüft.

Der Rückstand des Euphorbiums von der Ausziehung durch Alkohol wurde nun noch mit Wasser und dann mit Aether ausgezogen.

Als Resultat dieser Analyse ergaben sich in 500 Gran auserlesenen Euphorbiums folgende Bestandtheile: Euphorbiumharz 218⅞; Cerin 68½; Myricin 6⅕; Kautschuk 24⅕; Phyteumacolla (thierisch vegetabilische Materie) 1; Aepfelsäure mit äpfels. Kali, äpfels. Kalk und problematischen Spuren von äpfelsaurer Bittererde, 16; Aepfelsäure mit äpfels. Kali, äpfels. Kalk und Spuren von benzoës. Kali, 8½; äpfels. Kalk, mit Spuren von schwefels. Kalk, 68⅖; äpfels. Kalk 25½; schwefels. Kalk ½; schwefels. Kali 2¼; phosphors. Kalk ¾; (= 122 Gran Salze); Wasser 27; holziger Rückstand 28. S. = 495⅘.

Von diesen Bestandtheilen ist nun das Euphorbiumharz der vorzüglich charakteristische, welchem das Euphorbium seine ganze Wirksamkeit verdankt. In seinem reinen Zustande zeigte es sich dunkel röthlichbraun, in dünnem Ueberzuge bräunlichgelb, durchsichtig, hatte einen etwas süßlichen Geruch, der Geschmack war anfangs nicht bemerklich ausgezeichnet, hernach aber stechend, die Speicheldrüsen reizend und außerordentlich brennend. Die Consistenz des Harzes war trocken, spröde, doch leicht mit dem Nagel Eindrücke aufnehmend; über der Lichtflamme schmolz es, und verkohlte sich dabei unter Ausstoßung eines angenehmen Benzoëgeruchs ohne beträchtliches Aufblähen; (sollte das Euphorbium bei der trocknen Destillation Benzoësäure sublimiren lassen?) in Aether, Alkohol, Terpenthinöl löste es sich sehr leicht, weniger leicht in Mandelöl auf; Aetzkaliflüssigkeit wirkte nur schwach darauf, und löste es nur zum Theil auf; concentrirte Schwefelsäure löste es schon in der Kälte auf, Salpetersäure verwandelte es in gelben Bitterstoff, wobei sich etwas Kleesäure und Milchzuckersäure zugleich gebildet hatte. 40 Gran gaben nur ¾ Gran Asche, die aus kohlens., salzs. und schwefels. Kali, phosphors. Kalk und kohlens. Kalk nebst Eisenoxyd bestand.

Wegen des großen Salzgehaltes (an äpfels. Kalke) schlägt Brandes vor, das Euphorbium salziges Harz zu nennen, nach der Analogie der Gummiharze.

Das Euphorbium, obgleich es in ältern Zeiten auch innerlich zu 1—10 Gran gegeben ist, wo es als das heftigste drastische Purgirmittel wirkt, wird jetzt nur noch äußerlich gebraucht, theils als Pulver, häufiger als Tinctur, theils und vorzüglich macht es einen Bestandtheil des sogenannten immerwährenden Spanischenfliegenpflasters aus.

Das Euphorbium wird, wie auch unser Text angiebt, nicht allein von der oben erwähnten Pflanze gesammelt, sondern auch von Euphorbia Antiquorum, die in der Berberei und auf Malabar wächst, und von E. canariensis, die auf den canarischen Inseln einheimisch ist, und von dieser soll der größere Theil des jetzt im Handel befindlichen Euphorbiums gewonnen werden. Von einer andern Euphorbia, nämlich von E. Lathyris, waren

sonst die Saamen officinell, unter dem Namen Springkörner, Purgirkörner (Semen Cataputiae minoris); der Geschmack derselben ist anfangs mild und süßlich, wird aber hinterher sehr scharf und beißend. Diese Schärfe verdanken diese Saamen einem giftigen Stoffe, welcher in der Schale und im Keime enthalten ist. Auch bei dieser Pflanze enthalten alle Theile im frischen Zustande einen sehr scharfen ätzenden Milchsaft.

Fabae albae. Weiße Bohnen.

Phaseolus vulgaris et nanus Linn. Eine einjährige, in Gärten angebaute, aus Indien entsprossene Pflanze.

Längliche, zusammengepreßte, nierenförmige, weiße Saamen.

Phaseolus vulgaris Linn. Die gemeine Bohne.
Phaseolus nanus Linn.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Die gemeine Bohne hat einen windenden Stengel, welcher eine Höhe von 6—10 Fuß erreicht, walzenrund und schwach behaart ist. Die gestielten Blätter bestehen aus drei ei-lancettförmigen, in eine lange Spitze endigenden, ganzrandigen, schiefen, etwas behaarten und scharfen Blättchen. Die weißen oder gelblichen Blüthen stehen in einer Art kurzen Aehre oder Traube, auf einem gemeinschaftlichen Blüthenstiele, welcher kürzer ist, als der Blattstiel. Der Kelch fast glockenförmig, am Ende gleichsam abgestutzt, mit drei kleinen nach unten gerichteten Zähnen versehen. Seitlich stehen zwei offene und kürzere Deckblättchen.

Die Saamen der Bohnen, denen man sonst ohne allen Grund arzneiliche Wirkung, als **Emmenagoga, Diuretica,** zugeschrieben hat, werden bisweilen noch zu Pulver gestoßen äußerlich angewandt. Wichtiger ist ihr ökonomischer Nutzen, indem sie sehr häufig als Nahrungsmittel benutzt werden; sie enthalten nach einer Analyse von Einhoff (Gehlen's J. VI. S. 545.) besonders Gummi, Stärkemehl und Kleber.

Farfara. Die Blätter. Huflattigblätter.

Tussilago Farfara. Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Herzförmige, rundliche, eckige, buchtig-gezahnte, unten weiße, filzige Blätter, von etwas zusammenziehendem bitterlichem Geschmacke. Im Monat Mai einzusammeln.

Tussilago Farfara Linn. Gemeiner Huflattig.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese durch ganz Europa häufige Pflanze findet sich an feuchten, unfruchtbaren, sandig thonigen Abhängen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0421-5

Die lange, dünne, kriechende Wurzel ist faserig, weißlich und treibt meistens mehrere Blumenschafte. Diese erscheinen vor den Blättern (die Pflanze hieß daher auch vormals filius ante patrem), sind einfach, einblumig, röhrig, aufrecht, weißlich-wollig, mit lancettförmig-spitzigen Schuppen bedeckt und 4—6 Zoll hoch. Die Blumen sind goldgelb, im Strahle blässer, und abgeblüht gewöhnlich überhängend. Der Kelch ist einblättrig, und die zusammengesetzte Blumenkrone verschieden. Die Blüthen sind nämlich entweder alle Zwitterblumen, oder nur die, welche sich in der Scheibe befinden.

Die Blüthezeit ist März bis April. Die Blumen öffnen sich nur an heitern Tagen, des Nachts und bei trübem Wetter sind sie geschlossen.

Erst nachdem diese verblüht sind, kommen die ziemlich großen Blätter (Wurzelblätter) hervor; sie sind langgestielt, auf der Oberfläche hellgrün, glatt und mit rothen Adern durchzogen, unten aber weißfilzig. Sie werden im Anfange des Sommers gesammelt, sind fast geruchlos und von einem schwach zusammenziehenden, etwas schleimig-bitterlichen Geschmacke.

Bisweilen werden sie mit den jungen Blättern des großblättrigen Huflattigs (Tussilago Petasites Linn.) verwechselt; diese sind aber auf der Oberfläche dunkelgrün, unten mit feinen Härchen besetzt, auch nicht ganz so weiß und herzförmig-rund, am Rande ungleich gezahnt, am Blattstiel mehr als herzförmig eingestielt und viel größer.

Das gelind bitterlich schmeckende Infusum des Huflattigs wird von schwefelsaurem Eisen etwas dunkel gefärbt.

Der Huflattig wird im Aufgusse oder als Thee gegen chronische mit Husten verbundene Lungenentzündungen (daher der Name Tussilago) verordnet, geht auch in die officinellen Brustspecies ein.

Fel tauri. Ochsengalle.

Bos Taurus Linn.

Die Galle ist eine Absonderung, welche zur Verrichtung der Verdauungsorgane bei sehr vielen Thieren wesentlich zu seyn scheint. Sie ist in einer Blase enthalten, und hat eine zähe klebrige Beschaffenheit, eine im durchscheinenden Lichte gelblichgrüne, im zurückgeworfenen Lichte braune Farbe, einen eigenthümlichen thierisch-aromatischen Geruch, und einen ekelhaft bittern Geschmack. Sie braust weder mit Alkalien noch mit Säuren auf, und verbindet sich mit fetten Oelen, nicht aber auf gleiche Weise mit den ätherischen.

Nach Berzelius besteht die Galle aus: Wasser 907,4; Gallenstoff (Materia Bilis, Thénards Pikromel) 80,0; Schleim der Gallenblase 3,0; Alkalien und Salzen, die sich in allen secernirten Flüssigkeiten finden, 9,6. S. = 1000.

Um den Gallenstoff darzustellen, entfernt man zuerst den Schleim aus der Galle durch verdünnte Schwefelsäure, dann wird die Galle erwärmt und mit einer neuen gehörigen Menge von Schwefelsäure behandelt, wodurch eine

harzähnliche Substanz (Thénards Gallenharz) niederfällt, welche mit Wasser ausgewaschen, und mit kohlensaurem Baryt und Wasser digerirt wird, wodurch die mit dem Gallenstoffe niedergefallene Schwefelsäure diesem entzogen, und unauflöslicher schwefelsaurer Baryt gebildet wird. Die überstehende Flüssigkeit enthält nur reinen Gallenstoff, welcher durch Verdampfen der filtrirten Flüssigkeit erhalten wird. Dieser Gallenstoff ist eine grüngelbliche geruchlose Substanz, von einem sehr bittern, nachher süßlichen Geschmacke, löst sich in Wasser und Alkohol leicht auf, wird durch Aether in eine fettige, stinkende Masse zersetzt, verbindet sich mit verdünnten Säuren, welche Verbindungen leicht auflöslich sind, wird in der Auflösung durch Bleizucker gefällt, indem eine Verbindung des Gallenstoffs mit dem Bleioxyde in weißen, gelben oder grünlichen Flocken niedergeschlagen wird. Der Gallenstoff besteht nach Thomson aus Kohlenstoff 54,53; Wasserstoff 1,82; Sauerstoff 43,45.

Die frische Galle wird selten in medicinischen Gebrauch gezogen, sondern vorzüglich zur Bereitung der eingedickten Ochsengalle verwendet.

Ferrum. Eisen.

Wird aus eigenthümlichen Erzen in Hüttenöfen bereitet.

Ein grauschwärzliches Metall, dem Magnete folgsam, dehnbar, von fast 8,0 spec. Gew. Im oxydulirt-oxydirten Zustande und in Säuren aufgelöst, wird es von der Galläpfeltinctur mit violett-schwarzer, von der eisenblausauren Kaliflüssigkeit mit gesättigt himmelblauer Farbe niedergeschlagen. Verwerflich ist das mit Kupfer verunreinigte, was bei aufgegossener Aetzammoniakflüssigkeit an der himmelblauen Farbe erkannt wird. Man nehme Stangeneisen, Nägel oder Eisendraht, und nicht Eisenfeile, wenn nicht das Eisen zum äußerlichen Gebrauche erfoderlich ist.

Das Eisen war den Alten später bekannt, als Gold, Silber und Kupfer. Zur Zeit des trojanischen Krieges war es sehr selten; zwar kannten es die Aegyptier, Phönicier und die Hebräer vor und zu Moses Zeiten, doch war sein Gebrauch sehr eingeschränkt. Je mehr aber dieses so merkwürdige und nützliche Metall benutzt wurde, je mehr äußerte es auf die Menschen seine wohlthätigen Wirkungen, so daß die vervielfachte Anwendung desselben beinahe eine Bedingung für die gesteigerte menschliche Natur gewesen ist, und mit dieser gleichen Schritt gehalten hat.

Das Eisen ist in der ganzen Natur verbreitet, in Fossilien, in Thieren und in Gewächsen, und es giebt sehr wenige Steinarten, die nicht mehr oder weniger davon enthielten. Es wird selten im gediegenen Zustande gefunden, und das meiste gediegene Eisen, welches vorkommt, ist dasjenige, welches sich in den aus der Luft gefallenen sogenannten Meteorsteinen befindet, von denen die von Pallas im Jahr 1772 in Sibirien gefundene Masse 1600

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0423-6

Pfund wiegt, die in Südamerika am Paranastrom aufgefundene aber für 30,000 Pfund schwer gehalten wird. Am gewöhnlichsten findet man es oxydirt, oder mit Kohle verbunden, wie im Graphit oder am häufigsten durch Schwefel vererzt. Diejenigen Mineralien, welche das Eisen in solcher Menge und in einer solchen Form enthalten, daß es daraus mit Vortheil ausgeschmolzen und gereinigt werden kann, werden Eisenerze genannt. Diese sind von vielen und verschiedenen Gattungen, und das aus ihnen erhaltene Eisen variirt sehr an Güte, je nachdem diese Erze mehr oder weniger frei sind von andern Metallen, von Schwefel und von Phosphor. Die besten Eisenerze kommen im Vorgebirge vor, wo sie gewöhnlich sehr mächtige Lager bilden. Das aus den Erzen der jüngern Formationen erhaltene Eisen ist immer von geringerer Güte. Da Eisenerze aus der Urformation Schweden, Norwegen, und Rußland angehören, und Erze von jüngern Formationen in andern europäischen Ländern am häufigsten vorkommen, so hat dieses dem in den nördlichen Theilen von Europa erzeugten Eisen einen bedeutenden Vorzug gegeben.

Das Eisen wird aus seinen Erzen folgendermaßen erhalten. Die Erze werden geröstet, und dann mehrere dieser Erze mit einander gemengt, weil ein solches Gemenge leichtflüssiger wird, und ein besseres Eisen giebt. Zur Gattirung der Erze setzt man Kalkstein, theils in der Absicht, ein Flußmittel zu erhalten, d. i., um die fremden Mineralstoffe, welche sich im Eisenerze befinden, und die Vereinigung des reducirten Eisens hindern würden, zu verglasen, theils um verschiedene fremde Stoffe abzuscheiden, die dem ausgeschmolzenen Eisen Unarten geben würden. Ein solches Gemenge wird mit dem Kunstworte der Hüttenleute Beschickung genannt. Sie wird in einem Hohofen schichtweise mit Kohlen eingelegt. Dieser ist ein großer Schmelzofen, welcher in seiner innern Form die Figur zweier gleich großer übereinander umgestürzter Tiegel, wovon der obere keinen Boden hat, darstellt. Der Ofen hat unten einen Raum, in welchem das geschmolzene Metall sich sammelt. Im Boden dieses Herdes ist von der Seite eine Oeffnung, durch welche das geschmolzene Eisen ausfließen kann, und welche während des Schmelzens mit Sand verstopft ist. Etwas höher, als dieser Raum, befindet sich eine andere Oeffnung, durch welche die Röhre der Blasebälge die Luft einführt. Der Hohofen wird langsam erwärmt, um von zu schneller Hitze nicht gesprengt zu werden, und wenn er die gehörige Temperatur erhalten hat, wird die Beschickung schichtweise mit Kohlen eingelegt, worauf die Blasebälge in stetem Gange gehalten werden. Je nachdem die Kohlen niedergebrannt werden, senkt sich die Masse; man ersetzt von oben das Niedergesunkene mit neuen Schichten von Erz und Kohle, und auf diese Weise kann ein solcher Hohofen Tag und Nacht in beständigem Gange seyn.

In der hohen Temperatur, die man in den Hohöfen hervorbringt, wird das Eisen vor der Kohle reducirt, aber mit dem Eisen auch zugleich mehr oder weniger andere reducirbare Stoffe im Erze, als Schwefel, Phosphor, Kiesel, Magnesium, Mangan u. a. m., und das Eisen löst dabei eine größere oder geringere Menge Kohle auf, wodurch es leichtflüssiger als reines

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0424-2

Eisen wird, aber seine Geschmeidigkeit dabei verliert. Die Kalkerde und die erdigen Fossilien, welche die Gangart des Eisenerzes bilden, schmelzen zu einem unklaren Glase, Schlacke genannt, die dem fließenden Eisen zum Boden des Ofens folgt, wo beide in zwei Schichten sich sammeln, von welchen die Schlacke die obere bildet, und das darunterliegende geschmolzene Eisen gegen die Einwirkung der Luft schützt. Die Schlacke sammelt sich in weit größerer Menge als das reducirte Eisen an, und muß deswegen von Zeit zu Zeit durch eine Oeffnung abgelassen werden. Wenn das geschmolzene Eisen seinen bestimmten Platz am Boden des Ofens füllt, wird der Sand weggenommen, der Herd geöffnet, und das Eisen in eigene in Sand gebildete Formen herausgelassen, wo es erstarrt Molden oder Gänse bildet. Es wird nun Guß- oder Roheisen genannt.

Das Roheisen ist nun ein Gemenge reducirter Stoffe, deren Hauptmasse ein mit verschiedenen Mengen Kohlenstoff verbundenes Eisen ist, nach welchem es ein verschiedenes Ansehen und Verhalten zeigt. Um dieses Eisen geschmeidig zu machen, ist es nöthig, die Kohle und alle fremden Metallstoffe, die es enthalten kann, durch Verbrennen zu entfernen. Dieses geschieht in eigenen Oefen, wo das Roheisen umgeschmolzen wird. Man nennt diese Operation das Frischen, und der erstarrte Eisenklumpen bekommt den Namen gefrischtes Eisen. Das gefrischte Eisen wird aus dem Herde genommen, und unter großen durch Wasser getriebenen Hämmern ausgeschmiedet. Bei jedem Hammerschlage wird eine große Menge der in der Masse mechanisch eingemengten Schlacke ausgepreßt, auf deren Kosten die Kohle des Gußeisens verbrannt worden ist. Sobald die metallischen Theile hinlänglich an einander haften, und die Schlacke völlig ausgepreßt worden ist, wird das Eisen zu Stangen oder Stäben von verschiedenen Dimensionen geschmiedet, und bekommt in diesem Zustande den Namen Stabeisen. So kommt das geschmeidige Eisen im Handel vor.

Das am besten bereitete Stabeisen enthält noch gegen $\frac{1}{2}$ Procent Kohlenstoff und ungefähr einen halben Tausendtheil Kiesel. Solches Stabeisen, welches man aus manganhaltigen Erzen bekommt, enthält außerdem immer eine Portion Mangan, die jedoch keineswegs der Güte des Eisens nachtheilig ist. Wenn die Eisenerze Schwefel, Phosphor, Arsenik oder Kupfer enthalten, so erhält das Eisen Unarten, von welchen es durch die größte Sorgfalt bei der Bereitung sich nicht befreien läßt, weil diese Stoffe nicht vollkommen weggeglüht werden können, sondern durch die Affinität der größern Eisenmasse gegen die Einwirkung der Luft geschützt werden. Enthält das Eisen Schwefel, Arsenik oder Kupfer, so bekommt es die Unart, beim Rothglühen unter dem Hammer in Stücke zu zerfallen; man nennt ein solches Eisen rothbrüchig. Wenn es Phosphor enthält, läßt es sich wohl in der Glühhitze behandeln, aber es zerspringt, wenn es nach der Abkühlung gebogen wird; dieses nennt man kaltbrüchiges Eisen.

Um ein völlig reines Eisen aus Stabeisen darzustellen, muß man Eisenfeile mit $\frac{1}{4}$ ihres Gewichts schwarzem Eisenoxydul mischen, das Gemenge in

einen hessischen Tiegel legen und sie mit einem Pulver von grünem Glase bedecken, oder am besten mit einem Glase, welches man aus metallfreien Materialien selbst bereitet hat, worauf der Tiegel verkittet, in eine Esse gesetzt, und durch eine Stunde lang fortgesetztes Blasen der Inhalt zum Schmelzen gebracht wird.

Das Eisen hat in diesem reinen Zustande eine beinahe silberweiße Farbe, ist äußerst zähe und weicher als das gewöhnliche Stabeisen; im Bruche ist es schuppig, muschlig und beinahe wie krystallisirt. Spec. Gew. = 7,8439.

Das gewöhnliche graue Stabeisen hat eine hellgraue Farbe, einen sehnigen und höckrigen Bruch, und sein eigenthümliches Gewicht ist nach einer Mittelzahl = 7,7. Es hat eine bedeutende Zähigkeit, aber sie wechselt nach der verschiedenen Reinheit der Eisensorten sehr ab. Das Eisen erweicht noch vor dem Schmelzen, und kann in diesem Zustande zusammengeschmiedet werden; dieses nennt man schweißen, und es geschieht auf die Art, daß man die geglühten Enden des Eisens, welche zusammengeschweißt werden sollen, mit feinem Sande bestreut, wobei der Sand mit dem in der Oberfläche oxydulirten Eisen zu einem Glase zusammenschmilzt, welches das metallische Eisen bedeckt, und sich, wenn die Enden zusammengelegt und gehämmert werden, fortpressen läßt, wobei die metallischen Oberflächen mit einander in Berührung kommen und an einander haften.

Das Eisen hat vor andern Körpern die Eigenschaft, vom Magnet angezogen zu werden, so daß mit Ausnahme einiger wenigen Metalle, besonders Nickel und Kobalt, die übrigen so wenig davon afficirt werden, daß es in Vergleichung mit dem Eisen für nichts angesehen werden kann. Die natürlichen Magnete sind Eisenerze, die Eisenoxydul enthalten.

In feuchter Luft wird das Eisen leicht oxydirt und rostet, aber es kann dagegen bewahrt werden, wenn es mit einem in Lein- oder Hanföl eingetauchten wollenen Lappen so lange gerieben wird, bis die Oberfläche des Eisens trocken erscheint. Bei dem Glühen wird die Oberfläche des Eisens oxydulirt, und in der Weißglühhitze brennt es unter Umhersprühen leuchtender Funken. Diese Erscheinung zeigt sich weit lebhafter im Sauerstoffgase, und der bei dem Verbrennen des Eisens sich entwickelnde Wärmestoff schmelzt das neugebildete Oxyd.

Ueber die Oxydationsstufen, und über das quantitative Verhältniß zwischen dem Sauerstoffe und dem Metalle hat man viel gestritten; es ist aber jetzt entschieden, daß wir nur zwei Stufen kennen, das schwarze und das rothe Oxyd, welche beide Salzbasen sind, nämlich das Eisenoxydul und das Eisenoxyd. Beides sind pharmaceutische Präparate und sollen im 2ten Theile abgehandelt werden. Der trockne dunkelgelbe Rost, welcher sich in feuchter Luft an der Oberfläche des Eisens bildet, ist Oxydhydrat mit kohlensaurem Eisenoxydul gemischt. Die sogenannten Sumpferze oder Ocher sind ähnliche Hydrate, die aber oft eine dreifache Verbindung von Eisenoxyd, Kieselsäure und Wasser enthalten, außerdem mit Kalk, Sand und andern fremden Stoffen mechanisch gemengt. Der Eisenglanz, welcher theils krystallisirt in glän-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0426-4

zenden, harten, stahlgrauen krystallinischen Stücken, theils in Schuppen, die gerieben rothes Pulver geben, vorkommt, welches auch den Namen Blutstein, Lapis haematites, bekommt, ist gewöhnlich reines Eisenoxyd.

Das Eisen färbt das Glas dunkelbouteillengrün, und die Farbe des grünen Glases rührt von einem Eisengehalte in den Materialien her, aus denen man das Glas bereitet. Bei diesem Zusammenschmelzen wird das in in diesen Materialien enthaltene Oxyd in das Oxydul verwandelt, wodurch die grüne Farbe entsteht. Zusatz von Braunstein oxydirt wieder das Oxydul, und wird selbst in Oxydul verwandelt; in diesem Zustande, nämlich das Eisen als gelbes Oxyd und das Mangan als blaßgraues Oxydul, färben diese beiden Stoffe das Glas am wenigsten. Die Gegenwart von Eisenoxyd in unsern Thonarten giebt den Ziegelsteinen ihre rothe Farbe, und je mehr Eisenoxyd ein Thon enthält, desto leichter wird er verglast; daher schätzt man die Ziegelsteine höher, je weniger sie nach dem Brennen, vorausgesetzt daß sie gut ausgebrannt sind, roth aussehen. Der Röthel, die rothe Kreide ist mit Eisenoxyd gemengter Thon.

Einige Chemiker nehmen noch ein drittes Eisenoxyd zwischen dem Oxyd und Oxydul an. Es ist dasjenige, welches die gewöhnlichen Eisenerze bildet, und welches 28,215 Procent Sauerstoff enthält. Berzelius sieht es aber als eine Verbindung des Oxyds mit dem Oxydul an, welche aus 69 Oxyd und 31 Oxydul besteht, und den Namen erhält: Eisenoxyd-Oxydul, Oxydum ferroso-ferricum. Diese Oxydverbindung wird auch öfter auf nassem Wege gebildet, wobei sich die beiden Oxyde sättigen, und sich dadurch auf diesem Oxydationspunkte erhalten. Einige Oxydulsalze oxydiren sich leicht, bis die Base Eisenoxyd-Oxydul wird; übergießt man sie in diesem Zustande mit kaustischem Kali, so bekommt man ein schwarzes Oxyd, welches Eisenoxyd-Oxydul ist (Aethiops martialis). Noch eine andere Verbindung der beiden Oxyde ist der Hammerschlag, welcher zwei bestimmte Lagen bildet, von denen die äußere mehr Oxyd, weniger Oxydul, die innere dagegen mehr Oxydul und weniger Oxyd enthält.

Die Verwandtschaft des Eisens zum Schwefel ist sehr groß, und wir kennen fünf Schwefelungsstufen. Erhitzt man eine eiserne Stange in einer Esse vor dem Gebläse, bis sie die Schweißhitze erhalten hat und zu sprühen anfängt, und stellt darauf ein Stück Stangenschwefel von rundem, ovalem oder viereckigem Umkreis, so geht es in wenigen Secunden durch, und das Loch hat die bestimmte Form des Schwefelstückes. Das Schwefeleisen im maximo ist der häufig als Mineral vorkommende Schwefelkies; dieser besteht aus 45,74 Eisen und 54,26 Schwefel. Um künstliches Schwefeleisen, welches zur Bereitung von Schwefelwasserstoffgas gebraucht wird, zu erhalten, mischt man etwas Eisenoxyd, z. B. feingeriebenen Hammerschlag, sehr genau mit dem doppelten Gewicht Schwefel, und erhitzt das Gemenge in einem gegen den Zutritt der Luft verschlossenen Gefäße; es entwickelt sich schwefligsaures Gas, und es bleibt Schwefeleisen zurück.

Mit dem Phosphor verbindet sich das Eisen leicht, wenn Phosphor-

säure mit Kohlenpulver und Eisen zusammengeschmolzen wird. Die Verbindung hat metallischen Glanz, ist grauweiß, spröde und ziemlich leichtflüssig. Eine geringe Menge Phosphoreisen in einer größeren Menge metallischen Eisens aufgelöst vermindert in der Kälte die Zähigkeit desselben, und verursacht, daß es bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft leicht bricht. Alle Eisenerze, die phosphorsaure Kalkerde und besonders ein phosphorsaures Eisensalz enthalten, geben ein phosphorhaltiges Roheisen, welches zwar zu Gußeisen benutzt werden kann, welches aber zur Bereitung von Stabeisen untauglich ist.

Mit dem Kohlenstoffe verbindet sich das Eisen in mehrern Verhältnissen. Mit Kohle übersättigt bildet es einen Körper, den man Reißblei oder Graphit (Plumbago) nennt. Dieses kommt theils in der Natur vor, theils wird es künstlich gebildet, wenn Roheisen in einer höheren Temperatur mit einem Ueberschusse von Kohlenpulver lange cämentirt wird. Das natürliche Reißblei ist stahlgrau, mehr oder weniger ins Schwarze sich ziehend, schwach metallglänzend, von blättrig schuppiger Textur, weich, fühlt sich fettig an, färbt stark ab, ist geschmacklos und unschmelzbar. Spec. Gew. = 2,4. Der reinste Graphit aus Cumberland in England besteht aus 96 Th. Kohlenstoff und 4 Th. Eisen. Die verschiedenen Arten des Roheisens und des Stahls sind verschiedene Verbindungsstufen des Eisens mit dem Kohlenstoffe. Stahl ist ein weniger kohlehaltiges Eisen als Roheisen, und verbindet mit der Geschmeidigkeit des reineren Eisens die Härte und leichtere Schmelzbarkeit des Roheisens. Man kennt zur Bereitung des Stahls mehrere Methoden, und darnach giebt es mehrere verschiedene Sorten von Stahl; alle aber bezwecken, das reine Eisen mit einer gewissen Menge Kohlenstoff zu verbinden. Obgleich eine gewisse Menge Kohlenstoff zur Güte des Stahls nothwendig ist, so ist dieses doch nicht allein hinreichend, um den besten Stahl hervorzubringen, sondern es ist dazu auch noch eine Beimischung von Mangan und von Phosphor nöthig; auch andere Metalle, als Silicium, Magnesium, Rhodium, Chrom, und besonders Silber, sind sehr nützliche Zusätze.

Der Stahl hat eine hellere Farbe als das Eisen; sein spec. Gew. ist 7,8 bis 7,9. Wenn der glühende Stahl schnell abgekühlt wird, z. B. durch Eintauchen in kaltes Wasser, so wird er hart, und kann, ohne zu zerbrechen, nicht mehr gebogen werden. Er ritzt jetzt Glas, und kann von der Feile nicht mehr angegriffen werden. Das Anlaufen des Stahls nach dem Erhitzen ist eigentlich eine Oxydation und die hierbei sich zeigenden Regenbogenfarben bestimmen den Grad der Hitze für den zu verschiedenen Zwecken bestimmten Stahl.

Von diesen Verbindungen des Eisens mit dem Kohlenstoffe ist der Graphit in den medicinischen Gebrauch gezogen, und sowohl innerlich als äußerlich angewandt worden, zu welchem er auf den gehörigen Grad der Feinheit gebracht werden muß. Zum innerlichen Gebrauche besonders darf nur der natürliche, und zwar der beste, der englische Graphit von Cornwall genommen werden, da der gewöhnliche noch Silicium, Alumium, Schwefelkies

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0428-5

und Kupferkies enthält, von welchen Verunreinigungen er indeß durch Kochen mit Salpetersäure und nachheriges vorsichtiges Auswaschen befreit werden kann. Zu technischen Zwecken dient der Graphit zur Verfertigung der Bleifedern; die Ypser- oder Passauertiegel werden aus einem Gemenge von Thon und Graphit verfertigt. Das sogenannte Wasserblei ist unreiner Graphit.

Das Eisen wird leicht von den Säuren aufgelöst und entwickelt dabei, durch die Zersetzung des Wassers, Wasserstoffgas. Das Wasserstoffgas ist jedoch nicht rein, sondern es führt den vom Eisen zurückgehaltenen Kohlenstoff mit sich; es hat davon einen eigenen Geruch, der verschieden ist von dem, welchen das durch Zink oder Zinn entwickelte Wasserstoffgas hat. Von chemisch reinem Eisen entwickelt sich dagegen ein Wasserstoffgas, das wenigstens dem Geruche nach nicht von dem unterschieden werden kann, welches man bekommt, wenn Zink, Zinn oder die Metalle der Alkalien in Säuren aufgelöst werden. Die Auflösungen des Eisens sind bläulich, grün (Oxydul), gelb oder roth (Oxyd). Werden diese Verbindungen des Eisens mit der Säure in fester Gestalt dargestellt, so erhält man Eisenoxydulsalze oder Eisenoxydsalze. Die Eisenoxydulsalze sind weiß oder blaßgrün, meistens in Wasser löslich; sie haben einen herben tintenartigen Geschmack, ziehen an der Luft Sauerstoff an, entziehen diesen auch vielen leicht desoxydablen Substanzen (Gold- und Silbersalzen, welche metallisch gefällt werden), und wandeln sich in Oxyduloxyd- oder Oxydsalze um, unter Abscheidung von Eisenoxyd oder basischem Salze. Reine und kohlensaure Alkalien fällen sie weiß, der Niederschlag wird schnell grün, dann braun. Blausaures Eisenoxydulkali fällt sie weiß, der Niederschlag wird an der Luft blau. Gallustinctur bewirkt anfangs keine Veränderung, durch Einwirkung der Luft entsteht aber bald ein blauschwarzer Niederschlag. Die Eisenoxydsalze sind braun oder gelb gefärbt, schmecken herber tintenhaft als die Oxydulsalze, werden durch reine und kohlensaure Alkalien braungelb gefällt; blausaures Eisenoxydulkali fällt sie dunkelblau, Gallustinctur blauschwarz.

Zum pharmaceutischen Gebrauche können zweckmäßig bei Bereitung von Eisenauflösungen kleine neue Nägel genommen werden, da die gewöhnliche Eisenfeile aus den Werkstätten mit Kupfer und Messing verunreinigt ist, und die sonst empfohlene und befolgte Methode, das Eisen mit einem Magnete auszuziehen, und es dadurch zu reinigen, durchaus nicht den Zweck erreichen läßt, indem nicht nur das mit Kupfer und Messing legirte Eisen vom Magnete gezogen wird, sondern selbst die Messing- und Kupferfeilstückchen mechanisch mitgerissen werden. Wo also Eisenfeile vorgezogen wird, da muß dieselbe in den Apotheken selbst oder wenigstens von sichern Leuten besonders bereitet werden und zwar aus dem geschmeidigen weichen Eisen, und unter diesem kann das zu Draht gezogene Eisen hiezu angewendet werden, daher denn auch die Eisenfeile von solchen Handwerkern, die in Eisendraht arbeiten, rein ist.

Durch seine Anwendbarkeit in den meisten Beschäftigungen der Menschen und in den Gewerken ist das Eisen ein ganz unentbehrliches Metall. Seine

Anwendung in metallischer Form ist allgemein bekannt. Auch im oxydirten Zustande wird es zu manchen ökonomischen und technischen Zwecken, zum Färben, Malen u. s. w. angewandt. In der Medicin ist es eins unserer kräftigsten stärkenden und adstringirenden Heilmittel, die mit dem größten Erfolge sowohl innerlich als äußerlich angewandt werden. Das Eisenoxyd und die Eisenoxydsalze übertreffen dabei an Wirksamkeit das Oxydul und die Oxydulsalze.

Bei den aus Eisen gefertigten Instrumenten kann die Entscheidung der Frage: ob auf diesen Instrumenten sich findende Rostflecke der Wirkung der Atmosphäre zuzuschreiben seyen, oder ob sie von Blute herrühren? in medicinisch-forensischer Hinsicht von der höchsten Wichtigkeit seyn. Daß hier eine geringe Ausbeute von Ammoniak beim Glühen eines solchen Rostes nicht beweisend seyn könne, hat Vauquelin dargethan, indem er fand, daß auch aus solchem Roste, der nur von Wasser herrührte, wo aber das Eisen in einer mit thierischen Ausdünstungen erfüllten Atmosphäre gehangen hatte, Ammoniak entwickelt wurde. Zur Entscheidung dieser wichtigen Frage mögen daher hier noch die von Chevallier deswegen angestellten Versuche (Froriep's Notizen, December 1826. S. 70.) einen Platz finden. Chevallier befeuchtete zu einer und derselben Zeit Eisenfeile mit Wasser und mit Blut, und setzte sie einige Monate an einen von thierischen Ausdünstungen entfernten Ort. Er erhielt folgende Resultate: Physische Kennzeichen. Nr. 1. Das von Wasser oxydirte Eisen. Die Masse ist hart, porös und schwer zu brechen, pulverisirt wird sie braun, sie hat fast keinen Geschmack. Nr. 2. Das durch Blut oxydirte Eisen. Die Rostmasse ist weniger hart, aber compacter, pulverisirt, gelbroth, wie Pulver der rothen China; der Geschmack ist ziemlich deutlich.

Mit destillirtem Wasser. Nr. 1. Zehn Gran pulverisirt und in das Wasser geworfen, zertheilen sich schnell und gleichmäßig durch Schütteln; kocht man es, so wird das Wasser nicht klebrig, filtrirt man es und dunstet es bis zur Trockne ab, so erhält man einen so geringen Rückstand, daß man ihn nicht untersuchen kann. Nr. 2. Zehn Gran eben so behandelt, zertheilen sich nicht, sondern bilden kleine zusammengeklebte Massen, welche sich auch durch starkes Schütteln nicht zertheilen lassen. Durchs Kochen wird das Wasser klebrig, reagirt wie das Blutwasser alkalisch, schäumt und fließt aus dem Gefäße, wenn man es nicht vom Feuer entfernt. Filtrirt und abgedunstet giebt es einen animalischen Rückstand, welcher dem Osmazom ähnlich ist. Gießt man diesen Rückstand in einen gläsernen Tubus, der an einer Seite verschlossen ist, so erhält man eine Menge kohlensaures Ammoniak (das man in Wasser oder bei Versuchen mit sehr kleinen Mengen in sehr verdünnte salpetersaure Queckſilberoxydulauflösung auffängt, aus welcher durch Ammoniak Hahnemannsches Queckſilberoxydul gefällt wird), und eine der thierischen ähnliche Kohle im Rückstande (die wohl noch durch Glühen mit Kali auf Blutlauge geprüft werden kann).

Mit Salzsäure. Nr. 1. ist völlig auflöslich darin. Die Solution ist

dunkelgelb, und bildet mit blausaurem Kali einen azurblauen Niederschlag. Nr. 2. ist nur zum Theil in Salzsäure löslich, und entwickelt während des Auflösens Schwefelwasserstoffgas. Filtrirt man, so hat die Solution eine gelbliche Farbe, und wird vom blausauren Kali grünlichblau niedergeschlagen. Das Residuum gewaschen und getrocknet ist schwärzlichgrau und flockig (Eiweiß); am Feuer liefert es alle Producte der eben so behandelten thierischen Substanzen. In einer gläsernen Retorte erhitzt entwickelt es einen Dampf, welcher geröthetes Lackmuspapier herstellt, und eine Platinsolution präcipitirt; im Tubus bleibt eine glänzende schwarze Kohle.

Mit Schwefelsäure. Nr. 1. ist in schwacher Säure völlig löslich. Nr. 2. nur theilweise; der Rückstand auf einem Filtrum gesammelt, ist flockig und giebt am Feuer alle Producte thierischer Stoffe.

Mit reinem Kali. N. 1. Läßt man 10 Gran in einer Auflösung von 6 Gran Kali in 2 Unzen Wasser fünf Minuten lang kochen, und seiht die Flüssigkeit durch, so fließt sie gefärbt ab, sättigt man sie mit Säure, so schlagen sich kaum einige weißliche Flocken nieder. Nr. 2. Dieselbe Quantität eben so behandelt, giebt beim Durchseihen eine braune Flüssigkeit, und wenn man diese mit Säure sättigt, so fallen eine Menge brauner Flocken nieder, welche sich am Boden des Gefäßes vereinigen.

Aus diesen Versuchen geht hervor: 1) daß man das durch Wasser oxydirte Eisen von dem durch Blut oxydirten durch physische und chemische Merkmale unterscheiden könne, und 2) daß das Wasser, die Salzsäure, die Schwefelsäure und das Kali die dazu passenden Reagentien sind.

Filix. Die Wurzel. Farrnkrautwurzel.

Aspidium Filix mas Swartz. In den Wäldern Deutschlands häufig.

Eine große Wurzel (Wurzelstock), mit den Rückständen der Blattstiele und spreuartigen Schuppen umgeben, frisch außen schwarzbraun, innen blaßgrünlich fleischig, getrocknet außen braunroth, innen röthlichweiß, von einem süßlich-bitterlichen Geschmacke und etwas widrigem Geruche. Sie werde nicht verwechselt mit der Wurzel von Aspidium filix femina und spinulosum, welche weniger fleischig und von dunklerer Farbe sind. Um das Pulver zu bereiten, werde die frische Wurzel wohl abgeschält, vorsichtig getrocknet, und das Pulver in gut zu verstopfenden Gläsern aufbewahrt. Sie werde im Herbste oder Frühlinge gesammelt, und nicht über ein Jahr aufbewahrt.

Aspidium Filix mas Swartz. Männlicher Nierenfarrn. Bandwurm-, Waldfarrn. Farrnkraut.

Polypodium Filix mas Linn.

Nephrodium Filix mas Rich.

Linn. Cl. XXIV. Cryptogamia. Ord. 2. Filices.
Juss. Cl. I. Ord. 1. Filices.

Diese ausdauernde Pflanze wächst durch ganz Europa, und findet sich vorzüglich in schattigen Wäldern und Gebüschen, an alten Mauern und zwischen bemoosten Felsen.

Die Wurzel, Johanniswurzel, Johannishand, liegt flach und horizontal, ist holzig, kriechend und mit vielen kleinen, häutigen Schuppen und Fasern besetzt. Die Blätter oder Wedel sind anfangs spiralförmig gewunden, und rollen sich nach und nach in die Höhe steigend auseinander. Sie sind ausgebreitet, grün, doppelt gefiedert, 1—2 Fuß lang, und haben Stiele, die, so wie auch die Hauptrippen, der Länge nach mit kleinen, trocknen, häutigen Schuppen dicht besetzt sind. Die größern Blättchen sind lancettförmig und minder gefiedert, die kleineren sind am Grunde fast zusammenfließend, länglich, stumpf, nehmen gegen die Spitze an Größe ab, und bilden zusammen eine Pyramide. Die Frucht besteht in kleinen, bedeckten, mit einem elastischen Ringe umgebenen Kapseln, die in nierenförmige, auf der Rückseite der Blättchen in zwei Linien gedrängt stehende Häufchen vereinigt sind.

Die Blüthezeit ist Juni bis September.

Das Wachsthum der Pflanze geschieht auf folgende Weise: Der Wurzelstock wächst nur an der Spitze vorwärts, und macht einen oder andern Nebenast. 3 bis höchstens 6 Stück Laub entfalten sich in der Spitze zweimal im Jahre; sobald diese im folgenden Frühlinge vertrocknen, bleibt auf dem Wurzelstock nur der untere etwas verdickte Theil des Strunkes stehen, und bekleidet den ganzen Wurzelstock. Dieser verdickte Theil des Strunkes enthält eine markige Substanz, die der eigentlich wirksame Bestandtheil ist. Diese Ueberbleibsel des Strunkes haben aber nur in dem jährigen und vorjährigen Zustande den Geschmack und die Wirksamkeit, die übrigen ältern sind kraftlos und schmecken nur etwas zusammenziehend.

Die Wurzel ist länglich, gegen 6 Fuß lang, bis 3 Zoll dick und besteht aus vielen länglich-eirunden Knoten oder Dornen, die mit rostfarbigen Schuppen bedeckt sind. Nach unten hin treibt sie viele schwarzbraune Fasern, und hat fast das Ansehn eines geflochtenen Zopfes. Im frischen Zustande hat sie auswendig eine grünlich-schwarzbraune, und inwendig eine grünlich- oder gelblichweiße Farbe, und markige Beschaffenheit; getrocknet aber ist sie außen dunkelbraun, etwas ins Röthliche spielend, und innen bleich bräunlichgelb. Der Geruch der frischen Wurzel ist schwach, etwas erdig und widrig, der Geschmack ekelhaft, anfangs süßlich und schleimig, dann aber bitterlich herbe und einigermaßen zusammenziehend. Die Wurzel soll nach Einigen im Spätherbste gesammelt unwirksam seyn, und daher in den Sommermonaten gesammelt, schnell getrocknet, und an einem trocknen Orte aufbewahrt werden. Sie muß auf dem Bruche ein pistaziengrünes Ansehen und einen virösen Geruch haben. Zwei bis drei Jahre reichen hin, das wurmtreibende Princip derselben zu zerstören, schon wenige Monate nach dem Trocknen ist das Verhältniß desselben in der Wurzel nicht mehr dasselbe. Das Pulver,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0432-6

aus den abgeschälten Wurzeln bereitet, ist grünlichgelb, und darf nicht in zu großer Menge vorräthig gehalten werden, weil es noch schneller, als die ganze Wurzel, an Wirksamkeit verliert.

Die Wurzel von **Aspidium Filix mas** unterscheidet sich dadurch, daß sie kurz und perpendiculär in die Erde steigt, und durch die schwarzen Schuppen ohne derben fleischigen Inhalt. Bei **Aspidium spinulosum** ist der Wurzelstock schwächer, die Ueberbleibsel der Strünke sind weniger verdickt, und enthalten nur sehr wenig markige Substanz von schwachem Geschmacke. Die Wurzel der **Pteris aquilina** ist dünner und länger, kriechend, ästig, auswendig von schwarzer Farbe, inwendig weiß gesprenkelt. (Vergleiche über die Verwechselungen: Schrader im Berl. Jahrb. 1803, und Willdenow in demselben 1807.)

Morin (Berl. Jahrb. XXVI. 2. 1825. S. 80. und Trommsd. N. J. 2. S. 101.) digerirte zuerst mit Aether; nach dem Verdunsten blieb eine bräunlichgelbe fette Materie zurück, die den der Wurzel eigenen naseösen Geruch und einen sehr unangenehmen Geschmack besaß. Auf glühenden Kohlen verbrennt sie unter Entwickelung eines dicken gewürzhaften Rauches, und läßt kaum eine Spur Kohle zurück. Sie ist schwerer als Wasser, und wenn sie zuweilen darauf schwimmt, so rührt dieses von der Adhäsion ihrer Molecülen unter sich her; sie röthet das Lackmuspapier. Destillirt man sie mit Wasser, so hat dasselbe den Geruch und Geschmack der Materie, und bei der Ruhe scheidet sich etwas weißes ätherisches Oel ab, dessen Geruch mit dem der Wurzel übereinstimmt. Wird nach Chevreul's Methode Seife aus ihr bereitet, und diese wieder durch Weinsteinsäure zersetzt, so wird die fette Materie in Oel- und Talgstoff geschieden. Morin hält dafür, daß es diese fette Materie der Farrnkrautwurzel sey, welche ihr die arzneilichen Kräfte ertheilt.

Hierauf wurde die Wurzel mit Weingeist digerirt und die Tincturen mit einem Zusatze von Wasser destillirt. Nach Abscheidung des Weingeistes blieb eine gelbliche saure Flüssigkeit zurück, die einen ziemlich starken zuckerigen Geschmack besaß. Sie wurde bei mäßiger Wärme bis zur starken Syrupsdicke verdampft, und dann längere Zeit mit Aether geschüttelt. Dieser zog daraus eine kleine Menge fetter Materie, der früher erhaltenen ähnlich. Als diese fette Materie mit destillirtem Wasser ausgewaschen wurde, so erhielt das letztere die Eigenschaft, die Lösungen der Eisensalze schwarz zu fällen, ohne jedoch die des thierischen Leims zu trüben. Die Lösung des Syrups hingegen brachte mit dem thierischen Leim einen im siedenden Wasser auflöslichen Niederschlag hervor. Um den Zucker von dem zusammenziehenden Stoffe zu befreien, wurde die Auflösung mit einem Ueberschusse von flüssigem Eiweiße gekocht. Nach dem Abrauchen bildeten sich Krystalle von Zucker, der mit einer kleinen Menge Hefen leicht in Weingährung überging; jedoch mit einigen Tropfen Schwefelsäure zusammengerieben, entband sich aus ihnen ein gemischter Geruch nach Salzsäure und Essigsäure. Calcinirt hinterließ der Zucker einen weißen kalischen Rückstand, welcher, mit starkem Weingeiste

behandelt, diesem salzsaures Kali abtrat. Was der Weingeist nicht gelöset, färbte der Veilchensaft grün. Im Wasser löste sich alles bis auf einige Flocken auf, die aus phosphorsaurem Kalke bestanden. Die wäßrige Lösung erregte Aufbrausen mit den Säuren, und einen Niederschlag in der salzsauren Platinlösung. Es war also kohlensaures Kali.

Die mit Aether und Weingeist ausgezogene Farrnkrautwurzel wurde mit Wasser bei 40 ° C. behandelt, und dadurch ein klümpriges Extract erhalten, welches größtentheils in kaltem Wasser wieder auflöslich war, bis auf eine Haut, die sich während des Abdampfens gebildet hatte. Diese blieb auf dem Filter zurück, wurde ausgewaschen, und zeigte sich auch in siedendem Wasser nur in kleiner Menge löslich, welches jedoch dadurch die Eigenschaft erhielt, das Jod blau und die Eisensalze schwarz zu fällen, auch die Lösung des thierischen Leims niederzuschlagen. Wahrscheinlich war also diese Haut durch die Wirkung des Gerbestoffs auf das Stärkemehl entstanden. Die kalte Lösung enthielt Stärkemehl, welches durch die lange Einwirkung des Wassers in Amidin verändert war, und eine in Weingeist lösliche zuckerige Masse, welche die Gallerte fällte, und die Eisensalze schwarz niederschlug.

Der Rückstand der Wurzel wurde zu einem Teige zerstoßen, mit destillirtem Wasser ausgewaschen, und die Waschwasser durch ein seidenes Sieb abgesondert. Aus der milchigen Flüssigkeit wurden durch Schlemmen zwei Substanzen abgesondert. Die eine war sehr weiß und leichter, als die andere, welche eine graue Farbe und ein gallertartiges Ansehen hatte, und schwerer war. Die leichtere war ein mit einer färbenden Materie verunreinigtes Stärkemehl, die mit ätzender Kalilauge behandelt ganz weiß wurde. Die gallertartige Materie wurde durch Jodtinctur stark blau gefärbt, weil sie noch Stärkemehl beigemischt enthielt. Um sie von diesem zu befreien, wurde sie in mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser einige Minuten gekocht. Der ungelöste Rückstand wurde auf einem Filter so lange mit Weingeist behandelt, bis er keine Wirkung mehr auf das Lackmuspapier zeigte. Die gallertartige Materie hatte jetzt eine grauliche Farbe, keinen Geruch, und wurde durch siedendes Wasser nicht gelöst. Mit schwacher Salzsäure behandelt erhielt sie eine schöne Rosenfarbe, und löste sich zum Theil in dieser Flüssigkeit auf; Ammoniak schlug sie in bläulichen Flocken nieder. In kaustischer Kalilauge war die Materie leicht auflöslich, und Galläpfeltinctur fällte aus dieser Lösung weiße Flocken. Salpetersäure gab Sauerkleesäure.

Der Wurzelrückstand mit verdünnter Schwefelsäure behandelt, gab eine zuckerartige, ganz mit dem Stärkezucker übereinstimmende Masse. Die durch Waschen von aller Säure befreite Wurzel gab mit Aetzkali behandelt Ulmin, das unstreitig künstlich erzeugt war. Der Rückstand war Holzfaser.

Nach dieser Analyse Morin's ist die männliche Farrnkrautwurzel zusammengesetzt aus: 1) flüchtigem Oele; 2) einer fetten Materie, aus Oel- und Talgstoff bestehend; 3) Galläpfel- und Essigsäure; 4) unkrystallisirbarem Zucker; 5) Gerbestoff; 6) Stärkemehl; 7) einer in Wasser und Weingeist unlöslichen gallertartigen, dem Ulmin sich nähernden Materie und 8) Holzfaser.

In der Asche wurden basisches kohlensaures, schwefels. und salzs. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk, Thonerde, Kieselerde und Eisenoxyd gefunden.

Aehnliche Resultate gab eine Analyse des Hrn. v. Gebhardt (Pfaff's Syst. der Mat. med. VII. S. 214.) obgleich der Gang derselben abweichend war, indem hier die Ausziehung mit Wasser begonnen wurde. Die Hauptabweichungen sind folgende: Hr. v. Gebhardt fand, daß die fette Materie ein Balsamharz enthielt. Aus dem süßen Extractivstoffe wurde durch Behandlung mit Weingeist von verschiedener Stärke gewöhnlicher Extractivstoff abgeschieden, dem jedoch noch Gerbestoff und süßer Extractivstoff anhing. Der Gerbestoff wurde hier, nicht wie von Morin durch Eiweiß, sondern mit Kalkwasser niedergeschlagen. Einige Abweichungen finden auch in den stärkemehlartigen Stoffen statt, die aber leicht erklärbar sind, da diese nach der Art, wie die Wurzel ausgetrocknet, und nach dem Zeitraum, während dessen sie der Wirkung des Wassers und der Luft ausgesetzt gewesen, stets in abweichender Form erscheinen. Der gallertartige Stoff des Hrn. Morin scheint durch die Behandlung mit Kali aus dem Faserstoffe der Wurzel gebildet worden zu seyn. Nach Gebhardt enthält die Wurzel folgende Bestandtheile: 1) ein fixes grünes Oel; 2) Weichharz; 3) Gerbestoff; 4) süßen Extractivstoff; 5) Stärkemehl; 6) färbenden Extractivstoff; 7) Eisen; 8) Oxalsäure; 9) Kalkerde; 10) Thonerde; 11) Kieselerde; 12) Gyps; 13) salzsaures Kali; 14) schwefelsaures Kali.

Peschier hat die Meinung Morin's, daß die durch Aether ausgezogene öligfettige Materie der eigentlich wirksame Bestandtheil der Farrnkrautwurzel sey, bestätigt, indem dieselbe in Gaben von 30—36 Tropfen angewendet, in Syrup, Ricinusöl oder in Pillen gegeben, weder Kolik noch Magenschmerz, noch sonst einen Zufall erregt und schon mehrmals gegen den Bandwurm Hülfe geleistet habe. Später (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 101.) hat er das durch Aether bereitete Extract noch weiter zerlegt, und daraus geschieden: eine fettwachsartige Substanz; braunes Harz; flüchtiges aromatisches Oel; fettes aromatisches Oel; grünen Farbestoff; röthlichbraunen Farbestoff; Extractivstoff; salzsaures Kali; Essigsäure.

Peschier hatte die fettige Substanz Oleum filicis maris genannt, Buchner (Repert. XXIII. 3. 1826. S. 433.) bemerkt, daß sie wohl richtiger Extractum resinosum genannt werden müsse. Dieses sey in Alkohol mit Hinterlassung einiger wachsartigen Flocken auflöslich, und die Auflösung bilde bei der Vermischung mit Wasser eine schmutziggelbe Milch, einem erkalteten Chinadecocte ähnlich, aus der sich selbst nach mehreren Tagen kein Harz oder Oel ausscheidet. Verdünnt man die Milch mit so vielem Wasser, daß sie anfängt, durchscheinend zu werden, und erhitzt man sie dann zum Sieden, so erfolgt eine beinahe vollkommene Auflösung, die Flüssigkeit ist dann nur noch opalisirend, und diese Trübung wird weder durch Aetzammoniak noch durch Salz- oder Schwefelsäure aufgeklärt. Der wirksame Bestandtheil sey also weder Harz noch Oel, weder ein Alkaloid, noch eine Säure, sondern scheine zu jenen harzähnlichen Farbestoffen zu gehören, welche

wie das Chinaroth, das Aloëharz, das Capsicin u. s. w. zwar in Alkohol am reichlichsten aufgelöst werden, aber auch in Wasser nicht ganz unauflöslich sind. Buchner schlägt vor, statt des theuren Aethers zur Ausziehung Weingeist anzuwenden. Vauquelin habe diesen Stoff richtiger als scharfes Harz bezeichnet, denn es war nur so lange öligflüssig, als es noch Aether enthielt (oder wäßrige Theile, nach der Verflüchtigung des nicht absoluten Aethers zurückbleibend).

Die Farrnkrautwurzel, welche schon früher ein Hauptingrediens der verschiedenen Geheimmittel gegen Würmer ausgemacht hat, und als vorzüglich wirksam gegen Bandwurm und Askariden empfohlen ist, wird in Pulverform gegeben, und um dieses zu bereiten, muß durchaus nicht die ganze Wurzel mit ihren unwirksamen Schuppen, sondern nur die an der Spitze des Wurzelstockes befindlichen Ueberbleibsel des Strunkes, die innerlich eine grünlichgelbe Farbe haben, von allen Häuten gereinigt verwendet werden.

Um das neuerlich empfohlene Oleum filicis maris zu bereiten, wird das frisch bereitete Pulver entweder mit Aether oder mit Weingeist ausgezogen und dieses letztere, weingeistige Extract kann dann noch mit Aether ausgezogen werden, wobei bei weitem nicht soviel Aether verloren geht. Peschier erhielt durch Ausziehen mit Aether aus einer Unze Pulver 64 Gran, Buchner (aus altem nicht frisch bereitetem Pulver) 36 Gran; ich erhielt aus 4 Unzen frischen Pulvers eine halbe Unze.

Man giebt die eine Hälfte der Dosis (nämlich 30—36 Tropfen) des Abends, die andere den folgenden Morgen, und 2 Stunden nach dieser letzteren 2 Unzen Ricinusöl (da der Wurm getödtet, nicht abgeführt wird), worauf gewöhnlich der Wurm abgeht. Selten ist es nöthig, das Verfahren zu wiederholen. Geht aber der Wurm nicht ab, so wiederholt man den nämlichen Abend und folgenden Morgen die erste Gabe. Die Wirksamkeit dieses einfachen und leicht zu nehmenden Mittels hat sich jedoch nicht unbedingt und in allen Fällen bestätigt.

Foeniculum. Der Saame. Fenchelsaamen.

Foeniculum vulgare Gaertn. Eine zweijährige Pflanze des südlichen Frankreichs und der Schweiz, in Deutschland angebaut.

Längliche, gestreifte, grünlichgraue Saamen, von etwas gewürzhaftem angenehmen Geruche und süßlichem Geschmacke.

Foeniculum vulgare Gaertn. Der gemeine Fenchel.

Anethum Foeniculum Linn. Fencheldill. Meum Foeniculum Spr. Foeniculum dulce Link.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Man hält Syrien und die azorischen Inseln für das eigentliche Vaterland des gemeinen Fenchels, dessen angenehmer und eigenthümlicher Geruch

fast allein hinreicht, um ihn von den andern Doldengewächsen zu unterscheiden. Er ist zwei-, auch mehrjährig, und wächst jetzt in der Schweiz, in Frankreich, Spanien, England und Deutschland, wo er gewöhnlich in Gärten und im Großen angebaut wird.

Die Wurzel ist spindelförmig, fingersdick, auch etwas dünner, am Ende zweitheilig, nur wenig faserig und von weißlicher Farbe. Der Stengel ist bläulichgrün, aufrecht, rund, glatt, gestreift, 4—6 Fuß hoch. Die Blätter sind breit, lang, glatt, ästig und 2—3mal gefiedert; die einzelnen Blättchen derselben zahlreich, zweitheilig, fast haarförmig und auseinander gesperrt. An der Spitze des Stengels und der Zweige bilden sich ausgedehnte, ungleiche, vielstrahlige Dolden, wovon jeder einzelne Strahl eine kleine, kurze, vielblüthige Dolde trägt. Die Blumenkrone besteht aus fünf gelben oder grünlichgelben Blättern.

Die Frucht besteht in 2 kleinen, ovalen, auf einer Seite glatten, auf der andern bauchigen, mit drei Streifen gezeichneten, zuweilen etwas gekrümmten Saamenkörnern, von grünlichgrauer Farbe, einem eigenthümlichen, starken, angenehmen Geruche, und gewürzhaftem, süßlichem, dem Anis nahe kommenden Geschmacke. Der italische oder kretische Fenchel (**Foeniculum dulce**) ist länger, schmal, gekrümmt, nicht so glatt als der deutsche, mehr hellgelb, süßer und ölreicher.

Die Saamen geben bei der Destillation von 10 Pfunden 4—5 Unzen ätherisches Oel; Hagen erhielt verschiedene Ausbeute, aus 8 Pfunden 8½ Loth, zu andern Zeiten aus 12 Pfunden nur 4 Loth 1½ Quentchen.

Durchs Auspressen erhält man ein fettes grünes Oel, das $\frac{1}{10}$ des Ganzen beträgt, das jedoch immer etwas von ätherischem Oele beigemischt enthält und davon Geruch und Geschmack hat.

Durch Ausziehen des Fenchelsaamens mit Weingeist und gelindes Abrauchen trennt sich das dickliche Oel von dem eigentlich harzigen Stoffe, und kann so besonders gesammelt werden, während letzterer mit braungelber Farbe und dem eigenthümlichen, etwas aromatisch scharfen und süßen Fenchelgeruche zurückbleibt.

Der Fenchelsaamen wird als Zusatz zum Thee oder in Pulverform bei Brustkrankheiten und zur Vermehrung der Milch angewendet, auch als Gewürz benutzt.

Bisweilen wird auch noch die Wurzel (**Radix Foeniculi**) verlangt, doch steht sie dem Saamen weit nach, da bei der getrockneten Wurzel der Geruch beinahe gänzlich verloren gegangen, und nur noch etwas Geschmack zu bemerken ist. Eine (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 374.) erwähnte Verwechselung der Fenchelwurzel mit Belladonnenwurzel ist kaum glaublich, da die Verschiedenheit so sehr groß ist.

Foenum graecum. Der Saame. Bockshornsaamen.

Trigonella Foenum graecum Linn. Eine einjährige Pflanze des mittägigen Europas.

Fast viereckige, zusammengedrückte Saamen, mit einem einwärts gebogenen anliegenden Schnäbelchen, hart, gelb, bisweilen in die braune Farbe übergehend, von melilotenartigem Geruche.

Trigonella Foenum graecum Linn. Der gemeine Kuhhornklee. Bockshorn. Griechisches Heu.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Der Bockshorn wird auch in einigen Gegenden Deutschlands angebaut.

Aus einer weißen Wurzel kommen aufrechte, einfache, seltener ästige, 1—1½ Fuß hohe Stengel hervor. Die Blätter stehen abwechselnd, und sind dreizählig, aus drei kurzgestielten, keulenförmigen, stumpfen Blättchen zusammengesetzt. Die gelben Schmetterlingsblüthen erscheinen einzeln sitzend, in den Winkeln der obersten Blätter. Der grüne längliche Fruchtknoten wächst besonders schnell zur Frucht heran, und erscheint nun als eine große, 4—5 Zoll lange, zusammengedrückte, bogenförmig gekrümmte, etwas runzlige, in eine lange runde Spitze auslaufende Hülse. An der erwachsenen Pflanze findet man diese Hülsen fast in allen Blattwinkeln. Sie enthalten gewöhnlich zwölf Saamen. Diese sind dunkelgelb, an beiden Enden abgestutzt, und an den Seiten mit einem schieflaufenden Eindrucke bezeichnet; im getrockneten Zustande geht die Farbe mehr in Braun über. Sie besitzen einen eigenthümlichen, unangenehmen Geruch, dem Steinklee ähnlich, und haben einen bedeutenden Gehalt an Schleim, daher sie auch zu den äußerlichen erweichenden Mitteln gehören. Der Geschmack ist schleimig-bitter. Ihr Inneres ist stärkemehlartig. Eine Unze Saamen macht in der Wärme 16 Unzen Wasser sehr schleimig. Der Aufguß wird durch schwefelsaures Eisen schwarzbraun gefärbt. Bassou fand in diesen Saamen ein scharfes fixes Oel, und später ein flüchtiges; einen bittern, ekelhaften, allen Hülsenfrüchten eigenen Stoff, und einen gelben Farbestoff, mit welchem Wolle und Baumwolle gefärbt werden konnte.

Der Bockshornsaamen wird vorzüglich nur in der Thierheilkunde benutzt, wo er als ein Mittel gegen den Rotz berühmt ist. In der Levante soll er gegessen werden.

Die ganze Pflanze verbreitet getrocknet einen starken, durchdringenden, sehr fest haftenden Geruch, der mehrere Jahre lang bleibt.

Formicae. Ameisen.

Formica rufa Linn. Ein zu der Ordnung der Hautflügler gehöriges in Europa häufiges Insect.

Rothbraun-schwärzliche Insecten, mit einer flüchtigen, einen Essiggeruch verbreitenden Säure begabt. Nur die lebenden und von den Baumabfällen gereinigten dürfen angewandt werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0438-1

Die Holzameisen oder Waldameisen leben, wie die Bienen, in Gesellschaft, und in einem Ameisenhaufen lassen sich, wie in einem Bienenstocke, drei Geschlechter, die Männchen, die Weibchen und die Geschlechtslosen unterscheiden. Die letztern allein verrichten die Arbeiten, und sorgen für die Erhaltung der jungen Brut; sie haben keine Flügel. Die Männchen haben Flügel, die Weibchen sind auch ungeflügelt, aber größer, als die Geschlechtslosen. Die Weibchen bleiben in ihrem Neste und werden darin von den Männchen befruchtet. Die Männchen sterben bald nach der Befruchtung; die Weibchen überwintern aber, gleich den Geschlechtslosen, und legen ihre befruchteten Eier im Frühling in ihren unterirdischen Kammern ab. Mit diesem Eierlegen fahren sie bis in den August fort, während welcher Zeit ein einziges Weibchen über 7000 Eier von der Größe eines Hirsekornes legen kann. Aus diesen Eiern kriechen nach einigen Tagen Würmer hervor, welche nach 10—14 Tagen, wo sie von den Geschlechtslosen gefüttert werden, sich mit einem zarten und zähen Häutchen umspinnen, und so Puppen bilden, aus welchen sich die vollkommenen Ameisen entwickeln. Diese verpuppten Larven, keinesweges aber die Eier der Ameisen, sind die unter dem Namen der Ameiseneier bekannten, weißen, länglichen Körperchen, welche im Sommer gesammelt werden, um Nachtigallen und andere Vögel damit zu füttern.

Die Ameisen halten sich in ungeheurer Anzahl in Fichtenwäldern auf, und bilden große, stumpfe, kegelförmige Haufen, die sie aus Fichtennadeln, Reiserchen, Holzspähnen u. dergl. zusammensetzen. Sie tragen auch die Harzkörner von Wacholdern und Fichten (wilden Weihrauch) ein, die sie mit als Baumaterial brauchen.

Die Ameisen haben keinen Stachel, beißen aber und spritzen, wenn sie berührt werden, zu ihrer Vertheidigung einen sauren wohlriechenden Saft aus, der auf der Hand ein Brennen erregt.

Statt dieser großen Waldameise mit einer glatten eisenrostfarbenen Brust und schwarzbraunem Hinterleibe, können auch in etwaniger Ermangelung derselben die schwarzen und gelbrothen Arten der Gartenameisen angewandt werden; doch erhalten die ersteren vorzüglich viele saure und ätherisch-ölige Theile.

Daß die Ameisen eine Säure enthalten, war schon gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts von Botanikern bemerkt worden, als sie die in Ameisenhaufen gefallenen Cichorienblüthen geröthet sahen, (rothe Spuren zeigen sich schon, wenn die Waldameise über blaue Blumen hinwegläuft). Im Jahre 1670 wurde aber die Säure zuerst von Sam. Fischer durch Destillation der Ameisen mit Wasser dargestellt. Marggraf suchte die Eigenthümlichkeit dieser Säure nachzuweisen, welchen Weg Richter mit Erfolg befolgte. Fourcroy und Vauquelin erklärten sie jedoch für eine innige Verbindung der Aepfel- und Essigsäure. Suersen und Gehlen haben aber zuletzt die specifische Natur der Ameisensäure außer allen Zweifel gesetzt. Diese Säure ist im reinen Zustande wasserklar, besitzt ein spec. Gew. von 1,102

bis 1,113, einen eigenthümlichen Geruch, der völlige Aehnlichkeit mit den Ausdünstungen eines Ameisenhaufens hat, und sich merklich vom Geruche der concentrirten Essigsäure unterscheidet, und einen merklich weniger sauren Geschmack, als die reine Essigsäure; sie gefriert auch in den höchsten Kältegraden nicht, und erfodert zur Neutralisirung eine geringere Menge Salzbasis, als eine Essigsäure von gleichem specifischen Gewichte. Döbereiner (Zur pneum. Chemie. III. 1822. S. 32 u. 61.) hat die Ameisensäure künstlich dargestellt: ein Gemenge von Weinsteinsäure oder Weinsteinrahm, schwarzem Manganoxyd und Wasser wird erhitzt; es entwickelt sich unter starkem Aufbrausen Kohlensäure, und eine flüssige Säure geht über, die wirklich Ameisensäure ist. Wird Schwefelsäure zugesetzt, so wird die Weinsteinsäure vollständig in Kohlensäure, Wasser und Ameisensäure zersetzt, und das Product der letzteren Säure vermehrt. Die besten Verhältnisse sind 2 Th. Weinsteinsäure, 5 Th. Manganperoxyd und 5 Th. Schwefelsäure, mit dem doppelten Betrage ihres Gewichtes an Wasser verdünnt. Die Ameisensäure betrachtet Döbereiner als eine Verbindung von 4 Raumtheilen Kohlenoxyd mit 2 Raumtheilen Wasserdampf ($\dot{C}O + HO$.).

Außer dieser eigenthümlichen Säure enthalten die Ameisen auch noch Aepfelsäure, fettes und flüchtiges Oel, Gallerte, vielleicht auch Harz. Das ätherische Oel hatte schon Neumann entdeckt, welches später auch Margraf durch Destillation der Ameisen mit Wasser, auf diesem schwimmend, erhielt; er fand es in gewöhnlichem rectificirten Weingeiste unauflöslich, von gar keinem hitzigen Geschmacke und dabei ganz besonderm Geruche. Aus dem Rückstande, von welchem das Flüssige getrennt worden, erhielt er noch durch Auspressen ein fettes Oel. Dieses riecht etwas nach Ameisen, hat eine braunröthliche Farbe, ist durchsichtig, verdickt sich aber in der Kälte, wird dann undurchsichtig, und verhielt sich übrigens ganz wie alle andern fetten Oele.

In der Medicin werden die Ameisen bloß zur Bereitung des Ameisenspiritus gebraucht, wozu sie lebendig und von den Unreinigkeiten möglichst befreit angewandt werden müssen; sonst werden sie auch bisweilen zur Bereitung eines Bades für einzelne gelähmte Gliedmaßen benutzt.

* Fraxinus. Die Rinde. Eschenrinde. Hocheschenrinde.

Fraxinus excelsior Linn. Die gemeine Esche.

Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 2. Dioecia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 4. Jasmineae.

Dieser Baum wächst durch ganz Europa, häufig in Deutschland, auch im nördlichen Asien, und macht als Zierde unserer Wälder den höchsten Bäumen den Rang streitig. Mit Schnelligkeit wächst die Esche aus dem Grunde der Thäler bis zum Gipfel der Berge, erreicht zuweilen eine Höhe von 130 Fuß, und wird 2—300 Jahre alt. Ihre Nähe ist jedoch allen Vegetabilien schädlich und verderblich, welches man den giftigen Ausflüssen ihres Laubes zuschreibt. Die spanischen Fliegen pflegen aber auf diesem Baume sich sehr häufig einzufinden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0440-0

Die Rinde dieses bekannten Baumes ist rauh, rissig, zerbrechlich, auswendig von einer aschgrauen ins Grüne spielenden Farbe, mit hellen, höckrigen Punkten besetzt, und inwendig weißgelblich. Sie besitzt keinen Geruch, aber einen bittern, schleimigen, zusammenziehenden Geschmack. Der wäßrige und geistige Auszug hat, gegen das Licht gehalten, eine blaßgelbe Farbe, aber gegen einen dunklen Körper gehalten, erscheint er himmelblau. Die Rinde enthält Gerbestoff, und giebt, so wie das Holz, mit Eisenvitriol eine schwarze Farbe.

Zum arzneilichen Gebrauche zieht man die Rinde der ältern Aeste der der jüngern Zweige vor, und reinigt sie von der Oberhaut, und den ihr anhängenden Moosen und Flechten. Sie gehört zu den adstringirenden Mitteln, und ist als Chinasurrogat empfohlen worden, jedoch wenig mehr im Gebrauche.

In warmen Gegenden schwitzt aus der Rinde und den Blättern ein zuckerartiger Saft aus, der eine geringe Sorte von Manna giebt.

Das feste Holz dieses Baumes, das oft schön adrig und geflammt ist, wird von Tischlern und andern Künstlern benutzt.

Frumentum. Der Spiritus. Kornbranntwein.

Ein Destillat aus den der Gährung unterworfen gewesenen Getreidekörnern.

Eine mehr oder weniger aus Alkohol, Wasser und einem eigenthümlichen Oele gemischte Flüssigkeit. Ihr specifisches Gewicht sey 0,940 bis 0,950.

Die gegohrnen Getränke, wie Wein und Bier, sind seit den ältesten Zeiten bekannt. Die Griechen und Römer kannten aber nicht das Verfahren, den Spiritus davon abzuscheiden; dieses scheint den nordischen Völkern früher bekannt gewesen zu seyn.

Der geistige Bestandtheil des Branntweins, der Alkohol, kann allein durch die geistige Gährung gebildet werden, und diese Bildung beruht auf der Zersetzung, welche das in den Getreidearten u. s. w. enthaltene Stärkemehl und Zucker erleiden, wenn sie mit Ferment und Wasser gemischt einer gewissen Temperatur ausgesetzt werden, wodurch diese Theile in Alkohol und in entweichende Kohlensäure zerfallen; so zerfällt der Zucker in 48,80 Kohlensäure und in 51,20 Alkohol u. s. w. Das Stärkemehl ist als solches nicht der geistigen Gährung fähig, es muß daher erst in einen zuckerartigen Stoff, zum Theil durch die Gährung selbst, umgewandelt werden. Da nun die Entwickelung des Zuckerstoffs in den Getreidearten durch das Malzen sehr begünstigt wird, so wendet man zwar nicht alles Getreide im gemalzten Zustande hiezu an, jedoch hat die Erfahrung dafür entschieden, daß ein Zusatz von Malz zu den ungemalzten Körnern, welcher in verschiedenen Verhältnissen von 1 zu 4 bis 9 Theilen gemacht wird, die Erzeugung des Alkohols

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0441-6

sehr begünstige. Im Kleinen wird also die Alkoholbildung am leichtesten erfolgen, wenn man reinen Zucker mit Ferment und Wasser der zur Gährung nöthigen Temperatur aussetzt, welche Operation auch durch die Messung des kohlensauren Gases auf die Menge des in einer Flüssigkeit enthaltenen Zuckers zurück schließen läßt (vergl. Döbereiner: Zur pneum. Chemie IV. 1824. S. 81.). Aus der gegohrnen Flüssigkeit wird der Spiritus aus einer Destillirblase abgezogen, welche technische, gemeiniglich im Großen ausgeführte Operation allgemein bekannt ist.

Da diesem zufolge aus jeder zuckerhaltigen Flüssigkeit (oder wenn dieselbe darein verwandelt werden kann) Branntwein gewonnen werden kann, dergleichen Flüssigkeiten es aber verschiedene giebt, so werden auch verschiedene Destillate erhalten werden, je nachdem dieselben mehr oder weniger zufällige Bestandtheile enthalten, und daher auch mit Recht durch verschiedene Namen unterschieden werden; so haben wir den Kornbranntwein, den Kartoffelbranntwein, den Kirschen- und Zwetschen- oder Pflaumenbranntwein, den Rum, wenn er aus dem Zuckersafte, und den Arak, wenn er aus dem Reiße durch Gährung gewonnen worden. In den Weinländern wird eine ansehnliche Menge Spiritus aus den Weinen gezogen. Bei uns haben wir nur den Korn- und den Kartoffelbranntwein, wozu jedoch auch andere Getreidesorten, nach Verhältniß der Preise derselben, verwendet werden. Das aus der gegohrenen Mischung, der Maische, durch die erste Destillation gewonnene Fluidum nennt man Lutter, welcher nochmals destillirt den Branntwein liefert.

Ein unsere gewöhnlichen Branntweine stets verunreinigender Bestandtheil ist ein eigenthümliches Oel, unter dem Namen Fuselöl bekannt. Die Erzeugung dieses Oeles scheint nach Hensmans (Denkschrift über die geistigen Flüssigkeiten, aus dem Französischen übersetzt von Brandes 1826.) mit der Säuerung in einem gewissen Verhältnisse zu stehen, denn Hensmans will bemerkt haben, daß die Branntweine, welche am reichhaltigsten an Essig sich zeigten, am ärmsten an Oel waren, als wenn das fette Oel zerstört worden sey, damit sich die Essigsäure bilden könne. Diese fette Materie hat für jede Art von Branntwein einen verschiedenen Geruch, ist aber sonst in ihren physischen Eigenschaften nicht verschieden, so daß man dieselbe betrachten kann als zusammengesetzt aus einem fetten Oele, welches bei allen Branntweinen gemeinsam dient, um ein einer jeden Art von Branntwein eigenthümliches riechendes Princip aufzunehmen. (Ueber das Fuselöl des Kartoffelbranntweins hat Pelletier in Trommsd. N. J. XII. 1. 1826. S. 135. einige Versuche mitgetheilt.)

Ob dieses Oel nun ein Product der Gährung oder in den gährungsfähigen Stoffen präexistirend sey, ist zweifelhaft. Mehrentheils ist man der Meinung, daß dieses Oel in der Haut der Früchte existire, und daß es mit der fetten Materie identisch sey, welche gewisse fettig anzufühlende Früchte im Momente ihres Reifwerdens zu erkennen geben; Hensmans aber ist der Meinung, daß seine Entstehung durch die Gährung bedingt sey, denn die Erfahrung habe ihn gelehrt, daß Weingeist und diese fettige Materie in ge-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0442-2

wissen Beziehungen stehen. Die gegohrne Flüssigkeit giebt nämlich um so weniger geistige Flüssigkeit, je mehr man Oel sammelt, und umgekehrt. Die Gährung, die am regelmäßigsten betrieben wird, giebt am wenigsten Oel.

Dieses Fuselöl ist aber nicht nur unangenehm von Geruche und Geschmacke, sondern äußert auch schädliche Wirkungen, wie damit angestellte Versuche bewiesen haben. Auch ist bekannt, daß ein Rausch nach dem übermäßigen Genusse solchen fuseligen Branntweins ein weit größeres Unwohlseyn nach sich zieht, als die Weinbranntweine verursachen.

Eine andere Ursache der Unreinigkeit des Branntweins ist die Verbindung mit Essigsäure, deren Bildung aus dem Weingeiste durch die Gährung bei Acetum abgehandelt worden ist. Diese Ursache ist aber nicht bei allen Branntweinen in gleichem Grade vorhanden, und der Branntwein aus Korn ist vielleicht am reinsten davon, wogegen der Traubenbranntwein am meisten damit imprägnirt ist.

Um nun die Branntweine von solchen sie verunreinigenden Beimischungen zu befreien, hat man verschiedene Mittel vorgeschlagen, welche denselben bei der Rectification zugesetzt werden sollen. Dahin gehören thierische Kohle im frisch geglühten und im ungeglühten Zustande, Holzkohle, Schwefelsäure, Kalk, Chlorkalk, Aetzkali u. s. w. Nach Schütz soll man dem zu entfuselnden Branntwein Milch, Salz und etwas Sägespähne von Eichenholz zusetzen, wodurch der Fuselgeruch und Geschmack fast gänzlich zum Verschwinden gebracht wird. Hensmans hat durch Versuche dargethan, daß das Fuselöl durch öftere Rectificationen und jedesmalige Verdünnung des Destillats vor der neuen Rectification vollständig abgeschieden werden könne. Um jedoch dieses beschwerliche Rectificiren zu vermeiden, versuchte Hensmans viele andere Zusätze, und er fand das ätzende Natron am geeignetsten, welches zugleich den Vortheil gewährt, den Weingeist von dem stinkenden Oele und von der Essigsäure zu befreien, so daß dieses Verfahren dem der Reinigung durch Wasser vorzuziehen ist, weil es weniger kostspielig, schneller zum Ziele führt und bei Alkohol von jedem Grade anwendbar ist. Auf 3 Pinten (1 Pinte = $\frac{1}{2}$ Quart) gewöhnlichen Kornbranntwein nimmt man 2 Drachmen trocknes kohlensaures Natron, die man in $1\frac{1}{2}$ Pinten Wasser auflöst, und durch etwas mehr als sein doppeltes Gewicht gebrannten Kalk ätzend macht; man gießt die Flüssigkeit ab, vermischt sie mit dem Branntwein, und fängt nach 24 Stunden, in welcher Zeit man die Mischung oft umschüttelt, die Destillation an. Das allgemein als höchst zweckmäßig befolgte Verfahren besteht darin, daß man dem Branntwein vor der Rectification ganz frisch ausgeglühte Kohlen zusetzt, und bei gelindem Feuer den Weingeist abzieht, wobei man sich jedoch vor der Unvorsichtigkeit hüten muß, die Kohlen dem Branntwein zuzuschütten, wenn sie vielleicht noch glühende Fünkchen enthalten, wodurch der Branntwein entzündet werden würde, welches Brennen nur durch Zudecken mit Tüchern, um den Zutritt der atmosphärischen Luft abzuschneiden, gelöscht werden kann.

Das Fuselöl ist in der Kälte im Branntwein weniger auflöslich als in

der Wärme, es setzt sich daher während der Kälte in den Gefäßen ab, worin man denselben aufbewahrt; bei der Wärme wird es jedoch wieder aufgelöst. Wenn man daher die Branntweine vor der Rückkehr der warmen Jahreszeit von den im Winter gebildeten Bodensätzen abgießt, so findet man, daß sie sich im Geruche und Geschmacke sehr verbessert haben.

Auch Brandes stellte mehrere Versuche an über das beste Mittel, um einen Branntwein, welcher aus einem durch die Aufbewahrung dumpfig gewordenen und mulstrich riechenden Getreide bereitet worden war, den sehr unangenehmen Geruch und Geschmack zu benehmen. Er wandte alle vorhin genannten Mittel hierzu an, doch war es die Holzkohle, welche sich noch vorzüglicher als die thierische Kohle bewies, und die besten Dienste leistete. Chlorkalk wirkte hier sehr wenig. Buchner merkt hier mit Grund an, daß ein schimmlig gewordenes Getreide auf die einfachste und sicherste Weise dadurch wieder verbessert werden könne, daß man es auf einer schwach geheizten Malzdarre ausbreitet und öfters umrührt. Dadurch verschwindet dann aller üble Geruch nicht nur sehr bald, sondern es tritt dagegen sogar ein angenehmer Malzgeruch ein, und das Getreide ist dann zur Essig- und Branntweinfabrication vortrefflich, würde vielleicht (?) auch ein gutes Mehl geben.

Der größere oder geringere Gehalt eines Branntweins an Alkohol wird sich durch das specifische Gewicht zu erkennen geben, indem der Alkohol specifisch leichter als das Wasser ist. Je geringer demnach das specifische Gewicht eines Branntweins ist, desto reicher ist er an Alkohol, und er muß hiervon wenigstens soviel enthalten, daß das spec. Gew. 0,950 sey, d. h. daß ein Gefäß, welches genau 1000 Theile destillirtes Wasser faßt, nur 950 Theile Branntwein aufnehmen könne. Um nun nach dem verschiedenen spec. Gew. den wirklichen Gehalt an Alkohol bestimmen zu können, sind von verschiedenen Chemikern durch Versuche, die große Sorgfalt erfodern, Tabellen angefertigt worden, indem das jedesmalige spec. Gewicht der aus Alkohol und Wasser in verschiedenen Verhältnissen gemischten Flüssigkeit bei einem feststehenden Temperaturgrade gesucht und angemerkt wurde. Von solchen Tafeln mögen zwei hier einen Platz finden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0444-3

Tafel

über die Mengen von absolutem Alkohol in Weingeiste von verschiedenen Dichtigkeiten, bei 60 ° F. = 12,44 R. = 15,56 C. nach Lowitz.

100 Theile Alkohol	100 Theile Wasser	Spec. Gew. bei 60 ° F.	100 Theile Alkohol	100 Theile Wasser	Spec. Gew. bei 60 ° F.
100	0	0,796	52	48	0,912
99	1	0,798	51	49	0,915
98	2	0,801	50	50	0,917
97	3	0,804	49	51	0,920
96	4	0,807	48	52	0,922
95	5	0,809	47	53	0,924
94	6	0,812	46	54	0,926
93	7	0,815	45	55	0,928
92	8	0,817	44	56	0,930
91	9	0,820	43	57	0,933
90	10	0,822	42	58	0,935
89	11	0,825	41	59	0,937
88	12	0,827	40	60	0,939
87	13	0,830	39	61	0,941
86	14	0,832	38	62	0,943
85	15	0,835	37	63	0,045
84	16	0,838	36	64	0,947
83	17	0,840	35	65	0,949
82	18	0,843	34	66	0,951
81	19	0,846	33	67	0,953
80	20	0,848	32	68	0,955
79	21	0,851	31	69	0,957
78	22	0,853	30	70	0,958
77	23	0,855	29	71	0,960
76	24	0,857	28	72	0,962
75	25	0,860	27	73	0,963
74	26	0,863	26	74	0,965
73	27	0,865	25	75	0,967
72	28	0,867	24	76	0,968
71	29	0,870	23	77	0,970
70	30	0,872	22	78	0,972
69	31	0,874	21	79	0,973
68	32	0,878	20	80	0,974
67	33	0,879	19	81	0,975
66	34	0,881	18	82	0,977
65	35	0,883	17	83	0,978
64	36	0,886	16	84	0,979
63	37	0,889	15	85	0,981
62	38	0,891	14	86	0,982
61	39	0,893	13	87	0,984
60	40	0,896	12	88	0,986
59	41	0,898	11	89	0,987
58	42	0,900	10	90	0,988
57	43	0,902	9	91	0,989
56	44	0,904	8	92	0,990
55	45	0,906	7	93	0,991
54	46	0,908	6	94	0,992
53	47	0,910			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0445-9

Tafel

nach Tralles bei 60 ° F. = 12,44 R. = 15,56 C.

(Spec. Gewicht des Wassers ist im dichtesten Zustande bei 39,83 ° F. oder 3,176 ° R. = 1000.)

Eine Mischung von der 100 Maß enthalten Maß Alkohol	hat bei 60 ° F. ein spec. Gew. von	Unterschied des spec. Gew.	Eine Mischung von der 100 Maß enthalten Maß Alkohol	hat bei 60 ° F. ein spec. Gew. von	Unterschied des spec. Gew.	Eine Mischung von der 100 Maß enthalten Maß Alkohol	hat bei 60 ° F. ein spec. Gew. von	Unterschied des spec. Gew.
0	9,991		35	9,583	13	70	8,892	25
1	9,996	15	36	9,570	13	71	8,867	25
2	9,961	15	37	9,556	14	72	8,842	25
3	9,947	14	38	9,541	15	73	8,817	25
4	9,933	14	39	9,526	15	74	8,791	26
5	9,919	14	40	9,510	16	75	8,765	26
6	9,906	13	41	9,494	16	76	8,739	26
7	9,893	13	42	9,478	16	77	8,712	27
8	9,881	12	43	9,461	17	78	8,685	27
9	9,869	12	44	9,444	17	79	8,658	27
10	9,857	12	45	9,427	17	80	8,631	27
11	9,845	12	46	9,409	18	81	8,603	28
12	9,834	11	47	9,391	18	82	8,575	28
13	9,823	11	48	9,373	18	83	8,547	28
14	9,812	11	49	9,354	19	84	8,518	29
15	9,802	10	50	9,335	19	85	8,488	30
16	9,791	11	51	9,315	20	86	8,458	30
17	9,781	10	52	9,295	20	87	8,428	30
18	9,771	10	53	9,275	20	88	8,397	31
19	9,761	10	54	9,254	21	89	8,365	32
20	9,751	10	55	9,234	20	90	8,332	33
21	9,741	10	56	9,213	21	91	8,299	33
22	9,731	10	57	9,192	21	92	8,265	34
23	9,720	11	58	9,170	22	93	8,230	35
24	9,710	10	59	9,148	22	94	8,194	36
25	9,700	10	60	9,126	22	95	8,157	37
26	9,689	11	61	9,104	22	96	8,118	39
27	9,679	10	62	9,082	22	97	8,077	41
28	9,668	11	63	9,059	23	98	8,034	43
29	9,657	11	64	9,036	23	99	7,988	46
30	9,646	11	65	9,013	23	100	7,939	49
31	9,634	12	66	8,989	24			
32	9,622	12	67	8,965	24			
33	9,609	13	68	8,941	24			
34	9,596	13	69	8,917	24			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0446-5

Gebräuchlicher sind die Senkwagen, welche den Alkoholgehalt gleich nach Procenten anzeigen, und gewöhnlich findet sich auf guten Senkwagen der Procentsatz nach Richter und nach Tralles neben einander angegeben. Stets muß aber der Temperaturgrad, bei welchem die Scala gefertigt worden, und der gewöhnlich 12,5 ° R. ist, beobachtet werden, da bekanntlich die Körper durch die Wärme ausgedehnt, durch die Kälte aber zusammengezogen werden, mithin auch die weingeisthaltende Flüssigkeit in der Wärme specifisch leichter werden, und einen größern Gehalt an Alkohol anzeigen wird, als sie wirklich hat, bei der Kälte aber das Entgegengesetzte erfolgen muß. In solchen Fällen muß daher die Flüssigkeit entweder auf den gehörigen Temperaturgrad gebracht, oder das gefundene Resultat hiernach berechnet werden.

Die gewöhnlichen Branntweinproben geben nicht hinlänglich genaue Resultate, und sind daher nicht zum Gebrauche für die Pharmaceuten geeignet.

Der Kornbranntwein als solcher findet in der Medicin, zuweilen zu äußerlichen Mitteln, nur selten Anwendung, desto unentbehrlicher ist er aber dem Pharmaceuten, um daraus Weingeist von verschiedener Stärke zu bereiten, wovon gehörigen Orts die Rede seyn wird.

Fumaria. Das Kraut. Erdrauchkraut.

Fumaria officinalis Linn. Eine einjährige zwischen Gartenkräutern und Saaten häufige Pflanze.

Das blühende salzigbittere Kraut, mit graugrünen zusammengesetzten Blättern, die letzten Einschnitte oval, mit rothen Blumen. Im Mai und Juni einzusammeln.

Fumaria officinalis Linn. Der gemeine Erdrauch.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 2. Hexandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 2. Papaveraceae.

Diese durch ganz Deutschland, überhaupt durch ganz Europa häufige Pflanze findet sich auf Aeckern unter dem Getreide und auf Brachäckern. Ihr Standort zeigt fetten Boden an.

Die weißen, faserigen, länglichen Wurzeln treiben aufrechte, auch niederliegende, dünne, zarte, weitschweifige glatte Stengel, die eckig, saftig, sehr ästig, graulichgrün und 8—10 Zoll, auch drüber, hoch sind. Die vielfach zusammengesetzten Blätter sind glatt, abwechselnd, dünngestielt, saftig und weich; die kleinen Blättchen sind eingeschnitten und von matt bläulichgrüner Farbe. Die Blüthen bilden an den Seiten und an der Spitze der Stengel aufrechte, lange lockere Trauben; sie sind kurzgestielt, und von purpurröthlicher, auch weißer Farbe. Der Kelch besteht aus 2 Blättchen; die Krone ist länglich, röhrig und unregelmäßig. Sie hat 4 ungleiche Blumenblätter, dem Anscheine nach wie bei den Schmetterlingsblumen gestaltet.

Die Blüthezeit ist Juni bis September.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0447-1

(Abbildung und Beschreibung dieser Pflanze vom Hr. Prof. Dierbach findet sich in Geiger's Magazin, Mai 1826. S. 113.)

Zum officinellen Gebrauche wird die ganze Pflanze mit der ersten Blüthe eingesammelt. Sie hat einen bittern etwas scharfen Geschmack, der bei der getrockneten merklicher salzigbitter ist. Der ausgepreßte Saft dieses Krautes enthält ziemlich viel Eiweißstoff, bittern Extractivstoff und salzsaures Kali, das beim Eindicken anschießt.

Merk (Trommsd. J. XX. 2. S. 16.) giebt als Bestandtheile des aus frisch ausgepreßtem Safte bereiteten frischen Extracts an: eine besondere thierische Substanz (Eiweißstoff?); Extractivstoff; Schleim; weinsteinsauren Kalk; salzsaures Kali; schwefelsauren Kalk; grünes Satzmehl; Feuchtigkeit. Im rückständigen Kraute befand sich: Extractivstoff, schwefels. und salzs. Kalk; schmieriges Harz; Holzfaser; ein besonderer thierischer Stoff, nach dem Einäschern phosphors. Kalk und schwefels. Kali liefernd.

Beim Trocknen verliert das frische Kraut $\frac{7}{8}$. Es giebt $\frac{1}{4}$ wäßriges und $\frac{1}{10}$ geistiges Extract, welches letztere viel bitterer ist.

Der Erdrauch wird als auflösendes und Magenmittel in der Abkochung, im Extracte oder auch im frisch ausgepreßten Safte gebraucht.

Galanga. Die Wurzel. Galgantwurzel.

Eine unbekannte in China einheimische Pflanze.

Eine walzenrunde Wurzel (Wurzelstock), von der Dicke eines Fingers, geringelt, außen braunroth, innen röthlich, von scharfem bitterlichem Geschmacke und gewürzhaftem Geruche.

Als Mutterpflanze der Galgantwurzel wird bezeichnet:

Alpinia Galanga Roxb. Die Galgantalpinie, Galgantpflanze.

Maranta Galanga Linn.

Linn. Cl. I. Monandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. IV. Ord. 2. Cannae.

Diese Pflanze ist sowohl auf dem festen Lande als auf den Inseln Ostindiens einheimisch, und soll auch in China und Cochinchina vorkommen.

Aus einer perennirenden kriechenden, knolligen, mit starken Fasern versehenen Wurzel von aromatischem Geruche und Geschmacke erheben sich krautartige, runde, glatte, 4—6 Fuß hohe Stengel. Die Blätter, welche mit ihren Scheiden den untern Theil des Stengels bedecken, sind breit lancettförmig, 12—24 Zoll lang und 4—6 Zoll breit. Die blaßgrünlich-weißen Blüthen bilden an der Spitze des Stengels eine ansehnliche, aufrechte, sparrige Rispe. Der Kelch ist walzenförmig, weiß; die Blumenkrone rachenförmig, fünftheilig, mit offnen, wechselsweise stehenden Lippen. Roxburgh giebt an, daß auch die Wurzeln von **Alpinia nutans Roscoe** bisweilen als Galgantwurzel versendet würden. Ehemals leitete man die Galgantwurzel von **Kaempferia Galanga Linn.** her; allein nach Banks ist die Wurzel dieser Pflanze den londoner Droguisten völlig unbekannt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0448-6

Es giebt im Handel zwei Sorten Galgant, den großen und den kleinen. Man nimmt an, daß der erstere von der hier genannten Pflanze, der letztere von einer Spielart derselben abstamme. Bei der großen Aehnlichkeit beider Sorten ließe sich übrigens auch annehmen, daß der kleine Galgant von jüngern Pflanzen derselben Art gesammelt werde.

Den kleinen Galgant erhalten wir in walzenförmigen, etwas gebogenen und öfters zweigabligen ästigen Stücken von 2—3 Zoll Länge und 3—6 Linien Durchmesser. Die Farbe ist ein röthliches Braun, die durch ringförmige Absätze von blässerer Farbe unterbrochen wird; inwendig ist die Wurzel gelbbraun-röthlich, etwas faserig, auf dem Schnitte dicht und ein wenig glänzend. Ihr Geruch ist, wenn sie gerieben wird, gewürzhaft, dem Cardamom ähnlich, ihr Geschmack brennend scharf aromatisch.

Der große Galgant ist weniger gewürzhaft, und unterscheidet sich durch die im Verhältniß kürzeren und oft einen Zoll dicken Stücke.

Zuweilen findet sich unter der Galanga eine ihr sehr ähnliche, aber etwas heller gefärbte und leichtere Wurzel, die fast ganz ohne aromatischen Geruch und Geschmack ist, und dies ist die Wurzel der erwähnten **Alpinia nutans**, welche mit der **A. Galanga** gleiches Vaterland hat.

Der wäßrige Aufguß des Galgants ist klar, röthlichgelb, die Tinctur schön goldgelb.

Bucholz (Trommsd. J. XXV. 2. S. 3.) erhielt durch Destillation ein ätherisches, ziemlich dünnflüssiges Oel, welches gelblichweiß und specifisch leichter als Wasser war, beinahe gar nicht galgantartig, sondern im Mittel cardamom- und campherartig oder cajeputähnlich roch. Der Geschmack war gelind erwärmend, nach Campher gewürzhaft, am nächsten dem Cardamom. An der Luft verdickt es sich, wobei der Geruch fast ganz verloren geht. Es ist mit Aether und Alkohol in allen Verhältnissen mischbar; Wasser nimmt nur den Geruch davon an; Aetzkali und Aetzammoniak bildeten eine milchige Flüssigkeit.

1000 Gran Galgant verloren in mäßiger Ofenwärme 124½ Gran. Die 875½ Gran wurden mit absolutem Alkohol in der Wärme ausgezogen, von den Tincturen der Weingeist abdestillirt, und der dunkel gelbbraun gefärbte Rückstand in einer genau abgewogenen Porcellanschale völlig verdunstet, mit Schwefeläther übergossen, der sich dunkelbraun färbte, und nach dem Abziehen desselben ein Balsam oder Weichharz erhalten. Dieses war schwarzbraun, ins Gelbbraune sich ziehend, von dickflüssiger Consistenz, angenehmen Galgantgeruch, und aromatisch brennendem ganz galgantartigem Geschmacke. Mit Wasser geschüttelt erfolgte beinahe eine vollkommene Zertheilung, und es wurde eine milchige Flüssigkeit gebildet. In Aether und Alkohol war es leicht auflöslich, in Terpenthin- und Mandelöl unauflöslich. Concentrirte Schwefelsäure löst ihn zu einer anfangs gelben, dann rothgelben und endlich rothbraunen Flüssigkeit auf. Rauchende Salpetersäure bildet unter lebhaftem Aufschäumen eine röthlichgelbe Auflösung. Mit Aetzlauge wurde eine klare Seife gebildet, die mit gleichviel Wasser eine gelbbraune Auflösung gab; Aetzammoniak gab eine milchige Flüssigkeit.

Was der Aether unaufgelöst gelassen hatte, war umbrabraun, zerreiblich und pulverig, roch schwach nach dem Harze, schmeckte salzig, war in kochendem Wasser auflöslich, und war Extractivstoff mit einem Antheil eines salzsauren Salzes.

Der nach dem Ausziehen mit Alkohol gebliebene Wurzelrückstand wurde mit siedendem Wasser behandelt Die Decocte zeigten im warmen Zustande deutlich den Geruch der Vanille, und einen anfangs schwach vanilleartigen, hinterher schwach zusammenziehenden Geschmack. Es sonderte sich bei längerem Stehen der verdunsteten Decocte ein braungefärbter, stark zusammenhängender, schwer zu pülvernder Stoff ab, der Traganthstoff war. Das klare Decoct gab ein Extract, welches braunschwarz, gepülvert rothbraun war, einen angenehm schwach süßlichen aromatischen Geruch, einen milden, schwach zusammenziehenden, hinterher schwach vanilleartigen Geschmack hatte. Durch Zusatz von Alkohol zu seiner wäßrigen Auflösung wurde es in Gummi und in reinen Extractivstoff zerlegt, welcher nur in einem sehr geringen Grade die Natur eines adstringirenden Körpers (Gerbestoff) besaß, und einen geringen Antheil eines salzsauren Salzes erkennen ließ.

Der Rückstand von den Abkochungen wurde noch mit Aetzlauge behandelt, und die dann rückständige Wurzelfaser verbrannt.

Der vanilleartige Geruch und Geschmack ließ Benzoësäure vermuthen; bei einer eigends hierauf angestellten Prüfung konnte jedoch keine Spur davon erkannt werden.

Aus dieser Analyse ergiebt sich, daß die lufttrockne Galgantwurzel in 1000 Th. enthält: Balsam (Weichharz) 49; ätherisches Oel 5; Extractivstoff 97; Gummi 82¼; Traganthstoff 414½; Feuchtigkeit 122½; Wurzelfaser 216½; Verlust 13¼. S. = 1000.

Die Asche der Wurzelfaser enthielt größtentheils kohlensauren Kalk, etwas Alaunerde und eine Spur Bittererde.

Morin (Berl. Jahrb. XXV. 2. 1824. S. 66.) zerlegte die Galgantwurzel nach der bei Zedoaria anzugebenden Methode, und fand: harzige Materie; Halbharz; weißliches, sehr balsamisches flüchtiges Oel; essigsaures Kali; Osmazom; Stärkemehl; Schwefel; sauerkleesauren Kalk, braune färbende Materie und Holzfaser.

Als die vorzüglich wirksamen Bestandtheile der Galgantwurzel sind nach der Bucholz'schen Analyse der balsamische Stoff und nächstdem das ätherische Oel anzusehen, daher denn die Tinctur oder das Pulver sich am besten zur Anwendung eignen, als aromatische Reizmittel. In Ostindien ist die Wurzel ein sehr beliebtes Gewürz, und als solches wird sie auch bei uns häufig benutzt.

Galbanum seu Gummi Galbanum. Mutterharz.

Ein an der Luft verhärteter Saft einer unbekannten orientalischen Pflanze.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0450-6

Ein Gummiharz in Kuchen aus gemeiniglich zusammengeklebten Körnern, seltener in abgesonderten Körnern, weißgelblich, mit weißen Flecken, in kleineren Stücken fast durchscheinend, wenig glänzend, in der Kälte zerbrechlich, durch die Wärme der Hand erweichbar, von bitterscharfem Geschmacke, und starkem etwas widrigem Geruche. Wasser löst ungefähr den dritten Theil auf mit milchiger Auflösung, Weingeist löst eine größere Menge auf, mit gesättigt gelber Auflösung.

Linné bezeichnete als die Mutterpflanze des Galbanum **Bubon Galbanum**, weil Herrmann aus dieser Pflanze einen Saft erhalten hatte, welcher dem Galbanum an Geruche ähnlich war, was jedoch Treviranus nicht bestätigt gefunden hat; auch geben die Blätter keinen demselben ähnlichen Geruch. **Bubon Galbanum** soll ferner nur am Cap wachsen, und in diesem Falle konnte es weder den Griechen und Römern, was nicht bezweifelt werden kann, noch zu Moses Zeiten bekannt gewesen seyn. Nach Richard's Bemerkung kommt diese Pflanze jedoch auch in Aethiopien vor, wodurch dann die historischen Zweifel entfernt würden. Sprengel sagt jedoch, daß die Pflanze, die nach Dioskorides eine Ferula ist, uns noch gar nicht bekannt sey.

Selinum Galbanum Spr. Galban-Siga.

Bubon Galbanum Linn. Galban-Bubon. Galbankraut.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Das Vaterland dieses Doldengewächses ist das Vorgebirge der guten Hoffnung, nach Richard überhaupt Afrika und besonders Aethiopien.

Die Wurzel ist holzig, und der strauchartige, walzenrunde, glatte, ästige Stengel wird 4, 5 bis mehrere Fuß hoch. Die 2 und 3mal gefiederten Blättchen sind von zart grüner, etwas bläulicher Farbe, die Blättchen eiförmig-keilförmig, ziemlich groß, fächerförmig ausgebreitet. Die grünlichgelben Blumen sind alle fruchtbar und einförmig; sie stehen in wenigen, dichten, großen Enddolden, die aus vielen Strahlen, wovon die mittleren kürzer sind, bestehen. Der Kelch ist bleibend und fünfzähnig; die Krone wird aus fünf lancettförmigen Blumenblättern gebildet; die Frucht besteht in zwei glatten, länglichen, eiförmigen Saamen.

Alle Theile der frischen Pflanze enthalten einen Milchsaft, der zum Theil von selbst ausschwitzt, größtentheils aber dadurch gewonnen wird, daß man den Stengel über der Wurzel quer durchschneidet, wo dann dieser Milchsaft ausfließt, an der Luft erhärtet und gesammelt wird; auch wird es durch bloße Einschnitte gewonnen, die man einige Zoll über der Erde in die Zweige macht, aus welchen dann eine große Menge Tröpfchen hervorkommen, die sich an der Luft verdichten und gesammelt werden.

Es kommen im Handel zwei Sorten Galbanum vor. Die erste in Kör-

nern (Galbanum in granis) besteht aus kleinen, höchstens haselnußgroßen, kugeligen, etwas durchscheinenden, gelblichweißen oder gelbröthlichen unter sich zusammengebackenen Körnern. Dies ist die bessere Sorte. Die zweite besteht aus Klumpen, Kuchen oder größeren Massen (Galbanum in massis) von bald heller, bald dunkler brauner Farbe, und mit mehr oder weniger weißen Körnern untermischt. Je mehr weißliche Körner, je weniger Saamen und andere Unreinigkeiten in diesen Massen enthalten sind, je reiner und heller von Farbe sie vorkommen, desto besser und brauchbarer ist die Sorte. Der Unterschied ist wahrscheinlich der verschiedenen Gewinnungsweise zuzuschreiben.

Ganz verwerflich ist das dunkelbraune, von jenen gelblichen Körnern entblößte, sehr schmierige, viele Sägespähne, Saamenkörner, Sand und andere Unreinigkeiten enthaltende Galbanum, welches oft mit einem schlechten Ammoniakum oder einem andern aus Sicilien kommenden rothen Schleimharze verfälscht ist.

Das Galbanum ist in der Kälte spröde, in der Wärme erweichend, von starkem eigenthümlichen, widrigen Geruche, und einem bitterlich scharfen erwärmenden Geschmacke. Zum pharmaceutischen Gebrauche muß es bei Frostkälte gepulvert, und dadurch von den etwa anhängenden Unreinigkeiten befreit werden.

Das Galbanum gehört seiner Mischung nach zu den Schleimharzen.

Neumann erhielt aus einem Pfunde Mutterharz 6 Quentchen ätherisches Oel, nebst einem sehr kräftig schmeckenden und riechenden destillirten Wasser.

Fiddechow's Analyse (Berl. Jahrb. 1816. S. 230.) ist durch die von Meißner (Trommsd. N. J. I. 1. S. 3.) sehr ergänzt worden.

Das Mutterharz wurde mit Alkohol ausgezogen, und von diesen Tincturen der Alkohol wieder abgezogen. Dieser hatte einen Theil des ätherischen Oeles mit sich übergeführt. Aus dem nach völliger Verdunstung des Weingeistes gebliebenen Rückstande zog Wasser nur eine unbedeutende Menge von Extractivstoff mit einer Spur von Aepfelsäure aus. Das Harz selbst war geschmacklos, löste sich in Alkohol und Aether leicht, in 50 Procent haltigem Weingeiste aber und auch in Mandelöl gar nicht auf, und gab mit Salpetersäure behandelt Kleesäure, Essigsäure und eine gelbe, jedoch nur wenig bittere Substanz.

Der Rückstand wurde nun mit Wasser ausgezogen, wobei die Auflösung etwas trübe blieb, und die darin schwimmenden Flocken davon getrennt sich als dem Traganthstoff am nächsten kommend zeigten.

Bei der Destillation von 24 Unzen Wasser über 2000 Gran Galbanum, von welchem 8 Unzen übergezogen wurden, folgten nach den ersten 60 Tropfen ungefärbter wäßriger Flüssigkeit, eine halbe Stunde lang Tropfen eines weißen Oeles, welches auf der Oberfläche des schon übergegangenen Wassers schwamm, und endlich mit Oel geschwängertes Wasser. Das Galbanumöl war völlig weiß, durchsichtig, von galbanumartigem, etwas campherähnlichem

Geruche, brennendem, campherartigem, hinterher kühlendem und etwas bitterlichem Geschmacke, von 0,912 spec. Gew. bei 15 ° R. Zugleich war Essigsäure mit übergegangen.

Die weißlichgelben Körner dieses Gummiharzes fand Meißner gänzlich aus Gummi bestehend, wahrscheinlich von ätherischem Oele durchdrungen, welches jedoch gewöhnlich nur bei dem Harze stattfindet.

500 Th. Galbanum gaben: Harz 329; Gummi 113; Traganthstoff 9; Extractivstoff mit Aepfelsäure 1; Oel 17; Feuchtigkeit 10; Rückstand von vegetabilischen Theilen 14. S. = 493.

Bei der trocknen Destillation giebt das Galbanum kein Ammoniak, aber man erhält aus demselben ein schön indigblaues Oel, welches sich leicht in Alkohol auflöst, und diesem die blaue Farbe mittheilt. Nach Fiddechow ist das Oel erst grün, dann dunkelblau, später violett und zuletzt geht ein braunrothes stinkendes Oel über.

Nach Pelletier bestehen 100 Th. Mutterharz aus: Harz 66,86; Gummi 19,28; holzigen Theilen und Unreinigkeiten 7,52; saurem äpfels. Kalke eine Spur; ätherisches Oel und Verlust 6,34.

Das Galbanum wird zum innerlichen Gebrauche nur in Pillenform verordnet; außerdem geht es in mehrere Pflaster ein.

Gallae. Galläpfel.

Aufschwellungen der Blätter der Quercus infectoria Olivieri, eines kleinen morgenländischen Baumes, durch den Stich von Cynips Quercus folii Linn. hervorgebracht.

Warzenförmig-stachlige rundliche Körper, oft mit einem Loche versehen, beinahe gestielt, hart, gelblich-aschgrau, von einem herben Geschmacke, adstringirendes Princip und Gallussäure enthaltend. Die schwereren sind vorzuziehen.

Quercus infectoria Oliv. Die Färbereiche, Galläpfeleiche.
Linn. Cl. XXI. Monoecia Ord. 8. Polyandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Amentaceae.

Erst in der neueren Zeit (Vergl. Willdenow in Berl. Jahrb. auf das Jahr 1808. S. 53.) ist durch Olivier diese Eichenart als die wahre Galläpfeleiche bekannt geworden. Sie ist durch ganz Kleinasien, vom Bosporus bis nach Syrien, und von den Küsten des Archipels bis an die Grenzen von Persien verbreitet, wo sie in bergigen Gegenden häufig vorkommt.

Sie bildet einen kleinen ästigen, strauchartigen, ungefähr 6 Fuß hohen Stamm. Die Blätter sind gestielt, oval-länglich, ungefähr 2 Zoll lang, 1 Zoll breit, auf beiden Seiten glatt und von blaßgrüner Farbe. Die männlichen Blüthen kommen gleichzeitig mit den Blättern aus den bräunlichen Knospen hervor; die weiblichen Blüthen stehen sehr kurzgestielt oder fast

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0453-3

sitzend an der Spitze der jungen Zweige. Die Früchte sind 1½ Zoll lang, glatt, mit einem kleinen Spitzchen endigend.

Durch den Stich eines Insects (Cynips Quercus folii Linn., Diplolepis gallae tinctoriae Fab.) entstehen auf dieser Pflanze die Galläpfel. Das Weibchen dieser Gallwespe hat nämlich einen vorstehenden Legestachel, mit dem es die Rinde des Blattstiels durchbohrt, um seine Eier hineinzulegen, und bald bildet sich durch den Ausfluß der Pflanzensäfte rundum ein Auswuchs. Die so eingeschlossenen Eier, hierdurch gleichsam gebrütet, schlüpfen aus, und gehen alle ihre Verwandlungsstufen bis zum Zustande des vollkommenen Insects durch, worauf sie ihr Gefängniß durchbrechen und davon fliegen. Stirbt das Insect, ehe es ganz verwandelt ist, so bleibt der Gallapfel undurchbohrt.

Die beste Sorte Galläpfel sind die schwarzen (Gallae nigrae) die, bevor sie das Insect durchbohrt hat, in der Mitte des Monats Juli gesammelt werden. Sie sind rund, von verschiedener Größe, mehr oder weniger höckerig, dunkel, grünlich oder gelblichgrau, schwer und von dichterem Gefüge, gleichsam mit einem festen braunen Kerne angefüllt. Man schätzt besonders die, welche in dem Innern von Natolien bei Aleppo (daher Aleppische Galläpfel), Smyrna, Magnesia, Rara-nissar und Diarbekir wachsen. Weniger reich sind die sogenannten weißen Galläpfel (Gallae albae). Es sind diejenigen, die erst später, nachdem das Insect herausgekrochen ist, gesammelt werden; sie sind viel leichter, von gelblichweißer Farbe, mehr glatt, von weniger dichtem Gefüge.

In Frankreich und Oestreich wird noch eine andere Art von Galläpfeln gesammelt von Quercus Cerris, die aber bei uns selten in den Handel kommen. Diese sind von gelblichröthlicher Farbe, einer fast ebenen glatten Oberfläche, und meistens durchlöchert. Auch von unserer inländischen Loheiche (Quercus Robur und Q. pedunculata) werden die auf den Blättern festsitzenden Galläpfel gesammelt; sie sind von weit geringerer Güte, haben eine schöne rothe Farbe, ein äußerst lockeres und schwammiges Gewebe, und schrumpfen sehr beim Trocknen zusammen Solche Auswüchse kommen auch an den Kelchen der Eicheln von unregelmäßiger Gestalt vor, und diese letzteren, welche sich vorzüglich auf der Kieleiche erzeugen, und besonders aus Ungarn, Mähren und Böhmen gebracht werden, führen den Namen Knoppern, sie dienen zum Schwarzfärben, können auch zur Tinte benutzt werden.

Die Galläpfel gehören zu den stärksten adstringirenden Arzneistoffen.

Der concentrirte kalte wäßrige Aufguß der pulverisirten levantischen Galläpfel hat eine gesättigt braungelbe Farbe, im reflectirten Lichte spielt seine Farbe etwas ins Bläulichgrüne; er hat einen äußerst herben, zusammenziehenden, hintennach süßlichen Geschmack und eigenthümlichen Geruch. Die letzten Aufgüsse der Galläpfel, wenn diese wiederholt ausgelaugt werden, sind nach Deyeux grün, ihre Farbe wird durch Säure geröthet, durch Kalkwasser und Laugensalze erhöht, und sie haben weiter keinen zusammenziehenden Geschmack. Davy, der dieses vollkommen bestätigt fand, hielt diese letzten

Aufgüsse für eine Auflösung des gallussauren Kalkes, weil sich ihm das ähnliche Verhalten gegen Säuren und Laugensalze bei allen auflöslichen Gemischen, wenn sie Galläpfelsäure und Kalk enthielten, zeigte.

In einem concentrirten Galläpfelauszuge bildet concentrirte Schwefelsäure einen reichlichen, milchweißen Niederschlag, der geronnener Milch ähnlich sieht, der sich aber bald bräunt und nur eine harzähnliche Masse absetzt. Wird die Säure so lange zugesetzt, als noch ein Niederschlag entsteht, so bleibt eine nur blaßgelb gefärbte Flüssigkeit zurück, die kaum noch zusammenziehend schmeckt. Dieser Niederschlag löst sich sowohl in Alkohol als in kochendem Wasser auf; kaltes Wasser äußert keine merkliche Wirkung darauf. Es ist dieser Niederschlag eine Verbindung des Gerbestoffs mit der Schwefelsäure, der zugleich etwas Extractivstoff enthält. Das kohlensaure Kali bringt, wie zuerst Deyeux bemerkt hat, gleichfalls einen reichlichen weißen Niederschlag in dem Galläpfelauszug hervor, der sich wie Harz absetzt, und der aus Gerbestoff, Kalkerde und Kali besteht, und daher auch nicht die Eigenschaft des Gerbestoffes zeigt, nicht zusammenziehend schmeckt, und die Leimauflösung nicht niederschlägt. Offenbar rührt dieser Niederschlag zum Theil von der Zersetzung einer kalkerdigen Verbindung her, welche der Galläpfelaufguß enthielt. Die über dem Niederschlage befindliche Flüssigkeit färbt sich sehr bald an der Luft grün, und enthält vorzüglich eine Verbindung der Gallussäure mit dem Kali, sowie auch noch etwas Gerbestoff. Kaustisches Kali bringt keinen Niederschlag hervor, verändert aber die Farbe des Galläpfelaufgusses aus dem Braungelben in das Braunrothe. Kalk-, Baryt- und Strontianwasser bringen einen reichlichen olivenfarbigen Niederschlag hervor, und die Flüssigkeit wird fast ganz klar und von röthlicher Farbe. Die Auflösungen der Neutralsalze, namentlich des schwefelsauren Kalis, des Salpeters, Kochsalzes, salzs. Ammoniaks, salzs. Baryts, salzs. Kalks, essigs. Kalis fällen den Galläpfelaufguß, und die Niederschläge bestehen zwar größtentheils aus Gerbestoff, enthalten aber auch einen Antheil Galläpfelsäure und Extractivstoff und einen Antheil des zur Fällung angewandten Salzes.

Oxydulirte salzsaure und schwefelsaure Eisenauflösung bringt im ersten Augenblicke keine merkliche Farbenveränderung hervor; nach einiger Zeit nimmt aber die Flüssigkeit eine violettblaue Farbe an, und es setzt sich ein grober violettblauer Niederschlag zu Boden; oxydirte Eisenauflösung erzeugt dagegen sogleich eine sehr dunkelblaue Farbe, es setzt sich ein reichlicher, grober schwarzblauer Niederschlag ab, und die Flüssigkeit hellt sich vollkommen über derselben auf. Salpetersäure löst diese Niederschläge vollkommen auf, und die Flüssigkeit hat eine rothe Farbe.

Leimauflösung erzeugt in dem Galläpfelaufgusse einen flockig-fasrigen, in Wasser unauflöslichen Niederschlag.

Ueberläßt man einen Galläpfelaufguß bei mäßiger Wärme und unter freier Einwirkung der Luft sich selbst, so überzieht er sich allmälig mit einer dicken lederartigen Schimmelhaut, und nach einigen Wochen setzt sich ein reichlicher grauer oder gelblichgrauer krystallinischer Satz auf dem Boden,

und zum Theil an den Wänden des Gefäßes als eine Rinde, welche mit körnigen, glänzenden, graulichgelben Krystallen bedeckt ist, und die sich auch unter der Schimmelhaut finden, ab. Der Aufguß hat dabei seinen zusammenziehenden Geschmack fast gänzlich verloren. Dieser ganze Absatz ist Gallussäure, aus den weißen Galläpfeln beinahe vollkommen rein, aus den schwarzen mit Gerbestoff und Extractivstoff verbunden.

Das Decoct der Galläpfel läßt beim Erkalten eine ziemliche Menge einer dicken, schmutzig grauen, elastischen Materie fallen, welche an der Luft dunkler wird, und größtentheils aus Gerbestoff mit etwas Extractivstoffe verbunden besteht.

Der Weingeist zieht beinahe eben so viele auflösliche Theile aus den Galläpfeln, als das Wasser aus. Die geistige Tinctur verhält sich im Wesentlichen mit den Reagentien so wie der wäßrige Aufguß; sie schimmelt aber nicht, und läßt daher auf diesem Wege keine Gallussäure ausscheiden.

Das merkwürdige, in dem Obigen angegebene Verhalten der Galläpfel hatte schon früher die Aufmerksamkeit der Chemiker angezogen. Bergmann hat aber zuerst die Meinung geäußert, daß in den Galläpfeln eine eigenthümliche Säure existire, worüber Morveau, Maret und Durande die ersten entscheidenden Versuche anstellten. Scheele gelang es auf einem ganz neuen Wege, diese Säure in reichlicher Menge und hinlänglicher Reinheit darzustellen, nämlich durch Schimmeln des concentrirten wäßrigen Galläpfelaufgusses. Bald wurde aber auch bei den von Seguin im Großen angestellten Gerbeversuchen die merkwürdige Eigenschaft der Galläpfel, mit der Leimauflösung einen unauflöslichen Niederschlag zu bilden, so wie auch das Kalkwasser reichlich niederzuschlagen, ausgemittelt, und dieses zusammenziehende, gerbende Princip Gerbestoff, Tannin, genannt. Dieser Stoff wurde ein Gegenstand der Arbeiten der ausgezeichnetsten Chemiker, wobei das Verhältniß desselben gegen die Gallussäure, die Methode, beide Stoffe von einander zu scheiden, und jeden rein für sich darzustellen, die Festsetzung der Eigenschaften beider in den mannigfaltigsten Beziehungen u. s. w. vorzüglich im Augenmerk waren.

Beide Substanzen, der Gerbestoff und die Gallussäure, haben in mehreren Eigenschaften so große Aehnlichkeiten, daß man sie in mancher Hinsicht für identisch nehmen könnte, daher sie manche Chemiker auch nur als Modificationen, und nicht wesentlich von einander verschieden ansehen. Es ist nämlich merkwürdig, daß in demjenigen Processe, durch welchen die Gallussäure am reichlichsten gewonnen wird, nämlich durch Schimmeln eines Galläpfelaufgusses, der Gerbestoff größtentheils verschwindet, während zugleich Sauerstoff aus der Luft absorbirt wird. Hier scheint also der Gerbestoff durch Oxydation in Gallussäure übergegangen zu seyn. Diese Wahrscheinlichkeit wird durch Pfaff's Versuche beinahe zur Gewißheit, aus welchen folgte, daß ein Galläpfelaufguß, aus welchem der größte Theil des Gerbestoffs durch Leimauflösung vorher niedergeschlagen worden ist, unter denselben Umständen fast gar keine Gallussäure giebt; daß ferner das Schimmeln und

die Bildung der Gallussäure gehindert werde, wenn man den Galläpfelaufguß unter einer Glocke mit Quecksilber sperrt. Wuttig hat bestimmt die Ansicht aufgestellt, daß Gerbestoff und Gallussäure sich gegen einander bloß wie unvollkommene und vollkommene, mehr oder weniger oxydirte Säure verhalten, womit auch die Meinung Scherer's übereinstimmt, der die Coëxistenz dieser beiden Stoffe, des Gerbestoffes und der Gallussäure, als verschiedener Stoffe, neben einander läugnet, und die eigentliche Gallussäure als ein Product des Versuchs selbst ansieht.

Freilich stimmen die meisten übrigen Chemiker mit dieser Ansicht nicht überein. Proust, der sich sehr viel mit diesem Gegenstande beschäftigt hat, so wie Richter, Davy u. A., behaupten die Coëxistenz beider Stoffe und auch Berthollet, wenn er gleich eine theilweise Bildung der Gallussäure während des Schimmelns des Galläpfelaufgusses als möglich annimmt, behauptet doch auch ausdrücklich die Präexistenz des größten Theils derselben vor dem Schimmeln neben dem Gerbestoffe.

Die Gallussäure kann man entweder nach Deyeux durch trockne Destillation der gepulverten Galläpfel, oder nach Scheele durch Schimmeln des Aufgusses bereiten, woraus die Säure sich sehr reichlich herauskrystallisirt. Um diese zu reinigen, kann man entweder, nach Proust, zu einer Auflösung derselben in dem 9—10fachen Gewichte Wasser salzsaures Zinn tropfenweise hinzusetzen, so lange noch Flocken entstehen, worauf man filtrirt und bis zur Hälfte abraucht, wo sich dann beim Erkalten Krystalle bilden, die man von der anhängenden Flüssigkeit befreit und durch wiederholtes Abrauchen neue Krystalle gewinnt; oder man kann sie nach Berthollet mit frisch niedergeschlagenem Zinnoxyd behandeln, welches den Gerbestoff zurückhält, wodurch eine Entfärbung der aufgelösten Säure bewirkt wird, die dann in sehr weißen Nadeln krystallisirt.

Die Darstellung eines reinen Gerbestoffes hat mehr Schwierigkeiten; man hat hierzu verschiedene Verfahrungsarten vorgeschlagen:

1) Niederschlagung des Gerbestoffes durch salzsaures Zinn, und nochmalige Zerlegung des Zinntannats durch Hydrothionsäure, wobei der Gerbestoff sich allmälig in dem Wasser, womit ersteres übergossen ist, auflöst.

2) Die Niederschlagung durch kohlensaures Kali, wobei ein häufiger aus gelblichweißen Flocken bestehender Niederschlag zu Boden fällt, den Proust für reinen Gerbestoff nahm.

3) Durch concentrirte Schwefelsäure, wodurch gleichfalls ein weißer flockiger Niederschlag zu Boden fällt, den man mit kaltem Wasser auswaschen, dann in heißem Wasser auflösen, und die noch verbundene Säure mit kohlensaurem Kali sättigen soll, um in dem alsdann erfolgenden Niederschlage reinen Gerbestoff zu erhalten.

4) Grotthuß bringt Galläpfelaufguß in den Kreis der Voltaischen Säule, wo sich am + Pole die Gallussäure, am — Pole der Gerbestoff, und zwar in weißen käsigen Flocken abscheidet.

Durch keine dieser Methoden (vielleicht mit Ausnahme von 4) wird aber

reiner Gerbestoff erhalten, sondern dieser bleibt stets mit andern Stoffen verbunden, nämlich theils mit dem in Galläpfelaufgusse enthaltenen Extractivstoff, theils mit den Fällungsmitteln, namentlich im ersten Falle mit Extractivstoff und wahrscheinlich etwas Salzsäure, im zweiten mit Gallussäure, kohlensaurem Kali und kohlensaurer Kalkerde; im dritten Falle mit Extractivstoff und vielleicht einem Theile Schwefelsäure, wie die nähere Untersuchung des auf die angezeigte Weise erhaltenen Gerbestoffs bewiesen hat. Auch durch andere von Trommsdorff, Thomson, Bouillon Lagrange ꝛc. empfohlene Methoden wird kein reiner Gerbestoff erhalten. Es ist daher auch sehr schwierig, specifische Unterscheidungszeichen anzugeben, da das chemische Verhalten der Gallussäure und des Gerbestoffes sehr viel Analoges darbietet (Vergl. Pfaff's Syst. der Mat. med. II. S. 157.).

Davy giebt die auflöslichen Bestandtheile von 500 Granen guter aleppischer Galläpfel, die er so lange mit Wasser ausgezogen, bis sie erschöpft waren, folgendermaßen an: Gerbestoff 130; Schleim und durchs Verdunsten unauflöslich gewordene Substanz 12; Gallussäure mit etwas Extractivstoff 31; rückständige Kalkerde und Salze 12. S. = 185 Gran. Die eingeäscherten Galläpfel geben eine sehr beträchtliche Menge Kalkerde.

Braconnot (Trommsd. N. J. III. 2. S. 393.) hat noch eine besondere Säure, Acide ellagique von ihm genannt, aus den Galläpfeln dargestellt, die in gewisser Hinsicht zwischen der Milchzucker- und der Harnsäure in der Mitte steht. Wenn man nämlich den Niederschlag, der sich in dem concentrirten Galläpfelaufgusse nach einigen Wochen an der Luft gebildet hat, mit kochendem Wasser behandelt, so sondert sich ein unauflösliches weißfahles Pulver ab, das fast gänzlich aus jener neuen Säure nebst einer kleinen Menge gallussauren Kalks, schwefels. Kalks und einer braunen färbenden Materie besteht. Sie ist in kochendem Wasser kaum auflöslich, röthet kaum das Lackmuspapier, neutralisirt aber vollkommen die Basen, und giebt mit ihnen eben so unauflösliche Salze, als die Gallussäure. Als charakteristisch für diese Säure wird noch angegeben, daß die Salpetersäure durch Wärme unterstützt sie roth färbt, was endlich in Blutroth übergeht; fortdauernde Einwirkung der Salpetersäure verwandelt diese Säure endlich in Kleesäure. Chevreul hält aber diese Säure für ein Gemisch von Gallussäure, von flüchtigem gelbem Farbestoffe, von rothem Farbestoffe, von stickstoffhaltiger Materie und von etwas Kalk und Eisen.

Bei der Destillation der Galläpfel mit Wasser geht zwar keine Gallussäure über, denn das Destillat röthet das Lackmuspapier nicht, und ertheilt den Eisenauflösungen keine blaue Farbe, aber wohl verflüchtigt sich ein eigenthümliches Geruchsprincip, welches sich, wie Hagen bemerkt hat, als ein talgartiges ätherisches Oel darstellen läßt, wovon 6 Pfund gegen eine halbe Unze geben.

Die Galläpfel geben das wirksamste zusammenziehende Mittel ab; in Vergiftungsfällen, wo adstringirende Gegenmittel angezeigt sind, als mit Brechweinstein, Brechwurzel ꝛc., wird eine starke Galläpfelabkochung nützlich

seyn. Zum äußerlichen Gebrauche wendet man sie im Aufgusse, in der Abkochung und auch in Pulvergestalt, mit Schweinefett zur Salbe gemacht, an. Die Galläpfeltinctur, aus 1 Th. Galläpfel und 6 Th. Alkohol, durch kalte, mehrtägige Maceration bereitet, ist ein unentbehrliches chemisches Reagens.

Die Anwendung der Galläpfel zum technischen Gebrauche, nämlich zum Schwarzfärben und zur Tinte, ist bekannt. Zu der letzteren hat Hagen 9 Th. Galläpfel, 3 Th. reinen Eisenvitriol und einen Theil arabisches Gummi als das beste Verhältniß gefunden. Nach einer andern Vorschrift werden 12 Unzen gestoßener Galläpfel und 4 Unzen Eisenvitriol mit 3 Maß (à 48 Unzen) Wasser und einem Maße Weinessig kochend heiß infundirt, nach einigen Tagen 3 Unzen in 10 Unzen Wasser aufgelöstes Senegalgummi zugesetzt, und diese Mischung 5—6 Tage bei gelinder Wärme hingestellt, worauf sie von dem Bodensatze abgegossen und aufbewahrt wird. Nach Lewis Vorschrift werden 1 Th. Blauholz und 3 Th. gepulverte Galläpfel mit 16—18 Th. Essig und eben so viel Wasser gekocht, und nach dem Durchseihen mit 1 Th. Eisenvitriol, und 1—1½ Th. arabischem Gummi vermischt.

Gentiana rubra. Die Wurzel. Rothe Enzianwurzel.

Gentiana lutea Linn. Eine ausdauernde Pflanze der schweizer Alpen.

Die Wurzel von der Dicke eines Daumens, oder auch etwas dicker, wenig ästig, im Stamme geringelt mit hin und wieder einigen Wurzelzasern, in den Zweigen runzlig gestreift, außen braunroth, innen vornehmlich angefeuchtet gelblichröthlich, mit nicht sehr dicker Rinde, dickem schwammigen Holze, von stark bitterm Geschmacke. Es kommen auch Wurzeln vor von ähnlicher Form, von der Dicke eines Fingers, von blässerer Farbe, die von andern verwandten Arten Gentiana genommen und nicht zu verwerfen sind, man sehe aber mit der größten Sorgfalt darauf, daß nicht die Wurzeln von **Veratrum album** (weiße Nieswurzel) untergemischt sind.

Gentiana lutea Linn. Der gelbe oder edle Enzian.
Linn. Cl. V. Pentandr. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 13. Gentianeae.

Diese edle Zierde der Alpen wächst auf den höheren Gebirgen des mittlern Europas, auf den östreichischen und schweizer Alpen; besonders häufig auf dem Jura. Sie liebt eine Höhe von 3—4000 Fuß, und steigt selten über 5400 Fuß in der Höhe.

Die Wurzel ist nach Verschiedenheit des Alters mehr oder minder stark und ästig, fleischig, außen gelblichbraun, und mit ringförmigen Erhabenheiten versehen, inwendig gelb. Der Stengel ist krautartig, gerade, aufrecht, dick und hohl, vollkommen glatt, 3—4 Fuß und darüber hoch. Die Blätter

sind gegenständig, eiförmig oder oval, spitz, ganzrandig, glatt, mit 5—7 starken Nerven versehen und gefaltet; die untern verschmälern sich in einen kurzen Blattstiel, die übrigen sind sitzend und stengelumfassend; die größern erreichen eine Länge von einem Fuß, bei einer Breite von 5—6 Zoll. In der Nähe der Blüthen sind sie verhältnißmäßig viel kleiner, concav und gelblichgrün. Die Blüthen stehen in zahlreicher Anzahl quirlförmig beisammen, so daß diese Blüthenquirle sich gegen die Spitze hin immer mehr nähern, und in ein Köpfchen endigen. Jede Blüthe ist gestielt. Der Kelch besteht aus einer zarten, häutigen blaßgelblichen Scheide, die in zwei ungleiche Lappen gespalten ist. Die Blumenkrone ist bis auf die Basis in fünf, selten in sechs, länglich-lancettförmige, spitze, schön gelbe, nicht punktirte, 10—12 Linien lange Abschnitte getheilt, welche bei voller Blüthe radförmig ausgebreitet sind. Die Frucht ist eine längliche, walzenförmige, einfächrige Kapsel mit zahlreichen, rundlichen, röthlichen Saamen.

Die Wurzel dieser Pflanze zeichnet sich durch eine ausnehmende Bitterkeit aus, und ist daher seit alten Zeiten als eins der trefflichsten bittern Mittel berühmt. Wir erhalten diese **Radix Gentianae luteae s. rubrae** entweder bei jüngern Wurzeln ganz, oder die ältern auf verschiedene Weise gespalten. Sie zeichnen sich auch im getrockneten Zustande durch einen eigenthümlichen Geruch, durch die ringförmigen Wurzeln, bei den Seitenzweigen der Wurzel durch runzlige Längsfurchen auf der Oberfläche, und die schmutzig röthlichgelbe Farbe im Innern aus.

Der größte Theil der im Handel vorkommenden rothen Enzianwurzel wird von dieser Art gesammelt, indessen sind die Wurzeln anderer verwandten Arten nicht wesentlich verschieden; dahin gehören: **Gentiana punctata Froehl.**, der punktirte Enzian, der auf den östreichischen und schweizer Alpen, so wie am Riesengebirge, in Mähren und auf den Pyrenäen wächst, dessen Blüthen schön gelb, mit zahlreichen, schwarzvioletten Punkten bezeichnet sind, und dessen Wurzel der vorigen ähnlich, nur minder stark, übrigens eben so bitter ist. Der ungarische Enzian, **Gentiana pannonica Jacq.**, wächst vorzugsweise auf den bairischen und östreichischen Alpen. Der untere Theil der Blume ist gelblich, der obere schön purpurroth und mit zahlreichen dunkleren Punkten bezeichnet. Von dieser Pflanze wird vorzugsweise im Salzburgischen die Wurzel gegraben, die in Hinsicht der Bitterkeit mit den vorigen übereinkommt, sich aber von den Wurzeln der G. lutea durch eine dunklere mehr braune Farbe, innen getrocknet gelb, frisch weißlich, durch stärkere Längsfurchen und den Mangel der zahlreichen Querwurzeln unterscheidet, die man dort in der Nähe des Stengels (am Kopf der Wurzel) bemerkt. Der purpurrothe Enzian (**Gentiana purpurea Froehl.**) ist auf den Schweizeralpen und auf den Pyrenäen einheimisch. Die Blüthen sind ähnlich wie bei **G. pannonica**, nur am obern Theile dunkler purpurroth, auch die Wurzeln beider Pflanzen stimmen ganz überein, nur ist die letztere etwas schwächer, im Geschmacke zeigt sie nach Nees v. Esenbeck eine ganz besonders intensive Bitterkeit.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0460-2

Es ist im Handel eine Gentianwurzel mit narkotischen Eigenschaften vorgekommen (Berl. Jahrb. 1815. S. 69.), die aber nicht, wie sonst angegeben wird, mit den Wurzeln des Ranunculus Thora (die graubraun, blässer, selbst weißlich, spröde, von widrigem Geruche und stechend brennendem Geschmacke sind), noch weniger mit Belladonna- oder weißen Nieswurzeln (die beide so wenig Aehnlichkeit mit dem rothen Enzian haben, daß nur bei der gröbsten Unkunde und Unachtsamkeit eine Verwechslung möglich ist) vermengt waren, die man auch darunter gefunden haben will. Diese narkotischen Enzianwurzeln unterscheiden sich von den officinellen 1) durch eine im Allgemeinen geringere Größe; 2) durch eine durchaus hellere Farbe des Innern wie des Aeußern, und 3) durch bedeutend schwächern Geruch. Chemische Reagentien ließen aber keine Verschiedenheit wahrnehmen. Die Herren Schrader und Staberoh äußern in ihrem Gutachten die Vermuthung, daß die Verschiedenheit der sonst ächten Gentianwurzel durch unzeitige Einsammlung herbeigeführt worden seyn könne, oder daß sie von einer andern Gentiana, z. B. G. punctata genommen seyen. Nach Planche enthält indeß jede frische Gentianwurzel narkotisches Princip, und das auf frischen Wurzeln stehen gelassene Wasser bekommt jedesmal einen ekelhaften Geruch, und verursacht narkotische Zufälle. Vielleicht waren also jene Wurzeln noch zu frisch.

Das Enzianpulver ist hellbräunlich, beinahe wie Chinapulver. Das Wasser zieht schon in der Kälte die bittern und extractiven Theile reichlich aus, besonders wenn das Pulver damit gerieben wird. Ein solcher wäßriger Aufguß ist vollkommen klar nnd durchsichtig, von hellbräunlich rother Farbe, im ersten Augenblicke von kaum merklich süßem, dann aber sogleich anhaltend rein bitterm Geschmacke, und von schwachem, angenehmen, eigenthümlichem, süßlich-bitterm Geruche. Der Weingeist zieht eine schön goldgelbe Tinctur aus, die viel reiner und stärker bitter ist, als der wäßrige Aufguß und durchaus keinen süßlichen Beigeschmack hat.

Acht Pfund Wurzeln geben drei Pfund wäßriges Extract.

Nach den Bemerkungen und chemischen Versuchen von Schrader (Trommsd. N. J. III. 2. S. 272.) und Henry (ebend. S. 281.) haben Henry und Caventou (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 79. und Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 99.) durch eine ausführliche Analyse die Bestandtheile des rothen Enzians kennen gelehrt.

Gepulverter Enzian wurde mit Aether digerirt und nach Verlauf von 24—48 Stunden eine grünlichgelbe Tinctur erhalten, aus welcher, wenn man sie langsam verdunsten läßt, eine beträchtliche Menge sehr kleiner gelber nadelförmiger Krystalle anschießen. Wird die Ausziehung, ohne die Krystallisation abzuwarten, durchs Verdampfen sehr concentrirt, so erhält man nach dem Erkalten eine gelbe krystallinische, aber dabei weiche und klebrige Masse. Zieht man diese mit absolutem Alkohol so lange aus, als er noch Farbe und Geschmack annimmt, so bleibt eine sehr klebrige, härtliche, grünlichweiße Masse zurück, die sich in allen Stücken wie Vogelleim verhält.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0461-7

Dampft man die geistigen Auszüge ein, und behandelt das Zurückgebliebene mit schwachem Weingeiste, so löst sich alles bis auf eine gewisse Menge einer geruch- und geschmacklosen grünlichen fetten Materie auf. Der schwache Weingeist hat eine gelbe bittere Materie (Gentianin), und eine saure Substanz, und diejenige Materie gelöst, wovon der eigenthümliche Geruch der Enzianwurzel herrührt. Um jene Stoffe von einander zu scheiden, dampft man die mit schwachem Weingeiste erhaltenen Lösungen zur Trockne ein, behandelt die trockne Masse mit Wasser und etwas reiner Bittererde einige Zeit in der Siedhitze, und bringt dann alles im Wasserbade wieder zur Trockne. Hierdurch entfernt man den größten Theil der riechenden Materie, die Säure verbindet sich mit der Bittererde, und die gelbe bittere Materie ist zum Theil frei, zum Theil mit der Bittererde verbunden, die dadurch eine schöne gelbe Farbe erhalten hat. Behandelt man diese Masse mit siedendem Aether, so löst sich der freie Theil des Gentianins darin auf, und man erhält es daraus rein nach dem Verdampfen. Das mit der Bittererde verbundene Gentianin kann man mit Sauerklee- oder auch Phosphorsäure davon abscheiden.

Das Gentianin hat eine schöne gelbe Farbe, keinen Geruch, aber einen starken aromatischen bittern Geschmack, und von ihm rührt der bittere Geschmack der Enzianwurzeln her. Es ist neutral, und verändert daher weder das blaue noch das geröthete Lackmuspapier (nach Buchner scheint es eher zu den aciden Pflanzenstoffen als zu den Alkaloiden zu gehören), löst sich leicht in Aether und Weingeist, und scheidet sich beim freiwilligen Verdampfen dieser Lösung in der Form gelber krystallinischer Nadeln ab. Kaltes Wasser wirkt zwar wenig darauf, aber es erhält doch schon dadurch einen sehr bittern Geschmack; heißes löst mehr auf, und läßt daher beim Erkalten einen Theil wieder fallen. Verdünnte kalische Laugen machen die Farbe desselben dunkler, und lösen etwas mehr davon, als das bloße Wasser; Säuren bleichen die gelbe Farbe desselben bedeutend, und lösen es in beträchtlicher Menge. Die mit der Schwefel- und Phosphorsäure erhaltenen Lösungen sind ungefärbt, die mit den schwächern Säuren, wie der Essigsäure, gelblich. Alle haben einen sehr bittern Geschmack. Die concentrirte Schwefelsäure verkohlt diese Materie leicht, und die Bitterkeit verschwindet, so wie das Gleichgewicht der Bestandtheile derselben aufgehoben wird. Setzt man dasselbe einer Hitze aus, die der der kochenden concentrirten Schwefelsäure gleich ist, so sublimirt sich ein Theil in der Form von kleinen gelben krystallinischen Nadeln, während ein anderer sich zersetzt. In der wäßrigen Lösung des Gentianins wird durch den Bleiessig sogleich ein gelber, und durch das salpetersaure Silber nach einigen Stunden ein sich bräunender Niederschlag hervorgebracht, aber der Bleizucker, der salzsaure Baryt, das sauerkleesaure Ammoniak, das reine Ammoniak, Aetzkali und ätzender Quecksilbersublimat bewirken keine bemerkbare Trübung.

Werden die mit Aether ausgezogenen Enzianwurzeln mit starkem siedendem Weingeiste behandelt, so setzt sich beim Erkalten der heiß filtrirten

Tincturen noch mehr von der vogelleimartigen Materie ab. Der abdestillirte Weingeist hat den Enziangeruch; der Rückstand löst sich bis auf etwas vogelleimartige und etwas fette Materie in Wasser, und diese rothfahle Lösung röthet Lackmuspapier, wird durch Galläpfelaufguß und sauerkleesaures Ammoniak getrübt, erhält durch schwefelsaures Eisenoxydul eine bräunlichgrüne, und durch Kalien eine rothgelbe Farbe; giebt mit dem Bleiessig einen starken Niederschlag, wird aber durch den Leim, Brechweinstein, salzsauren Baryt und Jod nicht im geringsten verändert. Zur Syrupsdicke abgedampft, giebt es ein durchscheinendes Extract von rothfahler Farbe und einem sehr bittern Geschmacke, dem aber ein deutlicher süßer vorhergeht. Dieses Extract besteht aus einer gelben färbenden Materie, aus unkrystallisirbarem Zucker und aus Gentianin. Versetzt man die Lösung des Extracts mit Bleiessig, so wird eine große Menge der gelben färbenden Materie und ein Theil des Gentianins gefällt. Läßt man nun durch die darüber stehende Lauge Hydrothionsäure streichen, um das Blei abzuscheiden, filtrirt und raucht wieder zur Dicke eines Syrups ab, löst diesen in Weingeist, und setzt dann Aether hinzu, so wird der syrupartige Zucker reiner abgeschieden, und sein süßer Geschmack ist dann nur noch mit einem schwachen Bitter vereint.

Die mit Aether und Alkohol ausgezogenen Enzianwurzeln haben dennoch einen bitterlichen Geschmack, welcher von einem kleinen Rückhalt an Gentianin herrührt, der den Wurzeln stark anhängt. Sowohl kaltes als kochendes Wasser lösen daraus nichts weiter, als eine gummiartige Materie, und der Rückstand ist Holzfaser.

Durch diese Analyse wurden folgende Bestandtheile der Enzianwurzeln gefunden: 1) eine flüchtige riechende Materie. Diese ist wahrscheinlich ein ätherisches Oel ohne Bitterkeit. Das vorsichtig über die Wurzeln abdestillirte Wasser hat einen auffallend widerlichen Geruch und einen gering scharfen Geschmack. 2) Gentianin. 3) Eine vogelleimartige Materie, die geruch- und geschmacklos, unlöslich in Wasser, kaltem Weingeiste, Säuren, und kalischen Laugen ist; kochender starker Weingeist löst davon eine sehr kleine Menge auf, die aber beim Erkalten wieder daraus niederfällt. Sie löst sich in ätherischen und fetten Oelen, und verbindet sich mit Aether in allen Verhältnissen. 4) Eine fette Materie; diese hat alle Eigenschaften der fetten Oele, und löst sich, gleich dem Ricinusöle, in starkem Weingeiste auf. 5) Eine verbrennliche Säure; sie ist in sehr kleiner Menge vorhanden, und daher schwer zu bestimmen; wahrscheinlich ist es Essigsäure. 6) Unkrystallisirbarer Zucker. 7) Gummi. 8) Eine gelbe färbende Materie, und 9) Holzfaser. (Kein Stärkemehl?)

Dem Gehalt an Schleimzucker ist es zuzuschreiben, daß es gelingt, durch Gährung eine Art Branntwein aus den Enzianwurzeln zu bereiten, der vorzüglich von den Tyrolerinnen aus den Wurzeln, die sie im Frühjahr auf den steierschen Alpen sammeln, bereitet, und unter dem Namen Enziansgeist verkauft werden soll.

Die frühere Analyse Henry's (siehe oben) ergab auch ein rothgelbes

scharf und bitter schmeckendes, nach Enzian riechendes, mit ein wenig flüchtigem Oele verbundenes Weichharz und etwas Hartharz.

Das Gentianin äußert keine giftigen Wirkungen, es erregt außer dem bittern Geschmacke nur ein leichtes Gefühl von Hitze im Magen.

In der Medicin dient die Gentiana als ein magenstärkendes, tonisches und Fiebermittel und wird schicklich im wäßrigen und weinigen Aufgusse, in der Tinctur oder im Extract, weniger passend, wegen der über ½ betragenden Holzfaser, in Pulverform verordnet.

Geoffroya surinamensis. Die Rinde. Geoffräenrinde.

Geoffroya surinamensis Linn. Ein im südlichen Amerika häufiger Baum.

Eine dicke Rinde, außerhalb, wo sie oft mit grauen Lichenen bedeckt wird, braunschwärzlich, innerhalb faserig, bräunlich, von bitterlichem herbem Geschmacke.

Es giebt zwei Arten Geoffräenrinde, nämlich die surinamische und die jamaikanische, welche nachstehenden Pflanzen zugeschrieben werden.

Geoffroya surinamensis Bondt. Der surinamische Wurmrindenbaum. Surinamische Geoffräa. Surinamischer Kohlbaum.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Das Vaterland dieses Baumes ist Surinam, wo er die höher liegenden Wälder und einen sandigen Boden liebt. Der Stamm wird mehrere Klafter hoch, einige Spannen dick, und ist mit einer glatten Rinde bekleidet. Seine Aeste sind zahlreich, lang und abstehend. Das Holz ist fest, gelblichbraun. Verwundet ergießt sich aus ihm ein harziger rother Saft. Die Blätter sind ungleich, vierpaarig-gefiedert; die Fiederblättchen ungefähr 2 Zoll lang und einen Zoll breit, oval, oben dunkelgrün, glänzend, unten blaßgrün. Die Blüthen bilden ansehnliche, aufrechte, zweitheilige, sehr ästige Trauben, sind hochroth, geruchlos, aber reich an Honig. Der Kelch glockenförmig glatt, die schmetterlingsförmige Blumenkrone dreimal länger als der Kelch.

Die frische Rinde kommt nach Bondt in ziemlich schweren, ungefähr einen Fuß langen und einige Linien dicken Stücken, doch verschieden nach der Verschiedenheit des Alters des Baumes oder der Aeste, von denen sie genommen ist, vor. Sie ist gewöhnlich mit grauen Flechten bedeckt, welche die rothe Farbe der Epidermis verhüllen; unter dieser erscheint die Rindensubstanz faserig, zähe, aber dicht, rostfarbig mit dunklern oder hellern Stellen gemischt. Auf dem Querschnitte ist sie glänzend, das Pulver derselben ist blaß zimmtfarbig. Die Rinde besitzt im frischen Zustande einen unangenehmen Geruch, der sich bei dem Trocknen verliert; der Geschmack ist schwach bitter, etwas herb und kräftiger in der innern (Bast-) Lage der Rinde. (Nees v. Esenbeck hält es für wahrscheinlicher, daß die sogenannte surinamische

Rinde, wie sie jetzt im Handel vorkommt, von der Geoffroya inermis Sw. als von G. surinamensis abstamme, und auch Hr. Batka hat mir schriftlich seine Zweifel über diesen Gegenstand mitgetheilt und er ist gleichfalls geneigt, die surinamische Rinde der Geoffroya inermis zuzuschreiben.)

Die erste Nachricht von dieser Rinde ertheilte Macari, ein amerikanischer Priester, der zugleich Arzt war, im Jahr 1770.

Das über diese Rinde abgezogene Wasser hat einen faden Geschmack, ist ein wenig weiß trübe, doch ohne eine Spur von Oel, und riecht widerlich. Der wäßrige Auszug sieht rothbraun aus, schmeckt ekelhaft, herb bitter und trübt sich beim Erkalten. Um alles Auszugsfähige auszuziehen, muß man die Rinde wenigstens mit 16—24 Theilen Wasser zwei Stunden kochen. Nach Bondt liefern 8 Unzen Rinde 10 Quentchen wäßriges herbbitteres, honigdickes, gelbrothes Extract. Beim Einkochen desselben will er den Geruch nach bittern Mandeln bemerkt haben, und er erhielt dabei noch 3 Quentchen, wahrscheinlich harzige Theile, in abgenommenen Häuten. Mit Weingeist erhielt er aus einer gleichen Menge eine dunkelrothe Tinctur, welche ein Quentchen und 24 Gran zerreibbares bitterschmeckendes Harz lieferte. Trommsdorff (J. I. 2. S. 123.) kochte 4 Unzen Rinde wiederholt mit Wasser, wodurch sie eine halbe Unze verlor; durch nachherige Behandlung mit Alkohol verlor sie noch ein Quentchen, die 3 Unzen 3 Quentchen holziger Rückstand gaben verbrannt 40 Gran Asche, die aus Kali, schwefels. und salzs. Kali, Kalk und Kieselerde bestand.

Dr. Hüttenschmidt (aus dessen Inaugural-Dissertation in Geiger's Magazin II. 7. 1824. S. 283.) erschöpfte die Rinde mit heißem Weingeist. Der geistige Auszug roch anfangs chinaartig, beim Abdampfen nach Pflaumenkernen. Wasser schied eine braune Substanz aus, die sehr viel Aehnlichkeit mit Pelletier's Chinaroth hatte, und von dem Verf. oxydirter Gerbestoff genannt wird. Beim Erhitzen entwickelte sie ammoniakhaltige Dämpfe, die davon befreite Flüssigkeit wurde mit Bleiessig versetzt und der beträchtliche fleischfarbene Niederschlag mit Hydrothionsäure zerlegt. Das erhaltene Schwefelkali wurde mit absolutem Alkohol gekocht, welcher Schwefel daraus aufnahm, der beim Verdampfen in zarten Krystallen erhalten wurde. Die vom Schwefelblei abfiltrirte wäßrige Lösung enthielt eisengrünenden Gerbestoff und Aepfelsäure. Von der Flüssigkeit, welche mit Bleiessig behandelt war, wurde der Bleigehalt durch Hydrothionsäure entfernt, und hierdurch der eigentlich wirksame Bestandtheil der Rinde (mit Essigsäure verbunden?), Surinamin, Surinamstoff, erhalten. Es krystallisirt aus der wäßrigen Lösung in einer glänzenden, weißen, voluminösen, baumwollenartigen Masse, ist geschmacklos, in Wasser und Weingeist löslich; die Lösung reagirt weder auf Lackmus- noch auf Kurkumepapier. In der Hitze bläht es sich stark auf, verbreitet einen süßlichen empyreumatischen Geruch, und entwickelt ammoniakhaltige Dämpfe; die Kohle verbrennt ohne Rückstand. In wäßrigem Kali löst es sich leicht mit brauner Farbe auf; mit Säuren geht es krystallisirbare Verbindungen ein.

Merkwürdig ist das Verhalten des Surinamins gegen salpetrige Säure. Die wäßrige Lösung erhält nämlich beim Erwärmen mit salpetriger Säure anfangs eine violette Farbe, welche bald in ein schönes Berlinerblau übergeht. Diese blaue Flüssigkeit wird durch Chlor in Violett verwandelt, welche Farbe nach 48 Stunden verschwindet, wobei sich violette Flocken ablagern. Hydrothionsäure verwandelt die blaue Farbe in Grün, welches nach 24 Stunden verschwindet; salpetrige Säure stellt die blaue Farbe nicht wieder her. Salzsaures Zinnoxydul verwandelt die blaue Farbe in Schmutziggelb; schwefelsaure Alaunerde in Grasgrün. Ammoniak fällt hieraus die Alaunerde, aber nicht den Farbestoff. Kali bringt eine gelbe Farbe hervor, ähnlich dem salzsauren Eisenoxyd, Alaun bewirkt in dieser Flüssigkeit einen flockigen Niederschlag, fällt aber nicht die färbende Substanz, die Flüssigkeit bleibt grün; für sich bringt aber Alaun in der blauen Flüssigkeit keinen Niederschlag hervor, Schwefelsäure bewirkt keine Veränderung. Magnesia wirkte wie Kali, und brachte man Salz- oder Schwefelsäure zu dem Gemenge, so nahm die Flüssigkeit eine grüne Farbe an. Eisenvitriol brachte eine blaßgrüne Farbe hervor, ohne die Farbe zu zerstören.

Bei sehr gelindem Abdampfem nimmt die durch salpetrige Säure blau gefärbte Flüssigkeit eine blutrothe Farbe an. Mit Wasser verdünnt erhält sie die Farbe des schwefelblausauren Eisenoxyds, bald bleicht sich die Flüssigkeit unter Absatz rother Flocken. Verbindungen dieses Stoffes wurden dargestellt mit der Schwefel-, Salz- und Essigsäure zu krystallisirbaren Salzen. Statt der Benennung Surinamin ist als passenderer Name Geoffroyin in Vorschlag gebracht worden.

Die mit Weingeist ausgezogene Rinde wurde mit Wasser gekocht; die dadurch erhaltene Flüssigkeit enthielt vorzüglich Gerbestoff, Satzmehl und äpfelsaure Salze.

Durch Behandlung des Rindenrestes mit Essigsäure, salzsaurem und kohlensaurem Kali nach einander erhielt man noch kleesaur. und phosphorsaur. Kalk, und einen braunen flockigen Niederschlag, der nicht weiter untersucht wurde.

Die surinamische Wurmrinde enthält demnach: Surinamin; oxydirten Gerbestoff; einen das Eisen grün färbenden Gerbestoff; Stärke; Gummi; Aepfelsäure und kleesauren Kalk.

Beim Einäschern gaben 20 Theile Rinde 0,84 Asche, welche enthielt: kohlens., salzs. und phosphors. Kali 0,12; phosphors. Kalk und Eisenoxyd 0,06; kohlens. Kalk 0,59; Magnesia 0,03; Kieselerde und Manganoxyd 0,03.

* Geoffroya inermis Sw. Die wehrlose Geoffräa. Jamaikanischer Wurmrindenbaum.

Classe und Ordnung wie bei der vorigen.

Es ist ein Baum von mittlerer Größe, der in den Wäldern des westlichen Theils von Jamaika, und zwar an den Ufern der Flüsse einheimisch ist. Seine Rinde ist bläulichgrau. Die Aeste sind rund, glatt ausgebreitet, aber nur wenig getheilt. Die Blätter ungleich gefiedert, fast einen Fuß lang;

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0466-6

die Fiederblättchen oval, ungefähr 3 Zoll lang und 1—1½ Zoll breit. Die rothen Blüthen stehen in großen reichblüthigen, aufrechten Rispen. Der Kelch ist glockenförmig, die Blumenkrone schmetterlingsförmig.

Die Rinde dieses Baumes (**Cortex Geoffroyae jamaicensis, Cort. Cabbagii**) wurde zuerst durch die Engländer, und besonders 1777 durch Wright als ein kräftiges Wurmmittel bekannt. Nach Wright kommt sie bald in flachen, bald in zusammengerollten, selten über eine Linie dicken Stücken von etlichen Zollen bis einen Fuß Länge vor, ist außen grau, auf der innern Seite schwarz und gefurcht, hat einen faden, schleimigen, bitterlichen Geschmack und einen widrigen, bei der trocknen Rinde besonders beim Pulvern und beim Uebergießen mit siedendem Wasser bemerklichen Geruch. Das darüber abgezogene Wasser soll einige Schärfe und einen widrigen Geruch haben. Die Abkochung mit Wasser sieht braun aus, und liefert etwas über den sechsten Theil an gummigem, mildbitterm, der geistige weingelbe Auszug aber $\frac{1}{12}$ außerordentlich bitteres, anhaltend fast wie Pfeffer beißendes Extract.

Die vor mir liegende jamaikanische Wurmrinde, von Hrn. Batka erhalten, ist außen blaulichgrau, hin und wieder mit Flechten besetzt, unter der Epidermis sogleich in ein frisches Gelb übergehend, welches bei dem innern Theile der starken Splintlage etwas ins Bräunliche übergeht. Diese Splintlage ist sehr faserig, daher die Rinde wohl in die Länge splittert, aber nicht in die Quere bricht. Der Geschmack ist kräftiger, bitterer, als bei der surinamischen Rinde.

Auch die jamaikanische Wurmrinde wurde von Dr. Hüttenschmidt mit heißem Weingeiste erschöpft, der Weingeist abgezogen und der Rückstand mit Wasser versetzt, wo sich ein schwarzgrünes Harz mit Wachs und einer dem Ulmin ähnlichen Materie vermischt ausschied, welche durch Lösen in heißem Weingeiste, Erkalten u. s. w. getrennt wurden. Die wäßrige Lösung wurde mit Bleiessig versetzt, und Hydrothionsäure durchströmen gelassen. Die filtrirte weingelbe Flüssigkeit schmeckte bitter. Salzsäure und Salpetersäure fällten daraus Krystalle von gelber Farbe, dem Gummigutt ähnlich; Schwefelsäure und Phosphorsäure bildeten ebenfalls gelbe Niederschläge; Kali färbte sie safrangelb; Silberlösung fällte sie wenig; Eisenvitriol und Jod gar nicht.

Die Lösung wurde nun mit mehrerer Säure versetzt, die erhaltenen Niederschläge durch wiederholtes Lösen in Wasser und Krystallisiren gereinigt; ferner die schwefelsaure Verbindung mit kohlensaurem Baryt digerirt, und so ein eigenthümlicher Stoff, das Jamaicin erhalten. Das Jamaicin, Jamaikastoff, krystallisirt in Quadrattafeln, ist undurchsichtig, gelb wie Gummigutt. In Wasser sind die Krystalle leicht löslich, etwas schwieriger in Weingeist. Die Lösung verändert weder Lackmus- noch Kurkumepapier. Von Kali und salpetersaurem Queckſilberoxyd wird sie nicht verändert; Chlor färbt sie roth, wäßriges Jod veranlaßt ein schwaches Opalisiren; Sublimat und Gallustinctur fällen einen gelben Niederschlag. Mit mehreren Säuren bildet es krystallisirbare, lösliche, bitterschmeckende Verbindungen. Die Krystalle der reinen Substanz schmelzen schon unter dem Kochpunkte des Wassers; bei

stärkerer Erhitzung schwellen sie auf, verbreiten einen den gerösteten Cacaobohnen ähnlichen Geruch, und verbrennen endlich ohne Rückstand zu lassen. In trockner Destillation liefern sie eine ammoniakhaltige Flüssigkeit. Verbindungen wurden dargestellt mit der Schwefelsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Essigsäure und Kleesäure. Die Salze blieben gelbgefärbt, auch wenn sie mit thierischer Kohle behandelt wurden. Statt des nur das Land, nicht die Pflanze bezeichnenden Namens Jamaicin, ist vorgeschlagen, diesen Stoff nach dem ältern Namen der Rinde, Cort. Cabbagii, Cabbagin zu benennen.

Die vom Jamaicin größtentheils befreite Flüssigkeit war stark gelb gefärbt, und schmeckte unangenehm bitter. Sie färbte Leinwand dauerhaft gelb, und enthielt gelbfärbenden Extractivstoff.

Die mit Weingeiste behandelte Rinde wurde mit kaltem Wasser ausgezogen. Der Auszug lieferte ein braunes glänzendes Gummi von fadem Geschmacke. Dann wurde die Rinde mit kochendem Wasser behandelt, wo eine gelbe Flüssigkeit von fadem Geschmacke erhalten wurde, die von Jod sich blau färbte, beim Abdampfen Häute zog, welche erhitzt einen brenzligen, dem gebrannten Zucker ähnlichen Geruch verbreiteten; die Dämpfe reagirten sauer. Dann wurde die Rinde mit Essigsäure in der Hitze behandelt; die gelbe Flüssigkeit mit Ammoniak neutralisirt, wo sie dunkler wurde, ohne einen Niederschlag zu bilden. Die Flüssigkeit enthielt essigsauren Kalk, etwas bittere Substanz und Stärkemehl.

Die so behandelte Rinde wurde dann mit sehr verdünnter Salzsäure gekocht, welche neben gelbem Farbestoffe kleesauren Kalk auszog. Zuletzt wurde der Rindenrest mit einer Lösung von kohlensaurem Natron gekocht, die Flüssigkeit mit Salzsäure gesättigt, worauf nach einiger Zeit ein sehr voluminöser Niederschlag sich ausschied, der beim Verbrennen einen thierischen Geruch ausstieß, und dessen Dämpfe Kurkume rötheten.

Die jamaikanische Wurmrinde enthält demnach: Jamaicin (Cabbagin); einen färbenden Stoff, Gummi, Stärke, Wachs, Harz. 20 Th. Rinde gaben beim Einäschern 0,68 Th. Asche, welche aus kohlens. und wenig salzs. und schwefels. Kali, 0,10; kohlens. 0,40, und phosphors. Kalke 0,14, wenig Magnesia 0,02 und Kieselerde 0,01 bestand, und eine Spur Eisenoxyd.

Bei den mit den beiden entdeckten Stoffen angestellten Versuchen zeigten 2 Gran essigsauren Surinamins auf eine Taube und einen Sperling gar keine Wirkung, wogegen eben so viel Jamaicin diese Thiere unruhig, zitternd machte, und nach einer kleinen halben Stunde heftig abführte. Hiernach wäre diejenige Rinde, welche im Handel gewöhnlich als jamaikanische Geoffräa vorkommt, für die wirksamere zu halten, wofür auch der kräftigere Geschmack zu sprechen scheint.

Glycyrrhiza echinata. Die Wurzel. Süßholzwurzel.

Glycyrrhiza echinata Linn. Eine ausdauernde Pflanze des südlichen Rußlands.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0468-8 DFG

Eine große, von der Rinde geschälte, gelbliche, süße Wurzel. An Dicke übertrifft sie weit die Wurzel der Glycyrrhiza glabra.

Glycyrrhiza glabra. Die Wurzel. Süßholzwurzel.

Glycyrrhiza glabra Linn. Eine ausdauernde Pflanze des südlichen Europas.

Eine sehr lange, walzenförmige, holzige Wurzel, von der Dicke eines Fingers, auch wohl eines Daumens, außen grau-schwärzlich, innen gelb, von süßem Geschmacke. Sie ist der Wurzel der Glycyrrhiza echinata vorzuziehen.

Glycyrrhiza echinata Linn. Das stachlige Süßholz.
Glycyrrhiza glabra Linn. Das gemeine Süßholz.
Liquiritia officinalis Moench.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Das stachlige Süßholz ist in den südlichen Provinzen Rußlands und in Ungarn zu Hause, läßt sich auch leicht cultiviren. Die Wurzel ist stark, holzig, ästig, außen hellbräunlich, innen gelblichweiß. Die Stengel sind 5—6 Fuß hoch, die Blätter sind ungleich gefiedert, die Fiederblättchen, gewöhnlich 9, länglich. Die Blüthen stehen in runden kopfförmigen Aehren, als weiß und violette Schmetterlingsblumen. Die Wurzel der cultivirten Pflanze zeigt einen nur sehr unbedeutend süßen Geschmack.

Das gemeine Süßholz ist im südlichen Frankreich und in Spanien zu Hause; es wird aber auch in Deutschland, besonders bei Bamberg, der Wurzel wegen, cultivirt. Diese ist kriechend, stark und holzig, außen bräunlich, innen gelb. Die gefiederten Blätter stehen abwechselnd, die einzelnen Fiederblättchen, 13—15 an einem Blattstiele, sind eiförmig länglich; stumpf, gelbgrün, haben auf der untern Seite einen eigenen Glanz, und sind besonders in der Jugend ganz klebrig. Die Blüthen stehen in einfachen Aehrchen, sind Schmetterlingsblumen, und weiß mit violetten Spitzen.

Diese beiden Pflanzen geben die beiden im Handel vorkommenden Sorten Lakrizenholz, nämlich das russische und das spanische. Das erste ist schon von der äußern Rinde befreit, und heißt daher geschältes Lakrizenholz. Die Stücke sind nicht sehr lang, bald mehr bald weniger dick, knotig und von hellgelber Farbe; die dickern Stücke sind auch wohl gespalten. Das zweite besteht aus langen Wurzelstücken, die fingersdick, biegsam, faserig, noch mit der graubraunen Rinde bedeckt und inwendig gelb sind. Auf dem Querdurchschnitte ist es strahlig gestreift und von Saftröhrchen allenthalben punktirt, und zeigt einen markigen Mittelpunkt.

Der Geschmack des Lakrizenholzes ist süß, hintennach etwas ins Bittere übergehend.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0469-6

Der wäßrige Aufguß ist gelblich, schmeckt angenehm süß, ohne merklich bittern oder kratzenden Nachgeschmack; ein zweiter Aufguß derselben Wurzel ist dunkler und weniger angenehm; was zuletzt ausgelaugt wird, hat kaum noch einen süßen, sondern mehr scharfen Geschmack.

Robiquet (Trommsd. J. XIX. 1. S. 271.) hat in einer sehr sorgfältigen Untersuchung der Süßholzwurzel den eigenthümlichen süßen Bestandtheil derselben ausgeschieden, und es Glycion (besser Glycyrrhizin) genannt. Um dasselbe darzustellen, bereitet man einen recht concentrirten wäßrigen Aufguß, kocht denselben auf, wobei ein Theil thierisch-vegetabilischer Materie gerinnt, filtrirt ihn, und setzt nun Essigsäure zu, worauf erst wenige Flocken niederfallen, die sich aber allmälig vermehren, und sich endlich zu einem reichlichen gallertartigen, durchsichtigen Magma anhäufen, das, mit kaltem Wasser auf dem Filter ausgewaschen und von der anhängen Säure befreit, das reine Glycion darstellt. (Ist wohl wahrscheinlich essigsaures Glycion). Nach Döbereiner erhält man es in völlig reinem Zustande, wenn ein kalter Aufguß der Wurzel mit salzsaurem Zinnoxydul gefällt, und der abgesonderte und ausgewaschene Niederschlag mit rectificirtem Weingeist von 0,85 spec. Gew. (= 80 Proc.) einige Stunden lang erhitzt wird. Dieser nimmt den größten Theil des Glycyrrhizins auf, welches sodann durch Verdunsten des Weingeistes rein erhalten wird. Es ist nicht krystallisirbar, sondern stellt einen spröden, harzartig glänzenden und durchscheinenden Körper von gelber Farbe dar, besitzt den eigenthümlichen, lange anhaltenden süßen, etwas widerlichen Süßholzgeschmack, ist in Wasser und Alkohol auflöslich. In kaltem Wasser ist es jedoch schwer löslich, schwillt darin nach und nach zu einer gelben gallertartigen, gleichsam körnig-krystallinischen Masse (Glycyrrhicinhydrat) auf; in heißem Wasser ist es leicht löslich, und die nicht zu verdünnte Lösung gesteht beim Erkalten gallertartig. Die wäßrige Lösung ist, selbst mit Hefe versetzt, nicht gährungsfähig, und wird von Säuren, so wie von mehrern Metallsalzen flockig oder käseartig niedergeschlagen. Der Niederschlag, welcher durch die eigentlichen Metallsalze, z. B. durch salzsaures Zinn, hervorgebracht wird, wird durch Digestion mit Weingeist zum Theil wieder zersetzt.

Robiquet behandelte ferner die frische und ein wenig ausgetrocknete Wurzel mit Alkohol. Die stark gefärbte Tinctur wurde durch Wasser nicht getrübt, aber beim Verdunsten des Alkohols erschienen auf der Oberfläche der Flüssigkeit bräunliche Tropfen, ähnlich einem verdickteten Oele, und es sonderte sich auf diese Weise eine braune klebrige Masse ab, die, mit wenig kaltem Wasser ausgewaschen, im Anfange süßlich (von etwas beigemischtem Glycyrrhizin) schmeckte, bald aber eine sehr starke Schärfe entwickelte, die vorzüglich im Schlunde bemerklich war. Dieses Weichharz ist es, welchem der deutlich scharfe Nachgeschmack der Süßholzwurzel zuzuschreiben ist. Wenn Robiquet die vorher mit Wasser ausgezogene Wurzel mit Alkohol behandelte, so erhielt er eine harzige trockne Substanz (Hartharz) von geringerer Schärfe. Pfaff vermuthet mit Recht, daß Weichharz und Hartharz neben einander im Süßholz existiren.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0470-7

Aus dem von seinem Glycion durch Essigsäure befreiten Aufgusse fällte essigsaures Blei einen reichlichen Niederschlag. Die dadurch entfärbte, und dann durch Schwefelwasserstoffgas von dem überschüssig zugesetzten Blei befreite Flüssigkeit gab nach gehörigem Abrauchen und ruhigem Hinstellen eine krystallinische, dem Asparagin ähnliche Substanz, aus der durch Aetzkali Ammoniak entbunden, und die durch Salpetersäure nicht in Pflanzensäure umgeändert wird. Durch das Blei waren Aepfel- und Phosphorsäure, und eine braunfärbende animalische Substanz niedergeschlagen worden. Außerdem wurden noch Wachs, Stärkemehl und Eiweiß gefunden.

Robiquet giebt demnach folgende Bestandtheile in der Süßholzwurzel an: Wachs; kratzendes Weichharz; eine dem Asparagin ähnliche Materie; Glycyrrhizin; Stärkemehl; Holzfaser; braune färbende Materie von thierischer Natur; Eiweißstoff; Aepfelsäure; Phosphorsäure; schwefels. und phosphors. Kalk; phosphors. Bittererde.

Das Süßholz wird theils in Substanz, theils im Aufgusse oder in gelinder Abkochung, theils als Extract angewandt. Im Munde gehalten, stillt sie den Durst, und ist dadurch Wassersüchtigen angenehm. Der kratzende harzige Bestandtheil der Wurzel wird durch anhaltendes Kochen zum Theil aufgelöst, und die Abkochung erhält dadurch einen kratzenden Nachgeschmack; die Wurzel muß daher bei Holztränken, denen sie zur Verbesserung des Geschmacks häufig zugesetzt wird, nur gegen Ende des Kochens zugesetzt, oder mit der Abkochung infundirt werden.

Das Süßholz wird auch zu mehreren pharmaceutischen Präparaten gebraucht.

Glycyrrhiza. Der rohe Saft. Succus Liquiritiae crudus. Roher Lakrizensaft.

Wird durch Ausziehen der Wurzeln von Glycyrrhiza glabra Linn. im südlichen Europa bereitet.

Ein festes Extract, in cylindrische Stangen geformt, schwarz, auf dem Bruche glänzend, sehr häufig mit Lorbeerblättern umwickelt, von einem süßen schärflichen Geschmacke, im Wasser, mit Hinterlassung der fremdartigen Theile, auflöslich. Der angebrannte und mit Kupfer verunreinigte Saft werde verworfen, was durch den Augenschein oder durch eine polirte Eisenplatte, welche das Kupfer abscheidet, erkannt wird.

Der Lakrizensaft wird hauptsächlich in Spanien und in Italien, in Calabrien, Sicilien, bereitet. Die zerschnittenen Süßholzwurzeln läßt man einigemal aufkochen, drückt dieselben stark aus, und läßt die Flüssigkeit in einem kupfernen Kessel abdampfen. Wenn der Saft dick genug ist, wird er mit eisernen Spateln herausgenommen, und zu 5—6 Zoll langen und ungefähr

einen Zoll dicken Stangen geknetet. Diese werden mit Lorbeerblättern umwickelt als Lakrizensaft in den Handel gebracht. Er sieht schwarz aus, hat einen glänzenden Bruch, ist in der Kälte spröde, in der Wärme einigermaßen zähe, und hat einen sehr süßen Geschmack mit kaum merklicher Schärfe. Er darf nicht brenzlig riechen und schmecken.

Der Lakrizensaft enthält dieser Bereitung zufolge alle bei der Süßholzwurzel angeführten in Wasser auflöslichen Bestandtheile, außerdem Ueberbleibsel von Fasern und Kupferstückchen, die mit den Spateln von dem Kessel abgekratzt worden. Bisweilen werden aber auch aus Betrug mehlige Substanzen, Kirschgummi, Stärkemehl ꝛc. untergemischt. Diese Verfälschung soll häufig noch bei seiner Ankunft zu Bayonne vorgenommen werden, und deßwegen der spanische Lakrizensaft dem calabresischen an Güte nachstehen. Wenn er unvermischt ist, so ist er bis auf ungefähr $\frac{1}{5}$ im Wasser auflöslich. Die Auflösung ist dunkelbraun und schimmelt sehr leicht. Alkohol nimmt etwa $\frac{1}{2}$ des Ganzen auf; diese Auflösung ist kratzend. Was der Alkohol nach wiederholter Digestion unaufgelöst zurückläßt, giebt mit dem Wasser eine vollkommen süße Auflösung.

Gramen. Die Wurzel. Queckenwurzel. Päden.

Triticum repens Linn. Ein perennirendes auf den Aeckern Deutschlands häufiges Gras.

Eine sehr lange, runde, dünne, knotige Wurzel (Sprosse), an den Knoten mit Wurzelzasern besetzt, hohl, weißlich, von süßem Geschmacke. Im Spätherbste oder im Frühlinge einzusammeln.

Triticum repens Linn. Das Queckengras.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. II. Ord. 4. Gramineae.

Das Queckengras wächst allenthalben durch ganz Europa, und findet sich häufig als ein sehr lästiges Unkraut auf Aeckern, in Gärten ꝛc.

An den Knollen der langen, horizontal unter der Erde weit fortkriechenden, gestreiften, gegliederten, fadenförmigen, weißgelblichen, zuweilen federkieldicken, glatten Wurzelsprossen und Halmschößlinge bilden sich viele dünne Wurzelzasern. Der Halm ist aufrecht, rund, glatt, knotig, 2, 3—4 Fuß hoch. Die flachen, länglichen, 2—3 Linien breiten Blätter sind hier und da etwas haarig und rauh, die Blattscheiden gestreift und glatt. Die Blüthen stehen in einer zweizeiligen, aufrechten, etwas dünnen, schlanken Aehre an der Spitze des Halmes. Die einzelnen mehrblumigen, zusammengedrückten Aehrchen sitzen abwechselnd an der gewundenen Spindel. Die Kelchspelze, so wie die äußern Kronspelze sind mit Grannen von verschiedener Länge versehen.

Die Blüthezeit ist Juni bis August.

Die Wurzel, Queckenwurzel, weiße Graswurzel, wird von den Fasern

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0472-9

und häutigen Fortsätzen gereinigt und getrocknet. Sie ist geruchlos und von süßlichem Geschmacke. Frisch zerstampft geben sie vom Pfunde 5 Unzen Saft. Beim Trocknen verlieren sie $\frac{4}{5}$ an Feuchtigkeit. Aus 40 Pfunden getrockneter Wurzeln erhält man durchs Kochen 7 Pfunde Mellago.

Pfaff (Syst. der Mat. med. VI. S. 110.) hat eine eigenthümliche Art Zucker aus dem Extracte der Queckenwurzeln dargestellt, und ihn Graswurzelzucker genannt. Man erhält ihn am besten, wenn man das Extract mit Weingeist heiß auszieht, und es dann erkalten läßt. Es bleibt viel Schleim ungelöst, der Graswurzelzucker krystallisirt beim Erkalten heraus, und der Schleimzucker bleibt aufgelöst. Ersterer erscheint in zarten, büschelförmig und zu ganzen Kugeln zusammengehäuften Nadeln und Prismen von vollkommen weißer Farbe, die weich und biegsam sind, und einen rein süßen Geschmack besitzen. Er ist in Alkohol viel auflöslicher, als der gemeine Zucker und der Mannazucker. Vorzüglich unterscheidet ihn von allen übrigen Arten Zucker die merkwürdige Eigenschaft, daß er beim Erkalten den Weingeist eben so figirt, wie die Gallerte das Wasser, und daß eine kleine Menge desselben, nämlich 1 Th., 120 Th. starken Weingeist beim Erkalten in einen starren, der Morsellenconsistenz ähnlichen Zustand verwandeln kann. Die Auflösung dieses Zuckers wird von den Reagentien eben so wenig, wie die des gemeinen Zuckers, afficirt, doch bringen salpetersaure Quecksilberauflösung, salpeters. und essigs. Bleiauflösung eine leichte Trübung darin hervor. Außerdem enthält die Graswurzel vielen Schleim, Schleimzucker, Satzmehl, etwas glutinösen Stoff und einige salzige Bestandtheile.

Die Graswurzel wird zu Brusttränken, blutreinigenden Tränken als eröffnendes und kühlendes Mittel in der Abkochung verordnet; häufig im Mellago von $\frac{1}{2}$—1 Unze, oder auch als Zusatz zu Kräutersäften. Auch für das Vieh sind diese Wurzeln, zu Häcksel zerschnitten und gebrüht, sehr nahrhaft; sie werden daher in Neapel als Pferdefutter zu Markte gebracht.

Zur Bindung des Flugsandes und zur Befestigung der Wälle ist die Quecke sehr nützlich. Die klein zerschnittenen Wurzeln dürfen dazu nur mit Heusaamen vermischt im Herbste ausgesäet werden.

* Grana Tiglii s. Grana Tillii. Die Saamen. Purgirkörner.

Croton Tiglium Linn. Der Purgir-Kroton. Purgirholzbaum. Der indische Wunderbaum.

Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.

Juss. Cl. XV. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Das Vaterland dieser Pflanze ist Ostindien, wo er sowohl in Malabar als auf den molukkischen Inseln, sowie in Ceylon und Java, an felsigen und steinigen Orten gefunden wird, auch soll er in einigen Gegenden angebaut werden.

Der Stengel ist strauchartig, vom Grunde an ästig. Sein Holz ist blaß, leicht, mit einer dünnen grauen Rinde bekleidet, und von widrig scharfem

Geschmacke. Die Blätter stehen abwechselnd an den jüngern Zweigen, sind gestielt, eiförmig oder kaum herzförmig, lang zugespitzt, sägeartig-gezähnt, bis 5 Zoll lang und 2½ Zoll breit, und am Grunde mit 2 Drüsen besetzt. Die kleinen unansehnlichen weißlichen oder gelblichen Blüthen bilden eine aufrechte, 2—3 Zoll lange Traube an der Spitze, und zwar nehmen die weiblichen Blüthen den größten untern, die männlichen den kleinern obern Theil der Traube ein. Die Saamenkapseln sind dreifächrig, lederartig, eirund mit sehr dünnen hautartigen Scheidewänden; sie enthalten in jedem Fache einen länglich-eiförmigen, stumpf vierkantigen, auf der einen Seite flachen, auf der andern convexen, nicht ganz haselnußgroßen, glatten, schwärzlichen oder bräunlichgelben, mit einer dünnen, zerbrechlichen Schale, und unter dieser mit einer weißlichen Epidermis bekleideten Saamen, welcher, wenn er gekaut wird, anfangs einen milden öligen, oder falls er schon lange gelegen hat, einen etwas ranzigen, bald aber einen sehr scharfen Geschmack erregt, der nach und nach in ein heftiges, lange anhaltendes, den ganzen Mund und die Rachenhöhle einnehmendes Brennen und Zusammenziehen übergeht.

Alle Theile dieser Pflanze sind sehr scharf, und besitzen purgirende Eigenschaften. Der Stamm und die Zweige schwitzen, wenn man sie abschneidet, einen scharfen milchigen Saft aus, welcher sich an der Luft verdickt und färbt; eine Eigenschaft, die fast allen Euphorbiaceen eigenthümlich ist. Das Holz (**Lignum moluccense**) kommt auch unter dem Namen Panara, Pawana, Panawa vor; der Geschmack desselben ist reizend, der Geruch unangenehm. In kleiner Gabe eingenommen, ist es schweißtreibend, in größerer Brechen und Abführen erregend. Auch die Blätter sind nach Murray in solchem Grade reizend, daß sie eine entzündungsartige Geschwulst vom Munde bis zum Ausgange des Mastdarmes hervorbringen. Vor allen heftig wirken aber die Saamen. Zerquetscht man 12—15 Stück derselben, mischt sie mit Honig, und giebt sie einem Pferde von gewöhnlicher Größe ein, so erregen sie einen heftigen Durchfall, an dem diese Thiere zuweilen erliegen. Die Indier haben die Gewohnheit, die Purgirkörner, um ihre Schärfe zu mildern, zu rösten; sie entschalen die Körner, zerquetschen sie, und erhalten durchs Auspressen das jetzt auch in Europa wieder in Gebrauch gezogene Krotonöl.

Die Holländer haben vor fast 200 Jahren zuerst den Gebrauch der Kerne in Europa verbreitet, als in der Wassersucht und bei Verderbniß der Säfte heilsam. Die Nachtheile aber, welche mit ihrer unvorsichtigen oder unzeitigen Anwendung verbunden sind, machten, daß man sie allgemein wieder verließ.

Nach einer Zerlegung des Dr. Nimmo (Gräfe und Walther J. f. d. Ch. IV. 1. S. 186. und Buchn. Repert. XV. 2. S. 234.) bestehen die Purgirkörner aus 36 Th. Häute und 64 Th. innern Kerns. Die Häute, welche man als vorzugsweise mit den scharfen Eigenschaften begabt ansah, gaben, als man sie eine hinlängliche Zeit mit starkem Weingeiste in die Wärme stellte, eine braune Tinctur, die weder Schärfe noch eine andere be-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0474-0

merkenswerthe Eigenschaft auf den thierischen Körper äußerte. 100 Th. des Kernes der Purgirkörner enthielten: bittern oder harzigen abführenden Stoff, mit einer Säure verbunden, 27,5; sehr reines Oel, dem Olivenöle ähnlich, ohne alle abführende Eigenschaften, 32,5; mehlartigen Stoff 40.

Brandes (Archiv IV. S. 173.; Buchn. Repert. XIV. S. 302.) fand in 2000 Theilen derselben: Krotonöl mit Krotonsäure und einem Alkaloid 340; krotonsaures Salz (des Alkaloids) und Farbestoff 6,50; Stearin 7; Wachs 6; Halbharz 20; inulinartige Substanz 5,25; Gummi 23,50; Kleber (Gummi) 40; Gummoin 180; färbende extractive Materie mit etwas Schleimzucker, saurem, äpfels. Kali und Kalk 41; Eiweiß 6,25; verhärtetes Eiweiß 14; Stärkemehl mit phosphors. Bittererde 7; verhärtetes Stärkemehl mit phors. Kalke und Bittererde 102; Saamenhülle und Saamenfaser, dem Amygdalin ähnlich, 780; Wasser 450. S. = 2028,50.

Die Krotonsäure ist sehr flüchtig, steht der Jatrophasäure in den Purgirkörnern von Jatropha Curcas nahe, ist vielleicht mit ihr identisch, und zeigt so heftige Wirkungen, daß Brandes und seine Mitarbeiter bei der Analyse mehrmals heftigen Gesichtsentzündungen, Brennen in den Augen, im Halse, in der Brust und den Eingeweiden u. s. w. ausgesetzt waren, die sie nöthigten, die Arbeit unvollendet zu lassen und die Erforschung der chemischen Verhältnisse der Säure auf eine andere Zeit zu verschieben. Sollte es möglich seyn, die Säure im concentrirten Zustande darzustellen, so würde sie sich gewiß als eins der furchtbarsten Gifte zeigen. Auch scheinen die heftigen Wirkungen des Krotonöles von der Krotonsäure herzurühren.

Mehrere Versuche dieser Analyse machen das Daseyn eines Alkaloids in den Krotonsaamen nicht unwahrscheinlich, indeß läßt sich darüber noch nichts Bestimmtes aussprechen, da die oben angezeigten heftigen Zufälle die weitere Ausführung der Analyse auch in dieser Hinsicht verhinderten.

Die Krotonsaamen werden an sich nicht, wohl aber das aus ihnen ausgepreßte Oel angewendet; in Ostindien aber werden sie, besonders von der ärmeren Classe der Einwohner, als Purgirmittel häufig benutzt, und gewöhnlich ist ein gepulverter Saamen eine vollkommen hinreichende Dosis.

Granatum. Die Rinde des Apfels. Malicorium. Granatäpfelschale.

Punica Granatum Linn. Ein im Morgenlande, auch im südlichen Europa einheimischer, vorzüglich in Spanien häufiger Baum.

Die braungelbe, lederartige Rinde der Frucht, oben mit den Kelchresten gekrönt und offenstehend, geruchlos, von bitterlichem sehr zusammenziehendem Geschmacke.

Punica Granatum Linn. Gemeine Granate.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0475-6

Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 7. Myrti.

Der gemeine Granatbaum, welcher wild auch strauchartig, cultivirt aber mehr baumartig wächst, und eine Höhe von 16—18 Fuß erreicht, ist in den wärmeren Gegenden in Asien, Afrika und auf den Antillen zu Hause. Er soll von den Römern während der punischen Kriege (woher der Name **Punica**) nach Italien gebracht worden seyn, und wächst jetzt auch in andern Ländern des südlichen Europas, in Portugal, Spanien, Frankreich und der Schweiz an Feldern und Mauern, besonders aber auf Kreideboden. In Deutschland wird er in Kübeln gezogen, und in Gewächshäusern überwintert, wo er dann gehörig cultivirt und beschnitten in voller Blüthe einen überaus schönen und angenehmen Anblick gewährt.

Die Wurzel ist holzig, der Stamm baumartig und rauh, die Aeste sind winklig, mehr glatt und mit einer röthlichen Rinde bedeckt. Die Blätter sind gegenüberstehend und abwechselnd, länglich-lancettförmig, sehr glatt, hellglänzend grün. Die fast aufsitzenden, brennend hochrothen Blüthen stehen gewöhnlich einzeln zwischen den Blättern und zuweilen an den Enden der Zweige zu 2, 3 oder 4 zusammen. Der Kelch ist bleibend, einblättrig, die Blumenkrone fünf- oder sechsblättrig, die Blätter rundlich, aufrecht abstehend, wellenförmig, in kleine unordentliche Falten gelegt und im Kelche befestigt; mehr als 20 Staubfäden, die längliche Staubbeutel tragen, einen unten festsitzenden Fruchtknoten mit einfachem Griffel, welcher so lang ist, als die Staubfäden, und eine kopfförmige Narbe hat. Die braunröthlichen, runden, mit einer lederartigen Haut überzogenen Früchte sind von verschiedener Größe, oft bis zu der einer Pomeranze, welche in 8—10 Fächern eine große Anzahl eckiger, länglicher, lebhaft rother Saamen enthält. Das saftige rothe Fleisch der reifen Früchte hat einen leicht weinigen Geruch und angenehm säuerlichen Geschmack.

Dieser schöne Baum blüht im Juli und August, trägt aber bei uns keine Früchte.

Die frischen Schalen sind gelblichröthlich, inwendig gelb, die trocknen braunröthlich, innen gelb, hart, öfters zerbrochen, gebogen, runzlig, etwas durchscheinend, liniendick. Die Abkochung giebt mit Eisenvitriol eine schwarze Farbe. Reuß (Grindel Jahrb. d. Ph. 1810. S. 142.) giebt folgende Bestandtheile an: Tannin 60; Schleim 74; Harz 2; oxydirtes Tannin und Verlust 11; Extract 47; Gallusäure eine Spur.

Die Granatäpfelschale wird gewöhnlich nur äußerlich als adstringirendes Mittel in der Abkochung verordnet; in den Ländern, wo der Baum einheimisch und häufig ist, wird sie auch zum Gerben angewandt.

* Die Granatwurzelrinde (**Cort. radicis Granatorum**) ist von **Dr. Gomez**, Leibarzt des Königs von Portugal, als ein vortreffliches Mittel gegen den Bandwurm empfohlen worden. Sie muß von dem wilden Baume genommen werden, sorgfältig von dem holzigen Theile gereinigt und wohl getrocknet seyn. Ihre Farbe ist außen aschgrau, innen gelb; benetzt man

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0476-2

sie mit Wasser, und bestreicht Papier damit, so läßt sie darauf gelbe Flecke, die, wenn man schwefelsaures Eisen darauf bringt, dunkelblau werden. Von einer Säure werden diese Flecke leicht rosenroth, welche Farbe in einem Augenblicke wieder verschwindet; Kalilösung macht sie gelbbraun. Kaut man diese Rinde, so färbt sie den Speichel gelb, und läßt im Munde einen zusammenziehenden Geschmack zurück, der nichts Unangenehmes hat.

Die Rinde soll bisweilen mit der Wurzelrinde des Buchsbaums verfälscht werden, mit der sie zwar einige Aehnlichkeit hat, sich aber durch ihren bittern Geschmack, den die erstere Wurzelrinde nicht hat, unterscheidet. Costel hat folgende Unterscheidungszeichen angegeben: das Decoct der Wurzelrinde des Granatbaumes ist, wenn es nur etwas concentrirt ist, dunkelbraun, von etwas styptischem Geschmacke, es röthet das Lackmuspapier; Gallertauflösung bringt darin einen gelben Niederschlag hervor, und eine Auflösung von schwefelsaurem Eisen einen schwarzen; Alaunauflösung erzeugt auch in der Abkochung ein Präcipitat. Das Buchsbaumrindendecoct, wenn es in demselben Verhältniß gemacht ist, ist gelb, sehr bitter, wirkt nicht auf das Lackmuspapier, und keine von den genannten Solutionen bringt darin einen Niederschlag hervor.

Die Wurzelrinde des Granatbaumes enthält nach Mitouart's Untersuchung (Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 221.) viel Gerbestoff, eine wachsartige Materie, eine zuckerige, zum Theil in Weingeist, zum Theil in Wasser auflösliche Materie, wovon die erstere krystallisirbar ist, und die andere sich wie Mannastoff verhält, und eine merkliche Menge Gallussäure.

Die Rinde wird im Decocte, und zwar 2 Unzen auf 16 Unzen, in 3 Portionen gegeben, und zwar von halbe Stunde zu halbe Stunde. Den Tag vorher wird ein Abführungsmittel aus **Oleum Ricini** genommen. Eine Viertel- bis ganze Stunde, nachdem die letzte Gabe des Decocts genommen, erfolgt die Wirkung, nämlich 3—4 Stuhlgänge, mit denen der Wurm abgeht. Die Gallussäure möchte wohl hier als das Wirkende anzusehen seyn. Der Erfolg hat aber nicht den Erwartungen entsprochen, und die Rinde ist daher wieder außer Gebrauch gekommen.

Granatum. Die Blumen. Balaustia. Granatblumen.

Fünfspaltige, lederartige, rothe Kelche, scharlachfarbene Blumenblätter enthaltend, mit adstringirendem Principe begabt.

Die officinellen Granatblumen (**Flores Granatorum, Fl. Balaustiorum**), sind die großen, gefüllten oder einfachen, im frischen Zustande glänzend hochrothen, getrocknet dunkelrothen Blumen, meist noch in dem dicken Kelche enthalten. Sie sind geruchlos, von zusammenziehendem, herbem Geschmacke, und färben den Speichel, wenn sie einige Zeit gekaut werden, violett. Ihr wäßriger Aufguß schlägt das Eisen stark mit einer schwarzen Farbe nieder.

In Frankreich werden sie häufiger als bei uns als tonisches Mittel in der Abkochung gebraucht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0477-8

Gratiola. Das Kraut. Gottesgnadenkraut.

Gratiola officinalis Linn. Eine ausdauernde auf Wiesen und an Ufern vorkommende Pflanze.

Das blühende bittere, scharfe Kraut, mit vierseitigem Stengel, entgegengesetzten, sitzenden, lancettförmigen, sägeförmigen, unbehaarten Blättern, und rachenförmigen, weißlichen Blumenkronen. Im Monat Juni und Juli einzusammeln. Bewahre es mit Vorsicht auf. Die Gabe bis zum Scrupel.

Gratiola officinalis Linn. Echtes Gnadenkraut. Echtes Purgirkraut.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 7. Scrophulariae.

Diese Pflanze wächst in mehreren Gegenden Europas, in Deutschland, Spanien, Frankreich ꝛc. auf sumpfigen und feuchten Wiesen, an den Ufern der Flüsse und Teiche, läßt sich auch in feuchten Gärten ziehen.

Die Wurzel ist weiß, kriechend, gegliedert, und mit vielen Zasern versehen, welche senkrecht in den Boden eindringen. Der Stengel ist aufrecht, viereckig, gegliedert, gewöhnlich wenig ästig, ungefähr einen Fuß und drüber hoch, mit kreuzförmig gegenüberstehenden stiellosen, den Stengel halb umfassenden, oval-lancettförmigen, glatten, hellgrünen, auf der Unterfläche mit drei länglichen, merklich erhabenen Rippen durchzogenen Blättern bekleidet. Die Blumen stehen einzeln in den Blattwinkeln, von weißgelblicher Farbe mit weißröthlichem Rande. Der Kelch ist einblättrig, fünftheilig, die Blumenkrone gleichfalls einblättrig und hat eine eckige, etwas gekrümmte Röhre. Die Zeit der Blüthe ist Juni und Juli.

Diese Pflanze wird bisweilen verwechselt mit dem gemeinen Helm- oder Fieberkraute (**Scutellaria galericulata**), so wie auch mit dem schildförmigen Ehrenpreis (**Veronica scutellata Linn.**) und dem Ackerveilchen (**Viola arvensis Linn.**). Ersteres hat einen höhern, ästigern, viereckigern Stengel, der eben so wie die Rückschärfe der kurzgestielten, herz-lancettförmigen, gekerbten, runzligen, glatten, paarweise stehenden Blätter mit rückwärts gekrümmten Borsten bekleidet ist. Der schildförmige Ehrenpreis unterscheidet sich durch seinen runden Stengel, seine zwar etwas lancettförmigen, aber nur wenig zugespitzten, am Grunde ungezahnten, am Ende feingezackten Blätter, so wie durch seine sehr lockeren, ästigen, weißen rothgestreiften Blumentrauben, die wechselsweise an den Seiten der Stengel stehen. Die dritte Verwechslung kann wohl nur sehr selten vorkommen, da die Verschiedenheit zu groß ist. Die Stengel der **Viola arvensis** sind dreikantig und weitschweifig, die Blätter länglich, rund, gezahnt, die untern ziemlich herzförmig, oft so breit als lang und fast rund.

Die **Gratiola** hat keinen merklichen Geruch, aber einen ekelhaften und heftig bittern, scharfen, lange anhaltenden Geschmack. Ihre Brechen und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0478-3

Purgiren erregende Eigenschaft war schon den Alten bekannt. Durchs Trocknen verliert sie einen Theil ihrer Kraft, und durch langes Liegen wird sie unwirksam. Die Bitterkeit der Gratiola grenzt am nächsten an die der Koloquinte. Der heiße Aufguß hat einen scharfen körbelartigen Geruch und giebt mit dem salzsauren Eisenoxyd eine lebhaft grüne Farbe.

Vauquelin (Trommsd. J. XIX. 1. S. 292.) hat die Pflanze zerlegt. Der ausgepreßte und filtrirte Saft ist wenig gefärbt, sein Geschmack scharf und bitter. Bei der Destillation gieng kein flüchtiger Bestandtheil über. Der zur Extractdicke concentrirte Saft ließ, mit Alkohol behandelt, als unlöslichen Theil Gummi und äpfelsauren Kalk im Rückstande, wogegen der Alkohol einen sehr bittern harzigen Stoff auflöste, der vermittelst der beigemischten Salze, namentlich des essigs. Kalis und salzs. Natrons, in vielem kochendem Wasser sich gleichfalls auflöste. Dieser Stoff, eigentlich eine innige Verbindung von Harz und Extractivstoff, ist als das eigentlich wirksame Princip anzusehen, und seine Auflöslichkeit in Wasser bedingt die große Wirksamkeit des Decocts der Gratiola. Außer diesen Bestandtheilen fand Vauquelin einen kleinen Antheil thierisch-vegetabilischer Materie, ein grünes Harz, und in den durch Wasser und Alkohol erschöpften Theilen des Krauts kleesaur. Kalk, phosphors. Kalk, phosphors. Eisen und Kieselerde.

Die Wirkungen der Gratiola fallen nach der Gabe, und auch nach der Form des Gebrauchs verschieden aus, und können bis zur höchsten Stufe eines drastischen Purgirmittels steigen. Das Infusum ist wenig, das Decoct sehr wirksam, so auch das durch Auskochen bereitete Extract. Das Pulver wird zu 10—20 Gran gegeben.

Guajacum. Das Holz. Lignum sanctum. Guajakholz. Franzosenholz.

Guajacum officinale Linn. Ein Baum Westindiens.

Ein schweres, festes, grünlich-graues Holz, von scharfem Geschmacke, und balsamischem nicht unangenehmen Geruche. Die Raspelspähne, welche gewöhnlich zum Verkauf kommen, müssen nicht zu sehr mit weißlichen Stücken, von dem Baste herrührend, gemischt seyn.

Guajacum officinale Linn. Officineller Guajak. Pockenholz.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 21. Rutaceae.

Der Guajakbaum ist auf Jamaika, Domingo, St. Thomas und wahrscheinlich auch auf andern westindischen Inseln einheimisch.

Der Stamm wird bedeutend hoch; die Zweige sind ausgebreitet, gleichsam gegliedert und mit einer grauen runzligen Rinde bekleidet. Das Holz ist sehr fest und schwer, von gelblicher oder gelblichgrauer Farbe. Die Blätter sind gegenständig, gefiedert, die Fiederblättchen ebenfalls gegenständig,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0479-2

oval, glatt, blaßgrün, 1—1½ Zoll lang, und 6—8 Linien breit. Die Blüthen stehen zu 6—10 auf 1—1½ Zoll langen Blüthenstielen an der Spitze der Zweige beisammen. Der Kelch ist aus fünf ovalen Blättchen gebildet. Die Blumenkrone besteht aus fünf keilförmigen stumpfen Blumenblättchen von blauer Farbe; sie ist doppelt so lang, als der Kelch. Die Frucht ist eine fleischige Kapsel.

Dieser Baum ist in medicinischer Hinsicht vielfach wichtig, indem sowohl die Rinde, als das Holz, als auch das aus dem Stamme austretende Harz als sehr wirksame Arzneistoffe anerkannt sind.

Die Rinde (Cort. Guajaci) ist schwer, hart, platt, bis einige Linien dick, auswendig rauh und rissig, schwarzgrün mit bläulichgrauen und gelben Flecken gezeichnet, inwendig gelblichgrau und auf dem Bruche hellbraun. Sie läßt sich leicht in verschiedene Lamellen zertheilen. Ihr Geschmack ist beißend, kratzend und bitterlich. Wenn diese Rinde lange Zeit aufbewahrt worden ist, so zeigen sich bisweilen auf ihrer innern Fläche eine große Menge glänzender Krystallchen, welche Guibourt für Benzoësäure zu halten geneigt ist. Sie enthält mehr gummige als harzige Theile. Neumann erhielt $\frac{4}{32}$ Harz und $\frac{5}{32}$ wäßriges Extract.

Das Holz kommt in bedeutend großen Stücken zu uns, die öfters noch mit der Rinde bedeckt und der Quere nach durchsägt sind. Es ist sehr schwer, dicht, harzig, an einzelnen Stellen gelblich, an andern bräunlichgrün; gerieben verbreitet es einen schwachen aber angenehmen Geruch; der Geschmack ist etwas scharf aromatisch. Diese Stücke haben in der Mitte einen schwärzlichgrünen geflammten Kern von mehr oder weniger Umfang; von da aus werden sie nach dem Aeußern hin immer hellfarbiger und gelblicher. Der innere schwärzlich grüne Theil ist der härteste und schwerste, von einem spec. Gew. von 1,333, dabei der harzigste, brennt mit heller Flamme unter Ausschwitzung von Harz; der gelblichere Theil hat mehr von dem beißend kratzendem Guajakharze. Oft erhält man es auch in Stücken, die aus den größern Stämmen oder Aesten der Länge nach geschnitten sind; diese sind, je nachdem sie mehr vom Kerne oder von der Umgebung desselben herrühren, entweder olivengrün mit dunkler gefärbten Flammen und länglichen schwarzen Punkten, oder mehr gelblich, ungeflammt, und nur mit einzelnen dunkelgrünen Flecken bezeichnet.

In den Apotheken gebraucht man die Raspelspähne (Rasura, Scobs ligni Guajaci) welche in Seestädten von den beim Schiffsbau vorkommenden Arbeiten abfallen, oder auch in den Zucht- und Werkhäusern Englands und Hollands verfertigt werden. Dieses geraspelte Guajakholz ist von gelber Farbe, grünlich oder blaugrünlich gefleckt, und in diesem geraspelten Zustande tritt die bei Guajakharz zu erwähnende grüne Färbung durch den Sauerstoff der Luft noch mehr hervor. Die geschmacklosen, weißlichen Stücke, welche durch die Dämpfe der salpetrigen Säure keine Spur von blaugrüner Farbe annehmen, sind verwerflich.

Die Abkochung der Raspelspähne ist gelblich, verändert ihre Farbe an

der Luft nicht, wird eben so wenig durch die Salpetersäure in der Farbe verändert, aber nach einiger Zeit getrübt, schlägt die Auflösung des Brechweinsteins und den Galläpfelaufguß nicht nieder, und wird durch Zumischung von schwefelsaurem Eisen nur etwas ins Dunklere verändert. Die Raspelspähne, wie sie im Handel vorkommen, gaben weniger Harz und mehr wäßriges Extract. Neumann aber erhielt $\frac{7}{32}$ harziges und $\frac{3}{32}$ wäßriges Extract.

Das Guajakholz wird als schweißtreibendes Mittel vorzüglich in der Abkochung gebraucht, und macht einen vorzüglichen Bestandtheil der Holzspecies.

Das eigentliche heilige Holz, Lignum sanctum, mit welchem das Guajakholz oft verwechselt wird, kommt von Guajacum sanctum Linn., einem gleichfalls auf den westindischen Inseln wachsenden Baume. Dieses Holz ist blaßgelb, leichter und nicht so wirksam, als das ächte Guajakholz.

Guajacum. Resina nativa. Guajakharz.

Ein an der Luft erhärteter Saft von Guajacum officinale Linn., entweder von selbst, oder aus dem verwundeten Baume ausschwitzend.

Ein Harz in unförmlichen Stücken, bräunlichgrünlich, glänzend, fast durchscheinend, zerreiblich, zerrieben von weißlicher Farbe, von einem süßlich-bittern, scharfen Geschmacke, auf Kohlen geworfen einen nicht unangenehmen Geruch verbreitend. Das ächte mit Mimosenschleim und Wasser gerieben und der Luft ausgesetzt, wird bläulich gefärbt.

Das natürliche Guajakharz, welches schon seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts in Europa als Heilmittel angewendet wird, ist das vorzüglich aus den alten Guajakbäumen von selbst aus der aufspringenden Rinde oder aus künstlich gemachten Einschnitten ausschwitzende, erhärtete Harz. Es kommt in unförmlichen, großen, harten Stücken zu uns, an welchen oft noch Stücke der Rinde hängen. Auf der äußern, der Einwirkung der Luft ausgesetzt gewesenen Oberfläche zeigt es gewöhnlich eine dunkel pistaciengrüne Farbe, und an der abgeriebenen Stelle ist es selbst mit einem dergleichen grünlichen Pulver bedeckt. Diese grünliche Farbe zieht sich auch wohl durch Klüfte und Risse in das Innere hinein. Die eigentliche Farbe dieses Harzes ist aber die röthlichbraune oder auch gelbbraun-grünliche. Dabei ist es durchscheinend, ins Durchsichtige übergehend, auf dem Bruche glänzend, theils muschlig, theils splittrig, und die Splitter sind theils gelblichgrün, theils röthlichbraun und durchsichtig; es ist spröde, leicht zerreiblich, von einem süßlichbittern, dabei aber besonders im Schlunde merklich scharfen und kratzenden Geschmacke, und einem eigenthümlichen balsamischen Geruche, der aber nur in der Wärme, und besonders wenn es auf glühende Kohlen geworfen wird, in dem dadurch entstehenden, die Lungen stark reizenden Rauche

sehr merklich ist. Es erweicht nicht in der Hand, wird aber beim Kauen zähe. Das spec. Gew. ist nach Pfaff (Syst. d. Mat. med. III. S. 118.) 1,205, nach Brande 1,228. (Berl. Jahrb. auf d. J. 1808. S. 94.; Trommsd. J. XVIII. S. 210.)

Das Pulver ist graulichweiß, und wird durch die Einwirkung der Luft grünlich.

Der eigenthümlichste Charakter des Guajakharzes ist die Farbenveränderung, die es durch Einwirkung des Lichts und der Luft erleidet. Hierher gehört das Grünwerden des mit Guajaktinctur befeuchteten Papiers, des Guajakpulvers, das allmälige Grünwerden der Mixturen, in welchem Guajakharz vermittelst arabischen Gummis vertheilt ist. Daß aber hierbei nicht sowohl das Licht, als vielmehr der Sauerstoff der Luft wirksam sey, erhellet aus den Versuchen von Brande u. Wollaston (Gilbert's Annal. XXXIX. S. 294.; Buchn. Repert. III. S. 281.). Nach Brande färbte sich das Guajakpulver im Sauerstoffgase auch im Dunkeln grün, nach Wollaston hingegen nur bei Zutritt des farblosen oder des violetten Lichtes; der rothe Strahl reducirte das Grün wieder zu Gelb, welches auch in kohlensaurem Gase erfolgte, auch wird nach Wollaston das grün gewordene Papier durch Erhitzen mit einem heißen silbernen Löffel wieder gelb. Schneller wird diese Farbenänderung des Guajaks durch salpetrige Säure, so wie durch versüßten, nicht ganz säurefreien Salpetergeist hervorgebracht. Setzt man einen solchen zur Guajaktinctur hinzu, so entsteht eine schöne azurblaue Farbe, und beim Zusatze von Wasser schlägt sich das Guajakharz als ein reichliches lockeres, hell azurblaues Pulver nieder, das aber seine Farbe ins Grünliche und Weißgrünliche verändert.

Auf ähnliche Art wirkt die Salpetersäure selbst. Schlägt man eine verdünnte Auflösung des Guajaks in Aetzkali durch Salpetersäure nieder, so entsteht ein grünlichblauer Niederschlag, der seine blaue Farbe standhaft behält, so lange ein Ueberschuß von Säure vorhanden ist, bei Sättigung der Säure durch Laugensalz aber ins Grüne übergeht. Eine wenig gesättigte blaß röthlichgelbe Guajaktinctur geht bei fortgesetztem Zusatze von Salpetersäure durch Blau, Grün und Gelb endlich in Rothbraun über. Es scheinen demnach gleichsam verschiedene Oxyde des Guajaks stattzufinden, ein grünes, blaues und ein rothbraunes; letzteres scheidet sich allmälig aus der sauren Tinctur ab. Doch kann auch die ursprüngliche rothgelbe Farbe der Tinctur wieder hervortreten, wenn durch einen Ueberschuß von Guajak gleichsam die Wirkung der Oxydation wieder aufgehoben wird. Die concentrirte Salpetersäure wirkt auf das trockne Guajakharz sehr heftig, das Harz nimmt eine dunkelgrüne Farbe an, es entwickelt sich viel Salpetergas, und bald ist das Guajak zu einer rothbraunen Flüssigkeit aufgelöst. Aus der Auflösung krystallisirt sich beim Abziehen der Salpetersäure sehr viel Sauerkleesäure, wodurch sich das Guajak von den übrigen Harzen wesentlich unterscheidet. Hat man wenig Salpetersäure angewandt, so bleibt eine braune Substanz zurück, die alle Eigenschaften eines wahren Harzes hat; hat man dagegen

Salpetersäure wiederholt über das Guajak abgezogen, so hat der Rückstand die Eigenschaften eines Harzes gänzlich verloren, und verhält sich als künstliche Gerbesubstanz.

Mischt man nach Pagenstecher (Trommsd. N. J. III. 1. S. 447.) die Guajaktinctur mit essig-, salpeter- oder schwefelsaurem Kupferoxyd, und zugleich mit Blausäure, so fällt blausaures Kupferoxydul nieder, und die Flüssigkeit geht durch Grün und Blau in Braun über, worauf sich die grüne Farbe durch dieselben Mittel nicht wieder hervorrufen läßt. Mischt man die Flüssigkeit, während sie gerade schön blau ist, mit Wasser, so erhält man einen blauen kupferfreien Niederschlag, welcher sich nicht in Aether und Säuren, aber in Weingeist mit blauer, in Ammoniak mit grüner Farbe löst, welche beide Farben jedoch bald in Gelb übergehen.

In Chlorgas und in wäßrigem Chlor färbt sich das Guajakpulver schnell grün, dann blau, dann braun; zugefügtes Ammoniak verwandelt das Braune wieder in Grün und färbt sich eben so; auch in der Guajaktinctur erzeugt Chlor einen blauen Niederschlag.

Nach Taddei (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 159. und Berl. Jahrb. 1821. S. 120.) bläuet sich das Guajakpulver lebhaft, beim Zusammenreiben mit Kleber, wofern dieser nicht verdorben ist, und mit Mehlen, welche Kleber enthalten, nicht mit Stärkemehle. Nach Planche (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 161.) wird die Guajaktinctur auch ohne Einwirkung von Licht gebläuet beim Auftröpfeln auf Scheiben folgender frischen Wurzeln: Cochlearia Armoracia und officinalis, Symphytum officinale, Leontodon Taraxacum, Cichorium Intybus, Eryngium campestre, Iris germanica, Nymphaea alba, Solanum tuberosum, Inula Helenium, Althaea officinalis, Daucus Carota, Glycyrrhiza glabra, Brassica Napus, Arctium Lappa, Colchicum autumnale, Saponaria officinalis, Fumaria officinalis, Rumex acetosa, Scorzonera hispanica, Borago officinalis, Angelica Archangelica und Allium Cepa. Bei Cichorium Intybus bläuet auch der Saft der Wurzel. Die meisten dieser Wurzeln verlieren beim Trocknen und zum Theil schon beim Erhitzen bis zu 100 ° ihre bläuende Kraft. Folgende frische Wurzeln bläuen nicht die Guajaktinctur: Rumex acutus, Fragaria vesca, Polypodium Filix mas u. s. w. Das mit kaltem Wasser angemachte arabische Gummi bläuet das Guajakpulver, auch wenn das arabische Gummi zuvor für sich erhitzt war; wenn es aber in heißem Wasser gelöst wurde, so bläuet es nicht, so wie auch Traganthgummi unter keinen Umständen bläuet. Diese Bläuung mit Gummischleim erfolgt nach Brandes (Berl. Jahrb. 1821. S. 143.) bloß bei Zutritt der Luft, und eine Guajaktinctur, welche 14 Tage in einem unverkorkten Glase gestanden hat, wird nicht mehr durch arabisches Gummi gebläuet. Auch die Milch bläuet nach Planche die Guajaktinctur; sie verliert diese Eigenschaft durch die Siedhitze, selbst wenn man sie nachher erkalten läßt, und mit Luft durch Compression sättigt. Das beim Erhitzen der Milch Uebergehende bläuet auch nicht Guajak. Fällt man die Milch durch

Weingeist, so bläuet nicht die Molke, sondern bloß der Käse das Guajak, doch wird ihm diese Eigenschaft durch Auspressen des Weingeistes benommen. Beim Kneten des Guajakpulvers mit Seife wird ersteres ebenfalls gebläuet, aber durch Zusatz trocknen Süßholz- oder Chinawurzelpulvers wird diese blaue Färbung gehindert.

Wasser löst durch anhaltendes Kochen 0,16 vom Guajakharze auf, die Lösung ist, so lange sie heiß ist, blaugrün, beim Erkalten scheidet sich der größte Theil des Aufgelösten aus, und die wäßrige Lösung ist dann trübe und bräunlichgelb; metallische Salze machen darin flockige Niederschläge, und es bleibt nach dem Verdampfen des Wassers eine Art extractiver Substanz zurück. Das Guajak ist in Aether minder auflöslich, als in Alkohol; die alkoholische Auflösung giebt mit Wasser eine Milch, die sich filtriren läßt; Salzsäure bewirkt ein graues, Schwefelsäure ein blaßgrünes Präcipitat, Essigsäure keine Fällung. Die ätherischen Oele so wenig als die fetten äußern eine merkliche auflösende Kraft auf das Guajak. Concentrirte Schwefelsäure giebt mit dem Guajakharze eine anfangs dunkel carmoisinrothe etwas ins Braune spielende Auflösung; frisch bereitet giebt sie beim Zusatze von Wasser einen lilafarbigen Niederschlag; wird die Schwefelsäure abgedampft, so bleibt keine Gerbesubstanz, sondern bloß ein kohliger Rückstand zurück, dessen Menge 0,58 beträgt.

Wäßriges Ammoniak löst das Guajak auf, und zersetzt zum Theil die Guajaktinctur unter Bildung eines hellgrünen Niederschlages. Die fixen ätzenden Alkalien lösen das Guajakharz sehr schnell mit roth- oder grünlichbrauner Farbe auf. Die Auflösung wird nicht durch überschüssig zugesetztes Alkali gefällt (Unterschied vom Geigenharze).

Terpenthinöl über reinem Guajak gekocht, hat eine nicht unbedeutende Menge Harz aufgelöst, die sich beim Erkalten größtentheils ausscheidet. Nach dem Erkalten filtrirt erscheint die Auflösung wasserhell, wird sie aber erwärmt und abgeraucht, so erscheint die Flüssigkeit erst schwach bläulich, hierauf amethystroth, dann blaß rosenroth, nun bräunlichroth und endlich bräunlichgelb, und an den Seiten, wo es trocken wurde, sondert sich das Guajak blaugrün und blau ab. Das rückständige Harz ist gelbbraun. Wird auf den trocknen noch heißen Rückstand frisches Terpenthinöl gegossen, so erscheint das Harz erst schön blau, so auch das Oel, welches etwas davon aufgelöst enthält; nach abgegossener Flüssigkeit wird das Harz blaugrün, und beim ferneren Erhitzen wieder gelbbraun, ins Grünliche schielend, und endlich rothbraun.

Diese vom Guajak hier angeführten Eigenschaften beweisen hinlänglich seine große Verschiedenheit von den übrigen Harzen. Am meisten charakteristisch ist ohne Zweifel seine leichte Oxydabilität, und die Verwandlung desselben in verschiedene Oxyde, die durch ihre verschiedenen Farben gleichsam die Rolle von Metalloxyden im Pflanzenreiche spielen. Doch scheint die Farbenänderung auch durch andere Ursachen hervorgerufen werden zu können, wofür die von Taddei und Planche angeführten Versuche sprechen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0484-6

100 Th. Guajak enthalten 80 reines Harz und 20 Rindentheile; in diesen letzteren fand Bucholz 2,1 Extractivstoff, 1,5 Schleim und Holzfaser.

Das Guajakharz ist besonders der Verfälschung mit Geigenharz unterworfen. Zur Entdeckung dieser Verfälschung hatte Schaub eine Verfahrungsweise angegeben, welche die Versuche von Thiemann (Berl. Jahrb. 1804. S. 34.) und von Bucholz (Taschenb. 1804. S. 201. und 1806. S. 64.) veranlaßte. Das von Bucholz verbesserte Schaub'sche Verfahren ist folgendes: eine gesättigte Auflösung des verdächtigen Harzes in Weingeist zerlege man mit so viel Wasser, als eben nöthig ist; zu der erhaltenen milchähnlichen Flüssigkeit tröpfle man alsdann langsam Aetzlauge hinzu, wo sich sämmtliches Gefällte wieder auflösen wird; nunmehr fahre man fort Aetzlauge hinzuzutröpfeln, wo dann bei Unverfälschtheit des Guajakharzes alles hell und ungetrübt bleiben, bei vorhandener Verfälschung mit Geigenharz aber ein Niederschlag erfolgen wird, der in Verhältniß der Aetzlauge zunimmt, und aus Kolophoniumseife besteht (vergl. oben). Eine andere von Thiemann und Bucholz angegebene Prüfungsmethode besteht darin, daß man 1 Th. Guajak mit 4 Th. Terpenthinöl übergießt und sieden läßt. Das Terpenthinöl nimmt zwar beim Sieden auch eine beträchtliche Menge Guajak auf, läßt aber beim Erkalten den größten Theil niederfallen, wogegen das beigemischt gewesene Geigenharz oder ein anderes Tannenharz aufgelöst bleibt, und dem Terpenthinöl eine gelbbräunliche Farbe ertheilt. Es ist nicht hinreichend, das feingepulverte Guajak mit rectificirtem Terpinthinöle zu übergießen und zu schütteln; ist nämlich das Geigenharz in einem geringen Verhältnisse, z. B. $\frac{1}{7}$, beigemischt, so löst das Terpenthinöl nach Bucholz nur erst in der Siedehitze das Geigenharz; bei größerem Verhältniß nimmt es das letztere auch schon in der Digestionswärme auf.

Thiemann erwähnt einer groben Verfälschung, indem das Ganze ein Gemenge von geraspeltem Bernstein, Steinchen und Sand mit Geigenharz und etwas ächtem Guajak war.

Das Guajak wird als ein noch immer bewährtes Mittel in Pulver- oder Pillenform, oder auch mit arabischem Gummi oder Eidotter abgerieben verordnet. Vor einigen Jahren war die sogenannte Guajaktaffia (2 Unzen Guajak mit vier Pfunden Rum oder Zuckerbranntwein digerirt) sehr in Ansehen. Außerdem werden daraus die officinellen Tincturen und die Guajakseife bereitet.

Gutti seu Gummi Guttae. Gummigutt.

Der an der Luft erhärtete Saft von der verwundeten Garcinia Cambogia Roxb., einem Baume Ostindiens.

Ein Gummiharz, fest, zerbrechlich, auf dem Bruche glänzend, undurchsichtig, von braungelber, beim Reiben citronengelber, befeuchtet lebhaft gelber Farbe, keinem Geruche, und einem scharflichen süßlichen Geschmacke. In Wasser wird es fast ganz mit

trüber Auflösung, in Alkohol zum Theil mit klarer Auflösung aufgelöst. Die Gabe bis fünf Gran.

Garcinia Cambogia Roxb. et Desrousset. Guttabaum. Guttabringende Mangostane.

Cambogia Gutta Linn. Mangostana Cambogia Gaertn.

Linn. Cl. XI. Dodecandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 8. Guttiferae.

Dieser Baum kann eine beträchtliche Höhe erreichen. Der Stamm theilt sich nach oben in zahlreiche, mit einer schwärzlichen Oberhaut bedeckte Aeste, welche entgegengesetzte, gestielte, eirunde, spitze, ganzrandige, lederartige, glatte, glänzende, mit parallelen Seitennerven bezeichnete Blätter tragen. Die kleinen Zwitterblüthen sitzen in geringer Anzahl und ungestielt am obern Theile der jungen Zweige. Die Frucht ist kugelig, gelb, von der Größe einer Pomeranze.

Das Gummigutt wird auf doppelte Art gewonnen, entweder durch Einschnitte in die Rinde des Baumes, oder dadurch, daß man die Blätter und Zweige abbricht, wo es dann aus den Bruchstellen herabtröpfelt, wovon es ohne Zweifel den Namen **Gummi Guttae** erhalten hat.

Die vorzüglichste Sorte Gummigutt wird von **Guttifera vera Koenigii, Stalagmites Cambogioides Murray (Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 1. Monoecia)**, einem ebenfalls ostindischen und zu der Familie der Guttiferen gehörigen Baume gesammelt, welches sich durch seine mehr gelbe Farbe, die auch beim Trocknen nicht bräunlich wird, unterscheidet; indessen ist es gewiß, daß dieses Gummigutt nur äußerst selten nach Europa gebracht wird.

Das im Handel vorkommende Gummigutt erhalten wir in graugelblich bestäubten unförmlichen Kuchen, oder dicken wie Wachsstock gewundenen cylindrischen Massen. Auswendig ist das beste Gummigutt safrangelb, inwendig heller gefärbt, in dünnen Stücken und an den Kanten etwas durchscheinend, trocken, brüchig, auf dem Bruche glänzend, groß- und flachmuschlig, kaum hie und da etwas splittrig, nicht löcherig, zerreiblich, zwischen den Zähnen zähe, mit Speichel befeuchtet eine hellgelbe Farbe annehmend, ohne merklichen Geruch, im ersten Augenblicke geschmacklos, beim längern Kauen aber scharf und zuletzt süßlich schmeckend, den Speichel anlockend, und ein Gefühl von Trockenheit im Munde zurücklassend. Spec. Gew. 1,207.

Das in kleinen Stücken und Bröckelchen vorkommende, matte, auf dem Bruche nicht glänzende, löcherige, mehr braunrothe Gummigutt ist verwerflich.

Es soll auch in Amerika von mehreren Arten des **Hypericum** der Milchsaft eingesammelt, und als Gummigutt in den Handel gebracht werden, das nicht so scharf und trocknend schmeckt, und der drastischen Eigenschaften des wirklichen Gummigutts entbehrt.

In der Wärme dunstet das Gummigutt einen besondern Geruch aus,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0486-8

und schmilzt nicht, sondern zersetzt sich; an der Lichtflamme entzündet es sich aber, und brennt mit einer hellen, Ruß absetzenden Flamme.

Wasser löst das Gummigutt nicht vollständig, doch nimmt es den größten Theil desselben in sich. Alkohol löst 0,80 Harziges, und läßt 0,20 eines beinahe vollständig in Wasser auflöslichen Gummis zurück.

Braconnot zog 20 Grammen Gummigutt mit Alkohol aus; es blieb ein Rückstand von graulicher Farbe und 4 Grammen Gewicht, der schwer austrocknete, und brüchig wurde; es war Pflanzengummi. Die geistige Tinctur war klar, roth und hinterließ nach dem Abrauchen 16 Grammen einer durchsichtigen, harzähnlichen Substanz von rother Farbe, welche pulverisirt einen eigenthümlichen Geruch verbreitete, und eine gelbe glänzende Farbe annahm. Gießt man zur Auflösung dieser Substanz in Alkohol Wasser, so ballt sie sich nicht, wie die gewöhnlichen Harze zusammen, sondern es entsteht eine gleichförmige gelbliche, milchartige Flüssigkeit. Kalilauge wirkt besonders in der Wärme sehr schnell auf diese Substanz; es entsteht eine gleichsam ölige Flüssigkeit von dunkelrother Farbe, welche, zur Trockne abgeraucht, eine dunkelrothe, beinahe schwarze Seife vorstellt, die sich fettig anfühlt, und wohl getrocknet zerreiblich ist. Sie hat einen Geschmack, wie ranziges Fett, und hinterläßt eine gelinde Schärfe auf dem Grunde der Zunge. Kalkwasser bildet in der Auflösung dieser Seife einen schönen orangefarbenen Niederschlag. Die erdigen Salze, so wie der größte Theil der Auflösungen weißer Metalle verursachen ebenfalls gelbe Niederschläge darin. Sie schlägt das schwefelsaure Eisen braun, und das salpetersaure Kupfer grün nieder. Salpetersäure bildet ein Bitterharz mit einem gelben harzartigen Stoffe verbunden, wobei sich Kleesäure, Aepfelsäure und bitterer Extractivstoff erzeugen. Chlor giebt ein unauflösliches Pulver, welches eine wahre neutrale Verbindung mit der Salzsäure zu seyn schien.

Weniger Salmiakgeist und Kalilauge lösen das Gummigutt vollständig auf, die Auflösung ist schön roth. Bei der trocknen Destillation giebt das Gummigutt empyreumatische Essigsäure (kein Ammoniak), etwas leichtes Oel, viel dickes braunes Oel, und eine schwer einzuäschernde Kohle, in deren Asche sich schwefels. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk fanden.

Das Gummigutt, lange Zeit als specifisches Mittel gegen den Bandwurm in Ansehen stehend, wurde in Pulverform gegeben, wo es als ein heftiges Purgirmittel wirkt, welches auch bisweilen Erbrechen erregt; jetzt wird es fast nur noch als Färbematerial benutzt.

Gypsum. Gyps.

Ein in verschiedenen Gegenden vorkommendes Mineral.

Ein weißlicher Stein, im Feuer zerfallend, in Wasser sehr schwer auflöslich, mit Säuren nicht aufbrausend, größtentheils aus schwefelsaurem Kalke bestehend.

Der Gyps findet sich in ziemlich großer Menge in der Natur; er kommt in großen Krystallen oder in Stücken vor, die bald undeutlich krystallisirt, bald unrein, und dem Kalkstein ähnlich sind. Die Mineralogen unterscheiden nach der verschiedenen Krystallform den Anhydrit oder prismatischen Gyps, den Selenit oder spathigen Gyps, den blättrigen gekörnten Gyps, dichten Gyps, faserigen Gyps u. s. w. Zu dem spathigen Gyps gehört das Marienglas, Fraueneis (Glacies Mariae, Lapis specularis), so genannt, weil es in alten Zeiten in Rußland, wo es in großer Menge vorhanden ist, auch jetzt noch, zu Fensterglas gebraucht worden ist. Es ist grau, weiß und gelb, zuweilen Regenbogenfarben spielend, in dünnen Stücken biegsam, aber unelastisch. Spec. Schwere 2,3. Bestandtheile desselben sind nach Bucholz: 33,9 Kalk, 43,9 Schwefelsäure, 21,0 Wasser und 1,2 Verlust. Wenn die blättrigen und dichten Gypse rein und im Stande sind, eine gute Politur anzunehmen, so werden sie von den Künstlern Alabaster genannt, und zu Bildsäulen und Gefäßen verarbeitet. Die gröbern Sorten werden durch Brennen in den sogenannten Gyps verwandelt. Bei diesem Brennen verliert der natürliche schwefelsaure Kalk sein Wasser, blättert sich auf, zerfällt und bildet dann, wenn er im gepulverten Zustande wieder mit Wasser eingerührt wird, anfangs einen Teig, der aber bald erhärtet, indem das Wasser in den festen Zustand des Krystallwassers übergeht, wobei Wärme frei wird. Der zu stark gebrannte Gyps und der wasserleere natürliche Gyps, Anhydrit, verbinden sich nur höchst langsam mit dem Wasser. Der Anhydrit hat daher auch ein spec. Gew. von 2,96 und besteht aus 41,75 Kalk, 55 Schwefelsäure und 1,0 salzsaurem Natron, er blättert sich daher auch nicht im Feuer auf und zerfällt nicht.

Diese Verbindung der Kalkerde mit der Schwefelsäure wird aber auch sehr häufig bei chemischen Operationen gebildet, und erscheint dann als ein weißes Pulver, doch kann er auch aus der wäßrigen Lösung durch langsames Verdampfen in Nadeln angeschossen erhalten werden. Der Gyps löst sich nämlich in 460 kalten und eben so viel heißen Wassers auf. Die Auflösung hat einen schwachen faden Geschmack. Bestandtheile nach Bucholz: Kalk 33; Schwefelsäure 46; Wasser 21. Im wasserleeren Zustande nach Berzelius Kalk 42; Schwefelsäure 58.

Der gebrannte Gyps wird häufig angewendet, um anatomische und andere Figuren, welche zum Schmucke dienen sollen, abzumodelliren; ferner zu Stuccaturarbeiten u. s. w. In der Pharmacie wird er zum Kitten und Lutiren benutzt.

Hedera terrestris. Das Kraut. Gundermannkraut.

Glechoma hederacea Linn. Eine ausdauernde in Deutschland sehr häufige Pflanze.

Das blühende Kraut, mit entgegengesetzten, gestielten, nierenförmigen, gekerbten, ein wenig haarigen Blättern, von bitterlichem

etwas gewürzhaftem Geschmacke. Im Monat April und Mai einzusammeln.

Glechoma hederacea Linn. Der gemeine Gundermann.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese in Deutschland und in den übrigen Ländern Europas sehr häufige Pflanze wächst gewöhnlich in schattigen, feuchten Gebüschen und Wäldern an Zäunen, alten Mauern, Dämmen und Wiesenrändern.

Die Wurzeln sind dünn und faserig. Die langen, ästigen, viereckigen, saftigen, feinhaarigen Stengel liegen meistens auf der Erde, treiben an den Gelenken Wurzeln; die blüthentragenden stehen aufrecht. Die Blätter sind dunkelgrün. Die Blumen stehen gewöhnlich zu dreien von beiden Seiten quirlförmig, und sind blau. Der Kelch ist einblättrig, fünfspaltig; die Blumenkrone gleichfalls einblättrig und rachenförmig; die Oberlippe zweitheilig, die Unterlippe dreitheilig.

Diese sehr bekannte Pflanze, von der es Abarten mit großen Blumen, Stengeln und Blättern, mit purpurfarbigen oder weißen Blumen giebt, blüht im April bis Juni, und bisweilen im Herbste noch einmal.

Das Kraut besitzt einen angenehm bitterlichen etwas scharfen Geschmack, und schwach gewürzhaften Geruch, welcher letztere beim Zerreiben stärker wird. Es wird als Thee oder im Aufgusse als Brustmittel verordnet; auch der ausgepreßte Saft des frischen Krautes zu Kräutercuren.

Helenium seu Enula. Die Wurzel. Alantwurzel.

Inula Helenium Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands und der Schweiz.

Die außen gelblichgraue, innen weiße Wurzel, mit Bläschen, die mit einem wie es scheint braunen glänzenden Harze angefüllt sind, mit dünner Rinde, schwammigem hartem Holze, von scharf bitterlichem Geschmacke und gewürzhaftem Geruche. Sehr häufig wird sie gereinigt und der Länge nach zerschnitten feil geboten. Im Herbste oder Frühling einzusammeln.

Inula Helenium Linn. Der wahre oder gewöhnliche Alant.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Der Alant wächst in Italien, Frankreich, England, Holland, in der Schweiz und in Deutschland auf schattigen fetten Wiesen, an Zäunen, Ackerrändern und Dörfern.

Die Wurzel ist dick, ästig, fleischig und fahlgelb oder bräunlich von Farbe. Der Stengel ist aufrecht, stark, hart, eckig, rauh, trägt mehrere Aeste, und erreicht eine Höhe von 4—5 Fuß. Die Wurzelblätter sind

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0489-7

sehr groß, eiförmig-lancettförmig, oben grün und rauh, unten weißlichfilzig, stehen in einem Kreise und endigen sich in den Blattstiel. Die Stengelblätter sind weniger groß, eiförmig zugespitzt, die untern gestielt, die obern aufsitzend, den Stengel selbst umfassend. Die großen goldgelben Blüthen sind Strahlenblumen, und stehen einzeln an der Spitze der Zweige und am Ende des Stengels. Der gemeinschaftliche Kelch ist einfach, einblättrig, und besteht aus eiförmigen, etwas filzigen Schuppen. Die zusammengesetzte Blumenkrone ist gestrahlt. Die Blüthen in der Scheibe sind Zwitterblumen, und im Strahle sind viele zungenförmige, weibliche Blumen zusammengedrängt.

Diese Pflanze, welche auch zur Zierde in Gärten gezogen wird, blüht im Juli und August.

Die Wurzel wird von wild wachsenden Pflanzen gesammelt. Sie ist groß, lang, ästig, wenig faserig, fleischig, schleimig, frisch auswendig von fahlgelber, getrocknet von graubräunlicher Farbe und inwendig weißlich. Der Geruch der frischen Wurzel ist stark, durchdringend und campherartig, der der getrockneten veilchenartig. Der Geschmack ist anfangs etwas ekelhaft, dann scharf bitterlich, einigermaßen gewürzhaft, schleimig, und wird bei der getrockneten milder. Zum bessern Austrocknen wird sie in längliche Stücke zerschnitten.

Ein merkwürdiger Bestandtheil der Alantwurzel ist das ätherische Oel, welches in der Kälte krystallisirt, wenig flüchtig, specifisch schwerer als Wasser, in Wasser fast gar nicht, aber wohl in Weingeist löslich ist, und dann nach Einigen das Lackmuspapier röthet, nach Andern nicht röthet. Es hat keinen sehr auffallenden Geruch, und den reizenden eigenthümlichen Geschmack der Alantwurzel; von Gmelin wird es Alantcampher genannt. Ein anderer merkwürdiger von Rose entdeckter Bestandtheil ist das Inulin, ein besonders geartetes Satzmehl, das sich aus dem heißen concentrirten wäßrigen Decocte beim Erkalten von selbst absondert.

Funke (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 74.) erhielt durch Destillation der Alantwurzel mit Wasser ein milchiges Destillat, auf dessen Oberfläche einige Oeltropfen schwammen; eine große Menge eines gelblichen Oels hatte sich auf dem Boden gesammelt, und gerann in der Kälte zu einer milchweißen krystallinischen Masse, wobei sich das Wasser ganz aufhellte. Der Rückstand von der Destillation wurde vollends ausgekocht. Beim Abrauchen des Decocts zeigten sich keine Häutchen. Das Extract war röthlichbraun, angenehm süßlich, und besaß nichts von dem brennenden Geschmacke der rohen Wurzel. Aus der Luft zog es Feuchtigkeit an, und löste sich leicht mit Absetzung eines grauen Salzes, des Inulins, in Wasser. Dieses Extract wurde mit Weingeist digerirt, welcher nach dem Abziehen einen braunen süßen Extractivstoff zurückließ. Das vom Weingeiste nicht Aufgelöste war ein gummiger Extractivstoff, den Funke Alantin nennt.

Der ausgekochte Wurzelrückstand gab mit Alkohol behandelt eine schön gelb gefärbte, scharf und beißend schmeckende, das Lackmuspapier röthende Tinctur, welche nach dem Abrauchen ein in prismatischen Krystallen an-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0490-2

schießendes Harz lieferte, das sich durch seinen kratzenden und reizenden Geschmack besonders charakterisirte. Wurde die trockne Wurzel mit absolutem Alkohol ausgezogen, so konnten keine Krystalle erhalten werden, die sich aber sogleich zeigten, wenn das durch den absoluten Alkohol ausgezogene weiche Harz in etwas wäßrigem Weingeiste aufgelöst wurde, welcher dem Harze das erfoderliche Krystallisationswasser abgeben konnte.

Um das Inulin darzustellen, zerstampfte Funke die im August eingesammelte Alantwurzel, wo die Menge des Satzmehls in der Wurzel vermehrt ist, mit Wasser zum Brei, und drückte es durch nasses wollenes Zeuch. Der Rückstand wurde noch mit Wasser ausgekocht. Aus der trüben und weißröthlichen Flüssigkeit setzte sich jedoch kein Satzmehl ab; bis zum Kochen erhitzt gerann etwas Eiweißstoff; zum völligen Abklären wurde sie mit Eiweiß aufgekocht. Jetzt war die Flüssigkeit nach dem Filtriren wasserhell, und wurde zur Syrupsconsistenz verdunstet. Mit kaltem Wasser aufgeweicht löste sich nur etwa der sechste Theil auf, und es blieb ein schneeweißes in kaltem Wasser unauflösliches Mehl zurück, das zwar in vielen Stücken dem Stärkemehle sich ähnlich zeigte, aber sich darin unterschied, daß die mit heißem Wasser gemachte Auflösung beim Eindicken keinen Kleister bildete, sondern bei der Syrupsdicke wieder zu einer weißen pulverigen, salzähnlichen Masse erstarrte, die mit kaltem Wasser übergossen wieder ein mehlartiges Pulver darstellte.

Der wäßrige und geistige Auszug enthalten etwas freie Essig(?)säure.

25 Th. wohlgetrocknete Alantwurzel enthalten demzufolge: krystallinisches Harz und ätherisches Oel 2; Seifenstoff 0,7; gummigen Extractivstoff 1,5; Inulin 10,8; Pflanzenfaser 10; etwas weniges freie Essigsäure und Eiweißstoff.

John (Chem. Schriften IV. S. 61.) destillirte und kochte den Rückstand aus. Das Extract wurde durch Alkohol und kaltes Wasser in Extractivstoff, Gummi und Alantstärke zerlegt. Die ausgekochte Wurzel gab noch mit Alkohol behandelt beim Erkalten ein wachsartiges Harz. Was im Alkohol aufgelöst geblieben war, war ein klebriges Harz von bitterm ekelhaftem, sehr scharfem, fast ätzendem Geschmacke, das auch in Aether auflöslich war. Kalilauge zog aus dem Rückstande noch Extractivstoff aus. Pfaff bestätigt noch die von John an sich selbst gemachte Erfahrung, daß die beim Kochen entweichenden flüchtigen Theile der Alantwurzel narkotisch wirken. John fand: ätherisches Oel eine Spur; Alantcampher 0,3 bis 0,4; Wachs 0,6; scharfes Weichharz 1,7; bitterlichen Extractivstoff 36,7; Holzfaser 5,5; oxydirten Extractivstoff mit geronnenem Eiweißstoffe 13,9; überdies Kali-, Kalk- und Bittererdesalze.

Schultz (Berl. Jahrb. 1818. S. 251.) giebt folgendes Verhältniß der Bestandtheile in 500 Th. an: Inulin 66; Seifenstoff (bittern Extractivstoff) 56; Gummi 164; Harz 11; Alantcampher 1¼; durch Kali ausgezogenen Extractivstoff 52; Faserstoff 125; flüchtige Theile 24¾.

Die Dahline, welche Payen als einen eigenthümlichen Bestandtheil der Knollen der Dahlien und Georginen angegeben hat, Trommsdorff's

Menyanthine (Journ. XVI. 2. S. 85. und XVIII. 2. S. 97.) und Braconnot's Datiscine (Gmelin's Handb. d. Ch. 2te Aufl. S. 1443.) kommen in allen Stücken mit dem Inulin überein, welches sich überhaupt noch in vielen andern Wurzeln findet, als in der Zeitlose, in der Bertramwurzel, der Engelwurzel, der Altheewurzel u. s. w. Es ist ein weißes oder gelblichweißes durchscheinendes, körnig anzufühlendes Pulver ohne Geruch und Geschmack, in kaltem Wasser unauflöslich, in $\frac{1}{5}$ Wasser von 60 ° auflöslich, die Auflösung schleimig, nicht kleisterartig. Bei dem Erkalten und durch Alkohol wird es wieder niedergeschlagen.

Die Alantwurzel wird, als ein auf die Organe der Brust und auf die Haut specifisch wirkendes Mittel, in Pulverform, in der Abkochung, nicht im Aufgusse, am häufigsten aber im Extracte verordnet; auch wird mit Schweineschmalz eine Salbe daraus bereitet.

Helleborus albus. Die Wurzel. Weiße Nieswurzel.

Veratrum album Linn. Eine ausdauernde Alpenpflanze der Schweiz und des südlichen Deutschlands.

Eine walzenförmige, außen schwärzliche, von den abgeschnittenen Wurzelzasern genarbte, innen weiße Wurzel (Wurzelstock), von sehr scharfem brennendem Geschmacke, gerieben heftiges Niesen erregend, giftig. Bewahre sie vorsichtig den Verordnungen gemäß auf. Die Gabe bis zu einem Gran.

Veratrum album Linn. Der weiße Germer. Weiße Nieswurzel.
Veratrum Lobelianum Bernh. Der Lobelische Germer.
Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 1. Monoecia.
Juss. Cl. III. Ord. 3. Junci.

Der weiße Germer wächst auf Wiesen in den Ebenen und auf den Alpen in Oestreich und Ungarn.

Die Wurzel besteht aus einem einfachen, runzligen, außen schwärzlichen, innen weißen, ziemlich großen Wurzelstocke, der mit vielen weißen Wurzelzasern besetzt ist. Aus diesem erhebt sich ein 2, 3 bis 4 Fuß hoher Stengel, welcher nach unten mit vielen ovalen, ungefähr 6 Zoll langen und halb so breiten, weichen, der Länge nach gefalteten, auf der untern Seite schwach behaarten Blättern besetzt ist. Außerdem trägt derselbe noch weitläufiger stehende, kleinere, lancettförmige Stengelblätter, und nach oben grünlichweiße Blüthentrauben.

Der Lobelische Germer, welcher von mehreren Autoren als eine Spielart des vorigen betrachtet wird, wächst auf den höheren Bergen der Schweiz, in Kärnthen und Krain. Er kommt dem vorigen sehr nahe, doch stehen die Blättchen der Blüthenhülle (petala) mehr aufrecht, und sind blaßgrün mit dunklern Nerven.

Der von den Wurzelfasern befreite Wurzelstock beider Pflanzen ist als

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0492-4

weiße Nieswurz officinell. Sie ist eine unförmliche, einigermaßen konisch abgestumpfte, knotige, dicke Wurzel von 2—3 Zoll Länge, ½—1 Zoll Dicke, fest, schwer, holzig, außen runzlig, gleichsam warzig, schwärzlichbraun, innen weiß. Die Wurzel hat getrocknet keinen Geruch, aber einen höchst scharfen, brennenden und bitterlichen Geschmack, noch lange eine Empfindung von Trockenheit im Munde zurücklassend. Ihr Staub reizt aufs heftigste zum Niesen, man muß sich also vor demselben beim Pulverisiren der Wurzel zu bewahren suchen.

Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. V. 2. S. 92.) zerlegten die weiße Nieswurzel, nach demselben Verfahren, welches sie bei der Untersuchung des Sabadillsaamens anwandten, wie dort näher angegeben werden soll. Nach ihrer Analyse enthält diese Wurzel: eine fette Materie, durch Aether ausgezogen, zusammengesetzt aus Elaïne, Stearine und einer flüchtigen Säure, welche wenig verschieden ist von der aus dem festen Sabadillöle erhaltenen, die jedoch nicht krystallinisch konnte dargestellt werden; saures galläpfelsaures Veratrin und gelben Farbestoff, beide durch Alkohol ausgezogen; Gummi, durch kaltes, Stärkemehl, durch heißes Wasser ausgezogen, worauf eine große Masse holziger Theile zurückblieb. Die Asche war zusammengesetzt aus kohlens. und phosphors. Kalke, kohlens. Kali, Kieselerde und schwefels. Kalke.

Von dem Veratrin oder Sabadillin, als einem eigenthümlichen Alkaloid, wird bei Sabadilla die Rede seyn.

Pfaff (Syst. d. Mat. med. VII. S. 230.) suchte das Veratrin auf dieselbe Weise, wie das Chinin, zu gewinnen dadurch, daß er die Wurzel mit verdünnter Schwefelsäure digerirte, mit gebranntem Kalke niederschlug und den Niederschlag auszog. Es wurde eine ziemliche Menge einer gelblichweißen, getrocknet pulverigen Substanz erhalten, die aber durchaus keine alkalische Eigenschaften zeigte, auch keinen Geschmack hatte, und unter allen Substanzen dem Wachse am nächsten kam, sich aber von demselben durch ihre leichte Auflöslichkeit in warmen Alkohol unterschied, aus welchem sie beim Erkalten, so wie bei der Zumischung von nur sehr wenigem Wasser ausschied, ferner durch die sehr geringe Löslichkeit in Aether, folglich als eine eigene Modification des Wachses zu betrachten ist. Außer dieser weißen wachsähnlichen Materie hatte der Alkohol aus dem Kalkniederschlage gelbfärbenden Stoff aufgenommen. Sollte, fragt Pfaff, das Veratrin der weißen Nieswurzel in Wasser auflöslicher seyn, als das des Sabadillsaamens? (oder sollte es überhaupt verschieden, oder auch durch die Gewinnungsart verändert worden seyn?)

Die weiße Nieswurzel erregt heftiges Erbrechen und Purgiren, erheischt also bei etwaniger innerlicher Anwendung die größte Vorsicht, da sie zu den aufs höchste drastischen Arzneistoffen gehört. Bei Vergiftungen damit sind Tamarinden, Cremor Tartari, einhüllende und demulcirende Mittel, und der schwarze Kaffee innerlich und in Klystieren als Gegenmittel zu gebrauchen. Aeußerlich mit Fetten zur Salbe gemacht, hat sich die Wurzel gegen Krätze sehr wirksam bewiesen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0493-9

Helleborus niger. Die Wurzel. Schwarze Nieswurzel.

Helleborus niger Linn. Eine ausdauernde Pflanze der Schweiz und des südlichen Deutschlands.

Die kurze, wenig dicke, höckerige Wurzel (Wurzelstock), mit zahlreichen, sehr langen, gegen die Basis fast eine Linie dicken Wurzelzasern, mit braunschwärzlicher Oberhaut, einer nicht sehr dicken weißen Rinde, und einem feinen aus Bündeln zusammengesetzten Holze. Sie wird mit verschiedenen andern Wurzeln verwechselt, ist aber durch ihre Länge und Dicke, so wie auch durch die Menge der Wurzelfasern und den nicht scharfen Geschmack zu erkennen. Mit Vorsicht aufzubewahren. Die Gabe bis zum halben Scrupel.

Helleborus niger Linn. Schwarze Nieswurz.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 7. Polygynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Diese Pflanze wächst auf den Pyrenäen, Alpen, Apenninen, in Oestreich, Böhmen, Schlesien u. s. w., an Bergen und steinigen, schattigen Orten; sie wird auch ihrer frühen schönen Blüthe wegen bei uns in Gärten gezogen.

Die Wurzel bildet einen rundlichen schwärzlichen Kopf, aus dem dicke fleischige Fasern von bräunlichschwarzer Farbe hervorkommen. Der Schaft ist aufrecht, 4—5 Zoll hoch, dick, rund, etwas röthlich, einfach oder gabelförmig am Ende, und trägt gewöhnlich zwei auch wohl eine Blume. Die immergrünen Blätter erscheinen kurz nach der Blume, sind sämmtlich Wurzelblätter, in 7—8 glatte, verkehrt eiförmig-lancettförmige, zugespitzte, lederartige, dunkelgrün glänzende Blättchen getheilt. Die Blüthen sind wohlriechend, groß, röthlich oder weiß, offenstehend und halten bis 2 Zoll im Durchmesser. Der gleichsam glockenförmige Kelch besteht aus 5—6 ungleichen Blättchen, die Krone aus 10—12 ovalen stumpfen Blumenblättern. Die sehr zahlreichen Staubfäden sind pfriemenförmig, stehen auf dem Fruchtboden und tragen gelbe Staubbeutel.

Die schwarze Nieswurz blüht vom December bis März, überhaupt in den Wintermonaten, selbst unter dem Schnee, die Gärtner nennen sie daher auch Weihnachtsrose.

Die officinelle Wurzel, Christwurzel, hat einen rundlichen, gefurchten, braunschwarzen Knollen oder Kopf, von der Größe einer Muscatnuß, der nach allen Seiten kurze, gegliederte Aeste treibt, aus welchen wieder viele glatte, runde, strohhalmsdicke und dickere, zähe fleischige, einige Zoll lange, bei ältern Wurzeln in einander geschlungene Fasern kommen, die auswendig schwarz oder schwarzbraun, inwendig weiß sind, einen scharfen, bitterlichen ekelhaften Geschmack und widrigen ranzigen Geruch besitzen. Durchs Trocknen werden sie runzlig, dünner, zerbrechlich, auswendig braungraulich, in-

wendig gelblichweiß, verlieren meistens ihren Geruch und schmecken beim Kauen weniger bitterlich, hinterlassen aber noch lange die Empfindung einer Schärfe, und verursachen eine Art Gefühllosigkeit und Erstarrung der Zunge. Pfaff bemerkt, daß diese ächte Christwurzel mit allen angegebenen Charakteren ihm noch nicht vorgekommen sey, und daß es ihm zweifelhaft bleibe, ob die Mutterpflanze dieser Wurzel auch in der That der Helleborus niger L. sey. Indessen ist denn doch wohl die ächte Christwurzel nicht so selten, wenn gleich Verwechselungen vorkommen, und zwar vorzüglich 1) mit der Wurzel des Frühlingsadonis (Adonis vernalis L.). Diese ist viel dunkler schwarz und inwendig mehr glänzend weiß; die Fasern kommen unmittelbar aus dem Wurzelkopfe, nicht aus einer Zertheilung der Seitenäste. Der Geschmack ist ekelhaft süßlicher, dann seifenhaft und scharf bitterlicher, so wie der Geruch auch der getrockneten weit erdiger ist. 2) Mit der Wurzel der grünen Nieswurz (Helleborus viridis L.), deren Fasern dünner, kürzer, häufiger, von fahlschwarzer Farbe und sehr ekelhaftem bitterm und fast brennend scharfem Geschmacke sind, welcher sogleich beim Kauen, bei der ächten Nieswurz hingegen erst später empfunden wird; auch ist ihre Wirkung viel stärker. 3) Mit der stinkenden Nieswurzel (Helleborus foetidus L.), deren Hauptwurzel dünner, nicht so knollig und fast gerade ist, auch viel weniger kurze, völlig schwarze, holzigmarkige Fasern hat, und einen viel ekelhaftern und schärfern Geruch und Geschmack besitzt. Die Wurzeln des Christophskrauts (Actaea spicata), der europäischen Trollblume (Trollius europaeus), der großen Astrantia (Astrantia major), des blauen Sturmhuts (Aconitum napellus), u. s. w. haben weniger Aehnlichkeit, und, bis auf den Sturmhut, keine Schärfe.

Die schwarze Nieswurz wird im Spätherbste oder gleich nach der Blüthe eingesammelt, vorsichtig getrocknet, sorgfältig vor der Luft geschützt und an einem trocknen Orte aufbewahrt, weil sie sonst leicht ihre Kraft verliert. Ihre Schärfe und Wirksamkeit scheint zum Theil wenigstens auf einem flüchtigen Princip zu beruhen, da sie sowohl durch langes Liegen an der Luft, als auch durch langes Kochen ganz die brechenerregende und purgirende Eigenschaft verliert.

Feneulle und Capron (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 51. u. Buchn. Repert. XII. S. 222.) bemerken bei ihrer Untersuchung der schwarzen Nieswurzel, daß diese dem Alkohol, mit dem sie kochend ausgezogen wird, eine braune, die Wurzel des Helleborus hiemalis dagegen eine schöne smaragdgrüne Farbe mittheile. Bei dieser Untersuchung wurde besonders nach einem Alkaloid geforscht; es konnte aber keins gefunden werden. Die gefundenen Bestandtheile waren: 1) eine fette Materie (Weichharz?), braungelb, beißend scharf, besonders im Halse, weich, leicht in Aether, weniger leicht in Alkohol auflöslich, in Wasser unlöslich, mit einer flüchtigen, der Jatrophasäure ähnlichen Säure verbunden, in welcher die Wirksamkeit der Wurzel liegen soll, was sich aber mit dem Umstande nicht vereinigen läßt, daß diese fette Materie mit Wasser und Talkerde gekocht zwar ihre lackmusröthende Eigenschaft verlor, aber ihre Schärfe vollkommen beibehielt. Es ist vielmehr an-

zunehmen, daß diese fette Materie dem scharfen und kaustischen Oele ähnlich sey, welches Vauquelin (Berl. Jahrb. auf das Jahr 1807. S. 1.) im Helleborus hiemalis gefunden hat. 2) Ein flüchtiges, widrig riechendes Oel. Das Destillat hatte nämlich einen ekelhaften Geruch, und färbte salpetersaures Silber nach einigen Stunden braun. 3) Harz. 4) Wachs. 5) Eine flüchtige Säure, mit der fetten Materie verbunden. 6) Bitteres Princip. 7) Schleim. 8) Galläpfelsaures Kali und saurer galläpfelsaurer Kalk, auf welche die Verf. wegen des schwarzen Niederschlages in der Eisenauflösung, durch die Abkochung der Nieswurzel hervorgebracht, ohne daß thierischer Leim gefällt wird, schließen. 9) Thonerde und 10) ein Ammoniaksalz, das aber nicht essigsaures Ammoniak war.

Die schon bei den Alten berühmt und in Gebrauch gewesene Nieswurz ist nicht dieser Helleborus niger, sondern, wie Tournefort bewiesen hat, der jene Pflanze auf der Insel Anticyra, in Böotien, Euböa ꝛc. fand, eine von allen europäischen ganz verschiedene Art, die namentlich von unserer schwarzen Nieswurz gänzlich abwich. Er nannte diese Species Helleborus orientalis; später ist sie H. officinalis genannt worden.

Jetzt ist die schwarze Nieswurz, die ehemals häufig und gegen mancherlei Krankheiten gebraucht wurde, nur selten im Gebrauche, am häufigsten in Extractform, sonst auch in der Tinctur, im Aufgusse und in der Abkochung; die kräftigste Form aber ist das Pulver.

Helminthochortos. Wurmmoos.

Verschiedene Arten von Ceramium Agardh. und Hutchinsia Ag., unter welchen bisweilen Sphaerococcus Helminthochortos Agardh. vorkommt, im mittelländischen Meere an der Küste Corsikas häufig.

Gelblichbräunliche, daumensdicke, aus sehr feinen, vielspaltigen, zähen Fäden zusammengesetzte Algen, von salzigem Geschmacke und einem Seegeruche.

Dieses Gemenge mehrerer kleinen Pflanzen aus der Familie der Algen wird theils von den Felsen abgerissen, theils auch von den Wellen an das Ufer geworfen, von den Einwohnern gesammelt, und ganz so in dem Zustande, wie es eingesammelt worden, d. h. noch mit vielen Unreinigkeiten, Schalthieren, Sand u. s. w. vermengt, zu uns gebracht. Agardh hat 22 verschiedene Seegewächse gezählt, als, außer den angegebenen: Conferva prolifera und C. catenata Ag., Fucus purpureus, plumosus, barbatus etc., Corallina officinalis und rubens, Blätter der Zostera marina u. s. w.

Diese Gesammtmasse, wie sie zu uns kommt, besteht aus unzähligen Zäserchen, die mit ihrem untern Ende auf Sandstückchen aufsitzen, auf denen sie vegetirten. Jede Zaser ist als ein Stengelchen anzusehen, welches sich gabelförmig in zwei Aeste theilt, die selbst wieder gabelförmig gespalten sind,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0496-7

so daß der Stengel gabelspaltig (dichotomus) wird. Diese Zasern sind auswendig schmutzig rothgrau, welche Farbe auch die ganze Masse hat, inwendig aber sind sie weiß. Wenn man das Wurmmoos an einem trocknen Orte aufbewahrt, so sind seine Zäserchen trocken und so hart, daß sie sich zerbrechen lassen; wird es aber an einem feuchten Orte aufgehoben, so werden sie feucht und biegsam. Der Geruch des Wurmmooses ist stark und widerlich, der Geschmack stark salzig. In Wasser geweicht schwellen die Zäserchen auf, entfalten sich, verlieren allmälig die braune Farbe, welche sie dem Wasser mittheilen. Wegen etwas beigemischten Meersalzes knistern sie gelind auf glühenden Kohlen.

Das Wurmmoos muß leicht seyn, und so wenig als möglich Sand enthalten. Es soll bisweilen absichtlich mit Lichen castaneus Leersii verfälscht werden; dieser ist aber ganz braun, weich, hohl und spitzig.

Nach John enthalten 1000 Th. Wurmmoos: Seesalz 92; Gallerte 602; Gyps 112. Nach Bouvier: Gallerte 602; Pflanzenfaser 110; schwefels. Kalk 112; Kochsalz 92; kohlens. Kalk 75; Eisen, Talkerde, Kieselerde und phosphors. Kalkerde 17. S. = 1008. Nach den neuesten Untersuchungen enthält es auch Jod, als Jodnatrium, den charakteristischen Bestandtheil der meisten Seegewächse.

Das Helminthochorton wird jetzt nicht mehr so häufig wie früher als wurmtreibendes Mittel in Pulverform, im Aufgusse oder im Gelee verordnet. Es ist auch in mehreren Fällen skirrhöser Drüsenverhärtungen mit sehr günstigem Erfolge versucht worden.

Hippocastanum. Die Rinde. Roßkastanienrinde.

Aesculus Hippocastanum Linn. Ein im nördlichen Persien einheimischer, jetzt in Deutschland gemeiner Baum.

Die Rinde der nicht gar zu alten Aeste, mit glatter, rothbrauner Oberhaut, innen gelblich, von bitterm zusammenziehendem Geschmacke. Sie werde im Frühlinge gesammelt.

Aesculus Hippocastanum Linn. Die gemeine Roßkastanie.
Linn. Cl. VII. Heptandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 6. Acerineae.

Dieser Baum, welcher über 100 Jahr alt wird, und sich zu einer Höhe von wenigstens 60 Fuß erhebt, soll ursprünglich in den gemäßigten Gegenden Asiens zu Hause seyn. Jetzt ist er in dem größten Theile Europas einheimisch, und wir finden keinen Baum, der, besonders zur Zeit der Blüthe, mit ihm verglichen werden könnte. Seine zahlreichen, schönen auf weißem Grunde rosenfarbig und gelb gefleckten Blumen, die sich an den Spitzen der Zweige in großen, aufrechten, pyramidenförmigen Trauben aus der ausgebreiteten, buschigen, schattenreichen Krone erheben, gewähren einen sehr angenehmen Anblick.

Der Stamm ist dick und gerade, das Holz zart, weiß und faserig, und

die Rinde der ältern Stämme aufgerissen, die der jüngern und der Aeste glatt und weißlichgrau. Die entgegenstehenden, langgestielten Blätter sind gefingert, und bestehen aus 6 oder 7 glatten, lancettförmigen Blättchen. An den Blumentrauben sind die obern Blumen männliche, und die untern Zwitterblüthen. Der Kelch ist einblättrig, die Krone fünfblättrig. Die Frucht besteht in einer dicht mit Stacheln besetzten grünen Kapsel. Die Saamen, 1 oder 2, sind rundlich.

Dieser Baum blüht im Mai und Juni, die Früchte reifen im September und October.

Die officinelle Rinde wird im Frühjahre gesammelt, weder von zu alten, noch von zu jungen Aesten, und von dem noch anhängenden Splinte gereinigt. Sie ist leicht, zähe, auswendig mit einer graubraunen, hin und wieder mit zarten Flechten besetzten Oberhaut bekleidet, wodurch sie ein der Chinarinde entfernt ähnliches Ansehen bekommt; inwendig ist sie weißgelb oder röthlich angelaufen. Ihr Geschmack ist bitter und sehr zusammenziehend; ihr Geruch angenehm und besonders bemerkbar, wenn sie gekocht wird.

Die wäßrige Abkochung erscheint, so lange sie warm ist, gelbbraun, erkaltet aber blässer und trübe. Diese sowohl als die geistige Tinctur und die Auflösung des Extractes changiren, mit vielem Wasser verdünnt und gegen einen dunklen Körper gehalten, oder von oben herabgesehen, himmelblau. Diese Eigenschaft verschiedener Stoffe, die Farbe zu changiren, wie man es z. B. bei dem rothen Steinöle, bei der Auflösung des sauren schwefelsauren Chinins und der Quassiatinctur (Kastn. Archiv VIII. S. 84.) bemerkt, schreibt Hr. Raab (Kastn. Archiv X. S. 121.) einem eigenthümlichen vegetabilischen Stoffe zu, den er Schillerstoff nennt, und der unbezweifelt auch in dieser Rinde vorhanden seyn müßte. Wegen ihrer zähen Beschaffenheit ist die Rinde schwer zu pulvern.

Ollenroth erhielt aus 1000 Gran Rinde: Faserstoff 774 Gran; Gerbestoff 80; Gummistoff 68; Extractivstoff mit sehr viel Gallussäure verbunden 72; Verlust 6.

Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 113.; Buchn. Repert. XII. S. 217.; Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 77.) konnten kein dem Cinchonin ähnliches Alkaloid entdecken. Sie erhielten: grünliches fettes Oel; röthlichbraune harzige Materie; rothen Farbestoff; gelben schwach bittern Farbestoff; eisengrünenden, den Brechweinstein nicht fällenden Gerbestoff; Gummi; Holzfaser und etwas freie Säure, die mit Bittererde ein wenig in Wasser, nicht in Weingeist lösliches Salz bildet.

Du Menil (Trommsd. Taschenb. 1824. S. 1.) digerirte 16 Unzen Rinde mit Alkohol von 83 Proc. Die Tincturen gaben nach Abziehen des Weingeistes eine braune Flüssigkeit von herbem und zusammenziehendem Geschmacke, welche eine Substanz abgesetzt hatte, die durch Alkohol leicht abgespühlt werden konnte. Als das Ganze bis auf 12 Unzen abgedampft worden, befand sich am Boden wie am Rande der Abrauchschale eine zähe harzige Materie, die sich durch Zusatz von Wasser und Erhitzung des trüben Ge-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0498-9

misches bis zur Entfernung alles Weingeistes ansehnlich vermehrte. Sie wurde mit 15 Unzen durch etwas Salzsäure geschärften Wassers in einer bis zum Kochgrad steigenden Wärme digerirt, und diese Digestion wiederholt. Der harzige Klumpen hatte seine Zähigkeit eingebüßt, war geschmacklos, dunkelbraun, in dünnen Lagen aber roth, und verhielt sich wie Hartharz. Er wog 1 Unze und 20 Gran. Das Fluidum wurde eingeengt bis auf 10 Unzen. Es hatte sich dadurch eine beträchtliche Menge einer dem Pflanzendicksaft ähnlichen Materie abgesetzt, welche mit Wasser gekocht diesem einen sehr adstringirenden Geschmack ertheilte. Die Materie selbst hatte diesen Geschmack in einem noch höheren Grade, d. h. ganz dem Catechu ähnlich, gab mit Weingeist eine diesem völlig gleiche Tinctur, und schien fast allein aus concretem Gerbestoffe zu bestehen. Im Platinlöffel über der Spirituslampe blähete es sich ungemein auf, brannte und hinterließ eine schöne metallisch glänzende Kohle, die sich sehr schwer einäschern ließ. Die Materie wog 2 Unzen 4 Drachmen. Die Flüssigkeit war dunkel grüngelb; sie wurde, um etwa Cinchonin oder einen ähnlichen Stoff aufzusuchen, mit 8 Drachmen reiner Magnesia digerirt bis zum Sieden. Die Flüssigkeit wurde entfärbt, und die Magnesia nahm eine chocoladenbraune Farbe an, und wog 11 Drachmen. Die abfiltrirten Flüssigkeiten zeigten das eigene Opalisiren des Roßkastanienrindendecocts, welches die übrigen Flüssigkeiten nicht gezeigt hatten. Zur Trockne abgeraucht wurde 1 Unze 7 Drachmen eines braunen Rückstandes erhalten, der in Alkohol vollkommen auflöslich war, und sich dann zum Theil mit Wasser ausschied. Er hatte einen starken, gerbestoffartigen, nebenher salzigen Geschmack, zerfloß an der Luft und enthielt salzsaure Magnesia ungefähr 2 Drachmen, die übrigen 1 Unze und 5 Drachmen war eine dicksaftartige Masse, die sich von obigem Gerbestoffe sehr wenig unterschied.

Die braune Magnesia, welche 3 Drachmen an Gewicht zugenommen hatte, wurde mit Weingeist bis zum Sieden erhitzt, und dadurch eine sehr schön blau opalisirende Flüssigkeit erhalten, welche bis auf 3 Unzen abdestillirt, und dann abgedunstet, 4 Gran einer Substanz zurückließ, die Spuren von Krystallisirbarkeit zeigte, sich leicht in Wasser, aber trübe auflöste, und durch Reagentien bewies, daß salzsaure Magnesia darin befindlich war. Es gelang nicht, die mit Alkohol ausgezogene Magnesiaverbindung durch Essigsäure so zu zersetzen, daß die braune sie färbende Substanz allein übrig geblieben wäre, selbst Salpetersäure vermochte dies nicht. Der Filtririnhalt wog noch 3 Drachmen 4 Gran, und zeigte geglüht einen starken Gehalt an Magnesia.

Die essigsaure Auflösung entfärbte sich nach dem Zusatze von essigsaurem Bleioxyd gänzlich, der gelbe Niederschlag bestand aus Bleitannat, vielleicht mit etwas Farbestoff, der obige Zuwachs von 3 Drachmen bei der Magnesia kann also als Gerbestoff in Rechnung gebracht werden.

Die mit Weingeist ausgezogene Rinde wurde mit dem sechsfachen Gewicht Wasser übergossen, und blieb 24 Stunden stehen. Es wurden 2 Drachmen eines bittern Extractes erhalten, welches nur Spuren von Gerbestoff

erhielt, sich wenig von den gewöhnlichen Pflanzendicksäften unterschied, nur mehr Schleim mit sich zu führen schien, und mit Weingeist behandelt 21 Gran eines dem Kolophonium ähnlichen Rückstandes gab, von bittersäuerlichem Geschmacke.

Die Abkochung des letzten Rindenrückstandes gab 45 Gran eines braunen amylumhaltigen Extracts. Die Verbrennung endlich gab 270 Gran Asche, welche mit kaltem Wasser ausgezogen 8 Gran kohlens. Kali und hierauf mit Salzsäure ausgezogen 44 Gran Kiesel hinterließ. Die salzsaure Auflösung mit Ammoniak versetzt ließ außer weniger Alaunerde 15 Gran phosphors. Kalkerde mit 206 Gran kohlens. Kalk fallen.

In 16 Unzen Rinde sind also enthalten: Hartharz 1 Unze 20 Gran; Gerbestoff 2 Unzen 7 Dr.; gerbestoffhaltiger Dicksaft 1 Unze 6 Dr.; bitterer Dicksaft 4 Dr.; Pflanzenfaser 10 Unzen 3 Dr. 30 Gr. u. s. w.

Canzoneri (Hänle's Magazin 1824. 3. S. 303. u. Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 214.) will aus den Früchten der Roßkastanie durch Digestion mit Schwefelsäure, Fällen mit Kalkhydrat, und Ausziehen des Niederschlages mit Alkohol u. s. w., einen eigenen Stoff gefunden haben, der eine Salzbasis seyn soll uno den er Aesculin nennt. Durch Verdunsten der geistigen Auflösung wird es als eine graubraune, nicht krystallinische Masse, von süßlichem, hintennach stechendem Geschmacke erhalten. In Aether und Alkohol auflöslich, brennt mit Flamme, bildet mit Schwefelsäure seidenglänzende nadelförmige Krystalle.

Berzelius äußerte aber gleich die Meinung, daß dieser neue Stoff nichts anderes, als die in Wasser unauflösliche Verbindung von Extractivstoff mit Kalke sey, und daß die mit Schwefelsäure erhaltenen Krystalle Gyps wären, was denn auch durch Versuche von Chereau bestätigt worden ist. Auch Robiquet, Guibourt, Buchner ꝛc. stimmen damit überein, daß in der Roßkastanie kein Alkaloid zu finden sey.

Die Roßkastanienrinde ist als Chinasurrogat empfohlen worden, hat aber ihre fiebervertreibende Kraft nicht bewährt. Sie gehört zu den sehr adstringirenden Mitteln, und wird in der Abkochung, im Extracte und im Pulver verordnet. Das Pulver, zu lange aufbewahrt, verliert die Kraft, obgleich die Rinde in Stücken ihre Wirkung viele Jahre hindurch behält.

Die Rinde und das Holz liefern einen vortrefflichen Gerbe- und Farbestoff. Die Kastanienrinde soll zweimal (?) soviel Gerbestoff als die Eichenrinde, und beinahe zweimal soviel Farbestoff als Campecheholz enthalten. Das mit dieser Rinde gegerbte Leder wird fester, dauerhafter und geschmeidiger. Die Kastanienrinde ist auch vorzüglich zur Bereitung von Tinte geeignet, wenn man sie mit Essig mischt. Die daraus gezogene Flüssigkeit wird indigoblau; auf Papier verwandelt sie sich aber in eine schöne Schwärze.

Das Mehl von den Früchten der wilden Kastanie ist als ein Schutzmittel wider den Bücherwurm, unter den Buchbinderkleister gemischt, empfohlen worden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0500-3

Hirudo. Blutegel.

Hirudo medicinalis Linn. Cuv. Ein Thier aus der Ordnung der Ringelwürmer, in den Sümpfen Deutschlands häufig.

Das lebendige walzenförmige Thier, auf dem Rücken braun, mit sechs gelben Streifen gezeichnet, mit gefleckten Zwischenräumen, unten grau mit schwarzen Flecken.

Dieses zu den im Wasser lebenden, kiemenlosen Ringelwürmern gehörige Gliederthier ist ein Zwitterthier, und hat weder Augen noch äußere Gliedmaßen. Der Körper ist länglich, an beiden Enden abgestutzt, in die Quere gefurcht, und kann sich sehr in die Länge ziehn. Der Rücken ist gewölbt, schwärzlichbraun, und mit 6—8 gelben oder röthlichgelben Streifen gezeichnet; unten ist der Körper grau mit schwarzen Flecken. Die fortschreitende Bewegung besteht in einem wechselsweisen Zusammenziehen und Ausdehnen des Körpers. An dem schmäler zulaufenden Ende des Körpers ist das Maul befindlich, welches eine dreieckige Oeffnung zwischen zwei aus biegsamen Fasern bestehenden Lippen ist, in der drei scharfe Zähne stehen, womit sie beim Blutsaugen die Haut durchbohren, und eine dreieckige Wunde zurücklassen. Wenn sich der Blutegel einmal angesogen hat, so läßt er nicht eher ab, als bis er ganz mit Blut angefüllt ist; doch kann man ihn auch zum Abfallen bringen, wenn man ihm etwas Kochsalz auf den Rücken streut. (Derheim's Abhandl. in Buchn. Repert. XXI. 3. 1825. S. 341. beschäftigt sich lediglich mit den vorzüglichsten Verrichtungen der Organe der Blutegel, sowie auch der Bericht darüber von Henry, Virey und Haller ebendaselbst.)

Dieser Blutegel muß wohl unterschieden werden vom Pferd- oder Roßegel (**Hirudo sanguisuga Linn.**), so genannt, weil er sich häufig dem Rindvieh, den Schaafen und besonders den Pferden an die Füße hängt, wenn sie durch den Morast gehen, oder im Wasser saufen und dessen Biß bei Menschen gefährlich werden kann, weil er Entzündung und Eiterung erregt, und starke Blutungen zur Folge hat. Dieser Egel hat einen mehr platten, beinahe schwarzen Rücken, mit einem gelben Seitenrande, und einen blaßfarbigen Bauch, aber nicht die gelben Längsstreifen über dem Rücken. In Ceylon hat man giftige Blutegel bemerkt, deren Biß sehr bösartige Wunden erzeugt hat.

Der eigentliche Blutegel wird in klaren Bächen und Teichen gefunden; im Winter erstarrt er, verborgen unter den netzartigen Wurzeln der Wasserpflanzen. Er saugt den Fröschen, Wassersalamandern und Fischen das Blut aus. Das Verfahren, welches die Blutegelfischer gewöhnlich beobachten, besteht darin, daß sie mit entblößten Füßen in solche Wasser gehen, in welchen sie Blutegel vermuthen. Durch starke Bewegung der Füße suchen sie es dahin zu bringen, daß das Wasser sich möglichst trübt, damit ihnen kein Thier, welches auf die Oberfläche des Wassers kommt, entwische. Die Blutegel, theils durch die heftige Bewegung des Wassers beunruhigt, größten-

theils aber durch Instinct, das Blut des Fischers zu saugen, getrieben, kommen in Menge in die Nähe des letztern und werden größtentheils von demselben schon bei ihrer Annäherung ergriffen, bevor sie sich ansaugen, zum Theil aber auch erst dann bemerkt, wenn sie durch den Biß die Füße des Fischers verletzten. Am besten werden diese nützlichen Thiere gefangen nach einem vorhergegangenen Ungewitter, wo sie durch Instinct gezwungen werden, auf die Oberfläche des Wassers heraufzukommen.

Die Aufbewahrung der Blutegel geschieht im Allgemeinen und gewöhnlich in mit Flußwasser nicht ganz angefüllten Gläsern, die mit Leinwand überbunden werden, damit der Zutritt der Luft nicht abgehalten werde. Sie erhalten sich ohne alle weitere Nahrung sehr lange, doch hat man bemerkt, daß sie einander selbst ansaugen. Sie färben im Anfange besonders das Wasser roth, daher es nöthig ist, dieses öfter zu erneuern, damit es nicht in Fäulniß übergehe, wodurch die Blutegel getödtet werden. Nach den Versuchen von Henry, Virey ꝛc. ist Ammoniak den Blutegeln sehr schädlich, so wie vielen Reptilien, als Schlangen, Eidechsen, Salamandern, Kröten u. s. w., welche vielen heftigen Eindrücken mehr oder weniger widerstehen, von einigen Tropfen Ammoniakflüssigkeit aber getödtet werden. Diesem Umstande ist die große Schädlichkeit des abgesonderten Schleimes, der Excremente, des Bluts ꝛc. zuzuschreiben, welche bald in Fäulniß übergehen und Ammoniak entwickeln. Deswegen ist also die öftere Erneuerung des Wassers nothwendig, auch hat man einen Zusatz von vegetabilischer oder thierischer Kohle zu dem Wasser, als fäulnißwidriges Mittel, nützlich gefunden. Das Absterben trifft dann bisweilen den ganzen Vorrath; man hat daher bei dem starken Verbrauche der Blutegel in neueren Zeiten, und bei der Wichtigkeit derselben als Handelswaare, große Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gerichtet. Kunzmann (Hufeland's J. 1826. März. S. 59.) bemerkt, daß der Bedarf an Blutegeln in den letzten 30 Jahren so zugenommen habe, daß die Apotheker von Paris und London Menschen nach Deutschland schicken, um ihren Bedarf an Blutegeln, die sich bei ihnen nicht finden, dort einzukaufen. Nach London gehen in einem Jahr 7,200,000 Stück über Hamburg und Stettin. Ein Fuhrmann, der durch Stettin ging, hatte auf einmal 4,800,000 Stück für England in Fracht. Auch nach Amerika werden sie versendet. Der Preis ist en gros im Sommer für das Tausend 12 Thaler, im Winter 30 bis 45 Thaler, welchen Preis die Händler auch zahlen können, da nach Böhr's Angabe ein Blutegel in London 10—15 Silbergroschen kostet. Eine große Schwierigkeit, die den bedeutenden Gewinn schmälert, ist der Transport der Blutegel, die sehr oft während desselben sterben, so daß bisweilen die ganze Ladung verloren geht. Dieses kann nicht allein in der Art des Transports seinen Grund haben, sondern wird oft durch die Witterung herbeigeführt. Tritt nämlich während des Transports eine anhaltend heiße Witterung ein, oder findet eine schnelle bedeutende Abwechselung der Temperatur statt, so sterben die Blutegel. Daher wird auch in den Monaten Juli und August in Hamburg kein Blutegel für England angenommen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0502-5

Zum Transport der Blutegel bedienen sich Einige hölzerner Gefäße, gewöhnlich halbe Ankergefäße, die vorher mit kochendem Wasser rein ausgelaugt seyn müssen, und in denen weder Tabak noch Salz oder dergl. gewesen seyn darf. In ein solches Gefäß werden 2—3000 Stück, die kleinen von den größern geschieden, trocken eingesetzt; nach 36 Stunden wird ihnen soviel Wasser gegeben, daß der vierte Theil des Gefäßes damit angefüllt ist, und so werden sie auf den Transport zu Wagen gegeben. Wenn der Transport über 8 Tage dauert, so stirbt ein großer Theil, um so mehr, wenn während desselben große Hitze oder ein Gewitter eintritt. Andere bedienen sich reiner, jedoch ohne Seife gewaschener leinener Säcke von der Größe, daß jeder 3 Metzen halten kann. In jeden solchen Sack stecken sie 2000 Blutegel, und transportiren sie durch Tragen, nicht zu Wagen, um die zu starke Erschütterung zu vermeiden. Bei einem herannahenden Gewitter senken sie die fest verbundenen Säcke in einem Teich, Sumpf oder See, nicht aber in fließendes oder gar reißendes Wasser, und lassen sie so lange darin, bis das Gewitter vorüber ist. Ein gleiches thun sie, so oft sie selbst der Ruhe pflegen, oder es sonst für nöthig halten. Dieser Art des Transports, die am zweckmäßigsten scheint, bedienen sich besonders die aus Frankreich kommenden Händler. Noch Andere versenden die Blutegel in feuchtes Moos gepackt, bei welchem Transport aber von 8 Stück wenigstens 5 sterben sollen.

Da hiernach die Blutegel ein so bedeutender Gegenstand des Handels geworden sind, so ist auch die Aufbewahrung derselben in großen Massen nothwendig geworden, wozu denn auch vielfältige Anweisungen ertheilt sind. Dahin gehören die Abhandlungen von Häfner (Buchn. Repert. XV. S. 119.) und besonders v. Dr. Zier (Buchn. Repert. XVII. 1. S. 1.). Das erste Erforderniß hierbei ist dieses, daß man nur gesunde und muntere Blutegel zur Ueberwinterung bestimme. Den Schleim, welcher bald bei den gefangenen Blutegeln sich zeigt, sieht Zier als Folge einer Angst oder eines gereizten Zustandes an, und in sofern als etwas dem gesunden Zustande Unangemessenes, welches durch seine schnelle Fäulniß nur nachtheilig auf die Gesundheit wirken kann. Noch schädlicher ist es, daß diejenigen Thiere, welche sich an den Füßen der Fischer festsaugten, gewöhnlich mit Heftigkeit abgerissen, und dadurch so bedeutend verletzt werden, daß sie früher oder später erkranken und sterben. Ein weiter Transport aus entfernten Gegenden wirkt auch gewöhnlich sehr nachtheilig, besonders in der warmen Sommerszeit, wodurch sie schon so ermattet und krank ankommen, daß es nicht möglich ist sie zu überwintern. Die beste Zeit zum Fange ist daher das Frühjahr oder der Herbst, und auch selbst in diesen Jahreszeiten muß den Gefangenen Ruhe auf der Reise gestattet werden. Da überdem in die Monate Mai bis September die Fortpflanzung und Vermehrung der Blutegel einfällt, so ist dies ein wichtiger Grund mehr, den Fang der Thiere in diesen Monaten zu unterlassen. Während der Bewegung der Thiere durch das Tragen, Fahren oder Schiffen darf man ihnen kein Wasser geben. Allenfalls ertragen sie es, nach Zier, beim Schiffen, beim Fahren aber nie gern, es sey denn an

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0503-0

sehr kühlen Tagen. Aber während der Ruhe erhalten sie reines Teich- oder Flußwasser, nie aber Brunnenwasser, welches immer zu kalt ist. Dieses Wasser, welches, sobald die Reise fortgesetzt werden soll, behutsam abgegossen wird, nimmt den abgesonderten Schleim hinweg. Auch darf ihre Anzahl in einem Gefäße nicht zu groß seyn, so z. B. in einem Gefäß von 100 Quart nicht mehr als 5000 Thiere.

Ein zweites Erforderniß ist, zum Ueberwinkern nur solche Thiere zu wählen, welche nicht zu groß, vielmehr von mittlerer bis zur kleinsten Größe sind. Die Blutegelfischer wählen aber, der größern Ausbeute wegen, gern solche Orte, wo jene die mehreste Nahrung finden, d. h. an welchen sich warmblütige Thiere, Viehheerden u. s. w. aufhalten, denen sie Blut absaugen. Solche Thiere sind bedeutend größer, färben das Wasser blutroth, lassen bei einem mäßigen Drucke mit den Fingern etwas Blut fahren, und bringen also den Keim der Krankheit und des Todes schon mit sich. Solche Blutegel sterben aber nicht allein bald ab, sondern sie taugen auch deswegen weniger, weil sie in Folge ihrer Sättigung nicht gern ansaugen.

Bisweilen bemerkt man auch, wenn man die Blutegel mäßig mit dem Finger drückt, in ihrem Innern eine Verhärtung. Diese Verknorpelung, welche auch auf die gesunden übertragen wird, nimmt schnell so sehr überhand, daß bald der ganze Körper verknorpelt ist, und das Thier stirbt. Doch hat man nicht nöthig, jedes Thier zu untersuchen, es genügt, aus der zum Verkauf angebotenen Menge einige Hände voll zu prüfen.

Der Krankheiten, welchen die Blutegel auch während ihrer Aufbewahrung unterworfen sind, wird weiter unten noch besonders gedacht werden.

Die zu sehr ermatteten Blutegel, die in nicht zu kaltes Wasser geworfen, nicht munter, sondern nur langsam darin herumschwimmen, und nach einigen Bewegungen niederfallen und sich ruhig verhalten, die zwischen beide hohl zusammengehaltenen Hände einen Augenblick geschüttelt sich nicht schnell in Kugeln zusammenziehen, sondern mehr oder weniger lang bleiben, taugen nicht zum Ueberwintern. Als ein Zeichen der Krankheit betrachtet man noch, wenn der Mund oder der After des Thieres oder beide zugleich wulstartig hervorstehen oder bedeutend klaffen.

Wenn nun gesunde Thiere zur Ueberwinterung ausgewählt worden, so hängt von der Art ihrer Abwartung weniger ab, als man gewöhnlich annimmt, so z. B. ob man ihnen wöchentlich zweimal oder einmal, oder monatlich frisches Wasser giebt, wobei jedoch öftere Erneuerung des Wassers, so lange es von den Blutegel roth gefärbt wird, aus den vorhin angeführten Gründen nothwendig bleibt. Sonst hat Hr. Zier Blutegel während eines halben Jahres in demselben Wasser aufbewahrt, so daß sich bereits seit langer Zeit die vegetabilische grüne Materie gebildet und alle Wände des Gefäßes überzogen hatte, und dennoch lebten die Thiere im besten Wohlseyn fort. Auch scheint den Thieren die Art nicht gleichgültig zu seyn, wie man ihnen das Wasser giebt, denn es sterben bei weitem mehrere, wenn man das Wasser mit einer gewissen Heftigkeit von oben herab auf sie fallen läßt, als

wenn man dasselbe vermittelst einer Röhre an den Boden des Gefäßes leitet, so daß die Thiere zuerst von unten durch das Wasser berührt werden.

In Gefäßen von 100 Quart Inhalt halten sich 3000 Thiere der mittlern Größe recht gut, wenn man das Wasser wöchentlich erneuert, was jedoch in den ersten Wochen, wie erwähnt, öfter geschehen muß. Das frische Wasser muß aber kaum bis 2 Grad weniger Wärme haben, als dasjenige, welches man den Thieren nimmt. Der schnelle Wechsel der Temperatur ist den Blutegeln viel nachtheiliger, als eine allmälig eintretende Frostkälte. Es ist daher gut, das den Thieren zu reichende Wasser Tags zuvor dicht neben sie stellen zu lassen. Wird Wasser, in welchem die Blutegel während des Gefrierens des Wassers erstarrt sind, behutsam, z. B. im Keller wieder aufgethauet, so erwachen auch die Blutegel aus ihrem starren Zustande.

Unter allem Wasser ist dasjenige am angemessensten, welches aus Brüchen kommt, oder aus einem Moorboden, während seines Laufes aber sich im sandigen Bette reinigte. Doch schadet auch das Brunnenwasser und namentlich dann nicht, wenn das Bette des Brunnens Mergel oder Kiessand ist, und also der Brunnen bedeutend tief steht. Bei Anwendung des Flußwassers hat man dahin zu sehen, daß dasselbe geschöpft wird, bevor es dem Orte, durch welchem es fließt, ganz nahe kommt; denn wo Färbereien, Lohgerbereien und dergl. bestehen, vergiftet der Zufluß der Farbe- und anderer Brühen das Flußwasser oft so sehr und so schnell, daß die Blutegel, welche sich bisher in dem Wasser desselben Flusses recht wohl befanden, plötzlich sterben.

Hr. Böschner, Wundarzt in Coburg (Horn's Archiv, Januar und Februar 1825. S. 32.), befolgt folgendes Verfahren: In einem aus weichem Holze, nie aus Eichenholze, angefertigten Gefäße, welches noch zu keinem andern Zwecke gebraucht worden, und zwei Eimer Flüssigkeit enthalten kann, werden 500 Blutegel gesetzt. Das Wasser wird nach Umständen 1—2mal wöchentlich langsam abgelassen, weshalb 1—2 Zoll vom Boden des Gefäßes ein Hahn angebracht ist. Das Zugießen des frischen Wassers geschieht mittelst eines bis auf den Grund des Gefäßes reichenden Trichters, durch den die Flüssigkeit vorsichtig und langsam zugegossen wird. Hierzu wird Flußwasser genommen, welches im Herbste und Winter etwas verschlagen seyn muß. Das Gefäß, welches an einem mäßig temperirten Orte stehen muß, wird mit einem Tuche oder Haarsiebe bedeckt. Die Flüssigkeit, in der sie aufbewahrt werden, besteht zur Hälfte aus Wasser, zur Hälfte aus dem Schlamme des Sees, in welchem sie gefangen werden; in diese werden eine große oder mehrere kleine Kalmuswurzeln gelegt, an die sich die meisten Blutegel ansetzen, und sich sogar theilweise in dieselbe einbohren. Die auf diese Weise aufbewahrten Blutegel sollen sich eben so gut, wie in offnen Teichen fortpflanzen. Dr. Pfeufer in Bamberg hat dieses Verfahren mit Erfolg ausgeübt.

Da den Blutegeln nichts so tödtlich zu seyn scheint, als Ammoniak, so daß durch den Zusatz von 1—2 Tropfen Ammoniak zu einem geräumigen

mit Wasser gefüllten Glase die in demselben befindlichen Thiere auf der Stelle getödtet werden, so hat man auch die Gefäße vor einer Ammoniakdämpfe enthaltenden Luft, die sich in dem Wasser auflösen würden, zu bewahren; es ist daher nicht räthlich, dieselben in den Officinen oder Apothekenkellern, wo dergleichen Dämpfe durch Oeffnen der Standflaschen sich verbreiten, aufzubewahren.

Zur Aufbewahrung sehr großer Mengen Blutegel, als Handelsartikel, empfiehlt Zier den Thieren eine solche Wohnung zu geben, welche derjenigen möglichst gleich kommt, die sie im freien Zustande haben, als kleine Teiche graben zu lassen von 7—8 Fuß Tiefe, deren Wände nur wenig von der senkrechten Linie abweichen. In Teiche von 5—6 Fuß Durchmesser können etwa 20,000 Stück gesetzt werden.

Hartmann (Buchn. Repert. XXIII. 1. u. 2. S. 1—90, mehrere lehrreiche Abhandlungen über diesen Gegenstand enthaltend) erklärt zur Aufbewahrung und Vermehrung der Blutegel für erfoderlich einen künstlichen Teich aus Lehm und Thonlager, der, um einen möglichst gleichen Wasserstand von 3—4 Fuß Tiefe zu erhalten, mit einer gegen das Fortgehen der Egel durch ein feines Drathsieb oder einen mit Leinwand bezogenen Korb von Reisern gesicherten Abzugsröhre versehen wird. Zier hatte früher empfohlen, die Teiche gegen die nachtheilige Wirkung der zu sehr erwärmten Sonnenstrahlen durch angepflanzte Bäume zu schützen. Hierdurch entsteht aber der Nachtheil, daß zur Zeit des Abfallens der Blätter von den Bäumen die Teiche sehr verunreinigt werden, und dadurch das Wasser in eine den Blutegeln nachtheilige Gährung und Fäulniß gebracht wird. Zier empfahl daher später, auf dem Teiche die breiten Blätter der Nymphaea alba, Caltha palustris umherschwimmen zu lassen. Hartmann bedient sich hierzu der ganzen Pflanze des Potamogeton.

Jedes weiche Wasser ist zur Anlegung solcher Teiche tauglich, welches keine schwefelsaure und kohlensaure Kalkerde oder salzsaures Natron enthält. Um die Egel aus einem solchen Teiche zu fangen, ist das geringste Geräusch auf der Oberfläche durch Ruderschlag, Plätschern mit einer Stange ꝛc. hinreichend, um sie auf die Oberfläche zu locken und mit einem Netze von Gaze zu fangen. Zur Versendung empfiehlt Hartmann das feuchte Torfmoos (Sphagnum), auf welches man sie schichtweise legt; obenauf muß Moos mit einem geringen Drucke liegen, damit sie etwas gedrängt sich schichtweise im Kistchen befinden. Zier empfiehlt kleine Säcke von dichter grober Leinwand, so daß in einen Sack von etwa 18 Zoll Höhe und 12 Zoll Breite bis 1000 Thiere gegeben werden können. Ein Sack wird neben oder so über den andern gelegt, daß jeder auf einer Unterlage (einem Brette), die jedoch den untern Sack nicht berührt, ruhet. Diese Säcke taucht man täglich einmal, ohne sie zu öffnen, in reines kaltes Wasser, denn die Blutegel wollen überhaupt nicht auf lange Zeit in oder unter Wasser seyn, weshalb man auch bei ihrer Aufbewahrung ihnen Gelegenheit lassen muß, sich außerhalb des Wassers aufzuhalten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0506-8

Im Münsterschen Regierungsbezirke hat man in Betreff der Aufbewahrung der Blutegel widersprechende Beobachtungen gemacht (Rust's Magazin XXII. S. 594.), bis man endlich die Erfahrung erlangt hat, daß solche in großen, flachen, hölzernen, an der Innenseite 1—2 Linien tief verkohlten Gefäßen im Freien und an einem kühlen Orte am vortheilhaftesten geschieht. Der Boden dieser Gefäße wird einige Zoll hoch mit nicht kalkhaltigem Thone bedeckt, dieser hiernächst festgestampft, und der Rest davon mit einem dazu geeigneten, weder salzigen noch kalkhaltigen Wasser, worein mit Vortheil einige Wasserpflanzen, als Lemna, Myriophyllum, auch Torf und insbesondere Holzkohlen geschüttet werden können, angefüllt.

Was die Vermehrung der Blutegel betrifft, so sind hierbei Anordnungen erfoderlich, die der Natur der Thiere und ihrem Stande der Freiheit soviel als möglich entsprechen. Denn wie Le Noble gefunden hat, bildet der Blutegel in dem Boden während des Sommers eine platte konische Höhle, in der man nach einiger Zeit einen ovalen Cocon findet, in dem 9—14 junge Blutegel enthalten sind, die nach einigen Tagen ihre Hülle durchbohren und kräftig herumschwimmen. Diese Eigenthümlichkeit des Blutegels, im Schlamme Gehäuse zu bauen, in denen er seine Jungen absetzt, lehrt uns, wie Teiche und Behälter anzulegen sind; denn in Gläser gesetzt bilden sie jene Gehäuse nicht. Bei den künstlich anzulegenden Teichen hat man daher auf den Grund zu sehen. Dieser muß nämlich nicht aus Kies oder Kalk, sondern aus einer weichen Erdart, als Lehm, Thon oder Moor gebildet seyn; am besten ist der Moor aus dem Teiche oder Sumpfe, aus dem die Blutegel genommen worden. Dieser nöthigenfalls künstlich anzulegende Grund muß wenigstens 8—12 Zoll tief seyn, damit sie bei eintretender Kälte sich darin eingraben und ihr Gehäuse darin zubereiten können. Ist ein natürlicher Teich, der zu einem solchen Behälter sich eignete, zu groß, so kann ein Theil dazu eingedämmt werden, entweder durch einen Erddamm, oder auch durch dichte zusammengefügte Bretter, die aber nicht von hartem Holze, als Eichen, auch nicht neu seyn müssen, weil das Wasser sie auslaugt, und dadurch die Egel absterben. Bei künstlichen Gruben muß der Rand derselben mit einem Walle umgeben seyn, um das Eindringen des Regenwassers von den benachbarten Ländereien zu verhüten. Außerhalb des Walles in der Mitte seiner Länge muß auf jeder Seite ein Ständer von Kreuzholz eingegraben werden, der 16—18 Zoll über demselben hervorragt; beide Ständer werden durch ein Stück Halbholz mit einander verbunden, das mithin über die Mitte der Grube fortläuft. An diesem werden 4 Thüren befestigt, von denen immer 2 nach jedem Rande des Walles hinlaufen, die hier in einen angebrachten Falz einschlagen. Der Raum zwischen den beiden Ständern und den geschlossenen Thüren muß mit Brettern dicht verwahrt seyn. Durch das Oeffnen oder Schließen einer oder der andern Thür oder sämmtlicher Thüren wird der Eigenthümer in den Stand gesetzt, seine Egel nach Möglichkeit gegen die schädliche Einwirkung der Witterung und der Jahreszeit zu sichern, im Sommer gegen die zu große Hitze dadurch, daß die der Sonnenseite zu-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0507-4

gekehrten Thüren geschlossen und die entgegengesetzten geöffnet werden, und im Winter durch das Schließen sämmtlicher Thüren, damit das Wasser nicht ausfriert, zu welchem Ende die Thüren noch mit Stroh bedeckt werden können. Dieselben mit Mist zu bedecken, ist hier wegen der sich aus demselben entwickelnden Ammoniakdämpfe nicht zulässig. Bei sehr heftigen Regengüssen müssen die Thüren ebenfalls zugemacht werden, damit nicht das Wasser überlaufe und die Egel entführe.

Für die Brut und jungen noch nicht brauchbaren Blutegel muß eine ähnliche Grube, aber von geringerem Umfange, besorgt werden. In diese werden die Gehäuse, die man in den Monaten Mai bis Ende September sorgfältig in der größern Grube, in Sümpfen und Teichen aufgesucht hat, hineingesetzt und hier das Ausschlüpfen der Jungen abgewartet. Haben diese Egel ein Alter von 6 Monaten erreicht, so giebt man ihnen Gelegenheit Blut zu saugen, da sie den gemachten Erfahrungen zufolge nicht eher zur Vermehrung tauglich sind, und dies möchte hier nicht durch Pferde oder Kühe, sondern durch kleineres Vieh, als Hunde u. dergl. zu bewirken seyn, am zweckmäßigsten Frösche, denen man die Hinterschenkel gebunden hätte, damit sie nicht entweichen können. Sollte einer dadurch getödtet worden seyn, so darf er nicht in der Grube liegen bleiben, sondern muß sogleich daraus entfernt werden. Wenn die Egel gehörig ausgewachsen sind, werden sie in die größere Grube gesetzt.

Aus dem Moorgrunde sind die Egel zur Winterszeit schwer auszufinden, weil sie sich in Gestalt einer kleinen schwarzen Kugel zusammenrollen; es ist daher gut, für diesen Zweck eine besondere Grube mit feinem Lehmgrund zu halten. Einer Abwartung, als Fütterung u. dergl. bedarf es weiter nicht.

Ueber die Fortpflanzung und Anatomie der Blutegel sind zu vergleichen die Abhandlungen von Achard, Virey, Pelletier und Huzard in dem angeführten XXIII. Hefte des Buchner'schen Repertoriums. Nach Broffat (Brande's Archiv V. S. 250.) unterliegen die Blutegel folgenden drei, gleichsam epidemischen Krankheiten: 1) die metallische Krankheit. Die Blutegel bekommen ein besonderes Ansehen und Knoten. Diese Krankheit stellt sich meistens vom März bis Ende Mais ein, und dauert 11 Tage; nur wenige überleben sie. Behandlung. Man bringt die kranken Blutegel in poröse irdene Gefäße, die aus einem Gemische von Thon und Kohlenpulver nur leicht gebrannt sind, so werden sie einem starken Luftzuge ausgesetzt, um das Wasser abzukühlen; an die rauhen Stellen des Gefäßes legt sich viel Schleim an; ein hölzernes Gefäß, welches solchen Blutegeln zum Aufenthalte gedient hat, darf nie wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. 2) Schleimkrankheit. Diese zeigt sich vom Juni bis August. Sie dauert nur drei Tage, und scheint die häufigste zu seyn. Die Blutegel werden dabei weich und schleimig. Behandlung. Die kranken Blutegel legt man täglich in ein Bad von lauwarmen Wasser, und sodann in ein Gemisch von Wasser mit Kohlenpulver und $\frac{1}{16}$ Honig. Brandes hat die Trefflichkeit dieser Curmethode bestätigt. 3) Gelbsucht. Diese ist die schrecklichste von allen und die Krisis

dauert nur ungefähr 8 Stunden; man muß daher schnell zur Hülfe kommen. Behandlung. Das sicherste Mittel ist, den Schwanz des Thieres mit einer Nadel zu durchstechen, worauf ein gelber Saft ausfließt; hierauf bringt man die operirten Blutegel in lauwarmes Wasser, welches $\frac{1}{100}$ braungekochten Zucker enthält.

Dr. Pallas (Froriep's Notizen, October 1826. S. 231.) hat bei einem sehr großen Mangel an Blutegeln Versuche gemacht, die schon gebrauchten vom Blute zu befreien, und zu neuer Benutzung aufzubewahren. Er ließ im Freien eine Grube graben, deren Wandungen sich unten enger zusammenzogen. In der Mitte der Grube ließ er ein zweites Loch graben, welches mit einer durchlöcherten und verzinnten Blechtafel verschlossen wurde, damit die Blutegel keinen Durchgang finden konnten. Um den Abfluß des Wassers durch die kleinen Löcher der Blechtafel zu erleichtern, ließ er dem Boden der Grube eine geringe Neigung geben, hierauf denselben nebst den Wandungen der Grube mit Backsteinen auslegen, damit sich die Blutegel nicht in die Erde eingraben konnten. Dann wurden Rasenschichten neben einander gelegt, und der Raum mit abwechselnden Schichten von thoniger Erde und von gewöhnlicher leichter Erde ausgefüllt. Der leere Raum wurde nun mit Regenwasser ausgefüllt, und die Blutegel hineingesetzt. Diese verließen bald das Wasser, um sich zwischen die Rasenschichten zu begeben, und später drangen sie in die aufgefüllte Erde. Sie blieben 14 Tage lang in dieser Grube, und man trug Sorge, die eingefüllte Erde alle zwei Tage zu begießen. Auf diese Weise behielt sie ihre Feuchtigkeit, und das Wasser führte das Blut weg, welches die Blutegel von sich gegeben hatten. Auch die Erde, welche die Blutegel umgab, war häufig von Blut gefärbt. Sie konnten nach 14 Tagen von neuem gebraucht werden.

In derselben Zeitschrift S. 240. schlägt der Apotheker Petit-Ferdinand zu Amiens Folgendes vor. Wenn der Blutegel von der Haut abfällt, so macht der Chirurg an der Rückenseite gegen das hintere Ende hin mit einer Lancette einen Einstich von 1—$1\frac{1}{2}$ Linien Länge. Das in dem Darmcanale enthaltene Blut wird dann mit Gewalt hervorspritzen, und um das fernere Heraustreten desselben zu begünstigen, bringt man den Blutegel in Wasser von einer Temperatur von 20—25 ° C. Nachdem er daselbst $\frac{1}{4}$ Stunde gewesen ist, bringt man ihn in ein großes Gefäß, dessen Wasser man wenigstens alle 2 Tage erneuern muß. Die kleine Operation erfodert wenig Zeit, ist für die Blutegel gar nicht nachtheilig, die kleine Wunde heilt sehr schnell, und in wenig Tagen ist der Blutegel wieder im Stande, Dienste zu leisten. Daß übrigens von der Anwendung schon gebrauchter Blutegel kein Nachtheil zu besorgen sey, hat Dr. Pallas durch an sich selbst angestellte Versuche bewiesen, indem er Blutegel, die an venerischen Geschwüren angesetzt gewesen waren, an seinem Arme Blut saugen ließ, ohne den mindesten Nachtheil zu erfahren.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0509-8

Hordeum. Malz. Gerstenmalz.

Verschiedene angebaute Arten von Hordeum Linn.

Hordeum. Der ausgeschlaubte Saamen. Gerstengraupen.

Hordeum vulgare Linn. Die gemeine Gerste.
Hordeum hexastichon Linn. Die sechszeilige Gerste.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. II. Ord. 4. Gramineae.

Das Vaterland dieser bekannten Getreideart ist nicht mit Gewißheit zu bestimmen; sie soll in Sicilien und auch in Rußland wild wachsen. Nach einer gelehrten Abhandlung (Froriep's Notizen, December 1826. S. 38.) soll die Bergkette des Libanon das Land seyn, in welchem die Gerste und der Weizen einheimisch sind.

Proust (Gehlen's J. II. S. 376.) unterschied bei den Saamen einen eigenthümlichen Gerstenstoff, den er Hordein nannte, und der dem Stärkemehle sehr nahe verwandt ist. Er erhielt nämlich durch Auswaschen des Gerstenmehls ein Satzmehl, wovon sich nur ein Theil mit kochendem Wasser zu Kleister löste, während das Hordein ungelöst blieb. Dieses erscheint als ein gelbes körniges Pulver, welches bei der trocknen Destillation kein Ammoniak liefert, und beim Keimen der Gerste größtentheils in Stärkemehl verwandelt zu werden scheint. Das Mehl ungekeimter Gerste enthält nach Proust: Hordein 55; Stärkemehl 32; in kaltem Wasser auflösliche Materien, Gummi 4, Schleimzucker 5; Kleber, der sich beim Abdampfen des Wassers in Flocken ausschied, 3; gelbes Harz 1. Das Mehl von gekeimter Gerste oder das Gerstenmalz enthielt: Hordein 13; Stärkemehl 57; in kaltem Wasser lösliche Theile 30.

Einhoff (Gehlen's J. VI. S. 62.) fand die reife Gerste zusammengesetzt, aus: Hülse 18,75; Mehl 70,05; Wasser 11,20. Das Mehl enthielt faserige Materie (aus Kleber, Stärkemehl und Holzfaser bestehend) 7,29; Stärkemehl 67,18; Gummi 4,62; Schleimzucker 5,21; Kleber 3,52; Eiweiß 1,15; sauren phosphorsauren Kalk mit Eiweißstoff 0,24; Wasser 9,37; Verlust 1,42.

Fourcroy und Vauquelin fanden in 100 Th. 1 Th. eines eigenthümlichen, durch Weingeist ausziehbaren, grünlichbraunen, dicken Oels, welches dem Gerstenbrote den bittern Geschmack, und dem Branntweine den unangenehmen Fuselgeruch und Geschmack mittheilt; Zucker, Stärkemehl, thierischen Stoff, der zum Theil in Essig auflöslich ist, zum Theil aus glutinösen Flocken besteht, phosphors. Kalk und Talk, Eisenoxyd und Kieselerde, oft auch freie Essigsäure.

Prof. Zenneck hat nachgewiesen, daß das Hordein Proust's kein besonderer Stoff als Bestandtheil des Gerstenmehls sey, sondern daß es aus der Hülsensubstanz der zermalmten Gerstenkörner und einem denselben anklebenden Theile von Stärke bestehe. Die Zerlegung des Hordeins bewirkte er

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0510-9

bloß durch Kneten der erhaltenen Rückstände mit kochendem Wasser in einem leinenen Beutel.

Die Abkochung der ganzen Gerste ist etwas scharf, bitter und abführend, welche Eigenschaft dieselbe von der Saamenhaut erhält. Der Absud der enthülseten Saamen aber, der Gerstengraupe, welche den Namen Perlgraupe enthält, wenn die Saamen noch auf einer Mühle zugerundet sind, ist kühlend, lindernd und etwas nahrhaft, und ist schon seit den ältesten Zeiten, namentlich von Hippokrates, als Heilmittel benutzt worden.

Das Malz übertrifft vielleicht an Heilkräften die Gerstengraupen noch, wofür auch das durch die Gährung beim Malzen veränderte Verhältniß der Bestandtheile spricht.

Häufig wird aber auch das Gerstenmehl gebraucht, um daraus das **Hordeum praeparatum** anzufertigen.

Hydrargyrum seu Mercurius vivus. Queckſilber.

Es wird in Bergwerkshütten aus eigenthümlichen Erzen durch Destillation erhalten, vorzüglich wird es aus Idria zugeführt. Ein weißes, flüssiges, flüchtiges Metall von 13,5 spec. Gew. Gemeiniglich kommt es im Handel mit Blei und andern Metallen verunreinigt vor.

Dieses Metall, welches seit den ältesten Zeiten bekannt ist, kommt häufig gediegen, noch häufiger als Schwefelqueckſilber, sehr selten als Chlorqueckſilber vor. Sowohl gediegen als vererzt findet es sich in großer Menge in Istrien, Ungarn, Siebenbürgen; auch haben Rußland, Spanien und Peru ansehnliche Bergwerke. Das meiste jetzt im Handel vorkommende Queckſilber soll aus Ostindien gebracht werden. An manchen Orten findet es sich zwischen den Queckſilbererzen eingeschlossen, oder es fließt durch die Felsenritzen, und bleibt in den Höhlungen stehen, aus denen man es ausschöpft.

Die Darstellung des Queckſilbers aus dem Zinnober durch Eisen haben schon die griechischen und römischen Naturforscher Aristoteles, Dioskorides, Plinius u. s. w. beschrieben. Philippus Komikus bezeugt, daß Dädalus zur Belebung einer hölzernen Statue Queckſilber gebraucht habe, und es ist wohl wahrscheinlich, daß er die Kenntniß dieses Metalls den Priestern von Memphis (die Griechen holten nämlich ihre Kenntnisse aus Aegypten) zu verdanken gehabt habe. Dasselbe wird von Aristoteles erwähnt, der auch noch bei einer andern Gelegenheit das Queckſilber anführt. Theophrastus Eresius beschreibt eine Methode, das Queckſilber aus dem Zinnober durch Reiben mit Essig in einem kupfernen Mörser zu scheiden.

Jetzt befolgt man folgendes Verfahren. Die Queckſilbererze werden bald in Retorten oder Töpfen, bald in besondern Oefen, in denen sie unmittelbar vom Flammenfeuer berührt werden, destillirt. Der Schwefel wird dem Queckſilber entweder durch beigefügten ungelöschten Kalk oder Hammerschlag, oder

durchs Verbrennen desselben vermittelst der hinzutretenden Luft entzogen; die Quecksilberdämpfe werden in Vorlagen, oder in langen Canälen oder in Kammern verdichtet. Im Zweibrückenschen, wo die Scheidung des Quecksilbers am vollkommensten bewirkt wird, wird das gepochte Erz mit ungelöschtem Kalke aus eisernen Retorten in gläserne Vorlagen überdestillirt. Das Quecksilber wird von hier in großen Flaschen von geschmiedetem Eisen ausgeführt, die mit einer wohl schließenden eisernen Schraube verschlossen sind, und circa 70 Pfund halten. In Spanien wird das Erz in eigenen Oefen geröstet, wobei der Schwefel verbrennt, und das Quecksilber in Dämpfe verwandelt wird, die in Aludeln aufgefangen werden, welche so gestellt sind, daß die Dämpfe darin condensirt werden können. Diese Operation bewirkt eine Ersparung an Brennmaterial, aber es geht viel Quecksilber verloren. Aus Spanien kommt das Quecksilber in Säcken von Schaaffellen, wovon 2—3 in einander gelegt sind.

Das so gewonnene Quecksilber ist nicht völlig rein; es wird aber auch zuweilen noch absichtlich aus Gewinnsucht durch Blei oder Zinn, unter Vermittlung des Wismuths, das vorher mit dem Blei oder Zinn zusammengeschmolzen worden, verunreinigt. Ein auf solche Weise verunreinigtes Quecksilber giebt sich schon gewöhnlich durch seine äußern Eigenschaften zu erkennen, denn es hat keine so glänzende Oberfläche, wie das reine; auf Papier geschüttet, ist es nicht leicht flüssig, zieht sich vielmehr in länglichrunde Theilchen mit einem Schwanze und hinterläßt auf dem Papier einen schwärzlichen Staub; die Kügelchen vereinigen sich nur langsam, und schmutzen die Finger ab, wogegen ein reines Quecksilber leicht fließt, sich in kleine Kügelchen vertheilt, die sich leicht wieder vereinigen, und keinen Schmutz hinterlassen.

Die Gegenwart der das Quecksilber verunreinigenden Metalle wird auf folgende Weise nachgewiesen. Das Blei wird von dem mit einem solchen Quecksilber digerirten Essig aufgelöst, ertheilt diesem einen süßen Geschmack, und schwefelwasserstoffhaltiges Wasser schlägt Schwefelblei nieder. Das beigemischte Zinn wird von der darauf gegossenen Salpetersäure zu einem weißen Kalke zerfressen, und macht die Flüssigkeit milchig. Wismuth wird zwar mit dem Quecksilber zugleich aufgelöst, aber durch zugesetztes Wasser als Wismuthniederschlag in Form eines weißen Pulvers ausgeschieden. Wird die salpetersaure Quecksilberauflösung zur Trockne verraucht, und das trockene Salz in einer Retorte geglüht, so muß es sich bei anhaltender Hitze vollständig reduciren, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Bleibt aber ein solcher, ist dieser gelb oder gelblich, und löst er sich in Salpetersäure auf, so rührt er von Blei oder Wismuth her, oder, was jedoch sehr selten der Fall ist, von Antimonium. Löst sich der Rückstand in Salpetersäure nicht auf, oder doch nicht vollkommen, wohl aber in Salzsäure, und wird diese Auflösung durch schwefelwasserstoffsaures Ammoniak gelb gefällt, so war der Rückstand Zinnoxyd. Ueberhaupt muß das Quecksilber in einem eisernen Löffel stark erhitzt gänzlich verdampfen, ohne irgend einen Rückstand zu hinterlassen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0512-0

Um das Quecksilber von diesen Beimischungen anderer Metalle zu befreien, und ein gereinigtes Quecksilber darzustellen, muß dasselbe einer Destillation unterworfen werden, wie im 2ten Theile bei **Hydrargyrum depuratum** gezeigt werden wird.

Das reine Quecksilber ist zinnweiß, stark glänzend, und unterscheidet sich von allen andern Metallen durch seine außerordentliche Flüssigkeit, welche es nicht nur bei der gewöhnlichen Temperatur, sondern auch bei den niederern Graden derselben beibehält, und nur erst bei einer Kälte von — 32 ° R. (durch Vermischen des trocknen salzsauren Kalkes mit Schnee zu erhalten) verliert, wo es fest wird, in Oktaëdern und Nadeln krystallisirt, sich strecken, mit dem Messer schneiden und hämmern läßt, bei der Berührung heftige Schmerzen erregt und die Haut weiß macht. Das spec. Gew. des flüssigen Quecksilbers ist = 13,568, des gefrornen 14,391. Es ist flüchtig und erhebt sich schon bei der gewöhnlichen Temperatur in kleinen Theilchen, besonders im luftleeren Raume, wie bei Barometerröhren zu sehen ist, daß es sich aber auch im lufterfüllten Raume verflüchtige, sieht man daran, daß, wenn man einen Tropfen Quecksilber in eine Bouteille schüttet, und am Pfropfen, mit dem man dieselbe verschließt, ein Goldblatt befestigt, dieses nach einigen Tagen amalgamirt ist. Vom Wärmestoffe wird es in allen Temperaturen, bis zum Siedepunkte, gleichförmig ausgedehnt (daher seine vorzügliche Brauchbarkeit, die Grade der Temperatur zu messen). Der Siedepunkt desselben fällt nach Hinrich's Versuchen bei 356½ °, nach Dulong und Petit bei + 360 ° ein, bei welchem es sich in Dämpfen verflüchtigt.

Das Quecksilber hat zum Sauerstoffe nur eine geringe Verwandtschaft, denn durch die bloße Einwirkung der atmosphärischen Luft wird es nicht merklich verändert. Schüttelt man das Quecksilber beim Zutritte der Luft unter Mitwirkung von Wasser, Aether, Terpenthinöl, Zucker, Fett u. s. w. so wird es in ein schwarzes Pulver verwandelt, welches sonst unter dem Namen: **Aethiops per se**, bekannt und gebräuchlich war. Es ist dieses aber nicht eine Verbindung des Quecksilbers mit Sauerstoff, nicht ein Oxydul, sondern es besteht aus kleinen, durch die Zwischenlagerung der fremden Materien getrennten Kügelchen, die sich bei Entfernung der fremden Materien wieder zu laufendem Quecksilber vereinigen. Gleiches gilt von dem Tödten, der Extinction des Quecksilbers durch anhaltendes Zusammenreiben mit Zucker, Gummi, Fett ꝛc., welches man sonst für eine Oxydulation angesehen hat. Bei Oxydirung des Fettes ꝛc. wird jedoch allmälig ein Theil Quecksilber wirklich in Oxydul verwandelt. Wird aber das Quecksilber bei der Siedehitze unter Zutritt der Luft in Dämpfe verwandelt, so geht es mit dem Sauerstoffe derselben eine Verbindung ein, und wird in rothes Oxyd verwandelt, sonst unter dem Namen **Mercurius praecipitatus per se** bekannt. Eine größere Hitze hebt aber diese Verbindung wieder auf, treibt den Sauerstoff aus, und stellt das metallische Quecksilber wieder her.

Das Quecksilber stellt mit dem Sauerstoffe 2 Verbindungen dar: 1) das Oxydul. Man erhält dasselbe, wenn Quecksilberchlorür (**Calomel**) in feinem

Pulver mit einer Lauge von kaustischem Kali digerirt wird; doch muß das Salz recht fein pulverisirt seyn, und die Kalilauge auf einmal in einem großen Ueberschusse zugesetzt werden. Auch aus der salpetersauren Queckſilberoxydulauflösung wird es durch kaustisches Kali oder Ammoniak gefällt. Das Queckſilberoxydul ist ein schwarzes Pulver, welches im Tageslichte sowohl, als in der Siedehitze in metallisches Queckſilber und in Oxyd zersetzt wird, daher darf man bei der Bereitung mit kaustischem Kali keine Wärme anwenden; wird das trockne Oxydul gelind erhitzt, so verflüchtigt sich metallisches Queckſilber und Oxyd bleibt zurück. Das Oxydul besteht aus 96,20 Queckſilber und 3,80 Sauerstoff. 2) Das Oxyd. Man erhält dasselbe auf die schon oben angezeigte Weise, nämlich durch anhaltendes Kochen unter Zutritt der Luft, oder gewöhnlicher durch Zersetzung des salpetersauren Queckſilbers. Dieses Oxyd ist ein officinelles Präparat, und wird daher im 2ten Theile noch besonders eine Stelle finden. Es besteht aus 96,68 Queckſilber und 7,32 Sauerstoff.

Beide Verbindungen des Queckſilbers mit dem Sauerstoffe gehen als Basen Verbindungen mit dem Säuren ein, stellen die Queckſilber-Oxydul- und Oxydsalze dar, und geben verschiedene pharmaceutische Präparate.

Das metallische Queckſilber wird von der Salpetersäure in allen Temperaturen aufgelöst; von der Hydrochlorsäure (Salzsäure) und der Schwefelsäure dagegen wird es nicht in der Kälte angegriffen, durch Kochen mit letzterer im concentrirten Zustande wird es oxydirt, es wird schweflige Säure frey, und es bildet sich schwefelsaures Queckſilberoxydul oder Oxyd, je nach der Menge der angewandten Säure und der Dauer der Operation.

Mit Schwefel verbindet sich das Queckſilber leicht, und giebt eine nach dem verschiedenen Aggregationszustande verschieden gefärbte Masse; vergleiche Cinnabaris.

Auch mit dem Chlor vereinigt sich das Queckſilber leicht. Wird Queckſilber im Chlorgase erhitzt, so erfolgt die Vereinigung unter Feuerentwickelung; es bildet sich einfach und doppelt Chlorqueckſilber (Kalomel und Sublimat), die zwei bis jetzt bekannten Verbindungsstufen, beide sehr wichtige pharmaceutische Präparate.

Die Verbindungen des Queckſilbers mit andern Metallen nennt man Amalgama; sie können bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft in flüssiger Form erhalten werden, und sind in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. Bei der Auflösung eines Metalls in Queckſilber finden wir, daß eine bestimmte Verbindung zwischen dem Queckſilber und dem zugesetzten Metalle im übrigen Theile des Queckſilbers aufgelöst ist, woraus die erstere oft krystallisirt, und von welchem sie durch mechanische Mittel beinahe völlig abgeschieden werden kann. Die Benutzung dieser Eigenschaft haben wir bei der Ausscheidung des Silbers und Goldes aus den Erzen kennen gelernt. Davy hatte wahrgenommen, daß festes Wismuthamalgam mit festem Bleiamalgam eine flüssige Verbindung bildet, Döbereiner (Zur pneum. Ch. V. 1825. S. 59.) bemerkte hiebei, daß während der Vereinigung beider Amalgame Kälte entsteht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0514-2

Von dergleichen kälteerregenden Metallauflösungen, die wohl von denselben Ursachen, welche die Kälteerzeugung bei Auflösung der krystallisirten Salze in Wasser bedingen, abzuleiten seyn möchten, werden mehrere Beispiele angeführt.

Das Quecksilber ist eins der schätzbarsten Heilmittel, ein Specificum gegen Syphilis, aber auch in vielen andern Krankheiten, z. B. den Entzündungen ꝛc., unentbehrlich, daher es auch sehr vielen Präparaten und Compositis zur Basis dient. Die Abkochung des laufenden Quecksilbers mit Wasser oder Milch, wobei dasselbe nicht den mindesten Gewichtsverlust erleidet, wird als wurmtreibend gerühmt. Auch zu Räucherungen gegen syphilitische Nachkrankheiten, alte Rheumatismen ꝛc, wird es gebraucht, und die zu dergleichen Räucherungen bei den Indianern übliche Masse ist folgende: Quecksilber ℥jjj, Bleiglätte ℥j ℈jj (℥jß), rothes Bleioxyd ℥jjj und Kupfervitriol ℥ß. Aber auch in den Künsten und Gewerben bedient man sich des Quecksilbers zu verschiedenem Gebrauche, wie zum Belegen der Spiegel, zu Vergoldungen und Versilberungen (wozu nämlich die Gold- und Silberamalgame angewandt werden, und von denen das Quecksilber durch Hitze nachher ausgetrieben wird), zum Ausziehen des Goldes und Silbers aus den Erzen u. s. w. Da das Quecksilber auf den Organismus nachtheilig einwirkt, so daß die Präparate daraus zu den sehr gefährlichen Giften gezählt werden müssen, so äußern auch die Dämpfe des metallischen Quecksilbers ihre nachtheilige Einwirkung, so daß Vergolder, Spiegelmacher, welche diesen Dämpfen lange ausgesetzt gewesen sind, nach mehrjähriger Arbeit bisweilen in eine eigene plagende Schwachheit des Muskelsystems verfallen, die von einem beständigen Zittern in jedem dem Willen unterworfenen Muskel begleitet wird, welchem selten geholfen werden kann. Es ist also von der größten Wichtigkeit, daß diese Personen sich so viel als möglich hüten, das Metall mit bloßen Händen zu berühren, und daß die Dämpfe desselben aus dem Zimmer gehörig abgeleitet werden.

Der schädlichen Wirkungen wegen ist es von Wichtigkeit, das Quecksilber in den Vermischungen und Auflösungen erkennen zu können. Die Quecksilbersalze haben im Allgemeinen folgende Merkmale: 1) Blausaures Eisenkali giebt einen weißen Niederschlag; 2) Schwefelwasserstoff einen schwarzen; 3) Salzsäure oder salzsaures Natron mit den Oxydulsalzen einen weißen; 4) Gallussäure einen orangegelben Niederschlag; 5) eine Kupfertafel giebt Quecksilber; 6) die Oxydulsalze werden durch alle Alkalien schwarz, die Oxydsalze pomeranzengelb gefällt, ausgenommen durch das Ammoniak, welches die letzteren weiß fällt; 7) in einer schwachen Rothglühhitze sind sie flüchtig. Die sicherste Probe, das Quecksilber mag nun im trocknen Salzzustande oder in der Auflösung vorhanden seyn, besteht darin, daß man das Salz auf eine gut polirte Kupferplatte streicht, oder diese Platte in die Auflösung taucht. In beiden Fällen bildet sich ein weißer Fleck oder ein weißer Ueberzug, die durchs Reiben weiß werden, und in der Hitze verschwinden, was sie von den durch Silber bewirkten Flecken unterscheidet, welche feuerbeständig sind.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0515-8

Eine queckſilberhaltige Subſtanz mit einem Tropfen Salzſäure auf Gold mit einem Stück Zinn gelegt, giebt augenblicklich ein Goldamalgama; bei Sublimat iſt der Säurezuſatz unnöthig. Durch dieſe Mittel kann auch eine ſehr geringe Menge Queckſilber nachgewieſen werden. (Vergl. Hydrargyrum muriaticum corrosivum im 2ten Theile.)

Hydrargyrum muriaticum corrosivum venale. Mercurius sublimatus corrosivus venalis. Bichloretum Hydrargyri venale. Käufliches ätzendes ſalzſaures Queckſilber. Käufliches Queckſilberſublimat.

Ein Präparat chemiſcher Fabriken aus Queckſilber, Schwefelſäure und ſalzſaurem Natron.

Ein kryſtalliniſches, zuſammenhängendes, ſchweres Salz, in ſechszehn Theilen Waſſer, in zwei und einem halben Theile Alkohol und in drei Theilen Schwefeläther auflöslich, im Feuer ſich verflüchtigend; aufs höchſte giftig. Beſteht aus Queckſilber und Chlor. Es werde nur zu den Queckſilberpräparaten angewandt. Bewahre es mit Vorſicht den Vorſchriften gemäß auf.

Hydrargyrum oxydatum rubrum venale. Mercurius praecipitatus ruber venalis. Oxydum hydrargyricum venale. Käufliches rothes Queckſilberoxyd. Käufliches rothes Queckſilberpräcipitat.

Ein Präparat chemiſcher Fabriken aus Queckſilber und Salpeterſäure.

Ein Pulver in ſchuppenförmigen glänzenden ſehr rothen Theilchen, aus Queckſilber und Sauerſtoff beſtehend, gemeiniglich noch mit Salpeterſäure gemiſcht. Man hüte ſich, daß es nicht mit Minium und Ziegelpulver, die im Feuer ſich nicht verflüchtigen, verfälſcht ſey. Bewahre es mit Vorſicht den Vorſchriften gemäß auf.

Von beiden Präparaten wird im 2ten Theile gehandelt werden.

Hyoscyamus. Die Blätter. Bilſenkraut.

Hyoscyamus niger Linn. Eine zweijährige, auf Schutthaufen und an Wegen häufige Pflanze.

Stengelhalbumfaſſende, buchtige, zottige, bleich grünliche Blätter, von widrigem narkotiſchem Geruche. Sie müſſen, wenn

die Pflanze zu blühen anfängt, gesammelt und nicht über ein Jahr aufbewahrt werden. Die Gabe bis drei Gran.

Hyoscyamus niger Linn. Schwarzes Bilsenkraut.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Das blasse, ins Dunkelgelbe fallende Grün der Blätter, die traurige düstere Farbe der Blumen, der ekelhafte widrige Geruch aller Theile, erregen beim ersten Anblicke den Verdacht giftiger Eigenschaften bei dieser Pflanze, die durch ganz Deutschland, und in allen übrigen Ländern Europas in Dörfern, an Zäunen, Wegen, auf Schutthaufen und an andern angebauten Orten wächst.

Die Wurzel ist fingersdick, lang, runzlig, wenig ästig, auswendig braun, inwendig weiß, und bringt einen aufrechten, ästigen, zottigen, etwas klebrigen, 2—3 Fuß hohen Stengel hervor. Die zottigen, mit klebrigen Haaren bedeckten, weichen Blätter stehen abwechselnd, sind stiellos, breit, eiförmig-lancettförmig. Die fast aufsitzenden Blüthen bilden am Ende der Zweige eine blättrige, lockere, einseitige Aehre. Der röhrige Kelch ist einblättrig, fünfspaltig. Die trichterförmige kurzröhrige Krone ist ebenfalls einblättrig, mit fünf aufrechten, stumpfen Lappen versehen, von schmutzig gelber Farbe und mit netzförmigen purpurrothen Adern durchzogen. Die Frucht ist eine eiförmige, stumpfe, zweifächrige Kapsel mit vielen Saamen.

Die Blüthezeit ist Mai und August.

Der Geschmack der Blätter ist weichlich, fade und ekelhaft, getrocknet etwas bitterlich; der Geruch äußerst widerlich und betäubend. Man verwechselt sie mit den Blättern des weißen Bilsenkrautes (**Hyoscyamus albus L.**), welches nicht so häufig ist, als das schwarze. Die Blätter sind kleiner, stumpfer, wolliger und gestielt.

Ehedem war auch die Wurzel im Gebrauche; jetzt zwar nicht mehr, aber die Saamen des Bilsenkrautes werden bisweilen zu Räucherungen gegen Zahnweh angewandt, wobei jedoch Vorsicht nöthig ist, indem leicht Betäubung davon entstehen kann. Diese Saamen sind klein, rundlich, fast nierenförmig, etwas zusammengedrückt, runzlig, von aschgrauer Farbe, einem unangenehmen betäubenden Geruche und bitterlichen Geschmacke. Spec. Gew. = 0,913.

Brandes (Trommsd. N. J. V. 1. S. 35.) hat eine ausführliche Analyse des Bilsenkrautsaamens geliefert, wobei besonders darauf Bedacht genommen wurde, ob auch hier ein basischer Stoff als Hauptträger des Narkotismus ausgeschieden werden könne.

Der Saame wurde wiederholt mit Alkohol digerirt, und von den klar gelblichen Tincturen der Weingeist bis auf $\frac{1}{4}$ abgezogen. Am Boden der Retorte zeigte sich ein ausgeschiedener öliger Stoff, der durch ein Filtrum abgesondert wurde. Die von den fetten Oele getrennte geistige Flüssigkeit wurde noch weiter abgeraucht, wobei sich auch etwas Oel ausschied und hierauf zur

Trockne verdunstet. Der Rückstand wurde wieder in Alkohol aufgelöst und mit Wasser vermischt, wodurch eine weißliche Trübung entstand. Der die Trübung verursachende Stoff wurde auf einem Filter gesammelt, und noch mit Wasser ausgewaschen. Hierauf wurde er wieder in Alkohol gelöst und in gelinder Wärme abgedunstet; der Rückstand war eine stearinartige, oder vielmehr fettwachsartige Materie. Die wäßrige filtrirte Flüssigkeit wurde gleichfalls abgeraucht, und eine weiße durchsichtige Masse erhalten, welche betäubend roch, außerordentlich bitter schmeckte, an der Luft zerfloß, in Wasser und Alkohol gleich auflöslich sich zeigte, das narkotische Princip des Bilsenkrautes enthielt, und auf die Pupille mit großer Intensität wirkte. Aetzlauge schied aus der wäßrigen Lösung einen gallertartigen weißen Bodensatz unter geringer Entwickelung von Ammoniak aus; Ammoniak verhielt sich ähnlich. (Galläpfeltinctur, die im Allgemeinen auf alle Pflanzenalkaloide reagirt, wurde nicht angewendet.) Brandes konnte dieses Alkaloid für sich nicht darstellen, die Auflösung wurde durch basisches essigsaures Blei gefällt, und nach Ausscheidung des überschüssig zugesetzten Bleies aus der rückständigen essigsauren Auflösung durch phosphorsaures Natron die Kalkerde ausgeschieden, worauf Ammoniak und Aetzlauge noch schleimige Niederschläge hervorbrachten, welche das Alkaloid darstellten, das mit Säuren eigenthümliche Salze bildete. Doch sind diese nicht näher beschrieben, und das Alkaloid, Hyoscyamin, mehr als problematisch zu betrachten. Die aus dem Bleiniederschlage getrennte Säure verhielt sich wie Aepfelsäure.

Der Saamenrückstand wurde hierauf mit Wasser ausgezogen, dann noch mit Alkohol ausgekocht, endlich auch Salzsäure und Kalilauge zur gänzlichen Erschöpfung angewandt.

Nach Brandes enthalten 1000 Th. Saamen: fettes in Alkohol leicht lösliches Oel 196,0; fettes in Alkohol schwer lösliches Oel 460; besondere stearin- oder vielmehr fettwachsartige Substanz 9,5; Wachs 14,0; Halbharz 30,0; thierisch-vegetabilische Materie (Phyteumakolla) 34,0; Eiweiß 8,0; verhärtetes Eiweiß 37,5; äpfelsaures Hyoscyamin mit Antheilen von äpfels. Kalk, Talkerde, Kali- und Ammoniaksalz 63,0; schwefels., äpfels. und salzs. Kali 4,0; äpfels. Kalk 4,0; äpfels. Talkerde 2,0; phosphors. Kalk und Talk 24,0; Gummi 12,0; Traganthstoff 24,0; Stärkemehl 15,0; Schleimzucker eine Spur; Faser 260,0; Wasser 240,0. S. = 1025. Die Asche enthielt: kohlens., phosphors., salzs. und schwefels. Kali; viel phosphors. Kalk und Kieselerde, schwefels. Kalk, Eisenoxyd, Manganoxyd, Kupferoxyd eine geringe Spur.

Auch Peschier (Trommsd. N. J. V. 1. S. 92.) will gleichzeitig mit Brandes ein Alkaloid aus den Blättern des Bilsenkrautes dargestellt haben, indem er die Abkochung mit Ammoniak und Talkerde behandelte; ferner erhielt er eine eigenthümliche Säure, und ein aromatisches nach Kantharidin riechendes Princip.

Runge schied auf die bei **Belladonna** angegebene Weise die narkotische Base des Bilsenkrautes aus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0518-5 DFG

Lindbergson (Scherer's Allgem. nordische Annalen VIII. S. 60.; und Berzelius Jahresbericht 1ster Jahrg. S. 97.) konnte das von Brandes beschriebene, vermittelst ätzenden Talks und Alkohols erhaltene Hyoscyamin im Bilsenkrautextracte nicht vorfinden, und er zweifelt, daß der narkotische Bestandtheil des Bilsenkrauts auch ein alkalischer, im Wasser unauflöslicher Stoff sey. Der aus dem Bilsenkrautextracte durch Aetzammoniak erhaltene sparsame Niederschlag bestand bloß aus phosphors. Ammoniaktalk. Dagegen stellte Lindbergson nach der Methode von Runge einen narkotischen Stoff dar, indem er die filtrirte Lösung des Bilsenkrautes mit basischem essigsaurem Blei fällte, die über dem Niederschlage befindliche kaum gefärbte Flüssigkeit abschied, Schwefelwasserstoff bis zur Zersetzung des darin befindlichen Bleisalzes hindurchströmen ließ, dann filtrirte, zur Trockne abrauchte, das Rückbleibsel mit Weingeist auszog, und die geistige Lösung, die eine feurig rothe Farbe hatte, verdampfte. Der so erhaltene (essigsaure?) narkotische Stoff war nicht vollkommen trocken darzustellen, hatte einen scharf salzigen Geschmack, war in Wasser vollkommen auflöslich, gab dem gerötheten Lackmuspapier eine bedeutend blaue Farbe wieder, zeigte auf Kurkumepapier nur eine schwach bemerkbare Reaction, und bewirkte eine starke Dilatation der Pupille. Die kalische Reaction rührte aber wahrscheinlich von Kali her, das aus den kalischen Salzen des Bilsenkrautes abgeschieden worden; das erzeugte basische essigsaure Kali ist in Weingeist auflöslich. Runge's Hyoscyaminbase stimmt mit dieser Substanz ganz überein. Nach Lindbergson enthält das Bilsenkraut: narkotischen Stoff; in Weingeist auflöslichen Extractivstoff, der keine narkotischen Eigenschaften besitzt; äpfels., phosphors., schwefels. und salzs. Kali, auch etwas salzs. Talkerde.

Buchner empfiehlt auch hier die bei Belladonna angegebene Verfahrungsweise, um vorzüglich wirksame Extracte zu bereiten, wozu sich besonders die Saamen eignen, welche sich auch dadurch empfehlen, daß sie wohl stets von gleicher Wirksamkeit sind, wogegen die Blätter in verschiedenen Jahrgängen nicht gleiche Kräfte besitzen, und beim Aufbewahren leicht Feuchtigkeit aus der Luft anziehen, eine Art Gährung erleiden und an Wirksamkeit verlieren. Ein solches Extract ist so wirksam, daß die Erweiterung der Pupille in ein paar Stunden den höchsten Grad erreicht, so daß die Iris ganz verschwindet; auch hält die Erweiterung drei, ja bei Menschen sogar fünf Tage lang an, was dem Augenarzte sehr erwünscht ist. Endlich ist es nicht reizend, und verursacht keinen Schmerz. Auch aus diesen Saamen kann vorher das fette Oel durch kaltes Auspressen gewonnen werden, doch muß beim ersten Pressen etwas Wasser zugesetzt werden, sonst geben sie, besonders wenn sie recht trocken sind, sehr wenig Oel.

Das Bilsenkraut wird vorzüglich zur Bereitung des Extracts, aber auch äußerlich zu erweichenden Umschlägen gebraucht.

Bei Vergiftungen mit Bilsenkraut sind anzuwenden: Brechmittel, Säuren und Kaffee.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0519-3

* Hypericum. Das Kraut. Johanniskraut.

Hypericum perforatum Linn. Das gemeine Hartheu. Johanniskraut.
Linn. Cl. XVIII. Polyadelphia. Ord. 4. Polyandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 8. Hypericeae.

Das Johanniskraut ist eine ausdauernde Pflanze, welche in ganz Europa angetroffen wird, und an ungebauten, sonnigen Orten, auf Hügeln und Ackerrainen wächst.

Die Wurzel ist kriechend, sehr ästig, hart, holzig und von braungelblicher Farbe. Sie treibt mehrere aufrechte, feste, sehr ästige, glatte, 2—3 Fuß hohe, cylindrische Stengel, die da, wo die Blätter und Zweige sitzen, aufgeschwollen, und an diesen Zwischenknoten mit zwei entgegengesetzten Schneiden versehen sind, welche durch die mittlere Rippe jedes Blattes hervorgebracht wird. Die Blätter sind klein, gegenüberstehend, aufsitzend, halbumfassend, länglich-eiförmig, etwas stumpf, glatt, hellgrün, ganz ungetheilt, durchsichtig punktirt, 6—9 Linien lang und 2—4 breit. Die Blumen sind gelb, von mittlerer Größe, kurzgestielt, sitzen am Ende der Nebenzweige zahlreich bei einander, und bilden ausgebreitete ästige Rispen. Der Kelch ist einblättrig, bleibend, fünftheilig; die Blumenkrone fünfblättrig.

Das Kraut wird gewöhnlich mit den Blüthen im Juni oder Juli eingesammelt. Der Geruch ist schwach und angenehm; der Geschmack balsamisch-bitterlich und etwas zusammenziehend. Das Kraut und die Blumen sowie überhaupt die ganze Pflanze enthalten einen rothen Farbestoff; die Blumen enthalten zwei Farbestoffe, einen gelben, der sich in Wasser auflöst, und seinen Sitz in den Blumenblättern hat, und einen rothen, welcher harziger Natur ist, sich in Alkohol und Oel auflöst, und vorzüglich in der Narbe und Frucht enthalten ist.

Man verwechselt die Pflanze zuweilen mit dem vierkantigen Hartheu, (Hypericum quadrangulare Linn.), welches sich aber durch den einfachen, vierkantigen Stengel, der nicht so holzig und ästig ist, unterscheidet.

Das Johanniskraut ist beinahe ganz außer Gebrauch gekommen, und es ist nur noch das Johannisöl im Gebrauche, an welches das Kraut den Farbestoff abgiebt.

Hyssopus. Das Kraut. Ysopkraut.

Hyssopus officinalis Linn. Ein kleiner Strauch des südlichen Europas, der bei uns in Gärten gezogen wird.

Ein aromatisches Kraut, mit viereckigem Stengel, entgegengesetzten, lancettförmigen, sitzenden, ganzrandigen, unbehaarten Blättern, fünfzähnigen Kelchen, fast rachenförmigen blauen Blumenkronen und abstehenden Staubgefäßen. Im Monat Mai einzusammeln.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0520-4

Hyssopus officinalis Linn. Der gemeine Ysop.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst in verschiedenen Gegenden Deutschlands, in Italien, Frankreich, der Schweiz und Sibirien ꝛc., auf niedrigen Alpen, in bergigen Gegenden wild, und wird häufig in unsern Gärten gezogen.

Die Wurzel ist schwarz, hart, holzig, zaserig, fast von der Dicke eines Fingers, und treibt mehrere aufrechte, fast strauchartige, etwas ästige, viereckige, 1—2 Fuß hohe Stengel. Die gegenüberstehenden, stiellosen, lebhaft grünen Blätter sind oben glatt und unten scharf punktirt; auch giebt es eine Spielart mit vierzählig-kreuzenden, lancettförmigen Blättern. Die dunkelblauen, zuweilen rothen oder weißen Blumen sind größtentheils nach einer Seite gewendet, kurz gestielt, in den obern Blattwinkeln büschelförmig vereinigt, und bilden so zusammen an dem Ende der Stengel aufrechte, etwas quirlförmige, einseitige, beblätterte Aehren. Der Kelch ist einblättrig, röhrig; die Krone einblättrig und rachenförmig; die Oberlippe flach, kurz, eingeschnitten, die Unterlippe dreispaltig, mit zwei stumpfen Lappen an den Seiten, und einem größern, umgekehrt-herzförmigen Lappen in der Mitte. Im Grunde des Kelches liegen vier fast eiförmige, braune, unbedeckte Saamen.

Die Pflanze blüht im Juni bis August, und wird vor dem völligen Aufbrechen der Blüthen eingesammelt. Sie besitzt einen angenehm gewürzhaften Geruch und aromatischen, erwärmenden, etwas bittern Geschmack. Sie enthält viel flüchtiges Oel, besonders zur Zeit der Blüthe. Hierin liegt auch vorzüglich die Wirksamkeit des Krautes. Sechs Pfunde desselben geben bis zu einer Unze eines gelblichen Oels, dessen Farbe sich mit der Zeit ins Rothe verändert, von einem sehr scharfen, etwas campherartigen Ysopgeschmacke.

Der wäßrige Aufguß ist röthlich, schwach aromatisch campherartig, bitterlich, und wird von schwefelsaurem Eisen grünlichbraun.

Man gebraucht den Ysop im Theeaufgusse gegen Verschleimung der Brust, im destillirten Wasser, häufiger noch zu Fomentationen bei Quetschungen und zu Umschlägen.

Diese Pflanze behält nur ihre Kraft, wenn sie auf mergelartigem oder steinigem der Mittagssonne ausgesetztem Boden angebaut wird; auf gutgedüngtem Boden angebaut riecht und schmeckt sie schwächer.

Jalapa. Die Wurzel. Jalapenwurzel.

Convolvulus Jalapa Linn. seu Ipomoea Jalapa Michaux. Eine ausdauernde merikanische Pflanze.

Knollige, feste, schwere Wurzeln, außen braun, mit schwärzlichen Runzeln, entweder ganz oder in Scheiben zerschnitten, aus concentrischen Ringen zusammengesetzt, mit glänzenden braunen Punkten und Strichen, von einem scharf ekelhaften Geschmacke. Man sehe darauf, daß das Harz nicht ausgezogen sey.

Convolvulus Jalapa Linn. Die Jalapenwinde.
Ipomaea Jalapa Desf. et Ker. Ipomaea macrorrhiza Michx.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 10. Convolvulaceae.
(Vergl. Berl. Jahrb. 1804. S. 64.; und Berl. Jahrb. 1820 S. 59.)

Diese Pflanze wächst wild im wärmern Amerika, in Mexiko, in den trocknen sandigen Gegenden von Vera-Cruz, besonders häufig bei Xalapa, einer Stadt, woher sie zuerst im Jahr 1610 nach Europa gebracht wurde, auch in Florida, Carolina und Georgien; sie wird ihrer wohlriechenden Blüthen wegen auch bei uns in Gärten gezogen.

Die fleischige, sehr dicke, oft 12, 15 bis 20 und mehrere Pfunde schwere weiße Wurzel (die von Charles-Town nach Frankreich gebrachte frische Wurzel wog, ungeachtet ein Theil davon ausgeschnitten war, bei ihrer Ankunft 47¾ Pfund) ist knollig, rübenförmig, rund oder spindelförmig, unten mit mehrern geraden, senkrechten, dicken Wurzelzasern versehen; sie enthält einen milchigen süßen Saft und treibt an ihrem obern Theile mehrere krautartige Stengel, welche die benachbarten Gegenstände umwindend und kletternd sich zu einer Höhe von 12—20 Fuß erheben. Die gestielten, weichen, 3—5 Zoll langen und fast eben so breiten Blätter sind siebennervig, herzförmig, 3 oder 5lappig; ihre obere Fläche ist runzlig, die untere weißfilzig. Die Blumenstiele stehen einzeln in den Blattwinkeln, sind ein-, zwei- oder mehrblüthig. An jeder Blume bemerkt man einen bleibenden fünfblättrigen Kelch, eine einblättrige, glockenförmige, weiße oder veilchenblau schattirte und geaderte Krone mit etwas bauchiger, innen dunkelviolettfarbiger Röhre. Die fünf ungleichen Staubfäden tragen weiße, pfeilförmige Staubbeutel. Die Frucht besteht in einer fast runden viersaamigen Kapsel; die vier Saamen sind braunröthlich und zottig.

Die officinelle Jalapenwurzel wird nicht nur von der wildwachsenden Pflanze allein gesammelt, sondern auch von der in manchen Gegenden Neuspaniens, bei Xalapa, Orizaba, Cordoba u. s. w. besonders angebauten.

Die Zubereitung, welche mit der Wurzel vor ihrer Versendung vorgenommen wird, besteht einzig darin, daß die Wurzel, nachdem sie gereinigt worden, je nach der Größe und dem Umfange, in Querstücke oder Viertel zertheilt, der Länge nach gespalten, oder bei zu geringer Dicke bloß eingeschnitten und alsdann im Schatten getrocknet wird. Die im Handel vorkommenden Wurzelstöcke sind daher auch ungleich und verschieden gestaltet, bald ungetheilt, kurz, rundlich, ei- oder birnförmig, in halbbirnförmigen Stücken, bald länglich, oder in mehr oder weniger runde, ¼ bis ½ Zoll dicke Scheiben zerschnitten. Außen sind sie runzlig, dunkelbraun oder schwärzlich; das innere Gewebe erkennt man am besten an den Wurzelstücken; diese haben dieselbe runzlige Oberhaut, auf der innern Oberfläche sind sie gelblichgrau mit schwarzen Adern oder Strichen durchzogen, die auf den Querscheiben der Quere nach, auf den länglichen Stücken der Länge nach concentrisch sind. Einzeln sind sie von nicht sehr merklichem Geruche, in Masse aber oder

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0522-6

etwas erwärmt zeigen sie einen eigenthümlichen sehr widrigen Geruch. Der Geschmack ist zuerst ebenfalls wenig merklich, dann aber unangenehm, ekelhaft, scharf bitterlich, kratzend. Die recht trocknen, schweren, dichten, nicht zerbrechlichen, unter dem Hammer oder im Mörser leicht in glänzende, schwärzliche Stückchen zerspringenden und der vielen Harztheile wegen leicht entzündlichen, mit heller Flamme brennenden Stücken sind die besten und geben fein gestoßen ein gelbbräunlich-graues Pulver.

Verwerflich sind die leichten, äußerlich hellbraunen, inwendig weißlichen oder blaßgrauen, glanzlosen, so wie die schwammigen, von Würmern zerfressenen (wobei jedoch das Harz nicht, sondern nur der stärkemehlartige Theil angegriffen wird, die daher zur Gewinnung des Harzes noch gut benutzt werden können), leicht zerbrechlichen, so wie auch die durch Trocknen bei zu starker Hitze beinahe verkohlten Stücke. Man mengt auch wohl solche Stücke unter, denen schon ein großer Theil des Harzes durch Weingeist entzogen worden ist; diese erkennt man aber an dem Mangel der glänzenden Punkte und Streifen, und an der fast durchaus ganz gleich braunen Farbe. Untergemischte Stücke der Zaunrübenwurzel sind an ihren Merkmalen leicht zu erkennen. Buchner (Trommsd. N. J. IV. 1. S. 310.) fand eine grobe Verfälschung mit gerösteten Früchten, die mit Jalapentinctur getränkt waren.

Cadet de Gassicourt (Buchn. Repert. VI. S. 22.) zerlegte die Jalapenwurzel durch Einweichen in kaltem Wasser, wiederholtes Kneten und Durchpressen durch Leinwand. Das Harz bleibt an den Händen zurück, und wird mit Weingeist abgespühlt. Aus der durchgelaufenen Auflösung der extractiven Theile setzt sich das Stärkemehl ab. Aus dem Rückstande wird der letzte Antheil Harz durch Alkohol ausgezogen, nnd so bleibt eine holzige Materie von hellgrüner Farbe zurück. Die vom Stärkemehle abgegossene Flüssigkeit war noch trübe, und ließ sich nur mit Mühe filtriren. Beim Erhitzen wurde sie milchig, und beim Kochen setzte sie einen dichten Niederschlag ab, der auf dem Filter gesammelt und getrocknet sich wie verhärteter Eiweißstoff verhielt. Die durchfiltrirte Flüssigkeit wurde zur Extractdicke abgedampft; das braungefärbte, beinahe trockne Extract zog die Feuchtigkeit aus der Luft an, hatte einen salzigen, nicht unangenehmen Geschmack, röthete die Lackmustinctur, und gab an den Alkohol eine geringe Menge gefärbter Substanz und salzsauren Kalk ab, worauf das rückständige Extract getrocknet nicht weiter Feuchtigkeit anzog.

100 Grammen gaben auf diese Art zerlegt: Harz 10,0; wäßriges Extract 44,0; Stärkemehl 2,5; Eiweißstoff 2,5; holzige Substanz 29,0; Verlust 12,0. Die Asche von 100 Th. Jalapenwurzel enthält: salzs. Kali 1,622; salzs. Kalk 0,040; phosphors. Kalk 0,804; basisches kohlens. Kali 0,376; kohlens. Kalk 0,400; Eisen 0,020; Kieselerde 0,540. Pfaff vermuthet nach der Analogie auch Kupferoxyd.

Planche (Trommsd. J. XXIV. 2. S. 80.) beabsichtigte bei seiner Bearbeitung der Jalapenwurzel vorzüglich eine wohlfeilere Bereitung des

Jalapenharzes, ohne jedoch seinen Zweck zu erreichen. Er bemerkte hierbei, daß das Wasser aus dem innern holzigen Theile der Wurzel alle Farbe ausgezogen hatte, während der Rindentheil seine braune Farbe noch beibehielt. Er zog daher aus jedem dieser Theile das Harz besonders aus, erhielt aus jenem ein beinahe weißes, aus diesem ein braungefärbtes Harz. Dieses verdankt also seine Farbe einem eigenen blaufärbenden Stoffe, der nur in der Rinde seinen Sitz hat. Dieser Farbestoff kann aber dem Harze auch durch Behandlung der alkalischen Auflösung mit thierischer Kohle entzogen, und das Harz völlig entfärbt werden, wie Hr. Dr. Ph. Martius gezeigt hat, und wie eine mir gütigst mitgetheilte Probe augenscheinlich macht. Das Harz ist hierdurch wesentlich nicht verändert. Anders möchte aber wohl der Erfolg seyn, wenn, wie van Mons gethan hat, Chlor als Entfärbungsmittel angewandt worden, wodurch ein durchscheinendes aber nicht ganz weißes Harz erhalten worden war.

Trommsdorff erhielt gewöhnlich aus 20 Pfunden 32 bis 36 Unzen Harz; ich erhielt meistens aus einem Pfunde zwei Unzen.

Hume (Schw. N. J. XIII. S. 481.) will in der Jalapenwurzel ein Alkaloid entdeckt haben, das er Jalapin nennt. Zur Darstellung desselben giebt er folgendes Verfahren an: Grobgepulverte Jalape wird 12 oder 14 Tage mit starker Essigsäure macerirt, die dadurch erhaltene gelbgefärbte Tinctur durchgeseiht, mit Ammoniak übersättigt, und die Mischung stark geschüttelt, worauf sich sogleich ein sandiger Niederschlag und an den Seiten des Gefäßes wenige Krystalle bilden. Beide werden gesammelt und mit destillirtem Wasser ausgewaschen, von neuem in einer geringen Quantität concentrirter Essigsäure aufgelöst, und durch Ammoniak im Ueberschusse präcipitirt, wobei das Jalapin in kleinen weißen nadelförmigen Krystallen sich niederschlägt. Es hat keinen merklichen Geruch oder Geschmack, scheint specifisch leichter als andere (ähnliche) Alkalien aus dieser Classe, in kaltem Wasser ist es schwer oder nicht auflöslich, in heißem nur wenig auflöslich; Aether agirt nicht darauf; der Alkohol ist das eigentliche Auflösungsmittel. Leicht werden der Extractiv- oder Farbestoff davon getrennt, mit welchen es in geringer Verwandtschaft zu stehen scheint. Aus einer Unze kann man 5 Gran erhalten. Es ist aber von mir (Berl. Jahrb. XXVII. 1. 1825. S. 41.) gezeigt worden, daß kein Alkaloid in der Jalapenwurzel enthalten, sondern Hume's Jalapin eine Zusammensetzung aus dem Jalapenharze und der zur Extraction angewandten Essigsäure ist, welche beide Stoffe Verbindungen in verschiedenen Verhältnissen eingehen können.

Auch Pelletier hat versucht, jedoch ohne Erfolg, aus dem Jalapenharze den eigentlich abführenden Stoff abzuscheiden, indem nach seiner Meinung fast alle Harze diese Eigenschaft besitzen müßten.

Die Jalapenwurzel wird als kräftiges Abführungsmittel in Pulverform zu 20—30 Gran, oder auch in der geistigen Tinctur (Tinct. Jalapae seu cathartica) zu ʒij gegeben, und auch zur Bereitung des Jalapenharzes gebraucht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0524-8

Ichthyocolla seu Colla Piscium. Hausenblase.

Sie wird aus den Eingeweiden, vorzüglich aus der Schwimmblase des Acipenser Sturio oder stellatus oder Huso Linn., Bewohner des caspischen Meeres, bereitet.

Dünne, zusammengerollte oder flache, durchscheinende, weißliche, zähe Lamellen, in Wasser und verdünnterem Weingeiste fast ganz auflöslich.

Mehrere der zur Gattung der Acipenser gehörigen Fische, als der Stör, der Hausen ꝛc., die auch ein schmackhaftes Fleisch haben, und aus deren zahlreichen Rogen man den Caviar macht, geben die Hausenblase. Die beste wird in Rußland aus der Schwimmblase des Hausens bereitet. Dieser Fisch ist sehr gemein in der Wolga, so wie in den übrigen Flüssen, welche sich in das caspische und schwarze Meer ergießen, aus welchen er in die Flüsse kommt. Er erreicht daselbst zuweilen eine Länge von 24 Fuß und eine Schwere von 200—1000, ja bis 1200 Pfunden.

Die Schwimmblasen werden herausgenommen, sogleich eingewässert, gereinigt und abgetrocknet; die äußere Haut wird abgezogen, und die innere glänzende, welche eigentlich der Leim ist, zusammengerollt und getrocknet. Man bereitet aber auch schlechtere Sorten Hausenblase aus der Haut und den Eingeweiden der Fische durchs Auskochen.

Beim Trocknen giebt man derselben verschiedene Formen; sie ist bald hufeisen- bald herzförmig, bald köcherförmig. Die Form ist aber nicht entscheidend, obgleich die letztere am geringsten geschätzt wird, sondern allein die Beschaffenheit, und die beste Hausenblase ist diejenige, welche eine weiße oder milchweiße, zum Theil ins Gelbliche sich ziehende Farbe hat, halbdurchsichtig, trocken ist, und aus übereinander gerollten, etwas zähen Häuten besteht. Die schlechteren Sorten sind gelb, braun und undurchsichtig. Die reine Hausenblase löst sich bis auf einen kleinen Rückstand von 2 Procent, der aus etwas häutigem Wesen besteht, durch Hülfe der Wärme vollkommen klar im Wasser auf, und diese Auflösung, aus 24 Th. Wasser und 1 Th. Hausenblase, gerinnt beim Erkalten zu einer ganz durchsichtigen zitternden Gallerte. Auch der schwache Weingeist löst in der Wärme die Hausenblase auf.

John (Schw. J. XIV. S. 100.) löste bei 20 ° R. 10 Gran auserlesene Hausenblase in Wasser auf, wobei ¼ Gran Membran zurückblieb. Die Lösung erstarrte in der Kälte zur Gallerte. Zwei Unzen Alkohol schlugen aus der wenig verdünnten warmen Auflösung 7 Gran Gallerte nieder. Der Weingeist hatte Osmazom aufgelöst, das mit Galläpfelaufguß einen ungemein aufgequollenen gelben Niederschlag gab. 100 Th. Hausenblase bestehen nach John aus: reiner Gallerte (Thierleim) 70; Osmazom 16; freier Säure, vielleicht Milchsäure, mit Kali- und Natronsalzen, und etwas phosphorsaurem Kalke 4,0; in kochendem Wasser nicht löslicher Membran 2,5; Feuchtigkeit 7,5. S. = 100.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0525-3

Die Hausenblase wird gebraucht zum Klarmachen der Flüssigkeiten, und zur Bereitung des sogenannten englischen Pflasters.

* Jecur Aselli. Das Oel. Leberthran.

In Norwegen, und wahrscheinlich auch in andern nördlichen Küstenländern, wird aus der Leber des Kabliau (**Gadus Morrhua Linn.**), der in den gemäßigten Meeren, in der Nordsee, bei Neufoundland ꝛc. in ungeheurer Menge zu finden ist, da ein Fisch 4 Millionen Eier hat, so daß die Fischerei ganze Flotten beschäftigt, und welcher getrocknet unter dem Namen Stockfisch bekannt ist, dieser Thran (Fischfett) dadurch bereitet, daß man die Leber in eigenen Fässern faulen läßt, wodurch sich das ölige Fett entwickelt. Dieser Thran wird vorzüglich von Bergen in Norwegen aus unter dem Namen Leberthran versendet, und von Weißgerbern ꝛc. wie Wallfischthran und Heringsthran verbraucht. Dieser Berger Leberthran ist als Volksmittel gegen Gicht und Rheumatismus schon lange bekannt, und ist endlich auch von den Aerzten zur Anwendung gezogen worden. Wurzer (Hufeland's J. December 1822. S. 31.) hat eine chemische Untersuchung geliefert. Nach dieser ist der Leberthran röthlich, und überhaupt dunkler, als der gemeine Thran, welcher damit verglichen wurde. Er erstarrt zu einer butterartigen Masse bei einer Temperatur, bei welcher der gemeine Wallfischthran noch flüssig ist. Sein spec. Gew. ist nach W. = 0,923, das des damit verglichenen Thranes 0,907 bis 0,917. Jede unter mehreren Thranarten hatte übrigens ein anderes spec. Gewicht.

Der Geruch des Leberthrans ist fischartig, der Geschmack bitterlich, etwas scharf, auf der Zunge lange anhaltend, wesentlich verschieden von andern Thranarten. Wird der Leberthran mit Wasser geschüttelt, so ertheilt er letzterem eine strohgelbe Farbe, und durch Abdampfen desselben erhielt man ein zähes, gelbes, fast durchsichtiges Extract, welches ungefähr wie Heringe riecht, und widerlich bitter schmeckt, an der Luft schmierig wird und sich in Wasser und Weingeist leicht auflöst. Von der wäßrigen Auflösung wird das Lackmuspapier geröthet, von verschiedenen Salzen, die keine Veränderung hervorbringen, erzeugt das essigsaure Blei einen weißen Niederschlag, schwefelsaures Silber eine geringe sich bald bräunlich färbende Wolke. Galläpfeltinctur giebt eine Trübung, die sich an den Wänden des Gefäßes als eine leichte braunschmierige Masse niederschlägt, in Alkohol auflöslich, in Wasser aber unauflöslich. Der gemeine Thran giebt indessen bei der Behandlung mit Wasser ein ähnliches Extract, welches eben so reagirt, aber weniger beträgt.

In Schwefeläther und Alkohol ist der Leberthran eben so leicht löslich, wie der gemeine Thran.

Das größte Hinderniß der Anwendung ist der äußerst widerliche Geruch und ekelhaft ranzige Geschmack des gewöhnlichen Leberthrans, welcher bei den Gerbereien gebraucht wird. Nach einer Nachricht (Geiger's Magazin 1826. August. S. 101.) ist aber auch der Thran, welcher als Volksmittel

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0526-9

gegen die Gicht gebraucht wird, nicht dieser, sondern der sogenannte blanke Thran. Dieser ist das Fett von der Leber des Dorsch (Gadus Callarias Linn.). Das Residuum giebt den braunen Thran, den die Lohgerber gebrauchen, der aber von keinem Menschen genossen werden kann. Der weiße Thran führt den Namen Gichtthran. Dieser wird aber wohl von selbst aus der Leber abtröpfeln, der braune aber durchs Auskochen erhalten werden. Er kommt von der Küste Norwegens, besonders aus Bergen, daher die Benennung Berger Leberthran.

Dieser Thran, wie ich ihn auch hier am Orte erhalten habe, ist hell, weiß oder kaum goldgelb, wie feines Oliven- oder Mohnöl, etwas dickflüssig, riecht nicht sehr unangenehm, mild, thran- und heringsartig, der Geschmack ist mild, fettig, schwach nach Thran. An der Luft trocknet er nicht aus.

Der Leberthran wird eßlöffelweise innerlich gegeben; man hat ihn auch zum Klystier angewandt. Die Erscheinungen, welche sich nach dem innerlichen Gebrauche desselben einstellen, sind besonders Vermehrung des Schweißes und Urins, und, wo Verstopfung vorhanden ist, auch öfterer Stuhlgang.

* St. Ignatia. Die Bohne. St. Ignazbohne.

Strychnos Ignatia Berg. Ignaz-Krähenauge.
Ignatia amara Linn. Bittere Fiebernuß.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 14. Apocyneae.

Die erste Kenntniß dieses Baumes verdanken wir dem Jesuiten Camelli, der Exemplare an Ray und Petiver sandte, welche im Jahr 1669 eine Beschreibung und Abbildung bekannt machten. Später beschrieb der jüngere Linné dieses Gewächs unter dem Namen Ignatia amara. Neuerlich wird es aber von den Meisten als eine Strychnosart betrachtet. Die Früchte dieses Baumes, welche in ihrer Heimath als Universalarznei gegen alle Krankheiten gelten, werden von den Jesuiten, dem Stifter ihres Ordens zu Ehren, St. Ignatius-Bohnen genannt.

Dieser ziemlich hohe Baum wächst auf den philippinischen Inseln. Er trägt zahlreiche, lange, walzenrunde, völlig glatte und rankige Aeste mit gegenüberstehenden, festsitzenden, eiförmig-zugespitzten, ganzrandigen, flachen und ganz glatten Blättern. Die Blüthen bilden in den Blattachseln kleine kurze Trauben, sind weiß, röhrig und verbreiten einen angenehmen Jasmingeruch. Die Früchte haben die Größe einer mittelmäßigen Birne, sind eiförmig glatt, ihre äußere Hülle ist trocken und zerbrechlich. In dem weichen bitterlichen Marke liegen 15—20 Saamen, die an der Luft stark zusammentrocknen. Dieses sind die Ignazbohnen. So wie wir dieselben erhalten, sind sie fast einen Zoll lang, etwas platt, auf der einen Seite erhaben, auf der andern vieleckig, von außen lichtbraun und wie mit Staube (der sich aber nicht abwischen läßt) bestreut, innerlich grünbräunlich und etwas glänzend, von fast hornartiger Härte, doch so, daß sie mit dem Messer durchschnitten werden

können, von einem unangenehmen, einigermaßen moschusartigen, jedoch schwachen Geruche, und äußerst bitterm, lange anhaltendem Geschmacke.

Pfaff (Syst. d. Mat. med. II. S. 98.) bemerkte bei der Analyse eine große Uebereinstimmung der Ignazbohnen mit den Krähenaugen; diese ist durch die neuere Analyse der Herren Pelletier und Caventou außer allen Zweifel gesetzt worden. Diese Chemiker (Schw. J. XXV. S. 410. u. XXVIII. S. 32.; Gilbert's Annalen N. F. XXXIII. S. 266.; Berl. Jahrb. 1820. S. 206. u. Buchn. Repert. VII. 2. S. 169.) behandelten die gerasperten Ignazbohnen im papinianischen Topfe mit Schwefeläther, welcher ein fettes Oel von butterartiger Consistenz und schwach grünlicher Farbe auszog. Im geschmolzenen Zustande war dieses Oel, welches für rein gehalten wurde, durchscheinend und bewirkte unter Starrkrämpfen den Tod der Thiere. Der Rückstand von dieser Behandlung wurde mit Alkohol ausgezogen, welcher kochend filtrirt, eine geringe Menge wachsartiger Materie absetzte, und durch Filtriren davon getrennt, und abgeraucht ein gelblichbraunes Extract zurückließ, welches in Wasser aufgelöst eben so wie jenes Oel giftig auf die Thiere wirkte. Die Verf. glaubten anfangs, daß die giftige Wirkung einem kleinen Antheile Oele zuzuschreiben sey, und wirklich konnten sie noch etwas davon trennen, jedoch behielt das Extract noch immer seine heftige Wirkung. Um die extractartige Materie gänzlich von der bittern zu trennen, wurde eine concentrirte Lösung derselben mit Aetzkalilösung in Berührung gebracht: auf der Stelle entstand ein reichlicher Bodensatz, welcher mit kaltem Wasser, worin er unauflöslich war, ausgewaschen, eine weiße krystallinische, außerordentlich bittere Materie darstellte. Die alkalische Flüssigkeit enthielt alle färbende Materie und eine Säure.

Die krystallinische Materie stellte die durch Säuren gerötheten blauen Pflanzenfarben wieder her, und äußerte auf den thierischen Organismus furchtbar heftige Wirkungen. Es war also nicht länger zweifelhaft, daß diese Substanz als das wirkende Princip der Ignazbohnen zu betrachten sey. Sie fand sich auch in der fettigen Materie, welche durch Kochen mit salzsaurem Wasser davon befreit, keine giftigen Eigenschaften mehr zeigte.

Die bittere krystallinische Substanz, zweckmäßig Strychnin genannt, mußte sich auch in den Krähenaugen finden, welche Vermuthung durch die Erfahrung bestätigt wurde.

Das durch Krystallisation aus der geistigen mit wenig Wasser verdünnten Lösung gewonnene Strychnin stellt fast nur mikroskopische Krystalle dar, vierseitige Prismen mit vierseitigen pyramidalen Endspitzen. Bei einer schnellen Ausscheidung erscheint dasselbe weiß und körnig. Der Geschmack ist unerträglich bitter, hintennach etwas analog dem von Metallsalzen. Es ist geruchlos. An der Luft erleidet es keine Veränderung. Es ist weder schmelzbar, noch unverändert zu verflüchtigen, vielmehr wird es durch die Hitze verkohlt, und zwar schon bei 312—315 ° C. In Wasser ist es beinahe unlöslich, scheint auch kein Hydrat zu bilden. Bei 10 ° Temperatur erfodert es 6667, in der Siedehitze 2500 Th. Wasser zu seiner Auflösung; bei

600,000facher Verdünnung ist der Geschmack noch merklich bitter. In Alkohol ist es leicht auflöslich, auch in ätherischen Oelen; dagegen sehr wenig löslich in Schwefeläther. Bei der trocknen Destillation giebt es etwas brenzliges Oel, Essigsäure, kohlensaures Gas und gekohltes Wasserstoffgas, scheint hiernach keinen Stickstoff zu enthalten, der sich indessen nach der Analyse der Herren Dumas und Pelletier (Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 117. und Schw. N. J. X. S. 89.) doch darin findet; denn das Strychnin besteht aus Kohlenstoff 78,22; Stickstoff 8,92; Wasserstoff 6,54; Sauerstoff 6,38. Mit Säuren geht es Verbindungen ein, und neutralisirt dieselben. Die Strychninsalze sind alle in hohem Grade bitter, leicht löslich in Wasser und krystallisirbar, als schwefels., salzs., phosphors., essigs., weinsteins. und kleesaures Strychnin, von denen jedoch keines officinell geworden ist.

Von verdünnter Salpetersäure wird das Strychnin gleichfalls aufgelöst, krystallisirt in Nadeln, und wirkt heftiger auf den thierischen Organismus, als das reine Strychnin. Die concentrirte Salpetersäure färbt dagegen sowohl das reine Strychnin, als auch die Strychninsalze blutroth, und es entwickelt sich dabei der Geruch nach Salpetergas.

Als die Verf. später das Upas tieuté, dieses schreckliche Gift, dessen sich die Einwohner des indischen Archipels zur Vergiftung ihrer Pfeile bedienen, zerlegten, fanden sie, daß das Strychnin in demselben enthalten, und als das wirksame Princip darin zu betrachten sey. Das hier ausgeschiedene reine Strychnin zeigte nicht die Eigenschaft, die Salpetersäure roth zu färben, und die Verf. überzeugten sich, daß diese Eigenschaft einer von dem Strychnin verschiedenen gelben Materie zukomme, mit welcher ersteres verunreinigt ist. Denn als die Verf. ihre Vorräthe von Strychnin prüften, fanden sie, daß, je reiner das Strychnin ist, desto weniger die Salpetersäure durch dasselbe roth gefärbt wurde, und daß, wenn das aus den Krähenaugen gewonnene Strychnin, welches weniger weiß war, die schönste rothe Farbe annahm, die aus den Ignazbohnen ausgezogenen Strychninkrystalle von ausgezeichneter Weiße mit Salpetersäure nur eine leichte rothe Farbe gaben.

Ferrari bemerkte, daß die concentrirten Lösungen des schwefels., salzs., salpeters. und essigsauren Strychnins, wenn sie einen Säureüberschuß besitzen, sich bei der Temperatur des siedenden Wassers verflüchtigen, und es ist daher wahrscheinlich, daß auch die übrigen Strychninsalze flüchtig sind.

Das Strychnin wird aus seinen Verbindungen mit Säuren durch Alkalien und alkalische Erden gefällt, dagegen erlangt es in Alkohol aufgelöst die Eigenschaft, den größern Theil der Metallsalze aus ihren sauren Auflösungen zu fällen, wobei jedoch wohl die Mitwirkung des Alkohols zu berücksichtigen ist, in welchem die Metallsalze unauflöslich sind.

Das Strychnin wirkt als eins der heftigsten Gifte; schon in der Gabe von $\frac{1}{2}$, ja $\frac{1}{4}$ Gran tödtet es ein Kaninchen in 5 Minuten. Essigsaures Morphium schien als Gegengift zu wirken. Vorsichtig, in einer alkoholischen Auflösung, tropfenweise gebraucht, hat das Strychnin in Lähmungen sich sehr heilsam bewiesen.

Die Verf. hatten sich zur Abscheidung des Strychnins auch statt des Aetzkalis der reinen Bittererde bedient, mit welcher die durch die geistigen Auszüge erhaltene bittere gelblichbraune Materie während einiger Minuten gekocht wurde. Von dem auf einem Filter gesammelten Niederschlage wurde die färbende Materie durch Auswaschen mit kaltem Wasser getrennt, und dann aus dem ersteren das Strychnin durch Alkohol ausgezogen.

Die Abwaschflüssigkeiten enthalten außer der färbenden Materie noch etwas Strychnin und etwas Säure, von denen man erstere ziemlich rein erhalten kann, wenn man die Flüssigkeiten zur Trockne verdampft, und mit schwachem Alkohol digerirt. Die durch denselben ausgezogene färbende Materie bietet nichts Interessantes dar; ihre Farbe wird durch Säuren geschwächt, durch Alkalien erhöht; sie wird durch essigsaures Blei niedergeschlagen, und besitzt zur Alaunerde wenig Verwandtschaft.

Wird der von dem Strychnin und der färbenden Materie befreite Magnesianiederschlag mit kochendem Wasser behandelt, so löst sich die Verbindung der Magnesia mit der in den Ignazbohnen enthaltenen Säure auf. Die Flüssigkeit wird durch Abdampfen concentrirt und durch essigsaures Blei gefällt. Das mit der neuen Säure verbundene Bleipräcipitat wurde durch Hydrothionsäure zersetzt, und die von dem entstandenen Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit zur Syrupsconsistenz verdunstet. Die so dargestellte neue Säure zeigte viel Aehnlichkeit mit der Aepfelsäure, jedoch auch Verschiedenheiten. Sie krystallisirt in kleinen harten und körnigen Krystallen, ist in Wasser und Alkohol leicht löslich, schmeckt sauer und sehr zusammenziehend, und bildet mit den Alkalien und Erden in Alkohol und Wasser lösliche Salze. Das vollkommen neutrale Ammoniaksalz bildet in den Silber-, Queckfilber- und Eisensalzen keinen Niederschlag, verändert die blaue Farbe der Kupferauflösungen in die grüne, und es sondert sich ein glänzend grünliches in Wasser schwer lösliches Salz aus. Die Verf. geben dieser Säure den Namen Igasursäure, nach dem malabarischen Namen der Ignazbohnen.

Die durch Aether und Alkohol erschöpften Ignazbohnen geben nun mit Wasser macerirt demselben viel Gummi ab. Im Augenblicke, wo das Wasser auf das Gewebe der Bohnen wirkt, schwillt die Masse auf, und nimmt ein beträchtliches Volumen ein. Durch Kochen mit Wasser wird Stärkemehl aufgelöst. Der Rückstand ist noch gelatinös, was von dem Bassorin (Traganthstoff) herrührt, das sich durch Salzsäure ausziehen läßt.

Die eingeäscherten Ignazbohnen lassen nur einige Atome ($\frac{1}{1000}$) Asche übrig, die aus kohlens. Kalk und salzs. Kali besteht.

Die Ignazbohnen enthalten demnach: igasursaures Strychnin; Myricin Spuren; Oel; gelbe färbende Materie; Gummi; Stärkemehl; Parenchym (Traganthstoff) und etwas Holzfaser. Daß die Ignazbohnen neben dem Strychnin auch Brucin (von letzterem jedoch nur Spuren) enthalten, ist bereits bei Angustura erwähnt worden.

Nach Haase (Commentatio de Faba St. Ignatii. Lips. 1822.) hat das berühmte Weitz'sche Geheimmittel gegen Epilepsie nur in den Ignaz-

bohnen bestanden, und diese verdienen wahrscheinlich auch in Substanz wieder in Gebrauch gezogen zu werden.

Imperatoria. Die Wurzel. Meisterwurzel.

Imperatoria Ostruthium Linn. Eine ausdauernde Gebirgspflanze des südlichen Deutschlands.

Die verlängerte knotiggeringelte, zusammengedrückte Wurzel, außen gelblich ins Schwärzliche neigend, innen weißlich, durch Bläschen unter der Oberhaut in die Augen fallend, von starkem Geruche und einem etwas scharf gewürzhaften Geschmacke. Im späten Herbste oder im Frühlinge einzusammeln.

Imperatoria Ostruthium Linn. Gemeine Meisterwurzel. Kaiserwurzel. Peucedanum Ostruthium Koch.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese Pflanze ist auf den Gebirgen des südlichen Europas, in Oestreich, in der Schweiz und in Frankreich einheimisch, und wird leicht in unsern Gärten cultivirt.

Die Wurzel liegt schief oder fast horizontal in der Erde, und besteht aus einem walzenförmigen Wurzelstocke, der in eine allmälig sich verdünnende Hauptwurzel von hellerer Farbe ausläuft; aus ihm kommen kriechende Ausläufer hervor. Der Stengel ist aufrecht, 2—3 Fuß hoch, rund und glatt. Die Wurzelblätter stehen aufrecht auf runden, hohlen, glatten und gestreiften, ungefähr 6—10 Zoll langen Blattstielen; sie sind doppelt dreizählig; die Blättchen sind scharf gezahnt, blaßgrün und etwas runzlig. Die untern Stengelblätter sind den Wurzelblättern gleich, nur kleiner, die obersten Blätter sitzen unmittelbar auf. An der Spitze des Stengels bildet sich eine große, flache, vielstrahlige und vielblättrige Dolde mit zwei gewöhnlich unvollkommnen Seitendolden. Die Blüthen sind weiß oder röthlich.

Diese Pflanze blüht im Juni und Juli.

Die getrocknete Wurzel erhalten wir gewöhnlich in fingerslangen, etwas zusammengedrückten Stücken; außen geringelt, knotig, graulichbraun, im Innern schmutzigweiß, oder gelblich, mit zahlreichen eigenen Gefäßen unter der Epidermis versehen, welche ein ätherisches Oel, beim Druck mit dem Nagel hervortretend, oder bei den ältern Wurzeln eine scharf-aromatische harzartige Substanz enthalten, daher solche Wurzeln bei einem Querdurchschnitte viele glänzende Punkte erkennen, und bei dem Drucke mit dem Nagel weniger Oel hervortreten lassen. Diesen Bestandtheilen verdankt die Wurzel ihren durchdringenden, starken, eigenthümlichen, etwas der Angelika ähnlichen Geruch und Geschmack. Durchs Alter wird die Wurzel wurmstichig, und schwach an Geruche und Geschmacke.

Die Wurzel ist im Spätherbste am kräftigsten, und enthält dann einen

weißen Milchsaft, der gelblich wird. 16 Unzen geben bei der Destillation mit Wasser 1 Quentchen ätherisches Oel.

Die Anwendung dieser kräftigen Wurzel ist jetzt größtentheils auf die Thierheilkunde beschränkt; in der neuesten Zeit ist sie von Mylius (Harleß rheinische Jahrbücher VII. 1. S. 159.), im geistigen Auszuge mit Schweinefett zur Salbe gemischt, äußerlich, auch innerlich beim Gesichtskrebs empfohlen worden.

* Indigo. Indig.

Indigofera tinctoria Linn. Die gemeine Indigpflanze.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Diese Pflanze ist in Ostindien einheimisch, von wo sie nach Amerika und Westindien verpflanzt worden ist; sie wird aber auch mit Fleiß angebaut.

Der Stengel ist an 2 Fuß hoch. Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen eiförmig und klein. Die Blüthen sind röthliche, traubenförmige Schmetterlingsblumen. Die Frucht besteht in langen, dünnen, geraden Hülsen.

Nicht diese Pflanze allein, sondern mehrere Pflanzen aus der Gattung Indigofera (Berl. Jahrb. 1817. S. 18.), als die in Amerika einheimische I. argentea, die silberweiße oder wilde Indigpflanze, welche den schönsten Indig, aber in geringer Menge liefert, die in Ostindien einheimischen sichelförmige und zweisaamige Indigpflanze, I. Anil und I. disperma; ferner I. pseudotinctoria, I. indica Lamb., I. coerulea Roxb. u. a. m. geben diesen bekannten Farbestoff. Derselbe findet sich aber nicht ausschließlich in der Gattung Indigofera, sondern unter den Leguminosen auch in Galega, unter den Apocyneen in Marsdenia tinctoria, Asclepias tingens und Nerium tinctorium; unter den Cruciferen in Isatis tinctoria L. und orientalis W.; unter den Polygoneen in Polygonum tinctorium und chinense u. s. w. Von den letzteren Pflanzen ist besonders Isatis tinctoria, Färberwaid (Linn. Cl. XV. Tetradynamia. Ord. 1. Siliculosa. Juss. Cl. XIII. Ord. 3. Cruciferae), während des von Napoleon angeordneten Colonialsystems, durch welches die Zuführung fremden Indigs abgeschnitten wurde, zuerst in Frankreich, dann auch in Deutschland und andern Ländern angepflanzt und auf Indig benutzt worden. Auch in Rußland ist seit 1810 der Waidbau mit Glück versucht worden, und zwar in der Gegend von Moskau. Der dort bereitete Waidindig soll dem schönsten indischen Indig nicht nachstehen. Die Indigpflanze soll aber 30mal mehr Indig geben, als ein gleiches Gewicht Waid. Bei allen genannten Pflanzen kommt aber viel auf Klima und Witterung an; Wärme und ein gewisser Grad von Trockenheit äußern günstigen Einfluß.

Die Art, den Indig aus den Indigpflanzen zu bereiten, und mit demselben die Zeuge zu färben, scheint in Indien schon von sehr alten Zeiten her bekannt zu seyn. Aber auch der vorzüglich in Thüringen wildwachsende Waid ist in Deutschland schon beinahe seit tausend Jahren zum Blaufärben benutzt

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0532-2

worden. Der ostindische Indig wurde jedoch erst gegen das 16te Jahrhundert in Europa bekannt, wo die Holländer anfingen, die Wichtigkeit dieses Farbestoffes bekannt zu machen. Demungeachtet kam der Indig erst in der Mitte des folgenden Jahrhunderts in Gebrauch, wo seine Vorzüglichkeit vor allen andern Farbeproducten allgemein anerkannt wurde. Die Indigpflanzen wurden nun in Mexiko und Westindien mit solchem Erfolge angepflanzt, daß der ostindische Indig in Vergessenheit gerieth. Seit einiger Zeit aber haben die Engländer den ostindischen Indig wieder in Aufnahme gebracht, und versorgen jetzt damit fast ganz Europa.

Die Indigpflanze ist zwar zweijährig, sie geht aber gewöhnlich schon im ersten Jahre aus. Sie wird daher alle Jahre im Monat März gesäet; 2 Monate später hält man die erste, 2 Monate darnach die zweite, und zuweilen noch in dem nämlichen Jahre die dritte und vierte Ernte, je nach der Verschiedenheit des Landes. Die erste Ernte ist aber die beste, und die andern werden immer geringer. In Mexiko und Westindien hält man gewöhnlich drei, in Südamerika höchstens zwei Ernten, weil die erste nicht früher, als 6 Monate nach dem Aussäen vorgenommen werden kann.

Die Pflanze wird mit Sicheln abgeschnitten, und schichtenweise in eine sehr große Butte, die Weichküpe genannt, gethan; diese Butte wird zu $\frac{3}{4}$ damit angefüllt, und die Pflanzen mit Gewichten beschwert, damit sie nicht auf dem Wasser schwimmen, welches man hernach darauf schüttet, so daß dasselbe ungefähr 1 Fuß hoch darüber steht. Man überläßt das Ganze der Gährung, bis man sieht, daß sich oben auf der Flüssigkeit ein regenbogenfarbiger Schaum bildet; dann zieht man das Wasser ab, und läßt es in die untergestellte Rührküpe laufen. Jetzt soll man indessen sowohl in Ost- als Westindien fast allgemein die Pflanze mit heißem Wasser ausziehen, weil man dadurch die Gährung erspart, auch in kürzerer Zeit mehr und schöneren Indig erhält. In der Rührküpe wird nun die Flüssigkeit 15 — 20 Minuten lang mit Krücken und Schaufeln in ziemlich heftige Bewegung gesetzt, bis sich ein blauer Satz abzuscheiden anfängt. Wenn die anfangs grünliche und trübe Flüssigkeit blau wird und gerinnt, so setzt man etwas Kalkwasser zu, welches die Abscheidung des Farbestoffes sehr befördert (wogegen Säuren, selbst die Kohlensäure, dieses verzögern, ohne daß wir von dem einen oder dem andern den Grund angeben können) und die Flüssigkeit vor der Fäulniß bewahrt. Man läßt die Flüssigkeit ruhig stehen, läßt das Wasser ab, wäscht den Niederschlag einmal aus, und bringt ihn zum Abtropfen auf Leinwand. Hierauf füllt man denselben in viereckige hölzerne Kistchen, welche einen Boden von ausgespannter Leinwand haben, und trocknet ihn vollends, indem man diese viereckigen Tafeln im Schatten aufhängt. Durch ein ganz ähnliches Verfahren (Heinrich in Gilbert's Annalen XLII. S. 328.) wird auch aus dem Waid der Indig erhalten, es ist aber ein etwas größerer Zusatz von Kalkwasser erfoderlich, und der Niederschlag muß nachher mit Salzsäure digerirt werden, um den niedergefallenen Kalk wieder aufzulösen.

Der Indig, wie er im Handel vorkommt, ist eine trockne Substanz,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0533-7

von dunkelblauer Farbe, welche jedoch vom Blauen bis in das Violette und Kupfrigblaue übergeht. Er ist leicht zerbrechlich, hat einen gleichförmigen, sehr feinen, nicht streifigen Bruch. Eine seiner ausgezeichnetsten Eigenschaften ist die, daß er durch das Reiben mit dem Nagel einen Kupferglanz annimmt. Derjenige, welcher hiedurch den meisten Glanz bekommt, am leichtesten ist, denn der Indig ist bald leichter, bald schwerer als Wasser, und eine schöne dunkle violettblaue Farbenmischung besitzt, ist der vorzüglichste.

Die Sorten des Indigs werden nach dem Namen der Länder unterschieden, welche sie liefern. So hat man den indischen oder bengalischen, und der Guatimala-Indig ist derjenige, der am meisten geschätzt wird, den Louisiana-Indig u. s. w. Der Guatimala-Indig ist der leichteste von allen; er hat eine schöne violettblaue Farbe. Der indische Indig kommt ihm am nächsten; der Louisiana-Indig ist fester, dunkler und auf dem Bruche kupfrig; er muß sehr stark färben.

Nach einer Analyse der Indigofera Anil von Chevreul (Schw. J. V. S. 315.) enthält das aus dem ausgepreßten Safte niederfallende Satzmehl: Wachs, harziges Blattgrün, harzige rothe Materie; kleberartige Materie; Indig. Der übrige Saft: harziges Indiggrün; gelben Extractivstoff; Gummi; kleberartige Materie; ungefärbten Indig; Kali- und Kalksalze.

Der Indig ist aber nicht als ein wesentlicher Pflanzenstoff anzusehen, sondern er enthält außer einem eigenthümlichen wesentlichen Pigmente noch verschiedene andere Stoffe. Chevreul behandelte 100 Th. Guatimala-Indig erst mit Wasser, wodurch Schleim, Bitterstoff, mit Ammoniak verbundenes harziges Indiggrün und ungefärbter Indig 12 Th. ausgezogen wurden; dann mit Weingeist, welcher 30 Th. aufnahm, nämlich harziges Indiggrün, eine harzige rothe Substanz und etwas gefärbten Indig. Noch wurden durch Salzsäure 6 Th. harzige rothe Substanz, 2 Th. kohlens. Kalk und 2 Th. Eisenoxyd mit Alaunerde ausgezogen, worauf 45 Th. reiner Indig mit 3 Th. beim Einäschern zurückbleibender Kieselerde gemengt blieben. Manche Indigsorten theilen dem Wasser eine Säure mit, manche enthalten auch Bittererde.

Der reine Indigstoff kann auch durch Sublimation in einem mit Deckel versehenen Tiegel bei raschem Feuer erhalten werden, wobei jedoch ein großer Theil des Indigs zerstört wird. Crum sublimirt in zwei über einander gestürzten etwas gewölbten Deckeln von Platintiegeln über der Weingeistlampe. Der sublimirte Indig, von Döbereiner (Schw. J. XXVI. S. 268.) Isatine genannt, erscheint in dunkelrothen, halbmetallisch glänzenden Nadeln, welche ein blaues Pulver geben, in Wasser, nicht in Vitriolöl, niedersinken, nicht schmelzbar sind, sich aber im Feuer größtentheils unzersetzt mit purpurnen Dämpfen verflüchtigen.

Der Indig löst sich in kaltem Vitriol mit schön blauer Farbe auf. Vier Drachmen nordhäuser Vitriolöl mit einer Drachme fein zerriebenem Indig bilden unter Wärmeentwickelung und Aufschwellen einen schwarzblauen Syrup, der sich nach einigen Stunden mit blauer Farbe in Wasser auflöst. Englische

Schwefelsäure erfodert 12—24 Stunden dauernde Berührung und Schütteln, beim Rühren und Schütteln der Masse wird der Indig als ein blaues Pulver gefällt, das sich nach Bucholz (Gehlen's J. III. S. 3.) auch nicht mehr in rauchendem Vitriolöle auflöst, nach Gmelin jedoch von reinem Wasser mit blauer Farbe aufgelöst wird. Die wasserfreie Schwefelsäure wirkt besonders kräftig, so daß ein Zusatz von nordhäuser Vitriolöl zu englischer Schwefelsäure die Auflösungskraft der letzteren sehr befördert. Wird die schwefelsaure Indigauflösung mit kohlensaurem Kali (oder Kalke) neutralisirt, so bleibt sie blau und läßt nur einen Theil des veränderten Indigs, den Crum (Schw. N. J. VIII. 1823. S. 22.) Cerulin nennt, als ein blaues Pulver, blauen Karmin, fallen. Die Verbindung des Indigs mit der Schwefelsäure kann also durch die Alkalien und alkalischen Erden nur zum geringen Theile zersetzt werden. Eine ganz gleiche Fällung bewirken aber auch mehrere Neutralsalze, als Salmiak, Kochsalz, Glaubersalz, Alaun ꝛc.

Wird die Einwirkung der Schwefelsäure auf den Indig unterbrochen, so entsteht nach Crum eine neue Substanz, von ihm Phönicin genannt, welche durch Zusatz eines Salzes, als salzsauren Kalis, mit schöner purpurrother Farbe präcipitirt wird. Auch durch Alkohol wird nach Crum die Wirkung der Schwefelsäure auf merkwürdige Weise modificirt, nämlich die Farbe des Indigs wird in Gelb umgeändert, und die Auflösung kann durch starkes Papier filtrirt werden.

Der Indig ist unauflöslich in Wasser, verdünnter Schwefelsäure, Salzsäure und den übrigen, den Indig nicht zersetzenden Säuren, in den wäßrigen Alkalien, Aether und flüchtigen Oelen. Erhitzter Weingeist löst nach Chevreul eine geringe Menge mit schön blauer Farbe auf; beim Erkalten fällt er aber allmälig fast vollständig nieder. Mit reinem Kali und Natron giebt der Indig eine blaue, allmälig ins Grüne und Farblose übergehende Lösung. Der Indig wird aber in den Zustand des farblosen Indigs durch solche Stoffe übergeführt, welche ihm Sauerstoff entziehen, als Wasserstoff (Pleischl in Schw. J. XXV. S. 363.), Hydrothionsäure, hydrothionsaures Ammoniak, Schwefelarsenik, Eisenvitriol, salzsaures Zinnoxydul, und andere der Fäulniß fähige organische Substanzen, als Waid, Wau, Kleie ꝛc. Da nun der Indig in diesem Zustande mit Alkalien sich verbindet, sich mithin hier, wo ihm durch die genannten Stoffe Sauerstoff entzogen worden ist, wie eine Säure verhält, so erhält er als Base in der schwefelsauren Auflösung mehr Sauerstoff wie als Säure (Thomson in Schw. N. J. 1. S. 482.). Döbereiner hält den durch Kali, Kalk (in der Küpe) veränderten Indig für eine der Blausäure ähnliche Wasserstoffsäure, und nennt dieselbe Isatinsäure. Hat der grüngefärbte Indig Gelegenheit Sauerstoff anzuziehen, so nimmt er wieder die blaue Farbe an. Auf diese Eigenschaft gründet sich die Art und Weise, wollene und baumwollene Zeuche dauerhaft blau zu färben. Man bringt den Indig nämlich mit Pflanzenstoffen, die ihm durch eine anfangende faule Gährung Sauerstoff entziehen, oder mit Metallsalzen auf der niedrigsten Oxydationsstufe in Begleitung von Alaun,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0535-9

in Berührung, so daß der durch diese Mittel desoxydirte und aufgelöste Indig eine grüne Brühe bildet. Sobald die damit gefärbten Zeuche der Luft ausgesetzt werden, nehmen sie eine dauerhaft blaue Farbe an, welches mit der gewöhnlichen Indigauflösung nicht der Fall ist.

Nach Döbereiner (a. a. O. S. 267.) enthält der Auszug der frischen Blätter von Isatis tinctoria zwei Pigmente, ein blaues und ein gelbes, welche sich durch die beiden Pole der Voltaischen Säule abscheiden lassen.

Wird Indig mit verdünnter Salpetersäure behandelt, so wird Kleesäure, kleesaurer Kalk, Indigbitter und Indigsäure ꝛc. erhalten (Vergl. Gmelin's Handb. d. Th. 2te Ausg. S. 1517 und 1550.).

Chlor entfärbt die blaue Indigauflösung, und da nach Welther's genauen Versuchen 100 Gewichtstheile Chlor die Farbe von 226 Gewichtstheilen Indig verschwinden machen, so dient dieses Verhalten zu gegenseitiger Prüfungsmethode, nämlich auf die Reinheit des Indigs und auf die Stärke des wäßrigen Chlors sowohl, als auf die Güte des Chlorkalkes (Anleitung hierzu in Schw. N. J. V. S. 202.). Auch die Kohle entfärbt die Indigoauflösung vollständig, und um die entfärbende Kraft der Kohle zu prüfen, bedient man sich nach Bussy derselben Indigauflösung, womit man nach Welther das Bleichsalz untersucht (vergl. Carbo.).

Von Brugnatelli und Döbereiner wird der Indig für ein vegetabilisches Metall erklärt (Schw. J. XII. S. 424.). Werden aus einer Retorte entwickelte purpurne Indigdämpfe durch Quecksilber geleitet, oder werden 3 Theile Indigpulver mit 1 Theil Quecksilber unter beständigem Zusammenreiben bis zur Entstehung häufiger purpurrother Dämpfe erhitzt, so entsteht eine Art von zähem Amalgama, welches die Farbe und den Glanz des Quecksilbers hat, beim Erhitzen purpurne Indigdämpfe entwickelt, sächsisches Vitriolöl dunkelblau färbt, und beim Eintauchen in salpetersaure Silberauflösung artischockenförmig zusammengehäufte Krystalle giebt, welche sich wie eine Legirung von Indig mit Silber verhielten. Weder Giese noch Gmelin noch Crum haben diese Verbindung darstellen können, nur Oswald (Trommsd. N. J. III. 1. S. 433.) hat diese Verbindung durch Zusammenreiben unvollständig erhalten.

Thomson (Schw. N. J. 1. S. 482.) verwandelte den blauen Indig durch Digestion mit Kalk, Eisenvitriol und Wasser in ungefärbten, setzte ihn an die Luft, zog den an der Luft wieder blau gewordenen erst mit Salzsäure, und dann zur Entfernung des Harzes mit Weingeist aus. Diesen gereinigten Indig fand er zusammengesetzt aus: Kohlenstoff 40,384; Stickstoff 13,462 und Sauerstoff 46,154. (Keinen Wasserstoff.). Nach Ure (Schw. N. J. IX. S. 336.) besteht der Indig aus Kohlenstoff 71,37; Wasserstoff 4,38; Sauerstoff 14,25; Stickstoff 10,00. Le Royer und Dumas (Schw. N. J. VI. S. 277.) reinigten den Indig auf 3 verschiedene Weisen: 1) durch Krystallisation, indem sie den Indig erhitzten, wobei sich obenauf Krystalle bildeten; 2) durch Auswaschen mit Wasser, Weingeist und Salzsäure, und dann durch Sublimation, um ihn noch von der

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0536-5

Kieselerde zu trennen; 3) durch Fällung aus der Auflösung mit Eisenvitriol und Aetzkalk; aus der heißfiltrirten Flüssigkeit schlägt sich der Indig in dunkelblauen Flocken nieder, die mit salzsaurem Wasser ausgewaschen wurden.

Bestandtheile von	1.	2.	3.
Kohlenstoff . . .	73,26	71,71	74,81
Stickstoff . . .	13,81	13,45	13,98
Wasserstoff . . .	2,50	2,66	3,33
Sauerstoff . . .	10,43	12,18	7,88
	100	100	100

In der Pharmacie wird der Indig nur zum Färben einiger Salben und Oele, und zum Färben des Papiers gebraucht, zu letzterem Zwecke wird die schwefelsaure Auflösung mit Kreide neutralisirt. Bedeutend wichtiger aber ist der Indig für die Färbekunst. Das Neublau ist Stärke oder Kreide, die mit Indigauflösung stark blau gesättigt und getrocknet worden. Aehnlich wird der Plattindig, Indigo in tabulis, erhalten.

* Iod. Jod. Jodine.

Das Jod wurde im Jahre 1811 von Courtois, Sodenfabricanten in Paris, entdeckt. Er fand es in der Mutterlauge bei der Sodabereitung aus derjenigen Art roher Soda, welche durch Einäscherung verschiedener Tangarten erhalten wird, und welche im Handel Kelp oder Varec genannt wird. Der Umstand, daß er seine Metallgefäße angefressen fand, ließ ihn nach der Ursache dieser Erscheinung forschen, und den neuen Stoff entdecken. Seine chemische Natur wurde von H. Davy (Schw. J. XI. S. 68., XIII. S. 112. u. XVI. S. 343.) und dann viel vollständiger von Gay-Lussac (Schw. J. XIII. S. 384. u. XIV. S. 35.; Gilbert's Annalen XLIX. S. 1. u. 211.) dargethan. Man hat diesen Stoff vorzüglich als Bestandtheil einiger kryptogamischen Seepflanzen, nämlich mehrerer Species von Fucus und Ulva, einiger Seeconferven und des Badeschwammes gefunden, in welchen er, zum Theil wenigstens, als Jodnatrium, oder auch als hydriodsaures Kali und Natron enthalten ist, welche schon vor dem Einäschern, vollständiger jedoch nach dem Einäschern, der Pflanzen sich ausziehen lassen. Das Jod auch in dem Meerwasser nachzuweisen, hat lange Zeit nicht gelingen wollen, und da auch aus der Erde, welche den Meeresboden, den Standort dieser Pflanzen, bildet, kein Jod dargestellt werden konnte, so schien es sehr merkwürdig, daß das Jod sich in organischen Körpern befinde, ohne in denjenigen zu seyn, von welchem jene zu ihrem Wachsthume die Urstoffe nehmen. Doch hat später Balard durch sein weiter unten anzugebendes Verfahren das Jod nicht nur als Bestandtheil der Mutterlaugen jener Salinen, welche ihr Salzwasser aus dem mittelländischen Meere erhalten, nachgewiesen, sondern es auch in Substanzen vorgefunden, in welchen es Andere nachzuweisen vergeblich bemüht waren, z. B. in verschiedenen Seethieren, Doris, Venusmuschel ꝛc., in mehreren Polypen und Seegewächsen, den Gorgonien, der Zostera marina u. s. w. Fuchs hat ferner das Jod

in dem bei Hall in Tyrol brechenden Steinsalze, Charpentier in den Seesalzgruben zu Ber, Meißner in der Salzsoole zu Halle, Liebig in der Soole zu Salzhausen, Krüger in der Salzsoole zu Pulz in Mecklenburg, Angelini im Mineralwasser zu Sales in Piemont, Cantu in einem natürlichen Schwefelwasser, Egidi in mehreren salinischen Mineralquellen, welche in der Gegend von Ascoli im Kirchenstaate in reicher Menge vorhanden sind, und zwar als hydriodsauren Kalk in Verbindung mit salzsaurem Kalke, Vogel in der Mineralquelle zu Heilbrunn im baierischen Oberlande, Tucker in dem Mineralwasser zu Bonnington, unweit Leith, aufgefunden, ja in dem Wasser der Ferdinandsquelle des Marienbades hat Berzelius eine Spur von Iod nachgewiesen. Chevalier hat es in den Sepien entdeckt, und man vermuthet es auch als Bestandtheil mehrerer blau gefärbten Mollusken. Endlich ist auch von Vauquelin das Iod im Mineralreiche, nämlich in einem mexikanischen Silbererze, welches an 18,5 Proc. davon enthält, entdeckt worden, wo es wahrscheinlich mit Silber verbunden als Silberiodid vorhanden war. Ja, in lebenden Thieren, nämlich in einem Insect, dem Julus foetidissimus, soll Iod gefunden worden seyn. Der gelbe Saft dieses Insectes roch stark nach Iod, wie Holl berichtet, färbte die Haut stark gelb, und eine Stärkemehlauflösung, welche in ein mit diesem gelben Safte beschmutztes Glas gegossen wurde, nahm sogleich eine violette Farbe an.

Das Iod wird auf folgende Weise gewonnen: Nachdem man die löslichen Theile im Kelp ausgelaugt hat, scheidet man durch wiederholtes Abdunsten alle krystallisirbaren Salze aus. Die Mutterlauge, welche keine Krystalle mehr liefert, enthält nur Iodnatrium (hydriod- oder iodinewasserstoffsaures Natron) mit etwas Kochsalz, Glaubersalz, Natron ꝛc. Man vermischt diese Flüssigkeit mit concentrirter Schwefelsäure, und kocht sie eine Weile in einem offenen Gefäße, wobei Schwefelwasserstoffgas und Salzsäure weggehen. Hierauf bringt man das Gemenge in ein Destillationsgefäß und vermischt es mit sehr fein gepulvertem Braunsteine. Dann wird es wieder erhitzt, wobei das Iodnatrium (oder hydriodsaure Natron) durch den Sauerstoff des Braunsteins zersetzt wird, dadurch, daß sich die metallische Basis, das Natrium, zu Natron oxydirt (daß sich der Sauerstoff des Braunsteins mit dem Wasserstoffe der Hydriodsäure des hydriodsauren Natrons zu Wasser verbindet), und das Natron sich mit der Schwefelsäure vereinigt, wodurch das Iod frei wird. Bei dieser Temperatur verdampft es mit dem Wassergase, und erfüllt das Gefäß mit einem schönen violetten Gase, welches auf den kältern Theilen desselben in stahlgrauen, metallglänzenden Krystallen anschießt, die abgetrocknet und noch einmal sublimirt das reine Iod geben.

Das Iod bildet flitterartige glänzende Blättchen, von schwarzgrauer Farbe, nicht unähnlich dem Reißblei oder Eisenglimmer, oder den Blättchen des sublimirten Arsenikmetalls. Bei einer Temperatur von 175—180 ° C. verflüchtigt es sich in Gestalt eines schön violetten, ins Purpurne sich ziehenden Dampfes, von welcher Farbe (ἰώδης, Viola) es seinen Namen er-

halten hat. Im feuchten Zustande verdampft es ganz bedeutend an der Luft, und verbreitet dabei einen dem des Chlors sehr ähnlichen Geruch, welcher aber doch so viel Eigenthümliches hat, daß man beide auch an dem Geruche unterscheiden kann. Auf die Zunge gebracht, erregt es einen scharfen, dem Geruche analogen Geschmack, welcher lange anhält. Im trocknen Zustande ist es viel weniger flüchtig. Spec. Gew. = 4,948. Das im Handel vorkommende Iod enthält fast immer Kochsalz und andere Substanzen, absichtlich beigemengtes Reißblei, Sand u. dergl., welche bei der Auflösung in Alkohol zurückbleiben. Dieser Verunreinigungen wegen muß das Iod durch eine nochmalige Sublimation gereinigt werden.

Das Iod ist sehr wenig auflöslich im reinen Wasser; enthält dieses aber ein Salz, z. B. salzsaures oder salpetersaures Ammoniak, so nimmt es bedeutend mehr Iod auf. Iodwasser ins Sonnenlicht gestellt, verliert seine brandgelbe Farbe, und enthält dann Iodwasserstoff (Hydriodsäure) und Iodsauerstoff (Iodsäure). In Alkohol und Aether ist es sehr auflöslich. Im Uebrigen verhält sich das Iod meist wie Chlor, hat aber viel schwächere Affinitäten als dieses. Flüchtige Oele, und besonders Terpenthinöl sind nach E. Davy kräftige Lösungsmittel für das Iod; doch gilt dieses nicht allgemein, da einige Oele es nur unvollkommen auflösen; mit andern entsteht eine Art Verpuffung unter Entwickelung violetter Ioddämpfe. Wacholderbeer-, Sadebaum-, Rosmarin-, Lavendel-, Citronen- und rectificirtes Terpenthinöl erhitzen sich mit Iod unter explosiver Verflüchtigung desselben; bei Zimmt-, Nelken- und Sassafrasöl ist dies nicht der Fall. Terpenthinöl zieht nach Davy das Iod aus der Lösung in Wasser mit oder ohne Salze in der Flüssigkeit, und dieses geschieht durch Umschütteln beinahe augenblicklich. Weder Stärkemehl noch metallisches Silber zeigen dasselbe darin an. Die Lösung ist brandgelb und gelbbraun. Wird sie destillirt, so geht zuerst reines Terpenthinöl über, dann folgt die gesättigte Verbindung in braunen Tropfen. Die einzigen Flüssigkeiten, welche Iod ausziehen, sind Lösungen von salpetersaurem Silberoxyd und salpetersaurem Queckſilberoxydul. Mit Kali bildet die Iodlösung eine gelbe seifenartige Masse.

Das Iod verbindet sich mit dem Sauerstoffe und bildet die Iodsäure; jedoch kann diese Verbindung nicht auf directem Wege bewirkt werden. Mit dem Wasserstoffe bildet es die Hydriodsäure, Iodinewasserstoffsäure, welche auf verschiedene Weise, am bequemsten aber dadurch bereitet wird, daß man durch Wasser, in welchem feingepulvertes Iod vertheilt ist, einen Strom von Schwefelwasserstoffgas leitet; das Iod bemächtigt sich des Wasserstoffgases, wird dadurch zu Iodwasserstoffsäure, die man durch Filtriren von dem aus dem zersetzten Schwefelwasserstoffgase präcipitirten Schwefel, und durch Erhitzen von unzersetzt gebliebenem Schwefelwasserstoffgase befreiet.

Auch mit den andern elementaren Stoffen geht das Iod, ähnlich dem Chlor, Verbindungen ein, so mit dem Phosphor, welche Verbindung mit Heftigkeit erfolgt. Wenn man in einem Probirgläschen 10 oder 20 Gran Iod mit eben so viel wasserfreiem Weingeiste übergießt, und dann 5—10

Gran Phosphor hineinwirft, so erfolgt plötzlich eine große Temperaturerhöhung. Die Masse wirft dann schäumend weiße Dämpfe von hydriodsaurem Weingeiste, violette Joddämpfe und Phosphorwasserstoffgas aus, welches sich zwischen beiden Dampfschichten flammend entzündet. Die ganze Erscheinung gewährt einen schönen Anblick. Die rückständige Flüssigkeit besteht aus phosphoriger Säure und hydriodsaurem Weingeiste, welche durch Wärme von einander getrennt werden können.

Auch mit Metallen geht das Jod Verbindungen ein.

Zu verschiedenen organischen Materien hat das Jod große Verwandtschaft, es verbindet sich mit ihnen, ohne sich zu zersetzen, z. B. Zucker, Gummi, Stärkemehl. Jod färbt die Haut braun, was indeß bald wieder verschwindet; auch Papier, Leinen und Holz färbt es braun, aber dann ist die Färbung beständig, und Papier und Leinen werden davon spröde. Unter diesen Verbindungen ist die des Jods mit Stärkemehl so charakteristisch, daß wir uns derselben zur Entdeckung des Jods bedienen, wenn dasselbe in so kleinen Mengen vorhanden ist, daß es auf andere Weise nicht entdeckt werden kann. Vermischt man Stärkemehl mit einer Flüssigkeit, welche freies Jod enthält, so verbindet sich das Stärkemehl damit, und wird röthlich oder blau gefärbt, je nachdem weniger oder mehr Jod vorhanden ist. Die meisten Körper aber, welche allein oder bei dem Zutritte des Wassers Wasserstoff entwickeln, verwandeln das Jod in farblose Jodwasserstoffsäure, und zerstören die blaue Farbe des Jodstärkemehles; gewöhnlich kommt auch schon das Jod als Jodwasserstoffsäure an Salzbasen gebunden vor, aus welchen Verbindungen es daher frei gemacht werden muß. Dieses kann dadurch geschehen, daß man der zu prüfenden Flüssigkeit Stärkemehl beimengt, dieselbe mit Salpetersäure sauer macht, worauf man das Gemenge wohl verschlossen stehen läßt. Die Salpetersäure trennt die Hydriodsäure von der Base, und zersetzt zugleich die erstere durch Abgabe von Sauerstoff, wodurch das darin enthaltene Jod abgeschieden, Wasser und salpetrige Säure gebildet werden. Durch das abgeschiedene Jod wird nach und nach das Stärkemehl gefärbt. Nach Stromeyer wird auf diese Weise noch $\frac{1}{130000}$ aufgelösten Jods angezeigt. Diese Probe kann auch in der Art abgeändert werden, daß die Flüssigkeit mit Salpetersäure in einer Flasche vermischt wird, in welcher man über der Oberfläche der Flüssigkeit ein feuchtes mit etwas Stärkemehle bestreutes Papier aufhängt, worauf die Flasche verkorkt, und einige Stunden lang stehen gelassen wird. Der Erfolg wird hier derselbe seyn, nämlich das durch die Salpetersäure ausgeschiedene und im feuchten Zustande flüchtige Jod wird sich über die Flüssigkeit erheben, und das daselbst befindliche Jod färben. Nach Baup wird auch ein Milliontheil Jod sichtbar gemacht. Diese zweite Art des Versuches ist auch deßwegen sicherer, weil, wenn nach der ersteren Methode das Stärkemehl in die Flüssigkeit selbst gebracht wird, es auch von andern Materien, welche die Säure ausfällt, gefärbt werden kann; so wird z. B. aus der Mutterlauge verschiedener Sodaarten durch Salpetersäure nach einer Weile Berlinerblau gefällt, welches mit dem Stärkemehle

vermischt niederfällt und leicht irre führen kann. Nachstehende von Balard vorgeschlagene Probe ist die einfachste und sicherste. Man versetzt die Flüssigkeit, in welcher man Jod vermuthet, mit Amylum und etwas Schwefelsäure, um die Hydriodsäure aus den Salzen abzuscheiden, dann gießt man langsam eine Schicht wäßriges Chlor darauf, welche, vermöge ihres geringern Eigengewichts, darüber stehen bleibt. Ist Jod zugegen, so bildet sich in dem Augenblick, wo sich die beiden Flüssigkeiten berühren, eine blaue Zone, die, wenn sie auch noch so schwach ist, doch leicht bemerkt werden kann. Bewegt man das Gefäß langsam, oder rührt gelinde mit einem Glasstabe, so bilden sich blaue Wolken; schüttelt man alles durch einander, so verschwindet die blaue Farbe augenblicklich, wenn nur etwas zuviel Chlor zugegen ist. Diese Erfolge erklären sich dadurch, daß das Chlor vermöge näherer Verwandtschaft zum Wasserstoffe diesen dem Jodwasserstoff (-säure) entzieht, wodurch Salzsäure gebildet, das Jod aber abgeschieden wird, welches nun die Stärke blau färbt; ist aber Chlor im Uebermaße vorhanden, so vereinigt sich dieses zu Jodchlorid, welches sogleich wieder durch Zersetzung eines Antheils Wasser in Chlorwasserstoff- (Salz-) Säure und in Jod- (Sauerstoff) Säure zerfällt.

Das Jod ist eins unserer heroischen Heilmittel geworden. Coindet entdeckte, daß es eine specifische Wirkung gegen den Kropf äußere, und daß es im Allgemeinen, innerlich und äußerlich angewandt, Absorption und Umfangsverminderung im Drüsensysteme veranlaßte. Doch ist bei seinem Gebrauche große Vorsicht nöthig, weil es in großen Gaben giftige Wirkungen äußert, und mit Recht zu den stärksten Giften gezählt wird, daher auch die bei diesen vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln hinsichts der Aufbewahrung ꝛc. gleichfalls beobachtet werden müssen. Das Jod wurde im Anfange häufig in starkem Alkohol aufgelöst, als Tinctura Jodinae, innerlich verordnet; jetzt ist dieselbe, ihrer häufigen nachtheiligen Wirkungen wegen, fast ganz außer Gebrauch gekommen, und das Jod wird jetzt nur in der salzartigen Verbindung mit Kali äußerlich angewandt.

Ipecacuanha. Die Wurzel. Brechwurzel.

Cephaëlis Ipecacuanha Willd. Eine perennirende Pflanze Brasiliens.

Eine walzenförmige, ästige, dünne, geknieete Wurzel, mit zahlreichen, ungleichen, hervorragenden Warzen. Sie besteht aus einer schwärzlichen Oberhaut, aus einer weißlichen glänzenden, zerbrechlichen, bittern und scharf-ekelhaften Rinde, und aus einem innern holzigen, etwas gelblichen, unschmackhaften Theile. Das Pulver muß in gut verschlossenen Gefäßen, und nicht gar zu lange aufbewahrt werden. Die Gabe bis zu einer halben Drachme.

Cephaëlis Ipecacuanha W. Brechenerregende Kopfbeere. Aechte Brechwurzel.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XI. Ord. 2. Rubiaceae.

(Berl. Jahrb. 1804. S. 73. und Berl. Jahrb. XXII. S. 25.)

Ueber das Vaterland und die Mutterpflanze der Brechwurzel war lange nichts Gewisses bekannt, bis der portugiesische Arzt Gomez im Jahr 1801, und nachher der Professor der Botanik Brotero zu Lissabon sichere Nachrichten gegeben haben. Neuerlichst hat der berühmte Reisende Hr. v. Martius eine genaue Beschreibung und Abbildung dieser Pflanze nach den an Ort und Stelle gesammelten Exemplaren in seinem Werke: **Specimen, exhibens plantas medicinales etc.** gegeben, aus welchem Hr. Dr. Th. Martius (Buchn. Repert. XXII. 1825. S. 1.) einen Auszug gegeben hat.

Die ächte Ipecacuanha wächst in großer Menge in den feuchten und schattigen Urwäldern Brasiliens. Es ist ein kleiner, kriechender, oder doch wenig über den Boden erhobener Strauch. Die Wurzel ist einfach oder in wenige sparrige Aeste getheilt, sie geht schief in den Boden, ist gebogen, gewunden, 4—6 Zoll lang, selten noch etwas länger, ungefähr so dick, wie eine Schreibfeder, nach der Spitze und nach der Basis zu meistens etwas verdünnt, geringelt. Die Glieder zwischen den Ringen sind gewöhnlich über die Hälfte der Wurzeldicke breit und ungleich, hier und da mit dünnen gebogenen einfachen oder wenig zertheilten freistehenden Fasern versehen. Die Oberhaut ist glatt, an der frischen Pflanze hellbraun, getrocknet umbrabraun, schwärzlichbraun oder graubraun. Die Rinde oder das Parenchyma, welches die Rinde bildet, ist gleichmäßig weiß, getrocknet blaßröthlich oder blaßgelblich, in das Rosenrothe spielend, harzig glänzend, und läßt sich leicht von dem holzigen, runden, hellgelben Centralfaden trennen, welcher hier und da dazwischen sichtbar wird.

Der anfangs unter der Erde verborgene Stamm kommt hervor und erhebt sich ungefähr fußhoch. Er ist halb strauchartig, einfach, undeutlich vierkantig, oberwärts schwach behaart. Die Blätter, 6—8 an der Zahl, nehmen nur den obern Theil des Stengels ein; sie sind entgegengesetzt, kurzgestielt, verkehrt-eiförmig, spitz, ganzrandig, 3—4 Zoll lang, 1—2 Zoll breit, oben dunkelgrün, unten blaß, mit hervortretenden Adern. Zwischen den Blättern befinden sich zwei ziemlich große Nebenblätter. Die Blüthenstiele kommen einzeln aus den Blattwinkeln hervor, die kleinen weißen Blüthen sind in ein rundes Köpfchen gesammelt. Dieses wird am Grunde von einer sehr großen, aus vier behaarten Blättchen gebildeten Hülle umgeben. Die Frucht ist eine Steinfrucht, und enthält zwei weißliche Steinchen.

Dieses ist die Pflanze, welche die so häufig in Europa gebrauchte Ipecacuanha liefert. Sie kommt häufig zwischen dem 8ten und 20sten Grade südlicher Breite, seltener außerhalb dieser Breiten, sowohl gegen den Südpol als gegen den Aequator hin, an schattigen, dichtbewachsenen und feuchten Plätzen vor. Die Indianer sind so emsig im Aufsuchen derselben, daß sie

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0542-7

öfters mehrere Monate lang ihre Dörfer verlassen, und an den Orten, wo die Pflanze im Ueberflusse wächst, als in den Thälern der Granitgebirge, welche sich von den Provinzen Rio de Janeiro, Espiritu santo durch die Provinz Bahia hindurch in einer Kette, bald näher bald ferner vom Meere gegen Pernambuco hinziehen, Hütten bauen, um die Wurzel zum künftigen Verkaufe zu sammeln. Sie reißen zu dem Ende die Sträucher aus der Erde, schneiden die Wurzeln mit dem Messer ab, waschen sie oder lassen wohl auch die Erde noch daran hängen, und binden sie in Bündel von verschiedener Gestalt und Größe, um sie an der Sonne zu trocknen. Sie sammeln sie fast in jeder Jahreszeit, doch häufiger in den Monaten Januar, Februar und März, was, da später im April und Mai die Früchte zu reifen beginnen, der Fortpflanzung der Pflanze sehr viel Eintrag thut.

Die ächte Ipecacuanha kommt unter manchen Gestalten vor, die nur nach ihrem Alter und nach der Art, wie sie getrocknet werden, unter einander verschieden sind. Die gewöhnlichste in den Officinen ist die **Ipecacuanha fusca** oder **annulata brunea**. Dieses ist die ältere, etwas dickere Wurzel, welche deutlich knotig und geringelt ist, eine dickere, dunkel rothbraune, ja schwärzliche Oberhaut, eine härtere und harzreichere Rinde hat, als die **Ipecacuanha annulata griseo-rubens**. Die **Ipecacuanha griseo-alba** kommt bei uns höchst selten vor, und scheint nach Martius nur dadurch von den andern unterschieden zu seyn, daß sie schneller getrocknet und an einem feuchten Orte aufbewahrt wird.

Die weiße, die Feldbrechwurzel (**Poaya, Ipecacuanha branca**), welche bei den Brasilianern in besonderm Rufe steht, wird, wie Martius bestimmt angiebt, theils von Arten der **Richardsonia**, theils von mehren Arten **Ionidium** gesammelt. Hierher scheint auch die im Handel vorkommende spanische Brechwurzel zu gehören, dieselbe, welche Guibourt wellenförmige Brechwurzel nennt, und die die Wurzel der **Richardsonia scabra** ist, die aber nach Pelletier's Analyse nur 6 Procent Brechstoff enthält; sie darf also nicht angewandt werden. (Brande's Archiv III. S. 141.)

Die schwarze Brechwurzel von **Psychotria emetica** gehört unter die Seltenheiten und kommt nie in großer Menge im Handel vor; sie liefert nur 9 Procent Emetin. (Buchn. Repert. XVII. 2. S. 178.)

Nach St. Hilaire ist die Ipecacuanha jetzt weniger häufig als sonst; er glaubt deßhalb, man könne an ihrer Stelle sich folgender Wurzeln bedienen, nämlich **Richardsonia rosea, R. scabra**, welche beide in Brasilien unter dem Namen **Poaya do campo** bekannt sind, und deren Wurzel im hohen Grade brechenerregend ist; ferner **Ionidium hirsutissimum** und **Conohoria Lobolobo**.

Eine Analyse der Brechwurzel von Henry findet sich im Berl. Jahrb. 1808. S. 142.

Bucholz (Taschenb. 1818. S. 69.) fand in 100 Th. brauner oder geringelter Ipecacuanha: eigenthümlichen Extractivstoff durch Weingeist ausziehbar 4,13; Extractivstoff durch Wasser ausziehbar 10,12; durch Kali aus-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0543-3

gezogene extractartige Materie 5,15; durch dasselbe ausgezogene gummige Materie 25,45; durch dieselbe Behandlung ausgezogene stärkemehlartige Materie 4,20; Gummi 25,17; stärkemehlartigen Stoff 9,00; Weichharz 2,43; Zucker 2,00; Wachs 0,75; Holzfaser 10,80; Verlust 0,77.

Pelletier (Schw. J. XIX. S. 440.) sonderte die Rindensubstanz von dem holzigen Theile ab, und untersuchte jeden dieser Theile besonders. Zuerst wurde die Rindensubstanz mit Aether unter mitwirkender gelinder Wärme zu verschiedenen Malen behandelt. Hierauf wurde höchst reiner Alkohol bis zur völligen Erschöpfung angewandt, dann das wieder getrocknete Pulver erst mit kaltem und dann mit siedendem Wasser ausgezogen.

Die ätherischen Tincturen waren schön goldgelb, und ließen eine fette Materie zurück, die als solche eine bräunlichgelbe Farbe hatte, Aether und Alkohol aber goldgelb färbte. Sie hatte fast gar keinen Geschmack, aber einen sehr starken Geruch, der sich dem des wesentlichen Oels vom Rettig näherte, und bei der Wärme unausstehlich wurde. Dieser Materie muß man den Geruch der Wurzel zuschreiben. Diese fette Materie schmilzt in der Wärme und es scheidet sich ein außerordentlich flüchtiges Oel von einem sehr penetranten Geruche aus; aber der größte Theil der Materie wird zersetzt, ehe er sich verflüchtigt, und liefert die Producte der Verkohlung der stark wasserstoffhaltigen Vegetabilien. Zieht man Wasser über diese fette Materie ab, so erlangt es einen starken Geruch nach Ipecacuanha.

Die weingeistigen Tincturen ließen in der Kälte einige leichte Flocken fallen, welche auf ein Filter gesammelt sich als Wachs zu erkennen gaben. Die Tincturen waren gelbbraun, und lieferten einen festen Rückstand von safranrother Farbe. Dieser Rückstand löste sich größtentheils in Wasser auf, nur ein wenig Wachs sonderte sich noch ab. Die wäßrige Auflösung gab nach dem Verdunsten einen Rückstand, der sehr zerfließlich, säuerlich, von einem bittern und ein wenig scharfen Geschmacke, aber von keinem Geruche war. Die Säure wurde durch kohlensaure Schwererde weggeschafft, welche aber aus dieser Verbindung wegen der geringen Menge nicht abgeschieden werden konnte, jedoch für Gallussäure erklärt wird, weil die saure Flüssigkeit die essigsaure Eisenauflösung grün färbte. Die von der Säure befreite Auflösung wurde durch essigsaures Bleioxyd niedergeschlagen, das sie beinahe vollkommen entfärbte; das basische Salz entfärbte sie auf der Stelle. Der dadurch erhaltene grauliche Niederschlag wurde in Wasser zertheilt und durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt, und die dadurch vom Bleioxyd getrennte im Wasser auflösliche Materie als der wesentliche emetische und die Haupteigenschaft der Ipecacuanha besitzende Stoff erkannt.

Aus der durch Aether und Alkohol erschöpften Wurzel nahm Wasser bei der gewöhnlichen Temperatur Gummi auf mit noch etwas Emetin; durch Kochen wurde Stärkemehl ausgezogen.

Nach dieser Analyse enthielten 100 Th. der Rindensubstanz: fetten und und öligen Stoff 2; emetischen Stoff (Emetine) 16; Wachs 6; Gummi 10; Amylum 42; holzigen Antheil 20, Spuren von Gallussäure und Verlust 4.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0544-9

100 Th. der holzigen Mittelfaser, auf dieselbe Weise behandelt, gaben: Emetin 1,15; Extractivstoff, nicht emetisch, 2,45; Gummi 5; Amylum 20; holzigen Antheil 66,60; Spuren von einem fetten Stoffe; Verlust 4,80. (Vergl. Buchn. Repert. VII. S. 289.)

Flashoff (Taschenb. 1821. S. 83.; Trommsd. N. J. V. 1. S. 306.) erhielt ein Emetin, das sich sehr hygroskopisch zeigte.

Colmet empfiehlt die gepulverte Ipecacuanha mit kochendem Wasser auszuziehen, sämmtliche Auszüge im Wasserbade bis zur Syrupsdicke abzudampfen, und zur Sättigung der Säure etwas kohlensaure Bittererde zuzusetzen. Hierauf wird das Ganze bis zur Trockne abgeraucht, zerrieben, und so lange mit absolutem Aether behandelt, bis dieser sich nicht mehr färbt. Der Rückstand wird mit warmen Alkohol ausgezogen, die Tinctur filtrirt und zur Trockne abgeraucht. Dieses Product wird mit kaltem Wasser behandelt, welches bloß das Emetin auflöst, die Auflösung filtrirt, unter beständigem Umrühren im Wasserbade bis zur Syrupsdicke abgeraucht, und in diesem Zustande auf flache Schüsseln vertheilt, und dann vollständig im Trockenofen eingetrocknet. Die Behandlung mit Aether kann nicht erspart werden, weil sonst das Emetin statt des ihm eigenthümlichen angenehmen Geruchs den nauseösen der Ipecacuanha, von dem fetten Stoffe, hat, wenn es gleich dieselben Wirkungen zeigt.

Pelletier (Schw. N. J. II. S. 35.) hatte schon angezeigt, daß das zuerst von ihm dargestellte Emetin noch nicht rein sey, sondern einen Farbestoff enthalte; derselbe gab in Verbindung mit Dumas (Schw. N. J. X. S. 93.) folgendes Verfahren an, um das Emetin im reinen Zustande darzustellen. Statt der früher empfohlenen kohlensauren Bittererde muß man die reine Bittererde anwenden, und zwar in hinreichender Menge, damit nicht allein die freie Säure gesättigt, sondern auch das Emetinsalz zerlegt werde. Das Emetin wird dann frei, schlägt sich nieder und bleibt mit dem Ueberschusse von Bittererde gemengt zurück. Man gießt die Flüssigkeit ab, wäscht den Niederschlag mit sehr kaltem Wasser aus, um die mit der Bittererde nicht verbundene färbende Materie abzuscheiden, trocknet den Niederschlag und zieht dann das Emetin mit starkem Weingeiste heraus. Um es noch weißer zu erhalten, kann man es mit einer Säure verbinden, das Salz mit thierischer Kohle behandeln, durch Bittererde das Emetin niederschlagen und vermittelst starken Weingeistes es aus dem Niederschlage wieder abscheiden.

Bei allen diesen Arbeiten ist es zweckmäßig, die Abwaschwasser zu beachten, denn man kann aus ihnen durch zweckmäßige, von den bekannten Eigenschaften des Emetins hergeleitete Mittel noch eine gewisse Menge Emetin ausscheiden.

Das so erhaltene Emetin ist weiß, zuweilen gelblich, pulverig, und erleidet keine andere Veränderung an der Luft, als daß es sich etwas dunkler färbt. Kaltes Wasser löst davon nur wenig, heißes etwas mehr auf; in starkem Alkohol ist es sehr löslich, aber der Aether und die Oele lösen dasselbe nicht merklich. Es zeigt in einem hohen Grade alkalische Eigenschaften,

sättigt die Säuren, aber mit keiner derselben bildet es ein krystallisirbares Salz, obgleich die sauren Lösungen des Emetins einige Krystallanfänge zeigen. Die concentrirte Salpetersäure zersetzt das Emetin mit Leichtigkeit, und ändert es erst in eine bittere harzige Masse, und endlich in Sauerkleesäure um. Gallussäure und der Galläpfelauszug bilden in den Lösungen des Emetins weiße reichliche Niederschläge. Diese Eigenschaften hat es mit dem Chinin (und den übrigen Pflanzenalkalien) gemein, aber ersteres wird nicht durch sauerkleesaure oder weinsteinsaure Kalien gefällt, wie dieses. Endlich zeigt der Bleiessig (das basische essigsaure Blei), welcher die gefärbten Emetinauflösungen stark fällt, gar keine Wirkung auf dieses reine Emetin. Seine Anwendung erfodert Vorsicht, aber seine Wirkungen sind sicherer. Im Falle einer Vergiftung ist, dem Vorhergehenden zufolge, Galläpfelaufguß das einzige Gegengift.

Zusammengesetzt fanden sie dieses reine Emetin aus: Kohlenstoff 64,57; Stickstoff 4,30; Wasserstoff 7,77; Sauerstoff 22,95. S. = 99,59.

Die Ipecacuanha wird in ihrem Vaterlande gegen den Biß giftiger Schlangen gerühmt, auch soll sie gegen den tollen Hundsbiß als ausleerendes und schweißtreibendes Mittel vortreffliche Dienste leisten. Den Brasilianern gilt überhaupt diese Wurzel als eine wahre Panacee, so daß sie kaum ein anderes Arzneimittel bei den verschiedenartigsten Krankheiten mit gleichem Vertrauen anwenden. Sie nehmen größere Dosen, als bei uns gebräuchlich sind, nämlich 20—60 Gran.

Sie wird fast nur allein in Pulverform gebraucht. Hierbei stößt sich die äußere Rinde der Wurzel ab, und der innere holzige, am Brechstoffe sehr arme, mithin wirkungslose Theil der Wurzel bleibt zurück und wird als unnütz weggeworfen. Doch muß das ganze Pulver gut gemischt, und in fest verstopften Gläsern aufbewahrt, auch nicht zu lange Zeit vorräthig gehalten werden.

Das Emetin ist gerade nicht häufig in Gebrauch gezogen worden.

Iris florentina. Die Wurzel. Florentinische Veilchenwurzel.

Iris florentina Linn. Eine ausdauernde Pflanze Italiens.

Eine knotige feste Wurzel (Sprosse) von der Dicke eines Daumens, nach dem Abschneiden der Rinde mit den Wurzelzasern weiß, mit gelblichen Punkten gezeichnet, von einem Veilchengeruche.

Iris florentina Linn. Florentinische Schwertlilie.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 8. Irideae.

Diese Pflanze ist im südlichen Europa einheimisch, und wächst häufig in Italien, vorzüglich in der Umgegend von Florenz, in Dalmatien, Ungarn ꝛc. Ihrer schönen Blumen wegen wird sie bei uns in Gärten zur Zierde gezogen.

Die knollige, gegliederte und kriechende Wurzel treibt einen aufrechten, runden, 1—2 Fuß hohen Schaft, und gerade, schwertförmige, sehr glatte,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0546-0

bläulichgrüne Blätter, die kürzer sind als der Schaft. Die großen, aufrechten, gestielten, weißgelblichen, an den abstehenden Blumenkronlappen mit gelben Bärten versehenen Blüthen stehen zu eins oder zwei an dem Ende des Stengels, und verbreiten einen feinen sehr angenehmen Wohlgeruch. Die Blumenscheide ist zwei- bis dreiblättrig; die Blumenkrone einblättrig und sechstheilig, die Röhre derselben kaum von der Länge der Fruchtknoten.

Die Blüthezeit dieser Pflanze ist Mai und Juni.

Die officinelle Wurzel, die im dritten Jahre aus der Erde genommen wird, ist zwei und mehrere Zolle lang, schwer und dicht, innen weiß, frisch mit gelbrother Rinde überzogen und mit Fasern besetzt. So wie dieselbe im Handel vorkommt, besteht sie aus dichten, schweren, weißen, etwas flachen, knotigen, mit gelbbräunlichen Punkten bezeichneten, von der Rinde und den Fasern befreiten, an der Sonne getrockneten Wurzelstücken von verschiedener Gestalt, Größe und Dicke. Sie besitzt einen angenehmen Veilchengeruch, und einen schleimigmehligen, bitterlichscharfen Geschmack. Sie muß, da sie dem Schimmel und Wurmfraße sehr unterworfen ist, an einem luftigen und trocknen Orte aufbewahrt werden.

Sie kommt zuweilen mit den Wurzeln der folgenden Pflanze vermischt vor, die aber kleiner, dünner, minder weiß und schwächer riechend sind.

Bei der Destillation mit Wasser wird ein geruchvolles Destillat, jedoch kein substantielles Oel erhalten. Der geistige Auszug hat eine gelbliche Farbe, einen angenehmen Veilchengeruch, und einen bitterlichen, balsamischen, scharfen Geschmack, von einer Schärfe, die sich erst allmälig entwickelt, und in dem Schlunde ein Brennen wie Pfeffer verursacht. Raucht man diese Tinctur zum Theil ab, so erscheinen auf der obern Fläche öligharzige Theilchen, die abgesondert in der Kälte zu einem schmierigen Harze gerinnen, in der Wärme wieder flüssig werden, und einen etwas fetten, aromatischen, hintennach scharf brennenden Geschmack haben. Raucht man die Tinctur ganz ab, so bleibt ein ähnliches Harz von braungelber Farbe zurück. Eine Unze Wurzel giebt eine Drachme dieses Extractes.

Der wäßrige Aufguß ist blaßgelb, von bitterlichem, mäßig scharfem und etwas widerlichem Geschmacke, und von einem angenehmen Veilchengeruche. Durch Eisenauflösungen wird die Farbe dunkler braun. Durch starkes Auskochen erhält man $\frac{3}{5}$ schmutzigbraunes, bitterliches, kaum etwas scharfes Extract von einem noch merklichen Veilchengeruche. Es besteht aus gummigem Extractivstoffe und Stärkemehle mit einem kleinen Antheile des scharfen Harzes. Dieses scharfe Weichharz scheint auch der vorzüglich wirksame Bestandtheil der Wurzel zu seyn.

Vogel (Trommsd. J. XXIV. 2. S. 64.) erhielt bei der Destillation mit Wasser ein milchiges Destillat, auf dessen Oberfläche eine dunkelweißliche Masse, dem Rosenöle ähnlich, von dem angenehmsten Veilchengeruche, und sich sonst wie ein ätherisches Oel verhaltend, schwamm. Das Decoct nahm von schwefelsaurem Eisenoxydul eine weinrothe, von schwefelsaurem Eisenoxyd eine dunkelgrüne beinahe schwarze Farbe an. Das durch Abrauchen er-

haltene Extract war schmutziggrau, dem Kautschuk ähnlich. Beim Erkalten der Absude schied sich Amylum (oder vielmehr Inulin) aus. Das oben beschriebene Weichharz erschien hier mehr als ein fettes Oel, das bei gewöhnlicher Temperatur die Consistenz des Ricinusöles hatte, gelbgrün war, und außerordentlich bitter und scharf schmeckte. Es war in Aether, Alkohol und Terpenthinöl leicht auflöslich. Das Extract enthielt adstringirenden Extractivstoff und Gummi.

Die frische Wurzel scheint auch noch einige flüchtige Schärfe zu enthalten, durch welche sie heftiger, als Brechmittel und Abführungsmittel, wirkt.

Die Wurzel wird in Pulverform gegeben, auch zu Niespulver, Zahnpulver ꝛc. verordnet. Die ganze Wurzel giebt man kleinen Kindern beim Zahnen in den Mund, um darauf zu beißen.

* Iris nostras. Die Wurzel. Blaue Lilienwurzel.

Iris germanica Linn. Deutsche Schwertlilie. Gemeine blaue Schwertlilie.

Classe und Ordnung wie bei der vorigen.

Diese ausdauernde Pflanze wächst in mehreren Ländern Europas, in verschiedenen Gegenden Deutschlands, sowohl an feuchten als trocknen Orten, in schattigen Wäldern, auf Grasplätzen u. s. w.

Die längliche, knollige, kriechende Wurzel treibt einen aufrechten, runden, vielblumigen Schaft, welcher 1½—2 Fuß hoch wird. Die schwertförmigen Blätter sind kürzer als der Schaft, glatt, aufrecht, sichelförmig-gebogen und an ihrem Grunde scheidenförmig. Die Blumen sind abwechselnd, gestielt, violettblau, mit röthlichen Adern durchzogen; die obern fast aufsitzend. Die Blumenscheiden sind 2—3blättrig; die Röhre der einblättrigen, sechstheiligen Blumenkrone ist etwas länger, als der Fruchtknoten.

Die Blüthezeit ist Mai und Juni.

Die Wurzel, blaue Schwertlilienwurzel, Radix Iridis nostratis s. Gladioli coerulei, die im Frühjahre ausgegraben werden muß, ist lang, gegliedert, fleischig, dick, inwendig weißlich, äußerlich grau und mit Fasern besetzt; im frischen Zustande widrig riechend, und von einem sehr scharfen, beißenden Geschmacke. Schnell getrocknet erhält sie einen schwachen Violengeruch und der Geschmack wird bitterlich.

Die frische Wurzel enthält einen scharfen, brennenden, den Magen und Darmcanal stark angreifenden Saft, und ist ein heftig wirkendes Brech- und Abführmittel, dessen sich die ältern Aerzte in der Wassersucht bedienten. Heutzutage wird sie nur noch als Hausmittel benutzt.

Juglans. Die Nüsse. Wallnüsse.

Juglans regia Linn. Ein in Persien und Ostindien einheimischer, in Deutschland angebauter Baum.

Die ranzigen Nüsse sind zu verwerfen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0548-2

Juglans. Die grüne Rinde der Nuß. Grüne Wallnußschale.

Nur die frische Rinde werde genommen.

Juglans. Die unreifen Nüsse. Unreife Wallnüsse.

Die frischen Nüsse müssen gesammelt werden, so lange sie noch mit einer Nadel durchbohrt werden können.

Juglans regia Linn. Der gemeine Wallnußbaum.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Polyandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Der Wallnußbaum kommt aus Persien her, wo er noch wild in der Mitte der Wälder angetroffen wird. Ob er nun gleich in Europa beinahe einheimisch geworden ist, und eine gewöhnliche Kälte ziemlich gut aushält, so gewöhnt er sich doch nicht so ganz an unser Klima, daß er einer sehr strengen Winterkälte widerstehen könnte. Er wird daher nur besonders häufig im südlichen Europa, so wie auch in Deutschland und an andern Orten angebaut. Seine weitauslaufenden Wurzeln, sein Schatten und seine abfallenden Blätter sind aber den um ihn stehenden Vegetabilien nachtheilig. Er ist einer unserer schönsten Bäume, trägt eine ausgebreitete dichte Krone, wird ziemlich stark, 50—60 Fuß hoch, aber nicht leicht über 80 Jahre alt.

Die Rinde ist an jungen Bäumen glatt und glänzend braun, an ältern dick, aschfarbig, rauh und aufgesprungen. Das Holz ist hart. Die großen, gestielten, schön grünen, abwechselnden Blätter sind ungepaart-gefiedert, und bestehen aus 5, 7—9 oval-lancettförmigen, entgegengesetzten, ganzrandigen, fast aufsitzenden Blättchen; sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und gewürzhaft zusammenziehenden Geschmack. Die männlichen Blüthen bilden an dem ältern Holze lange, runde, herabhängende Kätzchen von braungrüner Farbe; die weiblichen Blüthen, zu zwei oder drei am Ende der jungen Triebe, jede mit einigen runden, pfriemenförmigen Blättchen umgeben. Die Frucht, eine Nuß oder trockne Steinfrucht, ist eiförmig kugelig. Die äußere Schale der Frucht ist glatt, fest, dick, fleischig, lebhaft grün, und mit einer Längsfurche versehen. Unter dieser Schale befindet sich eine zweiklappige, netzförmig gefurchte, knöcherne, röthlichgelbe Nuß, welche nach den Abarten des Baumes in ihrer Größe und Härte verschieden ist. Der Kern ist unregelmäßig wellenförmig gestaltet, in vier Lappen getheilt, ölig und sehr wohlschmeckend.

Der Nußbaum blüht im April und Mai; die Früchte reifen im September und October.

Die Früchte dieses Baumes werden auf verschiedene Weise in den pharmaceutischen Gebrauch gezogen. Die unreifen Nüsse, wenn sie noch so jung und weich sind, daß sie mit einer Nadel durchstochen werden können, werden zur Bereitung des officinellen Extractes benutzt; aus den reifen, nicht ranzigen Nüssen wird ein kalt geschlagenes Oel bereitet, und von den Nüssen wird

die grüne frische Schale benutzt, Cortex nucis Juglandis, Putamina nucum Juglandis. Diese hat einen sehr bittern, zusammenziehenden, äußerst herben Geschmack, und widrig gewürzhaften Geruch. Der Saft derselben färbt die Hände braungelb und schwarz. Sie wird von den noch unreifen Früchten in den Monaten Juni und Juli genommen, und ist im trocknen Zustande schwärzlichbraun, von etwas gewürzhaftem, doch unangenehmen Geruche und bitterlich herbem Geschmacke.

Braconnot (Trommsd. J. XX. 2.) hat die grünen Wallnußschalen analysirt, und folgende Bestandtheile gefunden: einen eigenthümlichen scharfen, sehr leicht zersetzbaren Bitterstoff, der durch die Einwirkung der Luft in eine Art von kohliger Materie übergeht; Gerbestoff; Stärkemehl; harziges Blattgrün; Pflanzenfaser; Aepfelsäure; citronensauren, kleesauren und phosphorsauren Kalk und in der Asche noch kohlensaures Kali und Eisenoxyd. Auf dieser Zersetzung des Bitterstoffes beruht das Braunwerden der anfangs weißen inneren Oberfläche der Schalen, und eben deshalb schmeckt auch wegen des vorwaltenden Gerbestoffs und der Pflanzensäuren das daraus bereitete Extract mehr säuerlichherbe, als scharf und bitter.

Die Wallnußschalen werden in der Abkochung gegen venerische, dem Queckfilber nicht weichende Krankheiten gerühmt, auch äußerlich gegen unreine scorbutische Geschwüre angewandt.

Schaumburg (Brandes Archiv IV. S. 336.) empfiehlt die grünen Schalen, die auch zum Färben benutzt werden können, zur Bereitung der Tinte anzuwenden.

Brandes bestätigt dies aus eigener Erfahrung, und erklärt die Galläpfel dazu für ganz überflüssig. Folgendes Verfahren soll das vortheilhafteste seyn: 6 Loth Blauholz und 12 Loth arabisches Gummi werden mit 24 Pf. Regenwasser bis auf 16 Pf. Rückstand eingekocht, und die Colatur auf 1 Pf. 22 Loth bei gelinder Wärme getrockneter Wallnußschalen und 1 Loth Gewürznelken gegossen. Das Ganze läßt man 4 Tage unbedeckt digeriren, gießt das Infusum ab, und setzt demselben ein halbes Pfund schwefelsaures Eisen hinzu. Schnell getrocknete frische Schalen geben nicht eine so gute Tinte, als langsam getrocknete.

Die grünen Nußschalen sind auch zum Gerben empfohlen.

Das Nußbaumholz vom Stamme und von der Wurzel wird sehr zu Tischlerarbeit gesucht.

Die wohlschmeckenden reifen Früchte dieses Baumes sind allgemein bekannt.

Juniperus. Die Beeren. Wachholderbeeren.

Juniperus communis Linn. Ein Baum oder Strauch des nördlichen Europas.

Schwarze, kugelrunde, oberhalb mit drei erhabenen Punkten und Furchen gezeichnete beerenartige Früchte, ein trocknes bitterlichsüßes Mark und ein unangenehm riechendes ätherisches Oel enthal-

tend. Im Herbste einzusammeln; die gar zu alten sind zu verwerfen.

Juniperus. Das Holz. Wachholderholz.

Ein weißliches, zähes, schweres Holz, der Rinde beraubt, harzig, beim Räuchern einen angenehmen Geruch verbreitend.

Juniperus communis Linn. Gemeiner Wachholder.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 12. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Coniferae.

Der gemeine Wachholder, ein mittelmäßiger ausgebreiteter Strauch von 3—6 Fuß Höhe, welcher aber durch Cultur in unsern Gärten und in wärmeren Ländern zu einem Baume von 15—20 Fuß Höhe wird, und eine Dicke von ½—1 Fuß erreicht, wächst fast durch ganz Deutschland, im nördlichen Europa, allenthalben an sandigen Stellen, in bergigen Wäldern, auf Bergen, Hügeln und Triften.

Der Stamm ist meist unförmlich und gekrümmt. Die Aeste sind zahlreich und unregelmäßig. Die Rinde ist uneben und von braunröthlicher Farbe; das Holz hart, von angenehmen Geruche. Die jungen Zweige sind dünn, hängend, fast dreieckig und mit erhabenen Streifen versehen, welche sich von einem Blatte zum andern erstrecken. Die Blätter sind aufsitzend, gewöhnlich zu drei beisammenstehend, ausgebreitet, gleich breit-lancettförmig, hart, sehr scharf zugespitzt, stechend, etwas dreieckig, auf der obern Fläche vertieft, glatt, am Grunde ein wenig weißlich oder blaugrün und mit dunkelgrünen Seiten eingefaßt. Die Rückseite derselben ist erhaben und dunkelgrün; sie dauern das ganze Jahr hindurch. Die männlichen Blüthen sind in kurzen, sehr kleinen, gelblichen, ungestielten, einzeln in den Blattwinkeln stehenden, kegelförmigen Kätzchen vereinigt; der Kelch bildet eine schildförmige gestielte Schuppe; die Blumenkrone fehlt. Die weiblichen Blüthen bestehen aus drei am Grunde verwachsenen Kelchschuppen, deren jede eine Blume einschließt. Die Frucht ist eine stiellose genabelte, im ersten Sommer grüne, im zweiten zur Zeit der Reife bläulichschwarze Beere.

Die Blüthezeit ist April und Mai; die Früchte reifen im Herbste des folgenden Jahres. Die glänzenden Beeren, Kaddigbeeren, enthalten im frischen Zustande inwendig ein gelblichröthliches Fleisch, das in den getrockneten Beeren eine leichte schwammige Masse von gelblicher Farbe bildet, und drei steinharte Saamenkörner enthält. Sie haben einen harzigen, süßlichbittern Geschmack und starken balsamischen Geruch, der sich auch beim Verbrennen derselben auf Kohlen verbreitet, daher sie nicht nur als Räucherungsmittel gegen Krankheiten der Haut, sondern auch zum Wohlgeruche benutzt werden.

Verwerflich sind die blassen, beim Trocknen stark zusammengeschrumpften Beeren, die nicht ihre gehörige Reife erlangt haben. Auch sind die Beeren leicht dem Schimmeln unterworfen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0551-7

Das vorzüglich Wirksame der Beeren liegt in ihrem ätherischen Oele, welches durch Destillation mit Wasser aus ihnen gewonnen werden kann. Die Ausbeute wird verschieden angegeben; nach Einigen sollen 10 Pfund 1—2 Loth geben; Hagen erhielt nur aus 40 Pfunden 2½ Loth Oel. Tremlich erhielt aus 100 Pfund Beeren 100 Quentchen Oel. Dieses Oel ist in eigenen Bläschen, zehn an der Zahl, die unmittelbar auf dem Kerne liegen, enthalten; bei älteren Beeren, wo das Oel verharzt ist, sind diese Bläschen leicht zu erkennen.

Werden die ganzen Beeren mit heißem Wasser übergossen, so ist der Aufguß durchsichtig, blaßroth, von süßlichem, balsamischem, etwas bitterlichem Geschmacke. Der Aufguß der gequetschten Beeren ist trübe, schmutziggelb, und schmeckt noch süßer und aromatischer als der erste. An wäßrigem Extracte erhält man aus einer Unze drei Quentchen. Die geistige Tinctur hat eine Goldfarbe, den eigenthümlichen Wachholdergeruch, und einen scharf bitterlichen, aromatischen Geschmack. Nach dem Abrauchen hinterläßt sie eine zweifache Substanz, nämlich eine gelbe, halbflüssige, süße, ölige, und eine zähe, braungrünliche, harzige, an den Zähnen und dem Gaumen stark anhängende, von einem harzigen, nur wenig aromatischen Geschmacke.

Nach einer sehr genauen Untersuchung von Trommsdorff (Taschenb. 1822. S. 43.) enthalten 1000 Th. Wachholderbeeren: Wasser 129; ätherisches Oel 10; Wachs 40; Harz 100; Zucker, verbunden mit essigsaurem und äpfels. Kalke, 338; Schleim oder Gummi mit Pflanzensalzen verbunden 70; Holzfaser 350. S. = 1037. Der Ueberschuß 0,037 rührte von zurückgehaltener Feuchtigkeit bei den einzelnen Substanzen her.

Das Wachholderöl war völlig wasserhell, von dem durchdringenden Geruche der Beeren, von scharfem, gewürzhaftem etwas harzigem Geschmacke und von 0,853 spec. Schwere. Das Wachholderwachs wurde erhalten durch Auskochen der Beeren mit Weingeist. Aus der heiß filtrirten Tinctur schied sich beim Erkalten das Wachs als eine graue, spröde, pulverisirbare Substanz aus, die in siedendem Wasser zu einem Oele mit Wachsgeruch schmolz. In erhitztem Weingeiste löst es sich reichlich auf, scheidet aber beim Erkalten vollständig wieder aus; es löst sich nicht in kaltem, aber in heißem Aether auf, die Auflösung trübt sich beim Erkalten. In erwärmten flüchtigen und fetten Oelen löst es sich leicht auf, ohne daß diese Lösung beim Erkalten sich trübt. Von ätzender Kalilauge wird es selbst bei längerem Kochen nicht aufgelöst. Durch längeres Kochen mit Salpetersäure wird es in eine harzähnliche Substanz verwandelt. Bei der trocknen Destillation und beim Verbrennen verhält sich dieses Wachs wie anderes.

Das Wachholderharz ist schmutziggrün, an den Kanten durchscheinend, spröde, läßt sich leicht in ein graugrünes Pulver verwandeln. Es riecht schwach nach Wachholderbeeren, ist geschmacklos. In der Wärme erweicht es sich und schmilzt dann. In Weingeist, Aether, Terpenthin-, Citronen- und Rosmarinöle ist es mit grünlicher Färbung leicht löslich, wenig in kaltem, besser in erhitztem Mandel- und Mohnöle. Diese Lösungen besitzen einen

eigenthümlichen kratzenden Geschmack. In kochender Kalilauge wird es härter und fester, ohne sich zu lösen oder eine Seife zu bilden. In wäßrigem Ammoniak löst es sich schon in der Kälte, die hellgrüne Auflösung giebt mit Säuren einen weißlichen Niederschlag. Durch erhitzte Salpetersäure wird es sehr langsam zersetzt, und in künstliches Bitter verwandelt. In Vitriolöle löst es sich schnell auf; die dunkelrothe Auflösung wird durch Wasser getrübt und fällt Thierleim. Bei der trocknen Destillation liefert es brennbares Gas, säuerliches Wasser, brenzliges Oel und aufgeblähte Kohle, deren Asche phosphorsaurer Kalk ist.

Ein Hauptbestandtheil der Beeren ist ein eigenthümlicher Zuckerstoff, der Wachholderzucker, wodurch sie der geistigen Gährung fähig werden. Er ist dem krümligen Zucker ähnlich, krystallisirt sehr schwer, oder giebt vielmehr nur eine undeutliche Gerinnung, ist sehr zerfließlich, besitzt noch weniger Süßigkeit als der Stärkezucker, ist unlöslich in Aether, löslich in starkem siedendem Weingeiste, fällt aber beim Erkalten wieder daraus nieder. Er hat die Farbe des Honigs, ist nie trocken und weiß darzustellen, und geht, mit Hefen versetzt, in die geistige Gährung. Außer der Süßigkeit besitzt er noch einen eigenthümlichen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

Die Kaddigbeeren werden im wäßrigen Aufgusse oder als Thee verordnet, sonst auch zur Bereitung des ätherischen Oeles und des eingedickten Saftes gebraucht.

Das Holz wird im Frühjahre eingesammelt. Das Holz mit einer schwarzgrauen oder röthlichbraunen Rinde umgeben, ist unter derselben weiß, gegen den Kern zu aber gelblichroth. Es ist sehr harzig, fest, zähe und schwer. Der Geruch desselben ist stark und angenehm balsamisch, besonders wenn es zerschnitten oder angezündet wird. Der Geschmack ist etwas scharf, harzig und gewürzhaft.

Man nimmt es von dem Stamme, den größern Zweigen und der Wurzel, welches letztere am wirksamsten ist. Zwischen dem Holze und der Rinde setzt sich bisweilen eine harzige Substanz an, die man sonst unter dem Namen deutscher Sandarak oder Wachholderharz (Resina Juniperi, Sandaraca germanica) einsammelte, die aber von dem wahren Sandarak durchaus verschieden ist.

Das Holz enthält nur wenig ätherisches Oel; Hagen erhielt aus 15 Pfunden Holz 4 Loth Oel, welches dicklich, wie warm gemachter Terpenthin war. Der wäßrige Aufguß ist röthlich, unangenehm, balsamischharzig von Geruche und Geschmacke. Die geistige Tinctur ist dunkel orangegelb, Geruch und Geschmack etwas wie Sandarak und Mastix.

Das Holz wird vorzüglich zum Räuchern, zu Holztränken wenig benutzt.

Kali carbonicum crudum seu Cineres clavellati. Carbonas kalicus crudus. Rohe Potasche.

Wird aus Holzasche durch Auslaugen, Eindicken der salzigen Flüssigkeit und Brennen des Rückstandes bereitet.

Ein festes Salz, an der Luft zerfließend, weißlich, von laugenhaftem Geschmacke, mit Säuren aufbrausend. Besteht aus Kali und Kohlensäure mit schwefelsaurem Kali, wie auch aus salzsaurem Kali und beigemischten metallischen Oxyden.

Die rohe Potasche wird durch Einäscherung solcher Vegetabilien erhalten, die entfernt von den Gestaden des Meeres oder anderer gesalzener Wasser wachsen, daher wurde sie auch und das daraus bereitete reine Kali sonst vegetabilisches Laugensalz genannt. Zum Einäschern wählt man besonders harte Holzarten, als Buchen, Eichen, Rüstern, Eschen. Gräser geben im Allgemeinen nach Kirwan mehr Asche und ihre Asche weit mehr Salz, als Hölzer. Erdrauch und Wermuth geben das meiste Salz; Trifolium fibrinum giebt mehr Asche und Salz als Farrnkraut. Nach Hersant hat die Pteris aquilina, die in sumpfigen Thälern häufig und sehr üppig wächst, einen bedeutenden Kaligehalt. 100 Pfund von diesem halbgetrockneten Farrnkraute geben 3¼ Pfund graulichweiße Asche, woraus ein Pfund und eine Unze Salzmasse ausgelaugt werden. Diese Potasche enthielt nach Vauquelin's Analyse 40 Procent reines wasserfreies kohlensäuerliches Kali. In der Asche aller dergleichen Vegetabilien ist das Kali an Pflanzensäuren, bisweilen auch an Salpetersäure gebunden, welche durch die Calcination zerstört werden.

Das Kali ist aber nicht ausschließlich in den Vegetabilien vorhanden, sondern es kommt auch häufig im Mineralreiche vor, z. B. im Feldspath und im Glimmer; auch in animalischen Flüssigkeiten findet es sich, jedoch in geringer Menge.

Die Pflanzenasche enthält nebst dem kohlensauren Kali auch schwefels. und salzs. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk, Kieselerde, Alaunerde, bisweilen etwas Bittererde, ferner Mangan- und Eisenoxyd. Durch Auslaugen mit Wasser trennt man die auflöslichen Theile größtentheils von den übrigen unauflöslichen Bestandtheilen der Asche. Dieses Auslaugen geschieht in hölzernen, nahe am Boden mit einem Ablaßhahne versehenen Bottichen, in denen entweder ein zweiter etwas höher liegender, durchlöcherter, mit Stroh bedeckter Boden, oder bloß eine Lage von Stroh die Stelle des Filtrums vertritt. Die gesammelte Asche läßt man mit Wasser angefeuchtet längere Zeit in Haufen liegen, stampft sie dann in die Bottiche und übergießt sie mit heißem oder kaltem Wasser. Das Wasser saugt sich durch die festgestampfte Asche langsam durch, hat also Zeit, das Auflösliche der Asche aufzunehmen, wird mit diesem beladen durch den untern Hahn abgelassen und in gußeisernen Kesseln bis zur Trockne abgedampft. Die salzartige trockne Masse wird zur vollständigen Verflüchtigung des Wassers, zur Zerstörung des anhängenden brenzligen Oeles, von dem sie braun gefärbt ist, in dem Calcinirofen, unter öfterem Umrühren, bei gelinder Rothglühhitze calcinirt, wodurch die Potasche, mit einem Gewichtsverluste von 0,10 bis 0,20, mehr oder weniger weiß wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0554-5

Diese calcinirte Potasche kommt in größeren und kleineren, leichten, löchrigen, eckigen, zerbrechlichen und zerreiblichen Stücken von grauer, graubläulicher, schmutzigweißer, blaugrünlich gefleckter Farbe vor, die an der Luft leicht zerfließen, von eigenthümlichem brennendem alkalischem Geschmacke. Sie ist mehr oder weniger durch die in der Asche vorhandenen fremdartigen Stoffe verunreinigt, und enthält demnach nicht bloß mehrere auflösliche Salze, als schwefels. und salzs. Kali, sondern auch Thonerde, Kieselerde, Eisen- und Manganoxyd. Von diesen Metalloxyden rührt die bläuliche Farbe der Potasche her, und besonders ertheilt das Manganoxyd der Auflösung eine grüne, bisweilen eine rothe Farbe (mineralisches Chamäleon). Bei dem Ausstellen an der Luft und Einsieden der Auflösung werden, so wie das ätzende Kali, welches die Metalloxyde aufgelöst hielt, Kohlensäure anzieht, diese nach und nach ausgeschieden und ein weißes Kali erhalten.

Außer diesen zufälligen Unreinigkeiten werden aber auch der Potasche nicht selten absichtlich andere Dinge beigemischt, als Kochsalz, schwefelsaures Kali, als Rückstand bei der Destillation des Scheidewassers gewonnen, Sand, Mehl u. s. w. Das Kochsalz verknistert auf Kohlen, das schwefelsaure Kali krystallisirt aus der wäßrigen Auflösung, Sand, Mehl ꝛc. bleiben beim Uebergießen der Potasche mit Wasser unaufgelöst zurück. Häufig ist aber der Sand bei der Calcination der Potasche zugesetzt, und so mit dieser zusammengeschmolzen. Diese Verbindung des Kali mit der Kieselerde (Kieselsäure) ist aber in Wasser auflöslich, es läßt sich daher diese Verfälschung erst beim Sättigen der Potasche mit Säuren entdecken, wo dann durch die stärkere (Schwefel-, Salpeter-, Essig-) Säure die Kieselsäure in Wolken abgeschieden wird. Es ist daher von Wichtigkeit, die käufliche Potasche auf ihren wirklichen Gehalt an Kali zu prüfen, welches man den äußern Kennzeichen nach nicht beurtheilen kann; es muß dieses daher, wenn ein zuverlässiges Resultat erhalten werden soll, durch eine chemische Prüfung ausgemittelt werden, und hierbei kann man auf folgende Weise verfahren. Man wiegt 100 Th. Potasche ab, und löst sie in hinreichendem kochenden Wasser auf, der unaufgelöste Rückstand wird mit warmen Wasser ganz ausgewaschen. Das Durchgeseihte wird bis zur Hälfte abgedunstet und mit Schwefelsäure gemengt. Zu diesem Behufe nimmt man eine Säure von 1,85 spec. Gew. und verdünnt sie genau mit 19 gleichen Gewichtstheilen Wasser. Ein Theil dieser Säure wird abgewogen, und in kleinen Portionen nach und nach der Auflösung zugesetzt, und dabei genau der Sättigungspunkt in Acht genommen. Um dabei recht sicher zu gehen, kann man die alkalische Flüssigkeit mit Lackmustinctur mengen, das Gemenge bis zum Kochen erhitzen, und dann den Versuch bei der Siedehitze vornehmen. Beim Zusetzen der ersten Portionen Säure entsteht kein Aufbrausen, weil sich die frei werdende Kohlensäure mit dem noch nicht damit gesättigten Antheile Kali verbindet, welches dadurch zu neutralem kohlensauren Kali wird. Ist die Hälfte des Kalis mit der zugesetzten Säure gesättigt, so fängt nun die Zerlegung des neutralen kohlensauren Kalis, mit diesem ein starkes Aufbrausen, und das Röthen des Lackmus-

pigments durch die Kohlensäure an. Man läßt nun nach jedesmaligem Zusetzen von Säure das Gemenge einige Minuten kochen, um die Kohlensäure auszutreiben, und so lange die Flüssigkeit im Kochen ihre blaue Farbe wieder annimmt, so lange ist sie noch nicht gesättigt. Ist so viel Säure zugesetzt, daß sie zu reagiren anfängt, so wiegt man den Rückstand derselben, um zu wissen, wieviel davon aufgegangen ist. 100 Th. Schwefelsäure von 1,85 spec. Gewicht, d. h. also 2000 Th. der verdünnten Säure, entsprechen 95 Th. des reinen ätzenden Kalis. Wären also z. B. 950 Th. der verdünnten Säure verbraucht worden, so wären in den dem Versuche unterworfenen 100 Th. Potasche enthalten $45\frac{1}{3}$ Th. reines ätzendes Kali, denn

2000 : 95 = 950 : x

$x = 45\frac{1}{3}$.

Wenn eine käufliche Potasche Feuchtigkeit enthält, so bestimmt man deren Menge dadurch, daß man die Potasche glüht, und vor und nach dem Glühen wiegt.

Oft kommt es aber nicht darauf an, den wirklichen Gehalt an Kali bei den im Handel vorkommenden Sorten Potasche zu wissen, sondern mehr, um den Werth zu bestimmen; und einen hierzu tauglichen Akalimeter erhalten wir, wenn wir, unter der Voraussetzung, daß 100 Th. basisch kohlensaures Kali gleich sind 70 Th. reiner concentrirter Schwefelsäure, in einer hundertheiligen Maßröhre 70 Gran Säure bringen, und den übrigen Raum mit Wasser füllen. Ist die Potasche rein, so werden 100 Gran derselben die sämmtlichen 100 Abtheilungen der Säure zu ihrer Neutralisation verlangen. Verlangen 100 Gran Potasche etwa nur 60 Abtheilungen der Säure, so wird die Potasche auch nur 60 Procent wirklich basisch-kohlensaures Kali enthalten u. s. w. Wenn man den Alkalimeter für reines ätzendes Kali verlangt, so muß man 105 Gran concentrirter Säure anwenden, und den übrigen Raum der graduirten Röhre mit Wasser ausfüllen.

Man kann auch zweckmäßig den Versuch in folgender Art anstellen, besonders wenn mehrere Sorten Potasche zu untersuchen sind. Schwefelsäure verdünne man so weit mit destillirtem Wasser, daß gerade 1000 Gran erfodert werden, um 100 Gran reines trocknes kohlensaures Kali (Weinsteinsalz) zu neutralisiren. Bei der Prüfung einer Potasche wiegt man von einer größern gepulverten Menge derselben 100 Gran ab, löst sie in Wasser auf, filtrirt und setzt der Lauge von den in einem tarirten Gläschen genau abgewogenen 1000 Granen der Probeschwefelsäure so lange zu, bis die Flüssigkeit auch nach dem gänzlichen Entweichen der Kohlensäure durch Erwärmen das Lackmuspapier deutlich roth zu färben anfängt. Durch Wiegen des Gläschens mit der übriggebliebenen Säure findet man die Menge der zum Neutralisiren verbrauchten Säure. Beträge diese z. B. 730, so findet man durch leichte Rechnung die derselben entsprechende Menge kohlensäuerliches Kali, denn wenn 1000 Gran der angewandten Schwefelsäure 100 Gran reines kohlens. Kali neutralisiren, so sättigen 730 Gran Säure nun 73 Gran Kali, nämlich: 1000 : 100 = 730 : 73.

In den 100 Granen der untersuchten Potasche waren also 73 Gran kohlens. Kali und 27 Gran fremdartige Theile enthalten.

Bei allen diesen Prüfungen muß man aber immer darauf achten, ob aus der klar filtrirten Lauge durch die Säure ein wolkenartiger Niederschlag ausgeschieden wird. Dieses ist nämlich die mit dem Kali durch Zusammenschmelzen verbunden gewesene Kieselsäure, und da das mit dieser Substanz verbundene Kali für technische Zwecke, z. B. für die Seifensiederei, verloren ist, so ist je größer der Niederschlag, desto verwerflicher die Potasche. Um die Kieselerde abzusondern, und dem Gewichte nach zu bestimmen, wird die am besten mit Salzsäure etwas im Ueberschusse versetzte klare Lauge zur staubigen Trockne abgedunstet und in Wasser wieder aufgelöst, wo dann die Kieselerde als ein rauh anzufühlendes Pulver zurückbleibt.

Die meiste Potasche wird in Rußland, Polen, Amerika, in den holzreichen, noch wenig bebauten Gegenden bereitet, es kommen daher auch die verschiedenen Sorten Potasche unter verschiedenen Namen im Handel vor. Die amerikanische Potasche, die ganz im Feuer geschmolzen und hart wie Stein ist, ist nach Vauquelin die reichste an Kali. Bei uns ist vorzüglich die russische Potasche gebräuchlich. Die Perlasche ist eine durch mehrmaliges Auflösen, Durchseihen und Calciniren gereinigte Potasche; doch nennt man auch die aus der Asche der Weinreben und Weinhefen bereitete Asche (Cineres clavellati, Cendres gravelées) Perlasche. Diese Asche besteht aus einer grauen klümprigen Masse, welche, wenn sie etwas Feuchtigkeit eingeschluckt hat, eine weißere Farbe hat, ein größeres Volumen einnimmt, und aus ziemlich reinem basischem kohlens. Kali besteht. Waidasche nennt man die rohe unausgelaugte, mit einer Aschlauge übergossene, getrocknete, und bis zur Verglasung calcinirte Potasche, aus welcher sich deshalb die salzigen Theile ungleich schwerer auslaugen lassen.

Die rohe Potasche wird zur Bereitung der gereinigten Potasche gebraucht.

Kali ferruginoso-hydrocyanicum seu Kali zooticum aut borussicum venale. Cyanetum Kalii et Ferri venale. Käufliches blausaures Eisenkali.

Wird in chemischen Fabriken durchs Brennen thierischer Körper mit kohlensaurem Kali und Eisen bereitet.

Zusammenhängende, gelbe Krystalle, von süßlichem Geschmacke, in vier Theilen Wasser auflöslich, in Alkohol völlig unauflöslich, aus Kali, Eisen und Cyan bestehend. Man wähle die größeren, von schwefelsaurem Kali und andern fremdartigen Theilen völlig freien aus.

Dieses Präparat chemischer Fabriken wird zur technischen Verwendung im Großen durch Calcination thierischer (stickstoffhaltiger) Substanzen mit Alkalien in eisernen Gefäßen, Auslaugen der geschmolzenen Masse, Abdam-

pfen und Reinigen durch Krystallisation dargestellt. Man erhält dasselbe auch nach Berzelius, wenn feingeriebenes und reines Berlinerblau mit einer Auflösung sowohl von kaustischem, als einfach oder zweifach kohlensaurem Kali gekocht wird. Das Berlinerblau, welches eine Verbindung von Eisencyanür (blausaurem Eisenoxydul) mit Eisencyanid (blausaurem Eisenoxyd) ist, wird dann auf solche Art zersetzt, daß das Cyanid von dem Alkali zerlegt wird, indem dieses selbst in Kalium und Sauerstoff zerfällt, welcher letztere sich mit dem Eisen zu Eisenoxyd verbindet, wogegen das dadurch frei gewordene Cyan sich mit dem Kalium zu Cyankalium verbindet, welches nun mit dem Eisencyanür eine Verbindung eingeht. Zu der kochenden Kalilauge setzt man feingeriebenes Berlinerblau in kleinen Portionen so lange zu, bis das zuletzt zugeschüttete nach einigem Kochen nicht mehr verändert wird. Das Alkali ist dann gesättigt. Man filtrirt nun, wäscht das ausgeschiedene Eisenoxyd aus, und dampft bei gelinder Wärme ab, wo dann das Cyaneisenkalium in großen, rechtwinkligen Tafeln von reiner citrongelber Farbe anschießt. Hat das Salz eine unreine Farbe, so kann man es, nach dem Zerfallen in der Wärme, in einer Retorte bis zum Schmelzen erhitzen, wobei die fremden Farbestoffe zerstört werden. Enthält das Salz einen Ueberschuß von Alkali, so kann dieses mit destillirtem Essig gesättigt und das Cyanür dann entweder sogleich, oder nach vorhergegangenem Abdampfen, mit Alkohol ausgefällt werden, der Niederschlag bildet hellgelbe glänzende Schuppen.

Dieses Salz ist gewöhnlich mit schwefelsaurem Kali verunreinigt, welches durch essigsauren Baryt zersetzt werden muß, wodurch nämlich als unauflöslich niederfallender schwefelsaurer Baryt und essigsaures Kali gebildet werden, welches letztere durch Alkohol ausgezogen wird. Auch schon durch Aussuchen der größeren, rein ausgebildeten Krystalle wird dieses Salz rein erhalten. An einem lauwarmen Orte aufbewahrt, oder bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft, im luftleeren Raume neben Schwefelsäure, verliert dieses Salz sein Krystallwasser, aber es behält seine Form und seinen Zusammenhang. Das Wasser macht 12,82 Procent seines Gewichts aus, und ist gerade hinreichend, um durch seinen Sauerstoff das Eisen aus dem Eisencyanür in Eisenoxydul und das Kalium aus dem Cyankalium in Kali, das Cyan aus beiden Verbindungen aber durch seinen Wasserstoff in Cyanwasserstoffsäure zu verwandeln. Das Salz krystallisirt in gelben durchscheinenden, vierseitigen Säulen mit abgestumpften Endkanten und Ecken, von 1,832 spec. Gew.; es hat einen bitterlich süßlichen, etwas herben, schwach salzigen Geschmack. Es enthält nach Berzelius: 12,85 Procent Eisen = 16,58 Eisenoxydul; 37,11 Procent Kalium = 44,66 Kali und 37,22 Procent Cyan = 38,64 Cyanwasserstoffsäure. Es wird hiernach also dieses Salz aus den elementaren Stoffen 12,85 Eisen + 37,11 Kalium + 37,22 Cyan (Blaustoff) + 12,82 Krystallwasser gebildet angenommen (Kaliumeisencyanür), wogegen es bisher als eine Verbindung von Eisenoxydul, Kali und Cyanwasserstoffsäure (Blausäure) angesehen wurde, welches erst durch gelindes Erhitzen in die erstere Verbindung übergeführt werde, indem der Sauerstoff aus dem Eisenoxydul

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0558-8

und Kali mit dem Wasserstoffe aus der Cyanwasserstoffsäure zu Wasser zusammentrete, wodurch gleichzeitig die Verbindung der elementaren Stoffe Eisen, Kalium und Blaustoff bewirkt werde, welche, wenn sie wieder mit Wasser in Berührung kommen, durch Zerlegung eines Antheils desselben sich wieder in blausaures Eisenoxydulkali verwandeln.

Wird das Salz einer Hitze, die das Glas schmelzt, ausgesetzt, so fängt es an mit Entwickelung von Stickstoffgas zersetzt zu werden, aber die Zersetzung geht schwer und langsam. Bei einer weit höheren Temperatur geht sie leichter vor sich, aber auch wenn man es in offnem Feuer im Tiegel zu verbrennen sucht, ist es schwer, es in Kali und Eisenoxyd zu verwandeln, weil, sobald das Cyaneisen zerstört ist, das Cyankalium der Zerstörung lange widersteht.

Wenn man eine Auflösung dieses Doppelcyanürs in eine Auflösung eines Eisenoxydulsalzes gießt, so bekommt man einen weißen Niederschlag, der im Allgemeinen als Eisencyanür angesehen worden ist, von dem aber Proust gezeigt hat, daß er gleichfalls ein Doppelcyanür ist, indem er Kali enthält, welches ihm durch einen Ueberschuß von Säure nicht entzogen werden kann, nur ist die Menge Kalium in diesem Niederschlage gegen das Eisen weit geringer, doch ist das quantitative Verhältniß noch nicht untersucht worden. Läßt man diesen Niederschlag in Berührung mit der Luft stehen, so nimmt er Sauerstoff auf und wird, wenn das Doppelcyanür im Ueberschusse vorhanden ist, blau, blaugrün aber, wenn das Eisensalz im Ueberschusse zugegen ist, indem sich aus diesem gelbes Eisenoxyd ausscheidet, welches aber dem Niederschlage durch Salzsäure entzogen, und dieser von blauer Farbe erhalten werden kann. Dieser Niederschlag ist Berlinerblau, das Kalium bleibt in Verbindung mit einem geringeren Theile des Eisens, in Form des gewöhnlichen Doppelcyanürs, in der Flüssigkeit aufgelöst.

Wenn dieses Salz von gehöriger Reinheit ist, so darf es mit verdünnter Schwefelsäure in der Kälte kein Berlinerblau bilden; ist dieses der Fall, so enthält es noch unzersetztes Eisencyanid (blausaures Eisenoxyd); bildet salzsaurer Baryt einen Niederschlag (Schwerspath), so enthielt es Schwefelsäure.

Für sich wird dieses Salz in der Medicin nicht gebraucht; dient aber zur Bereitung der Blausäure ꝛc., auch ist es ein vorzügliches Reagens.

Kali muriaticum oxygenatum seu Kali oxymuriaticum aut Kali chloricum venale. Chloras kalicus venalis. Käufliches oxydirtes salzsaures Kali.

Wird in chemischen Fabriken bereitet, aus dem in einer Auflösung des kohlensauren Kalis aufgefangenen Gase.

Ein Salz in schuppigen, weißen, glänzenden, in sechszehn Theilen Wasser auflöslichen Krystallen, mit verbrennlichen Stoffen erwärmt oder gerieben verpuffend. Es besteht aus Kali und Chlorsäure, mit salzsaurem Kali mehr oder weniger gemischt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0559-6

Das von diesem Präparate Anzuführende wird im zweiten Theile bei Kali muriaticum oxygenatum depuratum eine Stelle finden.

Kali nitricum crudum seu Nitrum crudum. Nitras kalicus crudus. Roher Salpeter.

Natürlicher wird in Ostindien gefunden, auch wird er in unsern Salpetersiedereien bereitet, durch Auslaugen der in Viehställen ausgegrabenen und anderer damit angeschwängerter Erden.

Ein Salz in kleinen prismatischen, weißlichen, feuchtwerdenden Krystallen, in vier Theilen Wasser auflöslich, durch hineingeworfene Kohlen verpuffend. Es besteht aus Kali und Salpetersäure, mit verschiedenen fremdartigen Dingen, vorzüglich mit salzsaurem Natron gemischt.

Der Salpeter war schon den Völkern des Alterthums bekannt, da er in vielen Theilen der Erdoberfläche vorkommt. Doch sie verwechselten ihn mit dem kohlensauren Natron, welches auf ähnliche Weise vorkommt; das *Νίτρον* der Griechen und Römer ist Natrum carbonicum. Geber führt den Salpeter als Arzneimittel an, Roger Baco gab im 13. Jahrhundert die erste Nachricht von der Natur des Salpeters; Lemery zeigte 1717 seine näheren Bestandtheile.

Natürlicher Salpeter wittert in vielen Ländern auf der Oberfläche der Erde aus, häufig auch an Wänden und Felsen, daher der Name Sal petrae, wie in Aegypten, Tibet, Ostindien, Italien, Ungarn, Spanien, Amerika (noch mehr aber der salpetersaure Kalk). Der als weißer Beschlag ausgewitterte Salpeter wird, wenn er eine gewisse Dicke erlangt hat, weggenommen, woher er auch den Namen Kehrsalpeter führte. Die merkwürdigste Salpetergrube ist aber die im Pulo di Molfetta, welche 1783 im Königreiche Neapel von Fortis entdeckt worden ist. Dieser Pulo ist eine kreisrunde Vertiefung, die ungefähr 400 Meter im Umfang und 33 Meter in der Tiefe hat; sie scheint durch Einsturz in ein Muschelkalkgestein entstanden zu seyn und an den Seiten befinden sich Löcher, welche Oeffnungen von tief in die Erde gehenden Grotten sind. Auf der ganzen Wand dieser Grotten findet man eine große Menge fast reinen Salpeters, der sich daselbst in Zeit von einem Monate oder sechs Wochen wieder erzeugt, ohne daß seine Wiedererzeugung dem Aufenthalte von Thieren zugeschrieben werden könnte; denn man hat die Beobachtung gemacht, daß die reichsten Grotten jene sind, zu welchen man, ihrer kleinen Oeffnungen wegen, gar nicht kommen kann. Auf der Insel Ceylon befinden sich nach John Davy 22 Höhlen, aus denen man Salpeter gewinnt. In einer derselben, der Höhle zu Memoora, sind die Wände mit Salpeter imprägnirt; die Arbeiter behauen dieselben mit Handbeilen, und verwandeln hierauf die losgebrochenen Bruchstücke in Pulver. Dieses wird mit einer gleichen Menge Holzasche gemischt, und mehrmals mit

kaltem Wasser ausgelaugt, welches man in irdenen Gefäßen auffängt, in denen man die Lauge auch bis zu einer gewissen Stärke abraucht. Das Salz wird dann dnrch Krystallisiren gewonnen. Alle von Davy besuchten Höhlen schienen einander ähnlich zu seyn, und die Felsen, in welchen sie sich befinden, enthielten wenigstens immer Feldspath und kohlensauren Kalk. Die Zersetzung des erstern liefert die Salzbase, das Kali; diese und der kohlensaure Kalk üben auf den Sauerstoff und Stickstoff der atmosphärischen Luft eine besondere Wirkung aus, die wir bis jetzt noch nicht kennen, so daß diese beiden Bestandtheile zusammentreten, um Salpetersäure zu bilden. Fertig gebildeter Salpeter konnte nie anders als nur auf der Oberfläche der Körper, zu denen die Luft Zutritt hatte, entdeckt werden, und dieser war immer von salpetersaurer Kalk- oder Bittererde begleitet.

Der natürliche Salpeter reicht aber bei weitem nicht zu dem großen Verbrauche hin; man hat daher, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in beinahe allen andern Ländern, künstliche Salpeteranlagen gemacht, welche auf den Umstand gegründet sind, daß die Salpetersäure an allen Orten gebildet zu werden scheint, wo animalische Stoffe unter dem Zutritte der Luft völlig zersetzt werden und geeignete Substanzen vorhanden sind, mit welchen die neu zu bildende Säure leicht Verbindungen eingehen kann. Zu diesem Zwecke werden Wände oder Haufen aus Lehm, Kalk, Maurerschutt, Asche ꝛc. mit thierischen stickstoffhaltigen Stoffen vermengt, dem Luftzuge ausgesetzt, zuweilen mit Urin, Mistjauche, Wasser ꝛc. begossen und mit einem Dache bedeckt, damit der Regen das Salz nicht auswasche. Nach einigen Jahren, binnen welcher Zeit die Haufen öfter umgearbeitet werden müssen, oder in kürzerer Zeit, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, nur den obern der Luft ausgesetzt gewesenen Theil der Haufen absondert, hat sich der Stickstoff, welcher ein vorzüglicher Bestandtheil thierischer Stoffe ist, mit dem Sauerstoffe der Luft zu Salpetersäure verbunden, welche von den Basen, Kalk- und Talkerde ꝛc., aufgenommen wird. Um diese Erden wieder abzuscheiden und salpetersaures Kali zu bilden, wird die Salpetererde mit Asche oder Potasche vermischt, und mit weichem Wasser ausgelaugt. Die Lauge wird eine Weile gesotten; es scheidet sich zuerst Kochsalz und dann aus der abgegossenen und aufs neue verdunsteten Lauge der rohe Salpeter, **Nitrum crudum**, in Krystallen ab. Er besteht aus kleinen, mehr oder weniger gelbgefärbten Krystallen, in welchen schon mit bloßem Auge beigemengte Krystalle von salzsauren Salzen unterschieden werden können.

Die Salpeterbildung wird durch die Anwesenheit thierischer Stoffe überall begünstigt, daher denn die Erde unter Viehställen bis auf 10 Zoll Tiefe mit Salpeter beladen gefunden wird; so findet er sich auch in einigen Wässern gebildet ꝛc. Der fertig gebildete Salpeter findet sich auch in vielen Pflanzen, als im Tabak, Boretsch, Schierling, Bilsenkraut, Wollkraut, Erdrauch, Schöllkraut, Andorn, Nesseln u. s. w., daher man auch wohl solche Pflanzen den Salpeterhaufen zusetzt, um diese zum Theil lockerer zu machen, und der atmosphärischen Luft mehr Zugang zu verschaffen.

Der rohe Salpeter findet in der Medicin keine Anwendung, und dient allein zur Bereitung des gereinigten Salpeters.

Kali sulphuricum crudum. Arcanum duplicatum aut Tartarus vitriolatus crudus. Sulphas kalicus crudus. Rohes schwefelsaures Kali.

Wird in chemischen Fabriken aus den Rückständen von der Destillation der Salpetersäure bereitet.

Ein Salz in zusammenhängenden, weißen, prismatischen, am Ende zugespitzten Krystallen, von bitterlichem Geschmacke, in sechszehn Theilen Wasser auflöslich, in der Luft nicht feucht werdend, auch nicht zerfallend. Es besteht aus Kali und Schwefelsäure, oft mit schwefelsaurem Kalke gemischt. Verwerflich ist das durch Metalle, vorzüglich durch Zink oder Kupfer, verunreinigte. Jenes wird durch Fällung mit kohlensaurer Natronflüssigkeit und Auflösung in Aetzammoniakflüssigkeit, dieses auf dieselbe Weise und durch die dann blaue Farbe erkannt.

Aus diesem Salze wird das gereinigte schwefelsaure Kali gewonnen.

Kino. Kino.

Ein an der Luft erhärteter Saft eines unbekannten Baumes, aus Ostindien zugeführt.

Kleine, eckige, zerreibliche, röthlichschwarze, beim Reiben rothe, glänzende, undurchsichtige Stücke, von zusammenziehendem Geschmacke, den Speichel roth färbend, in Wasser und Weingeist auflöslich.

Von dem Kino kann nur mit Bestimmtheit angegeben werden, daß es, ähnlich dem Catechu, ein eingedickter Saft ist. Das zuerst in den Handel gebrachte kam aus Afrika, und sollte, nach dem Berichte eines englischen Reisenden (Moor), von einem an den Ufern des Flusses Gambia wachsenden Baume, einer Art von **Pterocarpus**, herkommen, daher es auch den Namen **Gummi Gambiae** führte. Bald kam eine andere Substanz als Kino in den Handel, welche aus Jamaika eingeführt und der **Coccoloba uvifera** zugeschrieben wurde. Später wurde ein Kino aus Neuholland gebracht, von **Eucalyptus resinifera** abstammend. Die jetzt im Handel befindliche Sorte Kino wird aus Ostindien nach England gebracht, und zwar in Kisten von 1—2 Centnern; es kommt, wie man annimmt, aus Amboina, doch ist nicht ausgemacht, von welcher Pflanze es gewonnen wird. **Butea frondosa** Roxb., welche als Mutterpflanze angegeben wird, giebt einen rothen Saft,

welcher nach der Untersuchung des Dr. Duncan in seinen Eigenschaften sehr bedeutend von denen des Kino abweicht, obgleich er als Surrogat gebraucht werden könnte. Nach Hunter soll das Kino das trockne Extract der Nauclea Gambir seyn; daß aber von dieser Pflanze wahrscheinlich das jetzt vorkommende Catechu abstamme, ist dort erwähnt worden, und vermuthlich ist die Aehnlichkeit des Wortes Gambir mit Gummi Gambiae, dem früheren Namen des Kino, die Ursache, daß man dieses Gambir mit dem Kino für identisch erklärt.

Es ist hiernach wohl anzunehmen, daß es mehrere Arten von Kino giebt, die aus verschiedenen Weltgegenden herkommen und von verschiedenen Pflanzen abstammen, nämlich aus Afrika, aus Jamaika, aus Botany-Bay in Neuholland und Amboina, und eine Vergleichung dieser vier Sorten findet man in Trommsdorff's N. J. IV. 2. 1820. S. 86.

Das jetzt im Handel befindliche Kino kommt in kleinen, eckigen, glänzenden, undurchsichtigen Stücken vor; es sieht fast schwarz aus, erscheint aber in den kleinsten Stücken roth, giebt auch ein eben solches Pulver; es läßt sich zwischen den Fingern zerreiben, zerfließt auf der Zunge, färbt den Speichel roth, schmeckt wenig bitter, dagegen sehr zusammenziehend, herbe, hintennach dauernd süß. Dieses Kino kommt mit dem aus Afrika beinahe ganz überein, wogegen zwischen den andern Sorten ein bedeutender Unterschied zu seyn scheint. So bildet das Kino von Botany-Bay unförmliche Stücke von der Größe einer Hasel- bis Wallnuß, die von dunkel chocoladenbrauner Farbe, mit einem bräunlichen Staube leicht bedeckt, im Bruche harzartig glänzend sind und sparsame und kleine Höhlungen zeigen. Es giebt ein umbrabraunes Pulver. Zwischen den Zähnen knirscht es erst, dann hängt es sich an sie an, färbt den Speichel wenig, und hat einen stärker bitterlichen, weniger herbe zusammenziehenden Geschmack.

Das Kino giebt schon mit bloßem kaltem Wasser durch mehrstündiges Stehen eine durchsichtige dunkel braunroth aussehende Tinctur, welche die Lackmustinctur röthet, und sich im Wesentlichen wie die Catechutinctur verhält. Mit den oxydirten Eisenauflösungen giebt sie dunkelgrüne Niederschläge, mit Hausenblase einen reichlichen ziegelrothen Niederschlag, durch salpetersaures Silber wird sie röthlichbraun, durch Queckſilbersublimat röthlich, durch Bleizucker braun niedergeschlagen. Die Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure erzeugen reichliche Niederschläge. Kali giebt der Auflösung eine tiefe rothbraune Farbe.

Das heiße Wasser löst das Kino viel reichlicher als das kalte auf, doch trübt sich der Absud beim Erkalten und setzt eine braunrothe Materie ab. ⅓ bleibt unaufgelöst. Dieser Rückstand ist in Alkohol auflöslich, welcher dann eine rothe Farbe annimmt. Alkohol löst in der Wärme den größten Theil auf, die Tinctur hat eine rothbraune Farbe, wird durch das Wasser ein wenig getrübt, ohne jedoch etwas abzusetzen; ist sie sehr gesättigt, so wird sie durch Brechweinsteinlösung getrübt, die Trübung verschwindet aber bei Verdünnung mit Wasser, und wendet man gleich eine nur etwas verdünnte

geistige Auflösung an, so erfolgt keine Trübung; im Uebrigen verhält sich die Tinctur vollkommen wie der wäßrige Auszug. Abgeraucht hinterläßt dieselbe eine beim völligen Austrocknen schwarze spröde Substanz, die nur zu einem kleinen Theile in kaltem, und selbst in kochendem Wasser in viel geringerem Verhältnisse als das Kino auflöslich ist.

In gelinder Wärme erweicht sich das Kino, in größerer Hitze schmilzt es, bläht sich beträchtlich auf, brennt schwer und läßt eine Asche zurück, welche aus Kalkerde, Kieselerde, Thonerde und Eisenoxyd besteht.

Vauquelin hat das afrikanische Kino analysirt und in 100 Th. gefunden: 75 Th. Gerbestoff und eigenthümlichen Extractivstoff, 24 Th. rothen Schleim und 1 Th. Faserstoff.

Das Kino gehört zu den adstringirenden Mitteln, und hat die größte Aehnlichkeit mit dem Catechu; der Gerbestoff ist auf dieselbe Weise modificirt, und selbst jener eigenthümliche Extractivstoff des Catechu scheint hier nicht zu fehlen. Auch mit dem Ratanhiaextract hat es viele Aehnlichkeit.

Lac. Der Zucker. Milchzucker.

Wird aus süßen Milchmolken durch Verdampfung und Krystallisation in der Schweiz bereitet.

Fest, krystallinisch, weiß, hart, süßlich; in acht Theilen Wasser auflöslich, in siedendem Weingeist unauflöslich.

Die Milch der Kühe ist etwas spec. schwerer als Wasser und röthet gleich nach dem Melken das Lackmuspapier. In der Ruhe scheidet sie auf der Oberfläche den Rahm (die Sahne) ab, und heißt dann, wenn jener abgenommen worden, abgerahmte Milch. Diese wird nach einiger Zeit mehr säuerlich und gerinnt. Doch kann die frisch gemolkene Milch, wenn sie mit Hefen oder einem andern Fermente versetzt, an einen warmen Ort gestellt, und durch öfteres Umrühren oder Schütteln die Absonderung der Butter und des Käses von den Molken gehindert wird, auch in die geistige Gährung übergeführt werden, wo sie dann ein säuerlich geistiges Getränk (den Kumiß der Tartaren) darstellt, aus dem durch Destillation wahrer Alkohol (Arki) erhalten werden kann. Ohnedies geht die Milch sehr bald in die saure Gährung, und die erzeugte Essigsäure bewirkt das Gerinnen der Milch. Durch dieses Gerinnen zerfällt die Milch in einen festen käsigen Theil und in eine durchsichtige Flüssigkeit. Die Alkalien verhindern das Gerinnen, theils weil sie die sich bildende Säure sogleich neutralisiren, theils weil sie den käsigen Theil der Milch aufzulösen im Stande sind; andererseits befördern saure Körper das Gerinnen sehr, und bewirken dasselbe schneller und vollständiger, indem sie sich mit dem käsigen Theile chemisch zu verbinden scheinen. Solche das Gerinnen befördernde Körper sind, außer den Säuren, der Alaun und vorzüglich solche Salze, welche ein schweres Metalloxyd zur Basis haben, als Zinnsalz, Bleizucker, Eisen- und Kupfervitriol, Silber und Quecksilbersalpeter u. a. m. Aber auch andere Körper bewirken das Gerinnen der

Milch, als der Magensaft, das Kälberlab (d. h. der vierte, unausgewaschen getrocknete Magen eines jungen Kalbes, vor dem Gebrauche in gesalzene Molken oder in Wasser eingeweicht), die innere Magenhaut junger Hühner, getrockneter Menschenmagen, Eidotter, Gummi, Zucker, Alkohol, Gerbestoff, wie auch einige Pflanzen, z. B. das Labkraut (Galium verum), die Vaillantia (Vaillantia cruciata), die Färberröthe (Rubia tinctorum), die Distelarten u. a. m. Eine höhere bis zur Siedehitze steigende Temperatur beschleunigt das Gerinnen der entweder schon etwas säuerlichen oder mit den oben genannten sauren Substanzen versetzten Milch. Die Pflanzen bewirken nach Jacquin's Erfahrungen das Gerinnen der Milch nur dann, wenn sie in der Milch kalt infundirt werden, oder wenn der wäßrige Aufguß derselben mit der Milch gemischt wird; durch heißes Infundiren oder durch Abkochen dieser Pflanzen in der Milch, wie auch durch Vermischen des Absuds oder des heißen Aufgusses der genannten Pflanzen mit der Milch wird das Gerinnen der letzteren eher aufgehalten als beschleunigt.

Wenn der nach Absonderung des Käses übrig bleibende flüssige Theil der entweder ohne Zusatz oder mittelst Kälberlabs bei der gewöhnlichen Temperatur geronnenen Milch mit Zusatz von etwas Essig zum Sieden erhitzt wird, so scheidet sich eine beinahe mehr dem Eiweiß als dem Käse ähnliche Substanz aus, welche in den Sennhütten der Schweiz unter dem Namen Zieger bekannt ist. Die nach der Abscheidung des Ziegers zurückbleibende klare Flüssigkeit heißt Molken oder Käsewasser (Serum lactis). Die Molken haben einen süßlichen Geschmack, und wenn sie ohne Anwendung von Siedehitze entstanden sind, auch den Geruch der Milch, sind aber von fein vertheilten Käsetheilchen noch immer trübe, und werden nur durch Klären mit Eiweiß hell gemacht. Diese Molken werden in der Medicin verordnet, und zwar als saure Molken (serum lactis acidum) — auf zwei Pfund Milch ein Loth Weinessig —, als Weinsteinmolken (s. l. tartarisatum) — auf ein Pfund Milch ein Quentchen Weinstein —, als Citronenmolken (s. l. citratum) — mit einigen Theelöffeln Citronensaft —, als Weinmolken (s. l. vinosum) — auf ein Pfund Milch zwei Unzen Franz- oder Rheinwein —, als Tamarindenmolken (s. l. tamarindinatum) — auf ein Pfund Milch ein halbes Loth Tamarinden —, als Alaunmolken (s. l. aluminosum) auf ein Pfund Milch 20—30 Gran Alaun —, als süße Molken (s. l. dulce — mit Eiweiß —). Aus den süßen Molken — mittelst Kälberlab bereitet, wenn gleich auch bei Anwendung von Säuren, selbst von Schwefelsäure, wenn diese nicht im Uebermaß zugesetzt worden, die Molken keinen sauren Geschmack annehmen, indem sich die Säure chemisch mit dem ausgeschiedenen käsigen Theile verbindet — wird durch Abdampfen und Krystallisiren der Milchzucker erhalten, unter welchem sich auch einige Krystalle von salzs. und phosphors. Kali befinden.

Die näheren Bestandtheile der Milch sind hiernach: Butter, Käse, Zieger, Milchzucker, Milchsäure, milchs., phosphors., salzs. und schwefels. Kali-, Natron-, Kalk- und Bittererdesalze. Berzelius giebt folgendes Verhältniß der Bestandtheile in 1000 Th. Milch an: Wasser 928,75; Käse mit et-

was Butter 28,00; Milchzucker 35,00; salzs. Kali 1,70; Milchsäure, essigs. Kali mit einer Spur milchsauren Eisens 6,00; phosphors. Erden 0,30.

Von diesen Bestandtheilen ist der Milchzucker, der ein charakteristischer Bestandtheil der Milch und nur in dieser vorhanden ist, officinell. Er wird in der Schweiz im Großen bereitet. Die zur Consistenz des Honigs eingedickten und in besondern Formen an der Sonne getrockneten süßen Molken geben den rohen Milchzucker. Wird dieser in Wasser aufgelöst, mit Eiweiß abgeklärt, und bis zur Syrupsdicke abgeraucht, so erhält man den gereinigten Milchzucker in starken, rindenartigen, milchweißen Stücken, die unten glatt und oben krystallinisch sind, mit rechtwinklig parallelepipedischen Endspitzen. Die Krystalle sind halbdurchsichtig, und wenn sie vollkommen ausgebildet sind, so stellen sie regelmäßige Parallelepipeda dar, die mit vierseitigen Pyramiden zugespitzt sind. Sie sind ziemlich hart, jedoch zerreiblich, von 1,543 spec. Gew.; der Geschmack ist nur schwach süßlich, erdig. Von dem gemeinen Zucker unterscheidet sich der Milchzucker, die härteste Zuckerart, so daß er zwischen den Zähnen kracht, überhaupt durch eine größere Cohäsion; er ist daher auch in Wasser viel weniger auflöslich, als der gemeine Zucker, denn er erfodert bei gewöhnlicher Temperatur 8—9, in der Siedehitze 4 Th. Wasser zu seiner Auflösung, ohne einen Syrup zu bilden. Alkohol äußert auch in der Wärme keine merkliche Auflösungskraft.

Die Auflösung des Milchzuckers zeigt eben so wie die des gemeinen Zuckers auf keines der Metallsalze eine Reaction, sie ist aber nicht wie diese der weinigen Gährung fähig. In der Hitze verhält sich der Milchzucker wie der Zucker, und giebt dieselben Producte, nur in einem etwas verschiedenen Verhältnisse. Das empyreumatische Oel hat einen der Benzoësäure ähnlichen Geruch; die Kohle enthält kohlens., phosphors. und schwefelsauren Kalk. Nach Berzelius enthält der krystallisirte Milchzucker in 100 Th. 12,333 Wasser, und besteht in diesem Zustande aus: 39,474 Kohlenstoff; 7,167 Wasserstoff und 53,359 Sauerstoff. Die Bestandtheile des wasserfreien Milchzuckers sind: 45,267 Kohlenstoff, 6,385 Wasserstoff und 48,348 Sauerstoff.

Der gepulverte Milchzucker mit Salpetersäure destillirt giebt die im Jahre 1780 von Scheele und Hermbstädt entdeckte Milchzuckersäure, welche allgemein den Namen Schleimsäure führt, da dieselbe Säure auch durch Erhitzen von 1 Th. Gummi mit 2 Th. Salpetersäure erhalten wird. Außerdem wird Aepfel- und Kleesäure erhalten. Der Milchzucker scheint hienach gleichsam zwischen Zucker und Gummi zu stehen. In destillirtem Essig löst sich der Milchzucker leicht auf; aus dieser Auflösung schießt er beim Verdunsten in eben so festen Krystallen an, als aus der wäßrigen Mineralsäure; Alkalien, Erden und Metalloxyde scheinen mit dem Milchzucker wirkliche chemische Verbindungen einzugehen.

Bisweilen kommt ein Milchzucker vor von gelblicher Farbe, von einem säuerlichen Geschmacke und einem fetten Geruche; er röthet dann die Lackmustinctur und braust mit Alkalien auf. Ein solcher Milchzucker ist aus sauren Molken bereitet und bildet gewöhnlich kleine kegelförmige Brode; er

ist aber verwerflich, so wie auch derjenige, dem käsige Theile beigemengt sind. Absichtliche Verfälschungen mit Salzen, als Kochsalz, Alaun ꝛc., wenn sie ja vorkommen sollten, lassen sich durch die Form der Krystalle, durch den Geschmack und durch die reichlichen Niederschläge, welche oxydulirtes salpetersaures Queckssilber und Bleizucker erzeugen, sehr leicht erkennen. Eine Vermischung des gepulverten Milchzuckers mit gemeinem Zucker erkennt man leicht, wenn man das Pulver mit gleichen Theilen kalten Wassers anrührt, welches den gemeinen Zucker, an seinem süßen Geschmacke kenntlich, auflöst.

Der Milchzucker wird in Pulverform, auch in Auflösungen verordnet.

* Lacca in baculis seu in ramulis. Stocklack. Stangenlack.

Lacca in granis. Körnerlack.

Lacca in tabulis. Schellack. Tafellack.

Das Lack ist der aus mehreren Bäumen in Ostindien durch den Stich, welchen das Weibchen der Lackschildlaus (Coccus Lacca Linn.) in die Rinde der Zweige macht, ausfließende und erhärtete Saft. Unter diesen Bäumen führt man den indischen und heiligen Feigenbaum (Ficus indica und F. religiosa L.), den Gummilack-Kreuzdorn (Rhamnus Jujuba L.) an, doch scheint der Lackcroton (Croton lacciferum L.) das meiste zu liefern. Das Insect pflanzt sich auf diesen Bäumen fort, und setzt sich an den Spitzen der jungen Zweige in so großer Menge fest, daß die Aeste wie mit einem rothen Staube bedeckt erscheinen, und wegen der Menge Säfte, die sie ernähren, die Blätter fallen lassen und ganz verdorren. Das Insect durchsticht die Rinde und vergräbt sich in dem herausfließenden Safte. Es schwillt allmälig zu einer ganz unförmlichen und fast unbeweglichen kleinen Blase auf, die eine Flüssigkeit enthält, in welcher man 20—30 Würmchen schwimmen sieht. Wenn diese Flüssigkeit aufgezehrt ist, so bohren sich die kleinen Insecten durch den Rücken der Mutter, kriechen aus und lassen ihre abgestreifte Haut in der Zelle, die sie einschloß, zurück. Das vor dem Ausschlüpfen des Insects durch Abbrechen der Aestchen eingesammelte Lack enthält noch die eingetrocknete rothe Flüssigkeit, welche bei den durchbohrten aufgezehrt ist; das erstere färbt daher stärker als das andere. Es wird zweimal im Jahre, im Februar und August, eingesammelt.

Das Stocklack stellt eine gelblichrothe, bisweilen auch rothbraune, etwas glänzende, durchscheinende, harte, zerbrechliche Substanz dar, welche an Aestchen, die 2—3 Zoll lang sind, als eine Rinde von unebener runzliger Oberfläche, von einer Dicke von 1—2 Linien, einigermaßen zellig, und mit feinen Löchern durchbohrt sitzt. Es ist geruchlos und schmeckt schwach bitterlich zusammenziehend. Auf glühenden Kohlen verbreitet es anfänglich einen angenehmen, harzigen, später einen sehr widrigen Geruch, wie verbranntes Horn. Am Lichte entzündet es sich und verbrennt wie ein Harz. Im Munde wird es durch Kauen weich. Im Wasser löst es sich nicht auf, theilt ihm aber durch Kochen eine schön rothe Farbe mit. Oele zeigen darauf keine

auflösenden Kräfte. Schwefeläther löst es größtentheils auf mit Hinterlassung einer nicht harzigen Substanz. In Alkohol ist es leicht auflöslich. In Funke's Analyse des Stocklacks (Trommsd. J. XVIII. 2. S. 142.) blieben von 300 Gran bei der Digestion mit Alkohol 85 Gran einer hellgelben wachsartigen Substanz zurück. Aus der geistigen Tinctur wurde durch Vermischen mit Wasser und Abziehen des Weingeistes als Rückstand in der Retorte ein röthliches Harz, 197 Gran an Gewicht, erhalten. Das rothgefärbte Wasser hinterließ beim Abdunsten 18 Gran einer rothen, leicht zerreiblichen Substanz, den thierischen Farbestoff des Stocklacks, der ein wenig bitterlich zusammenziehend schmeckt, die Lackmustinctur schwach röthet, in Wasser und Weingeist gleich auflöslich ist, Oele, Naphthen und Alaunauflösung roth färbt, die meisten Metallsalze in mehr oder weniger dunkel- auch wohl blutrothen Flocken niederschlägt, vom Galläpfelaufgusse aber eine gelbliche Trübung erleidet. Das über Stocklack abgezogene Wasser besitzt zwar den eigenthümlichen angenehmen Geruch der Tinctur, zeigt aber kein Oelhäutchen, und reagirt nicht auf Lackmuspapier.

Nach dieser Analyse enthalten 300 Th. Stocklack: wahres Pflanzenharz 197; eine zwischen Wachs und Harz in der Mitte stehende Substanz (Lackstoff) 85; thierischen Farbestoff 18.

John (chemische Schriften V. S. 12.) bereitete ein wäßriges trocknes Extract des gepulverten Stocklacks. Dieses wurde mit Alkohol digerirt, und der geistige Auszug gleichfalls zur Trockenheit abgedampft. Diese Masse digerirte er dann mit Aether, und dampfte die Aetherauflösung ab, wodurch eine syrupartige Masse von hellgelber Farbe erhalten wurde, die man abermals in Alkohol auflöste. Setzt man dieser Auflösung Wasser zu, so fällt etwas Harz zu Boden. Eine eigenthümliche Säure, die mit Kali und Kalk verbunden ist, bleibt in der Auflösung, und man erhält dieselbe frei, wenn man mit essigsaurem Blei niederschlägt, und das gewaschene unauflösliche stocklacksaure Bleisalz mit einer gleichen Quantität Schwefelsäure zersetzt. Die Stocklacksäure krystallisirt, hat eine weingelbe Farbe, einen sauren Geschmack, und ist in Wasser, Alkohol und Aether auflöslich. Sie fällt das Blei und das Quecksilber weiß, wirkt aber nicht auf die Auflösungen des Kalkes, des Baryts und des Silberoxyds; die Eisensalze fällt sie weiß. Mit Kalk, Natron und Kali bildet sie zerfließende und in Alkohol auflösliche Salze. Auch den Lackstoff hat John dargestellt, er beschreibt ihn aber nicht ganz übereinstimmend mit Funke. Diese Substanz ist nach John weder in Wasser noch in Alkohol, noch in Aether, weder in fetten noch ätherischen Oelen auflöslich, wird beim Erwärmen unter Verbreitung eines angenehmen Geruchs bloß weich, schmilzt aber nicht, verkohlt bei höherer Temperatur. Nach John's Analyse besteht das Lack aus: Harz 0,667; Wachs 0,017; Lacksubstanz 0,167; balsamischem Bitterstoffe 0,025; Farbestoffe 0,039; fahlgelbem Extract 0,004; Decken von Insecten 0,021; Stocklacksäure 0,006; stocklacks. schwefels. und salzs. Kali, phosphors. Kalk und Eisen 0,010; Erden 0,006.

Nach Hatchett's Analyse enthalten 100 Th. Stocklack: Harz 68;

färbendes Extract 10; Wachs 6; Gluten 5,5; fremdartige Substanzen 6,5; Verlust 4. Das Wachs ist dem der Myrica cerifera analog; das Gluten oder der Kleber hat große Aehnlichkeit mit demjenigen des Weizens.

Das Stocklack wird in der Medicin allein zur Bereitung der wäßrigen Lacktinctur gegen scorbutisches Zahnfleisch verordnet. Der Farbestoff wird aber auch als Farbematerial benutzt, und die jetzt im Handel unter dem Namen Lac-Lake und Lac-Dye oder Färberlack vorkommenden Stoffe, die in der Färberei zum Theil die Cochenille ersetzen, sind Zubereitungen, aus diesem Lack, durch Kochen desselben mit Natronlauge, wodurch das Pigment und eine beträchtliche Menge Harz aufgelöst wird, und Versetzen der klaren Flüssigkeit mit Alaun erhalten.

Das Körnerlack (Lacca in granis) besteht aus rothbräunlichen, auch wohl gelbbräunlichen Körnern, und ist das von seinen Aesten losgemachte, auch wohl eines Theiles seines Farbestoffes beraubte Stocklack. Nach Hatchett enthalten 100 Th.: Harz 88,5; Farbestoff 2,5; Wachs 4,5; Gluten 2; Verlust 2,5.

Das Schellack oder Tafellack (Lacca in tabulis) wird aus dem Stocklack dadurch erhalten, daß ihm durch Einweichen in Wasser sein Farbestoff entzogen, es hierauf getrocknet, und in einem leinenen Beutel unter Umrühren über Kohlenfeuer so lange gehalten, bis es geschmolzen, dann durchgepreßt, und zuletzt, so lange es noch warm und weich ist, zu einer dünnen Tafel über die obere glatte Seite eines Pisangblattes auseinander gezogen wird. Nach Andern wird das Stocklack mit Wasser gekocht, wovon es flüssig wird und obenauf schwimmt, dann durchgeseiht und zwischen zwei platten Marmorn zu Tafeln gepreßt. Diese Tafeln sind mehr oder weniger braun oder braungelb, durchsichtig beinahe wie Spießglanzglas nnd bestehen aus dem eigentlichen Harze und Lackstoffe. Nach Hatchett enthalten 100 Th.: Harz 90,9; färbendes Extract 0,5; Wachs 4,0; Kleber 2,8; Verlust 1,8.

Das Schellack enthält nichts im Wasser Auflösliches mehr; dagegen giebt es mit 6 Th. Weingeist schon bei gewöhnlicher Temperatur einen braunen Lackfirniß. Am leichtesten wird es von den versüßten Geisten, dem weinigen Salmiakgeiste und der geistigen Aetzkaliflüssigkeit aufgelöst, doch taugen diese Auflösungen nicht zum Firniß, der rissig wird. Das Schellack macht ferner die Grundlage der Siegellacke, z. B. 48 Gewichtstheile Schellack, 19 Gewichtsth. venetianischer Terpenthin, 1 Gewichtsth. peruanischer Balsam und 32 Gewichtsth. feiner Zinnober.

Man kann dem Schellack zwar seine Farbe benehmen, wenn man es in äußerst dünne Tafeln zieht, der Sonne aussetzt und mehrmals in kochendem Wasser schmelzt. Leichter wird es durch Chlor gebleicht, wenn es vorher in ein zartes Pulver verwandelt worden, doch scheint durch das Bleichen das Schellack in seiner Grundmischung verändert zu werden, denn es verliert seinen zähen Zusammenhang.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0569-2

Lactuca virosa. Das Kraut. Giftlattigkraut.

Lactuca virosa Linn. Eine einjährige im mittägigen Europa wild wachsende, bei uns in Gärten gezogene Pflanze.

Ein Milchsaft führendes Kraut, mit sitzenden, länglichen, unausgeschnittenen, bisweilen mit einer oder der anderen Bucht ausgeschnittenen, am Rande und auf der Unterseite stachligen, unbehaarten Blättern. Es werde vor dem Blühen eingesammelt und nur frisch angewandt. Man sehe darauf, daß es nicht mit dem Kraute der **Lactuca Scariola** verwechselt werde, deren Blätter immer buchtig-halbgefiedert sind. Wenn die wildwachsende Pflanze fehlt, so ist es erlaubt, die angebaute anzuwenden.

Lactuca virosa Linn. Giftlattig. Der giftige Salat.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.
Juss. Cl. X. Ord. 1. Cichoraceae.

Diese Pflanze wächst an Hecken, Mauern und auf Wegrändern im südlichen Europa. Aus der zweijährigen Wurzel erhebt sich ein aufrechter, oben ästiger, walzenrunder, glatter, 3—4 Fuß hoher, graugrüner Stengel. Dieser dient den halbumfassenden Blättern zur Anheftung; die untern sind sehr groß, fast ohne Einschnitte, pfeilförmig, stumpf, gezähnelt, mit stachligen Nerven auf der Unterseite; die oberen sind kleiner, spitz, fiedertheilig. Die gelben Blüthenköpfe stehen in einer ästigen Rispe am Ende der Zweige. Die Hülle ist walzenförmig, aus lancettförmigen, dachziegelartigen, aufrechten Schuppen gebildet. Der Blüthenboden nackt, flach, etwas grubig, 20—25 halbblumige Zwitterblüthchen tragend. Die ellipsoidische, stark zusammengedrückte Frucht ist mit einer vorstehenden Haut eingefaßt, und mit einer borstigen, gestielten, aus perlmutterweißen, gegliederten Haaren gebildeten Saamenkrone besetzt.

Die Pflanze blüht im Juli bis August.

Die in Gärten, besonders in fettem Boden, gezogene Pflanze wird zwar größer, verliert aber an Kräften; sie muß daher an einem sonnigen Orte in einem kiesigen steinigen Boden ausgesäet werden.

Sehr verwandt ist der wilde Lattig, **Lactuca scariola**, der sich nur durch schrotsägeförmig-fiedertheilige untere Blätter unterscheidet.

Alle Theile des Giftlattigs enthalten einen zähen, scharfen, bittern, brennend schmeckenden Milchsaft, und besitzen einen sehr widrigen betäubenden Geruch. Der Milchsaft des wilden Lattigs ist minder bitter und narkotisch.

Der Milchsaft von beiden Pflanzen nimmt getrocknet eine gelblichbraune Farbe an, und bildet so einen dem Opium an Geruche und Geschmacke ähnlichen Arzneistoff, **Lactucarium** genannt. Dieser Milchsaft quillt aus den in die Epidermis gemachten Stichen hervor, ohne daß dadurch die Vegetation der Pflanze bedeutend gestört wird; die Pflanze bringt reife Saamen. Das

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0570-3

Ausfließen des Milchsaftes dauert bis zum Reifen des Saamens ununterbrochen fort. Die Wirkung des Lactucariums soll dem Opium ähnlich seyn.

Schrader (Trommsd. N. J. V. 1. S. 112 und 338.) bereitete Lactucarium aus L. sativa und zerlegte es. Er fand kein Morphium darin. 1000 Th. enthielten: zwei verschiedene Harze 342; eine Substanz, welche sich im höchstrectificirten Weingeiste, im gewöhnlichen Weingeiste und im Wasser auflöste, und die Eisenauflösungen grün färbte, 363; eine nur im Wasser lösliche Materie 35; unauflöslichen Rückstand, größtentheils aus verhärtetem Eiweiße bestehend 260.

Den frischen Milchsaft des Giftlattigs besonders hat Klink analysirt (Pfaff's Mat. met. VI. S. 501. u. Berl. Jahrb. XXIV. S. 144.). Der Saft röthet das Lackmuspapier; er wird durch Säuren und Weingeist zum Gerinnen gebracht, nimmt an der Luft eine gelbe Farbe an, macht das Wasser erst milchig, und giebt allmälig damit eine rothbraune Auflösung, indem sich ein ansehnlicher Theil unaufgelöst absetzt. Diese Auflösung wird durch salzs. Eisenoxyd grünlich, durch schwefels. Eisenoxyd rothbraun, durch salpeters. Quecksilberoxyd reichlich und zwar röthlich, durch schwefels. Kupfer schwärzlichgrau, auch durch Bleiessig niedergeschlagen, durch kohlens. Kali nicht getrübt, sondern nur in der Farbe erhöht, woraus schon einigermaßen die Abwesenheit eines Alkaloids hervorgeht.

Der concentrirte wäßrige Auszug des Milchsaftes von gelbrother Farbe und sehr durchdringendem virösem Geruche verlor denselben durch das Kochen gänzlich; es gerann nur sehr wenig Eiweißstoff, und es konnte auch durch Behandlung mit Magnesia kein Alkaloid (Morphium) erhalten werden.

Das über den Milchsaft überdestillirte Wasser hatte ganz den virösen Geruch und einen unangenehmen Geschmack, zeigte aber keine Spur von Säure.

Auch der aus der ganzen Pflanze ausgepreßte Saft wurde zerlegt. Derselbe hatte eine dunkelgrüne Farbe, einen mehr krautartigen und virösen Geruch und bittern Geschmack. Es wurde zum Theil mit essigs. Blei, zum Theil mit schwefels. Kupfer niedergeschlagen, die Verbindung mit den Metalloxyden durch Schwefelwasserstoff zersetzt, und die von den Schwefelmetallen abgetrennte Flüssigkeit zur Krystallisation abgeraucht. So wurde eine eigenthümliche Säure, die Lactucasäure (unreine Aepfelsäure), erhalten, welche zwar große Aehnlichkeit mit der Kleesäure hatte, aber sich von ihr wesentlich dadurch unterschied, daß sie in der so viel möglich durch Ammoniak neutralisirten salzsauren Eisenauflösung einen reichlichen grünen Niederschlag bewirkte, auch das schwefelsaure Kupfer viel reichlicher und mit brauner Farbe fällte, auch mit der Talkerde ein schwerauflösliches Salz gab.

Der vom Eiweißstoffe und grünem Satzmehle befreite Saft giebt ein bräunlichgrünes Extract ohne merklichen virösen Geruch, aber von anfangs salzigem, dann sehr bitterm Geschmacke. Alkohol von 0,800 spec. Gew. entzog ihm einen ziemlichen Antheil Salpeter; wäßriger Weingeist löste den bittern Extractivstoff auf, Wasser den Schleim, und ließ einen grauen Satz zurück, der aus Kalk und Talk mit Lactucasäure verbunden bestand.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0571-9

8 Grammen getrockneten Milchsaftes gaben an Bestandtheilen: in Wasser auflösliche Theile 4,1; Wachs 0,7; trocknes Harz (von angenehmen aromatischem Geruche beim Verbrennen) 0,6; Kautschuk 1,8; Feuchtigkeit 0,8.

Auch Peschier (Trommsd. N. J. XIII. 2. 1826. S. 177.) hat eine vergleichende Prüfung des ausfließenden und des ausgedrückten Milchsaftes vom Gartenlattig (L. sativa) angestellt. Der erstere, Lactucarium, Thridax (θρίδαξ, Lattig), besitzt einen heftigen Geruch, einen bittern Geschmack, ist klebrig, erhält in kurzem eine feste Consistenz, nimmt eine Farbe an, die der des trocknen Opiums ähnlich ist, und verliert mehr als die Hälfte an seinem Gewichte. Er besteht 1) aus einem aromatischen Principe, welches dem des Opiums ähnlich ist; 2) aus zwei harzigen Substanzen; 3) aus einem unkrystallisirbaren alkalischen Principe eigener Art; 4) aus einem gummiartigen Extractivstoffe; 5) aus einer faserigen stickstoffhaltigen Substanz. Das durch Auspressen der Pflanze erhaltene vom Satzmehle befreite Extract hat keinen dem Thridax ähnlichen Geruch. Alkohol schied einen gelblichen, klebrigen Stoff aus, der dem von Thridax ähnlich ist; Wasser zog einen gummigen Extractivstoff von bitterm salzigem Geschmacke aus.

(Ueber Lactucarium und dessen Gewinnung vergl. Berl. Jahrb. XX. S. 196., Taschenb. 1823. S. 24., Buchn. Repert. XV. 2. S. 273., und XXV. S. 104.)

Das Lactucarium ist sehr als beruhigendes Mittel gerühmt worden. Die Kenntniß von diesen Kräften des Lattigs ist nicht neu. Schon Galen, der in seinem Alter viele Nächte schlaflos zubringen mußte, aß Abends Salat und bekam nun ruhigen Schlaf. Die alten Römer beschlossen ihre Mahlzeiten mit Salat, um besser schlafen zu können.

Der Giftlattig wird, vor der Blüthe eingesammelt, nur zur Bereitung des Excracts gebraucht; er ist ein kräftiges Narkoticum, und wird im Keuchhusten angewandt.

Lapathum acutum. Die Wurzel. Grindwurzel.

Rumex obtusifolius Linn. Eine ausdauernde Pflanze Europas.

Die verlängerte, wenig ästige, oberhalb einen Daumen dicke Wurzel, mit wenigen Wurzelzasern, außen rothbraun, innen gelblich, mit hartem Holze, und aus dem Stengel übergehendem, allmälig abnehmendem Marke, von bitterm etwas scharfem Geschmacke, den Speichel safrangelb färbend.

Rumex obtusifolius Linn. Der stumpfblättrige Ampfer.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 5. Polygoneae.

Dieser Ampfer kommt durch ganz Deutschland auf Grasplätzen und Wiesen, in Wäldern und an Gräben sehr häufig vor.

Die Wurzel ist ästig, in Hinsicht der Stärke sehr verschieden, außen

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0572-4

gelblichbraun, innen in Rinde- und Markſubſtanz gelb, in dem holzigen Theile weißlich; die gelbe Farbe iſt, wie bei allen verwandten Arten, bei ſolchen Exemplaren, die an feuchten Orten wachſen, heller. Der Stengel iſt aufrecht, 3—5 Fuß hoch, von Grund an mit aufrechten langen Aeſten beſetzt. Die Wurzelblätter ſtehen ausgebreitet, auf langen Stielen, ſind an der Baſis ungleich und undeutlich herzförmig, länglich und ſtumpf. Die Stengelblätter ſind größer; mit dem Stiel oft 1½ Fuß lang und 4 Zoll breit, die obern ſind lancettförmig; alle ſind oben glatt, unten mit kürzerem ſchwachem Haarüberzuge bekleidet. Die Blüthen ſind klein und bilden lange, gegen die Spitze verdünnte blattloſe Trauben.

Dieſer Ampfer iſt durch ſeine Größe ausgezeichnet, und nur mit R. cristatus und R. sylvestris zu verwechſeln; die Wurzel des letztern ſoll dunkler gelb ſeyn.

Die officinelle Grindwurzel, Mangelwurzel (Radix Lapathi acuti), wurde bisher dem Rumex acutus zugeſchrieben, nach Dierbach's Unterſuchungen aber iſt R. obtusifolius die officinelle Pflanze, daher die Wurzel bloß Radix Lapathi zu nennen iſt. Doch wird die in den Officinen vorkommende Wurzel vermiſcht von R. obtusifolius, von R. nemorosus Schrad. und R. crispus Linn. eingeſammelt. R. nemorosus iſt aber nicht ſo häufig, als die beiden andern Arten, daher die Wurzel auch am häufigſten von dieſen beiden eingeſammelt wird.

Getrocknet iſt ſie außen braun, innen mehr oder weniger gelb, und beſitzt einen bittern und adſtringirenden Geſchmack. Die Wurzel des R. obtusifolius iſt bitterer als die der beiden andern. Sie iſt geruchlos, und färbt den Speichel beinahe eben ſo gelb wie Rhabarber.

Der Aufguß der Wurzel iſt röthlichgelb, ſchleimig und wird durch Eiſenſalze grünlich. Laugenſalze verändern die Farbe mehr ins Braunrothe. Die Wurzel enthält nach Parmentier Schwefel und Stärkemehl.

Sie wird faſt ausſchließlich äußerlich in der Abkochung gegen Flechten und ähnliche Ausſchläge, bisweilen auch innerlich als blutreinigendes Mittel angewandt, häufig noch in Frankreich zu der Tisane de racine de patience.

Larix. Boletus. Agaricum. Lerchenſchwamm.

Boletus Laricis Jacq. Auf altwerdenden Stämmen von Pinus **Larix Linn.** im ſüdlichen Europa vorkommend.

Ein Pilz mit ſeitenſtändigem Hute, mit ſehr feinen Röhren verſehen, mit übereinander gelegten Lagen, außen aſchgrau, innen weiß, leicht, zerbrechlich, von ſüßlichem, bitter werdendem, ſcharfem Geſchmacke. Im Handel kommt er getrocknet und geſchält vor.

Boletus Laricis Jacq. Der officinelle Lerchenſchwamm.
Polyporus officinalis Fries.
Dieſes Arzneimittel iſt bereits als **Boletus Laricis** abgehandelt.

Durch das Verwachsen über einander sich erzeugender Hüte in ein Ganzes entstehen Schwämme von ganz verschiedener Gestalt, die ohne Strunk ansitzen. Bald erscheint er kissenförmig, bald mehr kegelförmig verlängert oder kopfförmig, immer auf der einen Seite convex, auf der andern, wo er ansitzt, flach.

In der Jugend ist der Schwamm fast ganz weiß, später wird er mehr ocherfarbig-gelblichbraun, besonders in den Poren; im Alter wird er rissig und mehr oder weniger schwarz gefleckt.

Lauro-Cerasus. Die Blätter. Kirschlorbeerblätter.

Prunus Lauro-Cerasus Linn. Ein immergrüner Baum des Orients, in Gärten angebaut.

Breit lancettförmige, glänzende, lederartige, etwas sägeförmige Blätter, mit zwei unten auf die Rippe aufgedrückten Drüsen, mit der aufs höchste giftigen Blausäure begabt. Nur die frischen dürfen angewandt werden. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Prunus Lauro-Cerasus. Kirschlorbeerbaum.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Der Kirschlorbeer, ein Strauch oder Baum, welcher etwa 15—18 Fuß hoch wird, wächst wild in Syrien, Persien und am schwarzen Meere, vorzüglich in den Gegenden von Trapezunt, von wo er im Jahr 1576 nach Europa gebracht wurde. In mehreren Ländern Europas, z. B. im südlichen Frankreich, in Italien, auch in England und in den wärmeren Gegenden Deutschlands hält er die nicht zu strengen Winter aus, und wird bei uns theils in Gewächshäusern, theils im Freien gezogen, blüht jedoch selten.

Er theilt sich in zahlreiche Aeste und hat eine glatte aschfarbige Rinde, welche an den jüngeren Zweigen grün ist. Die abwechselnden, mit kurzen, glatten, und tiefrinnigen Blattstielen versehenen, eiförmig-länglichen, zugespitzten, festen, steifen, lederartigen Blätter sind glatt, glänzend, immergrün, 4, 5—6 Zoll lang, 1—2 Zoll breit, an den Rändern etwas umgebogen, weitläufig, kurz und scharf gesägt, flach geadert mit stark hervorragender Mittelrippe, oben von dunkelgrüner Farbe, auf der Unterfläche blaßgrün, und nach dem Stiele zu am Grunde mit zwei Drüsen versehen. Die schmutzig weißen, wenig glänzenden Blüthen stehen in den Winkeln der obern Blätter in einfachen aufrechten Trauben. Der Kelch ist einblättrig, glockenförmig, mit 5 Einschnitten versehen. Die Krone besteht aus 5 rundlichen Blumenblättern, die auf dem Kelche befestigt sind. Die Frucht, eine Steinfrucht, ist rundlich glatt, den Kirschen ähnlich, an einer Seite etwas gefurcht, von mittelmäßiger Größe, nimmt, je mehr sie sich der Reife nähert, eine schwarze Farbe an, und enthält in einem fleischigen, saftigen Marke eine rund-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0574-6

lich-längliche, glatte Nuß mit etwas vorstehenden Näthen. Der Kern besitzt die den Blättern, den bittern Mandeln und der Blausäure eigenthümliche Bitterkeit in hohem Grade.

Die Blüthezeit des Kirschlorbeers ist April und Mai.

Die officinellen Blätter sind geruchlos, zerschnitten aber oder zwischen den Fingern gerieben riechen sie balsamisch, stark nach bittern Mandeln und betäubend, und besitzen einen gleichen, bittern, etwas zusammenziehenden Geschmack. Durchs Trocknen werden sie fast geruch- und geschmacklos. Auch die Blüthen haben einen gleichen Geruch.

Die giftigen Eigenschaften der Kirschlorbeerblätter waren den Aerzten schon lange bekannt. Die ältesten Beobachtungen sind von dem Jahre 1737. Der Gehalt der Blätter an ätherischem Oele wurde schon 1778 von Bergius angegeben. Aber erst in neuerer Zeit sind sie ein Gegenstand arzneilicher Anwendung geworden, haben aber auch dadurch sorgfältigere Analysen veranlaßt.

Schrader (Trommsd. J. XI. S. 259.) wies zuerst im Jahre 1802 im Kirschlorbeerwasser die Blausäure nach. Um das Berlinerblau zu erhalten, müsse man zu dem über die frischen Blätter abgezogenen concentrirten Wasser Kali und eine nicht vollkommen oxydirte Eisenauflösung setzen; der grüne Niederschlag verwandle sich dann durch Uebergießen mit Salzsäure (die das zugleich mit niedergeschlagene Eisenoxyd auflöst) in schönes Berlinerblau.

Schaub (Trommsd. J. II. 1. S. 109. und V. 1. S. 86.) hatte früher die Säure für eine Art von oxydirter Essigsäure gehalten.

Spandau du Celliée (Trommsd. J. XVII. 1. S. 318.) erhielt durch Destillation der frischen Blätter für sich allein im Anfange ein wesentliches Oel; dasselbe auch bei der Destillation mit Wasser, und zwar von 16 Unzen Blätter 2 Scrupel. Durch wiederholtes Auskochen der rückständigen Blätter mit Wasser erhielt er aus jeder Unze der Blätter 2 Quentchen Extract von schwarzer Farbe, das aber keine Spur von dem eigentlichen Geruche der Pflanze hatte. Sehr rectificirter Weingeist zog aus den Blättern eine dunkelrothe Tinctur aus, die den nämlichen Geruch wie das destillirte Wasser von sich gab. Der davon abgezogene Weingeist hatte den aromatischen Geruch der Pflanze. Aus 4 Unzen frischer Blätter wurden auf diese Weise nur 16 Gran Harz erhalten. (Kein Myricin? welches doch durch den glänzenden Ueberzug der Blätter angedeutet wird.)

Die Kirschlorbeerblätter werden allein im frischen Zustande zur Bereitung des Kirschlorbeerwassers gebraucht. Schrader erhielt auf die angegebene Weise aus 100 Gran Kirschlorbeerwassers im Durchschnitte 0,26 Gran blausaures Eisen, welches den alleinigen Maßstab für die Stärke dieses Wassers abgiebt.

Der Kirschlorbeer verdankt seine Wirksamkeit dem ätherischen Oele und namentlich der darin enthaltenen Blausäure. In dem Kirschlorbeerôle hat Stange Krystalle von Benzoësäure entdeckt (Buchn. Repert. XIV. 2. S. 329.).

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0575-2

Laurus. Die Beeren. Lorbeeren.

Laurus nobilis Linn. Ein Baum des südlichen Europas.

Rundliche, schwärzliche, runzlige Saamen, mit leicht abzusondernder Schale, mit bräunlichem, hartem, in zwei Theile theilbarem Kerne, von aromatischem Geruche.

Laurus nobilis Linn. Der gemeine Lorbeerbaum.
Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IV. Ord. 6. Laurineae.

Dieser schöne Baum ist schon seit langer Zeit bekannt, und ausgezeichnet durch seinen prachtvollen Wuchs, seine Haltung, sein immergrünes Laub und seine balsamischen Ausdünstungen. Die alten Griechen weiheten ihn dem Gott der Poesie und der Künste; auch waren seine Zweige zugleich bestimmt, der Sieger Stirne zu zieren.

Das Vaterland des Lorbeerbaums ist ursprünglich Kleinasien; auch wächst er im nördlichen Afrika, in Griechenland, Italien, Spanien, und scheint ebenfalls in den südlichen Gegenden Frankreichs einheimisch geworden zu seyn. Da er gegen unser Klima etwas empfindlich ist, und bei der Kälte im Freien nicht wohl ausdauern kann, so wird er bei uns in Gewächshäusern durchwintert.

Der Lorbeer erhebt sich zu einer Höhe von 20, bisweilen von 25 bis 30 Fuß. Seine Aeste sind biegsam, gerade, braungrünlich und gegen den Stamm anliegend. Dieser ist platt und ohne Knoten; die Rinde nicht sehr dick, das Holz porös und schwach. Die immergrünen, abwechselnden, kurzgestielten, lancettförmigen Blätter sind hart, steif, lederartig, ganz ungetheilt, etwas wellenförmig an den Rändern, auf beiden Seiten glatt, geadert, oben von dunkelgrüner Farbe und glänzend, unten blässer und 3—5 Zoll lang, sie besitzen einen stark gewürzhaften Geruch und Geschmack. Die Blüthen sind klein, weißgelblich, meistens vierspaltig, und stehen in den Blattwinkeln in kleinen Dolden. Die Frucht, eine Steinfrucht, uneigentlich Beere genannt, ist eiförmig, länglichrund, fast von der Größe einer kleinen Kirsche, von schwärzlichblauer Farbe, an der Basis nackt, einfächerig und enthält unter einer dünnen zerbrechlichen Schale einen dicken weißlichen Kern, der in zwei Theile zerfällt und einen eigenthümlichen stark gewürzhaften Geruch, und einen bittern, fettigen, gewürzhaften Geschmack hat. Dieser Kern enthält zwei Oele, ein ätherisches wasserhelles, welches man durch Destillation erhalten kann, und ein fettes, butterartiges, grünes, welches durch Auspressen oder Kochen mit Wasser gewonnen wird.

Die sehr runzligen, angefressenen, leichten und schwach riechenden Lorbeeren sind untauglich.

Bonastre (Buchn. Repert. XVII. S. 190.) macerirte die von ihrer Schale befreiten und gepulverten Lorbeeren mit absolutem Alkohol 48 Stunden lang. Die durch Abdunsten concentrirte Flüssigkeit wurde in einem glä-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0576-7

fernen Cylinder einer Temperatur von 12—15 ° R. ausgesetzt, und hatte sich nach 24 Stunden in zwei Theile getheilt, wovon der obere aus einem grünlichen Oele, der untere aber aus einer wenig geistigen, etwas trüben Flüssigkeit bestand. In beiden Flüssigkeiten hatten sich lange nadelförmige Krystalle gebildet, welche gesammelt und durch nochmaliges Abrauchen der Flüssigkeit noch vermehrt wurden. 500 Grammen Lorbeeren hatten durch kaltes Maceriren mit Alkohol 80 Grammen an auflöslichen Bestandtheilen verloren, welche in fettem Oele, Harze und krystallinischer Substanz bestanden. Die alkoholische Flüssigkeit hatte außerdem die Eigenschaft, das Lackmuspapier sehr stark zu röthen.

Die erhaltenen Krystalle waren gelblichweiß, ziemlich durchsichtig, nadelförmig und gewöhnlich 3—4, bisweilen auch bis 15 Linien lang; sie besitzen einen bedeutend bittern und scharfen Geschmack, und riechen wie Lorbeeren, sind in kaltem Wasser gar nicht, in kaltem Alkohol schwer, in kochendem aber und in Aether leicht und vollständig auflöslich. In einem silbernen Löffel erhitzt schmelzen sie und verbreiten einen schwachen Harzgeruch unter Hinterlassung eines unbedeutenden, beinahe ungefärbten Rückstandes. Kaustische Alkalien wirken nicht darauf und bilden keine Seife damit. Die geistige Auflösung verändert weder Lackmus- noch Kurkumepapier.

Das fette Oel nähert sich in seinem Ansehen und seinen Eigenschaften den fetten Oelen. Es ist grün, sehr bitter, scharf, etwas reizend und von dicker Consistenz wie ein Mucilago. Es enthält Stearine, und bildet mit kaustischem Kali und Natron weiche Seifen. Der schwache Alkohol, aus welchem und dem Lorbeeröle die krystallinische Substanz sich abgesondert hatte, ließ beim fernern Abdampfen eine weiche Substanz fallen, welche B. bituminös-harzig nennt, weil sie einige Eigenschaften der Harze hat. Sie ist schwarz, talgartig, wird an der Luft bald fest, riecht unangenehm empyreumatisch, schmeckt bitter, reizend, brennt mit lebhafter Flamme, und hinterläßt eine leichte lockere graue Kohle. Aether nimmt wenig, Alkohol beinahe die Hälfte auf; das Zurückbleibende ist zähe und klebrig. Kaustisches Kali löst beide Harze vollkommen auf.

Der Rückstand von der Behandlung mit kaltem Alkohol wurde mit Alkohol gekocht, und dadurch Stearine erhalten, welcher aber noch $\frac{1}{3}$ des Gewichts flüssiges Oel beigemischt war.

Bei der Destillation mit Wasser gaben die Lorbeeren eine aromatische mit ätherischem Oele geschwängerte Flüssigkeit. Letzteres ist bei 25 ° flüssig, bei 15 ° schmierig und in niedrigeren Temperaturen völlig fest, schmeckt bitter und ist von schmutzig weißer Farbe. Der Schleim, das Satzmehl und die halbfesten fetten Substanzen hindern sehr die Destillation.

Auf dem erkalteten dicken Rückstande schwimmt eine fette schmierige Substanz, welche sich durch gelindes Erwärmen in ein grünes Oel und in eine eiweißartige Substanz scheidet. Jodtinctur erzeugt in dem Decoct eine schöne blaue Farbe.

Durch Zerreiben der geschälten Lorbeeren wurde eine Emulsion erhalten,

aus welcher nach dem Abscheiden der öligen Theile und Filtriren der Flüssigkeit, durch Abrauchen ein Extract von gummiger oder schleimiger Beschaffenheit und einem süßlichen Geschmacke erhalten wurde.

Wurden die mit Alkohol und Aether ausgezogenen Lorbeeren mit kaltem Wasser behandelt, so trübte sich dieses und ließ ein weißes Pulver fallen — Satzmehl. Der Rückstand, aus welchem das Gummi und das Satzmehl geschieden worden war, mit kochendem Wasser übergossen schwoll während des Erkaltens zu einer weißen durchsichtigen im Wasser schwimmenden Materie auf. Diese Substanz, die durch Jod nicht blau gefärbt wird, hat einige Aehnlichkeit mit dem Bassorin.

Endlich wurde jener sauren das Lackmuspapier röthenden Flüssigkeit, die von dem Abdampfen beim Krystallisiren und dem Fällen des Harzes herrührte, destillirtes Wasser zugesetzt, aufgekocht und filtrirt. Die Flüssigkeit war röthlichbraun, färbte sich mit schwefels. Eisenoxydul schön dunkelgrün, gab mit Kalkwasser einen unbedeutenden Niederschlag, ohne die Farbe zu ändern, und wurde von Gallerte kaum getrübt. Die selbst mit Kohlen gereinigte Abkochung gab als Rückstand eine zuckerartige unkrystallisirbare bitterliche Masse.

Beim Verbrennen gaben 32 Grammen Lorbeeren 4 Decigrammen Asche, die aus kohlensäuerlichem Kali, phosphors. und kohlens. Kalke bestand.

Nach dieser Untersuchung sind 500 Th. Lorbeeren zusammengesetzt aus: flüchtigem Oele 4,0; krystallinischer Materie (Laurine) 5,0; grünem fetten Oele 64,0; Stearine, zusammengesetzt aus einem flüssigen Oele und Wachs, 35,5; Harz, zusammengesetzt aus einem löslichen Harze und einem klebrigen Unterharze, 8,0; Satzmehl 129,5; gummigem Extract 86,0; bassorinähnlicher Substanz 32,0; Säure, ungefähr 0,6; unkrystallisirbarem Zucker 2,0; Parenchym der Beeren 94,0; Feuchtigkeit 32,0; Eiweißstoff Spuren; salzigem Rückstande 7,2.

Laurus. Das Oel. Oleum laurinum. Lorbeeröl.

Wird aus den frischen Früchten von Laurus nobilis Linn. durch Kochen und Auspressen im südlichen Europa bereitet.

Ein ätherisch-fettes Oel, dick, körnig, gelblichgrün, von lorbeerartigem Geruche, in Schwefeläther gänzlich, in Weingeist vorzüglich dem ätherischen Theile nach auflöslich.

Dieses Oel hat eine dickliche, butterartige, gleichsam körnige Consistenz, zerfließt bald in der warmen Hand, hat einen sehr kräftigen Lorbeergeruch, und einen bittern, fettigen, etwas balsamischen Geschmack. Alkohol zieht in der Kälte nur die Farbe und das ätherische Oel heraus, und läßt ein geruch- und geschmackloses Fett zurück, aus welchem durch kochenden Alkohol etwas Wachs ausgezogen werden kann.

Häufig wird es mit Schweinefett vermischt; es hat dann keine so körnige Beschaffenheit, und giebt mit dem Schwefeläther nur eine trübe Auflö-

sung. Es kommt auch wohl ein bloßes Kunstproduct vor, aus Schweinefett, welches mit zerstoßenen Beeren macerirt, und mit Kurkume und Indig gelbgrün gefärbt ist. Es unterscheidet sich von dem ächten durch sein Verhalten.

Das Lorbeeröl ist ein bewährtes äußerliches Mittel.

Lavandula. Die Blüthen. Lavendelblumen. Spicke.

Lavandula Spica Linn. Ein kleiner im südlichen Europa einheimischer, bei uns in Gärten angebauter Strauch.

Die walzenförmigen, blauen Blumenkronen, mit ähnlich walzenförmigen vierzähnigen Kelchen, von gewürzhaftem sehr angenehmen Geruche.

Lavandula vera De C. Aechter Lavendel.
Lavandula Spica Linn. Gemeiner Lavendel.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der ächte Lavendel ist in den südlichen Provinzen Frankreichs und in der Schweiz auf Hügeln und am Fuße der Gebirge einheimisch, und wird ausschließlich im freien Lande der Gärten des mittlern und nördlichen Europas cultivirt. Die Pflanze ist ausdauernd.

Der halb strauchartige, ungefähr fußhohe, undeutlich vierkantige Stengel entwickelt lange, dünne, feinbehaarte, weißliche, vierkantige Aeste, welche nach unten beblättert, in der Mitte nackt sind und an der Spitze Blüthen tragen. Die gegenüberstehenden, sitzenden Blätter sind schmal lancettförmig, spitz, ganzrandig, behaart, und bei dem Hervorbrechen weißlich. Die violetten, kleinen, wirteligen, sitzenden Blüthen bilden am Obertheile der Aeste Aehren, welche am Grunde unterbrochen sind. Der Kelch ist röhrig, gestreift, haarig, mit vier kaum angedeuteten Zähnen und einem kleinen, zugerundeten, am Grunde verschmälerten Lappen, welcher sich am Obertheile der Röhre befindet. Die Krone röhrig, zweilippig, die Röhre gerade, länger als der Kelch, die Oberlippe verkehrt herzförmig, ausgeschnitten, mit zwei rundlichen Lappen; die Unterlippe mit drei kleineren stumpfen Lappen.

Die Lavendelblumen sind in hohem Grade aromatisch, ihr Geruch ist stark, durchdringend und sehr angenehm, ihr Geschmack heiß bitterlich. Der Aufguß der Lavendelblumen ist röthlich, balsamisch bitterlich, und wird in gehörig verdünntem Zustande von der schwefels. Eisenauflösung grün gefärbt. Die geistige Tinctur ist gelbgrünlich, und von scharfem balsamisch-bitterlichem Geschmacke.

Sie werden nicht innerlich sondern nur äußerlich angewendet, zu Umschlägen, zu Bädern, zur Bereitung des ätherischen Oeles, des Lavendelgeistes ꝛc., auch machen sie einen Bestandtheil der aromatischen Kräuter aus.

Von dem Blumen der **Lavandula Spica De C. (L. latifolia Ehrh.)**, welche in den südlichen Provinzen Frankreichs sehr gemein ist, wird das Spicköl gewonnen. Es wird von den Hirten auf freiem Felde destillirt.

Lavandula. Das Oel. Lavendelöl.

Wird durch Destillation aus dem blühenden Kraute von Lavandula Spica Linn. vorzüglich im südlichen Frankreich bereitet.

Ein ätherisches, grünlichgelbliches Oel von angenehmen Geruche. Spec. Gew. = 0,877.

Das in der Heimath der Lavendelblumen destillirte Oel hat einen angenehmern Geruch, als das bei uns destillirte. Es hat eine weißgelbliche Farbe, ist sehr dünnflüssig, flüchtig, hat einen scharfen, brennenden, bitterlichen Geschmack und ein spec. Gew. von 0,983; das bei gelinder Rectification zuerst übergehende sehr leichte Oel zeigt aber nur ein spec. Gew. von 0,877.

Alkohol von 0,877 spec. Gew. nimmt bei 20 ° C. nur 40 Procent des Oels auf. Es absorbirt das 52fache seines Volumens an Sauerstoffgas, und es bildet sich dabei etwas Kohlensäure. Prout fand, daß das Lavendelöl die reichste Ausbeute an Campher gab, indem der vierte Theil des Oels erhalten wurde.

Nach Saussure besteht das Lavendelöl aus 75,5 Kohlenstoff, 11,07 Wasserstoff, 13,07 Sauerstoff und 0,36 Stickstoff.

Das Spicköl hat einen weniger angenehmen Geruch, eine etwas gelbe Farbe, und größere spec. Schwere, als das ächte Lavendelöl. Das im Handel vorkommende Spicköl ist aber gewöhnlich ein Gemisch aus Lavendel- und Terpenthinöl.

Ledum palustre. Das Kraut. Wilder Rosmarin. Porsch. Porst.

Ledum palustre Linn. Ein in moorigen und sumpfigen Gegenden Deutschlands häufiger kleiner Strauch.

Das Kraut mit nach oben zu braunem filzigem Stengel, mit linien-lancettförmigen, am Rande umgerollten Blättern von unbehaarter, runzliger, gesättigt grüner Oberfläche und filziger, brauner Unterfläche, von bitterm zusammenziehendem Geschmacke und starkem Geruche. Es werde im Monat Mai und Juni gesammelt.

Ledum palustre Linn. Der Sumpfporsch.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 3. Ericineae.

Dieser kleine Strauch wächst in mehreren Gegenden Deutschlands, und in andern Ländern des nördlichen Europas, auch in Asien und Amerika, an sumpfigen Orten, in torfmoorigen nassen Brüchen.

Der Stengel ist strauchartig, ästig und erreicht eine Höhe von 2—4 Fuß und drüber. Die Rinde des Stengels ist aschfarbig, die der Zweige braunroth und etwas wollig. Die zerstreuten, kurzgestielten, immergrünen

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0580-8

Blätter sind ziemlich hart, fest, linien-lancettförmig, eine Linie breit, einen Zoll auch drüber lang, am Rande zurückgerollt, oben dunkelgrün und glatt, den Rosmarinblättern ähnlich, unten braunfilzig. Die weißen, bisweilen röthlichen Blumen bilden an den Enden der Zweige Doldentrauben, und sind vor der Blüthe hängend. Der einblättrige sehr kleine Kelch ist fünfspaltig; die Blumenkrone einblättrig, flach und fünftheilig. Die Frucht ist eine fünffächrige Saamenkapsel mit vielen kleinen länglichen Saamen.

Der Porsch blüht im Mai bis Juli.

Das Kraut besitzt im frischen Zustande einen sehr starken, terpenthinartigen, widrigen, betäubenden Geruch und einen bittern zusammenziehenden Geschmack.

Westring erhielt bei der Destillation mit Wasser nur ein Destillat von angenehmen, einigermaßen rosenähnlichem Geruche. Nach Hagen erhält man ein bitterlich gewürzhaftes Wasser von betäubendem Geruche und ein weißes ätherisches Oel.

Hr. Dr. Meißner (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 170.) hat den Sumpfporsch zerlegt. Durch Destillation mit Wasser wurde ein wie das Kraut riechendes, brennend aromatisch schmeckendes ätherisches Oel erhalten. Dann wurde nach einem Alkaloid geforscht, aber keins gefunden.

Durch Behandlung der Blätter mit Schwefeläther und Verdunsten desselben wurde ein grün gefärbter Rückstand erhalten, welcher mit schwachem Alkohol behandelt und nach dem Verdunsten der Flüssigkeit wieder mit Wasser ausgezogen wurde. Die hierbei zurückbleibende Materie war ein Hartharz. Die nach der Behandlung des durch Aether erhaltenen Extractes mit Weingeist gebliebene Masse wurde gleichfalls mit Wasser an darin auflöslichen Theilen erschöpft und diese Auszüge mit den von dem Hartharze erhaltenen vereinigt und verdunstet. Der Rückstand war dunkel gelbbraun, roch wie das Kraut, schmeckte zusammenziehend, bitterlich, schwach sauer, röthete bleibend Lackmuspapier, behielt eine weiche Consistenz, und verhielt sich wie ein eisengrünender Gerbestoff mit äpfelsaurem Kalke. Der von Alkohol und Wasser nicht angegriffene Theil des ätherischen Extracts war grün, ohne Geruch und Geschmack und war das Blattgrün.

Der Blätterrückstand, wiederholt mit Alkohol digerirt, gab ein geistiges Extract, welches wieder mit Wasser behandelt wurde; diese wäßrigen Auszüge gaben nach dem Verdampfen ein Extract, welches aus unkrystallisirbarem Zucker, eisengrünendem Gerbestoffe, saurem äpfels. und essigs. Kalke und Kali bestand. Was das Wasser nicht aufgenommen hatte, war das schon erwähnte Hartharz.

Der Blätterrückstand wurde dann mit Wasser ausgekocht, abgeraucht und das Extract mit Alkohol behandelt, welcher einen braunen Farbestoff mit saurem äpfels. Kali und Kalk aufnahm. Der in Alkohol nicht auflösliche Theil verhielt sich wie ein gefärbtes Pflanzengummi. Durch Behandeln mit Aetzlauge und nachheriges Sättigen mit Essigsäure wurde ein Niederschlag erhalten, der Ulmin zu seyn schien. Die salzige Flüssigkeit verdunstet und

mit Alkohol ausgezogen gab ein Gummi; was der Alkohol noch aufgelöst hatte, kam mit dem sogenannten Extractiv- oder Farbestoffe überein. Der Blätterrückstand war jetzt Pflanzenfaser.

500 Gran der Blätter enthalten: ätherisches Oel 7,80; Blattgrün (Chlorophyll) 57,00; Hartharz 37,50; eisengrünenden Gerbestoff mit saurem äpfels. Kalke 13,00; eisengrünenden Gerbestoff mit saurem äpfels. und essigs. Kalke und Kali 21,00; nicht krystallisirbaren Zucker 15,00; braunen Farbestoff mit saurem äpfels. Kali und Kalke 23,00; Gummi (durch Wasser 30,5, durch Aetzlauge ausgezogen 156, zusammen) 186,50; Extractivstoff, durch Aetzlauge gewonnen, 34,00; Ulmin 20,00; Faser 55,00; Feuchtigkeit 30,00. S = 499,80.

Der Porsch, eine mit narkotischen Eigenschaften begabte Pflanze, wurde von schwedischen Aerzten, auch von Linné im Keuchhusten und in Hautausschlägen empfohlen. Von den Landleuten wird die Abkochung gebraucht, um durch Waschen des Rindviehes damit das Ungeziefer zu tödten. Motten und Wanzen sollen, wenn man das trockne Kraut zwischen die Kleider und Betten legt, vertrieben werden. Der Porsch soll auch zum Gerben des Leders brauchbar seyn. Ein schädlicher Mißbrauch wird bisweilen dadurch getrieben daß man dem Biere Porsch zusetzt, um es berauschender zu machen.

Levisticum. Die Wurzel. Liebstöckelwurzel.

Ligusticum Levisticum Linn. Eine ausdauernde Pflanze des südlichen Deutschlands, in Gärten angebaut.

Die walzenförmige, zusammengedrückte Wurzel, außen ins Braune sich neigend, innen weißlich, von aromatischem, etwas widerlichem Geschmacke und Geruche. Sie werde im Frühlinge gesammelt.

Ligusticum Levisticum Linn. Der gewöhnliche Liebstöckel.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der gemeine Liebstöckel wächst in Frankreich, Italien, der Schweiz, und wird bei uns sowohl in Gärten als auf dem Felde gezogen.

Die Wurzel ist dick, spindelförmig und ästig. Die Stengel erreichen eine Höhe von 2—6 Fuß, sind hohl, dick, glatt, gestreift und wenig ästig. Die glatten, glänzenden Blätter sind unregelmäßig, aus dreilappigen, keilförmigen, oben eingeschnittenen Blättchen zusammengesetzt und mit Blattscheiden versehen. Die Dolden mit blaßgelben Blümchen bilden sich am Ende des Stengels. Die gemeinschaftliche Dolde ist vielstrahlig, so wie auch die besondere, welche halbkugelig ist.

Die Blüthezeit ist Juni bis August; die Saamen reifen im September.

Die officinelle Wurzel ist einen halben, oft einen Fuß lang, oben über einen Zoll stark, mit vielen pfeifenstieldicken Aesten besetzt, fleischig, äußerlich von gelbbrauner, inwendig von weißer Farbe, und besitzt einen starken, durchdringenden, scharfen, gewürzhaften, nicht für Jeden angenehmen Geruch, und

einen zuerst süßlichen, dann aber widrigen und scharfen Geschmack. Aus der frischen Wurzel, welche im dritten Jahre im Frühjahre eingesammelt wird, quillt beim Zerschneiden ein gelblicher, gummiharziger Saft hervor, welcher dem Opoponax ähnlich ist.

Bei der Destillation mit Wasser erhält man (vom Pfunde ein Quentchen) ätherisches Oel. Das Infusum soll in Nervenfiebern die Angelika und Serpentaria vertreten können.

Außer der Wurzel wird auch bisweilen das Kraut, welches aber minder wirksam ist, noch seltener aber der Saame verlangt.

Lichen Islandicus. Isländisches Moos. (Flechte.)

Cetraria Islandica Acharii. In den Gebirgen Schlesiens, Thüringens, auf dem Harze und in andern bergigen Gegenden des nördlichen Europas häufig.

Eine aufsteigende, gerissene Flechte, mit linienförmigen, vielspaltigen, rinnenförmigen, gezähnt-wimperigen Einschnitten, olivengrünlich-kastanienbraun, an der Basis blutroth, bitter, schleimig.

Cetraria Islandica Ach. Die isländische Flechte. Isländische Schuppenflechte.

Lichen Islandicus Linn.

Linn. Cl. XXIV. Cryptogamia. Ord. Algae.

Juss. Cl. I. Ord. 2. Algae.

Die isländische Flechte ist besonders häufig in den nördlichen Ländern Europas, kommt aber auch in Deutschland und den angrenzenden Ländern, an trocknen sonnigen Orten, auf Bergen und in Nadelholzwäldern vor. Sie bildet kleine Rasen, indem immer mehrere an einzelnen Stellen mit einander verwachsen. Die Größe der Flechte ist sehr verschieden, so daß man Exemplare von 1½ Zoll, andere von 3—4 Zoll in der Länge findet. Das Laub (thallus) ist aufrecht, rinnenförmig, zusammengerollt und in viele unregelmäßige Lappen zerschlitzt. Diese Lappen sind an der unfruchtbaren Flechte schmal, gezahnt und am Rande mit sehr kurzen steifen Borsten gewimpert; an den fruchttragenden Exemplaren werden die Endabschnitte sehr breit und stumpf, wodurch diese ein sehr verschiedenes Ansehen gewinnen. Auf der Oberfläche befinden sich kleine Vertiefungen (lacunae). Die Grundfarbe der Flechte ist ein graulliches Weiß, welches gegen die Spitze hin bald ins Olivengrüne, häufiger aber ins Kastanienbraune übergeht; gewöhnlich ist die Basis des Laubes mit einem blutrothen Flecken bezeichnet. Im feuchten Zustande ist die Flechte zähe und biegsam, im trocknen sehr spröde und zerbrechlich. Die Früchte (Apothecia) bilden kleine runde oder ovale Schildchen an der Spitze des Laubes, sie sind flach, stehen nahe am Rande der Lappen, und sind nur im Anfange von dem Laube frei. Die Flechte kommt übrigens weit häufiger im unfruchtbaren als im fruchttragenden Zustande vor.

Unter allen kryptogamischen Gewächsen ist diese Flechte vorzugsweise als

Arzneipflanze geschätzt. Sie ist ohne Geruch; ihr Geschmack ist schleimig, bitter und etwas adstringirend, durch langes Kauen löst sie sich im Munde zum Schleim auf.

In kaltem Wasser nimmt das isländische Moos in kurzer Zeit die ihm eigene Farbe und Feuchtigkeit wieder an, und ein Pfund Moos, das man auf diese Art auffrischt, und mit einer Serviette abtrocknet, wiegt nun zwei Pfund und zwei Unzen. Nach 3 bis 4 Tagen theilt es dem Wasser zwar eine schwache falbe Farbe, aber nichts von seiner Bitterkeit mit; soll es diese an das Wasser abgeben, so muß man es vorher zerschneiden. Das gepulverte Moos theilt dem kalten Wasser in weniger als 3 Stunden eine schwach falbe Farbe, und eine der Cichorie ähnliche Bitterkeit mit; selbst nach 12 Stunden hat es aber nicht mehr als 3 Procent seines Gewichts verloren. Der kalte Aufguß erhält durch eine fast wasserhelle Auflösung der oxydirten Eisensalze eine violette röthliche Farbe. Warmes Wasser zieht viel schneller die Bitterkeit, zugleich aber auch etwas Schleim aus. Durch Kochen wird jedoch erst das Wasser in den Stand gesetzt, alle auflöslichen Theile aus dem Moose auszuziehen.

Nach den früheren Arbeiten von Ebeling, Cramer und Proust verdanken wir Berzelius (Schw. J. VII. 1813. S. 317.) eine schöne Arbeit über das isländische Moos, durch welche wir mit der Natur der zwei am meisten ausgezeichneten Bestandtheile des Mooses, nämlich des eigenthümlichen Bitterstoffs und des eigenthümlichen Stärkemehls, näher bekannt gemacht worden sind.

40 Grammen getrocknetes und grob gepulvertes Moos wurden wiederholt mit kaltem Wasser ausgezogen. Der Aufguß, welcher einen bittern unangenehmen Geschmack, fast keinen Geruch und eine schwach gelbbraune Farbe hatte, wurde abgedampft, wobei er seine Farbe in die braune umwandelte, und zuletzt ganz undurchsichtig wurde. Der dunkelbraune extractartige Rückstand gab an Alkohol einen braungelben Stoff ab, der nach dem völligen Verdunsten des Alkohols zähe war, und sich kaum zur Trockne bringen ließ. Bei der Auflösung desselben in Wasser blieb eine rothgelbe, pulverige, bittere Substanz übrig, welche sich am Ende der Verdunstung des Alkohols abzusondern angefangen hatte. Die von dem bittern Pulver befreite wäßrige Auflösung gab durch Verdunsten einen braunen Syrup, welcher süß und hintennach salzig schmeckte. Der braunfärbende Extractivstoff konnte durch Bleiessig gefällt, und der Syrup von hellerer Farbe dargestellt werden. Der vom Alkohol unaufgelöst gelassene Antheil war braun, und trocknete leicht zu einer harten spröden Masse aus, welche bis auf eine geringe Menge unauflöslich gewordenen Extractivstoff im Wasser auflöslich war, und neben phosphors. Kalke ein Kalksalz mit einer verbrennlichen Säure enthielt.

Da das kalte Wasser auch bei wiederholten Aufgüssen nicht allen Bitterstoff auszieht, wie schon Westring beobachtet hatte, so wurde das mit kaltem Wasser ausgezogene Moos dreimal mit einer Lauge von 1½ Pfund Wasser und einer Gramme krystallisirtem kohlensaurem Kali digerirt. Die alka-

lischen Auszüge waren ausnehmend bitter; sie wurden in einer Porcellanschale zur Trockne abgedampft. Während der Abdampfung wurde die Flüssigkeit immer dunkler braun und zuletzt ganz schwarz. Es blieb eine harte braune Masse zurück, die nicht im mindesten bitter schmeckte, was vorher im höchsten Grade der Fall war.

Das rückständige Moos wurde in einer Porcellanschale mit Wasser zwei Stunden gekocht, und die breiige Masse ausgepreßt. Die Flüssigkeit war braungelb, klar, beim Erkalten wurde sie undurchsichtig, und gerann zu einer steifen Gallerte. Diese ließ allmälig einen Antheil Flüssigkeit fahren, welche durch ein Seihetuch abgeschieden wurde. Die zurückbleibende Gallerte bildete nach dem völligen Austrocknen einen schwarzen harten Stoff. Die abgeschiedene Flüssigkeit gab beim Abdampfen Gummi.

Der durch das siedende Wasser nicht aufgelöste Antheil des Mooses war aufgequollen, halbgeronnenem Eiweiß ähnlich, von graugrüner Farbe. Beim Trocknen wurde er schwarzgrün, hart, rissig und auf dem Bruche glasig. Mit Alkohol behandelt gab er eine grüne Tinctur, und enthielt eine geringe Menge des grünfärbenden Wachses der Pflanzen, aber keine Spur von Harz.

40 Grammen isländisches Moos enthalten demnach: Syrup, mit etwas Extractivstoff und Pflanzensalz verunreinigt, 1,50; bittern Stoff 0,10; in Wasser auflöslichen Extractivstoff, mit Kalksalzen verbunden, 0,58; in kohlens. Kali auflösliches Extract 2,82; gallertartig gerinnenden Stoff 20,28; durch das Sieden gebildetes Gummi 0,49; unauflösliches Skelet 14,00.

Da in dieser Zerlegung Verschiedenes nicht genau bestimmt werden konnte, so begann Berzelius eine neue Analyse mit Ausziehung des Mooses durch Alkohol, und wechselndes Behandeln des Extractes mit Wasser und Weingeist, und hierdurch wurde der reine Bitterstoff, Wachs, Syrup, weinsteins. Kali, weinsteins. und etwas phosphors. Kalk erhalten. Laues Wasser nahm dann Gummi auf; Kalilauge gab ein dunkelgefärbtes Extract, ganz dem Kleber gleich, und die Auskochung mit Wasser Moosstärkemehl.

Der Bitterstoff wird erhalten, wenn das geistige Extract mit Wasser behandelt, und das Ungelöste wieder mit Alkohol ausgezogen wird, welcher grünes Wachs aufnimmt, den Bitterstoff aber zurückläßt. Dieser ist hellgelb, pulverig, leicht, von unbeschreiblich bitterm Geschmacke, der lange im Munde bleibt. Auf einer Glastafel erhitzt, wird er halbflüssig, braun, bläht sich auf, raucht, stößt einen widrigen, säuerlich-brenzligen Geruch aus und läßt eine löcherige Kohle zurück. Im Wasser löst er sich in äußerst geringer Menge auf; die gesättigte Auflösung hat eine schwache grünliche Farbe, und einen unerträglich bittern Geschmack. Durch Verdunsten in gelinder Wärme läßt sie den Bitterstoff unverändert als ein graues Pulver zurück; siedet man sie dagegen lange, so wird sie braun, es schlägt sich ein braunes Pulver nieder und der bittere Geschmack verschwindet. In Alkohol ist der bittere Stoff leichter auflöslich, als in Wasser, aber doch auch in unbedeutender Menge. In einer kohlensauren Kalilauge ist er am leichtesten auflöslich; die Auflösung ist grün und unbeschreiblich bitter, verliert aber durch Sieden den bittern

Geschmack, wobei der Bitterstoff zerstört wird. Bleiessig fällt ihn mit hellgrauer Farbe, Queckſilberoxydul als einen weißen Schleim. Von Eisensalzen wird er nicht verändert, wenn er durch Auswaschen von seiner Gallussäure befreit ist, andernfalls wird er purpurfarbig gefällt. Pfaff hat aber unter keinen Umständen eine solche purpurrothe Farbe durch Gallussäure in der Auflösung des schwefelsauren Eisens entstehen gesehen, die schwefelsaure Eisenoxydulauflösung wird auf das bestimmteste dadurch blau gefärbt, und die purpurrothe Farbe, welche das Eisenoxydul, namentlich in Kohlensäure aufgelöst, hervorruft, geht sehr bald ins Blaue über, von welcher Umwandlung sich beim Aufgusse des Mooses keine Spur zeigt. Der Moosaufguß röthet das Lackmuspapier; dieses rührt von saurem weinsteinf. Kali her; außerdem enthält das Moos weinsteinf. und phosphorf. Kalk, aber gar kein salz- oder schwefelf. Kali. Die Asche des verbrannten Mooses besteht größtentheils aus Kalkerde.

Die durch Kochen des vorher mit kaltem durch kohlenf. Kali geschärftem Wasser ausgezogenen Mooses bereitete Gallerte hat gewöhnlich eine bräunliche Farbe, die ihr jedoch nicht eigenthümlich ist, sondern von einem Antheile Extractivstoff herrührt. Bei gehöriger Sorgfalt des Auswaschens erhält man sie fast ganz farblos. Die Gerinnung beim Erkalten geht so weit, daß das Aufgelöste sich als ein zusammenhängender Klumpen ausscheidet, der sich nachher zusammenzieht und die Flüssigkeit fahren läßt, die als Auflösungsmittel diente. Wird das Geronnene jetzt auf ein Tuch gebracht, so fließt der größte Antheil der Flüssigkeit ab, und die Gallerte zieht sich immer mehr zusammen. Eine Auflösung von thierischer Gallerte verhält sich beim Gerinnen ganz anders, es geschieht bei ihr auf gleiche Weise, wie bei geschmolzenem Fette, und sie läßt keine Flüssigkeit fahren, sondern Wasser und Leim bleiben mit einander verbunden. Das Gerinnen der Moosgallerte kommt am meisten mit dem der sauer gewordenen Milch überein. Die abgelaufene Flüssigkeit enthält neben einem gummiähnlichen Stoffe einen kleinen Antheil Gallerte aufgelöst. Das Geronnene ist auf der Zunge schleimig, und fast geschmacklos, es läßt nur einen unbedeutenden Nachgeschmack, nicht unähnlich dem während des Siedens des Mooses sich verbreitenden Geruche, der jedoch nicht im mindesten zuwider ist. Es trocknet langsam zu einer schwarzen, beinharten, im Bruche glasigen Masse, die in kaltem Wasser sich wieder erweicht und aufschwillt, und von siedendem zu einer gerinnbaren Gallerte aufgelöst wird. Dabei bleibt der braunfärbende Stoff unaufgelöst, und die geronnene Gallerte ist ganz weiß, aber undurchsichtig.

Läßt man die Auflösung dieser Gallerte abdampfen oder sieden, so bedeckt sie sich mit einer Haut, die allmälig zu einem runzligen Klumpen zusammenschrumpft und auf der Oberfläche trocken wird, im Verhältnisse wie das Wasser verdunstet, so daß man auch bei beständigem Sieden nicht ohne die größte Schwierigkeit eine sehr verdünnte Auflösung davon concentriren kann, damit sie beim Erkalten gerinne. Es ist daher zum Auskochen des Mooses nicht zu viel Wasser anzuwenden, damit es nicht nöthig

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0586-3

werde, die Abkochung zur Gallerte lange abzudampfen, wodurch sie zum Theil ihre Gerinnbarkeit verliert. Jene Haut wird nämlich in kaltem Wasser weich und schleimig, in siedendem löst sie sich wieder auf, die Auflösung gerinnt aber beim Abkühlen nur zu einem Theile, das übrige bleibt weich und schleimig, wie eine starke Auflösung von Sago oder Stärkemehle, so daß die Gallerte durch die Verwandlung in Häute an der Luft ein größeres Vermögen erlangt hat, in kaltem Wasser aufgelöst zu bleiben. Die meiste Aehnlichkeit hat das Moosstärkemehl mit dem Sago, von dem wir wissen, daß es eine Abänderung des Stärkemehls ist. Mit Jod bringt das Moosstärkemehl nach Pfaff keine blaue Farbe hervor.

Bei trockener Destillation giebt das Moosstärkemehl keine Spur von Ammoniak, aber viel Säure, es ist daher auf ein großes Verhältniß Sauerstoff zu schließen.

Der gummige Extractivstoff des Mooses ist sowohl in kaltem Wasser als in Kalilauge leicht auflöslich, in Alkohol aber unauflöslich.

Die von den Abkochungen rückständige Masse besteht aus Gefäßen und dem Skelet des Mooses, und trocknet zu einer dunklen, harten, auf dem Bruche glasigen Masse aus. Sie scheint sich zu dem Moosstärkemehle zu verhalten, wie der stärkemehlartige Faserstoff der Erdäpfel zu dem Erdäpfelstärkemehle.

Nach dieser zweiten Analyse enthalten 100 Th. isländisches Moos: Syrup 3,6; saures weinsteins. Kali, weinsteins. und etwas phosphors. Kalk 1,9; bittern Stoff 3,0; grünes Wachs 1,6; Gummi 3,7; extractartigen Farbestoff 7,0; Moosstärkemehl 44,6; stärkemehlartiges Skelet 36,2. S. = 101,6. Zuwachs an Gewicht 1,6. Außerdem eine Spur Galläpfelsäure (?).

Pfaff (Schw. N. J. XVI. 1826. S. 476.) hatte schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß der Aufguß oder die Abkochung des isländischen Mooses mit den Auflösungen der Eisenoxydsalze eine Färbung ins Purpurrothe annehme, und daß diese Reaction nicht, wie Berzelius angegeben hat, einem Antheile Gallussäure zugeschrieben werden kann, welche eine dunkelblaue unter gewissen Umständen ins Olivengrüne übergehende Farbe giebt.

Ein Pfund sehr fein zerschnittenes isländisches Moos wurde mit destillirtem Wasser, dem zwei Drachmen kohlens. Kali zugesetzt war, bei einer Temperatur von 10—12 ° macerirt, der erhaltene neutrale Auszug wurde filtrirt, mit essigs. Blei gefällt und der Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die dadurch abgeschiedene Säure enthielt noch Kalk, welcher durch die Alkalien abgeschieden werden konnte. Die dadurch erhaltenen Salze fällten das essigs. und salzs. Eisenoxyd sehr reichlich und mit derselben rothbraunen Farbe, wie die bernsteins. Salze; auch andere Salze wurden gefällt.

Rein wurde die neue Säure dadurch erhalten, daß der durch essigs. Blei erhaltene Niederschlag durch eine berechnete Menge Schwefelsäure zersetzt wurde; dieselbe schied sich aus der concentrirten Auflösung in zusammengehäuften, weißen, fast prismatischen Krystallen, doch ohne Glanz, ab. Auf der Kohle verflüchtigte sie sich mit einem weißen Rauche, ohne vorher zu

schmelzen, oder sich zu verkohlen, mit einem etwas aromatischen Geruche, der aber an keine der bekannten Pflanzensäuren erinnerte, sondern ganz eigenthümlich war. Pfaff hält den Namen Flechtensäure (Acidum lichenicum) am passendsten. Sie nähert sich noch am meisten der von Braconnot bei der Analyse des Agaricus pseudo-igniarius gefundenen sogenannten Boletsäure (Acidum boleticum), welche nicht mit der Pilz- oder Funginsäure zu verwechseln ist.

Das isländische Moos ist lange als eins unsrer besten stärkenden und zugleich nährenden Heilmittel bekannt, besonders in solchen chronischen Krankheiten, wo der tägliche Verlust des Körpers unnatürlich vermehrt, und der Magen so schwach und reizbar ist, daß gewöhnliche Nahrungsmittel jenen Verlust nicht ersetzen können. Das von Grastheilchen u. s. w. ausgelesene Moos wird am zweckmäßigsten in der Abkochung oder Gallerte verordnet. Eine Unze Moos giebt zwei Unzen einer starken Gallerte, (Gelatina lichenis islandici), welcher man noch etwas Zucker oder Saft zuzusetzen pflegt.

4 Pfund geröstete und geschlaubte Cacaobohnen, eben so viel Zucker, 2 Pfund sorgfältig ausgelesenes, mit siedendem Wasser abgebrühtes, in gelinder Wärme getrocknetes und sehr fein gestoßenes isländisches Moos und drei Unzen Saleppulver, genau durch einander gemischt, geben die Mooschocolade.

In Island macht dieses Moos ein Hauptnahrungsmittel der Einwohner aus, wozu es von allen Unreinigkeiten befreit, gewaschen, getrocknet und zu Mehl gemahlen wird. Zwei Theile von diesem Mehle hält man für eben so nährend, als einen Theil Weizenmehl. Der bittere Stoff macht aber die Zubereitungen unschmackhaft, die leichte Auflöslichkeit desselben in Kalilauge giebt jedoch ein leichtes Mittel an die Hand, ihn zu entfernen, dadurch, daß man das fein zertheilte Moos mit schwacher Aschlauge übergießt, die dann wieder durch gelindes Auspressen und Auswaschen entfernt wird.

Lignum Campechianum. Campecheholz. Blauholz.

Haematoxylon Campechianum Linn. Ein Baum des wärmeren Amerikas.

Ein hartes, schweres, gelbrothes Holz von etwas zusammenziehendem süßlichem Geschmacke. Das mit einer Abkochung des Holzes befeuchtete Fließpapier wird durch zugesetzte schwefelsaure Kupferauflösung blau.

Haematoxylon Campechianum Linn. Campecheholzbaum. Blauholzbaum.

Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Leguminosae.

Das Vaterland dieses Baumes ist Mexiko, und besonders die Bai von Campeche, der er seinen Namen verdankt. Von hier wurde er nach Jamaika und nach andern antillischen Inseln gebracht, wo er zu Umzäunungen benutzt wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0588-5

Der Stamm erreicht eine Höhe von 40—50 Fuß, die Rinde ist an dem alten Holze runzlig, an dem jungen glatt, grau, der Splint gelblich, das feste Holz im Innern dunkelroth. Die Blätter stehen abwechselnd, sind abgebrochen gefiedert, die wohlriechenden Blüthen bilden zahlreiche vielblüthige, aufrechte, einfache, 3—4 Zoll lange Trauben. Der Kelch besteht aus einem sehr kurzen, kreiselförmigen, stehenbleibendem Rohre und einem aus 5 ungleichen, ovalen, röthlichen, hinfälligen Blättchen gebildeten Saume. Die Blumenkrone ist aus eben so viel keilförmigen, stumpfen, blaßgelben Blumenblättern, welche noch einmal so lang als der Kelch sind, zusammengesetzt.

Das innere dichte und ziemlich schwere Holz dieses Baumes ist unter dem Namen Campecheholz als Farbematerial und als ein adstringirender Arzneistoff bekannt. Wir erhalten es in großen von dem Splinte befreiten gelbröthlichen Stücken, die eine unebene Oberfläche, und von der Einwirkung der Luft von außen eine schwärzliche, inwendig eine blutrothe Farbe haben, und quer durchschnitten kleine, rothe, dunkle, wellenförmige Ringe zeigen. Es ist sehr dicht und fest, läßt sich schwer durchschneiden, und ist spec. schwerer, als das Wasser, nämlich 1,057. Gekaut färbt es den Speichel rothbräunlich. Der Geruch, wenn es gerieben wird, ist schwach violenartig, der Geschmack süßlich, etwas adstringirend, hintennach bitterlich.

Beim Kochen mit Wasser giebt das Blauholz eine sehr gesättigte rothe Flüssigkeit, welche durch die Säuren hochroth, und durch die Alkalien, Metalloxyde und basischen Salze derselben violett gefärbt wird. Auch der Weingeist zieht den Farbestoff aus. Zwei Pfund Holz geben gewöhnlich 4—5 Unzen wäßriges Extract.

Chevreul (Schw. J. IV. S. 424. und VIII. S. 272.) hat eine sehr sorgfältige Analyse dieses Holzes geliefert. Er stellte einen eigenen Grundstoff, der mit einem an sich in Wasser unauflöslichen Bestandtheile im Holze verbunden sich befindet, vermittelst des ersteren aber in Wasser auflöslich ist, dadurch abgesondert dar, daß er den wäßrigen, bis zur Trockne abgedampften Aufguß mit Alkohol übergießt, der den färbenden Grundstoff aufnimmt, und eine braune Substanz zurückläßt. Der geistigen Flüssigkeit wird, nachdem sie eingedickt worden, etwas Wasser zugesetzt, und der Weingeist abgedampft. Aus dem Rückstande krystallisirt sich nach einigen Tagen der färbende Grundstoff, den Chevreul Hämatine nennt, wofür man aber die passendere Benennung Hämatoxylin vorgeschlagen hat. Es schießt in kleinen, feinen, stark glänzenden, schuppigen Krystallen von weißer Rosafarbe an, welche etwas von dem Scheine des durch schwefelige Dämpfe leicht gefärbten Silbers oder des bleichen Musivgoldes besitzt, hat einen etwas adstringirenden und bittern Geschmack, wenn man es einige Zeit im Munde hält; ist in Wasser, Alkohol und Aether auflöslich, schlägt die Hausenblase nur schwach nieder; Säuren machen die orangerothe Farbe seiner Auflösung gelb, Alkalien purpurroth. Man kann diesen Stoff als eine besondere Art des Gerbestoffs (der Gallussäure ähnlich?) betrachten, welcher zugleich das vorzüglichste Pigment dieses Holzes ist.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0589-3

Außer dem Hämatoxylin findet sich im Extracte des Campecheholzes noch eine andere braune Materie, welche für sich in Wasser nicht merklich, aber wohl in Alkohol auflöslich ist, und die merkwürdige Eigenschaft hat, durch ihre Verbindung mit dem Hämatoxylin gleichsam eine neue Substanz, einen viel stärkeren Gerbestoff, zu bilden, als das Hämatoxylin für sich ist, indem diese Verbindung, welche Chevreul wegen ihrer Farbe die kastanienbraune Substanz nennt, die Gallerte viel stärker niederschlägt, und die in kochendem Wasser gemachte Auflösung sich auch eben so beim Erkalten trübt, wie die kochend gemachte Auflösung der adstringirenden Substanzen. Chevreul schließt daraus, daß die Eigenschaft, die Gallerte niederzuschlagen, wohl eben nicht immer einem einfachen Grundstoffe zukommen, sondern sich vielleicht in manchen Fällen erst durch die Verbindung zweier Stoffe mit einander, namentlich eines Farbestoffs mit einem an sich in Wasser unauflöslichen Stoffe, entwickeln möchte.

Nach Chevreul enthält das Campecheholz folgende Bestandtheile: ein flüchtiges Oel; Hämatoxylin; einen eigenthümlichen rothbraunen Gerbestoff; kleberartige Materie, und einige Salze, als essigs. Ammoniak, Kali und Kalk, kleesaur. Kalk, salzs. und schwefels. Kali, Alaunerde, Kieselerde, Mangan- und Eisenoxyd.

Das Campecheholz wird selten als adstringirendes Mittel in der Abkochung oder im Extracte verordnet; letztere Form ist wohl die zweckmäßigste. Häufiger wird es in der Färberei zum Schwarz- und Blaufärben gebraucht. Es nimmt auch eine schöne Politur an. Man bereitet ferner daraus die gewöhnliche rothe Tinte, zu deren Bereitung aber gewöhnlicher das Fernambukholz (von Caesalpinia echinata Lamarck) genommen wird. Hagen giebt folgende gute Vorschrift hierzu: 4 Unzen des besten Fernambukholzes und 2 Loth gestoßener Alaun werden mit 32 Unzen Regen- oder Flußwasser gekocht, bis die Hälfte davon übrig bleibt. In der warmen Colatur werden arabisches Gummi und Zucker, von jedem 2 Loth, aufgelöst.

Eine schwarze englische Patenttinte wird nach folgender Vorschrift bereitet: Campecheholz und Galläpfel von jedem 2 medicinische Pfunde, Granatschalen 4 Unzen, grüner Vitriol ein med. Pfund, Gummi arabicum 8 Unzen, Wasser ein Gallon. (1 engl. Gallon ist gleich 8 Pinten, jede Pinte ist gleich 16 Unzen.)

* Linaria. Das Kraut. Leinkraut.

Antirrhinum Linaria Linn. Das gemeine Leinkraut, Löwenmaul, Harnkraut.

Linaria vulgaris Loes.

Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 2. Angiospermia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 7. Scrophulariae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst in ganz Deutschland und wird auch überhaupt durch ganz Europa, auf sandigem Boden, auf Mauern und an angebauten trocknen Orten gefunden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0590-7

Die Wurzel ist lang, zart und weiß. Es entstehen aus derselben mehrere Stengel, welche aufrecht, rund, wenig ästig, auch einfach sind, und eine Höhe von 1 — 1½ Fuß erreichen. Nicht selten kommt diese Pflanze mit niederliegendem Stengel vor, so daß bloß die blühenden Aeste in die Höhe gerichtet sind. Die abwechselnden, stiellosen Blätter, wovon die untern zuweilen drei- oder vierzählig, sind lancettförmig, gleich breit, ganz ungetheilt, lang zugespitzt, aufrecht, glatt, oben von dunkelgrüner Farbe, unten blässer, und stehen gedrängt. Die gelb und weiß bunten, stiellosen oder kurzgestielten Blüthen liegen dachziegelförmig über einander, und bilden an der Spitze des Stengels gleichsam eine Aehre. Der Gaumen derselben ist goldgelb und langhaarig, der Kelch einblättrig, fünftheilig, die Blumenkrone einblättrig und rachenförmig, die Oberlippe zweispaltig und zurückgeschlagen. Die Unterlippe dreispaltig und stumpf, der Gaumen erhaben, zweitheilig, meistens den Schlund verschließend. Am Grunde der Blumenkrone befindet sich ein gerader, spitziger Sporn. Die Frucht ist eine zweifächerige vielsaamige Kapsel.

Die Blüthezeit ist Juni bis August.

Zum officinellen Gebrauche wird die ganze Pflanze mit Blättern und Blüthen eingesammelt. Sie besitzt einen unangenehmen bitterlichen Geschmack, und frisch etwas widrigen Geruch, der aber beim Trocknen vergeht. Es wird nur noch zum Unguentum Linariae benutzt. Die Blumen scheinen einen guten Farbestoff zu besitzen, der zum Färben des Leinens und der Wolle anwendbar seyn soll.

Linum. Das Oel. Leinöl.

Wird durch Auspressen aus den Saamen von **Linum usitatissimum Linn.**, einer einjährigen Saatpflanze Europas, bereitet.

Ein fettes, braungelbes Oel, von = 0,930 — 0,940 spec. Gew. Man sehe darauf, daß es nicht ranzig sey.

Linum. Der Saame. Leinsaame.

Eiförmige, zusammengedrückte, sehr glatte, glänzende, braune Saamen.

Linum usitatissimum Linn. Der gemeine Flachs oder Lein.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 5. Pentagynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 21. Caryophylleae. (Fam. affinis.)

Diese allgemein bekannte einjährige Pflanze findet sich in mehreren Gegenden Deutschlands, und in einigen anderen Ländern des südlichen Europas hin und wieder wild auf Wiesen und Aeckern; sie wird sehr häufig angebaut.

Die dünne, fast einfache, mit einigen Seitenfasern versehene Wurzel treibt einen aufrechten, einfachen, dünnen, glatten, runden, oben ästigen, 1 — 2 Fuß hohen Stengel. Die aufsitzenden zerstreuten Blätter sind glatt, bläulichgrün, schmal, lancettförmig, spitz und zolllang. Die ziemlich großen

schön hellblauen Blumen stehen an der Spitze der Aeste auf fadenförmigen einfachen Stielen und verblühen in einem Tage. Der bleibende Kelch ist fünfblättrig, eben so die trichterförmige Blumenkrone. Die Frucht besteht in einer kugeligen, zugespitzten, fünflappigen, zehnfächrigen, oben aufspringenden und in jedem Fache einen Saamen enthaltenden Kapsel. Die Blüthezeit ist Juni und Juli, die der Saamenreife September.

Die Saamen sind eiförmig-länglich, an einem Ende etwas spitz, am andern stumpf, flach zusammengedrückt, bräunlich, sehr glatt, glänzend, mit einem scharfen Rande versehen, und enthalten einen weißen, ölig-schleimigen Kern. Sie sind geruchlos, haben einen unangenehm süßlichen und schleimigen Geschmack.

Der Schleim hat seinen Sitz in der Schale des Kerns, und ein Theil der unzerquetschten Saamen kann 16 Theile darauf gegossenes kochendes Wasser in einen ziemlich dicklichen, fadenziehenden, durchsichtigen Schleim verwandeln. Kaltes Wasser zieht den Schleim nicht aus.

Ueber die chemische Beschaffenheit dieses Schleimes hat Vauquelin (Schw. J. IX. S. 93.) Versuche angestellt, aus denen er folgerte, daß der Leinsaamenschleim und wahrscheinlich auch die übrigen Schleime größtentheils aus einer dem Gummi ähnlichen Substanz bestehen, weil sie mit Salpetersäure behandelt, wie jene, Schleimsäure geben, daß aber auch im Leinsaamenschleime und in einigen andern Arten ein Stoff von der Beschaffenheit des animalischen Mucus enthalten sey, weil nach Abscheidung der Schleimsäure, des schleims. und kleesaur. Kalkes, und der Kleesäure, eine größere Menge der gelben bittern Materie aus der Mutterlauge erhalten wurde, als wenn Gummi dazu angewandt worden wäre.

100 Th. Leinsaamen geben 15 Th. trocknen Schleim, dem Osmazom ähnlich. 100 Th. trocknen Schleims hinterließen bei der Destillation, wobei Essigsäure und Ammoniak übergingen, 29 Th. Kohle. Die entbundenen Gasarten enthielten keine gasförmige Blausäure. Das flüssige Product wurde mit Kalkpulver aus einer gläsernen Retorte destillirt, an deren Ende ein Stück mit Eisenoxyd imprägnirtes Papier befestigt, welches durch Säure blau gefärbt wurde; auch ging Ammoniak über. Die mit dem halben Gewichte Kali calcinirte Leinsaamenkohle gab durch Auslaugen und Sättigung mit schwacher Schwefelsäure und Verbindung mit schwefels. Eisenoxydul Berlinerblau, und zwar enthielten 100 Th. Kohle so viel Blausäure, um 2½ Th. Berlinerblau zu bilden. Die Schleimkohle enthielt kohlens., salzs., schwefels. und phosphors. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk und Kieselerde.

Der Leinsaamenschleim enthält eine freie Säure, die Vauquelin für Essigsäure hält. Der Stickstoff, welchen der Schleim enthält, scheint durchgängig in der ganzen Masse vertheilt zu seyn (daher sind vielleicht die Leinkuchen so nährend für das Vieh. John.), denn Vauquelin konnte eine besondere stickstoffhaltige Materie aus dem Schleime nicht abscheiden. Durch diesen reichlichen Stickstoffgehalt, welchem der Leinsaamenschleim wahrscheinlich seinen Geschmack, seine Zähigkeit, seine Milde beim Anfühlen, seine Ei-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0592-9

genschaft, das Wasser so beträchtlich zu verdicken, verdankt, weicht er von dem reinen Gummi sehr ab. Dem essigs. und vielleicht auch dem salzs. Kali verdankt wahrscheinlich der Leinsaamenschleim seine urintreibenden Eigenschaften.

Der Leinsaamenschleim enthält demnach: 1) eine gummige Substanz; 2) eine animalische Substanz, wahrscheinlich Mucus; 3) freie Essigsäure; 4) essigs. Kali; 5) essigs. Kalk; 6) schwefels. und salzs. Kali; 7) phosphors. Kali und Kalk; 8) Kieselerde.

Nach Bostock giebt ein Theil Leinsaamen mit 10 Th. Wasser angerieben einen Schleim von der Consistenz des Eiweißes, der sich mit Wasser in allen Verhältnissen mischen läßt, durch salpeters. (?) Gold, schwefels. Eisen, Kieselkalk, Galläpfeltinctur nicht verändert, und nur durch salpeters. Queckssilberoxydul schwach gefällt wird.

Der weiße Kern enthält neben schleimigem Extractivstoffe ein Oel, welches im Großen durch warmes Auspressen der Saamen gewonnen wird, daher es auch nicht ganz milde ist; es beträgt den fünften Theil der Saamen.

Hr. Leo Meier (Berl. Jahrb. XXVIII. 1. 1826. S. 71.) hat eine sehr ausführliche Analyse des Leinsaamens gegeben, und zwar in der Art, daß er die in der Oberhaut des Saamens, und die in dem Kerne enthaltenen Substanzen möglichst abgesondert darzustellen suchte. Vauquelin hatte von dem Schleime des Leinsaamens angegeben, daß er eine animalische Substanz, wahrscheinlich Mucus, enthalte. Eben so ist nach ihm die freie Essigsäure dem Leinsaamenschleime nicht eigenthümlich, sondern sie erzeugt sich erst durch längeres Verweilen an der Luft; denn die mit kaltem Wasser durch Schütteln des ganzen Saamens frisch bereitete Schleimlösung röthete nicht das Lackmuspapier, sondern erhielt erst später diese Eigenschaft.

1000 Gran trocknen Leinsaamens enthalten: Pflanzenschleim mit freier Essigsäure, essigs. Kali, phosphors. Magnesia, phosphors. Kalkerde, schwefels. und salzs. Kali und essigs. Kalkerde, nebst dem Verluste bei der ganzen Analyse, 151,20; süßen Extractivstoff mit freier Aepfelsäure, äpfels. Kali, schwefels. Kali und salzs. Natrum, 108,84; Stärke mit salzs. Talkerde, Gyps und Kieselerde 14,80; Wachs 1,46; Weichharz 24,88; orangegelben extractiven Farbestoff, dem Gerbestoffe nahe verwandt, 9,26; orangegelben extractiven Farbestoff, dem Gerbestoffe nahe verwandt, mit salzs. Kalk, salzs. und salpeters. Kali, 9,91; Gummi mit vieler Kalkerde 61,54; Pflanzeneiweiß 27,82; Kleber 29,32; fettes Oel 112,65; harzigen Farbestoff 5,50; Emulsin und Hülsen 443,82.

Der Schleim, die Stärke, das Wachs, das Weichharz, der orangegelbe extractive Farbestoff und der harzige Farbestoff gehören nur allein der äußern Saamenhaut an; dem letztern verdankt sie größtentheils ihre Farbe. Der Kern besteht aus Gummi, Pflanzeneiweiß, Kleber, fettem Oele, süßem Extractivstoffe, Emulsin und Salzen. Der süße Extractivstoff scheint seinen Sitz sowohl in der äußern Saamenhaut als auch im Kerne zu haben.

Der zerstoßene Leinsaamen wird zu erweichenden Breiumschlägen verord-

net, und leistet da ganz vorzügliche Wirkung und Linderung; auch wird er wohl zu Gurgelwassern, Klystieren, zum Thee ꝛc. benutzt.

Daß der Bast des Stengels der Pflanze zu Leinen und Papier verarbeitet wird, ist bekannt.

Das auf den Oelmühlen ausgepreßte Leinöl ist bräunlichgelb, etwas dickflüssig, hat einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch und Geschmack. Bei — 4 ° wird es etwas blässer, ohne seine Consistenz zu verändern. Es trocknet leicht an der Luft. Wird es eine Zeitlang gekocht, so wird es dunkelbraun, zähe, dickflüssig und trocknet jetzt noch leichter (Buchdruckerfirniß). Erhitzt man es mit $\frac{1}{16}$ Glätte, so ist es der gewöhnliche Leinölfirniß.

Wenn man das Leinöl mit Weingeist digerirt, so röthen die alkoholischen Auszüge schwach Lackmuspapier, und besitzen den Geruch und Geschmack des Leinöls. Zugesetztes Wasser macht sie milchig, und es scheidet sich ein weißes, beim Trocknen bräunlich werdendes Harz aus; aus der überstehenden Flüssigkeit wird durch Abdampfen ein rothgelber extractiver Farbestoff erhalten (vergl. **Semen Lini**). Die Farbe des Leinöls ist also größtentheils diesen beiden Materien zuzuschreiben, von denen auch der ekelhafte Geschmack des Oeles herrühren möchte, denn das Harz schmeckt kratzend, der extractive Farbestoff hingegen herbe bitter. Seinen Geruch verdankt das Leinöl einem mit dem Farbestoffe verbundenen Riechstoffe, der so wenig flüchtig ist, daß er sich in der Siedehitze des Wassers nur schwer verflüchtigen läßt.

Dieses Leinöl wird nur äußerlich angewandt.

Lithargyrum. Ein Bleioxyd. Bleiglätte.

Wird sehr häufig bei der Reinigung des Silbers erhalten.

Kleine rothgelbe, glänzende, schwere Schuppen, aus Blei und Sauerstoff bestehend. Es sey nicht mit Kupfer verunreinigt, welches in der mit Salpetersäure gemachten Auflösung auf den Zusatz von Aetzammoniakflüssigkeit, so daß sie vorwaltet, an der blauen Farbe erkannt wird, und deßwegen ist das schlesische vorzuziehen.

Dieses Bleioxyd wird als Nebenproduct bei dem Abtreiben des silberhaltigen Bleierzes, oder bei der Reinigung des Silbers, um die demselben beigemischten fremden Metalle zugleich mit dem zugesetzten Bleie zu oxydiren, erhalten, und zwar in so bedeutender Menge, daß ein großer Theil des oxydirten Bleies wieder reducirt wird. Die hierbei erhaltene Bleiglätte ist daher mit Kupfer, Eisen, Silber, und Kieselerde verunreinigt, und nie so rein, als die aus reinem Blei durch eigene Operationen in Schlesien, Kärnthen ꝛc. dargestellte. Das bei dem Zutritte der Luft oxydirte und über dem geschmolzenen Silber eine flüssige Schicht bildende Blei fließt durch einen an dem obern Theile der Kapelle gemachten Ausschnitt ab, und wird in einem besondern Gefäße aufgefangen, wo die Masse beim Erkalten undurchsichtig wird, und sich in glimmerartige Blättchen zertheilt. Oder: das gelbe Bleioxyd

(Massicot) wird bis zum Schmelzen erhitzt, und die ganze zusammengebackene Masse in großen Klumpen auf einen eigenen Heerd außerhalb des Ofens gebracht, wo sie beim langsamen Erkalten in mehr oder weniger freie glimmerartige Schuppen sich blättert. Je länger das gelbe Bleioxyd dem Luftzuge ausgesetzt bleibt, ehe es zum Schmelzen gebracht wird, ein je größerer Theil desselben daher vor dem Schmelzen schon in rothes Bleioxyd verwandelt ist, desto röther wird die Glätte; je eher dagegen nach der Oxydation das Schmelzen eintritt, desto blässer oder gelber fällt die Glätte aus. Die röthliche heißt im Handel Goldglätte (Chrysitis), die gelbe, Silberglätte (Argyritis). Die Glätte fällt unter übrigens gleichen Verhältnissen um so schöner aus, je reiner von andern Metallen, vorzüglich von Kupfer und Eisen, das dazu verwendete Blei ist, und je weniger sie Gelegenheit findet, während des Schmelzens sich mit Erden und andern fremdartigen Stoffen zu verunreinigen.

Die Bleiglätte ist, wie aus dem Obigen erhellt, ein Gemenge aus gelbem und rothem Bleioxyd, Massicot und Mennige, das schon in anfangende Verglasung übergegangen ist. Sie besteht aus 92,83 Blei und 7,17 Sauerstoff. Wenn die Bleiglätte alt wird, verliert sie etwas an Glanz, weil sie mit der Zeit Kohlensäure und Wasser aus der atmosphärischen Luft absorbirt, und sich mit einer Rinde von basisch kohlens. Blei und Bleihydrat überzieht, daher sie dann beim Auflösen in Säuren aufbraust. Sie bildet mit den Säuren meist farblose, auflösliche, süß und zusammenziehend schmeckende Salze. Mit den fettigen Substanzen geht sie wahre chemische Verbindungen ein, und wird daher vorzüglich zur Bereitung der Bleipflaster benutzt. Hierzu muß eine reine Bleiglätte ausgesucht werden, denn ein Kupfergehalt ist wahrscheinlich die Ursache, daß das Pflaster gefärbt ausfällt, welches mit reiner Bleiglätte sehr weiß wird.

Reine Bleiglätte löst sich in Salpetersäure auf, und in dieser Auflösung muß überschüssig zugesetztes Aetzammoniak, nach Fällung des Bleioxyds, keine blaue Farbe annehmen. Da das Blei mit der Schwefelsäure ein unauflösliches Salz bildet, so kann auch die salpetersaure Auflösung durch Glaubersalz gefällt werden, in welchem Falle die überstehende, salpetersaures Natron haltende Flüssigkeit auf den Zusatz von Ammoniak Eisenoxyd fallen läßt, wenn die Glätte Eisen enthielt, oder eine blaue Farbe annimmt, wenn sie mit Kupfer verunreinigt war, welches auch von Blutlaugensalz mit rother Farbe niedergeschlagen wird.

Man zieht die englische Bleiglätte im Allgemeinen der deutschen vor, da erstere kein Kupfer und nur eine Spur von Eisen enthält.

Lupulus. Die Zapfen. Hopfen.

Humulus Lupulus femina Linn. Eine ausdauernde in Deutschland wildwachsende und auch angebaute Pflanze.

Die bräunlichgelben Zapfen, mit häutigen, eine körnige, har-

zige Materie eingesprengt enthaltenden Schuppen, von bittrem nicht unangenehmen Geschmacke, und gewürzhaftem Geruche.

Humulus Lupulus Linn. Der gemeine Hopfen.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 5. Pentandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Diese allgemein bekannte Pflanze wächst wild an Hecken, in Gebüschen und Wäldern, wird aber auch, jedoch nur die weibliche Pflanze, sehr häufig angebaut. Sie rankt sich an andere Körper, und wird an 12—15 Fuß hoch. Die Blätter sind gegenüberstehend, gestielt, handförmig getheilt, mit 3—5 gezähnten Lappen, ungefähr von der Gestalt der Weinblätter, rauh anzufühlen und mit breiten, häutigen, aufrechten, gestreiften, an der Spitze bisweilen zweispaltigen Nebenblättern. Die weiblichen Blüthen bilden eine Art kugeligen Köpfchens von der Dicke einer Erbse, welches einzeln, gestielt und achselständig ist. Es besteht aus einer großen Anzahl blattartiger, schwach behaarter Schuppen, in deren Achseln sich zwei weibliche, aufsitzende Blüthen befinden. Die auf andern Individuen befindlichen männlichen Blüthen bilden in den Achseln der obern Blätter unregelmäßig verzweigte Trauben. Die Früchte sind eine Art von häutigen, eiförmig-länglichen Zapfen (Strobili s. Coni Lupuli), deren dünne und ausdauernde Schuppen am Grunde zwei kleine Schließfrüchte enthalten. Diese sind von einem körnigen, gelben, harzigen Staube umgeben. Diese Zapfen werden Ende Augusts oder Anfang Septembers eingesammelt; sie besitzen einen angenehmen, aromatischen, etwas betäubenden Geruch, einen bittern, etwas erwärmenden, nicht unangenehmen Geschmack, und sind um desto kräftiger und besser, je klebriger sie sich anfühlen, je mehr harzigen Staub sie enthalten, und je stärker ihr Geruch und Geschmack ist. Zur Zeit der Fruchtreife ist nämlich die untere Fläche der Schuppen mit einer großen Menge kleiner Körnchen bedeckt, welche nach Planche aus dem Staube der Staubfäden abgesondert werden sollen. Diesen Staub nennt man auch das Hopfenmehl. Die Zapfen, aus denen das Mehl schon ausgefallen, und welche in der Hand gerieben nicht kleben und anhängen, sind untauglich.

Raspail hat gefunden, daß das Hopfenmehl nichts anderes als ein Organ, eine Drüse des Hopfens ist, oder vielmehr ein hohles Gefäß, welches sehr große Aehnlichkeit mit den Staubbeuteln hat, und so wie diese auf dem Wasser platzt. Dieses Hopfenmehl, von dem amerikanischen Arzte Yves mit dem Namen Lupulin belegt, befindet sich nicht bloß auf den Schuppen der weiblichen Blumen dieser Pflanze, sondern auch häufig auf allen jungen Blättern und Trieben derselben, und fällt in dem Maße ab, als das Blatt groß wird. Man braucht, um sich hiervon zu überzeugen, kein Vergrößerungsglas, man darf nur die jungen Blätter und Triebe auf einem Siebe trocknen, und dann das Sieb beuteln, und man wird verhältnißmäßig eben so viel Lupulin davon erhalten, als von den Zapfen. Diese Entdeckung, wichtig in der Pflanzenphysiologie, ist auch in technischer Hinsicht bemerkenswerth, wegen

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0596-3

der Anwendung des Lupulins zum Brauen. Auch haben die jungen Blätter und Triebe ganz den Hopfengeruch.

Durch Absieben der Zapfen erhält man das Hopfenmehl, Lupulin. Es ist goldgelb, körnig, hat einen gewürzhaften, starken, etwas narkotischen Geruch und einen aromatisch kräftig bittern Geschmack. Es ist das Wirksame in dem Hopfen als Stärkungs- und antiscorbutisches Mittel in der Medicin, und was dem Biere den eigenthümlichen Geschmack und die verdauende Kraft ertheilt, das Sauerwerden desselben verhindert, im Uebermaße aber narkotisch wirkt. 10 Th. Lupulin stehen 100 Th. Hopfen gleich. Um die Kosten des Transports zu mindern, könnte das Lupulin aus dem frischen Hopfen abgesondert werden, wogegen der davon größtentheils entblößte Hopfen, der jedoch noch immer einen Antheil Lupulin enthalten wird, da wo er gebaut wird, verbraucht werden könnte. Nach Yves's Angabe giebt der Hopfen 10 Procent, nach Payen und Chevallier nicht über 6 Procent Lupulin, was wohl nach Verschiedenheit des Jahres, des Klimas und des Erdbodens variiren möchte.

Planche (Trommsd. N. J. VII. 1. S. 201.) vindicirt für sich die Entdeckung des Lupulins als wirksamen Bestandtheils des Hopfens, und theilt die Resultate der Analyse des Dr. Yves mit, welcher in 120 Gran Lupulin fand: ein riechendes Princip; Gerbestoff 5; ausziehbaren Stoff 10; bittern Grundstoff 10; Wachs 12; Harz 36; faserigen und holzigen Ueberrest 46.

Payen und Chevallier (Ebend. S. 169.) erhielten ein ätherisches Oel, das einen penetranten, scharfen Geruch, wie das Lupulin hatte, und sehr scharf in der Kehle kitzelte. Es ist sehr flüchtig, löst sich zum großen Theil in Wasser auf, und ist leichter als Wasser; es verharzt sich nachher im Hopfen, weswegen dieser durch langes Liegen an Kraft verliert. Die Schärfe rührte von Ammoniak her, das zum Theil an Essigsäure gebunden war. Als Ergebnisse der Analyse von 200 Grammen Lupulin geben sie an: Wasser; ätherisches Oel; Kohlensäure, unvollkommen essiggesäuertes Ammoniak; Spuren von Osmazom; Spuren eines fetten Stoffes; Gummi; Aepfelsäure; äpfels. Kalk; einen bittern Stoff von weißlicher Farbe, der in Wasser, Alkohol und Aether auflöslich, die Thätigkeit der Verdauungsorgane aufhob und die Eßlust vernichtete, ohne narkotisch zu seyn, wie das Oel; ein goldgelbes bitteres Harz; Kieselerde; Spuren von kohlens. Salzen; salzs. und schwefels. Kali; kohlens. und phosphors. Kalk; Eisenoxyd und Spuren von Schwefel.

Die Verfasser zerlegten auch den französischen Hopfen und fanden: Wasser; flüchtiges Oel; überessigs. Ammoniak; Kohlensäure; einen weißen vegetabilischen Stoff in kochendem Wasser auflöslich, der aber, wenn er durch Abkühlung niedergeschlagen war, nicht minder in kochendem Wasser sich auflösen ließ; äpfels. Kalk; Eiweißstoff; Gummi; Aepfelsäure; ein Harz; einen besondern grünen Stoff; den bittern Grundstoff des Hopfens; einen fettigen Stoff; Chlorophyll; essigs. Kalk und Ammoniak; salpeters., salzs. und

schwefels. Kali; unvollkommen kohlengesäuertes Kali; kohlen- und phosphors. Kalk, Spuren von phosphors. Magnesia; Schwefel; Eisenoxyd und Kieselerde.

Das Lupulin (Ebend. S. 342.) ist als aromatisch, tonisch und narkotisch zugleich wirkendes Mittel empfohlen worden in den Fällen, wo man von dem Opium keine Anwendung machen kann, und zu seiner Anwendung empfiehlt sich vorzüglich die Tinctur (Tinctura Lupuli) nach folgender Vorschrift: eine Unze zerquetschtes Lupulin und zwei Unzen rectificirter Weingeist werden 6 Tage hindurch digerirt, worauf man zu der ausgepreßten und durchgeseihten Flüssigkeit noch so viel Weingeist hinzuthut, daß das Ganze 3 Unzen ausmacht. Auch sind noch Vorschriften zu Lupulin-Pillen, Extract, Syrup und Pomade gegeben. Die letztere, aus 1 Unze Lupulin mit 3 Th. Schweinefett 6 Stunden lang im Marienbade im verschlossenen Gefäße digerirt und colirt, soll im letzten Stadium des Krebses besonders gegen die oft so heftigen Schmerzen ein treffliches Mittel seyn.

Auch die Zapfen theilen die Eigenschaften des Lupulins, und sind schon früher im Gebrauche gewesen.

Lycopodium. Der Saame. Bärlappsaame. Streupulver.

Lycopodium clavatum Linn. Ein in den Wäldern Deutschlands häufiges Farrnkraut.

Ein sehr feines gelbliches Pulver, mit Wasser nicht mischbar, an der Flamme mit einem Blitze sich entzündend, die Saamen der Pflanze darstellend. Es muß nicht verwechselt werden mit dem Blumenstaube der Fichten und anderer Bäume, welcher leichter in kleine Kügelchen zusammengeht.

Lycopodium clavatum Linn. Das gemeine Bärlappen- oder Kolbenmoos. Johannesgärtel. Mörsemau.

Linn. Cl. XXIV. Cryptogamia. Ord. Filices.

Juss. Cl. I. Ord. 4. Musci. (Lycopodiaceae).

Diese ausdauernde Pflanze wird häufig in ganz Deutschland angetroffen, in bergigen, moosigen Wäldern und sandigen Heiden.

Die Wurzel ist schwach, fast spindelförmig und mit vielen haarförmigen Fasern versehen. Die Stengel sind dünn, hart, oft über 10 Fuß lang, ästig, mannigfach gekrümmt, breiten sich auf der Erde aus und schlagen hier und da Wurzeln. Die Aeste sind aufsteigend. Die zahlreichen, kleinen, stiellosen, zerstreuten Blätter sind linienförmig, kurz, sehr schmal, von etwas gelblichgrüner Farbe, dicht über einander liegend, und an der Spitze mit einer feinen Borste versehen. Am Ende jedes Astes erhebt sich ein gerader, fast nackter, beinahe 3 Zoll langer, mit kleinen pfriemenförmigen Schuppen bedeckter Stiel, welcher sich gewöhnlich in zwei aufrechte, cylindrische, zu-

weilen auch in drei, seltner in eine weißgelbliche, 1—2 Zoll lange mit Schuppen besetzte Aehre endigt. Diese Schuppen enthalten in ihren Achseln kleine aufsitzende, gelbliche, fast nierenförmige Kapseln, die sich elastisch in 2 oder 3 Klappen öffnen, aus denen eine Menge gelblichen Staubes hervorkommt.

Die Blüthezeit ist Juli und August; die Einsammlung des Saamens geschieht vom August bis September, ehe sich die Behältnisse öffnen.

Dieser Saamenstaub (Klopfpulver, Blitzpulver, Hexenmehl) ist in seinen kleinsten Theilen kugelrund, blaßgelb, äußerst zart und leicht, weich und fettig anzufühlen, sich an die Finger anhängend, nicht mit Wasser mischbar, und ohne Geruch und Geschmack. Auf glühende Kohlen gestreut, verbrennt und verraucht dieses Pulver langsam, aber in eine Lichtflamme geblasen oder geworfen entzündet es sich augenblicklich und mit einigem Geräusche.

Der Blüthenstaub vom Nußbaum, von Tannen und Fichten, welcher bisweilen statt des Bärlappsaamens eingesammelt wird, ist nicht so fein, hat ein schmutzig-dunkelgelbes Ansehen, und der von Tannen und Fichten besitzt einen nicht unangenehmen Harzgeruch. Eine Verfälschung mit Puder und andern leichten mit Kurkume gefärbten Pulvern wird theils durch die größere Schwere, theils durch den mit heißem Wasser entstehenden Kleister, theils durch die mit Kaliauflösung entstehende rothgelbe Farbe entdeckt. Zerfallener Kalk und Talk sind schwerer und sinken in Wasser zu Boden. Schwefel giebt auf glühenden Kohlen Schwefelgeruch und mit Aetzlauge gekocht Schwefelleber; auch wurmstichiges Holzmehl hat man untergemischt gefunden.

Wird der Bärlappsaamen auf Wasser geworfen, so bleibt er auf demselben schwimmend und ein durch denselben hindurch ins Wasser gesteckter Finger wird nicht naß. Wenn man die Flüssigkeit umrührt, so fällt nach Versuchen von Cadet ein Theil desselben zu Boden; bei dem Erwärmen sinkt alles zu Boden, das Wasser nimmt einen besondern Geschmack an, und enthält eine ziemliche Menge Schleim, welcher nach dem Abdunsten eine gallertartige Consistenz, dem des isländischen Mooses ähnlich, annimmt. Alkohol dringt augenblicklich durch den Bärlappsaamen durch, und das Pulver fällt zu Boden. In der Wärme erhält man eine Tinctur, die durch Wasser getrübt wird. Die mit Wasser gemischte und gefällte geistige Tinctur giebt ein Extract, welches Zucker enthält, der durch den Geschmack und die Gährungsfähigkeit mit Bierhefen erkannt wird. Aether wird von dem Bärlappsaamen grünlichgelb gefärbt, mit Alkohol und Wasser vermischt fällt Wachs nieder.

Bucholz (Gehlen's J. VI. S. 573.) erhielt als Bestandtheile des Bärlappsamens in 100 Th.: fettes Oel 6,0; Zucker 3,0; schleimiges Extract 1,5; Pollenin 89,5. So nennt Bucholz nämlich den eigenthümlichen Pflanzenstoff, welcher nach dem Ausziehen des Pollens mit Wasser, Weingeist und wäßrigem Kali übrig bleibt, und der immer einen Hauptbestandtheil des männlichen Saamenstaubes der Pflanzen auszumachen scheint. Das Pollenin ist ein gelbes, leichtes, zartes, geruch- und geschmackloses, sehr brenn-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0599-2

bares Pulver, welches bei der trocknen Destillation außer den gewöhnlichen Gasen (dem kohlensauren und dem Kohlenwasserstoffgase) brenzliges und ammoniakhaltiges Oel, Wasser mit essigs. Ammoniak und eine schwer einzuäschernde Kohle giebt, in der Lichtflamme blitzähnlich verbrennt, mit Salpetersäure ein eigenes, in Weingeist lösliches fettes Oel liefert, und in Wasser, wäßrigen, ätzenden und kohlensauren Alkalien, Weingeist, Aether und Terpenthinöl unauflöslich ist, und sich vom Kleber, Eiweißstoffe, Stärke u. s. w. sehr unterscheidet.

Der Bärlappsaame muß zum pharmaceutischen Gebrauche durch Absieben von den etwanigen Unreinigkeiten befreit werden. Er wird selten innerlich verordnet, als gelind diuretisches Mittel; häufiger ist sein Gebrauch zum Bestreuen der wundgeriebenen Stellen bei Kindern, und zum Bestreuen der Pillen, um das Zusammenkleben zu verhüten.

Macis. Muskatenblüthe.

Myristica moschata Linn. Ein Baum der molukkischen Inseln.

Die zerschlitzten Saamendecken der Muskatennuß, von zimmtartig brauner Farbe, von sehr gewürzhaftem, angenehmen Wohlgeruche und Geschmacke.

Myristica moschata Linn. Der ächte Muskatennußbaum.
Myristica aromatica Roxb.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 13. Monadelphia.
Juss. Cl. IV. Ord. 6. Laurineae.

Dieser schöne Baum findet sich ursprünglich auf den molukkischen Inseln, besonders auf den Bandainseln. Durch Poivre wurde er 1770 und 1772 nach Isle de France gebracht, und man baut ihn auch seit längerer Zeit in Cayenne und auf den Antillen an. Auf Sumatra, wohin 1803 Muskatennußbäume von Roxburgh von neuem gebracht wurden, indem die früher verpflanzten nicht fortkamen, wuchsen allein um Fort Marlborough im Jahre 1814 101,911 Stück. Der Baum wächst sehr schnell, erreicht eine Höhe von 30 Fuß und drüber, und bringt schon im 5—6ten Jahre Früchte, welche erst im 9ten Monate nach der Blüthe reifen. Ein 15 Jahr alter Baum giebt 5 Pfund Muskatennüsse und ¼ Pfund Macis.

Der Stamm ist gerade, mit einer glatten braunrothen oder schmutzig olivengrünen Rinde bedeckt. Die Aeste sind dicht gedrängt, so daß der Baum einem Orangenbaume ähnlich ist. Die Blätter sind abwechselnd, kurz gestielt, elliptisch, auf beiden Seiten glatt, oben grün, unten blaß. Die Blüthen stehen in den Blattwinkeln, die männlichen in zweitheiligen Träubchen, die weiblichen einzeln. Der Kelch ist einblättrig, krugförmig mit dreizahnigem Saume. Die Blumenkrone fehlt. Die Steinfrucht ist rundlich-birnförmig, fleischig und etwas wollig, mit einer Naht bezeichnet; sie ist einfächrig, zweiklappig. Die rundlich-eiförmige Nuß ist am Grunde der Frucht befestigt, mit einem gelben, vielspaltigen, lederartigen Arillus (Macis) bedeckt, und

mit Furchen bezeichnet, die der Theilung des Arillus entsprechen, übrigens ziemlich hart, glatt und von dunkelbrauner Farbe. Der Saamenkern ist von der Gestalt der Nuß und an ihrer Spitze befestigt. Der Embryo liegt am Grunde des Eiweißkörpers und besteht aus einem kleinen zweispaltigen Körperchen, welches zwischen zwei fleischig-mehligen, zusammengerollten, wohlriechenden und aromatischen Kotyledonen ruht.

Die Saamendecken (Arillus), zwischen der äußern fleischigen Schale und der Nuß befindlich, sind unter dem unpassenden Namen Muskatenblüthe (Macis) officinell. Sie haben eine zimmtbraune, ins Gelbliche fallende Farbe, einen eigenthümlichen, starken, sehr aromatischen Geruch, und einen angenehmen, sehr gewürzhaften, etwas bitterlich-scharfen Geschmack. Man wählt vorzüglich die noch ganzen, dünnen, biegsamen Hüllen, welche eine lebhafte Farbe, und einen durchdringenden Geruch und Geschmack besitzen. Durch Einwirkung des Lichts und der Feuchtigkeit bleicht die Farbe sehr aus. Es werden jährlich etwa 100,000 Pfund nach Europa gebracht.

Henry (Trommsd. N. J. X. 2. S. 60.; Berl. Jahrb. XXVI. 2. 1825. S. 71.) behandelte die Macis im Papinianischen Digestor mit siedendem Aether, welcher dadurch eine gelbliche Farbe und einen lieblichen gewürzhaften Geruch erhält. Durchs Verdampfen erhielt er eine flüssige ölige Materie im Rückstande, die einen sehr gewürzhaften Geruch, einen etwas scharfen Geschmack und eine röthlichgelbe Farbe besaß. Durch siedenden starken Weingeist wird sie in zwei ölige Materien geschieden; die eine bleibt ungelöst in Gestalt gelblicher Klümpchen, welche in einem Fläschchen zusammengeschmolzen beim Erkalten eine feste, undurchsichtige, fahlgelbe Masse bilden, die einen aromatischen Geruch besitzt, und sich bei der Temperatur des siedenden Wassers nicht verflüchtigt. Die andere wird durch den starken Weingeist gelöst, bleibt beim Verdampfen desselben zurück, hat eine feste Form, ist durchsichtig, besitzt eine röthlichgelbe Farbe, einen gewürzhaften, der vorigen Materie ähnlichen Geruch, und ist auch nicht flüchtiger als jene.

Die durch mehrmaliges Sieden mit Aether ausgezogene Macis wurde im Papinianischen Digestor mit starkem Weingeiste behandelt, welcher nur wenig gefärbt wurde, und nach dem Verdunsten eine sehr kleine Menge eines röthlichbraunen Extractes gab, das einen schwach gewürzhaften Geruch und einen scharfen Geschmack besaß, sich zum Theil in Wasser löste, und übrigens nichts Bemerkenswerthes zeigte.

Die von Aether und Weingeist ausgezogene Macis wurde in demselben Gefäße mit siedendem Wasser behandelt, wobei nichts weiter, als die häutige Materie der Macis zurückblieb. Die Abkochungen opalisirten, hatten eine schleimige Consistenz, die durchs Abrauchen immer dicker wurde, einen süßlichen, einer verdampfenden Gummilösung gleichenden Geruch, und waren ganz geschmacklos. Nach dem völligen Verdampfen blieb eine trockene zerbrechliche Materie, die alle physischen Eigenschaften des Gummis besaß. Sie ist ohne Geruch, zieht die Feuchtigkeit der Luft nicht an, ist unlöslich in starkem Weingeiste, schwillt im Wasser auf, löst sich demnächst darin, und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0601-4

ertheilt ihm eine ähnliche Klebrigkeit wie das Gummi. Die Lösung zersetzt sich, wenn man sie sich selbst überläßt, nicht leicht. Durch andere chemische Eigenschaften nähert sich diese Materie dem Stärkemehle (Salpetersäure erzeugt Sauerkleesäure, Schwefelsäure wandelt sie in eine zuckerige, trockene, in Weingeist und Wasser lösliche Materie ꝛc.), unterscheidet sich jedoch davon durch ihr Verhalten gegen die Jodtinctur, mit welcher sie, statt einer blauen, eine schön purpurfarbene Lösung bildet. Am meisten nähert sie sich der Amidine. (Vergl. S. 64.).

Durch Destillation der Macis mit Wasser erhält man ein etwas opalisirendes Wasser, das einen sehr gewürzhaften, dem des Terpenthinöles sich nähernden Geruch, und einen etwas gewürzhaften Geschmack besitzt. Auf der Oberfläche desselben schwimmt eine kleine Menge ungefärbten Oeles, und am Boden des Gefäßes befinden sich einige Tropfen eines andern Oeles.

Nach dieser Analyse enthalten die Macis: 1) eine kleine Menge flüchtigen ungefärbten Oeles (16 Unzen Macis geben ein halbes Loth Oel); 2) eine größere Menge eines gelben, riechenden, nicht flüchtigen Oeles, welches löslich in Aether und unlöslich in siedendem starken Weingeiste ist; 3) eine ungefähr gleiche Menge eines andern riechenden, nicht flüchtigen, rothen Oeles, welches in Aether und starkem Weingeiste in allen Verhältnissen löslich ist; 4) eine eigenthümliche gummige Materie, die mit dem Amylum und dem Gummi übereinstimmende Eigenschaften zeigt, jedoch darin vorzüglich abweicht, daß sie mit Jodtinctur statt der blauen eine schöne purpurfarbene Lösung bildet. Diese Materie macht wenigstens den dritten Theil des Gewichts der Macis aus; 5) eine kleine Menge Faserstoff.

Henry hält dafür, daß der Weingeist zur Ausziehung unzureichend sey, und man den Schwefeläther anwenden müsse, wenn man ein flüssiges Arzneimittel wünscht, welches alle ölige Theile der Macis aufgelöst enthalten soll. Gewöhnlich wird bis jetzt aber die geistige Tinctur oder auch das Pulver verordnet. Häufiger ist der Gebrauch als Gewürz.

Macis. Das Oel. Muskatenblüthöl.

Wird durch Destillation aus der Macis in Ostindien bereitet.

Ein ätherisches, dickliches, gelbliches, wohlriechendes Oel, von dem Geruche der Macis. Spec. = 0,948.

In diesem Oele erzeugen sich (ähnlich wie bei andern ätherischen Oelen), wie Wiegleb bemerkt hat, nach längerer Zeit gelbliche, durchsichtige Krystalle, die dem Candiszucker ähnlich sind, an der Lichtflamme brennen, in Weingeist, Terpenthin- und Mandelöl nur in der Siedehitze löslich sind, beim Erkalten sich wieder ausscheiden, und nur in einer großen Menge kochenden Wassers aufgelöst werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0602-0

Magnesia carbonica venalis. Carbonas magnesicus cum aqua ven. Käufliche kohlensaure Bittererde. Magnesia. Wird in chemischen Fabriken aus der schwefelsauren Magnesia bereitet.

Ein erdartiges Salz, zusammenhängend, sehr zerreiblich, abfärbend, sehr leicht, weiß, in Wasser fast unauflöslich, aus Magnesia und Kohlensäure bestehend. Sie sey rein und nicht mit kohlensaurer Kalkerde verunreinigt, welche durch kleesaure Kaliflüssigkeit aus der Auflösung der Magnesia in Salpetersäure niedergeschlagen werden kann. Der kohlensauren Magnesia zugemischtes kohlensaures Kali oder Natron werden durch Uebergießen mit heißem Wasser, welches vorzüglich das kohlensaure Kali oder Natron auflöst, durch Verdampfung und wiederholte Lösung in einer kleinen Menge Wasser erkannt.

Dieses Salz wird fast gar nicht mehr in den Apotheken bereitet, sondern meistentheils in Fabriken aus der schwefelsauren oder salzsauren Bittererde vermittelst kohlensauren Kalis oder Natrons gewonnen. Am vortheilhaftesten geschieht die Bereitung, wo man die salzsaure Talkerde als Nebenproduct bei den Salinen gewinnt. Gewöhnlich wird der noch feuchte Niederschlag in oblonge Formen gegeben, und durch Aussetzen an der Luft oder schwache Wärme getrocknet. Diese Stücke knacken beim Zerbrechen, und erregen zwischen den Fingern gerieben das Gefühl, welches der Puder erregt, ohne sich sandig zu zeigen.

(Vergl. Magnesia carbonica im 2ten Theile.)

Magnesia sulphurica cruda seu Sal amarus crudus. Sulphas magnesicus cum aqua crudus. Rohe schwefelsaure Bittererde oder rohes Bittersalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken, wie auch der Salzwerke aus der gemeinen Salzlauge.

Ein Salz in kleinen prismatischen, glänzenden, weißen, in zwei Theilen Wasser auflöslichen, in der Luft ein wenig matt werdenden Krystallen, von bitterm Geschmacke, aus Magnesia, Schwefelsäure und Wasser bestehend. Verwerflich ist das mit Kupfer und Eisen verunreinigte, was an der Farbe zu erkennen ist. Wenn es mit salzsaurer Magnesia gemischt ist, so wird es der Luft ausgesetzt feucht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0603-6

Der erste Entdecker dieses Salzes war der Engländer Nehemias Grew. Er schied dasselbe zuerst im Jahr 1695 aus dem Wasser des Brunnens zu Epsom durchs Verdunsten aus. Später wurde es als ein Bestandtheil mehrerer Quellen Englands, der Mutterlauge des Meersalzes, und dann allmälig auch in vielen deutschen Salzquellen aufgefunden, als vorzüglich wirksamer Bestandtheil der sogenannten Bitterwässer, als des Saidschützer- und Seidlitzer Wassers. (Das Saidschützer Bitterwasser enthält in 16 Unzen: Bittersalz 274$\frac{1}{5}$ Gran; schwefels. Natron 5$\frac{10}{25}$; schwefels. Kalk 5$\frac{16}{25}$; salzs. Bittererde 7$\frac{20}{25}$; kohlens. Bittererde 5$\frac{2}{25}$; kohlens. Kalkerde 1$\frac{86}{100}$; Harzstoff $\frac{58}{125}$ Gran und kohlens. Gas 2$\frac{27}{100}$. Das Seidlitzerwasser enthält: Bittersalz 104 Gran; schwefels. Kalk 8 Gr.; salzs. Bittererde 3 Gr.; kohlens. Bittererde 3 Gr.; kohlens. Kalkerde 8 Gran.). Es wittert auch in manchen Höhlen, in den Klüften der Schweizeralpen, in Bergwerksstollen, wie auch aus manchen Mauern aus. In einer großen Kalkhöhle, unweit Jeffersonville in Nordamerika wittert eine ungeheure Menge Bittersalz aus, und ersetzt sich nach dem Abkratzen in 4—5 Wochen wieder. Die aus mildem Gneus erbauten Stadtmauern von Freiberg in Sachsen blühen alle Sommer von ausgewittertem Bittersalze. In der Quecksilbergrube von Idria bildet das ausgewitterte Bittersalz unter dem Namen Halotrichon oder Haarsalz einen langhärigem Pelzwerke ähnlichen Ueberzug.

Man gewinnt dieses Salz durch Verdampfen der natürlichen Bitterwässer und durch Krystallisation, und es führt dann auch wohl die Namen der Wässer, aus welchen es bereitet worden, als Saidschützer-, Seidlitzer- und Epsomersalz. Um das Salz möglichst frei von Mutterlauge zu erhalten, wird die Krystallisation der abgedunsteten Lauge durch Umrühren gestört, und so erhält man dasselbe nur in kleinen Krystallen, in welcher Form es immer im Handel vorkommt. Dieses hält häufig etwas Glauberfalz, und dann verwittert es beträchtlich. Man gewinnt dieses Salz aber auch aus der Mutterlauge der Seesalzsiedereien, welche salzsaure Bittererde enthält, die durch Zusatz von Schwefelsäure oder bis zur Röthe calcinirtem Vitriol in schwefelsaure Magnesia und salzsaures Eisen umgewandelt wird; dem herauskrystallisirenden Salze hängt aber gewöhnlich noch etwas salzsaure Bittererde an, wodurch es an der Luft feucht wird. Werden schwefelkieshaltige Talkschiefer, nachdem sie geröstet worden und durch einige Zeit an der Luft verwittert sind, ausgelaugt, so wird auch hier, indem der Schwefel hierbei durch Oxydation in Schwefelsäure umgeändert worden, welche sich nur mit der Talkerde (Magnesia) verbindet, schwefelsaure Talkerde erhalten, welche aber häufig etwas kupfer- und eisenhaltig ist, wegen des Gehalts der Talkschiefer an Kupfer- und Eisenkies.

Das käufliche Bittersalz muß vor dem Gebrauche einer Reinigung unterworfen werden auf die bei **Magnesia sulphurica depurata** im 2ten Th. anzugebende Weise.

Majorana. Das Kraut. Majoran.

Origanum Majorana Linn. Eine einjährige Pflanze des mittägigen Europas und des Orients, in Gärten angebaut.

Ein gewürzhaftes Kraut mit viereckigem Stengel, entgegengesetzten, kurzgestielten, eiförmigen, stumpfen, ganzrandigen, dünnfilzigen, kleinen Blättern, fast kugelförmigen Aehren, und rundlichen filzigen Nebenblättern. Im Monat Juli einzusammeln.

Origanum Majorana Linn. Der Majoran.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Majoran, im südlichen Europa, z. B. Portugal, einheimisch, wird bei uns als eine beliebte Gewürzpflanze in Gärten angebaut.

Die Wurzel ist faserig, braun, ziemlich fest und fast holzig. Der Stengel wird 1—1½ Fuß hoch; er ist undeutlich viereckig, am Grunde braun und holzig, übrigens aber weichhaarig und sehr ästig. Die Aeste stehen kreuzweis aufrecht, und nehmen gegen die Spitze hin sehr an Länge ab. Die graulichgrünen Blätter sind mit einem sehr kurzen zarten Haarüberzuge bekleidet; die obern sind fast sitzend. Die Blüthen stehen in zahlreichen, eiförmigen, stumpfen, dichten Aehrchen, die gewöhnlich zu dreien an allen Endspitzen der Aeste und Aestchen erscheinen. Der Kelch besteht aus zwei Blättchen von ungleicher Größe; die Blumenkrone ist trichterförmig, zweilippig, weiß, die Oberlippe zweispaltig, die Unterlippe dreispaltig.

Das Kraut, welches mit den blühenden Spitzen eingesammelt wird, hat einen starken, angenehm aromatischen Geruch und Geschmack. Die Wirksamkeit desselben liegt hauptsächlich im ätherischen Oele. 16 Unzen trocknes Kraut geben ungefähr 2 Drachmen gelbliches ätherisches Oel. Der wäßrige Auszug hat den kräftigen aromatischen Geruch, einen bitterlichen Geschmack, eine röthliche Farbe, die durch die schwefelsaure Eisenauflösung ins Olivengrüne verändert wird. Die geistige Tinctur ist dunkelgrün, von einem scharfen aromatischen Geschmacke.

Der Majoran wird äußerlich zu Umschlägen gebraucht, dann dient er zur Bereitung des ätherischen Oeles, der Majoransalbe, würde auch ein wirksames destillirtes Wasser und infundirtes fettes Oel geben.

Malva. Die Blätter. Pappelkraut. Käsepappelkraut.

Malva rotundifolia Linn. Eine ausdauernde an unbebauten Orten Deutschlands sehr häufige Pflanze.

Langgestielte, herzförmige, cirkelrunde, fast fünflappige, mit abgerundeten, scharf gekerbten Lappen, ein wenig haarige, schleimige Blätter. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0605-8

Malva rotundifolia Linn. Die rundblättrige Malve. Käsepappel. Gänsepappel. Hasenpappel. Katzenkäse.

Linn. Cl. XVI. Monadelphia. Ord. 8. Polyandria.

Juss. Cl. XIII. Ord. 14. Malvaceae.

Die Wurzel dieser sehr häufigen Pflanze ist dünn, faserig, weiß und spindelförmig. Die Stengel sind weichhaarig, ästig, 1—1½ Fuß lang, niedergestreckt, bisweilen aufrecht. Die Blätter wie oben, die Blüthen sind klein, blaßroth mit purpurfarbigen Adern bezeichnet, zuweilen auch weiß. Der Kelch ist doppelt. Die Blumenkrone besteht aus fünf umgekehrt herzförmigen Blättern. Die Frucht ist eine rundliche Kapsel mit kleinen schwarzen Saamen.

Die Pflanze blüht im Juni bis September.

Die officinellen Blätter dieser Pflanze haben eine schmutzig dunkelgrüne Farbe, sind geruchlos, und wie alle Theile dieser Pflanze schleimig. Sie werden bisweilen verwechselt mit den Blättern der Waldmalve (Malva sylvestris siehe Malva vulgaris), welche aber, so wie die ganze Pflanze, weit größer sind, sich übrigens hinsichts der Wirkung wohl schwerlich unterscheiden, da bei beiden der schleimige Bestandtheil der vorwaltende ist. Sie dienen zu erweichenden Umschlägen. Das Infusum der Blätter ist jedoch nicht schleimig, es wird von schwefels. Eisen schwarz gefärbt.

Malva arborea. Die Blüthen. Stockrosen. Rosenpappelblumen.

Althaea rosea Cavanilles. Eine zweijährige orientalische, in den Gärten Deutschlands häufig angebaute Pflanze.

Die mit Schleim begabten Blumen, mit gemeiniglich schwarzbraunen, fünfblätterigen, an der innern Seite mit der Säule der Staubfäden verbundenen, ohngefähr 2 Zoll langen Kronen, mit doppeltem filzigem Kelche, der äußere vieltheilig, der innere fünfspaltig.

Alcea rosea Linn. Stockrosen-Eibisch. Herbstrose. Rosenpappel.

Linn. Cl. XVI. Monadelphia. Ord. 8. Polyandria.

Juss. Cl. XIII. Ord. 14. Malvaceae.

Diese Pflanze verträgt auch sehr gut unser Klima, und ist durch die Schönheit ihrer Blumen eine Zierde unserer Gärten geworden.

Sie treibt eine weiße lange Pfahlwurzel. Der beblätterte Stengel erhebt sich zu einer Höhe von 5—10 Fuß, und ist einfach, aufrecht, stark, dick, rund, etwas eckig und rauh. Die Blätter sind groß, abwechselnd, gestielt, breit, grün, wellenförmig, gelappt und gekerbt. Die Blumen sind groß, rosenförmig geöffnet, oft doppelt, nach der Varietät von verschiedenen Farben, meistens purpurfarbig oder weiß gestreift, stehen auf kurzen Stielen in den Winkeln der obern Blätter, und bilden durch ihre Annäherung eine

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0606-3

lockere lange Aehre, welche den Stengel endigt. Der Kelch ist doppelt und bleibend; beide einblättrig, der äußere sechs-, der innere fünfspaltig. Die Krone besteht aus fünf umgekehrt herzförmigen, abgebissenen, flachen, dem Staubfadenrohre eingefügten Blumenblättern. Die Frucht besteht aus einer scheibenförmigen, vielfächerigen Kapsel; jedes Fach ist einsaamig.

Die Herbstrose blüht im Juli; die Blumen fangen an unten zu blühen, und die Blüthe dauert bis spät in den Herbst. Die Saamen reifen im September bis October.

Zum Arzneigebrauche wählt man diejenigen Blumen, die eine dunkelrothe Farbe haben, weil sie etwas adstringirender sind. Sie besitzen einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas salzig zusammenziehenden Geschmack, und werden in gelinder Abkochung bisweilen zu Gurgelwässern verordnet.

Malva vulgaris. Die Blüthen. Malvenblüthen.

Malva sylvestris Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands, an ungebauten Orten häufig.

Die schleimigen Blumen, mit doppeltem Kelche, der äußere dreiblättrig, mit fünfblättrigen, an der inneren Seite mit der Säule der Staubfäden verbundenen, beinahe einen Zoll langen, bläulichen, geaderten Blumenkronen.

Malva sylvestris L. Die wilde oder Waldmalve.
Linn. Cl. XVI. Monadelphia. Ord. 8. Polyandria.
Juss. Cl. XIII. Ord. 14. Malvaceae.

Die Wurzel dieser sehr gemeinen Pflanze ist dick, einfach, weißlich, mit wenigen Fasern besetzt; sie treibt mehrere meistens aufrechte, ästige, haarige Stengel, von 1—2 Fuß Höhe und darüber. Die Blätter sind abwechselnd, sehr lang gestielt, nierenförmig, rundlich, mit 5—7 seichten, sehr stumpfen, gekerbten Lappen; zwei eiförmige, spitze, gewimperte, fast ganzrandige Nebenblätter sind am Grunde jedes Blattstiels befindlich. Die purpurfarbenen Blüthen stehen zu 3—5 in den Blattachsen auf langen, dünnen, walzenrunden Stielen. Der Kelch ist doppelt; der äußere besteht aus drei schmalen Blättchen; der innere ist glockenförmig, halb fünftheilig, mit spitzen Lappen. Die Krone wird von fünf verkehrt herzförmigen, oben ausgerandeten, und unten in einen mit der Substanz der Staubfadenröhre verbundenen Nagel endigenden Blumenblättern gebildet. Die Frucht besteht aus einer Menge kleiner einsaamiger Gehäuse, welche kreisförmig vereinigt um eine gemeinschaftliche Achse stehen.

Die Blumen sind als schleimige Mittel nur noch wenig im Gebrauch. Es werden auch wohl die Blumen von der rundblättrigen Malve gesammelt, welche kleiner und blaßroth, übrigens von gleicher Wirksamkeit sind. Die Farbe der Blumen ändert sich beim Trocknen in Blau um.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0607-9

Payen und Chevallier haben auf die außerordentliche Empfindlichkeit des in diesen Blumen enthaltenen Farbestoffes gegen Alkalien aufmerksam gemacht. Man kann dazu das mit dem ausgepreßten Safte gefärbte, oder noch besser, das mit der geistigen Tinctur (aus Alkohol und getrockneten Blumenblättern) bereitete Papier anwenden. Die violette Farbe verliert sich beim Erwärmen mit Alkohol beinahe gänzlich; die Tinctur und das damit getränkte Papier, erscheinen beinahe ungefärbt, verändern sich aber durch alkalische Auflösungen sogleich in ein schönes Grün. Dieses Reagens soll auch Schwefelalkalien und schwefligsaure Salze anzeigen, daher es bei Prüfung der Potasche und Soda anwendbar ist, wenn vorher ihr freies und kohlensaures Alkali mit Schwefelsäure neutralisirt worden ist. Die Tinctur zeigte sich sehr bedeutend empfindlicher, als das damit getränkte Papier; erstere ist so empfindlich, daß sie von einer Auflösung, die 0,000,005 Kali enthält, noch verändert wird. Wird der geistige Auszug abgedunstet, so nimmt er wieder eine schöne violette Farbe an, und es sondert sich dabei eine gelbe fettige Materie ab, die auf der Flüssigkeit schwimmt.

Die rothe Farbe der Pflanzentheile ist, nach der Angabe der Herren Payen und Chevallier, immer der in den Pflanzen vorhandenen Essig- oder Kohlensäure zuzuschreiben, wogegen die blaue oder grüne von anwesendem Ammoniak oder einem andern Alkali herrührt. Wenn z. B. die Malvenblumen ihre rothe Farbe beim Trocknen in Blau umändern, so ist anzunehmen, daß die Blumen ihre chemische Beschaffenheit ändern, daß die natürliche rothe Farbe durch frei werdendes Ammoniak in Blau umgeändert ist, und daß durch Abstumpfung dieses Ammoniaks die erstere natürliche Farbe wieder hervorgerufen werde.

Manganum oxydatum nativum. Manganesium. Superoxydum manganicum. Graubraunsteinerz. Braunstein.

Ein aus Bergwerken ausgegrabenes Mineral.

Ein dichter und strahliger, etwas glänzender, grauschwarzer Stein, sehr abschmutzend, schwer, aus Mangan und Sauerstoff, welchen er, in einem verschlossenen Gefäße geglüht, in Gasform reichlich ausgiebt, und aus verschiedenen fremdartigen erdigen Stoffen, vorzüglich kohlensaurer Kalkerde gemischt.

Der Braunstein ist als Mineral schon früh bekannt gewesen, aber seine Zusammensetzung blieb bis zu Scheele's Zeiten unbekannt. Scheele beschrieb es 1774 als eine eigene Erde, die sich in mehreren verschiedenen Verhältnissen mit dem brennbaren Gase verbinden könnte, und Gahn bewies später, daß diese Erde zu Metall reducirt werden könnte, dem Mangan (Magnium auch Manganesium genannt). Es hält den Sauerstoff außerordentlich stark zurück, und seine Reduction erfodert eine äußerst strenge und anhaltende

Hitze. Das reguliniſche Mangan hat eine ins Graue fallende Silberfarbe, dem des harten Gußeiſens ähnlich, und es giebt in feuchter Luft, oder wenn es mit feuchten Fingern berührt wird, einen unangenehmen Geruch. Es hat einen ſchwach metalliſchen Glanz und einen feinkörnigen Bruch. Es iſt weniger hart als Gußeißen, und läßt ſich feilen, iſt ſpröde, und läßt ſich zu einem eiſengrauen metalliſch-glänzenden Pulver zerreiben. Sein eigenthümliches Gewicht iſt = 8,013. Vom Magnete wird es nicht gezogen, erlangt indeſſen dieſe Eigenſchaft durch einen ſehr geringen Eiſengehalt.

Dieſes Metall kommt dem metalliſchen Radical der Alkalien in ſeinen Eigenſchaften ſehr nahe, ſowohl in Anſehung ſeiner ſtarken Verwandtſchaft zum Sauerſtoffe, als der Beſchaffenheit ſeiner Oxyde; es bildet alſo den Uebergang von dieſen zu den Metallen. Es oxydirt ſich ſowohl in freier Luft, als im Waſſer, und iſt alſo eben ſo ſchwer in metalliſcher Form zu verwahren, als Kalium und Natrium, am beſten unter rectificirtem Steinöle.

Von dem Mangan kennen wir vier verſchiedene Oxydationsſtufen, wovon 2 Oxyde ſind, die dritte ein Hyperoxyd, und die vierte eine Säure iſt; außerdem giebt es noch, analog dem Eiſen, eine Verbindung von Oxyd mit Oxydul.

a) Manganoxydul iſt dasjenige Oxyd, welches hauptſächlich die Baſis der Mangansalze ausmacht. Es iſt dunkel graugrün, und oxydirt ſich allmälig an der Luft. Aus ſeinen Salzen wird es durch Aetzkali weiß niedergeſchlagen, Oxydulhydrat, fängt aber durch Oxydirung auf Koſten der Luft augenblicklich an, ins Braune überzugehen. Das Oxydul beſteht aus 78,06 Mangan und 21,94 Sauerſtoff; oder 100 Th. Mangan nehmen darin 28,11 Sauerſtoff auf.

b) Manganoxyd. Es iſt ſchwarz von Farbe, oder, wenn es in einer Flüſſigkeit niedergeſchlagen und vertheilt iſt, dunkelbraun. Zu den Säuren hat es eine ſchwache Verwandtſchaft, aber es kann in einigen aufgelöſt werden, wobei es dunkelgefärbte Auflöſungen giebt. Es beſteht aus 70,34 Metall und 29,66 Sauerſtoff; oder 100 Metall nehmen 42,16 (= 28,11. 1½) Sauerſtoff auf.

c) Manganhyperoxyd. Braunſtein. Es iſt das ſchwarze Foſſil, durch deſſen Glühen in verſchloſſenen Gefäßen wir auf die leichteſte Art Sauerſtoffgas erhalten. Das Hyperoxyd wird bei dieſer Operation zu Oxyd, oder bei ſtärkerem Feuer zu Mangan-Oxydoxydul verwandelt.

Bisweilen kommt es rein vor, am gewöhnlichſten aber iſt es mit andern Mineralien, z. B. Flußſpath, Manganoxydhydrat, Eiſenoxydhydrat ꝛc. mechaniſch gemengt. Ueber die verſchiedenen Arten Braunſtein haben wir einen belehrenden Aufſatz von Leop. Gmelin in Geiger's Magazin, Januar 1826. S. 3.

α) Weichmangan. Schwach geſchoben vierſeitige Säulen, meiſtens zu ſtrahligen und faſrigen Maſſen zuſammengewachſen; weich und oft ſtark an Finger und Papier abfärbend. In Maſſe eiſenſchwarz mit ſchwachem Metallglanze, in Pulver ſchwarzgrau. Es wird vorzüglich bei Krettnich im Saarbrückenſchen gebrochen und nur in kleiner Menge in Ilefeld. Es giebt das

meiste Sauerstoffgas, und zwar nur im Anfange mit sehr wenig kohlens. Gase gemengt. Ganz rein besteht es aus: Mangan 64,01; Sauerstoff 35,99, oder 100 Th. Mangan nehmen 58,33 (= 28,11 . 2) Sauerstoff auf, also 2mal soviel als im Oxydul.

β) Das gewöhnliche Ilefelder Graubraunsteinerz, Weichmangan. Ist etwas härter als α, und färbt nicht ab. In Masse stahlgrau mit starkem Metallglanze, in Pulver braun. Giebt mehr Wasser und etwas weniger Sauerstoffgas als α.

γ) Hartmangan, oder dichter Braunstein. Derb, glasritzend und am Stahle Funken gebend. In Masse eisenschwarz mit geringem Glanze, in Pulver rothbraun. Enthält so viel Kohlenstoff, daß es fast bloß kohlens. Gas und erst am Ende des Processes etwas Sauerstoffgas ausgiebt.

δ) Schwarzmangan. Selten vorkommend in gelbkörnigen Massen. In Masse eisenschwarz mit mäßigem Metallglanze, in Pulver rothbraun. Giebt nur eine Spur Sauerstoffgas.

ε) Das Wad ist von diesen Braunsteinarten so sehr durch seine Lockerheit und Farbe unterschieden, daß die genauere Bezeichnung überflüssig seyn möchte.

Das Manganhyperoxyd wird unter Entwickelung von Sauerstoffgas von den Säuren zersetzt, wobei es in der Kälte zu Oxyd, in der Wärme aber, unter Entbindung von noch mehr Sauerstoffgas, zum Oxydul reducirt wird, während die Säuren damit Oxydulsalze bilden. Daher die größere Ausbeute an Sauerstoffgas, wenn der Braunstein mit dem gleichen Gewichte concentrirter Schwefelsäure in einer gläsernen Retorte übergossen und erhitzt wird. Werden vegetabilische oder animalische Stoffe, z. B. Zucker, Weinsäure oder Oxalsäure, zu einem Gemenge des Hyperoxyds und einer Säure gesetzt, so werden diese vom Sauerstoffe des Hyperoxyds zerstört, und dieses wird ohne Entwickelung von Sauerstoffgas zu Oxydul reducirt. Schwefelige und salpetrige Säure werden durch Aufnahme von Sauerstoff in Schwefel- und Salpetersäure verwandelt, und lösen es dann auf.

d) Mangansäure. Wenn Manganoxyd bei gelinder Hitze mit Salpeter (2 Th. Salpeter und 1 Th. Braunstein) oder mit kaustischem Alkali in einem offenen Gefäße geschmolzen wird, so erhält man eine schon seit längerer Zeit bekannt gewesene Verbindung, der man den Namen mineralisches Chamäleon gegeben hat, weil ihre Auflösung oft ohne sichtbare Ursachen die Farbe von Grün durch Violett zu Roth wechselt und endlich farblos wird. Diese Verbindung bildet sich nun, wenn das Glühen bei Luftzutritte geschieht, wobei Sauerstoffgas aufgenommen wird. Ist überschüssiges Alkali (die Salpetersäure des Salpeters wird nämlich beim Glühen zersetzt und verflüchtigt) vorhanden, so erhält man eine geschmolzene schöne grasgrüne Masse; nimmt man eine größere Menge Manganoxyd, so erhält man statt einer grünen Masse eine ganz schwarze, welche sich mit einer schön purpurrothen Farbe in Wasser auflöst, und aus welcher Auflösung man durch Abdampfen purpurrothe Krystalle erhält. Diese Krystalle sind ein neutrales Salz, von Kali

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0610-4

mit Manganſäure, welche letztere jedoch ganz rein darzuſtellen bis jetzt nicht gelungen iſt, weil ſie ſich gleich zu Mangan-Oxydoxydul zerſetzt. Frommherz (Schweigg. N. J. XI. S. 257. und XIV. S. 327.) hat ſie in einer Zuſammenhäufung von kleinen nadelförmigen dunkel carminrothen Kryſtallen erhalten, die aber ſelbſt bei gewöhnlicher Temperatur der Luft zerſetzt werden; ſie verlieren nämlich ihr Waſſer, und mit dieſem auch einen Theil ihres Sauerſtoffes. Die Manganſäure beſteht aus 58,73 Mangan und 41,27 Sauerſtoff, oder 100 Th. Metall nehmen darin 70,267 Th. (= 23,11 . 2½) Sauerſtoff auf, ſo daß die Sauerſtoffmengen in den bekannten Oxydationsſtufen des Mangans ſich verhalten wie 2, 3, 4 und 5. Die waſſerhaltige Säure enthält 8½ Procent Waſſer, deſſen Sauerſtoff ¼ von dem der Säure beträgt. Die Sättigungscapacität der Manganſäure iſt 8,254 oder ⅛ von ihrem Sauerſtoffgehalte (41,27 : 5.).

Das Manganhyperoxyd, der Braunſtein, wird häufig zu chemiſchen Zwecken angewandt, nämlich zur Bereitung des Sauerſtoffgaſes, des Chlors (vergl. die Anweiſung zur Prüfung des Manganoxyds vor ſeiner Anwendung zur Chlorbereitung von Gay-Luſſac in Buchn. Repert. XIX. S. 430.) und der Chlorverbindungen; auch iſt es mit Schweinefett zur Salbe gemacht äußerlich angewandt worden. Es dient ferner zu verſchiedenen techniſchen Zwecken, zur Amethyſtfarbe der Glasflüſſe, zum Mahlen auf Fayence und Porcellan; bei den Glashütten bedient man ſich deſſelben, um die gelbgrüne Farbe, von den eiſenhaltigen Materialien herrührend, wegzunehmen (das ſchwarze Eiſenoxydul wird dadurch in gelbes Eiſenoxyd verwandelt). Dieſe Wirkung des Manganoxyds, welches daher auch früher Glasſeife, **Magnesia Vitriariorum**, genannt wurde, war ſchon in älteren Zeiten bekannt. Der Braunſtein wird auch dem Waſſer zugemiſcht, um dieſes auf Seereiſen gegen das Verderben zu ſchützen, wobei einige Pfunde für jedes Faß hinreichend ſeyn ſollen.

Manna. Manna.

Ein aus der verwundeten Rinde des **Fraxinus rotundifolia Aitoni**, eines in Calabrien und Sicilien häufigen Baumes, tröpfelnder, erhärteter Saft.

Weiße und weißgelbliche bröckliche Klumpen (oder weiße röhrige Stücke), zerreiblich, durch die Wärme der Hand zu erweichen und etwas klebrig, in drei Theilen Waſſer, in Weingeiſt nur zum Theil auflöslich, von ſüßem Geſchmacke, und honigartigem Geruche. Vorzuziehen iſt die ſogenannte **Manna electa** oder **cannulata**, die in gemeinhin röhrigen Stücken vorkommt. Sie ſey nicht gar zu ſehr mit fremdartigen Stoffen, die bei der Auflöſung in Waſſer erkannt werden, verunreinigt.

Die Manna ist bisher nur auf den Pflanzen der südlicheren Länder ausschwitzend, und zwar vorzugsweise auf den zur Gattung Fraxinus (Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 2. Dioecia. Juss. Cl. VIII. Ord. 4. Jasmineae.) gehörenden Bäumen gefunden worden. Man gewinnt die Manna vorzüglich aus der angegebenen rundblättrigen und aus der schönen Esche (Fraxinus Ornus Linn.), die eine mäßige Höhe erreicht. Die beste Manna liefern die Bäume an der Nordseite der Berge, aber erst gegen das 10te Jahr. Die von selbst ausschwitzende Manna (Manna in lacrymis) ist weiß und trocken, kommt aber gar nicht in den Handel. Dieser Manna soll am nächsten kommen diejenige, welche in Menge dadurch ausschwitzt, daß Psyllen oder Kermesarten, deren es in Sicilien an den Eschen eine Menge giebt, die Oberhaut, die Zweige und Blätter der Bäume durchbohren (Manna foliata). Der größte Theil der Manna wird aber durch Einschnitte gewonnen. Im Juli und August nämlich macht man horizontale Einschnitte in die Rinde und sammelt den ausfließenden, klebrigen, wenig gefärbten Saft auf eingesteckten rauhen Blättern, auf welchen er bei der Sonnenwärme verdickt, und wodurch er eine röhrige Form, oder die Form von Stalaktiten erhält. Man verwahrt diese Manna erst an einem trocknen Orte, und versendet dieselbe hiernach als die feinste Gattung unter der Benennung Röhrenmanna, Manna cannellata s. cannulata. Sie besteht aus weißen, oder weißgelblichen, flachen oder etwas rinnenförmigen Stücken von 1—6 Zoll Länge und 1—1½ Zoll Breite; diese Stücke sind leicht, mürbe, trocken, aus mehreren Lagen zusammengesetzt; sie zeigen inwendig oft eine fadenartige Krystallisation, sind leicht auf der Zunge schmelzbar, und haben einen nicht unangenehmen, süßen, etwas schärflichen, nicht ekelhaften Geschmack, und einen nur schwachen, nicht widrigen Geruch.

Während der Monate September und October, wo die Atmosphäre weniger heiß und die Witterung öfters regnerisch ist, trocknet die dann ausfließende Manna nicht so schnell und nicht so vollständig ein; sie fließt am Baume herunter und wird schmutzig. Dieses ist die im Handel am häufigsten vorkommende Sorte, welche die calabrinische Manna, Manna calabrina, heißt. Sie besteht aus aneinander hängenden bröcklichen Stücken von verschiedener Größe und Gestalt, die noch viele kleine tropfenförmige Stücke durch eine weiche bräunliche, zusammenklebende Masse vereinigt enthalten, die theils trocken, theils auch etwas schmierig, und von theils schmutzig weißer oder gelblicher, auch etwas röthlicher Farbe, von einem süßlichschärflichen Geschmacke und honigartigem Geruche sind. Die aus Sicilien kommende Manna geht der aus Calabrien kommenden an Güte vor, und wird im Handel unter dem Namen Geracemanna (Manna Gerace) mehr geschätzt.

Im Monate November und zu Anfange Decembers fließt endlich die Manna bis zum Fuße des Baumes herab, und sammelt sich in einer kleinen Grube, welche man daselbst angebracht hat; sie stellt nur noch eine weiche, schmierige, mehr oder weniger unreine Masse dar, und ist die schlechteste Sorte Manna.

Die Manna soll bisweilen verfälscht vorkommen und besonders die Röh-

renmanna, durch ein Gemisch aus schlechter Manna, Zucker, Stärkemehl, Scammonium und Glaubersalz. Ein solches Kunstproduct wird aber sehr leicht daran erkannt, daß die Stücke sehr unregelmäßig geformt sind, daß sie auf dem Bruche nichts Krystallinisches zeigen, bei der Auflösung in Wasser einen merklichen Rückstand lassen, auch mit Weingeist digerirt sich nur zu einem geringen Theile auflösen. Die schlechtere Manna wird nachgekünstelt aus verdorbener Manna, Zucker, Honig und Mehl. Ein solches Gemengsel hat fast immer einen säuerlichen Geruch, einen sehr ekelhaften süßlichen Geschmack, und giebt durch Kochen mit Wasser eine dickliche Auflösung, die beim Erkalten gerinnt.

Die Manna kommt aber nicht ausschließlich auf den Eschen vor, sondern sie findet sich auch in vielen andern Pflanzen. So findet man zuweilen mannaartige Ausschwitzungen auf Citrus Aurantium, Juglans regia, mehreren Arten von Quercus, Salix, Prunus; Acer platanoides, Morus nigra, Ceratonia Siliqua, Ficus benghalensis, Phoenix dactylifera, Tilia europaea, Cistus ladaniferus, Hedysarum Alhagi, Heracleum sibiricum, verschiedenen Gras- und Carexarten u. s. w. Auch der Splint der Fichten enthält im Frühjahre eine süße Materie, von der man auch später im Sommer Spuren findet. Thiersch hat bemerkt, daß in warmen Sommern süße Tropfen durch die Rinden der Fichten sickern, die gestehen, und in welchen Bärwinkel Mannazucker fand. Ein ähnliches Erzeugniß ist die aus dem Lerchenbaume (Pinus Larix) ausschwitzende Briançoner Manna, die kleine weißliche Körner bildet, einen terpenthinartigen Geruch und süßen harzigen Geschmack besitzt. Hübner hat Mannastoff in der Selleriewurzel, Vogel auch in den Blättern der Sellerie nachgewiesen. Fourcroy und Vauquelin fanden den Mannastoff in den der Essiggährung unterworfen gewesenen Säften der Zwiebeln und Melonen, und da sie ihn nicht aus den frischen Säften abzuscheiden vermochten, so glaubten sie, daß er in diesen Fällen erst bei der Essiggährung gebildet worden sey. Braconnot erhielt ihn später auch aus gegohrenem Runkelrübensafte und Guibourt aus gegohrnem Honig. In allen diesen Säften ist jedoch der Mannastoff als präexistirend anzunehmen, und die Abscheidung desselben wird nur durch andere Bestandtheile, welche durch die Gährung zerstört werden, verhindert, da der Mannastoff selbst, auch unter den günstigsten Umständen, nicht der Gährung fähig ist, aus der gegohrnen Flüssigkeit also leichter und reiner abgeschieden werden kann.

Aus einem lehrreichen Aufsatze des Herrn Prof. Dierbach (Geiger's Magazin, Februar 1826. S. 97.) ersehen wir, daß zwar die Manna, sowie der Honig, stets vegetabilischen Ursprungs sey, daß aber der Honig als das Product einer gesunden und normalen, die Manna und der Honigthau dagegen als das Product einer kranken und gestörten Vegetation angesehen werden müsse. Damit sich nämlich Manna erzeugen könne, muß zuvor die Bildung eines andern süßen Pflanzenstoffes unterdrückt, die Blumen- oder Früchteentwickelung mehr oder weniger gehindert worden seyn. Die abgeson-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0613-2

derte Manna gehöre nicht mehr dem Pflanzenleben an, auch eile sie bald ihrer Entartung entgegen, und dies gäbe vielleicht Aufschluß, warum die Chemiker nur in gegohrnen Säften den Mannastoff finden konnten. Die häufige Erscheinung der Manna scheint übrigens an bestimmte klimatische Verhältnisse gebunden zu seyn, und diese nur vorzugsweise in den Stengeln und Blättern der Pflanzen sich zu erzeugen.

Fourcroy und Vauquelin (Gehlen's J. V. S. 357.) und Bucholz (Almanach 1809. S. 150.) haben die Manna analysirt, und auf einen eigenthümlichen süßen Stoff in denselben aufmerksam gemacht. Bucholz giebt folgende Bestandtheile in 100 an: Mannastoff 60; Schleimzucker, mit färbendem Stoffe, (purgirendem Bitterstoffe? Gmel.) 5,5; gummigen Extractivstoff 0,8; Gummi, etwas süßschmeckend, 1,5; faserigen kleberartigen Stoff 0,2; Wasser und Verlust 0,2. Nach Thenard besteht die Manna aus drei Bestandtheilen, nämlich aus Zucker, aus einem süßen krystallisirbaren und einem ekelerregenden unkrystallisirbaren Stoffe. Der Zucker wird in der Mannaauflösung durch eine vorsichtige Gährung zerstört. Um den zweiten Stoff zu erhalten, wird die gegohrene Flüssigkeit bis zur Trockne abgedunstet, und mit heißem Alkohol behandelt, welcher den Stoff beim Erkalten herauskrystallisiren läßt; durch Verdunsten des Alkohols aus dem keine Krystalle mehr anschießen, wird der unkrystallisirbare Stoff im Rückstande erhalten. An Zucker enthält die Manna den zehnten Gewichtstheil, der krystallisirbare süße Stoff, aus welchem die Röhrenmanna fast ganz besteht, scheidet aus der heißen gesättigten geistigen Auflösung in weißen, seidenartig glänzenden, nadelförmigen, zu sternförmigen rundlichen Häufchen vereinigten Krystallchen beim Erkalten aus; er zeigt sich in seinem übrigen Verhalten mit dem gewöhnlichen Zucker beinahe übereinstimmend, unterscheidet sich jedoch dadurch, daß er keiner Gährung fähig ist, welches auch von dem unkrystallisirbaren Zuckerstoffe gilt, welcher überhaupt nur ein veränderter Mannastoff zu seyn scheint, und von welchem die Manna desto mehr enthält, je schlechter sie ist. Diesen Mannazucker hat man mit dem Namen Mannastoff, Mannit, belegt. Nach Saussure besteht derselbe aus: Kohlenstoff 38,53; Wasserstoff 7,47; Sauerstoff 54,00.

Die Manna ist ein sehr gebräuchliches, gelind abführendes Arzneimittel, welches in der Auflösung verordnet wird.

Marrubium. Das Kraut. Weißer Andorn.

Marrubium vulgare Linn. Eine ausdauernde an ungebauten Orten Deutschlands häufige Pflanze.

Das blühende Kraut, mit viereckigem dicht filzigem Stengel, entgegengesetzten, die unteren gestielten, die oberen fast sitzenden, ovalen und rundlichen, an der Basis verdünnten, gekerbten, mehr oder weniger filzigen Blättern, quirlförmigen Blumen, zehnspal-

tigen Kelchen mit an der Spitze zurückgebogenen Zähnen. Im Monat Juli und August einzusammeln.

Marrubium vulgare Linn. Weißer Andorn.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese in Europa sehr häufige Pflanze wächst überall an Wegen, Zäunen und ungebauten Orten. Die Wurzel geht nicht tief in die Erde, ist zaserig und schwarz. Der aufrechte, viereckige, steife, harte Stengel ist mit einem weißen, unten besonders sehr häufigen Filze bedeckt, mit wenigen gegenüberstehenden Aesten versehen, und erreicht eine Höhe von 1—1½ Fuß. Die Blätter sind weich, ziemlich dick, kraus und runzlig, auf beiden Seiten weißlichfilzig, oben von etwas dunkelgrüner Farbe, einen Zoll und drüber lang. In den Blattwinkeln stehen die kleinen weißen Blumen in großer Zahl quirlförmig dicht beisammen. Der Kelch ist einblättrig, cylindrisch; die Krone einblättrig und rachenförmig, die Oberlippe fast aufrecht, zweispaltig, die Unterlippe zurückgebogen und dreilappig, die Seitenlappen sind spitz, der Mittellappen breit und eingeschnitten.

Blüthezeit Juni bis August.

Die blühende Pflanze hat frisch gerieben einen starken, balsamischen angenehmen Geruch, der sich beim Trocknen verliert. Der Geschmack ist bitter und etwas scharf salzig.

Verwechselungen mit Ballota nigra und Nepeta Cataria sind leicht zu vermeiden. Die Schwarzballote ist durchaus rauh, 3—4 Fuß hoch, blüht bläulichroth, und hat ein schwärzliches verblühtes Ansehen und einen eigenen widrigen Geruch. Die Blätter sind viel größer, mehr herzförmig, unten nicht weißwollig, und am Rande spitzig gezähnt. Die Blätter der Katzenminze sind zwar auf ihrer untern Fläche weißlich, aber mehr haarig als wollig; auch sind sie nicht eiförmig, sondern fast herzförmig und spitzig gezahnt; die ganze Pflanze besitzt einen starken münzeartigen Geruch.

Der weiße Andorn wird als zertheilendes und eröffnendes Mittel, vorzüglich nur in Extractform gebraucht. Nach Gleditsch kann er auch zur Lohe angewandt werden.

Marum verum. Das Kraut. Amberkraut. Katzenkraut.

Teucrium Marum Linn. Ein im Oriente wildwachsender, im südlichen Europa angebauter kleiner Strauch.

Das blühende gewürzhafte, wohlriechende Kraut, mit viereckigem Stengel, entgegengesetzten, länglichen und lancettförmigen, kurzgestielten, ganzrandigen, am Rande einwärts gebogenen kleinen, zugleich mit den Stielen und Aestchen mit einem weißen Filze überzogenen Blättern, und traubenartigen purpurfarbigen Blüthen. Im Sommer einzusammeln.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0615-3

Teucrium Marum Linn. Der Katzengamander. Mastixkraut.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Katzengamander, welcher ursprünglich in Syrien, Aegypten, Kandia, Griechenland, Spanien, besonders in Valencia, auch in Frankreich wächst, ist eine aufrechte, ästige, buschige Staude, die in jenen warmen Ländern 3—4 Fuß hoch wird, in andern europäischen Ländern hingegen, wo er in Gärten und Töpfen gezogen wird, kaum die Höhe eines Fußes erreicht. Sie dauert in Deutschland nur bei gelinden Wintern im Freien aus, behält die Blätter beständig und blüht im Juni und Juli.

Die Wurzel ist holzig und zaserig, der Stengel strauchartig, dünn, aufrecht, hart, etwas steif, sehr ästig und fein weißfilzig. Die Blätter sind sehr klein, auf der Oberfläche lebhaft grün, auf der Unterfläche weißfilzig. Die hellrothen kleinen Blumen wachsen in einseitigen Trauben an den Enden der Aestchen und Zweige. Der einblättrige Kelch ist röhrig, halb fünfspaltig; die Blumenkrone einblättrig und rachenförmig; die aufrechte Oberlippe zweispaltig, die Unterlippe dreispaltig.

Die blühende Pflanze hat einen durchdringenden, vermischt mastix- und campherartigen Geruch, und einen brennend und scharf gewürzhaften, bitterlichen, etwas campherartigen Geschmack. Das getrocknete Kraut muß in einem gut verschlossenen Glase aufbewahrt werden, damit das ätherische Oel, der vorzüglich wirksame Bestandtheil, sich nicht verflüchtige. Der wäßrige Aufguß ist röthlich, vom Geruche und Geschmacke der Pflanze, und wird durch schwefelsaures Eisen dunkelbraun. Der Weingeist zieht eine gelblichgraue Tinctur aus. Es wird als ein flüchtiges Reizmittel, im Aufgusse, in Pulver, auch als Schnupfpulver verordnet.

Der Geruch dieser Pflanze ist den Katzen so angenehm, daß sie dieselbe in Gärten nirgends stehen lassen.

Mastiche. Mastix.

Ein verdichteter Saft der Pistacia Lentiscus Linn., eines auf den Inseln des Archipels einheimischen Strauches.

Ein Harz in rundlichen, kleinen, halbdurchsichtigen, glänzenden Stücken, durch staubiges Abreiben unscheinbar, von weißlich-citronengelber Farbe, beim Kauen zähe, auf Kohlen geworfen einen angenehmen Geruch verbreitend, in Weingeist dem größten Theile nach auflöslich.

Pistacia Lentiscus Linn. Die Mastixpistazie.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 5. Pentandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Das Vaterland dieses Baumes ist Griechenland, und vorzüglich die Insel Chios, wo er sehr häufig angebaut wird, so daß daselbst wegen des Anbaues dieser Pflanze mehrere Dörfer Mastixdörfer heißen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0616-9

Der Stamm wird mit den aufrecht abstehenden Aesten ungefähr 10—12 Fuß hoch. Die Rinde ist rissig, dunkelgrau. Die Blätter sind immergrün, abstehend, abgebrochen-gefiedert, die Fiederblättchen klein, länglich, ganzrandig und stumpf. Die kleinen unansehnlichen Blüthen stehen in aufrechten kurzen zusammengesetzten Trauben in den Winkeln der Blätter.

Durch Querschnitte, die man gegen den August in die Rinde dieses Baumes macht, wird der Mastix gewonnen, und zwar auf Chios in so reichlicher Menge, daß sonst an den türkischen Sultan 300,000 Pfund als Tribut abgegeben wurden. Der Mastix besteht aus rundlichen, meist plattgedrückten Körnern oder Tropfen von verschiedener Größe, bis zur Größe einer Haselnuß, von außen ohne Glanz, etwas bestäubt, gelblich ins Grünliche spielend, durchscheinend, auf dem Bruche eben, von Glasglanz, hart, spröde, zerreiblich, von sehr angenehmen, balsamisch-süßlichem, jedoch nicht sehr starkem Geruche, und von schwach gewürzhaftem, kaum etwas zusammenziehendem Geschmacke. Spec. Gew. = 1,040. Unter den Zähnen wird er weich, geschmeidig und stellt dann eine vollkommen weiße, gleichsam wachsartige Masse dar. Das Pulver ist weiß.

Eine schlechtere Sorte Mastix (**Mastiche in sortis**) enthält nebst den eben beschriebenen auch Körner von auffallend grünlicher, auch bläulicher und schwärzlicher Farbe, mit Holzspähnen und andern fremden Beimischungen vermengt. Etwa beigemengte Sandarakkörner werden durch ihr sprödes Verhalten unter den Zähnen erkannt.

Runde (Berl. Jahrb. 1795. S. 142.) bestätigte die frühere Bemerkung Neumann's, daß der Alkohol nicht völlig den Mastix auflöse, denn es blieb eine weiße, zähe Masse im Rückstande, welche sehr schwer an der Luft austrocknete. Diese Masse, die man Masticin genannt hat, läßt sich in lange Fäden ziehen und ist in Schwefeläther, heißem absolutem Alkohol und Terpenthinöl auflöslich. Ein Tropfen dieser Auflösung auf Wasser getröpfelt verbreitet eine eben so farbenspielende Haut, als die Auflösung des Kautschuks, von dem sich aber das Masticin dadurch unterscheidet, daß es nach dem Schmelzen seine vorige Elasticität beibehält, die Durchsichtigkeit und Farbe des Mastix erhält, und beim Brennen keinen Gestank, sondern den angenehmen Geruch des Mastix verbreitet. Das Masticin, welches den zehnten Theil im Mastix beträgt, scheint überhaupt nichts weiter als ein etwas modificirtes Mastixharz zu seyn, denn trocknet man dasselbe, pulvert es und legt es einige Zeit an einen warmen Ort (wobei es vielleicht Sauerstoff aufnimmt?), so löst es sich dann ebenfalls auch in gewöhnlichem Alkohol auf. (Funke in Trommsd. J. XVIII. 2. S. 150. u. Brande in Berl. Jahrb. 1808. S. 110.)

Der Mastix wird nur zu andern zusammengesetzten Arzneimitteln, zum Räuchern und zu Firnissen gebraucht. In Griechenland und einem Theile des Orients herrscht der allgemeine Gebrauch, daß die Frauen und auch Männer immerwährend Mastix kauen, theils um das Zahnfleisch zu stärken und die Zähne weiß zu erhalten, theils um den Athem wohlriechend zu machen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0617-5

Matricaria. Das Kraut. Mutterkraut.

Pyrethrum Parthenium Smith. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Das blühende Kraut, mit zusammengesetzten strahligen Blumen, gelber Scheibe, weißem Strahle, abwechselnden doppelt halbgefiederten Blättern, die Blättchen nach vorne zusammenfließend, länglich, halbgefiedert, eingeschnitten, borstig, mit eckigem Stengel, von bitterm und gewürzhaftem Geschmacke. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Pyrethrum Parthenium Sm. Das wahre Mutterkraut. Mettram. **Matricaria Parthenium Linn.**

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 3. Polygamia superflua.

Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese Pflanze wächst in den südlicheren Gegenden Deutschlands wild, bei uns wird sie aber gewöhnlich in Gärten gezogen.

Die faserige Wurzel treibt viele aufrechte, ästige, gestreifte, 2—3 Fuß hohe Stengel. Die Blätter sind graulichgrün, besonders auf der untern Seite staubig-weichhaarig. Die gestrahlten Blüthenköpfchen stehen am Ende des ziemlich langen Blüthenstieles in einer Rispe; sie sind der gemeinen Kamille ähnlich, haben aber eine flachere Scheibe. Der Kelch ist halbkugelrund, dachziegelförmig, mit am Rande häutigen Schuppen.

Das mit den Blumen eingesammelte Kraut hat einen starken, balsamischen, etwas widerlichen Geruch, und einen eben solchen und bittern Geschmack. Es ist als magenstärkendes und bluttreibendes Mittel nur noch selten im Gebrauche.

Der Geruch dieser Pflanze ist den Bienen aufs höchste zuwider; vollblütige Personen, die den Bienenstichen vorzüglich ausgesetzt sind, können sich schützen, wenn sie etwas Mutterkraut bei sich tragen.

Mel. Honig.

Eine abgesonderte Feuchtigkeit der **Apis mellifica Linn.**, von den Blumen eingesammelt.

Eine dickliche, weißgelbliche Flüssigkeit, mehr oder weniger in die braune Farbe übergehend, frisch gleichförmig, alt körnig-krystallinisch, von süßem Geschmacke und eigenthümlichem Geruche. Oft ist er mit Mehl verfälscht, welches bei der Auflösung in nicht siedendem Wasser ungelöst zurückbleibt. Arten davon sind: **Mel album seu virgineum** (weißer Honig, Jungfernhonig), welcher von selbst aus den Zellen der Bienen ausfließt; **Mel commune seu**

flavum (gemeiner Honig), welcher durch Wärme und Auspressen aus den Zellen gewonnen wird.

Der Honig ist ein von den Bienen aus den Pflanzen, vorzüglich den Nektarien der Blumen eingesammelter, in ihrem Körper einigermaßen verarbeiteter, und in ihren Zellen abgesetzter Saft. Das Einsammeln geschieht im September und October. Zu diesem Zwecke bestreicht man einen leeren Bienenkorb inwendig mit Honig, stülpt ihn neben den vollen, welchen man abthun will, und rückt diesen über den ersteren, so daß sie genau auf einander zu stehen kommen. Nun kehrt man die beiden Körbe um, daß der volle umgekehrt und unten ist, und schlägt von außen leicht darauf. Die Bienen fliegen heraus und setzen sich in dem obern fest, welchen man hierauf in den Bienenstock stellt. Dann nimmt man die Hälfte oder höchstens zwei Drittheile der Wachstafeln heraus, und bringt die Bienen auf die nämliche Weise wie zuvor wieder in ihren alten Korb zurück.

Um den Honig von dem Wachse zu trennen, legt man die Wachstafeln auf Hürden in die Sonne, oder sonst an einen mäßig warmen Ort. Der Honig läuft aus, und wird in untergestellten Gefäßen aufgefangen. Dieser von selbst ausgelaufene Honig ist der beste, und heißt Jungfernhonig. Er ist weißlich oder blaßgelblich, körnig, von angenehmen, süßem, etwas schärflichem Geschmacke, und eigenthümlichem aromatischen Geruche. Die Wachsscheiben werden hierauf ausgepreßt, und man erhält einen mehr gefärbten Honig, den gemeinen Honig, der keinen so angenehmen Geruch und Geschmack besitzt.

Der Geruch des Honigs ist zum Theil zufällig, und hängt mit von den Blumen ab, aus welchen die Bienen den Honig einsammeln. So wird bei uns vorzüglich der Lippitzhonig geschätzt, der aus den Gegenden von Litthauen kommt, wo viele Lindenbäume angetroffen werden; aus demselben Grunde wird in Frankreich der Honig von Narbonne vorgezogen. Auf gleiche Weise nimmt aber auch der Honig einen unangenehmen widrigen Geruch, ja bisweilen schädliche Eigenschaften an, wenn z. B. viel Bärlauch (Allium ursinum) in der Nähe der Bienenstöcke sich findet. Ein solcher frembartiger Geruch kann dem Honig nach Cerutti entzogen werden, wenn man auf 30 Pfund Honig 30 Pfund Wasser, 3 Pfund gröblich gestoßene vom Staube befreite Holzkohle, und das zu Schaum geschlagene Eiweiß von 24 Eiern nimmt, die Mischung aufkocht, und wenn sie erkaltet ist, nochmals das zum Schaume wohlgeschlagene Eiweiß von 12 Eiern hinzusetzt, und nach dem Erkalten durch Leinwand colirt, welche mit grob zerstoßener Holzkohle überdeckt ist. Der auf diese Weise seines Geruches und Geschmackes, wie seiner Farbe beraubte Honig wird beim Abdampfen wieder braun. Nach einigen Monaten setzen sich nach Lowitz in dieser eingedickten braunen Honigmasse körnige Krystalle ab; Weingeist löst die braune klebrige Masse auf, und eine weiße körnige Substanz bleibt zurück, welche, noch mit Weingeist abgewaschen, weiß, luftbeständig und angenehm süß ist. Dieses ist der ei-

gentliche wahre Honigzucker, der sich in dem natürlichen körnigen weißen Honig schon gebildet vorfindet. Dieser Honigzucker hat zwar mit dem Rohrzucker die meiste Aehnlichkeit, doch weicht er in einigen Stücken von ihm ab. Er ist wie jener in heißem Alkohol vollkommen auflöslich, und kann auf diese Weise von anhängenden schleimigen Theilen befreit werden. Doch läßt er sich nicht so vollkommen krystallisiren, sondern die wäßrige Auflösung desselben gehörig eingedickt, gerinnt allmälig zu einer weißen, dichten und mit Höhlungen versehenen Masse, die jedoch unter dem Vergrößerungsglase als eine Anhäufung von lauter feinen Nädelchen erscheint. Auch wird er durch lebendigen Kalk, den man so lange zusetzt, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt, gänzlich zersetzt, erhält einen widrigen Geruch und ekelhaften bittern Geschmack. Wird der Kalk durch Schwefelsäure abgeschieden, so hat die zurückbleibende Flüssigkeit viel Aehnlichkeit mit der Aepfelsäure, und wird durch Salpetersäure in Kleesäure verwandelt.

Auch der ganze Honig, durch Kohlenpulver entfärbt, giebt mit Aetzkalk eingekocht eine klare, durchsichtige, gelbe, dem arabischen Gummi ähnliche bitterschmeckende Masse, die an der Luft beständig und vollkommen trocken bleibt.

Der Honig besteht 1) aus eigenthümlichem, in trockener körnig-krystallinischer Gestalt darstellbarem Honigzucker. 2) Aus einer braunen klebrigen Substanz, die in ihren Haupteigenschaften dem Honigzucker sehr ähnlich, nicht in fester Gestalt darstellbar, in Alkohol viel auflöslicher ist, auch dem Honig die braune Farbe ertheilt, die auch der durch Kohlenpulver entfärbte Honig beim Eindampfen wieder annimmt. 3) Aus einer freien Säure, die die Krystallisation des Honigs vorzüglich hindert, und 4) aus etwas Schleim. Außerdem enthält er einen Riechstoff, etwas Wachs, und nach Guibourt auch wohl Mannastoff.

Dem Honige etwa zugemischtes Stärkemehl oder Mehl, Verfälschungen, welche den Honig beim Kochen so dick machen, daß er sich nicht coliren läßt, auch durch Eiweiß noch undurchsichtiger wird, sammelt sich beim Auflösen des Honigs in kaltem Wasser auf dem Boden. Der mit Traganth oder Leim verfälschte Honig ist nicht körnig, und die zur Syrupsdicke eingekochte Auflösung gerinnt nach einigen Tagen zu einer halbdurchsichtigen Gallerte.

Der Honig äußert, so wie der Zucker, aber noch in höherem Grade, eine desoxydirende Wirkung auf die metallischen Salze; so entsteht z. B. beim Kochen mit dem essigsauren Kupfer ein voluminöser Niederschlag, der aus Kupferoxydul und veränderter Honigsubstanz zusammengesetzt ist.

Melilotus citrina. Das Kraut mit der Blüthe. Melilotenkraut mit Blumen. Steinkleekraut mit Blumen.

Melilotus officinalis Willd. Eine einjährige durch ganz Deutschland häufige Pflanze.

Die blühenden Aeste, mit dreizähligen Blättern, die Blättchen länglich, etwas sägeförmig, mit pfriemenförmigen Afterblättern,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0620-0

und traubenartigen Blumen, die schmetterlingsartigen Blumenkronen gelb, das Schiffchen und die Flügel von der Länge der Fahne, einen eigenthümlichen süßlichen, starken Geruch aushauchend. Sie werden im Monat Juli eingesammelt.

Melilotus officinalis Willd. Die officinelle Melilote.

Trifolium Melilotus officinalis Linn. Der officinelle Melilotenklee.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Diese bekannte Pflanze wächst häufig auf Anhöhen, Dämmen, Schutthaufen und Wällen, auf ungebauten und trocknen Orten.

Die Wurzel ist länglich, gerade spindelförmig, etwas ästig und mit Seitenfasern besetzt. Der Stengel aufrecht, ästig, 2 Fuß und drüber hoch, glatt, walzenrund und gestreift. Die Blätter sind aus drei glatten, schmalen, oben etwas gesägten Blättchen zusammengesetzt; die Afterblätter sind ganz ungetheilt. Die wohlriechenden, abwechselnden, kurzgestielten Blumen (Schmetterlingsblumen) sind klein, überhangend, von glänzend gelblicher Farbe, und stehen in den Blattwinkeln in länglichen, einfachen, walzenförmigen Trauben. Der Kelch ist einblättrig, fünfzähnig, bleibend.

Die blühenden Spitzen besitzen einen eigenthümlichen, balsamischen, starken, honigartigen, der Tonkabohne ähnlichen Geruch, von ätherischem Oele herrührend, den sie auch nach dem Trocknen behalten. Der Geschmack ist schleimig bitterlich und etwas scharf.

Vogel (Gilbert's Annalen LXIV. S. 163. u. Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 180.) hat in den Melilotenblumen Benzoësäure nachgewiesen. Man erhält diese aus denselben, wenn man sie mit sehr starkem Weingeiste — am besten ist ganz wasserfreier — in der Wärme auszieht, und den Weingeist wieder abdestillirt. Es bleibt hierbei Benzoësäure nebst einer dunkelgrünen fetten Materie zurück, von welcher man die erstere durch kochendes Wasser trennen kann. Auffallend ist die große Menge Asche, welche die Melilotenblumen liefern, zwei Pfund geben nämlich sechs Loth, welche größtentheils aus kohlens. Kalke, Bittererde und Schwefelkalke besteht.

Das Melilotenkraut wird in der Medicin nur noch selten als erweichendes Mittel zu Umschlägen gebraucht; häufiger wird es seines angenehmen Geruchs wegen unter den Schnupftabak beigemischt. Durch diesen Geruch sollen von den Kleidern die Motten, und von den Betten die Wanzen abgehalten werden.

Eine ähnliche Art ist die weiße Melilote (**Melilotus vulgaris**), welche der vorigen sehr ähnlich ist, jedoch weiße Blumen hat, die aber weniger stark riechen.

Eine andere bisweilen noch officinelle Art ist die blaue Melilote, der blaue Steinklee, Aegyptenkraut (**Melilotus coerulea, Lotus odorata**), welches in Böhmen und der Schweiz wächst, auch bei uns in Gärten gezogen

wird. Es hat blaßblaue Blumen, einen starken und besondern Geruch und einen etwas scharfen Geschmack. Es soll in der Schweiz den grünen Käsen, dem sogenannten Schaabzieger, beigemischt werden.

Melissa seu Melissa citrata. Das Kraut. Melisse. Citronenmelisse.

Melissa officinalis Linn. Eine perennirende Pflanze des mittägigen Europas, in Gärten angebaut.

Ein gewürzhaftes Kraut, von citronenartigem Geruche, mit viereckigem Stengel, gegenüberstehenden gestielten, die untern herzförmigen, die obern eiförmigen, gekerbt-sägeförmigen, borstigen Blättern. Im Monat Juni einzusammeln. Die Nepeta Cataria citrata Linn. unterscheidet sich vornehmlich durch die unterhalb weißfilzigen Blätter.

Melissa officinalis Linn. Citronenmelisse.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese Pflanze wächst in den südlichen Ländern Europas, vorzüglich auf den italienischen Alpen und in der Schweiz, ferner in Frankreich, auch in Deutschland, in Oestreich, Schlesien ꝛc. Bei uns wird sie in Gärten gezogen, läßt sich aber auch auf Feldern anbauen. Dieses muß auf mergelartigem und steinigem, beschattetem und feuchtem Boden geschehen, denn wenn sie gleich auf gut gedüngtem Gartenboden freudig zu wachsen scheint, und zahlreichere, breitere Blätter bekommt, so verliert sie doch sehr an Geruch und Wirksamkeit.

Die runden, schiefen Wurzeln sind hart, dünn und zaserig, die Stengel aufrecht, viereckig, etwas haarig, sehr ästig und 2—3 Fuß hoch. Die Zweige sind kurz und kommen aus den Blattwinkeln. Die kurzgestielten Blätter sind oben von etwas glänzender, dunkelgrüner Farbe, und von erhabenen Punkten rauh, unten etwas blässer, mit vertieften Punkten versehen, wenigstens 1½ Zoll lang, auch fast so breit. Die kleinen Blumen stehen halbquirlförmig um den Stengel auf einem gemeinschaftlichen kleinen Stiele, an dem sich die einfachen, einblumigen Blüthenstielchen befestigen, und sind alle nach derselben Seite gekehrt. Der Kelch ist einblättrig, fast glockenförmig; die Blumenkrone weiß, selten blaßröthlich, einblättrig und rachenförmig; der Schlund etwas aufspringend mit zweispaltiger gewölbter Oberlippe und flacher, abstehender, dreilappiger Unterlippe. Im Grunde des vergrößerten Kelches vier nackte Saamen.

Die Melisse blüht im Juli und August. Sie kann 2, auch 3mal jährlich geschnitten werden. Dieses geschiehet vor der Blüthe bei trockner Witterung. Der aromatische, sehr angenehme Geruch des Krautes, welcher vor der Blüthe viel stärker als zu jeder andern Zeit ist, hat viel Aehnlichkeit mit

dem der Citrone. Beim Trocknen des Krautes vermindert sich der Geruch beträchtlich. Der Geschmack ist balsamisch und etwas scharf.

Bei der Destillation mit Wasser giebt die Melisse eine sehr geringe Menge ätherisches Oel. Der wäßrige Aufguß ist dem Theeaufgusse ähnlich, hat den Geruch der Melisse und einen gelind bitterlichen herben Geschmack. Die hellbraune Farbe des verdünnten Aufgusses wird durch die Eisenauflösungen ins Dunkelolivengrüne verändert. Die geistige Tinctur ist von dem vielen grünen Harze der Blätter dunkelgrün, hat den Geruch der Melisse und einen scharfen balsamischen Geschmack.

Die fixen extractiven Bestandtheile der Melisse bestehen demnach in eisengrünendem Gerbestoffe, bitterm Extractivstoffe, Gummi und Harz.

Die Melisse gehört zu den gelind reizenden Mitteln, und wird sowohl im Thee oder Aufgusse, als auch im destillirten Wasser verordnet.

Mentha crispa. Das Kraut. Krausemünze.

Mentha crispa Linn. Eine ausdauernde Pflanze des südöstlichen Europas, in Gärten angebaut.

Ein gewürzhaftes und bitterliches Kraut, von unangenehmem Geruche, mit viereckigem Stengel, gegenüberstehenden, kurzgestielten, herzförmigen und eiförmigen, runzligen, wellenförmigen, gezahnten, die Zähne vorgezogen, fast unbehaarten Blättern und kopfförmigen Blumen. Es ist einzusammeln, wenn es zu blühen anfängt. Verwerflich ist die sehr ähnliche **Mentha crispata Willd.**, mit längeren eiförmig-länglichen Blättern, und (wenn sie vorhanden ist) sehr langer, nicht kurzer, kopfförmiger Aehre.

Mentha crispa Linn. Krausemünze.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese Pflanze wächst in der Schweiz, Italien, Frankreich, Sibirien, China, auch in einigen Gegenden Deutschlands, z. B. bei Halle, auf dem Harz u. s. w. Häufig wird sie in Gärten gezogen, wo sie sehr gut fortkommt. Sie erfodert bei weitem nicht so viel Pflege als die Pfeffermünze, und verlangt einen feuchten, lehmigen und fetten Boden, in welchem sie sich durch ihre stark wuchernden, langen, zaserigen und kriechenden Wurzeln sehr häufig und geschwind vermehrt, an einem schattigen Orte lange Jahre hindurch an Geruch und Geschmack sich gleich erhält und vollkommen glatt bleibt. In lockern, sandigen, sonnigen und trocknen, übrigens guten Boden verpflanzt, wächst sie nach Wiegmann höchstens 3 Jahre hindurch ziemlich üppig und unverändert, dann aber wird sie kleiner, haariger und bekommt einen ganz andern, als den ihr eigenthümlichen Geruch und Geschmack, der dem der Nepeta ähnelt, artet völlig aus und stirbt auch bald ab.

Der aufrechte, krautartige Stengel ist fast viereckig, etwas haarig, ästig,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0623-7

und wird 1—2 Fuß hoch. Die beinahe sitzenden, am Rande wellenförmig auf- und abgebogen gekräuselten Blätter sind oben von dunkelgrüner, unten von weißlichgrüner Farbe. Die kleinen purpur- oder violettröthlichen Blumen bilden an den Spitzen der Zweige und des Stengels kopfförmige, längliche, unterbrochene, oben schmäler werdende Aehren. Die Deckblätter sind eiförmig; der Kelch ist röhrig, fünfzahnig; die Blumenkrone einblättrig, röhrig, vierlappig. Im Grunde des Kelches vier sehr kleine Saamen.

Die Pflanze blüht im Juni bis August; sie wird, wenn sich die Blumen entwickeln, eingesammelt, und kann 2, auch wohl 3mal geschnitten werden. Sie besitzt einen gewürzhaften, brennend bitterlichen Geschmack, und einen stark balsamischen eigenthümlichen Geruch, welcher im Trocknen nicht vergeht.

Die Krausemünze wird am leichtesten verwechselt mit der glatten Krausemünze (Mentha crispata), die häufig statt der wahren Krausemünze in den Gärten gezogen wird. Die Blätter sind länger, mehr zugespitzt und minder kraus. Verwechselungen mit Mentha sativa, dentata, rubra, citrata, rotundifolia, wird man durch Vergleichung mit ächter Mentha crispa leicht vermeiden. Mentha aquatica muß zwischen den Pflanzen der M. crispa durchaus nicht geduldet werden, weil jene sonst überhand nimmt, und die M. crispa verdrängt.

In der Krausemünze ist das ätherische Oel der vorzüglich wirksame Bestandtheil. In trocknen Sommern werden bisweilen von einem Pfunde Kraut drei Quentchen Oel erhalten. Der Aufguß der Krausemünze ist ziemlich gesättigt roth, wird durch schwefelsaures Eisen sehr dunkel olivengrün. Die geistige Tinctur hat eine schwarzgrüne Farbe, und einen balsamisch-bittern Geschmack.

Die Krausemünze wird im Aufgusse gegeben, und zur Bereitung des ätherischen Oeles und des destillirten Wassers benutzt.

Mentha piperita. Das Kraut. Pfeffermünze.

Mentha piperita Linn. Eine ausdauernde Pflanze Englands, bei uns in Gärten gezogen.

Das Kraut mit viereckigem Stengel, gegenüberstehenden, gestielten, länglichen, spitzigen, scharf sägeförmigen, oberhalb unbehaarten, unterhalb mit etwas haarigen Nerven versehenen Blättern, von angenehmen Geruche, gewürzhaftem und campherartigem Geschmacke, mit einem Gefühle von Kälte im Munde. Im Monat Juni einzusammeln.

Mentha piperita Linn. Pfeffermünze.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese Pflanze wächst in England in sumpfigen, wäßrigen Gegenden und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0624-3

auf Wiesen wild; bei uns wird sie häufig in Gärten gezogen. Sie verlangt ebenfalls einen feuchten und lehmigen Boden; wird sie längere Zeit hindurch auf sandigem, lockerem und trocknem Boden angebaut, so verliert sie nach Nees v. Esenbeck und Wiegmann ihren eigenthümlichen Geruch und Geschmack, und scheint den der Mentha viridis anzunehmen. Nach Stolze's Erfahrungen müssen die Pflanzen der Münzen auch selbst in einem ihnen zusagenden Standorte nicht länger als 3 Jahre gelassen werden, ohne sie wenigstens umzulegen, weil ein Kränkeln der Pflanzen eintritt, wovon die Folge Veränderung des Geruches ist. In einem den Pflanzen nicht zusagenden Standorte zeigt sich dieses Kränkeln schon im 2ten Jahre; der Geruch der Pflanze ist schwächer und krautartiger, und nach und nach fangen sie an auszugehen. Wiegmann warnt, Mentha crispa und M. piperita, besonders auf trocknem Boden, zusammenzustellen, denn wenn beide Pflanzen zu gleicher Zeit geblüht haben, so nimmt im folgenden Jahre die M. crispa den Geruch der M. arvensis, und die M. piperita den Geruch der M. crispa oder vielmehr der M. aquatica an, und beide sind unbrauchbar. Schneidet man beide vor der Blüthe ab, so erfolgt diese merkwürdige Veränderung nicht. Kommt M. viridis unter die Pfeffermünze, so wuchert erstere so sehr, daß sie die letztere ganz verdrängt. Die Pfeffermünze friert bei kalten Wintern bisweilen aus, weswegen sie im Herbste mit Pferdedünger, Stroh oder Blumenlaub bedeckt werden muß.

Die Wurzel der Pfeffermünze ist lang, kriechend, zaserig und treibt zahlreiche, aufrechte Stengel, welche gewöhnlich von brauner, bisweilen von grünlicher Farbe, viereckig, ästig und wenig haarig sind, und die Höhe von 1—2 Fuß erreichen. Die Blätter sind kurzgestielt, länglich-eiförmig, ein wenig zugespitzt, gesägt, an ihrem Grunde rund und von sattgrüner Farbe. Man bemerkt an ihnen durchsichtige Punkte, die obere Fläche ist glatt und dunkelgrün, die untere etwas rauh und haarig. Die kleinen violettrothen, gestielten Blumen sind in einzelne von einander geschiedene Quirle vereinigt, welche an dem Ende der Zweige und des Stengels kurze, cylindrische, etwas dicke, stumpfe Aehren bilden. Der Kelch ist einblättrig, fünfzähnig; die Krone einblättrig, röhrig, viertheilig. Im Grunde des Kelches vier kleine Saamen.

Die Pflanze blüht im Juli bis August.

Die Pfeffermünze unterscheidet sich von allen übrigen Arten Münze durch ihren sehr durchdringenden Geruch, und vorzüglich durch ihren aromatischen, campherartigen und brennenden Geschmack, der hintennach eine angenehme Kühlung im Munde zurückläßt. Das Kraut wird vor der Blüthe eingesammelt. Am häufigsten wird es verwechselt mit dem Kraute der grünen Münze (Mentha viridis). Doch unterscheidet sich diese Münze von der Pfeffermünze durch ihre Haltung, durch die etwas gebogenen Zweige, durch die un- oder sehr kurzgestielten, lancettförmig-zugespitzten und schmälern Blätter, und durch den schwächeren Geruch und Geschmack. Die Blätter der wilden Münze (M. sylvestris) sind stiellos, dicker, weißlich hellgrün, oben runzlig, und unten

filzig; die der Wassermünze (M. aquatica) sind vollkommen eirund und weich behaart, die der Gartenmünze (M. gentilis) sind herzförmig, spitz, glatt und grün.

Das Wirksame der Pfeffermünze liegt vorzüglich in dem ätherischen Oele. Hagen erhielt aus 20 Pf. Kraut 4 Loth 2 Scrupel Oel; nach Trommsdorff erhält man aus derselben Menge 5—6 Loth Oel, je nachdem der Sommer heiß und trocken war. Nach Knigge geben 10 Pf. frisches Kraut beinahe 3½ Quentchen Oel. Der wäßrige Auszug ist röthlich, kräftig an Geruche und Geschmacke, und wird durch die oxydirten Eisenauflösungen dunkel olivengrün gefärbt.

Die Pfeffermünze ist ein vorzügliches flüchtiges Reizmittel, welches als Thee oder im Aufgusse verordnet wird.

Mentha piperita. Das Oel. Pfeffermünzöl.

Wird durch Destillation aus dem Kraute der Mentha piperita Linn. bereitet.

Ein weißes oder gelbliches ätherisches Oel, von durchdringendem Wohlgeruche, auf der Zunge ein Gefühl von Kälte erregend, spec. Gew. = 0,920. Das aus England gebrachte ist vorzüglich.

Dieses Oel hat bisweilen eine ins Grünlichgelbe schimmernde Farbe, ist von dem durchdringendsten Pfeffermünzgeruche, verdunstet leicht, und bringt beim Kosten außer einem stark brennenden campherartigen Geschmacke auch die Empfindung von Kühlung hervor, wobei man zugleich deutlich die Ausdehnung im Munde verspürt. In die Wangen unter den Augen eingerieben reizt es diese heftig zu Thränen, und stärkt hintennach das Sehvermögen. Bei — 22 ° R. bilden sich in dem Oele haarförmige Krystalle, die jedoch den Geschmack des Oeles behalten.

Mezereum. Die Rinde. Seidelbastrinde.

Daphne Mezereum Linn. Ein in Deutschland häufiger Strauch.

Eine sehr scharfe Rinde in verlängerten, dünnen, sehr zähen Stücken, mit grünlichbrauner Oberhaut, äußerer dünnen, weißlichen, innerer fasrigen, gelblichen Rinde, und glatter Innenfläche. Sie werde im Frühlinge gesammelt.

Daphne Mezereum Linn. Der gemeine Seidelbast oder Kellerhals.
Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 2. Thymeleae.

Dieser kleine Strauch wächst fast durch ganz Deutschland und in mehreren andern Ländern des nördlichen Europas, auch im nördlichen Asien, sehr häufig in schattigen bergigen Wäldern oder Laubhölzern. Seiner schönen blaßrothen und angenehm riechenden Blüthen wegen wird er auch in Gärten gezogen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0626-5

Die Stengel sind aufrecht, ästig, 2—4 Fuß hoch und mit einer bräunlichen oder grünlichen Rinde bedeckt. Die Blätter, welche erst nach der Blüthe erscheinen, stehen anfangs büschelweise, dann abwechselnd, sind fast zwei Zoll lang, lancettförmig, von blaßgrüner oder gelblichgrüner Farbe, ganzrandig und am Grunde etwas verschmälert. Die Blüthen sind ungestielt, sitzen zu 2 auch 3 zusammen, und haben eine einblättrige, trichterförmige, pfirsichblüthrothe und wohlriechende Blumenkrone. Die Frucht ist eine rundliche saftige Beere, von der Größe einer Johannisbeere, und zur Zeit der Reife von lebhaft rother Farbe; sie enthält unter einer braunen, streifigen und zerbrechlichen Schale einen öligen gelben und außerordentlich scharfen Kern.

Die Blüthezeit dieses Strauches ist Februar bis April. Die Früchte reifen im Juni bis August.

Es giebt eine Varietät mit weißen Blumen und gelben Beeren.

Wurzel, Rinde, Blätter und Beeren sind bei den verschiedenen Seidelbastarten von einer brennenden Schärfe, und erregen, äußerlich auf die Haut gelegt, Röthe und Blasen. Die Beeren von **Daphne Laureola**, unter dem Namen Kellerhalskörner, Seidelbastbeeren, Kellerhalssaamen (**Baccae seu Semen Cocognidii s. Coccumgnidii, Grana Gnidii, Cocci Gnidii**) sind rund, getrocknet ist die Schale, welche den Kern enthält, braun, streifig und zerbrechlich. Ein unvorsichtiger Genuß derselben erregt heftiges Erbrechen, Entzündung der Eingeweide, welche selbst den Tod nach sich zieht. Linné sah von 12 Saamenkörnern ein Mädchen sterben; 6 sollen nach ihm einen Wolf tödten, wogegen Miller versichert, daß die Beeren von einigen Vögeln begierig verzehrt würden. Die Weiber in Sibirien sollen, um sich zu schminken, die Wangen mit den rothen Beeren reiben, wovon sie anschwellen, und eine Entzündungsröthe bekommen. Bei der Wurzel sitzt die Schärfe in der Rinde, welche mit der Rinde des Stammes und der Aeste übereinkommt; der innere holzige Theil ist ohne Schärfe. Nach Hagen's Erfahrung bringt auch der Genuß der Blumen kleinen Vögeln, als Hänflingen, Canarienvögeln ꝛc. den Tod; die Blätter aber werden von Ziegen und Schafen gefressen.

Die officinelle Seidelbastrinde, von dem Stamme und den Aesten gesammelt, besteht aus langen, flachen oder meistens zusammengerollten Stücken, von der Dicke eines Pfeifenstieles bis zu der eines Fingers. Die Rinde selbst ist dünn, leicht, etwas gestreift, auswendig mit einem grünlichen Oberhäutchen bedeckt, worunter eine dunkelgrüne Substanz befindlich ist, inwendig besteht sie aus einem gelblichweißen, zähen, faserigen Baste. Sie hat keinen Geruch, aber einen höchst brennend scharfen Geschmack, der sich erst nach einiger Zeit beim Kauen entwickelt, lange anhält und eine Unempfindlichkeit der Zunge zurückläßt. Frisch oder, wenn sie trocken ist, in Essig aufgeweicht, und auf die Haut gelegt, erregt sie Röthe und zieht Blasen.

Lartigue (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 430.) erhielt durch Ausziehung des wäßrigen Extractes der Rinde mit Aether eine gelbe, sehr scharfe Materie, welche auf der Haut Blasen zog. Auch dem Olivenöle theilte

dieses Extract eine bedeutende Schärfe mit, machte es grünlich und dickflüssiger. Aether sowohl als Essig entzogen der Rinde das scharfe Princip, wurden dabei grünlich gefärbt, und die mitgetheilte Schärfe stand mit der Intensität der Färbung im Verhältniß.

Vauquelin, der schon im Jahre 1808 bei der Untersuchung der Daphne alpina und Gnidium eine alkalische Materie bemerkt hatte, welche er als einen sehr flüchtigen Stoff von sehr anhaltend scharfem Geschmacke bezeichnete und Daphnin nannte, giebt (Berl. Jahrb. XXVI. 2. 1825. S. 60.) zwei Verfahrungsarten an, um das Daphnin im Zustande der Reinheit zu erhalten:

1) Auf ein Pfund getrockneter Seidelbastrinde gießt man ein Pfund kochendes Wasser, und setzt das Gemisch einige Stunden einer Wärme von 60 — 70 ° aus. Man drückt hierauf die Flüssigkeit aus, und destillirt, nachdem man sie mit etwas Kalk, Kali oder auch Bittererde versetzt hat, sie so lange, als es möglich ist, ohne daß der Rückstand brenzlig wird. Man erhält auf diese Art eine wasserhelle Flüssigkeit, die sehr scharf ist, und diese Wirkung vorzüglich in der Kehle äußert, die Nase stark reizt, die blaue Farbe des durch Säure gerötheten Lackmuspapiers schnell wiederherstellt u. s. w. Will man diesen Stoff in einem Zustande von größerer Concentration haben, so kann man nach obiger Angabe bereiteten wäßrigen Auszug mit Schwefelsäure mischen, bis diese merklich vorsticht, dann denselben bis auf den vierten oder achten Theil seines früheren Umfanges verdampfen, mit Bittererde im Ueberschusse versetzen, und im Wasserbade bis zur Trockne abziehen, wobei man jedoch Sorge tragen muß, daß die Vorlage stets hinlänglich kalt sey. Auf diese Art erhält man ein 4 bis 8mal stärkeres Destillat.

2) Man übergießt 1 Th. Seidelbastrinde mit 4 Th. reinen starken Weingeistes und setzt dieses Gemenge in einem verschlossenen Gefäße 3—4 Stunden lang einer Wärme von 36 ° aus. Man gießt hierauf die braune Tinctur ab, destillirt den Weingeist ab, scheidet die zurückbleibende Flüssigkeit von dem während der Destillation abgeschiedenen Harze, und wäscht das letztere mit heißem Wasser aus, welches man der übrigen Flüssigkeit hinzusetzt. Das Harz enthält noch eine große Menge des scharfen Princips; man muß es daher bis zum Schmelzen unter mit Schwefelsäure gesäuertem Wasser erhitzen, dieses Wasser den übrigen Flüssigkeiten zusetzen, und diese mit Magnesia versetzt bis zur Trockne destilliren. Wenn das Harz auf diese Weise gut ausgewaschen ist, so bleibt, wenigstens nach dem Geschmacke zu urtheilen, nichts Merkliches vom scharfen Stoffe darin zurück. Das Harz verliert auch durch das Waschen mit Säure seine grüne Farbe, und nimmt eine gelbe Ocherfarbe an.

Das durch die Destillation erhaltene, mit dem scharfen Stoffe der Daphne sehr angeschwängerte Wasser reizt heftig die Nasenlöcher, welches eine große Flüchtigkeit jenes Stoffes anzeigt. Wirklich wird auch, wenn man ein Fläschchen zum Theil mit diesem Wasser füllt, ein darüber gehängter Streifen gerötheten Lackmuspapiers bald wieder blau. Bringt man einen Tropfen dieses

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0628-6

Wassers auf die Zunge, so verspürt man in dem ersten Augenblicke keine merkliche Wirkung, aber nach Verlauf einiger Minuten entwickelt sich im ganzen Munde eine Schärfe, und zwar vorzugsweise in der Kehle, woselbst sie auch lange anhält. Dieses Wasser sättigt die Säuren, und wenn man diese Verbindungen langsam verdunsten läßt, so krystallisiren sie in weißen glänzenden Krystallen. Dieses ist wenigstens bei Anwendung der Schwefel- und Salzsäure der Fall.

Dasselbe Wasser bewirkt auch in einigen metallischen Lösungen Niederschläge, namentlich in der des essigs. Bleies einen weißen seidenartig glänzenden, in der des schwefelsauren Kupfers einen grünen, und in der des salpeters. Silbers einen weißen, bald rosenfarben werdenden Niederschlag.

Nach diesen Thatsachen scheint es nicht zweifelhaft, daß in der Daphne eine Materie vorhanden ist, die alkalische Eigenschaften besitzt. Vauquelin erklärt sich gegen die Annahme, daß diese Materie ein in der Seidelbastrinde vorhandenes Pflanzenalkaloid sey, weil, wenn er eine große Menge des mit dem scharfen Principe von **Daphne Gnidium** angefüllten Wassers mit Salzsäure sättigte, er durch Verdampfung ein Salz erhielt, welches bestimmt salzs. Ammoniak enthielt. Er sieht es daher für möglich an, daß das Ammoniak allein die Ursache der alkalischen Eigenschaften des destillirten Wassers der Daphne sey, und das scharfe Princip daran keinen Theil habe. (Bekanntlich enthalten mehrere Pflanzen, als **Chenopodium Vulvaria etc.**, fertig gebildetes Ammoniak.)

Vauquelin, der seine Versuche über den Seidelbast fortgesetzt, und die frische Pflanze zerlegt hat (Berl. Jahrb. XXVII. 1. S. 179.) ist zu folgenden Schlüssen dadurch geführt worden: 1) daß der reizende Stoff der Daphnen ein flüchtiges Oel sey. 2) Daß die Daphnen während der Vegetation, wenn sie das meiste flüchtige Oel enthalten, auch am wirksamsten seyen. 3) Daß, so wie das Oel allmälig in Harz verwandelt wird, die reizenden Kräfte der Pflanze abnehmen. 4) Daß jedoch, wenn eine gewisse Menge Harz sich gebildet, dieses die Veränderung des übrigen Oeles verhindert, und daß dieses die Ursache ist, warum auch alte Seidelbastrinden noch Wirkung auf die Haut zeigen. 5) Daß das Oel aus den Aufgüssen der Seidelbastrinde zugleich mit der Säure durch den Bleizucker gefällt wird, und daß das Schwefelwasserstoffgas es aus den Niederschlägen nicht abzuscheiden vermag. 6) Daß jedoch dieses Oel durch siedenden Weingeist vom Schwefelblei abgesondert werden kann, wo es dann aber mit Schwefel verbunden ist.

Früher schon haben die Herren Gmelin und Bär (Schw. J. N. R. V. S. 1.) gleichfalls eine sehr sorgfältige Zerlegung der Seidelbastrinde mitgetheilt, deren Ergebnisse vor den obigen Resultaten in manchen Stücken abweichen. Durch Destillation einer geringen Menge Wasser über eine große Menge Rinde von **Daphne Mezereum** erhielten sie Spuren eines nicht scharfen ätherischen Oeles, und das destillirte Wasser ließ kaum etwas Schärfe bemerken, denn es blieb bloß, wenn man es in den Mund nahm, einige Zeit eine gewisse Trockenheit im Munde zurück. Auch zeigte das (ohne Zusatz

von Kalk, Kali ꝛc.) destillirte Wasser durchaus keine kalische Reaction. Als sie aber aus einer Glasretorte, die der Einwirkung des Wassers schlecht widerstand, destillirten, erhielten sie ein Wasser, welches die geröthete Lackmustinctur bläuete. Sie scheinen diese Wirkung von aufgelöstem Kali herzuleiten, wahrscheinlich aber hat dieses nur auf die Rinde eingewirkt und Ammoniak (aus einem schon vorhandenen Ammoniaksalze?) frei gemacht. Als fernere Resultate ihrer Analyse geben sie folgende Bestandtheile an: Wachs; scharfes Harz; Daphnin; freie Aepfelsäure; äpfels. Kali, Kalk und Bittererde; gelbfärbendes Princip; süße Substanz; Gummi, welchem eine thierische Materie beigemischt zu seyn scheint, und welches bei der trocknen Destillation viel Ammoniak liefert; braunrothen Extractivstoff; Holzfaser; in der Asche Kieselerde, phosphors. Kalk nebst einer Spur von phosphors. Kali, etwas Eisenoxyd und eine Spur Alaunerde, welche beide letztere vielleicht mit Aepfelsäure verbunden sind.

Das Harz ist von dunkelgrüner Farbe, löslich in Weingeist und Aether, etwas auflöslich in Wasser, besonders durch Hülfe der übrigen durch Wasser ausziehbaren Stoffe des Seidelbastes und verliert (der Angabe Vauquelin's entgegen) durch Behandlung mit Säuren, nichts von seiner Schärfe. Dieses Harz, in welchem die blasenziehende Kraft des Seidelbastes liegt, konnte durch Lösung in Alkohol und Präcipitation mit einer Lösung des essigs. Bleioxyds zersetzt werden, wobei in dem Alkohol ein scharfes Oel aufgelöst blieb, welches sich während des Abdampfens allmälig in Tropfen ausschied. Dieses bildet den eigentlich blasenziehenden Stoff. Es giebt mit Alkali Seife, und wenn diese Seife mit Weinsteinsäure behandelt, und die Flüssigkeit destillirt wurde, so zerfällt das scharfe Oel in Essigsäure, die mit einem Theile des scharfen Princips noch verbunden überdestillirt, und in eine gelbbraune fettige nicht mehr scharfe Substanz, wobei der größte Theil des scharfen Princips unter Entwickelung von gephosphortem Wasserstoffgas zerstört zu werden schien. Auch noch durch andere Versuche zeigte es sich, daß in diesem scharfen Oele ein Phosphorgehalt gegenwärtig sey. Das durch das Bleioxyd Gefällte bestand aus einer Säure, deren Natur nicht näher bestimmt wurde, und aus einem eigenthümlichen, durch wiederholtes Abdampfen unauflöslich werdenden Stoffe, aus dem Alkalien einen sehr starken widrigen Knoblauchgeruch entwickelten.

Das Daphnin wurde dadurch erhalten, daß die wäßrige Abkochung der Seidelbastrinde mit Bleizucker gefällt, und der erzeugte Niederschlag mit Hydrothionsäure behandelt wurde. Hierdurch wurde das Daphnin vom Bleioxyd wieder abgeschieden, löste sich in dem zugleich angewandten Wasser und wurde durch Behandlung mit absolutem Weingeiste u. s. w. von den übrigen es begleitenden Substanzen durch Krystallisation getrennt, indem in der braunen Mutterlauge Aepfelsäure und gelbfärbende Materie aufgelöst bleiben. Das mit kaltem absolutem Weingeiste abgewaschene Daphnin wurde durch Auflösung in heißem Wasser und Krystallisirung gereinigt. Das Daphnin bildet farblose, durchsichtige, glänzende, büschelförmig vereinigte Säulen, von bitterm und her-

dem Geschmacke; es reagirt weder sauer noch alkalisch; löst sich wenig in kaltem, leicht in heißem Wasser auf, aus dem es beim Erkalten herauskrystallisirt. In Weingeist und Aether ist es leicht auflöslich. Beim Erhitzen schmilzt es, schwillt auf, schwärzt sich und verwandelt sich in stechende Dämpfe. Da es durch essigs. Blei nicht niedergeschlagen wird, so ist die Fällung desselben aus der Abkochung der Seidelbastrinde durch das essigs. Blei von der Säure und dem färbenden Principe bedingt.

Coldefy-Dorly (Froriep's Notizen XII. Sp. 79.) will den blasenziehenden Stoff folgendermaßen dargestellt haben: Drei Pfund Seidelbastrinde wurden mit Alkohol dreimal heiß digerirt, ausgepreßt, $\frac{3}{4}$ des Alkohols abdestillirt, und der Rückstand filtrirt, wobei ein grünes Harz auf dem Filter blieb, so wie auch die bis auf den vierten Theil abgedampfte Flüssigkeit nach dem Erkalten eine bräunliche, etwas zerreibliche Harzsubstanz absetzte. Beide Harze wurden mit Aether so oft digerirt, als dieser sich noch grün färbte. Der von dem Bodensatze abgesonderte Aether wurde wieder abdestillirt. Das in dem etwa 3 Loth wiegenden Rückstande enthaltene braune Harz wurde noch durch Digestion mit Weingeist entfernt, und so etwa 9 Drachmen einer dunkelgrünen Substanz von butterartiger Consistenz erhalten. Dies ist nach Dorly der blasenziehende Stoff, der nicht an der Luft verdirbt, und in Aether, Alkohol, in fetten und flüchtigen Oelen auflöslich ist, und für sich oder in einer Auflösung an die Haut gebracht, diese nach einiger Zeit reizt.

Nach allen diesen Untersuchungen scheint doch die Ausscheidung des scharfen Stoffes aus der Seidelbastrinde, abgesondert von Ammoniak, Oel oder harzähnlichem Stoffe, noch künftigen Untersuchungen vorbehalten zu seyn. Nicht ohne Grund ist anzunehmen, daß dieser Stoff mit dem Kantharidin Aehnlichkeit habe, und vielleicht wie jenes dargestellt werden kann.

Die Kellerhalskörer sind von Willert (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 430.) und Celinsky (Berl. Jahrb. 1804. S. 54.) einer Untersuchung unterworfen worden. Die äußere Schale der Kellerhalskörner ertheilt dem darüber abgezogenen Wasser einen eigenthümlichen, etwas flüchtigen Geruch; der Geschmack desselben ist anfangs nicht merklich, nach einiger Zeit aber verursacht es im Munde ein starkes Brennen, worauf nach mehreren Stunden eine starke Geschwulst erfolgt. Die äußere Schale enthält nach Willert: destillirbares rothmachendes Princip; Harz; Extractivstoff; Gerbestoff; Schleim und Holzfaser. Der fleischige Theil der Beeren, welcher keine Spur von Schärfe zeigte, enthält: säuerlich bitterlichen Extractivstoff 4,2; körnige Absonderung, wachsähnlich 0,2; flockige Absonderung, eben so, 0,2; Schleim 1,5; blaßrothes Satzmehl 0,6; hülsigen Rückstand 10,9; Wasser 82,4. Nach Celinsky geben die Saamenkerne durch Auspressen ein strohgelbes dickliches Oel, welches mit dem Geruche der Kantharidin Aehnlichkeit hat. Der Geschmack desselben ist anfangs mild, zieht aber nachher ein starkes Brennen und Geschwulst im Munde nach sich; auf die Haut eingerieben erregt es entweder eine starke Geschwulst oder bloß rothe Pusteln.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0631-1

Die Saamenkerne enthalten: scharfes fettes Oel 56; Extractivstoff 0,5; Schleim 2; Stärkemehl 1,5; Schale 1; Kleber 33; Eiweißstoff 1,5; Verlust 4,5.

Die von Göbel (Buchn. Repert. VIII. S. 203.) in den Saamen gefundene Cocogninsäure bedarf noch weiterer Bestätigung.

Die officinelle Seidelbastrinde, welche bei uns von der in unsern Gegenden einzig einheimischen **Daphne Mezereum**, in Frankreich am meisten von **D. Gnidium** gesammelt wird, findet häufige äußerliche Anwendung als rothmachendes, und eine häufige seröse Absonderung bewirkendes Mittel. Die frische Rinde wird unmittelbar, die trockne nachdem sie vorher 8—10 Stunden in Essig oder Wasser eingeweicht worden, auf den Theil aufgelegt; es entsteht hierauf ein Jucken, ein Gefühl von Brennen, Röthe, bisweilen auch kleine Blasen, die Oberhaut wird verzehrt, gewöhnlich nach 2—4 Tagen, und es tritt eine reichliche seröse Absonderung ein. Die Rinde wird aber auch innerlich in der Abkochung, zur Zertheilung venerischer Geschwüre und bei Nachkrankheiten gegeben.

Millefolium. Die Blumen. Schafgarbenblumen.

Achillea Millefolium Linn. Eine ausdauernde sehr häufige Pflanze Deutschlands.

Zusammengesetzte weiße oder röthliche Blumen, mit kurzen sehr breiten Strahlenblümchen, von bitterm, schärflichem Geschmacke und etwas gewürzhaftem Geruche. Im Monat Juni einzusammeln.

Millefolium. Das Kraut. Schafgarbenkraut.

Das bittere und gewürzhafte Kraut, mit eckigem Stengel, doppelt-gefiederten, borstigen Blättern, die Einschnitte linienförmig, mit einer kleinen Borste begrenzt. Im Monat Juni einzusammeln.

Achillea Millefolium Linn. Gemeine Schafgarbe.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Diese Pflanze ist durch ganz Deutschland, so wie überhaupt durch ganz Europa auf trocknen Wiesen, Triften, Aeckern und an Wegen sehr häufig.

Die Wurzel ist faserig und von schwärzlicher Farbe. Der aufrechte, einfache Stengel erreicht eine Höhe von 1—2 Fuß und drüber. Die doppelt gefiederten, langen, schmalen Blätter mit gleich breit gezahnten Einschnitten sind fast glatt, nur etwas rauh und von dunkelgrüner Farbe. Die Wurzelblätter sind gestielt und stehen in einem Kreise. Die Stengelblätter sind abwechselnd und umfassend. Die Blüthen bilden am Ende des Stengels und der Zweige dichte, flache oder ebene Blumenbüschel, voller kleiner zusammengesetzter Blumen mit strahliger Krone aus fünf kurzen an der Spitze ein paarmal wenig eingeschnittenen Randblümchen von weißer, zuweilen röth-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0632-7

licher oder purpurrothlicher Farbe, und röhrenförmigen, grünlichgelben Scheibenblümchen. Der gemeinschaftliche Kelch ist schuppig und eiförmig, die zusammengesetzte Blumenkrone ist gestrahlt. Im Strahle stehen fünf weibliche Blüthen.

Die Pflanze blüht vom Juni bis October.

Die Blumen haben einen schwachen gewürzhaften, balsamischen Geruch, und aromatisch bitterlich scharfen Geschmack, den auch das Kraut besitzt. Dieses giebt bei der Destillation mit Wasser eine geringe Menge (das frische Kraut nach Dehne $\frac{1}{600}$ bis $\frac{1}{300}$, das getrocknete nach Lewis $\frac{1}{1430}$, nach Hagen $\frac{1}{300}$) ätherisches Oel, welches dunkelblau, bisweilen auch grün oder gelb ist, je nachdem die Pflanze auf fettem oder auf trocknem Boden gewachsen ist. Dieses Oel hat einen kräftigen, campherartigen Geschmack, und wird lange aufbewahrt dunkelbraun. Der wäßrige Aufguß ist gelblich, und zeigt durch die stark dunkelgrüne Farbe, die er von einer schwefelsauren Eisenauflösung erhält, das Daseyn von Gerbestoff an. 12 Unzen Kraut geben 5 Unzen wäßriges Extract. Die geistige Tinctur ist dunkel gelblichgrün.

Diese, vermöge ihrer ätherisch-öligen, extractiven und harzigen Bestandtheile recht wirksame Pflanze wird nicht nur häufig im ausgepreßten Safte zur Frühlingscur, sondern auch als Thee oder im Aufgusse, in gelinder Abkochung und im Extracte verordnet.

* Millepedes.

Oniscus Asellus Linn. Kellerassel. Kellerwurm.

Ein Krustenthier aus der Ordnung der Gleichfüßler.

Er ist länglichrund, flachgedrückt, oben gewölbt und bleifarbig, unten vertieft und weißlich. Der Körper besteht aus 14 Gelenken. Der Schwanz ist zweitheilig. Bei der Berührung haben sie die Gewohnheit, sich wie eine Erbse zusammenzulegen. Sie halten sich in den Kellern und an andern feuchten Orten unter Steinen auf.

Man tödtet diese Thiere mit darauf gegossenem weißem Weine und trocknet sie dann. Der Geruch ist gering, aber unangenehm, der Geschmack salzig und ekelhaft; er rührt von den salpetrigen Theilen her, in deren Nähe das Thier sich aufhält, und die demselben anhängen, oder auch von ihm verschluckt werden. Durch Kochen mit Wasser geben sie eine ekelhaft schmeckende Gallerte, und bei der trocknen Destillation Ammoniak. Sie werden nur noch selten als harntreibendes Mittel in Pulverform oder auch im ausgepreßten Safte, der salzs. Kali und salzs. Kalkerde enthält, gebraucht.

Die Steinassel (Oniscus Armadillo Linn.) ist etwas größer, und hat einen schwarzblauen, glatten, glänzenden und stark gewölbten Körper.

Mimosa. Gummi. Gummi Arabicum. Mimosengummi. Arabisches Gummi.

Ein an der Luft verdichteter Saft der Acacia tortilis und Seyal Forsk. und anderer Arten dieser Gattung, die in verschiedenen Gegenden Afrikas wild wachsen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0633-3

Ein Gummi in oft kugeligen, weißlichen oder gelblichen, glänzenden, beim Durchbrechen mit Glasglanz erscheinenden, durchscheinenden Stücken, von fadem Geschmacke und ohne Geruch. Das ächte giebt mit sechs oder acht Theilen Wasser eine vollkommen flüssige Auflösung.

Durch die Reisen von Ehrenberg und Hemprich in Nordafrika und Arabien sind uns über die Gummi-Acacien jener Länder neue und schätzenswerthe Nachrichten zugekommen. Von Hrn. Prof. Ehrenberg wurden sie dem Hrn. Prof. Hayne mitgetheilt und von letzterm im X. Bande seiner Arzneigewächse No. 28 — 34. bekannt gemacht. Dem zufolge liefern die beiden genannten Arten, A. tortilis und Seyal Forsk., die Substanz mit völliger Sicherheit, und einen großen Theil des gebräuchlichen Mimosengummis.

Acacia tortilis Hayne. X. t. 31. Drehfrüchtige Acacie.
Mimosa tortilis Forskål.
Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 1. Monoecia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Sie ist ausgezeichnet durch gezweite, meist gerade Stacheln (nur die verkümmerten sind zurückgekrümmt), doppelt gefiederte Blätter mit 2 — 5jochigen Fiedern, 5 — 11jochigen, länglich-linienförmigen Blättchen und einer blattstielständigen Drüse, durch blattachselständige, einzelne Blüthenköpfe und zusammengedrückte, linienförmige, adrig-gestreifte, verschieden gedreht gebogene, kahle Hülsen. Der 2 — 3 Fuß hohe und bis 4 Fuß dicke Strauch wächst im glücklichen Arabien, in Oberägypten, Nubien und Dongola und blüht im November und December. Die Beduinen, welche davon das Gummi sammeln, nennen ihn Aolhe.

Acacia Seyal Forsk. Hayne a. a. O. t. 30., Seyal-Acacie, der vorhergehenden verwandt, bildet einen mäßigen Baum oder Strauch von 15 — 20 Fuß Höhe mit zerstreuten, abwärts stehenden, gezweiten, geraden Stacheln, 2 — 4jochigen Blättern und 8 — 12jochigen, länglich-linienförmigen, kahlen Blättchen. Zwischen den beiden obern Jochen der Fiedern ist eine Drüse befindlich. Die kugelrunden Blüthenköpfe stehen gehäuft in den Blattachseln und die Hülsen sind zusammengedrückt, linien-sichelförmig, knorrig, zugespitzt und gerippt-streifig.

In Aegypten, Nubien, Dongola ist sie einheimisch und im April in Blüthe. Die Eingebornen nennen sie: **Sejal, Sijal oder Sjal** und sammeln davon Gummi in Menge.

Die beiden eben beschriebenen Arten liefern das Gummi **Tori** der Aegypter.

Außerdem giebt, obschon Sieber in seiner Reise nach Kreta es läugnet, **A. arabica** Hayne a. a. O. t. 32. (**Mimosa arabica Lam., M. nilotica L. zum Theil, Acacia nilotica De C.**) die in Aegypten, Arabien, am

Senegal und in Ostindien vorkommt, meist das ganze Jahr, besonders aber im April und Mai blüht, schönes Gummi in großer Menge, nur wird es in Aegypten, Ehrenberg's Nachrichten zu Folge, nicht gesammelt, weil der Baum nur dicht am Nil wächst, wo sich die Einwohner vortheilhafter mit Feldbau beschäftigen. Ob in Ostindien das Gummi dieser Acacie gesammelt wird, ist noch ungewiß. Von der **A. arabica** und der afrikanischen **A. vera** W. Hayne a. a. O. t. 34., welche beide von Linné unter **Mimosa nilotica** begriffen wurden, leitete man sonst ausschließlich das arabische Gummi her. Ehrenberg sah aber von **A. vera**, so wie von **arabica**, nie Gummi sammeln, glaubt indessen, daß auch jene das Product liefern könne. Es ist aber unzweifelhaft, daß außer allen schon erwähnten Arten der Gattung auch noch die folgenden Gummibäume oder Sträucher sind: **A. Ehrenbergiana**, Hayne a. a. O. t. 29., von welcher das **Gummi Saidi** der Aegypter kommt, **A. gummifera Broussonet**, Ebend. t. 28. von Mogador, und **A. Karroo**, Ebend. t. 33. Mehr als wahrscheinlich liefern auch noch eine Menge anderer Acacien und Mimosen das **Gummi arabicum** oder doch sehr verwandte Arten. Die beiden gedachten Sorten der Aegypter, **G. Saidi** und **Tori**, werden vermischt und im europäischen Handel nicht gesondert.

Aus allen den genannten bald baum- bald strauchartigen Gewächsen fließt das Mimosengummi von selbst aus. Wir erhalten dasselbe in grobkörnigen, rundlichen und eckigen Stücken, von mehr oder weniger weißer und gelblicher, seltener röthlicher Farbe, die leicht in kleinere Stücke zerbrochen, einen mehr kleinmuschligen, auch wohl unebenen Bruch, und auf dem Bruche einen vielfach reflectirten, zum Theil irisirenden Glanz haben. Es hat keinen Geruch, einen faden, klebrigen Geschmack, ein spec. Gew. von 1,316 bis 1,482, löst sich in Wasser auf, und ertheilt diesem eine dickliche, schlüpfrige und fadenziehende Consistenz; doch giebt es einen viel dünnern Schleim, als andere schleimige Mittel. 3 Th. Wasser erhalten von 1 Th. Gummi die Consistenz eines dünnen Syrups (**Mucilago Gummi Mimosae**). Wird diese Auflösung mit ½ Borax zusammengerieben, so erstarrt das Ganze zu einer dichten gallertartigen Masse. Dieses erfolgt nach Beobachtungen von Lambert und Giesecke (Schw. N. J. XIII. S. 493.) auch mit Baryt, Kalk, Thonerde, Bittererde, Ammoniak und Kali. Setzt man etwas Zucker oder Zuckersaft hinzu, so wird die Masse wieder flüssig, ja noch flüssiger als zuvor. Wegen dieser schleimigen Beschaffenheit seiner Auflösung ist das Gummi sehr geeignet, in Wasser unauflösliche Substanzen, als Oele, Harze, Campher, Moschus u. dergl. in Mischung und Suspension zu erhalten. Weingeist wirkt nicht auf das arabische Gummi, vielmehr wird die wäßrige Auflösung durch Alkohol getrübt und gefällt.

Gegen chemische Reagentien zeigt das Mimosengummi folgendes charakteristische Verhalten. Mit dem salpeters. (oxydirten und oxydulirten) Quecksilber nimmt die Auflösung eine hellrothe Farbe an, die besonders mit dem oxydirten schön pfirsichblüthroth, und nur bei dem oxydulirten mit einer ge-

ringen Trübung nach einiger Zeit verbunden ist. Doch ist diese Reaction nicht durchaus constant, vielmehr scheint sie von einem zufällig beigemischten Bestandtheile, vielleicht vom Kleber herzurühren, welcher nach Bostock mit diesem Reagens einen bestimmt pfirsichblüthrothen Niederschlag giebt. Besonders merkwürdig ist die Reaction mit dem schwefels. Eisenoxyd, welches eine Auflösung, die ¼ arabisches Gummi enthält, sogleich in eine feste durchscheinende, pomeranzengelbe Gallerte verwandelt, welche nicht in kaltem und nur zum Theil in kochendem Wasser auflöslich ist, wobei eine Verbindung von schwefels. Eisenoxyd mit wenig Gummi ungelöst bleibt. Auch mit der bis zur Farbenlosigkeit verdünnten oxydirten Eisenauflösung findet gelbliche Farbenveränderung, eine gelbliche Trübung, und nach einiger Zeit ein ziemlich reichhaltiger weißer Niederschlag statt, der in Salpetersäure unauflöslich ist. Bleiessig (nicht Bleizucker) fällt die Auflösung des Mimosengummis weiß; Kieselerde trübt dieselbe und fällt sie nach einiger Zeit in weißen Flocken. Die übrigen Metallsalze wirken wenig oder gar nicht darauf ein.

Ammoniak, Kali und Kalk lösen das Gummi auf; die gelbliche Auflösung in Kali läßt nach einiger Zeit das Gummi käsig fallen. Mit Salpetersäure bildet es bei gelinder Erwärmung Schleimsäure und Aepfelsäure, bei stärkerer Einwirkung und Oxydation Kleesäure und etwas kleesauren Kalk. Chlorgas, durch die wäßrige Lösung geleitet, scheint Citronensäure zu bilden. Reibt man Gummipulver in der Kälte nach und nach mit Vitriolöl zusammen, so erfolgt kaum merkliche Färbung, die erst nach 24 Stunden stärker wird; wird die Masse hierauf in Wasser gelöst und durch Kreide von der Schwefelsäure befreit, so erhält man durch Abdampfen ein Gummi, welches in allen Stücken, auch in Hinsicht seines Gehaltes an Unterschwefelsäure mit dem von Braconnot aus Lumpen und Schwefelsäure erhaltenen Gummi übereinstimmt. Beim gelinden Erhitzen mit Vitriolöl erzeugt sich Wasser, kohlige Materie, sehr wenig Essigsäure, Spuren von künstlichem Gerbestoffe und Aepfelsäure.

Die verdünnte wäßrige Auflösung des Mimosengummis wird erst nach längerer Zeit schimmlig, ohne sich beträchtlich zu verändern; selbst mit Hefen versetzt zeigt sie weder geistige noch saure Gährung; nur mit der Zeit geht sie in eine Art von Fäulniß über.

Vauquelin fand in dem arabischem Gummi: 97 Gummi und 3 essig- und äpfels. Kalk, phosphors. Kalk und Eisenoxyd.

Bei der trocknen Destillation giebt es kohlensaures und brennbares Gas, wenig Ammoniak (?) haltende brenzlige Essigsäure mit etwas brenzligem Oele und im Rückstande etwas Kohle, deren Asche aus kohlens. und sehr wenig phosphors. Kalke, auch etwas Eisen besteht. Wenn man nach Berzelius die wäßrige Lösung des Gummis mit Ammoniak versetzt, und mit nicht überschüssigem, halbsalpeters. Bleioxyde fällt, so erhält man eine neutrale, nach dem Austrocknen aus (1 M. G. =) 38,25 Bleioxyd, auf (1 M. G. =) 61,75 Gummi bestehende Verbindung. Als Berzelius dieses Bleigummat durch Kupferoxyd zersetzte, fand er das arabische Gummi zusammengesetzt

aus: Wasserstoff 6,792; Kohlenstoff 41,752 und Sauerstoff 51,456; Stickstoff, eine Spur. Pleischl (Schw. N. J. XIII. S. 491.) hat im Mimosengummi auch Spuren von Schwefel und Ammoniak gefunden.

Das Mimosengummi wird zum Theil als Bindemittel angewandt, es ist aber auch an sich als ernährendes, einhüllendes und linderndes Mittel bewährt, wo die innern Canäle von dem natürlichen Mucus entblößt sind. Es wird in der Auflösung oder auch in Pulverform verordnet. Den Einwohnern Arabiens und Aegyptens dient es aber auch auf den Reisen durch die Wüsten als Nahrungsmittel.

Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts ist ein Gummi in den Handel gekommen, unter dem Namen Senegalgummi, **Gummi Senegal**, welches gleichfalls als **Gummi arabicum** gebraucht wird. Es fließt dieses Gummi aus der Senegalacacie (**Acacia Senegal**), einem den vorhergehenden sehr verwandten Baume, der in den heißesten Gegenden Afrikas zwischen dem Senegal und dem Gambiastrome sehr gemein ist. Es bildet größere rundliche, von außen rauhe Stücke, die viel schwerer zerbrechlich sind als das arabische Gummi, keine solche körnige Zusammensetzung und einen großmuschligen Bruch mit einfachem Glasglanze zeigen. Im Uebrigen verhält es sich ganz wie das arabische Gummi, von dem es sich nur nach Sickmann's Bemerkungen (Brandes's Archiv III. S. 277.) durch sauren Geruch, überhaupt saure Reaction und dadurch unterscheidet, daß es beim Auflösen und Umrühren über dem Feuer nicht wie das arabische Gummi schäumt.

Im Handel unterscheidet man wohl noch das Geddahgummi, nach dem Namen eines arabischen Hafens benannt. Dieses kommt indessen dem Senegalgummi in Rücksicht auf Form der Stücke und Bruch sehr nahe, ist mehr gelblich oder röthlich, auch weniger spröde.

Minium. Superoxydum plumbosum. Mennige.

Ein Präparat chemischer Fabriken durch Brennen des gelben Bleioxyduls.

Ein Pulver von pomeranzengelb-rother Farbe, schwer, aus Blei und Sauerstoff bestehend. Es sey rein, nicht mit Kupfer, was durch Aetzammoniakflüssigkeit, auch nicht mit Ziegel verunreinigt, was durch das Löthrohr erforscht wird.

Das Minium wird fabrikmäßig im Großen dadurch bereitet, daß man das mäßig befeuchtete feingeriebene und geschlämmte gelbe Bleioxyd, Massicot, in einem Reverberirofen 48 Stunden lang calcinirt, und durch Umrühren die Berührung der atmosphärischen Luft befördert. Sobald es die gehörige schöne rothe Mennigfarbe angenommen hat, werden die Züge zugestopft, das Brennmaterial herausgenommen, und das Bleioxyd mit dem Ofen erkalten gelassen; je langsamer dieses geht, desto schöner wird, durch Anziehen des Sauerstoffes aus der Luft, die Mennige. Nach dem Erkalten wird, zur Ab-

sonderung der vielleicht entstandenen Glätte, das Minium in eigenen verschlossenen Kasten, (damit die Gesundheit der Arbeiter nicht durch den Staub gefährdet werde) durch ein feines Haarsieb gesiebt.

Die Mennige hat eine hochrothe Farbe, welche wegen eines Rückhaltes an Massicot etwas sich ins Gelbe zieht; mit dem Finger auf Papier gestrichen, ist sie beinahe gelb, besteht aus höchst feinen, und gleichsam unfühlbaren, kleinen glänzenden Schuppen, ist geschmack- und geruchlos und in Wasser unauflöslich. In starker Rothglühhitze geht sie unter Verlust eines Antheils Sauerstoffgas in den Zustand der Bleiglätte zurück; auch bloß dem Lichte ausgesetzt, schwärzt sie sich durch Verlust von Sauerstoff. Auf einer Kohle vor dem Löthrohre verwandelt sie sich vollständig in ein Bleikorn. Sie ist ein Hyperoxydul und besteht nach Berzelius aus 89,62 Blei und 10,38 Sauerstoff (d. h. $1\frac{1}{2}$ mal so viel als das Oxyd).

Die Mennige löst sich nur dann in Säuren auf, wenn ihr der überflüssige Sauerstoff entzogen wird; wird sie z. B. mit erhitzter Schwefelsäure übergossen, so wird Sauerstoff frei und schwefels. Bleioxyd gebildet; mit wenig Salzsäure übergossen nimmt der Sauerstoff der Mennige den Wasserstoff der Salzsäure auf und bildet Wasser; der dem überschüssigen Sauerstoffe entsprechende Antheil Chlor wird frei und entweicht, wogegen der dem im Bleioxyde enthaltenen Sauerstoffe entsprechende Antheil Chlor sich dem reducirten Blei zu Chlorblei verbindet; mit der Salpetersäure und anderen schwächeren Säuren zerfällt sie in salpetersaures u. s. w. Oxyd, und in Hyperoxyd, welches letztere als braunes Pulver sich ausscheidet; der überschüssige Sauerstoff kann ihr aber auch durch einen Zusatz von Zucker entzogen werden, in welchem Falle sie sich dann vollständig auflöst. Die Mennige enthält, außer dem nicht in Mennige verwandelten Rückhalte an gelbem Bleioxyde, welches durch Digestion mit schwachem Essig ausgezogen werden kann, alle die Beimengungen, die sich in dem Bleioxyde finden, gewöhnlich einen merklichen Kupfergehalt. Die Prüfung der durch einen Zusatz von Zucker vollständig bewirkten Auflösung in Salpetersäure durch Kupferammoniak geschieht auf die bei Lithargyrum angegebene Weise. Ein betrügerischer Zusatz von Ziegelmehl wird durch Behandlung der Mennige mit dem Löthrohre auf einer Kohle leicht entdeckt; durch den Kohlenstoff wird nämlich der Sauerstoff entzogen, und das reducirte Metall bildet ein Bleikorn, das Ziegelmehl bleibt aber als solches zurück.

Die Mennige wird vorzüglich zur Bereitung des Bleiessigs gebraucht. Zu technischen Zwecken wird sie als Zusatz bei Verfertigung des Krystallglases gebraucht, welchem sie eine größere Schmelzbarkeit und Schwere, vollkommnere Durchsichtigkeit und strahlenbrechende Kraft ertheilt.

Morus. Die Früchte. Maulbeeren.

Morus nigra Linn. Ein in Europa angebauter aus Persien herstammender Baum.

Die frischen beerenartigen, mit zusammengesetzter Beere, schwar-

zen, mit einem schwarzpurpurfarbigen süßen Safte angefüllten Früchte.

Morus nigra Linn. Die schwarze oder ächte Maulbeere.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 4. Tetrandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Dieser Baum wächst in Persien wild, von dort hat man ihn in südeuropäische Gegenden verpflanzt, wo er nun einheimisch geworden ist. Nach einigen Schriftstellern stammt das Gewächs aus China her, und wurde von da nach Persien verpflanzt. Er wird jetzt in mehreren Gegenden Deutschlands und andern Ländern Europas seiner angenehmen Früchte wegen in Gärten gezogen.

Der Baum kann eine Höhe von 24—30 Fuß erreichen. Der Stamm ist mit einer aus dem Aschgrauen ins Gelbe sich ziehenden, zähen, dicken Rinde bedeckt. Die Blätter sind bald herzförmig und an der Grundfläche schief sägeförmig, häufiger aber tief fünflappig eingeschnitten und ziemlich gleichförmig gezahnt. Die männlichen Blüthen bilden grünliche, länglichrunde Kätzchen; die weiblichen Blüthen, bei denen die Blumenkrone fehlt, finden sich entweder auf demselben oder einem andern Stamme zusammengehäuft. Die Frucht ist eine fleischige, saftige, aus dem vergrößerten Kelche entstandene, anfangs hellgrüne, später halb rothe und zuletzt violettschwarze, einen dunkelrothen Saft enthaltende unächte Beere. Der Saame ist einzeln, eiförmig und spitzig.

Dieser Baum blüht im April und Mai; die Früchte reifen gegen Ende Augusts und im September. Die Früchte oder Beeren haben einen süßlichsäuerlichen Geschmack und enthalten viel Schleim. Man benutzt sie um aus dem ausgepreßten Safte derselben den Maulbeersyrup zu bereiten.

Alle die sauren Früchte, welche zu verschiedenen arzneilichen Zubereitungen gebraucht werden, enthalten theils Citronen-, theils Weinstein-, theils Aepfelsäure, und gewöhnlich alle drei in verschiedenen Verhältnissen.

Moschus. Bisam. Moschus.

Die in der Nähe der Geschlechtstheile des Männchens befindlichen, getrockneten Bälge von Moschus moschiferus Linn., einem auf den Alpen des mittleren Asiens einheimischen Thiere.

Eine thierische, salbenartige Substanz, braunschwärzlichen Körnerchen gleichend, in eine dünn auszubreitende Lage gestrichen, dann mit schimmernden Punkten, von bitterlichem Geschmacke, eigenthümlichem, höchst durchdringendem, lange anhaltendem Geruche, in dem zelligen Gewebe eines kugligen, auf der einen Seite converen, auf der anderen concaven, mit Haaren besetzten, oft mit einem Ausscheidungscanale begabten Beutels abgesondert.

Der Moschus Tunquinensis, aus dem tibetanischen und chine-

fischen Reiche zugeführt, ist auszuwählen, dessen Beutel von der Größe eines Hühnereies und kleiner, außen mit kurzen, starren, gemeiniglich bräunlichen Haaren besetzt, innen mit einem braunen zähen Häutchen bekleidet. Durchaus verwerflich ist der **Moschus Cabardinicus**, in größeren, die Größe eines Hühnereies übersteigenden, immer mit längeren weißgrauen Haaren besetzten Beuteln eingeschlossen, so auch der sogenannte **Moschus ex vesicis**, der aus den Beuteln herausgenommen worden.

Moschus moschiferus Linn. Moschusthier. Bisamthier.

Ein wiederkäuendes Säugethier, zur Ordnung der Hufer gehörig, welches keine Hörner hat. Es lebt in rauhen und felsigen Gegenden, auf den wilden Gebirgen zwischen Sibirien, China und Tibet, in welchen die großen Flüsse Asiens entspringen. Es ist von der Größe eines Rehes, sehr lebhaft, wild, und wegen der zwei langen Hauzähne merkwürdig, welche aus der obern Kinnlade hervorkommen, und weit über die untere hinausgehen. Die Farbe des alten Thieres ist braunschwärzlich, die Kehle weiß, in der Jugend hellbraun, schwärzlich und gelblich gescheckt und gestreift. Das Haar ist so grob und brüchig, daß man es beinahe stachlig nennen könnte. Der Beutel, welcher den Bisam enthält, liegt zwischen dem Nabel und den Geschlechtstheilen, gerade vor der Vorhaut des Männchens und ist nur bei diesem vorhanden.

Man hat beobachtet, daß sich in der Brunstzeit der Moschus am reichlichsten absondert, und daß alsdann der Geruch und die übrigen Eigenschaften desselben am stärksten sind. Bei dem lebenden Thiere ist der Bisam halbflüssig, der nach dessen Tode getrocknete erscheint aber fest und klümperig. Er hat eine schwärzlichbraune Farbe, einen gewürzhaft bittern Geschmack, und einen äußerst starken Geruch.

Der allein zum medicinischen Gebrauche geeignete orientalische oder tunquinensische Moschus kommt in mehr runden als länglichen Beuteln vor, die $1\frac{1}{3}$—$1\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser haben, und $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ Drachmen und drüber Moschus enthalten. Buchner (Repert. XXII. 1825. S. 152.) giebt eine Beschreibung eines Moschusbeutels, der als zuverlässig ächt anzusehen war, welche ihrer Vollständigkeit wegen hier folgen mag. Es war der größte Moschusbeutel, den B. je gesehen. Er war beinahe kreisrund und hatte 2 Zoll im Durchmesser; er wog sammt dem daran hängenden Hauptstücke $1\frac{1}{2}$ Unze und 23 Gran. Der Beutel ist flach und befindet sich noch in seiner natürlichen Verbindung mit einem beträchtlichen Stücke der allgemeinen behaarten Bedeckung von der Unterleibsgegend des Moschusthieres. Auf einer Seite, wohin die Ausführungsgänge des Beutels zu gehen scheinen, befinden sich noch Ueberreste von den Zeugungstheilen. Die Lederhaut, welche den Beutel ringsum 2—3 Linien breit umgiebt, ist von außen ziemlich dicht mit Haaren bedeckt, welche 2—3 Linien lang, unten graulichweiß, oben gelblich, ziemlich

dick, in der Substanz schwammig sind, gegen den Beutel zu immer kürzer werden, und gegen den Mittelpunkt desselben wirbelig anliegen. Der Beutel ragt von außen nicht sehr stark hervor, und ist im Mittelpunkte mit einem schwarzen Siegel versehen, worauf sich orientalische Charaktere, wahrscheinlich als Ursprungszeichen befinden. Wenn man den Beutel entleert, so findet man, daß das Siegel eigentlich eine Oeffnung bedeckt, an welcher die Haare von der äußern Bedeckung nach einwärts gehen, und den Moschus, welcher hin und wieder mit kurzen abgerissenen Härchen untermengt ist (wahrscheinlich durch Lecken des Thieres mit der Zunge selbst hineingebracht), unmittelbar berühren. (Andere Beutel gleichfalls ächten Moschus hatten nicht ein gleiches Siegel, jedoch die Oeffnung.) Auf der innern Seite ist das Corium über dem Beutel flach gewölbt erhaben, so daß man eigentlich nur auf dieser Seite den Umfang des Beutels sehen kann. Von einer künstlichen Oeffnung, von einer Naht oder zugeleimten Stelle konnte nirgends Etwas bemerkt werden.

Das vorzüglich Unterscheidende von gewöhnlichen Moschusbeuteln ist also theils das beträchtliche Stück der behaarten Haut, welches sich ringsum noch daran befindet, wodurch man sieht, daß der Beutel von außen wenig hervorragt, theils die mit einem Siegel verschlossene Oeffnung auf dem Scheitel, wodurch die kurz behaarte Bedeckung sich nach innen umstülpt. Daß diese Oeffnung bei den gewöhnlichen Moschusbeuteln fehlt, ist nicht zu erklären.

Der Geruch war außerordentlich stark und rein nach Moschus, und nur wenig ammoniakalisch.

Beim Aufschneiden des Beutels zeigte sich nichts Ungewöhnliches, nämlich unter der Lederhaut ein ziemlich feines braungefärbtes, durchscheinendes Aderhäutchen, welches sich von der ersteren leicht lostrennen ließ, und den Moschus zunächst bedeckte. Dieses Häutchen besteht wieder aus zwei Schichten, wie man deutlich sehen kann, wenn man es in Wasser weicht. Der Moschus war von gewöhnlicher schwarzbrauner Farbe, aus rundlichen Klümpchen und dazwischen liegenden etwas hellen, braunen, aufgelockerten, leicht zerreißbaren Häutchen bestehend. Er war trocken, ohne jedoch rauh oder pulverig zu seyn, er fühlte sich weich an, und war auf Papier gestrichen gelblichbraun, wie ein Pflanzenextract, durchaus nicht sandig. Uebrigens sind die Klümpchen und die membranösen Theilchen weder unter einander noch mit dem umschließenden Häutchen irgendwo organisch verwachsen; es zeigt sich nirgends ein deutliches Zellgewebe.

In Rücksicht der bei diesem ächten Moschusbeutel vorhandenen, durch ein Siegel verschlossenen, bei den gewöhnlichen Moschusbeuteln aber fehlenden Oeffnung, ist zu bemerken, daß schon früher Wetzler (Buchn. Repert. XVI. S. 222.) bei Moschusbeuteln, deren Inhalt ächt zu seyn schien, in mitten des Haarscheitels, eine kleine runde Oeffnung von der Größe eines großen Stecknadelkopfes, was auch schon Buchner bemerkt hatte, gefunden hat. W. vermuthet, daß durch diese im frischen Zustande des Beutels größere Oeffnung, die durchs Trocknen verengert werde, der Inhalt des Beutels

geleert, und dieser dann wieder gefüllt werde, und es sey wohl denkbar, daß aller im Handel vorkommende Moschus auf diese Weise durch Künstelei vermehrt, und der Ueberschuß von dem asiatischen Luxus verbraucht werde.

Diese Klage über Verfälschung des Moschus, wozu der hohe Preis desselben hinreichende Anreizung giebt, ist zwar schon sehr alt, leider aber auch nicht ungegründet, denn nicht allein, daß man zur Vermehrung des Gewichts Stückchen Blei, oder einen bleiernen Ring von der Größe des Beutels eingenäht, oder, wie ich unlängst in einem Beutel, dessen Inhalt alle Kennzeichen eines unverfälschten Moschus darbot, gefunden habe, Stückchen Kautschuck, durch eine künstliche Oeffnung hineingesteckt, eine volle Drachme an Gewicht, antrifft, sondern es kommen auch Beutel vor, die so künstlich wieder zusammengenähet sind, daß man diesen Betrug erst beim Durchschneiden des Beutels bemerken kann. Die häufigste Verfälschung, die zugleich am schwersten zu entdecken ist, besteht in der Vermischung mit getrocknetem Blute, welcher der so genannte **Moschus ex vesicis** am leichtesten ausgesetzt ist, daher dieser denn auch nie unverfälscht vorkommen dürfte, mit Recht also aus der medicinischen Praxis verwiesen wird. Aber auch bei dem **Moschus in vesicis** hat man mit der größtmöglichsten Sorgfalt darauf zu sehen, daß die zum Gebrauche bestimmten Beutel nicht schon äußere Kennzeichen künstlicher Behandlung verrathen, weshalb ein vielleicht etwas höherer Preis niemals gescheut werden darf. Demohngeachtet wird der Apotheker wohl nur selten mit völliger Gewißheit und Ueberzeugung die Aechtheit seines Bisams behaupten können, da oft genug selbst der aus unverdächtigen Beuteln entleerte Bisam nicht den kräftigen durchdringenden Geruch erkennen läßt, welcher dem Moschus eigenthümlich ist. Die Klage über schlechten Moschus ist demnach leider oft genug begründet, ohne daß uns Mittel zu Gebote stehen, diesem Uebelstande abzuhelfen. Andrerseits geht man aber wohl auch zu weit, wenn man behauptet, daß niemals ächter und unverfälschter Moschus vorkomme.

Ein anderer Uebelstand wird ferner dadurch herbeigeführt, daß die Kaufleute den Moschus, um das Gewicht desselben zu vermehren, an feuchten Orten aufheben, und dann in fest verschlossenen blechernen Kasten aufbewahren. Hiedurch erleidet aber der Moschus, nach der Bemerkung der Herren Blondeau und Guibourt, wie alle stickstoffhaltige Materien, bald eine Veränderung; es bildet sich Ammoniak, dieses wirkt auf den Talgstoff im Moschus ein, verwandelt diesen zum Theil in Talgsäure, und bildet mit ihm eine dem Leichenfette ähnliche Verbindung. Nicht aller Bisam hat diese Veränderung in gleich hohem Grade erlitten, doch ist er immer etwas verändert; diese Veränderung äußert sich aber nur auf den Eiweißstoff, die Gallerte und den Faserstoff, als die unwirksamen Bestandtheile des Moschus, und der dadurch entstehende Nachtheil werde zum Theil durch das in eine seifenartige Verbindung verwandelte Ammoniak ersetzt.

Eine interessante Seltenheit sind die Concretionen, die sich in den Moschusbeuteln finden sollen. Diese werden in Ostindien außerordentlich geschätzt,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0642-3

und daher, wo man sie durch das Gefühl in den Beuteln erkennen kann, zum Gebrauch für die einheimischen Fürsten herausgenommen. Pfaff (Syst. d. Mat. med. VII. S. 286.) beschreibt zwei dergleichen, eine rund, die andere plattgedrückt, 5 und 5½ Gran schwer, von dunkelbrauner Farbe, rauher und matter Oberfläche, von sehr angenehmen Moschusgeruche. Im Innern zeigten sie keine Schichten oder sonstige Absonderungen, sondern sie haben ein ganz gleichartiges, schimmerndes, fast harziges Ansehen, und dieselbe braune Farbe wie außen; ihr chemisches Verhalten war mit dem Moschus übereinstimmend, nur waren sie trockener.

Der kabardinische oder russische Moschus (Moschus cabardinicus s. moscowiticus) kommt aus Sibirien in größeren, mehr länglichen, an dem einen Ende zugespitzten und mit längern weißen, gewissermaßen silberfarbigen Haaren besetzten Beuteln vor. Der darin enthaltene Moschus riecht viel schwächer, dabei widrig, dem Pferdeschweiße ähnlich, ohne merkliche Ausdünstung von Ammoniak; seine Farbe ist heller, mehr gelbbraun, seine Form kleinkörniger, fast pulverig. Er darf nie in den medicinischen Gebrauch gezogen werden.

Der Moschus ist vielfach zerlegt worden. Thiemann (Berl. Jahrb. 1803. S. 100.) fand in 100 Th.: Harz 1; Wachs 9; leimartige Substanz 60; eiweißartige Substanz und thierische Haut 30. Bucholz (Taschenbuch 1805. S. 169.): in Wasser auflösliche Theile 70—85; in Alkohol auflösliche Theile 18—25. Wetzler: in Wasser auflösliche Theile 55; in Alkohol auflösliche Theile 27. Es scheint hienach, daß der Moschus nicht immer von gleicher Beschaffenheit sey.

Eine sehr belehrende Arbeit über den Moschus verdanken wir den Herren Blondeau und Guibourt (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 349.). 100 Th. Moschus verloren durch Austrocknen an Feuchtigkeit 46,925, an Ammoniak 0,825. Aether zog eine wie gelbes Wachs aussehende Materie aus, 13,000, welche durch heißen Alkohol in 3 verschiedene fette Substanzen zerlegt wurde. Beim Erkalten schied Talgstoff in glänzenden Tafeln aus; der Oelstoff blieb in Alkohol aufgelöst. (Beide Fette kommen mit dem Fette der Schafe und anderer wiederkäuenden Thiere überein). Was der Alkohol nicht aufgelöst hatte, war Gallensteinfett, welches dem der menschlichen Gallensteine ähnlich zu seyn schien. Sie erkannten auch ein saures Oel mit dem Ammoniak verbunden, flüchtiges Oel und eine Spur Säure. Der rückständige Moschus gab mit Alkohol behandelt ein orangebraunes Extract von einem thierischen Geruche und widerlichen Geschmacke 6,000, welches enthielt: Chlolesterine, saures Oel mit Ammoniak verbunden, salzsaures Ammoniak, Kali und Kalk, und eine unbestimmte Säure, welche zum Theil mit den Basen gesättigt war. Der so erschöpfte Moschus mit kaltem Wasser behandelt, gab nach dem Verdampfen eine dunkelbraune Substanz, die sich in Schuppen absetzte, 19,000, welche bestand aus: salzs. Kali und Kalk, unbestimmter Säure, Gallerte, auflöslichem Kalksalze mit verbrennlicher Säure, sehr gekohltem nur in Wasser auflöslichem Extractivstoffe und phosphors. Kalke. Der Rückstand

wurde von Ammoniak bis auf einen unbedeutenden Theil aufgelöst, 12,000, und die Auflösung enthielt Eiweißstoff und phosphors. Kalk. Das Unaufgelöste betrug 2,750, bestehend aus Faserstoffe, kohlens. Kalke, phosphors. Kalke, Haaren, Sand ꝛc.

Auch Buchner hat den Moschus, aus dem vorhin beschriebenen Beutel genommen, untersucht. 1000 Th. desselben (Klümpchen und Häutchen unter einander) lieferten: flüchtige Bestandtheile 176; braunes mit kaltem Wasser ausziehbares Extract 344; mit kochendem Wasser ausziehbares Extract 205; unauflöslichen Rückstand 275. Das kalte Infusum besitzt einen stechend salzigen Geschmack und enthält freies Ammoniak, salzs. Ammoniak, schwefels. Kali, schwefels. Kalk, das riechende Princip zum größten Theil, und eine braune Substanz, welche sich wie eine schwache Säure verhielt, und nur vermöge des freien Ammoniaks in Wasser auflöslich war; denn so wie sich das Ammoniak beim Abdampfen verflüchtigt, fällt diese Substanz als schwarzbraunes Pulver unauflöslich nieder. Auf Zusatz von Ammoniak oder Kali löst sie sich wieder sehr leicht und vollkommen auf. Vom Weingeiste wird sie nur zum Theil aufgelöst, von Salzsäure aber mehr verdichtet und zusammenhängend gemacht. Diese wie eine Säure wirkende Materie ist diejenige, welche Blondeau und Guibourt kohlige Materie, gekohlten Extractivstoff, genannt haben; sie nähert sich zwar dem Ulmin und der pectischen Säure Braconnot's, allein sie scheint in ihrem chemischen Verhalten ganz eigenartig zu seyn, und vielleicht den Namen Moschussäure zu verdienen.

Der kochend bereitete wäßrige Auszug scheint noch etwas von der nämlichen Substanz nebst Gallerte zu enthalten, wenigstens giebt das Decoct mit Galläpfeltinctur einen gelblichbraunen flockigen Niederschlag; die durchs Abdampfen concentrirte Flüssigkeit gelatinirt aber beim Erkalten nicht merklich.

Was das Wasser unaufgelöst zurückläßt, verhält sich größtentheils wie verhärteter Mucus oder Eiweißstoff, und löst sich in kochender Kalilauge auf. Diese Auflösung ist braun, und scheint auch noch Moschussäure zu enthalten. Auch befinden sich dabei die talg-, fett- und cholesterinartigen Bestandtheile, welche von Blondeau und Guibourt entdeckt worden sind, und sich mit Aether ausziehen lassen.

Es ergiebt sich hieraus, daß der von Buchner untersuchte Moschus in seinen Haupteigenschaften mit jenem übereinstimmt, welchen Thiemann, Bucholz, Wetzler, Blondeau und Guibourt als ächt untersucht haben, obgleich die quantitativen Resultate verschieden sind, was sich leicht erklären läßt.

Der Moschus ist als äußerst kräftiges tonisches und reizendes Mittel bekannt, er wird fast nur allein in Pulverform, mit Zucker abgerieben, sehr selten in der geistigen Tinctur verordnet.

* Muscus corallinus. Korallenmoos. Wurmmoos.

Ein Pflanzenthier, welches im europäischen Oceane und im mittelländischen Meere auf Klippen, Steinen und Conchylien sitzend gefunden wird, von

rother, grüner, aschgrauer und weißer Farbe, welche erstere Farben aber in der Luft verbleichen und sich in Weiß umändern.

Wir erhalten dasselbe in abgebrochenen Stücken, die aus zarten, kreiselförmigen, glatten Gelenken zusammengesetzt und meist doppelt gefiedert sind, (gegen einander stehende Seitenzweige haben). Es ist sehr zerbrechlich, hat einen ekelhaften Geruch und salzigen Geschmack. Für sich destillirt giebt es einen empyreumatisch-ammoniakalischen Spiritus und etwas brenzliges Oel. In Salpetersäure löst es sich unter Aufbrausen bis auf wenige zarte fadenartige Theile auf. Kohlensaurer und etwas phosphorsaurer Kalk, thierische Gallerte und einige salzige Theile machen die Bestandtheile aus.

Myrrha. Myrrhe.

Ein an der Luft verdickter Saft von Amyris Kataf Forsk., einem in Oberägypten und Nubien einheimischen Baume.

Ein Gummiharz in Stücken von der Größe einer Haselnuß und Wallnuß, zerreiblich, leicht, etwas durchscheinend, braunroth, hin und wieder mit kleinen weißen eingemischten Flecken, fettglänzend, von bitterm und gewürzhaftem Geschmacke, und gewürzhaftem nicht unangenehmen Geruche. In der Wärme schmilzt es nicht, sondern verbrennt sogleich. In Wasser wird es fast ganz mit gelbbrauner trüber Auflösung, in Alkohol zum Theil mit gelbbrauner klarer Auflösung aufgelöst. Es kommt mit verschiedenen Harzen und auch mit Stücken des arabischen Gummis gemischt vor.

Amyris Kataf Forsk. Myrrhen-Amyris.
Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Therebinthaceae.

Von diesem, in Arabien, dem östlichen und westlichen Afrika einheimischen Baume leitet man die Myrrhe ab, und Ehrenberg hat die Wahrheit dieser Abstammung neuerlich erwiesen. Forskål sagt, daß eine der Amyris Kataf nahe verwandte Art dieses Arzneimittel liefere.

Dieser Baum hat unbewehrte Aeste und dreizählige Blätter, die Blättchen eiförmig, am Ende sägezähnig. Die gabeläftigen Blüthenstiele stehen gedrängt am Ende der Zweige. Die Blüthen sind zweihäusig.

Die beste jetzt vorkommende Myrrhe besteht aus eckigen, von außen unansehnlichen, abgeriebenen Stücken, die auf dem Bruche rothbraun sind. Spec. Gew. nach Brisson = 1,360. Als feinste Sorte erhielt ich jedoch unter dem Namen **Myrrha in lacrymis** eine Myrrhe, aus lauter kleinen unregelmäßigen, durchscheinenden, rothbraunen Thränchen bestehend. Der Geschmack der Myrrhe ist ziemlich bitter, dabei erwärmend, gewürzhaft; der Geruch stark, aromatisch, nicht unangenehm, eigenthümlich. Beim Kauen hängt sie sich an die Zähne, und löst sich größtentheils im Speichel auf, der davon milchig wird.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0645-0

Eine schlechtere Sorte (Myrrha natural. s. in sortis) besteht aus größeren dunkelbraunen, ja schwarzbraunen, undurchscheinenden Stücken, die auf dem Bruche nicht jenen auffallenden Fettglanz haben. Nicht selten findet man Stücke von Senegal- oder Kirschgummi, oder einem andern eigenthümlichen Gummiharze, von muschligem Bruche und gelblichweißer Farbe, darunter gemischt, die sich aber leicht erkennen lassen.

Die schlechteste Sorte (Myrrha sordida) ist Kunstproduct, nämlich Stücke von anderm Gummi ꝛc. mit Myrrhentinctur befeuchtet, und ganz verwerflich.

Gepulvert erscheint die Myrrhe als ein nur locker zusammenhängendes, braungelbes, etwas glänzendes Pulver, wie mit einem fetten Oele getränkt.

In der Wärme schmilzt die Myrrhe nicht, sie läßt sich aber am Lichte entzünden, und brennt mit heller Flamme. In Wasser, Wein, Bier und Essig ist sie auflöslicher als in Weingeist. Die Oele wirken nicht merklich darauf, in versüßten Säuren aber und in ammoniakhaltigem Weingeiste, so wie in Kalkwasser ist sie fast völlig auflöslich.

Nach Pelletier besteht die Myrrhe aus Harz, welches auch ätherisches Oel enthält, 34, und auflöslichem Gummi 66.

Eine vollständige Analyse verdanken wir Brandes (Almanach 1819. S. 51. und Berl. Jahrb. XXII. S. 275.); nach derselben enthalten 500 Th. auserlesener Myrrhe: ätherisches Oel 13; Balsamharz 111,20; Halbharz, nur in Alkohol löslich, 27,80; Gummi mit Spuren von benzoës., äpfels., phosphors. und schwefels. Kali- und Kalksalzen 271,92; Traganthstoff 46,83; vegetabilisch-thierische Materie, eine Spur von schwefels. und äpfels. Kali- und Kalksalzen, 8; Aepfelsäure, Benzoësäure und Essigsäure an Kali und Kalk gebunden 8; sauren äpfels. Kalk und benzoës. Kali 0,75; fremde Beimischungen 8; Feuchtigkeit 17. S. = 502,50.

Das ätherische Oel zeigte sich zum Theil auf dem Wasser schwimmend, zum Theil zu Boden sinkend; doch senkte sich auch bald das erste zu Boden, wahrscheinlich verdichtet durch etwas aus der Luft angezogenen Sauerstoff, wobei es seine weiße Farbe in die gelbe verändert. In dem Balsamharze, nebst dem ätherischen Oele, scheinen alle Kräfte der Myrrhe concentrirt zu seyn, denn letzteres zeichnet sich durch einen anfangs gelind bittern, myrrhenhaften, nachher stark bittern und dabei stechenden Geschmack aus.

Die Myrrhe ist, sowohl innerlich als äußerlich angewandt, in Pulverform, im geistigen und wäßrigen Auszuge, ein sehr wirksames Arzneimittel.

* Myrtillus. Die Beeren. Heidelbeeren. Blaubeeren. Bickbeeren.

Vaccinium Myrtillus Linn. Gemeine Heidelbeeren.
Linn. Cl. VIII. Octandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 3. Ericeae.

Der kleine gemeine Heidelbeerstrauch, eine perennirende Pflanze, wächst in den bergigen, schattigen, trocknen Waldungen, Gehölzen und Heiden

Deutschlands, Frankreichs und Englands, so wie auch noch in mehreren andern Ländern des nördlichen Europas sehr häufig.

Die Wurzel ist holzig, hart, dünn, faserig, und pflanzt sich gewöhnlich ziemlich weit unter der Erde kriechend fort. Der strauchartige eckige Stengel theilt sich fast von seiner Basis an in Aeste, welche glatt, dünn, biegsam, sehr winklig, mit hellgrüner Rinde, die ältern rothgrau, bedeckt sind, und eine Höhe von 8—12 Zoll erreichen. Die glatten, kurzgestielten, abwechselnden, eirund-lancettförmigen, an ihren Rändern gesägten, steifen, grünen, unten etwas nervigen Blätter fallen im Winter ab, werden aber vorher hochroth. Die kleinen, gestielten Blumen hängen einzeln in den Blattwinkeln, sind bauchig und von weißer und röthlicher Farbe. Der kleine einblättrige Kelch steht über dem Fruchtknoten, und ist mit vier Zähnchen gekrönt; die Blumenkrone ist glockenförmig, einblättrig, mit vier sehr kurzen Zähnen versehen.

Die Frucht, eine kugelrunde, schwarze, blaugrau bereifte Beere, von der Größe eine Erbse, an dem abgestutzten Ende mit dem Kelchsaume gekrönt. Sie ist fleischig, saftig, das Fleisch violett gefärbt; jedes der 5 Fächer, die sie enthält, umschließt 8—10 sehr kleine Saamen.

Die Blüthezeit dieses kleinen Strauches ist Mai und Juni; die Früchte reifen im Juli. Diese besitzen einen schleimigen, säuerlich-süßen, etwas zusammenziehenden Geschmack und werden sowohl frisch als Nahrungsmittel, als auch getrocknet benutzt.

Sie enthalten eine ziemliche Menge Farbestoff, oder vielmehr farbigen Extractivstoff, denn der Saft wird durch Alkalien grüngefärbt, und durch essigsaures Blei indigblau niedergeschlagen, wobei die Flüssigkeit entfärbt wird; dieser farbige Extractivstoff wird von Wasser und von Weingeist aufgenommen. Außerdem findet sich darin Schleimzucker, Citronen- und Aepfelsäure und wenig Ferment. Die Kerne sind ölig.

Die Stengel und Blätter sind von herbem, zusammenziehendem Geschmacke und werden in mehreren nördlichen Gegenden zum Gerben gebraucht.

Natrum carbonicum crudum seu Sal Sodae crudum seu Alkali minerale crudum. Carbonas natricus cum aqua crudus. Rohes kohlensaures Natron oder rohes Sodasalz oder rohes mineralisches Laugensalz.

Wird in chemischen Fabriken aus dem schwefelsauren Natron durch Brennen mit Kohlen und gebranntem Kalke, dann durch Auslaugen und Krystallisation des Rückstandes bereitet.

Ein Salz in krystallinischen, weißen, durchscheinenden, an der Luft zerfallenden Stücken, von laugenhaftem kühlendem Geschmacke, in zwei Theilen Wasser auflöslich, aus Natron, Kohlensäure und einer großen Menge Wasser bestehend, sehr oft mit

eingemischtem schwefelsauren Natron, auch salzsaurem Natron und schwefelwasserstoffsaurem Natron. Dieses wird durch den Geruch, besonders beim Daraufgießen von Schwefel- oder einer andern Säure, jene werden durch Niederschlagung mittelst salzsaurer Baryt- und salpetersaurer Silberauflösung, wenn das Natron vorher mit Salpetersäure neutralisirt worden ist, erforscht. Das durch Metalle verunreinigte werde verworfen, was, nach Neutralisirung mit Salpetersäure, durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser und durch eisenblausaure Kaliauflösung erkannt wird.

Das Natron, das Nitron der Alten *), hat in früherer Zeit den Namen mineralisches Alkali erhalten, weil es in mineralischen Krusten oder Spalten gefunden wird. Haidinger (Poggendorff's Annalen 1825. XI. S. 367.) beschreibt ein solches natürliches kohlensaures Natron, Trona genannt, welches wahrscheinlich das von Plinius beschriebene ist. Das Natron ist in mehreren Mineralien, als Natrolith, Sodalith, Nephelin u. s. w. enthalten, auch wittert es an vielen Stellen auf der Oberfläche der Erde aus. So findet man es ausgewittert in Aegypten, an den Natronseen in Ostindien, Persien, in Ungarn, in den heißen Quellen von Island und in vielen andern Mineralquellen. An den Orten, wo dieser Fall sich zeigt, ist der kalkhaltige Boden mit Kochsalz oder Glaubersalz haltendem Wasser getränkt; diese Salze werden durch die überwiegende Menge Kalk größtentheils zersetzt, und das ausgeschiedene kohlensaure Natron efflorescirt, wobei es noch immer viel Glaubersalz und Kochsalz enthält. Wenn man Kochsalz mit gebranntem Kalke mengt, und das Gemenge stets feucht enthält, so fängt nach einiger Zeit kohlensaures Natron an auf der Oberfläche zu effloresciren. Doch giebt dieses Verfahren eine so geringe Ausbeute, daß es als Bereitungsweise im Großen nicht lohnend seyn würde. Auf diese Weise erfolgt auch das Auswittern von kohlensaurem Natron aus alten Mauern, wenn der Kalk dazu mit Seewasser, oder mit einem anderen gesalzenen Wasser gelöscht worden ist.

Das auf diese Weise aus dem dann gleichsam bereiften Boden auswitternde oder durch das Eintrocknen der Natronseen bei der heißen Jahreszeit auf dem Boden ausscheidende Salz wird sorgfältig zusammengekehrt und entweder so, wie es ist, in den Handel gebracht, oder vorher durch Auflösen und Eindampfen von der beigemischten Erde befreit. In Südamerika, südwestlich von Merida, wird nach einer Nachricht von Rivero und Boussingault, aus einem kleinen See seit langen Jahren ein Salz, Urao genannt, ausgebracht, welches ganz ähnlich wie das Trona zusammengesetzt ist, und aus

*) Plinius beschreibt das Nitrum, welches in Aegypten in der Nachbarschaft von Naucratis und Memphis gefunden wurde, folgendermaßen: **Lapidescit ibi in acervis: multique sunt tumuli ea de causa lanei.**

41,22 Natron, 39,00 Kohlensäure, 18,80 Wasser, 0,98 fremden Substanzen und 0,98 Verlust besteht. Mehrere Mineralwässer, als das Karlsbader, das Bilinerwasser ꝛc. enthalten gleichfalls Natron.

Wenn wir das Kali sehr reichlich in dem Pflanzenreiche antreffen, so finden wir dagegen, daß das Natron, welches überhaupt sparsamer in der Natur vorkommt, als das Kali, mehr im thierischen Organismus, und nur gleichsam ausnahmsweise in denjenigen Pflanzen vorhanden ist, welche an den Meeresufern entweder von selbst wachsen, oder daselbst angebaut werden. Diese Pflanzen nehmen aber nicht aus dem mit Seewasser getränkten Boden das Kochsalz als solches auf, sondern dieses wird durch den Lebensproceß der Pflanzen zersetzt, und pflanzensaures Natron gebildet. Beim Verbrennen der Pflanzen wird die organische Säure zerstört, und die dabei erzeugte Kohlensäure tritt an das Natron, und kohlensaures Natron wird erhalten. Solche Pflanzen sind Salsola Kali, S. Natron, S. Tragus, Salicornia herbacea, Soda maritima, Atriplex maritima u. s. w., aus denen an den Meeresufern von Frankreich, Spanien, Italien und Rußland die im Handel unter dem Namen Barilla vorkommende unreine Substanz bereitet wird. Diese Pflanzen werden in niedrigen sumpfigen Gegenden an der See oder auch an Salzsümpfen mit Fleiß angebaut. Die künstliche Erziehung der Barillapflanze (Salsola Kali) ist sehr mühsam und kostbar. Der Boden, welcher zugleich niedrig und nahe am Meere belegen seyn muß, muß erst sehr viel gepflügt und von allem Unkaut gereinigt werden; dann säet man die Pflanze im Februar oder März und jätet fleißig alles Unkraut aus; ein Insect indessen (Brucus Salsolae kali oder Masone) zeigt sich oft nach starkem Regen in der Pflanze und vernichtet sie. Im October schneidet man die Barilla, und legt passende Haufen über ein Gitter mit einer Höhlung unter demselben. Wenn die Barillapflanze fast trocken ist, so zündet man solche an und sammelt die in die Höhlung hineingefallene Asche, die sich in großen Klumpen an einander setzt. Die kleineren Stücke und der Staub haben einen geringeren Werth.

Die rohe Soda kommt in Stücken zu uns von verschiedener Größe, welche bei einer guten Soda fest, sehr hart, schwer, trocken, klingend, inwendig löcherig, von blaulicher Farbe sind, mit kleinen weißen Flecken vermischt. Sie enthält etwa 20 Procent, die beste Barilla, die von Alicante, höchstens 40 Procent kohlensaures Natron, die übrigen 60 sind salzs., schwefels., iodwasserstoffs. Natron, ferner Kalk- und Talkerde, Kieselerde und Metalloxyde, als Eisen ꝛc. Der Kelp oder die Varecsoda, die aus eingeäscherten, im Meere selbst wachsenden Pflanzen, den Tangarten, gewonnen wird, enthält kaum 4—5 Procent Natron; ihr Gehalt an Jod giebt ihr aber jetzt einen gegen den früheren um vieles höheren Werth. Man kann aus diesen Sodaarten durch Auslaugen und Krystallisiren zwar auch ein reineres kohlensaures Natron gewinnen, indessen werden sie größtentheils zur Färberei, zur Bereitung der alicantischen Seife ꝛc. verbraucht.

Großentheils wird das rohe Mineralalkali aus dem Glaubersalze bereitet.

Man zersetzt das Glaubersalz durch Kali — auf 8 Th. krystallisirtes Glaubersalz 3½ Th. gereinigte Potasche — und scheidet das schwefelsaure Kali und kohlensaure Natron durch Krystallisation. Am häufigsten aber befolgt man die Methode, das Glaubersalz durch Brennen mit Kohle und Kalk zu zersetzen. Man mengt nämlich gleiche Theile getrocknetes Glaubersalz und Kreide und ⅔ Kohlenpulver, erhitzt die Masse bei heftigem Feuer, bis sie anfängt weich zu werden, darauf wird dieselbe ausgegossen, zerstückt, noch heiß in Wasser aufgelöst, die Lauge filtrirt und zum Krystallisiren gebracht. Hierbei wird durch das Glühen mit Kohle der Schwefelsäure im Glaubersalz der Sauerstoff entzogen, und Schwefelnatron gebildet, welches durch den Kalk wieder zersetzt wird. Beim Auflösen in Wasser bleibt die schwerlösliche Kalkschwefelleber auf dem Filter zurück. Die Lauge erfodert oft mehrere Tage, ehe sie krystallisirt, weil das Natron noch nicht genug Kohlensäure enthält, und diese erst aus der Luft anziehen muß. Auch folgendes Verfahren soll man jetzt in Frankreich befolgen: man löst Kalk in brenzliger Holzsäure auf, deren Oel auf der Auflösung oben schwimmt, und abgenommen wird. Nachdem die Säure mit Kalk gesättigt worden, setzt man so viel schwefelsaures Natron zu, als der durch Areometer zu bestimmende Gehalt der holzsauren Kalkauflösung fodert. Die Schwefelsäure verläßt hier, ihrer näheren Verwandtschaft zum Kalke folgend, das Natron und bildet schwefels. Kalk oder Gyps, welcher zu Boden fällt. Die darüber stehende Flüssigkeit giebt abgeraucht essigs. Natron, welches in einem Ofen geröstet kohlens. Natron liefert; dieses in heißem Wasser aufgelöst, giebt beim Erkalten sehr reine Krystalle von kohlens. Natron.

Die rohe Soda, wie sie im Handel vorkommt, sie mag auf die eine oder die andere Weise gewonnen worden seyn, ist mehr oder weniger mit Neutralsalzen, Erden u. s. w., außerdem aber noch mit schwefligs. Natron verunreinigt. Hensmans (Kastn. Archiv IX. 1. 1826. S. 83.) hat in der Varecsoda aus der Normandie einen Phosphorgehalt bemerkt, welcher in Körnern von sehr verschiedener Größe, nämlich von dem unmeßbaren Umfange eines feinen Staubes bis zu dem Vierfachen des Volums einer Erbse, von denen die größeren mit einer schwarzen Hülle umkleidet sind, vorkommt, und eine eigenthümliche, mit Phosphor übersetzte, noch näher zu bestimmende, metallisch-erdige (?) Phosphorverbindung zu seyn scheint, die aber so reich an Phosphor ist, daß die Körner oder Steinchen, zwischen den Fingern gerieben, diese mit einer leuchtenden Materie bekleideten, wobei sich ein starker Phosphorgeruch entwickelte. Um die Menge der fremdartigen Beimischungen, oder vielmehr den Gehalt an reinem Natron in einer fraglichen Sorte Soda zu bestimmen, muß diese in Wasser aufgelöst, die Auflösung filtrirt und die Sättigung mit Schwefelsäure auf dieselbe Weise, wie bei Kali carbonicum crudum, bewirkt werden. 6½ Th. concentrirte Schwefelsäure zeigen dann 4 Th. ätzendes, völlig wasserfreies Natron an. Würden also z. B. 20 Th. käufliche Soda 6½ Th. concentrirte Schwefelsäure zur völligen Sättigung erfodern, so wären in diesen 20 Th. roher Soda nur 4 Th. ätzendes Natron

enthalten. Wenn aber die Soda, wie es fast immer der Fall ist, schwefels. Natron enthält, so giebt diese Probe den Gehalt an Natron zu hoch an, weil das auflösliche schwefligs. Natron durch die Schwefelsäure zersetzt wird, ehe sich der Neutralisationspunkt durch die gewöhnlichen Mittel auffinden läßt. Die zur Probe bestimmte Soda muß daher vorher mit etwas chlorsaurem (oxydirtsalzs.) Kali geglüht werden. Dieses Salz giebt in der Hitze Sauerstoffgas aus, durch welches die schweflige Säure in Schwefelsäure und das Salz in schwefels. Natron umgeändert wird, so daß nur die Menge der zur Sättigung erfoderlichen Schwefelsäure mit Sicherheit auf den wirklichen Natrongehalt der Soda schließen läßt.

Zum pharmaceutischen Gebrauche wird indessen die rohe Soda nicht verwendet, sondern nur das aus derselben oder aus andern Zubereitungen gezogene krystallinische Salz, welches jedoch noch salzige Verbindungen enthält, und also noch einer Reinigung bedarf.

Natrum muriaticum seu Sal culinare. Chloretum Natrii. Salzsaures Natron oder Küchensalz.

Wird in unsern Salzwerken durch Verdampfung der Salzsoole bereitet.

Kleine kubische, gemeiniglich hohle Pyramiden darstellende, weiße, durchscheinende, in drei Theilen auflösliche, im Feuer verknisternde Krystalle. Das salzsaure Natron besteht aus Natrium und Chlor, oft mit eingemischter salzsaurer Magnesia und schwefelsaurer Kalkerde. Der Luft ausgesetzt werde es nicht gar zu feucht, und in wenigem Wasser aufgelöst lasse es nicht eine zu große Menge fremdartiger Körper fallen.

Das Kochsalz findet sich von allen leicht auflöslichen Salzen in der Natur am häufigsten. Es kommt vor als Steinsalz, in großen Flötzen von grauweißer, röthlicher, bläulicher Farbe, dicht, blättrig, selten krystallisirt. Einige Salzminen geben es so rein und durchsichtig, daß es so, wie es aus der Erde gegraben wird, sogleich verbraucht werden kann, z. B. die berühmten Salzminen bei Wieliczka bei Krakau. Häufiger aber enthält es Gyps, etwas Glaubersalz, und ist auch meistens mit etwas Erdharz durchdrungen, in welchem Falle der Salzstein im Berge selbst durch hinein geleitetes Tagwasser ausgelaugt, die gesättigte Lauge durch einen tiefern Stollen abgeleitet, und dann wie eine Salzsoole versotten wird.

Eine bedeutende Menge Kochsalz wird aus den Soolquellen erhalten, welche ihren Ursprung unterirdischen Salzflötzen verdanken, aber außer dem Kochsalz noch salzs. und schwefels. Kalk- und Talkerde, und schwefels. Natron in verschiedenen Quantitäten enthalten. Diese Salzsoole ist, je nach Verhältniß der vorhandenen Salzflötze zu dem Wasser, nach dem Zuflusse süßen

Wassers u. s. w., mehr oder weniger gesättigt; ihr Grad der Sättigung, ihre Löthigkeit, wird durch die Grade, die sie an der Salzspindel zeigt, angegeben. Ist die Soole nicht siedewürdig, so muß sie entweder durch Gefrieren oder durch Verdünsten an der Atmosphäre auf die gehörige Concentration gebracht, d. h. gradirt werden. Das Gradiren einer Soole geschieht dadurch, daß man sie auf hohe aus Reisern zusammengeflochtene Wände herabfallen läßt, wodurch ihr bei der großen Zertheilung eine große Ausdehnung gegeben und die Verdampfung der wäßrigen Theile befördert wird. Ist die Soole gesättigt, oder hinlänglich gradirt, so wird sie in das Siedehaus (Pfannhaus) und zwar zuerst in die Wärmpfanne geleitet; aus dieser fließt sie in die große, aus geschlagenen oder gewalzten Eisenplatten zusammengeschraubte Siedepfanne in dem Maße nach, als hier das Wasser verdampft. Sobald sich die Salzhaut zeigt, fängt das Salz an sich in kleinen Krystallen auszuscheiden; diese werden in bestimmten Zwischenzeiten mit hölzernen Krücken aus den Pfannen, und zwar zuerst zum Abtropfen auf eine schiefe Ebene gezogen, dann entweder in diesem losen Zustande, oder in Salzstücke geformt, in großen durch Nebenbenutzung des Feuers unter der Siedepfanne geheizten Vorrichtungen oder Kammern (Pfieseln) gedörrt.

Häufig wird auch das salzs. Natron aus dem Seewasser, welches Kochsalz, schwefels. Natron, salzs. Kalk- und Bittererde enthält, durch Abdämmen desselben in Gräben, Weiterleiten des durch Verdampfung an der Luft concentrirten, bis es in der letzten in Krystallen anschießt, gewonnen. Das braune Salz, Seesalz, Boysalz, wird dann entweder in kegelförmigen mit Stroh bedeckten Haufen der Atmosphäre ausgesetzt, damit die zerfließlichen Salze durch die angezogene Feuchtigkeit aufgelöst abfließen, oder es wird durch Auflösen, Filtriren, Klären, Abdampfen und neues Krystallisiren gereinigt.

Das Kochsalz krystallisirt in weißen, mehr oder weniger durchsichtigen Würfeln oder Oktaëdern, am häufigsten kommt es aber in trichterförmigen, vierseitigen Pyramiden vor, die aus aneinander gereihten und treppenförmig über einander gelagerten Würfeln bestehen. Spec. Gew. = 2,17. Es hat einen bekannten angenehmen Salzgeschmack, ist, wie Fuchs in München (Kastn. Archiv VII. S. 407.) nachgewiesen hat, in kaltem und kochendem Wasser völlig gleich auflöslich, so daß ein scheinbarer Unterschied nur der Gegenwart salzs. Bittererde oder Kalkerde zuzuschreiben ist. Diese Salze sind nämlich bei dem Siedepunkte der Kochsalzlösung, welcher um einige Grade den des Wassers übersteigt, bloß in ihrem Krystallwasser flüssig; sinkt nun die Temperatur, so können sie sich nicht mehr darin aufgelöst erhalten, sie entziehen daher dem Kochsalze das ihnen nöthige Auflösungsmittel, und es muß also eine verhältnißmäßige Menge Salz niederfallen. 100 Th. Wasser lösen 37 Th. Kochsalz auf, mithin enthalten 100 Th. einer gesättigten Kochsalzauflösung 37 Th. Salz. In reinem Weingeist ist es unlöslich, nicht so in wäßrigem Weingeiste. An der Luft ist es beständig. Auf glühenden Kohlen verknistert es stark, und bis zum Glühen erhitzt, schmilzt es und ver-

flüchtigt sich in weißen Dämpfen, ohne zersetzt zu werden. In diesem geschmolzenen Zustande ist es eine Verbindung des Natriums (des metallischen Radicals des Natrons) mit Chlor und zwar aus 39,7 Natrium und 60,3 Chlor. (zerfällt mit Wasser in salzsaures Natron?). Die ältere Theorie sah es an als bestehend aus 53,44 Natron und 46,56 hypothetischer trockner Salzsäure.

Eine feuchte Beschaffenheit des Kochsalzes deutet auf salzs. Kalk- oder salzs. Bittererde, ein bitterlicher Geschmack desselben auf schwefels. Kalk- oder schwefels. Bittererde. Um es von dergleichen Beimischungen zu befreien, bringt man es in ein konisches Gefäß, mit einer kleinen Oeffnung an der Spitze, und schüttet eine gesättigte Kochsalzlösung kochend heiß darüber. Diese Auflösung nimmt alle beigemischten Salze weg und läßt das Kochsalz bei 3—4maliger Wiederholung ganz rein zurück.

Das Kochsalz wird benutzt zur Darstellung der Salzsäure, des Chlors, auch wohl in der Medicin zur Schärfung der Klystiere. Die Unentbehrlichkeit desselben in der Haushaltung ist bekannt.

Natrum sulphuricum crudum seu Sal mirabile Glauberi crudum. Sulphas natricus cum aqua crudus.

Rohes schwefelsaures Natron oder rohes Glaubersalz.

Wird in chemischen Fabriken aus den Rückständen von der Destillation der Salzsäure wie auch von dem Kochen des salzsauren Natrons bereitet.

Ein Salz in krystallinischen, durchsichtigen, an der Luft zerfallenden, weißen, fast in drei Theilen Wasser auflöslichen Stücken, von bitterlichem kühlendem Geschmacke. Es besteht aus Natron, Schwefelsäure und Wasser, sehr oft mit eingemischter schwefelsaurer Kalkerde und salzsaurem Natron. Dieses wird durch schwefelsaure Silberauflösung, jene durch kohlensaure Kaliflüssigkeit erforscht. Verworfen werde das durch Metalle verunreinigte, was durch schwefelwasserstoffhaltiges Wasser und durch eisenblausaure Kaliflüssigkeit erkannt wird.

Das schwefelsaure Natron kommt in der Natur sehr häufig schon fertig gebildet vor, z. B. in vielen Mineralwässern, in mehreren Salzsoolen. Ein natürliches, wasserleeres, von Kochsalz, Magnesia- und Kalksalzen vollkommen freies schwefelsaures Natron mit einer sehr geringen Beimischung von einfach kohlensaurem Natron findet sich in Spanien, in der Nähe von Aranjuez. Es wird daselbst durch freiwillige Verdunstung im Sommer eines im Winter aus dem Boden eines Bassins hervordringenden salzhaltigen Wassers krystallinisch in so großer Menge gewonnen, daß eine hier gegründete Seifenfabrik das daraus durch Zersetzung gewonnene kohlensaure Natron nicht alles verbrauchen kann, sondern noch ein großer Theil desselben als künstli-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0653-4

che Soda in den Handel kommt. Der Glauberit enthält außer dem schwefelsauren Natron beinahe eine gleiche Menge schwefels. Kalk; die andern natürlichen Arten Glaubersalz enthalten außer dem Kochsalze auch Talksalze.

Sehr häufig wird dieses Salz als Nebenproduct erhalten, bei der Bereitung der Salzsäure als Kochsalz, dessen Basis, das Natron, nach Austreibung der Salzsäure vermittelst der Wärme und der Schwefelsäure sich mit dieser zu dem schwefelsauren Natron verbindet, welches in der Retorte als Rückstand bleibt. Auch bei der Salmiakfabrikation wird aus schwefelsaurem Ammoniak und salzsaurem Natron durch gegenseitige Zersetzung salzsaures Ammoniak und schwefelsaures Natron gewonnen.

Das Glaubersalz wird aber noch auf verschiedene andere Weise erhalten, als aus der Mutterlauge der Salzsoolen, aus welcher es bei der Frostkälte anschießt, durch Verwittern von schwefelkieshaltigen mit Kochsalzlauge befeuchteten Alaunschiefern, Auslaugen u. s. w., in welchem Falle es dann sehr leicht durch metallische Beimischungen verunreinigt seyn kann.

Das rohe Glaubersalz bedarf zur Verwendung in den pharmaceutischen Gebrauch einer nochmaligen Reinigung; zu verschiedenen technischen Zwecken, als zur Sodabereitung, zum Glasschmelzen wird es als solches verwendet.

Nicotiana. Die Blätter. Tabaksblätter.

Nicotiana Tabacum Linn. Eine einjährige Pflanze des südlichen Amerikas, bei uns angebaut.

Sitzende, länglich-lancettförmige, an der Basis verschmälerte, ganzrandige, große, braune Blätter von einem etwas widerlichen Geruche und scharfen Geschmacke. Man wende die Blätter an, welche gemeiniglich Virginische genannt werden.

Nicotiana Tabacum Linn. Gemeiner Tabak.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Der Tabak stammt aus dem südlichern Amerika, von wo er durch die Spanier in der Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa gebracht wurde; gegenwärtig wird er auch an mehreren Orten in Deutschland angebaut.

Die Wurzel ist stark, ästig, weiß, mit sehr zahlreichen Wurzelfasern bedeckt. Aus ihr kommen mehrere aufrechte, runde, mehr oder weniger ästige, krautartige Stengel hervor, die eine Höhe von 2—4 Fuß und drüber erreichen. Die Blätter sind sehr groß, abstehend; die untersten sind mehr elliptisch, lang zugespitzt, in einen kurzen Blattstiel herablaufend; die obern sind sitzend, lancettförmig, die obersten sehr schmal und linienförmig. Die Blüthen bilden eine große, reiche und sparrige Rispe an der Spitze des Stengels; der Kelch ist einblättrig, fünfspaltig, bauchig; die Blumenkrone trichterförmig, das Blumenrohr etwas gebogen, nach oben erweitert, blaßröthlich, und auf der äußern Seite mit kurzen feinen Drüsenhaaren besetzt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0654-0

Der Saum besteht aus fünf breiten und zugespitzten, rosenrothen, gefalteten Abschnitten. Die Frucht ist eine eiförmige, braune, zweifächrige Kapsel mit vielen kleinen braunen Saamen.

Die lebhaft grünen Blätter nehmen beim Trocknen eine braungelbe Farbe an, besitzen einen eigenthümlichen betäubenden Geruch und einen scharfen, ekelhaften und bittern Geschmack.

Vauquelin (Trommsd. J. XIX. 1. 316.) preßte die frischen Blätter aus. Mit dem Safte war eine sehr große Menge grüner Materie durch die Leinwand gegangen, welche durch ein Filtrum abgesondert wurde. Der Saft röthete die Lackmustinctur; Galläpfeltinctur und Mineralsäuren brachten einen milchigen, voluminösen Niederschlag darin hervor. Andere Reagentien zeigten Kalkerde, Aepfelsäure und etwas Salzsäure an. In der Siedehitze gerann viel Eiweißstoff; der davon befreite Saft wurde durch essigs. Blei gefällt, der Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zerlegt, und Aepfelsäure, äpfels. Kalk und etwas thierisch-vegetabilische Materie erhalten. Der äpfels. Kalk ist so reichlich darin enthalten, daß er aus der bis auf $\frac{1}{3}$ abgerauchten Flüssigkeit herauskrystallisirt.

Der durch essigs. Blei gefällte Saft besaß eine gelbe Farbe, und hatte den Geruch und die ganze Schärfe des frischen Saftes beibehalten. Er wurde der Destillation unterworfen. Das Destillat hatte einen etwas krautartigen Geruch und wenig Geschmack. Der Rückstand in der Retorte wurde mit ein wenig Kali versetzt, und verbreitete jetzt einen so starken und durchdringenden Geruch, daß man beim Einathmen desselben niesen mußte, und die Augen übergingen. Bei der jetzt unternommenen Destillation wurde eine Flüssigkeit erhalten, welche wie Tabaksrauch roch, überaus scharf war, und bei einem etwas starken Einathmen die Empfindung hervorbrachte, als wenn Schnupftabak in die Kehle kommt. Die Flüssigkeit reagirte alkalisch, was V. einem durch das Kali zersetzten Ammoniaksalze zuschreibt. Um den Grundstoff rein zu erhalten, wurde also die Flüssigkeit gelind abgeraucht, und mit Alkohol digerirt. Beim Verdunsten der geistigen Lösung bemerkte man auf der Oberfläche der Flüssigkeit einige Spuren eines braunen Oeles. Das beim Erkalten sich abscheidende beinahe feste Oel verbreitete auf glühenden Kohlen einen dichten Rauch, und einen unerträglich starken Geruch nach Tabak. Dieses scharfe Princip des Tabaks scheint nicht sehr flüchtig zu seyn.

Die übrigen Bestandtheile des Tabaks zeigten nichts Besonderes. Das grüne Satzmehl war mit etwas Eiweißstoffe verbunden; die in der Hitze geronnene Materie hatte alle Eigenschaften des Eiweißstoffes, dem etwas äpfelsaurer Kalk beigemischt war. Der eingedickte Saft hatte einen ziemlichen Gehalt an Salpeter. Aus dem ausgepreßten Rückstande der Tabaksblätter zog verdünnte Salpetersäure äpfels., kleesaur. und phosphors. Kalk aus. Der faserige Rückstand hinterließ beim Einäschern größtentheils Kieselerde, ein wenig Kalk und Eisenoxyd. Die außer dem Grundstoffe aufgefundenen Bestandtheile waren demnach: eine rothe thierisch-vegetabilische, in Wasser und Weingeist lösliche Materie; Eiweißstoff; grünes Satzmehl; Aepfelsäure; Es-

sigsäure; Salpeter; Salmiak; salzs. Kali; äpfels. Kalk in bedeutender Menge; im Rückstande kleesaur. und phosphors. Kalk und in der Asche Kieselerde und Eisenoxyd.

Da der narkotische Stoff von Vauquelin nicht rein und abgesondert dargestellt worden war, so übernahm Hermbstädt (Schw. N. J. 1. 1821. S. 442.) eine neue Analyse. Die getrockneten zerkleinerten Tabaksblätter wurden mit ihrem sechsfachen Gewichte destillirten Wassers in einer Retorte heiß digerirt, und dann der dritte Theil der Flüssigkeit etwas warm überdestillirt. Das trübe Destillat enthielt den eigenthümlichen Stoff des Tabaks theils gelöst, theils eingemengt. Es reagirte weder alkalisch noch sauer, Gallustinctur erzeugte darin weiße, in Säuren und in Alkalien lösbare Flocken. Als ein sehr concentrirtes Destillat von 6 Pfund Tabaksblättern 5 Tage lang in einem leicht bedeckten gläsernen Cylinder aufbewahrt worden war, hatte es sich aufgeklärt, und auf der Oberfläche desselben befand sich eine weiße blättrig-krystallinische Substanz abgesondert, welche das Nicotianin in reinem Zustande darstellte. Um den im Destillat gelöst gebliebenen Theil des Nicotianins zu trennen, wurde es mit übersäuertem essigs. Blei gefällt, der weiße Niederschlag vollkommen ausgewaschen, durch Schwefelsäure zersetzt, jedoch so, daß diese nicht vorwaltete, und nur das vom schwefelsaurem Blei abfiltrirte Fluidum an der Luft langsam verdunstet. Das Nicotianin blieb als eine weiche krystallinische Materie zurück, mit der zuerst erhaltenen vollkommen übereinstimmend.

Dies Nicotianin hat folgende Eigenschaften: 1) Auf der Zunge und im Schlunde erregt es einen eigenen Reiz, dem des Tabaks ähnlich. 2) Sehr wenig davon in die Nase gebracht reizt zum Niesen. 3) Zu einem Gran verschluckt erregt es Schwindel, Uebelkeit und Neigung zum Erbrechen. 4) In der Wärme wird es flüssig. 5) Im Wasser und Alkohol ist es gleich löslich. 6) In der Wärme verdunstet es, und verbreitet einen Geruch, demjenigen ähnlich, welcher nach dem Rauchen einer sehr feinen Sorte Tabak verbreitet wird. 7) Mit der Salzsäure ging es keine Verbindung ein; beim Verdunsten entwich die Salzsäure, und das Nicotianin blieb unverändert zurück.

Beim Rauchen des Tabaks macht das Nicotianin die Hauptwirkung, das Angenehme seines Reizes wird aber durch das brenzlige Oel, welches sich beim Rauchen erzeugt, verdorben.

Der Tabak wird selten und dann wohl vorzüglich im Aufgusse zu Klystieren, auch wohl im Extracte innerlich gegeben.

Nitri spiritus fumans. Acidum nitroso-nitricum. Rauchender Salpetergeist. Salpetrige Salpetersäure. Rauchendes Scheidewasser.

Wird in chemischen Fabriken durch Destillation des mit concentrirter Schwefelsäure gemischten salpetersauren Kalis bereitet.

Eine pomeranzengelbe Flüssigkeit, an der Luft einen rothen erstickenden Rauch aushauchend, aufs höchste ätzend, aus der concentrirtesten Salpetersäure und salpetriger Säure, wie auch Salzsäure gemischt. Bewahre sie vorsichtig in einem gläsernen, mit gläsernem Stöpsel verschlossenen Gefäße auf.

Die Bereitung der rauchenden Salpetersäure überläßt man den chemischen Fabriken. Bei der Destillation muß die Retorte in eine große geräumige tubulirte Vorlage münden, welche mit einer Woulfischen Flasche in Verbindung steht, die noch mit einem Ableitungsrohre versehen ist, damit der Apparat nicht zersprengt werde. Vorlage und Flasche bleiben leer, und müssen während der Destillation mit Schnee und kaltem Wasser umgeben, und immer kalt erhalten werden. 100 Th. Salpeter erfodern zu ihrer Zersetzung 48,5 Th. concentrirter Schwefelsäure von 1,85 spec. Gew. Die Schwefelsäure tritt vermöge ihrer näheren Verwandtschaft an das Kali, und die Salpetersäure fängt schon bei einer sehr gelinden Destillationswärme im Sandbade an sich zu verflüchtigen. Da die Salpetersäure aber nicht ohne Wasser bestehen kann, der geringe Antheil Wasser, welchen die concentrirte Schwefelsäure enthält, aber nicht hinreichend ist, so kann nur ein Theil der im Salpeter enthaltenen Säure unzersetzt übergehen, ein bedeutender Theil derselben zerfällt in salpetrige Säure und Sauerstoffgas. Erstere in gasartiger Form erfüllt den ganzen Apparat mit einem blutrothen Dampfe, zu dessen Concentrirung in eine Flüssigkeit eine geräumige stets kalt gehaltene Vorlage erfoderlich ist. Der Antheil Sauerstoff, welchen die salpetrige Säure weniger enthält als die Salpetersäure, bleibt gasförmig und würde den Apparat zersprengen, wenn ihm nicht durch das Ableitungsrohr ein Ausgang gestattet würde. Je größer die Hitze ist, welche man anwendet, desto mehr Säure wird zersetzt, daher werden denn auch bei der zum Austreiben der letzten Portionen Säure vorsichtig verstärkten Hitze die Gefäße ganz undurchsichtig. Gießt man etwas Wasser in die zweite Flasche, so erhält man mehr Säure, weil unter Vermittelung des Wassers die salpetrige Säure mit dem Sauerstoffe sich wieder vereinigt und als Salpetersäure im Wasser gelöst bleibt. War das angewandte salpetersaure Kali nicht ganz rein von salzsaurem Kali, so gewährt das in der zweiten Flasche vorgeschlagene Wasser auch noch den Vortheil, daß die von der Schwefelsäure gleichfalls ausgetriebene, durch die erste Vorlage gasförmig hindurchgehende Salzsäure von dem Wasser aufgenommen und das in der ersten Vorlage enthaltene Destillat salzsäurefrei erhalten wird.

Die rauchende Salpetersäure ist mehr oder weniger gefärbt, gelblich oder roth, stößt an der Luft rothe Dämpfe aus, und hat ein spec. Gew. von 1,50 bis 1,55. Bei der Verdünnung mit Wasser nimmt sie verschiedene Farbennuancen an und geht durch Blau und Grün in Gelb über. Sie muß genau vor dem Zutritte der atmosphärischen Luft verwahrt werden, weil sie

aus derselben Sauerstoffgas und Feuchtigkeit anzieht, die rauchende Eigenschaft verliert und zu Salpetersäure wird.

In diesem concentrirtesten Zustande wird die Salpetersäure selten gebraucht.

Nuces vomicae. Krähenaugen.

Strychnos nux vomica Linn. Ein auf Ceylon und Malabar einheimischer Baum.

Kreisrunde, niedergedrückte, nablige, sehr zähe Saamen, innen braun oder schwärzlich, mit graulich-silberfarbigen glänzenden Haaren besetzt, groß, von aufs höchste bitterm Geschmacke. Mit Vorsicht aufzubewahren. Die Gabe bis zu sechs Gran.

Strychnos nux vomica Linn. Gemeines Krähenauge.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 14. Apocyneae.

Dieser Baum von mittelmäßiger Größe wächst auf sandigen Plätzen in Malabar, Ceylon und Cochinchina.

Der aufrechte Stamm theilt sich in gegenüberstehende, gebogene, lange, glatte, mattgrüne oder aschfarbige Aeste. Die kurzgestielten, gegenüberstehenden Blätter sind eiförmig-rundlich, wenig zugespitzt und lederartig, glatt, glänzend und ganzrandig.

Die Blüthen sind klein, weiß und bilden am Ende der jungen Zweige kleine gipfelständige Doldentrauben. Der Kelch ist kürzer als die Krone, fünftheilig; die Kronenröhre nach oben etwas erweitert. Die Frucht ist rundlich-eiförmig, von der Größe einer Orange, von goldgelber Farbe, mit einer glatten, harten, doch leicht zerbrechlichen Schale versehen, und enthält in einem weißen, wäßrig-schleimigen, schwammigen Marke mehrere (8—10) Saamenkerne, welche im Handel als Krähenaugen vorkommen.

Diese sind kreisförmig, meistens 8—10 Linien im Durchmesser, platt, 1—2 Linien dick, weißlich, gelblich oder aschgrau, mit feinen glänzenden, kreisförmig laufenden Haaren besetzt, und in der Mitte mit einer nabelförmigen Erhabenheit versehen, welcher auf der andern Seite eine Eindrückung entspricht. Werden die Haare weggenommen, so kommt eine zarte braune Haut zum Vorschein, die behutsam abgenommen nicht bitter schmeckt; der eigentliche Kern ist gelb oder braun. Der Geruch ist eigenthümlich, etwas balsamisch widrig, doch schwach. Der Geschmack ist höchst bitter, kaum gewürzhaft und bleibt lange auf der Zunge. Wegen ihrer hornartigen Beschaffenheit lassen sich diese Früchte schwer pulvern. Die gelblichen und schwersten sind die besten. Häufig kommen sie geraspelt in dem Handel vor.

Die große Bitterkeit der Früchte findet sich auch in allen übrigen Theilen des Baumes, als Holz, Wurzeln u. s. w.

Die Krähenaugen äußern sehr heftige und schädliche Einwirkungen nicht

nur auf Hunde und andere vierfüßige Thiere, sondern auch auf den Menschen. Diese narkotischen Eigenschaften scheinen schon den Arabern bekannt gewesen zu seyn.

Das kalte Wasser wirkt nur wenig auf die Krähenaugen, mehr zieht dasselbe bei der Digestion aus.

Ueber das narkotische Princip in den Krähenaugen sind wir erst in neuerer Zeit durch die Herren Pelletier und Caventou belehrt worden. Durch ihre Analyse der Ignatiusbohnen geleitet, vermutheten sie, was schon Pfaff ausgesprochen hatte, eine große Uebereinstimmung der Bestandtheile in diesen natürlich so nahe verwandten Pflanzen, und sie fanden diese Vermuthung, als sie die Krähenaugen nach der bei den Ignatiusbohnen befolgten Methode einer Zergliederung unterwarfen, vollkommen bestätigt, denn als Resultat dieser Analyse ergaben sich dieselben dort gefundenen Bestandtheile, nur in abweichenden Verhältnissen. Die Krähenaugen enthalten nämlich weniger Strychninsalz, aber eine größere Menge festen Oels und gelber färbender Materie. Neben dem Strychnin fanden sie aber auch das in der falschen Angusturarrinde entdeckte Alkaloid, das Brucin, wodurch es wahrscheinlich wurde, daß auch diese Rinde von einer Strychnosart abstammen müsse, wie bei der Angustura angeführt ist. Das Brucin spielt gegen das Strychnin dieselbe Rolle, wie das Chinin gegen das Cinchonin. Beide Basen finden sich in den nämlichen Pflanzen vor, und bestimmen durch ihre absolute und relative Menge die physiologischen Eigenschaften derselben. In den Krähenaugen ist das Brucin in großer Menge vorhanden und schwer von dem Strychnin zu trennen.

Um das Strychnin aus den Krähenaugen zu gewinnen, geben Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. VII. 1. S. 314.) folgendes Verfahren an. Man bereitet einen geistigen Auszug, welchen man in Wasser löst, und so lange basisches essigs. Blei hinzusetzt, als noch ein Niederschlag entsteht. Man schlägt hierdurch die mit dem Strychnin verbundene Säure, die fettige Materie und den größten Theil des färbenden Princips zugleich nieder; das Strychnin bleibt mit der Essigsäure in der Auflösung verbunden zurück. Diese Flüssigkeit enthält noch einen geringen Antheil färbenden Stoffes, welcher durch das essigs. Blei nicht niedergeschlagen worden ist. Der Ueberschuß des Bleisalzes wird durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt, die Flüssigkeit von dem Schwefelblei abfiltrirt, mit reiner Bittererde gekocht, welche sich mit der Essigsäure verbindet, und das Strychnin ausscheidet, welches aus dem mit kaltem Wasser ausgewaschenen und dann getrockneten Niederschlage durch Alkohol ausgezogen und durch Verdunsten gewonnen wird. Sollte es noch nicht vollkommen weiß erscheinen, so kann man es in Essig- oder Salzsäure auflösen und es aufs neue durch Bittererde niederschlagen.

Henry (Berl. Jahrb. XXV. 2. S. 126.) giebt folgendes Verfahren an: man setzt die Krähenaugen eine halbe Stunde lang dem Dampfe des siedenden Wassers aus, und trocknet sie hierauf gut aus. Hierdurch werden sie so brüchig, daß sie sich nun recht gut pulvern lassen. In gröblich gepul-

vertem Zustande kocht man die Krähenaugen wiederholt aus. Die klar geseiheten Abkochungen werden bei mäßigem Feuer zur starken Syrupsdicke eingedunstet, dann mit gepulvertem Aetzkalke in geringem Ueberschusse einige Stunden in die Wärme gestellt, wo alles zu einer dicken, gelatinösen Masse gerinnt. Diese wird mit 90 Procent haltigem Weingeiste ausgezogen, und durch Abziehen und Verdunsten des Weingeistes das Strychnin in Krystallen erhalten, die man mit kaltem Weingeiste von 50 Procent abwäscht. Die geistige Mutterlauge so wie die Abwaschflüssigkeiten werden mit Salpetersäure bis zur Sättigung versetzt, dann wieder mit Aetzkalk gemischt, und wie das erstemal behandelt.

Ferrari (Schw. N. J. X. S. 402. und Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 204.) befolgt folgende Methode: drei Pfund Krähenaugen werden 2 Stunden lang mit 30 Pfunden Wasser, welchem drei Unzen Schwefelsäure oder besser sechs Unzen Salzsäure zugesetzt sind, gekocht, das Decoct im Ueberschusse mit Kalk versetzt, und nach einigen Tagen der von der Flüssigkeit getrennte Bodensatz gesammelt und getrocknet. Diesen behandelt man nun mit 80 Procent haltigem Weingeiste, zieht von der geistigen Lösung den Weingeist durch Destillation ab, wo dann die trübe gelbe kalische Flüssigkeit bei gehöriger Concentration erstarrt, sobald sie erkaltet. Wird diese nun nochmals mit Weingeist von 46 Procent behandelt, so bleibt das Strychnin rein zurück.

Corriol (Trommsd. N. J. XII. 1. S. 173.) läßt die gröblich zerstückelten Krähenaugen mit kaltem Wasser übergießen, und zwar in 3 Aufgüssen, wovon jeder 8 Tage dauert, wobei die Masse von Zeit zu Zeit umgerührt wird. Die wäßrigen Flüssigkeiten werden bis zur Syrupsdicke abgeraucht, durch einen Zusatz von Alkohol die gummigen Theile niedergeschlagen und die Tincturen zur Extractconsistenz abgeraucht. Dieses Extract, welches fast ganz aus igasursaurem Strychnin besteht, wird in kaltem Wasser aufgelöst, wodurch sich eine gewisse Menge einer fetten Materie absondert. Die Flüssigkeit wird etwas erwärmt, und mit Kalk niedergeschlagen. Aus dem getrockneten Niederschlage wird das Strychnin durch Alkohol ausgezogen. In diesem Zustande enthält es noch ein wenig färbende Materie und Brucin, welche beide Stoffe durch Maceriren mit schwachem Alkohol entfernt werden; dann löst man das Strychnin nochmals in starkem Alkohol auf, um es bei freiwilliger Verdunstung des Alkohols schön krystallisirt zu erhalten. Dieses Verfahren, das Brucin von dem Strychnin zu trennen, ist schon früher von den Herren Pelletier und Caventou angegeben worden, deren Angabe zufolge man diese Trennung auch dadurch bewirken kann, daß man das Gemenge beider Basen mit schwacher Salpetersäure behandelt, und auf diese Art salpeters. Strychnin und Brucin bildet. Das letztere Salz krystallisirt vor dem ersteren, und erscheint in viereckigen, ziemlich voluminösen und harten Prismen; das salpeters. Strychnin krystallisirt später in Sternen, die aus seidenartigen, biegsamen, glänzenden, sehr leichten Fasern bestehen. Man kann diese beiden Salze dnrch mechanische Mittel und durch wiederholte Krystallisation von einander scheiden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0660-3

Nach Duflos (Berl. Jahrb. XXVIII, 2, S. 208.) werden 10 Pfund Brechnüsse in einem eisernen Drathsiebe über glühenden Kohlen unter fortwährendem Umrühren mit einem hölzernen Spatel so lange geröstet, bis sie nach dem Erkalten unter dem Schlage des Hammers in mehrere Stücke springen. Jetzt werden sie vom Feuer abgenommen, und nachdem sie ziemlich erkaltet sind, in einem metallenen Mörser gröblich zerstoßen. Die auf solche Art zerkleinerten Krähenaugen werden mit dem fünffachen Wasser und einer Unze concentrirter Schwefelsäure in einem Kessel übergossen, unter Umrühren bis zum Sieden erhitzt, und 24 Stunden in Digestion gelassen. Dieses Verfahren wird wiederholt, jedoch ohne Zusatz von Schwefelsäure. Die Flüssigkeiten werden in einem kupfernen Kessel zur Syrupsdicke abgedampft, und um die schleimigen und gummigen Stoffe zu fällen, mit ungefähr 10—12 Pfund Alkohol von 75 Procent Richter vermischt. Das Gemenge läßt man eine Nacht in Digestion, gießt es hernach durch einen dichten leinenen Beutel und preßt den Rückstand aus.

Von der geistigen Flüssigkeit, die nur wenig gefärbt ist, wird der Weingeist gelind abgezogen, der Rückstand nach dem Erkalten ausgegossen, und Aetzkalilauge bis zur merklichen Reaction zugesetzt, wodurch ein gelblich weißer Niederschlag entsteht. Nach 24 Stunden Ruhe wird der krystallinische Niederschlag auf einem Filter gesammelt, und mit heißem Wasser ausgewaschen, bis dieses farblos abläuft; er ist dann trocken, ein weißes krystallinisches Pulver, welches an Gewicht 10 Drachmen beträgt, und aus Strychnin und Brucin besteht. Um diese beiden Stoffe zu scheiden, löse man das Gemenge in sehr verdünnter Schwefelsäure auf, digerire kurze Zeit mit thierischer Kohle, welcher vorher durch Salzsäure der kohlensaure Kalk entzogen worden, filtrire die gänzlich entfärbte Flüssigkeit und schlage sie noch heiß mit Aetzammoniak nieder. Während des Umrührens mit einem Glasstabe hängt sich das Brucin als eine weiche harzähnliche Masse an denselben an, und läßt sich bequem herausnehmen; das Strychnin schlägt sich in weißen Flocken nieder, und wird auf einem Filter gesammelt und getrocknet. Beide Stoffe lassen sich durch Auflösen in Weingeist und Verdunsten an der Luft krystallisirt erhalten. Zur medicinischen Anwendung möchte wohl, wegen der ungemeinen Schwerlöslichkeit dieser Alkaloide, eine salzartige, wie die leicht krystallisirende schwefelsaure Verbindung den Vorzug verdienen.

Um die Igasursäure (Strychninsäure) abzuscheiden, wird die Flüssigkeit, aus welcher die Alkaloide präcipitirt worden sind, bis zur Trockne abgedampft, die trockne Masse zerrieben, mit Alkohol digerirt und die Flüssigkeit abfiltrirt, das igasursaure Kali, welches vom Alkohol aufgelöst ist, wird sehr vorsichtig mittelst Schwefelsäure zersetzt, die Flüssigkeit von dem niedergefallenen schwefelsauren Kali abgegossen und zur Krystallisation abgedampft. Die Igasursäure krystallisirt in sandartigen körnigen Krystallen.

Die Krähenaugen werden im Extracte, oder auch in Pulverform bisweilen innerlich angewendet; die geistige Tinctur, äußerlich auf das Rückgrath eingerieben und zugleich innerlich angewandt, soll gegen Bleikolik sich

sehr wirksam bewiesen haben. Immer aber erfodern sie bei der Anwendung große Behutsamkeit, noch mehr aber das Strychnin, welches der allein narkotische Bestandtheil der Krähenaugen ist.

Dieser narkotischen Eigenschaften wegen müssen auch die Krähenaugen mit der erfoderlichen Vorsicht aufbewahrt werden.

Nucista. Das Oel. Muskatöl. Muskatbalsam.

Wird durchs Auspressen aus den Nüssen der Myristica moschata Linn. in Ostindien bereitet.

Ein ätherisch-fettes, festes Oel, braun und weiß gestreift, leichter als Wasser, von angenehmen Geruche, in siedendem Schwefeläther auflöslich mit klarer Auflösung. Man sehe darauf, daß es nicht mit Talg verfälscht sey, welches in Schwefeläther aufgelöst eine trübe Auflösung giebt.

Der Muskatbalsam (Oleum Nucistae expressum. Balsamum Nucistae), wird auf den Inseln, wo der Muskatnußbaum (vergl. Macis) wächst, bereitet, indem man die gestoßenen und in einem Beutel enthaltenen Muskatnüsse heißen Wasserdämpfen aussetzt, und zwischen einer erwärmten Presse auspreßt. Eine fast gar nicht im Handel mehr vorkommende Sorte ist der ostindische Muskatbalsam, der in steinernen Krügen zu uns kommt, eine dickliche butterartige Consistenz, eine rothgelbe Farbe, wie die Muskatenblumen, einen kräftigen Muskatengeschmack und einen angenehmen starken Geruch hat. Die geringere, jetzt gebräuchliche Sorte bildet ziemlich harte, feste, glatte, viereckige Stücke, hat eine röthlichgelbe marmorirte Farbe, einen schwächeren Geruch, und scheint zum Theil aus Muskatennüssen ausgepreßt zu seyn, von denen das ätherische Oel schon abdestillirt worden.

Schrader (Berl. Jahrb. 1804. S. 83.) erhielt aus 16 Th. käuflichen Muskatbalsams: 7 Th. einer weißen geruchlosen pulverartigen Substanz, welche sich kalt weder in Aether noch in Alkohol auflöste, übrigens sich wie Talg verhielt; 8½ Th. einer bräunlichgelben, weichen, fettigen Substanz, welche sich auch kalt in Aether und Alkohol auflöste, und ¾ Th. ätherischen Oels. Versuche mit selbstgepreßtem Balsam geben ähnliche Resultate.

Mögliche Verfälschungen können mit Rindermark, gelbem oder weißem Wachse und Wallrath seyn. Im ersteren Falle wird der Rückstand von der Behandlung mit Aether und Alkohol in der Kälte nicht so trocken und pulverig, sondern mehr fettig seyn. Wallrath wird aus dem heißen Alkohol in Gestalt von glänzenden Blättchen sich niederschlagen. Gelbes Wachs wird den Rückstand von der in der Kälte gemachten Auflösung gelb färben; weißes Wachs in der Wärme in Alkohol sich nicht so leicht auflösen, und in allen diesen Fällen das Verhältniß der Bestandtheile anders ausfallen, als das von Schrader gefundene.

Das ätherische Muskatennußöl (Oleum nucistae aethereum s. destil-

latum) wird gleichfalls in der Heimath des Muskatbaums aus den Muskatennüssen durch Destillation derselben mit Wasser bereitet. Es ist weiß, ungefärbt, hat einen erwärmenden, scharfen und stechenden Geschmack und einen sehr deutlichen Muskatengeruch.

Nux moschata. Muskatnuß.

Oelige, rundliche, schwere, kreisförmig gefurchte, außen aschgraue, innen mit brauner und rother Farbe marmorirte Nüsse, von gewürzhaftem angenehmen Geschmacke und angenehmen Geruche. Die von Würmern zerfressenen sind verwerflich.

Die bei Macis beschriebenen Früchte von **Myristica moschata** werden von der sie umhüllenden braunen Hülle befreit, und in den Handel gebracht. Sie sind rundlich, an beiden Enden stumpf, von der Größe einer großen Haselnuß, schwer, auswendig hell aschgrau oder bräunlich, etwas unregelmäßig gefurcht, inwendig dicht, röthlichbraun und weiß marmorirt, etwas glänzend, von einem, besonders wenn sie gequetscht oder geschabt werden, sehr durchdringenden, angenehmen, eigenthümlichen gewürzhaften Geruche und einem bitterlich erwärmenden, gewürzhaften, etwas fettigen Geschmacke.

Gute unverdorbene Nüsse müssen schwer und fettig seyn, mit einer heißen Nadel durchstochen ein gelbliches Oel ausschwitzen und beim Durchschneiden nicht zerbröckeln. Die angefressenen, wurmstichigen, leicht zerbrechlichen, die oft inwendig ganz hohl, von schwachem Geruche und Geschmacke sind (Rompen), sind verwerflich. Diejenigen Nüsse, die schon durch Destillation oder Ausziehen mit Weingeist zum Theil ihres Gewürzstoffes beraubt sind, geben sich durch eine ganz gleiche Farbe an der Oberfläche und im Innern, so wie durch einen schlechten Geschmack zu erkennen.

Neben diesen runden Muskatnüssen, die man ehemals die Weibchen nannte, kommt noch eine Sorte langer, und bedeutend größerer Muskatnüsse im Handel vor, die man die Männchen nennt. Diese sind noch mit der harten Schale umgeben, mit dieser 1½—2 Zoll lang, größtentheils eiförmig, oft auch länglichrund. Die harte Schale hat auf einer Seite eine etwas vertiefte Naht; ihr äußeres und inneres Ansehen ist übrigens wie das der runden Muskatnüsse, auch haben sie denselben Geruch und Geschmack, nur etwas schwächer, und der Sassafrasrinde einigermaßen ähnlich. Auch sind sie etwas leichter und beinahe immer von Würmern angestochen. Der Baum, von dem diese Nüsse herstammen, ist **Myristica tomentosa**, der filzige Muskatnußbaum, den **Rumpf** als einen Baum beschreibt, welcher höher und weniger ästig ist als der andere; seine Blätter sind größer und seine Früchte filzig.

Jährlich sollen etwa 250,000 Pf. Nüsse nach Europa gebracht werden.

Gute Nüsse geben aus 16 Unzen 1—2 Loth ätherisches Oel und durch Auspressen den achten, selten den fünften Theil ausgepreßtes Oel.

Nach **Schrader's** Versuchen (Berl. Jahrb. 1804. S. 83.) enthalten 4 Unzen Muskatnüsse: ätherisches leichtes Oel 50 Gran; ätherisches schweres

Oel 10 Gran; ausgepreßtes röthliches, weiches Oel 3 Qut. 21 Gr.; weißes trocknes, mehr talgartiges Oel 5 Qut. 39 Gr.; gummiges Extract 1 Unze; schmieriges Harz 1 Qut.; Parenchyma 1 Unze 3 Qut.; Verlust 2 Qut.

Bonastre (Trommsd. N. J. VIII. 2. 1824. S. 231.) erhielt durch Destillation aus 80 Grammen ein aromatisches Wasser, auf welchem flüchtiges Oel schwamm, welches 4 Grammen wog. Ueber der in der Retorte zurückbleibenden Flüssigkeit befand sich ein dickes Oel von einer blätterähnlichen Consistenz, welches durch Erkalten fest wurde; es wog 9 Grammen 3 Decigrammen. Der wäßrige Rückstand war sehr dick. Durch einen Zusatz von Jod wurde die Masse sehr dunkelblau gefärbt, verlor aber einen Augenblick nachher gänzlich die Farbe, die ihm mittelst flüssigen Chlors und mineralischer Säuren wieder gegeben werden konnte.

500 Th. Muskatnuß mit kaltem Alkohol behandelt gaben Auflösungen, welche das Lackmus rötheten. Der Rückstand gab mit kochendem Wasser wieder eine schleimige Auflösung, aus welchem durch absoluten Alkohol ein Präcipitat erhalten wurde, amylonartiges Satzmehl, welches getrocknet 12 Th. wog. Außerdem enthielt die Auflösung noch etwas Gummi, welches B. als von dem Satzmehle herrührend ansieht, das mit den Muskatnüssen, die eine sehr reichliche Menge Säure enthalten, kochend behandelt, sich in die gummige Substanz verwandelt. 500 Th. enthalten nach Bonastre: weißen unauflöslichen Stoff (Stearine) 120; butterartigen, gefärbten, auflöslichen Stoff (Elaïne) 38; flüchtiges Oel 30; Säure ungefähr 4; Satzmehl 12; natürliches oder gebildetes Gummi 6; holzigen Rückstand 270; Verlust 20.

John (Chemische Schriften VI. S. 61.) erhielt aus einer Droguerie-handlung kleine unregelmäßige krystallinische Rinden, welche sich aus dem ätherischen Muskatnußöle abgesondert hatten. Sie lösten sich sowohl in Weingeist als in Aether, unter Zurücklassung eines geringen schleimartigen Rückstandes auf, waren in warmen Wasser in ziemlicher Menge auflöslich und krystallisirten daraus bei freiwilliger Verdunstung in ¼ Zoll langen und einige Linien breiten, völlig durchsichtigen und farblosen prismatischen Tafeln mit zweiflächiger Zuschärfung. Sie haben einen sehr aromatischen Geruch und Geschmack, schmelzen in kochendem Wasser noch nicht, aber bei einer höheren Temperatur fließen sie wie Oel und verdampfen unter Zurücklassung eines braunen kohligen Fleckes, den kochendes Wasser nicht verändert. Ein Theil löst sich in 19 Th. siedenden Wassers auf, und diese Lösung gesteht beim Erkalten zu einer weißen krystallinischen Masse. Auf die Gold-, Eisen-, Queckſilber- und Barytauflösungen wirkt die Lösung der Krystalle nicht und setzt man derselben etwas Kali zu, so entsteht mit der Eisenauflösung noch keine Spur von Berlinerblau. Merkwürdig ist, daß dieser Stoff unter gewissen Bedingungen das gerötheten Lackmuspapier bläuet, unter andern Umständen aber umgekehrt das blaue Lackmuspapier etwas roth färbt, je nachdem sich aus der warmen wäßrigen Auflösung mehr oder weniger ausgeschieden hat. Fügt man der wäßrigen Lösung auch nur eine Spur einer Säure

hinzu, so prädominirt immer die Säure. Destillirt man die Krystalle, so erhält man zwei Flüssigkeiten: ein klares, farbloses, bei fortgesetzter Destillation gelb werdendes Oel, und eine säuerliche wäßrige Flüssigkeit. Das Destillat riecht und schmeckt aromatisch und brennend. Reibt man die Krystalle mit etwas gebranntem Kalke und Wasser, so erfolgt keine Entbindung von Ammoniak.

Diese Materie wird von John mit den Namen Myristicin, von Gmelin mit dem Namen Muskatcampher belegt, und ist wohl als aus der Einwirkung des Sauerstoffgases der atmosphärischen Luft auf das ätherische Oel entstanden anzusehen.

Oleum animale foetidum. Oleum Cornu Cervi. Stinkendes Thieröl. Hirschhornöl.

Wird in chemischen Fabriken aus verschiedenen thierischen Theilen durch trockene Destillation bereitet.

Ein empyreumatisches, dickliches, braunschwarzes, undurchsichtiges Oel, vom stinkendsten Geruche. Die Consistenz sey nicht gar zu dick.

Dieses Oel wird als Nebenproduct bei der Zerstörung thierischer Stoffe durch das Feuer, behufs der Ammoniakbereitung (vergl. S. 54.) gewonnen. Das im Anfange der Destillation übergehende Oel ist gelb, wird aber immer dunkler braun, und zuletzt beinahe schwarz. Mit der Farbe nimmt auch die Consistenz und das spec. Gewicht zu, so daß die letzten Portionen in der zugleich mit übergehenden ammoniakalischen Flüssigkeit zu Boden sinken. Es ist in Weingeiste ziemlich löslich.

Olibanum seu Thus. Weihrauch.

Der an der Luft erhärtete Saft von Boswellia serrata Colebrooki, einem Baume Ostindiens.

Ein Harz in kleinen weißlich-gelblichen, kaum etwas schimmernden, gleichsam mit Pulver bestreuten, zerbrechlichen Stücken und Körnern, von bitterlichem Geschmacke und, wenn es angezündet wird, angenehmen Geruche. In höchst rectificirtem Weingeiste wird es dem größten Theile nach aufgelöst.

Boswellia serrata Colebrooke. Der indische Weihrauchbaum.
Boswellia thurifera Roxb.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogyniä.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.

Dieser in Ostindien einheimische Baum hat ausgebreitete Aeste, die sich in viele Zweige zertheilen. Die langen ungleich gefiederten Blätter finden sich fast alle gegen die Spitze der Aeste hin. Die Blättchen sind abwechselnd

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0665-2

kurzgestielt, länglich, stumpf, gesägt und 1—1½ Zoll lang. Die kleinen, blaßgelblichen Blumen stehen in den Blattwinkeln in einfachen aufrechten Trauben.

Dieser Baum liefert nach Colebrooke den Weihrauch, welcher schon in dem Alterthume bekannt gewesen ist, wo man ihn der Gottheit zu Ehren in den Tempeln brannte, welcher in die katholische Kirche übergegangene Gebrauch in der fast bei allen alten Völkern üblichen Sitte, Thiere zu opfern, wodurch die Tempel mit übelriechenden Dämpfen angefüllt wurden, seinen Ursprung hat. Jener Weihrauch ist, wie nicht ohne Grund angenommen wird, eine unserm Olibanum ähnliche harzige Masse, welches wahrscheinlich von verschiedenen andern Pflanzen herstammt, da unser Olibanum (von Oleum und Libanon) nicht aus Ostindien, sondern aus Kleinasien und Arabien zu uns kommt, und von mehreren daselbst wachsenden Wachholderarten, hauptsächlich von dem lycischen Wachholder (Juniperus Lycia Linn.), nach Lamarck von Amyris Kafal oder Kataf Forskål herzustammen scheint.

Das Olibanum besteht aus rundlichen, getropften, zum Theil knolligen oder traubenförmigen Stücken, von der Größe einer Bohne bis zu der einer Wallnuß, die durchscheinend, blaßgelb, mit einem weißen Staube bedeckt, auf dem Bruche matt und splittrig, übrigens trocken, spröde und leicht zerbrechlich sind. Der Geschmack ist etwas scharf bitterlich, der Geruch etwas süßlich balsamisch-harzig, etwas terpenthinartig. Spec. Gew. = 1,221. Zwischen den Zähnen ist es anfangs spröde, nach einiger Zeit aber hängt es sich an dieselben an, wird zähe und weich, weiß, einigermaßen wie der Mastix, und macht den Speichel milchig.

Eine schlechtere Sorte besteht aus größeren, gewöhnlich zusammengeklebten, nicht so trocknen, unreinen Stücken und heißt im Handel Olibanum in sortis. Eine Verfälschung mit gemeinem Fichtenharze erkennt man an der dunklern mehr rothbraunen Farbe und an dem unangenehmen Harzgeruche, wenn es auf Kohlen gestreut wird.

Der Weihrauch nähert sich den Gummiharzen, denn gepulvert und mit Wasser gerieben giebt er eine in kurzer Zeit Harz absetzende Milch. Pfaff erhielt von 600 Gran Weihrauch 320 Gran reines Harz und 280 Gran einer dem arabischen Gummi ähnlichen Substanz. Am Lichte brennt es mit einer schönen weißen Flamme, und verbreitet auf glühende Kohlen geworfen einen starken angenehmen Geruch. Bei der Destillation giebt es etwas weniges ätherisches Oel.

Nach einer Analyse von Braconnot enthalten 100 Th. Weihrauch: in Alkohol auflösliches Harz 56,0; in Wasser auflösliches Gummi 30,8; in Wasser und Alkohol unauflöslichen Rückstand, welcher wahrscheinlich ein in dem letzteren unauflösliches Harz enthält 5,2; ätherisches blaßgelbes Oel und Verlust 8,0.

Der Weihrauch wird bloß zur Räucherung gebraucht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0666-7

Olivae. Das Oel. Olivenöl. Baumöl.

Wird aus den Früchten der Olea Europaea Linn., eines im mittägigen Europa einheimischen Baumes, durchs Auspressen bereitet.

Ein fettes, gelbliches oder grünliches Oel von 0,915 spec. Gew. Bei einer Wärme unter 0° geht es in eine körnig-krystallinische Masse. Das aus der Provinz Narbonne gebrachte (sogenannte Provenceröl) weiße oder gelbliche, geruch- und geschmacklose Oel werde zum innern Gebrauch, und wo es vorgeschrieben wird, angewandt. Man hüte sich vor dem mit Bleioxyd, Schwefelsäure und andern Oelen verunreinigten Oele.

Olea europaea Linn. Der gemeine Oelbaum.
Olea sativa et Oleaster Hoffmsgg.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 4. Jasmineae.

Der Oelbaum wurde von den Alten in großer Verehrung gehalten. Er war ein Zeichen des Friedens, und mehreren Gottheiten, bei den Griechen der Minerva, geheiligt. Man glaubt, daß die Phönicier 680 Jahr v. Chr. Geb., als sie in der Provence Colonien anlegten, diesen ursprünglich in Asien einheimischen Baum nach Marseille gebracht haben, von wo er sich ausbreitete. Jetzt wächst er häufig im nördlichen Afrika und in den südlichen Ländern Europas, vorzüglich in Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. In mehreren Gegenden dieser Länder wird er mit der größten Sorgfalt cultivirt, wodurch, wie bei unsern Obstarten, viele Varietäten entstanden sind. Eine große Kälte kann er nicht vertragen, er liebt einen dürren, steinigen Boden und soll ein hohes Alter erreichen.

Er ist von mittelmäßiger Größe, sein Holz hart und geadert, die Wurzel oft angenehm marmorirt. Die Aeste sind sehr glatt, von graulicher Farbe, und mit gegenüberstehenden, bleibenden, harten, festen, ganz ungetheilten, lancettförmigen Blättern besetzt, welche oben glatt und grün, unten weiß und seidenartig sind. Die Blüthen sind weiß, klein, wohlriechend, und zuweilen einzeln, öfter aber in kleinen, gedrängten Trauben in den Blattwinkeln stehend. Die Frucht, eine Steinfrucht, ist dunkelgrün, glatt, einfächrig, länglichrund, fleischig, sehr ölig, und enthält eine harte, längliche, gefurchte Nuß, die einen weißen süßen Kern einschließt.

Der Oelbaum blüht im Mai und Juni, und die Früchte reifen im October und November.

Die Früchte dieses Baumes haben das Besondere, was sie fast von allen übrigen Steinfrüchten unterscheidet, daß sie eben sowohl in ihrer fleischigen Saamenhülle, als in ihrem Kerne ein fettes Oel enthalten, wogegen gewöhnlich die Steinfrüchte ein solches nur in dem Kerne enthalten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0667-3

Um das Oel aus den Oliven durch Auspressen zu erhalten, werden diese sogleich nach dem Einsammeln in die Mühle gebracht, und das auf diese Weise gewonnene Oel ist mild, gelblich oder grünlich, und hat einen reinen, angenehmen, süßlichen Geschmack; es heißt Jungfernöl, und eins der vorzüglichsten ist das von Aix in der Provence. In den meisten Fällen werden aber die Oliven in Haufen aufgeschichtet, und einige Tage hindurch der Gährung überlassen, bevor man das Oel auspreßt. Die Gährung macht das Fleisch der Frucht weich, wodurch eine größere Menge Oel gewonnen wird. Dieses Oel ist gelb, noch mild und wohlschmeckend, die kürzere oder längere Zeit aber, während welcher man die Oliven der Gährung überlassen hat, verursacht einen großen Unterschied hinsichtlich der Güte desselben; je kürzer die Gährung gedauert hat, desto besser ist das Oel. Ein noch geringeres Oel erhält man durch ein zweites Auspressen der erwärmten Oelkuchen, oder auch dadurch, daß gleich schlechtere Oliven genommen werden. Dieses letztere Oel ist nur zur Seifensiederei brauchbar. Von allen officinellen fetten Oelen ist das Olivenöl das specifisch leichteste, nämlich = 0,915. Im Sommer ist es immer flüssig, bei einer Temperatur von etwas unter 0 ° wird es zum Theil fest, und bildet alsdann eine körnige Masse, welche desto fester wird, je stärker die Kälte ist; es kann dann durchs Auspressen (nach Braconnot) in 72 Oel- und 28 Talgstoff geschieden werden. Nach Gay-Lussac und Thenard besteht es aus Kohlenstoff 77,21; Wasserstoff 13,36 und Sauerstoff 9,43. Durch ein Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure wird es entzündet. Mit den Alkalien bildet es Seifen, mit dem Bleioxyd ein festes Pflaster. In Alkohol löst es sich sehr wenig, in Aether aber sehr leicht auf. An der Luft trocknet es nicht ein, und brennt mit heller Flamme ohne Rauch und üblen Geruch.

Das Baumöl wird mit andern fetten Oelen, als Mohn-, Nuß- oder Buchöl verfälscht, das schlechteste mit Rüböl oder Leinöl. Ein solches Oel hat ein größeres spec. Gewicht, gerinnt nicht sobald in der Kälte, oder erfodert doch einen höheren Grad der Kälte zur Gerinnung, bekommt durch starkes Schütteln viele Luftblasen, hat einen mehr oder weniger veränderten Geruch und Geschmack und brennt nicht ohne Rauch, und nicht mit einer so reinen und hellen Flamme, als das ächte. Als chemisches Reagens auf solche Beimischungen hat Poutet die concentrirte Lösung des sauren salpetersauren Quecksilberoxyduls (aus 6 Th. Quecksilber und 7½ Th. Salpetersäure von 1,356 spec. Gew. bereitet) empfohlen. Das Olivenöl wird nämlich durch dieses Reagens weit stärker verdickt, als die anderen fetten Oele. Schüttelt man 12 Theile des zu prüfenden Oeles mit einem Theile des obigen Prüfungsmittels, so wird es, war das Olivenöl rein, im Winter in 3—4 Stunden, im Sommer in 6—7 Stunden vollkommen geronnen, und seine Oberfläche glatt und weiß seyn. Enthält es den 20sten Theil Mohn- oder Rüböl, so befinden sich auf der Oberfläche blumenähnliche Figuren; enthält es den 10ten Theil, so ist die Consistenz nur die des Honigs, und ist der Zusatz an letztgenannten Oelen noch über dieses Verhältniß, so gerinnt

das Ganze nicht, sondern durchsichtiges Oel schwimmt über einem talgartigen Körper.

Nach Binder ist auch das Salpetergas ein gutes Prüfungsmittel des reinen Baumöls, denn dieses wird durch wenige Blasen des erstern weiß und fest, durch viel Gas gelb, aber nie roth oder braunroth, wie die Saamenöle.

Um ranzig gewordenes Oel wieder süß und weiß zu machen, soll es zuweilen mit Bleioxyden digerirt werden. Zwar wird das Oel dadurch farbenlos, aber es zeigt eine mehr schmierige Consistenz und eine eigene Süßigkeit. Zur Entdeckung dieses Betruges mischt man das Oel mit gleich viel destillirtem Essig, dem noch einige Tropfen Salpetersäure zugemischt worden sind, und scheidet nach starkem Durcheinanderschütteln das Oel wieder ab. Der Essig wird mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser vermischt, wo dann der braune oder schwärzliche Niederschlag den größern oder geringeren Bleigehalt zu erkennen giebt. Unschädlicher ist die Verbesserung eines ranzig gewordenen Baumöles durch Digestion mit Thonerde in einer Temperatur von 65—70 ° R., welche den Schleim des Oeles anzieht und es heller macht. Sollte das Oel zur Abscheidung der färbenden und schleimigen Theile mit Schwefelsäure behandelt worden, und von derselben etwas im Oele zurückgeblieben seyn, so werden der saure Geschmack, das Röthen des hineingetauchten Lackmuspapiers, und der beim Durchschütteln mit etwas salzsaurer Barytlösung entstehende Schwerspath diese Verunreinigung anzeigen.

Die Früchte dieses Baumes, die bekannten Oliven, werden etwas vor ihrer Reife eingesammelt, wenn ihr Fleisch noch hart und herbe ist. Um ihnen den scharfen bittern und unangenehmen Geschmack zu benehmen, läßt man sie einige Zeit in Salzwasser eingeweicht liegen, worauf sie in den Handel gebracht werden, und ihres angenehmen Geschmacks wegen beliebt sind.

Auch die Blätter des Oelbaumes sind als ein adstringirendes und fiebervertreibendes Mittel gerühmt worden; sie enthalten nach Pelletier's Untersuchung: fette Materie, Chlorophyll, Pflanzenwachs, eine gefärbte bittere Materie, Gallussäure, Aepfelsäure, Gummi und Holzfaser.

Ononis. Die Wurzel. Hauhechelwurzel.

Ononis spinosa Linn. Eine ausdauernde an Wegen häufige Pflanze.

Eine lange Wurzel, von der Dicke eines kleinen Fingers und drüber, etwas holzig, außen grau, innen bräunlich, zähe, von schärflichem Geschmacke. Im Frühlinge einzusammeln.

Ononis spinosa Linn. Die stachliche Hauhechel.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Diese Pflanze findet sich durch ganz Europa, und ist in Deutschland sehr gemein auf ungebauten Feldern, an sandigen unfruchtbaren Orten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0669-7

Die auswendig braune, inwendig weißliche Wurzel ist holzig, ästig, rund, von der Dicke eines kleinen Fingers und drüber. Sie kriecht in verschiedenen Richtungen weit unter den Boden, ist oft 1—2 Fuß lang, und so zähe, daß sie nicht selten den Gang des Pfluges hemmt, woher auch wohl ihre Benennung: Ochsenbrechwurzel, entstanden seyn mag. Der Stengel ist sehr ästig, rothbraun oder röthlich, gewöhnlich geneigt, selbst niederliegend, jung ohne Dornen, im Alter aber mit langen, starken, pfriemenförmigen Dornen versehen. Die Blätter sind abwechselnd, kurzgestielt, die untern dreizählig, und bestehen aus umgekehrt-eiförmigen, stumpfen, gesägten, auf beiden Seiten haarigen Blättchen; die obern Blätter sind einfach. Die blaß purpurrothen oder rosenfarbigen, selten weißen, schmetterlingsförmigen Blumen stehen auf sehr kurzen Stielen einzeln oder auch zu zweien in den Blattwinkeln.

Die officinelle Wurzel besitzt einen süßlich-schleimigen Geschmack, und ist geruchlos. Man sammelt sie auch wohl von der Ackerhauhechel (Ononis arvensis Linn.) welche Pflanze sich an gleichen Standorten findet, und deren Wurzel nicht wesentlich verschieden ist. Sie enthält eine ansehnliche Menge Harz, das sich bei dem Abdampfen der Abkochungen abscheidet.

Dieser Wurzel ist schon von Galen und Dioskorides als eines harntreibenden Mittels erwähnt worden; sie ist jetzt nur noch selten in Gebrauche, und wird in der Abkochung verordnet.

Opium. Opium. Mohnsaft.

Wird aus den unreifen Kapseln von Papaver somniferum Linn., einer einjährigen im Orient und in Aegypten angebauten Pflanze bereitet.

Ein dickes Extract in Klumpen oder Kuchen, braun, undurchsichtig, wenig glänzend, zähe, innen weicher und an den Fingern anhängend, getrocknet beim Zerreiben gelb, von bitterm Geschmacke, widerlichem Geruche, in Wasser dem größern Theile nach auflöslich mit klarer Auflösung, sehr häufig mit den Saamen und Blättern eines Ampfers umgeben, sehr giftig. Man hüte sich, daß das Opium nicht gar zu sehr mit fremdartigen Körpern vermischt sey. Bewahre es mit Vorsicht den Verordnungen gemäß auf. Die Gabe bis zu einem Gran.

Papaver somniferum Linn. Der gemeine Mohn und
Papaver officinale Gm. Der weiße Mohn.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 2. Papaveraceae.

Beide Pflanzen sind einjährig und im Oriente zu Hause. Sie werden, uud besonders die letztere, im Oriente, Persien, Arabien, Aegypten ange-

baut, wo sie außerordentlich gedeihen, und viel höher wachsen, als bei uns, indem sie des Saamens und des daraus zu pressenden Oeles wegen theils auf Feldern, theils auch in Gärten zur Zierde gezogen werden.

Der Stengel der erstern Pflanze ist aufrecht, blättrig, blaugrünlich, rund, etwas ästig, 3, 4—5 Fuß hoch, die breiten, großen, abwechselnden Blätter sind aufsitzend, den Stengel umfassend, eingeschnitten, ungleich gezahnt, zugespitzt, saftig, auf beiden Flächen glatt und von blaugrünlicher Farbe. Die sehr großen, blaß purpurfarbigen, am Grunde jedes Blumenblattes mit einem schwärzlichen Flecken bezeichneten Blumen stehen einzeln am Ende des Stengels und der Zweige auf glatten Blumenstielen, und sind vor dem Aufblühen hängend. Sie kommen oft gefüllt vor, sind sehr schön, und in Hinsicht der Farben sehr mannigfaltig. Der Kelch besteht aus zwei stumpfen Blättchen und ist nur an der ungeöffneten Blume vorhanden. Die vier abfallenden Blätter der Blumenkrone sind sehr groß, rundlich, ausgebreitet und am Grunde etwas schmäler. Die vielen haarförmigen Staubfäden tragen längliche Staubbeutel. Die Frucht besteht in einer sehr dicken, großen, glatten, fast kugeligen Saamenkapsel, welche, gekrönt mit der groben Narbe, unter welcher sie in vier Löcher aufspringt, inwendig durch halbe Scheidewände in viele Fächer getheilt ist, und eine sehr große Anzahl kleiner weißlicher oder schwärzlicher Saamen enthält.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli; die Saamen reifen gegen August und September.

Der weiße Mohn, der nach Nees v. Esenbeck als eine eigene Art unterschieden zu werden verdient, ist in allen Theilen größer; der blaue Reif, welcher den Stengel und die Blätter deckt, ist sehr dünn, so daß die blaßgrüne Farbe mehr hervortritt; die Blume ist größer, und von rein weißer Farbe; die Kapsel gewinnt einen weit größern Umfang und bleibt auch bei der Reife geschlossen. Der Saame ist weiß. Alle Theile dieser Pflanze besitzen einen virösen, widerlichen Geruch. Macht man einen Einschnitt in dieselbe, so fließt ein zäher, weißer Saft heraus, der sehr bald braun wird.

Aus den Saamenkapseln wird das Opium (Ale-oon oder Abe-oon von den Persern genannt, woraus durch Verstümmelung Opium geworden), gewonnen. Das eigentliche Opium der Alten war das durch Einschnitte in die Mohnköpfe gewonnene, wogegen das durch Auspressen der zerstampften Pflanze bereitete von ihnen Mekonium genannt wurde. Wenn es nun auch gewiß ist, daß das durch Einschnitte gewonnene Opium (Lacrymae Opii) bei weitem zu dem Verbrauche in Asien und Europa nicht ausreichen würde, dieses auch gar nicht zu uns kommt, so ist es doch sicher auch unrichtig, wenn behauptet wird, daß wir nur das Mekonium der Alten erhielten; denn ein solches Opium könnte nicht jenen eigenthümlichen Geruch besitzen, den man an dem verkäuflichen Opium bemerkt. Man muß also annehmen, daß beide Methoden zu gleicher Zeit angewendet werden. Den Nachrichten der Reisenden zufolge wird folgendermaßen verfahren: Es werden alle Abende 5 oder 6 Tage hindurch an den noch unreifen Mohnköpfen 4—5 Längeneinschnitte ge-

macht. Am andern Morgen wird der ausgeflossene und an den Mohnköpfen fest gewordene Saft mittelst eines Messers, das mit Sesamöl bestrichen ist, abgenommen, in flache Gefäße gethan und an der Sonne getrocknet. Hierauf zerstampft man, vielleicht mit etwas Wasser, die Pflanze, welche dieses erste Product geliefert hat. Man preßt den Saft aus, den man über dem Feuer abdampfen läßt und setzt ganz zuletzt so viel von dem zuerst gewonnenen Producte hinzu, als nöthig ist, um ihm den Geruch und die nöthigen Eigenschaften zu ertheilen; je größer dieser Zusatz, desto besser ist das Opium.

Dieses Extract wird in runden Kuchen von 4—16 Unzen Schwere und drüber geformt, in Blätter von Mohn oder andern narkotischen Pflanzen eingewickelt, und vollends in der Sonne getrocknet. Zwei Pfund Mohnsaamen auf 150 □Fuß Acker angebaut, geben 7—11 Pfund Opium. Guibourt berichtet, daß das Opium, welches nach Frankreich, besonders nach Marseille kommt, noch umgeformt wird; man macht es nämlich wieder weich, mengt allerlei fremdartige Substanzen bei, knetet es und umgiebt es von neuem mit Mohn- oder Tabaksblättern. Da man ferner ziemlich oft Saamen einer Ampferart auf der Außenseite des guten Opiums bemerkte, so trägt man Sorge, es ganz damit einzustreuen, außer der großen Menge, welche man schon hineingeknetet hat.

Die Masse eines ächten guten Opiums ist dicht, völlig undurchsichtig, zwischen den Fingern sich erweichend, beim Schneiden insgemein sich etwas zerbröckelnd, auf dem Bruche etwas glänzend, übrigens ziemlich gleichförmig röthlichbraun, von einem erst bitterlichen ekelhaften, nachher aber scharfen beißenden, allmälig etwas brennenden anhaltendem Geschmacke, und durchdringend ekelhaftem und betäubendem Geruche. Den Speichel macht es beim Kauen grünlich und schaumig. Auf dem Papiere giebt es einen hellbraunen unterbrochenen Strich. Das Pulver ist lichtbraun und leicht wieder zusammenbackend.

Verwerflich ist das ganz dunkelbraune, schwärzliche, schwach oder brenzlig riechende, mit fremdartigen Theilen verunreinigte, den Speichel stark braun färbende, völlig ausgetrocknet nicht mehr zähe werdende und sich erweichende, sondern zum staubigen Pulver zerreibliche, und eben so das zu weiche und schmierige Opium. Ein mit Sand vermengtes, mit Süßholzsaft, Aloë u. s. w. verfälschtes ist an dem Knirschen beim Schneiden und durch den Geschmack zu erkennen.

Pfaff (Trommsd. N. J. VII. 1. S. 428.) berichtet von einer schlechten Sorte Opium, welche ihm unter dem Namen „ostindisches Opium" vorgekommen ist. Es kommt gewöhnlich in etwas platten Kugeln von 3—4″ Durchmesser vor, ist viel dunkler, beinahe pechschwarz, hat nicht sowohl den eigenthümlichen Geruch des Opiums, als vielmehr einen eigenthümlichen virösen Geruch, einigermaaßen nach Bilsenkraut mit einer süßlichen Beimischung. Auf dem Bruche ist es nicht schimmernd, an der Lichtflamme nicht brennend, giebt auf dem Papiere nur einen matten Strich. Seine wäßrige Tinctur wirkt übrigens durch freie Säure eben so stark auf das Lackmuspapier und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0672-0

bringt mit Eisenlösungen eine eben so lebhafte carmoisinrothe Färbung hervor, wie die wäßrige Tinctur des besten Opiums. Bei der Aufbewahrung wird es ungemein hart, und hinterläßt beim Ausziehen mit 82procentigem Weingeiste weit mehr Rückstand, als das levantische, nämlich von einem Quentchen 36 Gran, da der von letzterem nur 20 Gran beträgt; auch ist der Rückstand vom ostindischen Opium mehr trocken, der vom levantischen hingegen mehr klebrig (wahrscheinlich von Kautschuk). Bisweilen fand auch Pfaff in den Apotheken ein Opium vor, welches, ebenfalls in platten Kuchen, auf dem Bruche sehr zähe, fast wie Kleber, und mehr hellbraun als dunkelrothbraun war. Ob es mit dem ostindischen einerlei sey, mag Derselbe nicht entscheiden.

Auch in Europa hat man verschiedene Versuche gemacht, das Opium aus Mohnpflanzungen zu gewinnen: die bedeutendsten sind die von Cowley und Staines 1821 zu Winslow in England angestellten. Sie erhielten aus noch nicht 4½ Morgen Landes, indem sie in die Mohnköpfe vermittelst eines Instruments mit fünf Klingen horizontale Einschnitte wiederholt machen ließen, 60 Pfund trocknes, dem besten türkischen gleichendes Opium; aus den Saamen überdies 71½ Gallone Mohnöl, und die Oelkuchen wurden mit Vortheil als Viehfutter benutzt. Auch in Deutschland hat man aus den halbreifen Saamenkapseln ein einheimisches Opium gewonnen, welches alle Bestandtheile des ostindischen Opiums und nahe in demselben Verhältnisse enthält. Lindbergson in Stockholm will sogar im inländischen Opium mehr Morphium gefunden haben, als im ausländischen. Bei dem Reifen der Saamen scheint jedoch eine Umwandlung der Stoffe zu erfolgen, denn das aus reifen Mohnköpfen gewonnene Opium enthielt, wie Peschier gefunden hat, weder Morphium noch Mekonsäure.

Kaltes Wasser nimmt einen bedeutenden Theil vom Opium in sich auf und giebt eine klare braun gefärbte Auflösung. Diese reagirt sauer; etwas davon zu einer schwefelsauren Eisenoxydulauflösung gegossen ertheilt dieser eine dunkelrothe Farbe.

Nicht leicht ist ein Arzneistoff ein Gegenstand so vieler Bearbeitungen gewesen, als, besonders in neueren Zeiten, das Opium. Bucholz (Trommsd. J. VIII. 1. S. 58.) wies als einen bis dahin unbekannten Bestandtheil des Opiums das Kautschuk nach. Derosne (Trommsd. J. XII. 1. S. 223.) erkannte im Opium eine krystallinische Substanz (Derosne's krystallinischen Opiumstoff); Sertürner (Trommsd. J. XIV. 1. S. 86.) entdeckte unabhängig von Derosne ebenfalls eine krystallinische Substanz, und außerdem noch eine eigene Säure, die Mohn- oder Mekonsäure u. s. w.

Als Resultate der vielfältigen Analysen und Arbeiten sind nun folgende aufgefundene Bestandtheile des Opiums anzugeben:

1) Morphium, Morphine. Sertürner hatte schon im Jahre 1805 neben dem Derosne'schen Salz eine andere krystallisirbare Substanz entdeckt, welche alkalische Eigenschaften zu haben schien. Jedoch blieb diese Entdeckung unbeachtet, bis er im Jahr 1816 seine neuen Bearbeitungen des Opiums bekannt machte, nach welchen er aus den wäßrigen Opiumauflösun-

gen durch Ammoniak eine neue alkalische Substanz, welche an eine eigene Säure gebunden gewesen, gefällt hatte (Gilbert's Annalen XXV. S. 56.). Im Jahr 1817 (Gilb. Ann. XXVI. S. 337.) lieferte er einen Nachtrag zu seinen Entdeckungen, die nun von Robiquet (Gilb. Ann. XXVII. S. 163.) von Buchner, Brandes, Vogel und Pettenkofer (Buchn. Repert. IV. S. 1.) bestätigt wurden, und noch viele andere Arbeiten veranlaßten, als von Pagenstecher (Trommsd. N. J. III. 1. S. 357. und IV. 2. S. 456.), John und Kastner (Berl. Jahrb. 1819. S. 152.) Geiger (Berl. Jahrb. 1820. S. 117.).

Auch Seguin (Trommsd. N. J. I. 2. S. 117.) hatte eine große Reihe von Versuchen mit dem Opium angestellt, und eine krystallinische Substanz, so wie eine eigenthümliche Säure gefunden, weshalb Vauquelin (Trommsd. N. J. III. 2. S. 316.) ihm die Priorität der Entdeckung zuschreiben wollte. Da jedoch Seguin die gefundenen Stoffe nicht weiter untersucht hat, so gebührt mit vollem Rechte Sertürnern die Ehre der Entdeckung.

Sertürner hatte, wie erwähnt, das Morphium aus der wäßrigen Auflösung des Opiums durch Niederschlagen mit Ammoniakauflösung dargestellt; später ist die Darstellungsweise theils von Sertürner selbst, theils von andern Chemikern auf vielfältige verschiedene Weise angegeben worden. Da das Morphium aber allgemein als ein ausnehmend wirksames Arzneimittel anerkannt worden ist, so daß dasselbe nicht leicht unter den pharmaceutischen Präparaten einer gut versehenen Apotheke fehlen darf, so wird es unter den Präparaten im 2ten Theile eine Stelle finden, wo auch die Bereitungsweise ausführlicher angegeben werden soll.

2) Narkotin. Opian. Dieser von Derosne dargestellte Stoff ist keineswegs, wie Sertürner glaubte, basisches mekonsaures Morphium, sondern ein eigenthümlicher Bestandtheil des Opiums, vom Morphium verschieden, von welchem eben so viel erhalten wird, wenn auch das Opium vorher ausgezogen worden ist. Dieses geschieht durch Aether, welcher außer dem an einer Säure gebundenen Opian noch Kautschuk, ein fettes Oel und eine thierisch-vegetabilische Materie auflöst. Der Aether wird bis auf $\frac{2}{3}$ abdestillirt. Es bleibt eine aus säurehaltigem Opian bestehende Salzkruste und eine braune, bittere, saure, Balsam, Opian und eine Säure, vielleicht Essigsäure, haltende Flüssigkeit zurück. Die abgegossene Flüssigkeit wird abgedampft, der Rückstand mit kochendem Wasser ausgezogen, welches den Balsam zurückläßt und aus der wäßrigen Auflösung das Opian durch Ammoniak gefällt. Die Salzkruste, durch erhitztes rectificirtes Terpenthinöl von anhängendem Balsam und Kautschuk befreit, und mit kaltem Alkohol abgewaschen, wird in heißem Alkohol aufgelöst, und das Opium durch Ammoniak gefällt. Das von beiden Substanzen erhaltene Opian wird in möglichst wenig erhitzter Salzsäure aufgelöst, und wieder durch Ammoniak ausgefällt.

Das reine Opian ist atlasartig glänzend, aus seiner sauren Auflösung gefällt erscheint es als ein weißes, lockeres Pulver, aus der Auflösung in

Alkohol oder Aether krystallisirt es in zarten, oft strahlig vereinigten vierseitigen Prismen mit rhomboidalischen Grundflächen und zugeschärften Enden. In kaltem Wasser ist es unauflöslich, von kochendem erfodert es 400 Theile. In der Auflösung reagirt es weder alkalisch noch sauer, verbindet sich zwar mit den Säuren, jedoch in geringerer Menge als das Morphium; die Verbindungen reagiren stets sauer, und schmecken bitterer als die Morphiumsalze. Die Alkalien fällen das Opian in weißen Flocken. Kalilösungen nehmen etwas mehr Opian auf, als das reine Wasser. Neben Alkohol und Aether lösen auch die ätherischen Oele das Opian auf, jedoch nicht das Terpenthinöl. Bei der trocknen Destillation schmilzt es, schäumt und giebt kohlensaures Ammoniak; auf glühenden Kohlen entflammt es sich. Erwärmte Salpetersäure röthet es und löst es unter Bildung von Kleesäure und künstlichem Bitter auf. Es besteht nach Dumas und Pelletier aus 68,88 Kohlenstoff, 7,21 Stickstoff, 5,91 Wasserstoff und 18,00 Sauerstoff.

Hinsichts dieser beiden krystallinischen Stoffe, des Morphiums und des Narkotins, möchte wohl die von Meißner ausgesprochene Ansicht, daß in der belebten Pflanze der eine Stoff in den andern übergehen könne, und daß in den unreifen Mohnköpfen das Morphium, in den reiferen das Opian verhältnißmäßig vorherrschend seyn möchte, der Wahrheit nahe kommen.

3) Mekonsäure. Mohnsäure. Nach Sertürner wird, nachdem aus der wäßrigen Opiumauflösung das Morphium durch Ammoniak ausgefällt worden, die überstehende Flüssigkeit von dem Niederschlage getrennt, und das überschüssig zugesetzte Ammoniak durch Erwärmen entfernt, worauf so lange salzsaurer Baryt hinzugesetzt wird, als noch ein Niederschlag entsteht (von 8 Unzen Opium 2—3 Drachmen), der mit destillirtem Wasser ausgewaschen und bei sehr gemäßigter Wärme getrocknet wird. Der Niederschlag ist eine Verbindung von Mekonsäure, Baryt und Extractivstoff; um diesen letztern zu entfernen, wird mit Alkohol digerirt, ausgewaschen und der dann bleibende Niederschlag durch eine dem Baryt angemessene Menge sehr verdünnter Schwefelsäure (auf 60 Gran mekonsauren Baryt 100 Gran Wasser, welches zuvor mit 24 Gran concentrirter Schwefelsäure gesäuert worden) zersetzt, wobei man jedoch lieber etwas mekonsauren Baryt unzersetzt läßt, als zuviel Schwefelsäure anwendet. Nachdem sich das Unlösliche zu Boden gesetzt, filtrirt man von dem entstandenen schwefelsauren Baryt die mekonsäurehaltende Flüssigkeit ab, verdampft dieselbe höchst gelind, und bringt die gehörig abgedampfte Lauge zum Krystallisiren in die Kälte, wo dann die Säure in regellosen Formen anschießt. Sie ist größtentheils gefärbt, und muß bei gelindem Feuer sublimirt werden, wo sich die Krystalle in schönen langen Nadeln ansetzen. Hierbei wird aber die Säure leicht zersetzt, sie kann also auch durch Auflösen, Digeriren mit Kohle und Krystallisiren gereinigt werden.

Robiquet kocht den Opiumaufguß mit reiner Bittererde, zieht das Morphium durch Alkohol aus, löst den Rückstand, mekonsaure Bittererde, in sehr verdünnter Schwefelsäure auf, fällt durch salzs. Baryt, und zersetzt nun wie vorhin den mekonsauren Baryt durch verdünnte Schwefelsäure.

Im reinen Zustande ist die Mekonsäure farblos, krystallisirt theils in langen Nadeln, theils in viereckigen Blättchen, oft auch in glimmerartigen Schuppen. Sie röthet die Lackmustinctur, schmeckt anfangs sauer und kühlend, dann unangenehm bitter. Sie ist in Alkohol und Wasser leicht auflöslich und bei 120—125 ° C. sublimirbar. Mit den Basen giebt sie neutrale leicht auflösliche Verbindungen, welche, so wie die Säure für sich, eine charakteristische Einwirkung auf die oxydirten Eisenauflösungen äußern, deren Farbe sie mehr oder weniger in Blutroth umändern. Diese Farbe bleicht im Sonnenlichte aus, kehrt aber im Dunkeln wieder zurück. Die schwarze Farbe der Tinte wird in die blutrothe umgewandelt. Das schwefelsaure Kupfer wird durch sie schön smaragdgrün gefärbt, und es bildet sich nach einiger Zeit ein pulveriger, blaßgelber Bodensatz. Die grüne Farbe ist daher entstanden aus der blauen des unzersetzten schwefelsauren, und der gelben Farbe des mekonsauren Kupfers. Auch die ätzende Sublimatauflösung wird nach einiger Zeit getrübt, und das salpetersaure Silber in hellgelben Flocken gefällt. Aus der salzsauren Goldauflösung scheidet die Mekonsäure das Gold metallisch auf der Oberfläche der Flüssigkeit ab.

4) Extractivstoff. Er findet sich im Opium in beträchtlicher Menge, und scheint mit dem Morphium in chemischer Verbindung zu stehn, daher es sehr schwer hält, ihm alles Morphium zu entziehen. Aus dieser Verbindung besteht größtentheils das Opiumextract.

5) Opiumbalsam. Nach Sertürner und John enthält das Opium noch eine balsamartige Materie, welche durch folgendes Verfahren erhalten wird. Der durch die Behandlung mit Wasser von den darin auflöslichen Theilen befreite, nicht spröde, sondern beinahe teigartige Rückstand des Opiums wird öfters mit kaltem Alkohol digerirt. Der Auflösung wird destillirtes Wasser zugesetzt und schwach aufgekocht, welches Verfahren noch einmal wiederholt wird; es scheidet sich eine braune, flüssige, balsamartige Substanz auf dem Wasser schwimmend ab, die aber bald zu Boden sinkt. Dieser Balsam, dem durch Digeriren mit Wasser noch die geringen Antheile Morphium entzogen werden, hat die Consistenz des Terpenthins, ist geschmacklos, riecht im hohen Grade wie Opium, ist in absolutem Alkohol, Aether und den ätherischen Oelen leicht löslich, im Wasser unlöslich; in einem Löffel erhitzt fließt er wie Oel, verbrennt mit lebhafter Flamme und einem besondern, nicht angenehmen Geruche, setzt Ruß ab, hinterläßt aber wenig Kohle.

6) Fettes Oel. Wird der Rückstand, von welchem die balsamische Materie erhalten worden, mit Alkohol digerirt, so erhält man oft eine farbige, kaum bitter schmeckende Auflösung, welche vom Wasser getrübt, von Essigsäure nicht wieder klar wird, daher diese Trübung von einem aufgelösten fetten Oele herrührt, welches sich auch oft schon in Tröpfchen abscheidet, und sich durch Ruhe zu Boden setzt. Es ist gewöhnlich schwärzlichbraun, schlägt sich aber, wenn es in vielem Alkohol aufgelöst wird, [illegible]alten in sehr zertheilter Form und mit gelbbrauner Farbe nieder.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0676-3

Dieses fette Oel scheint aber keineswegs ein wesentlicher Bestandtheil des Opiums, sondern das Sesamöl zu seyn, welches bei dem Einsammeln des Opiums zufällig in dasselbe hineingebracht worden ist.

7) Kautschuk. Aus den ätherischen Auszügen wird das Opium auskrystallisirt, wo sich beim ferneren Abdampfen Kautschuk absondert; oder auch, der von der balsamischen Materie befreite Opiumrückstand wird mit frisch rectificirtem Terpenthinöle oder Aether digerirt, das Auflösungsmittel abdestillirt, wo ein sehr weiches dehnbares Federharz im Rückstande bleibt.

8) Kleberartiger Stoff. Der von den auflöslichen Theilen vollkommen befreite Opiumrückstand wird zu wiederholten Malen in der Wärme mit verdünnter Schwefelsäure behandelt, wodurch eine graulichweiße Substanz ausgeschieden wird, welche ein kleberartiger Stoff zu seyn scheint.

9) Harz. Das im Opium enthaltene Harz scheidet sich während der Bearbeitungen des Opiums ab, und verbindet sich oft mit den abgeschiedenen Körpern. Es ist schwarz, zähe, hat wenig Geruch und Geschmack.

10) Gummi. Wird gleichfalls bei den Bearbeitungen des Opiums ausgezogen. Andere Chemiker haben kein Gummi gefunden.

11) Flüchtiger Stoff. Das über Opium abgezogene Wasser riecht stark, wie Opium, oder frisch aufgeschnittene Mohnköpfe, hat einen dem Opium ähnlichen Geschmack, reagirt weder auf Kurkume- noch Lackmuspapier, und enthält kein ätherisches Oel. Die Leute, welche das Opium einsammeln, oder beim Kochen des Mohnsaftes sich einige Zeitlang in mit Opiumdunst angeschwängerter Luft aufhalten, sollen oft betäubt und sinnlos wie todt zu Boden fallen. Eben so soll Opium in wärmere Temperatur versetzt einen Dunst von sich geben, welcher Thiere zu tödten vermag (dem Nikotianin ähnlich?).

Daß dieser flüchtige Stoff nicht Blausäure, diese Säure überhaupt nicht Bestandtheil des Opiums sey, geht aus Lüdecke's Versuchen (Schw. J. XVII. S. 449.) aufs deutlichste hervor.

Pfaff (Trommsd. N. J. VII. 1. S. 423.) fand in einem Opium, welches alle Kennzeichen der Güte hatte, an mehreren Stellen eine weiße gleichsam kreideartige, doch etwas krystallinische Substanz, welche eine neue eigenthümliche Säure war, die in die Classe der in Wasser schwer auflöslichen Säuren (wie z. B. die Benzoësäure) gehörte. In heißem Wasser löste sie sich leicht auf, schied sich aber beim Erkalten in weißen durchsichtigen, glänzenden, krystallinischen Blättchen wieder ab. Auf einem heißen Platinbleche schmolzen diese Blättchen leicht, und verflüchtigten sich vollkommen mit aromatischem Geruche. In Alkohol waren sie ungemein leicht auflöslich, und die Auflösung wurde durch Wasser getrübt. Die weingeistige, so wie die wäßrige Auflösung rötheten die Lackmustinctur, und färbten die Eisenoxydullösungen schmutziggrün; die Kupferauflösung wurde hellgrün, die Bleizuckerlösung weiß gefällt.

Robiquet wollte durch Auswaschen des Opiumbalsams mit destillirtem Wasser eine Säure gefunden haben, die nach ihm Robiquet'sche Säure genannt, von andern Chemikern aber für Essigsäure erklärt wurde. So

glaubte auch Robinet (Trommsd. N. J. XII. 1. 1826. S. 230. und XIII. 1. S. 136; Schweigg. N. J. XV. S. 242; Buchn. Repert. XXII. 2. S. 220.), als er concentrirte Lösungen leicht löslicher Salze, als des salzs. oder schwefels. Natrons, bei einer neuen Analyse des Opiums anwandte, eine von der vorigen abweichende eigenthümliche Säure aufgefunden zu haben, die er Kodsäure, Kodiksäure (von Κώδεια, Κωδία, der Mohnkopf) nannte, deren Vorhandenseyn sich aber gleichfalls nicht bestätigt fand. (Vergl. Morphium im 2ten Theile.). Duflos (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 195.) konnte außer der Mekonsäure keine neue Säure entdecken.

Sertürner gab als Resultat seiner früheren Analyse des Opiums folgende Bestandtheile an: Extractivstoff, Gummi, balsamartigen Stoff, Morphium, Mohnsäure, Harz, Gluten, Kautschuk, schwefels. Kalk, Thonerde, einen stark riechenden Stoff, außerdem noch verhärtetes Eiweiß, Pflanzenfaser und Unreinigkeiten. In seinen spätern Analysen fand er auch noch das Opian; einen wesentlichen Balsam; ein eigenthümliches Salz, zusammengesetzt aus dem zweiten Morphiumoxyd und einer noch nicht hinreichend untersuchten Säure, und ein anderes basisches Salz, aus denselben Bestandtheilen.

Nach John (Berl. Jahrb. XX. S. 153.) enthalten 100 Th. Opium: Morphium 12,0; Mekonsäure 2,5; braunen harten harzigen Stoff 12,0; braunen schmierigen Stoff 10,0; Extractivstoff 25,0; balsamische Materie 1,0; ranzigen stinkenden Stoff 2,0; Kautschuk 2,0; Membranen der Saamenkapsel und Fasern 18,5; verschiedene Salze und Feuchtigkeit 15,0.

Nach Buchner sind die Bestandtheile des Opiums: flüchtiger narkotischer Stoff; mekonsaures Morphium; Opian; Robiquet'sche Säure; Extractivstoff; Gummi; Harz; kleberartiger Stoff; Kautschuk; fettes Oel; schwefels. Kalk; Wasser; Unreinigkeiten. Andere Untersuchungen geben an, daß das Opium 12 Procent Morphium, 4 Procent Opian und 20 Procent bittern Extractivstoff enthalte. (Vergl. Berl. Jahrb. XIX. S. 290.; XXVI. 1. S. 232. XXVI. S. 202. Pfendler's chemische Abhandlung über das Opium.)

Merck (Geiger's Magazin 1826. August S. 147.) erhielt, als er das Opium nach Robinet's Anleitung mit einer Kochsalzlösung auszog: salzsaures Morphium und mekonsaures Natron, keine Kodsäure. Das salzs. Morphium, von dem Extractivstoffe sehr gefärbt, ließ sich größtentheils davon befreien durch öfteres Abrauchen und Wiederauflösen in kaltem Wasser, wodurch endlich das salzs. Morphium in großen farblosen strahlenförmigen Krystallen erhalten wurde, welches erst aus der geistigen Auflösung in den schönsten, weißen, stark glänzenden Krystallen anschoß.

Der ausgeschiedene Extractivstoff bildete in der Wärme eine harzige Masse, die sich kneten und ziehen ließ.

Robinet hatte von seinem durch concentrirte Kochsalzauflösung ausgezogenen Morphinsalze die ganz besondere Eigenschaft angeführt, daß es mit vollkommen oxydirten Eisensalzen eine intensiv blaue Farbe annahm, wodurch Robinet auf die Vermuthung gerieth, es möchte Gallussäure oder Blau-

säure enthalten, welche Vermuthung sich aber nicht bestätigte. Nach weiteren Versuchen von Robinet kommt diese eigenthümliche Reaction des Morphinsalzes auf die vollkommen oxydirten Eisensalze dem Morphium an und für sich zu, und es sey dies ein neues ausgezeichnetes Mittel, um das Morphium zu erkennen, und es von andern vegetabilischen Alkaloiden, welche mit Salpetersäure gleichfalls roth werden, zu erkennen. Merck bemerkt nun, daß auch das in Alkohol aufgelöste salzsaure Morphium in salzs. Eisenoxyd einen schön blauen Niederschlag hervorbrachte, der aber schnell wieder verschwindet, wenn die Auflösung des Morphiums nicht hinreichend concentrirt ist. (Nach meinen hierüber angestellten Versuchen kann ich auch dieser Angabe nicht beistimmen, da es unterlassen worden zu seyn scheint, den durch Ammoniak hervorgebrachten Niederschlag in der salzs. Eisenauflösung mit dem durch Morphium erhaltenen zu vergleichen.)

Der Opiumrückstand wurde nun mit verdünnter Essigsäure digerirt, die Flüssigkeiten zur Trockne verdunstet, und mit kaltem Wasser wieder aufgeweicht. Dieses wurde von neuem verdunstet und wieder aufgelöst, um den Extractivstoff abzuscheiden, wodurch eine leichte braune Masse von pulveriger Consistenz erhalten wurde, die zweimal mit kochendem Weingeiste behandelt nach dem Erkalten Narkotinkrystalle gab.

Aus diesen Versuchen ergebe sich die Existenz des mekonsauren Morphiums und Narkotins, welches letztere als schon gebildet und für sich bestehend anzunehmen sey. Vorzüglich häufig sey dasselbe in den sogenannten Remanenzen der Opiumtincturen enthalten, weshalb der von Mehreren gemachte Vorschlag, diese Rückstände durch Behandlung mit Essigsäure auf Morphium zu benutzen, nicht zu billigen sey, indem man aus denselben nur eine unbedeutende Menge Morphium, wohl aber viel Narkotin erhalte.

Nach dieser Analyse bestehen 2 Pfund Opium aus: Extractivstoff 16 Unzen; mekonsaurem Morphium 4 Unzen; Narkotin 1 Unze; eigenthümlicher Säure 1 Unze, Pflanzenfaser 4½ Unze, wäßriger Feuchtigkeit 3 Unzen; fettem Oele, narkotischem Stoffe und Verlust 2½ Unze.

Geiger (Magazin 1826. August. S. 164.) hat inländisches Opium analysirt und aus demselben erhalten: Morphium, Mohnsäure, harzigen braungefärbten Extractivstoff, Fett und Harz, Kautschuk, Kleber oder Eiweiß. Die Asche enthielt vorzüglich phosphorsauren Kalk. Dem inländischen Opium mangelte nur der nauseose Geruch des frischen weichen orientalischen Opiums.

Das Opium ist ein sehr geschätztes und in vielen Fällen unentbehrliches Heilmittel von narkotischer Wirkung. Diese leitete man früher bald von einer darin enthaltenen kleberartigen Materie, bald von einem narkotischen Extractivstoffe, bald von einem flüchtigen Principe ab, bald glaubte man, sämmtlichen Bestandtheilen des Opiums hänge die narkotische Kraft an. Die Entdeckung der beiden krystallisirbaren Stoffe im Opium durch Derosne und Sertürner berichtigte die früheren Meinungen, ohne daß jedoch alle Zweifel, sowohl über die chemische Constitution des Opiums, als darüber gehoben zu seyn scheinen, welchem Bestandtheile die narkotische Wir-

kung des Opiums zugeschrieben werden müsse. Sertürner schloß seinen Versuchen zufolge, daß das Opium, abgesehen von dem Harze, Oele u. s. w., mekonsaures Morphium enthalte, welches durch Einwirkung des kalten Wassers in leicht lösliches saures und in schwer lösliches basisches mekonsaures Morphium getrennt werde, vorausgesetzt, daß es keine andern Pflanzensäuren sind, welche das Lackmuspapier röthen. Der Extractivstoff werde ebenfalls in zwei Theile getrennt, wovon der eine, welcher sich in freiem Zustande befindet, aufgelöst werde, und der andere ohne Zweifel mehr oxydirte Theil mit dem basischen mekonsauren Morphium im Rückstande bleibe, und mit Alkohol digerirt basisches mekonsaures Morphium nebst einer Verbindung des Morphiums mit dem in Wasser fast unlöslichen, in den Säuren aber leicht löslichen Extractivstoffe bilde, welchen letzteren Sertürner daher später als eine Säure anzusehen geneigt war. Robinet glaubte, daß das Morphium an die Kodiksäure, die Mekonsäure aber an das Natron gebunden sey.

Nach Sertürner ist das Morphium als der eigentlich wirksame Bestandtheil des Opiums anzusehen, da es schon zu einem Gran in Zeit von einer Stunde genommen, Neigung zum Erbrechen, dumpfen Kopfschmerz und Betäubung verursache. Orfila fand es selbst in einer Gabe von 12 Gran schwächlichen Hunden gegeben ohne Wirkung, wogegen seine narkotische Wirkung sogleich entwickelt werde, wenn man es in Form eines Salzes reiche, wo es leicht von dem Magensafte aufgelöst werde. In den Versuchen von Vogel und Sömmering (Schw. J. XXIII. S. 31.) zeigte sich das mit Säuren verbundene Morphium in Gaben von 4—10 Gran sehr wirksam. Nach Magendie's Angaben soll das Morphium erst in Gaben von 30—60 Gran bei mittelmäßig großen Hunden Schwindel, convulsivische Bewegungen und nach 4—6 Stunden den Tod bringen. Größere und ausgewachsene Hunde vertragen große Gaben desselben, ohne davon zu unterliegen.

Lindbergson (Schw. N. J. XII. 1824. S. 308.) behauptet, daß die narkotische Kraft nicht dem Morphium angehöre, denn wenn es vollkommen rein ist, errege es bloß wegen des sehr bittern Geschmackes Ekel und Neigung zum Erbrechen, ein eigenthümliches Uebelbefinden im Magen und Kopfweh. Dieses sey auch von Andern bestätigt worden. John Murray in England habe einer Katze zwei Drachmen sauren essigs. Morphins gegeben, und es hätten sich davon keine giftigen Wirkungen gezeigt. Nach ihm ist es der Extractivstoff, der im Opium hauptsächlich wirksam ist. (Wohl nur durch seinen Gehalt an Morphium, welches in dieser leicht löslichen Verbindung vom Organismus leicht aufgenommen wird.)

Das Opian, dessen Daseyn Lindbergson ganz in Abrede stellt, da er durch Behandlung des Opiums mit Aether nur reines unschädliches Morphium (?) nebst Kautschuk erhalten habe, und welchem Bestandtheile Derosne die narkotische Wirkung des Opiums zuschrieb, hat sich in andern Versuchen ganz unwirksam bewiesen, da es nach Magendie selbst in Gaben von 30—40 Gran keine Narkosis herbeiführte.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0680-4

Bei diesen Versuchen ist es erfoderlich, sich des Stoffes zu vergewissern, mit welchem die Versuche angestellt werden sollen, und es ist hier dasjenige zu vergleichen, was im 2ten Theile bei Morphium über Trennung der beiden krystallisirbaren Stoffe angemerkt sich befindet.

Die Mekonsäure, welche nach Sertürner den wohlthätigen Wirkungen des Morphiums entgegenwirken, sie zum Theil vernichten soll, und von ihm als eins der fürchterlichsten Gifte der Pflanzenwelt angeklagt wurde, äußerte in den erwähnten von Vogel und Sömmering angestellten Versuchen in Gaben von 8—10 Gran keine giftige Wirkung, welches auch später von Fenoglio bestätigt worden ist.

Wenn nun hiernach gleich die größte Ungewißheit darüber zu bestehen scheint, welcher von den durch die neueren Zerlegungen aufgefundenen Stoffen als der vorzüglich wirksame Stoff angesehen werden müsse, so haben doch die ärztlichen Beobachtungen im Allgemeinen dahin entschieden, daß dieser das Morphium sey, daß vielleicht aber die Schwerlöslichkeit desselben der Einwirkung auf den Organismus entgegenstehe, diese aber sogleich hervortreten, wenn es durch die Verbindung mit dem Extractivstoffe oder mit irgend einer Säure dem Organismus zugänglicher gemacht werde.

Das Morphium wird nicht nur in Substanz in Pulverform verordnet, sondern es geht auch in mehrere sehr wirksame pharmaceutische Zubereitungen, als Tincturen, Extracte ꝛc. ein. Wegen der nachtheiligen, ja den Tod herbeiführenden Einwirkung des Opiums auf den menschlichen Organismus, kann bei Vergiftungen die Nachweisung und Ausmittelung des Opiums eine Frage von der größten Wichtigkeit werden. Früher war außer dem Geruche des Opiums kein Mittel bekannt, dasselbe in den ausgebrochenen Stoffen oder in den Contentis des Magens zu erkennen; jetzt haben uns die neueren Analysen des Opiums Mittel an die Hand gegeben, es durch chemische Reactionen zu erkennen, welche zwar nicht zu der vollständigen Ueberzeugung in dem Grade führen können, wie es bei Arsenik-, Quecksilber- und Bleivergiftungen durch Darlegung der giftigen Substanz selbst möglich ist, die aber doch hinreichend sind, uns der Wahrheit sehr nahe zu bringen, und den Schlüssen des gerichtlichen Arztes in Verbindung mit pathologischen und andern Kennzeichen eine früher nicht mögliche Gewißheit zu gewähren, die sogar auch durch Darstellung einzelner Bestandtheile des Opiums vollständig zu erlangen möglich ist.

Ist noch etwas von der verschluckten Substanz vorhanden, so wird die Erkennung des Opiums leicht seyn. Ist dieses aber nicht der Fall, und es steht bloß das Ausgebrochene zu Gebote, so ist es nicht leicht möglich, das Opium in Substanz zu erkennen, sondern hier muß das Bestreben dahin gerichtet seyn, die vorzüglichsten Bestandtheile des Opiums in ihren chemischen Reactionen zu erkennen, nämlich das Morphium, die Mekonsäure und den riechbaren Stoff. Zu diesem Ende trenne man die flüssigen Theile durch ein Colatorium von den festen Theilen, digerire diese, wenn sie auch nicht Opium in Substanz sollten erkennen lassen, mit verdünnter Essigsäure, mische es zu

dem Vorigen und präcipitire entweder mit Ammoniak oder koche mit Bittererde, um das Morphium niederzuschlagen, welches aus dem Niederschlage durch starken Alkohol ausgezogen und daraus krystallinisch gewonnen werden kann. Die vorgeschlagenen Mittel, das Morphium auch in den kleinsten Spuren durch chemische Reagentien zu erkennen, finden sich bei Morphium im 2ten Theile angegeben; hier ist nur noch zu bemerken, daß das Morphium aus seinen Salzen durch Ammoniak und Gallusäure gefällt wird. Ist es aber gelungen, das Morphium krystallinisch in Substanz darzustellen, dessen Eigenschaften genau geprüft werden müssen, so ist der Beweis auch durchaus vollständig geführt.

Die von dem Niederschlage abgegossene Flüssigkeit werde mit salzs. Baryt gefällt, der Niederschlag, wie bei der Mekonsäure angegeben worden, durch verdünnte Schwefelsäure zersetzt, und die überstehende Flüssigkeit auf Mekonsäure geprüft, welche sich durch die Eigenschaft, die Eisenoxydsalze blutroth zu färben, auf eine unzweideutige Weise wird erkennen lassen. Ist der Barytniederschlag in hinreichender Menge vorhanden, so destillire man einen Theil desselben mit verdünnter Schwefelsäure, wo sich dann zuletzt bei vorsichtiger Regierung des Feuers die Mekonsäure auf die beschriebene Weise sublimiren wird.

Sollte es gelungen seyn, das Vorhandenseyn des Morphiums und der Mekonsäure nachzuweisen, so ist es auch als erwiesen anzusehen, daß die Vergiftung durch Opium bewirkt worden. Bei hinreichendem Vorhandenseyn der verdächtigen Flüssigkeit kann ein Theil derselben der Destillation unterworfen werden, um den riechbaren Stoff des Opiums abzuscheiden.

* Opoponax. Opoponar.

Pastinaca Opoponax Linn. Gummibringender Pastinak. Panaxpflanze.
Ferula Opoponax Spr. Opoponax Chironium Koch.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese perennirende Pflanze wächst im Oriente, im alten Griechenland, in Sicilien, Italien und der Provence. Sie ist eins der größten Doldengewächse und hat ganz das Ansehen des gemeinen Pastinak. Die langgestielten, doppelt dreizähligen Blätter bestehen aus sehr breiten, buchtigen, am Grunde schief herzförmig ausgerandeten Blättchen. Der Stengel ist 4—5 Fuß hoch, cylindrisch, längsgestreift, innen hohl. Die Blüthen sind gelb, und stehen in breiten flachen Dolden am Ende der Stengelverzweigungen. Die Blumenblätter sind ungleich; die Früchte elliptisch flach, glatt, schwach gestreift.

Diese Pflanze giebt, wenn man den untern Stengel und obern Wurzeltheil durch Einschnitte verletzt, einen goldgelben Milchsaft, der an der Luft und Sonnenwärme erhärtet. Nur bei einer schönen und heißen Jahreszeit kann auch in Italien der Milchsaft gewonnen werden, das meiste Opoponax wird aus der Levante gebracht.

Das Opoponax besteht aus einzelnen rundlichen Stücken von der Größe

einer Erbse bis zu der einer Wallnuß, die etwas fettig anzufühlen und doch zerreiblich sind. Von außen ist es gelbröthlich oder braungelb, mit weißlichen Flecken besetzt, inwendig weißgelb, matt, von ebenem Bruche. Der Geschmack ist schärflich, widerlich bitter, dem Geschmacke des Liebstöckels nahe kommend, lange anhaltend; der Geruch gewürzhaft, mit dem des Liebstöckels übereinkommend. Spec. Gew. 1,622. Angezündet brennt es mit heller Flamme.

Dieses ist die beste Sorte, Panaxgummi in Körnern (Opoponax in granis). Eine schlechtere Sorte (O. in placentis) kommt in großen, unförmlichen, dunkelfarbigen, oder gar schwärzlichen, mit vielen Unreinigkeiten vermischten, sehr harten oder zu weichen Stücken vor. Zuweilen sollen Wachsbrocken untermengt vorkommen.

Das Opoponax läßt sich seines Oeles wegen nicht leicht zum feinen Pulver reiben. Mit Wasser gerieben giebt es eine gelbe Milch, aus welcher die harzigen Theile sich nach einiger Zeit abscheiden.

Pelletier (Schw. J. V. S. 245.) behandelte 50 Grammen Panaxgummi wiederholt mit Alkohol. Die letzten Portionen wurden siedend heiß filtrirt, und ließen beim Erkalten 0,15 Grammen einer wachsartigen Materie in Flocken fallen. Die Tincturen waren gelbröthlich. Der davon abdestillirte Weingeist hatte den Geruch und Geschmack im höchsten Grade, doch wurde er durch zugesetztes Wasser nicht milchig. Die zurückgebliebene harzige Masse wog 23,2 Grammen. Sie war dunkel pomeranzenfarbig, und hatte einen bittern Geschmack. Kochendes Wasser nahm davon 2,2 Grammen auf; der Rückstand war jetzt reines Harz. Die 2,2 Grammen, welche das Wasser aufgenommen hatte, gaben ein braunröthliches Extract, das an der Luft feucht wurde, die Lackmustinctur röthete, sehr bitter schmeckte, und aus Extractivstoff und Aepfelsäure bestand.

Der Rückstand des Opoponax von den geistigen Digestionen war weißgelblich, klumpig, klebte an den Wänden des Gefäßes, hatte einen faden und schleimigen Geschmack, und ließ sich mit kaltem Wasser in ein dem arabischen Gummi vollkommen ähnliches, und in ein mehr stärkemehlartiges Gummi zerlegen, das nur von siedendem Wasser aufgelöst wurde. Zurückgeblieben war ein Antheil ganz feiner Holzfaser und eine Spur von Kautschuk. Bei der trocknen Destillation gab das Opoponax empyreumatisches Oel, brenzlige Essigsäure, die nur sehr wenig Ammoniak enthielt, und eine voluminöse Kohle, welche größtentheils aus kohlens. Kalke bestand, und etwas Kieselerde, kohlens., schwefels. und salzs. Kali enthielt.

100 Th. Opoponax enthalten: Harz 42; Gummi 33,4; Stärkemehl 4,2; Holzfaser 9,8; Extractivstoff 1,6; Aepfelsäure 2,8; Kautschuk eine Spur; Wachs 0,3; flüchtiges Oel und Verlust 5,9.

Es ist nur noch selten im Gebrauche zu äußerlichen Mitteln.

* Oreoselinum. Das Kraut. Bergpetersilienkraut.

Athamantha Oreoselinum Linn. Bergpetersilie. Grundheil.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0683-1

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese Pflanze wächst häufig an Bergen und Hügeln auf der der Sonne ausgesetzten Seite.

Die Wurzel ist spindelförmig, von außen mit einem schwarzen Häutchen überzogen, unter demselben weiß und in der Mitte gelblich. Sie ergießt, wenn sie verletzt wird, einen Milchsaft, welcher getrocknet ein durchsichtiges braunes Harz giebt. Der Stengel ist 2—3 Fuß hoch, rund, etwas gestreift und zweitheilig. Die Blättchen sind steif, spitz, unten adrig, in Lappen zertheilt und eben so wie ihre Stiele, die vom gemeinschaftlichen Blattstiele ausgehen, unter rechten, öfters selbst stumpfen Winkeln abgebogen. Gewöhnlich sind sie hellgrün, oft roth angelaufen. Die Blumenschirme sind groß, vierstrahlig, etwas gewölbt und weiß. Der Saame ist glatt, eiförmig.

Die ganze Pflanze hat einen gewürzhaften Geruch und bitterlich aromatischen Geschmack. Das Infusum hat einen angenehmen Citronengeruch.

Die Pflanze scheint mit Unrecht in Vergessenheit zu gerathen. Die Landleute rühmen sie als ein vortreffliches Mittel gegen das Blutharnen des Viehes.

Origanum creticum. Das Kraut. Spanischer Hopfen.

Origanum creticum Linn. Eine ausdauernde auf den Inseln des Archipelagus wild wachsende Pflanze.

Längliche, 4—5 Linien lange, vierkantige Aehren, mit dachziegelförmigen rundlich-spitzigen, scharfen Brakteen, mit kurzen Haaren besetzt, grünlich-bräunlich, von scharfem gewürzhaftem Geschmacke, mit den Stengeln wie auch mit Aehren von andern Arten Origanum gemischt.

Origanum creticum Linn. Spanischer Hopfen.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Das eigentliche Vaterland dieser Pflanze ist die Insel Kreta; doch kommt sie auch auf den andern Inseln des Archipelagus und in andern Gegenden des südlichen Europas vor.

Die Wurzel ist perennirend; der Stengel aufrecht; ungefähr 1½ Fuß hoch, fast holzig, rund und mit rauhen weißen Haaren besetzt. Die Blätter sind gegenständig, kurz gestielt, eiförmig oder oval, ganzrandig, kaum spitz, auf beiden Seiten blaß graulich, rauhhaarig, mit zahlreichen kleinen rothbraunen Drüsen besetzt; sie sind verhältnißmäßig klein, 4—6 Linien lang und halb so breit. Aus ihren Winkeln kommen zahlreiche kurze blüthentragende Aeste hervor. Die Blüthenähren stehen gewöhnlich zu drei doldenförmig beisammen. Die kleinen Blüthen sind weiß. Der Kelch liegt unter den Deckblättchen verborgen; die Blumenkrone ist zweilippig.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0684-7

Alle Theile dieser Pflanze, besonders die Blätter und Blüthen (Summitates) besitzen einen sehr starken, dem Majoran ähnlichen, aromatischen Geruch und Geschmack, und enthalten ein eigenthümliches ätherisches Oel. 16 Unzen Kraut geben ungefähr 20 Gran Oel.

Origanum creticum. Das Oel. Spanischhopfenöl.

Wird aus den Aehren von Origanum creticum Linn. und andern Arten Origanum im südlichen Europa durch Destillation bereitet.

Ein ätherisches rothbraunes Oel, von strengem Geruche und gewürzhaftem brennendem Geschmacke.

Dieses Oel findet nur äußerliche Anwendung gegen schmerzhafte cariöse Zähne.

Origanum vulgare. Das Kraut. Gemeiner Dost. Wohlgemuth. Dostenkraut.

Origanum vulgare Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Das blühende gewürzhafte Kraut, mit viereckigem, röthlichem Stengel, entgegengesetzten, eiförmigen, kurzgestielten, fast gesägten, borstigen Blättern, kopfförmigen Blüthen, eiförmigen, unbehaarten, oft röthlichen Deckblättchen, die länger sind als der Kelch. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Origanum vulgare Linn. Gemeiner Dost.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Dost wächst an trocknen, bergigen Orten, in Wäldern ꝛc.

Aus der kriechenden Wurzel entspringen aufrechte, vierkantige, röthliche und behaarte Stengel von 1—1½ Fuß Höhe. Die am Ende der Stengel und Aeste stehenden doldentraubenartigen Aehren enthalten kleine blaßrothe Blumen. Der Kelch ist fünfzähnig, die Blumenkrone rachenförmig; die Oberlippe aufgerichtet flach; die Unterlippe dreispaltig.

Die mit den blühenden Gipfeln gesammelten Blätter haben einen gewürzhaften Geruch, und einen gleichen etwas erwärmenden und schwach bitterlichen Geschmack. Bei der Destillation geben sie eine ansehnliche Menge strohgelbes ätherisches Oel von scharfem gewürzhaften Geschmacke, welches gleichfalls als Zahnschmerz stillendes Mittel empfohlen wird.

Der Aufguß nimmt von schwefels. Eisen eine schmutzig violette Farbe an, was auf eine Modification des Gerbestoffes hinweist.

Der Dost wird selten im Theeaufgusse, mehr äußerlich zu Umschlägen

gebraucht. Auch hängt man ihn in das Bier, um es stärker zu machen und das Sauerwerden desselben zu verhüten.

* Orlean. Orlean.

Bixa Orellana Linn. Orleanbaum.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 18. Tiliaceae.

Dieser schöne Baum ist in den Wäldern von Südamerika, als Brasilien, Mexiko, einheimisch, wird auch mit Fleiß angebaut. Er ist von mittelmäßiger Größe, hat herzförmige, zugespitzte Blätter und traubenförmige Blumen. Die Früchte sind zweiklappige borstige Kapseln, welche die Saamen in einem klebenden rothen Marke eingeschlossen enthalten. Letzteres ist der Orlean. Um diesen zu erhalten, zerquetscht man die Früchte in Trögen, setzt Wasser zu und läßt sie einige Tage stehen. Es entsteht eine Art fauler Gährung, man bringt jetzt die Masse auf Siebe, der Orlean geht nun mit dem Wasser durch, und setzt sich ab; das Wasser wird abgegossen, und der Orlean so weit im Schatten getrocknet, bis er eine weiche knetbare Masse bildet, die in kleinen Broden nach Europa geschickt wird.

In Santa Fé de Bogota wendet man eine bessere Methode an, die ein reineres Product liefert. Die Körner, um welche der Orlean sitzt, werden unter Wasser gegen einander gerieben, so daß sie ganz bleiben; auf diese Art wird der Orlean abgesondert, ohne den Schleim, welchen die Saamen in ihrem Innern enthalten, aufzunehmen. Man läßt ihn absetzen und gießt das Wasser ab. Die so erhaltene Substanz heißt im Lande Achiote und ersetzt in der Haushaltung den Safran. Durch Trocknen wird sie dunkler, nimmt einen schwachen unangenehmen Geruch an, und ist geschmacklos. Beim Erhitzen wird der Orlean weich, entzündet sich und brennt mit vielem Rauche, eine glänzende leichte Kohle hinterlassend.

Wasser löst nur wenig vom Orlean auf und erhält eine blaßgelbe Farbe. Alkohol löst den größten Theil auf; die in der Kälte bereitete Auflösung hat eine schöne Orangenfarbe. Durch freiwilliges Verdunsten erhält man die färbende Substanz in pulverigem Zustande. Schwefeläther löst den Orlean noch leichter; die Lösung ist orangeroth. Aetzkali, kohlens. Kali und Natron lösen ihn in beträchtlicher Menge auf; die Lösungen sind sehr dunkelroth, Säuren schlagen daraus den Orlean in sehr fein zertheilten Flocken nieder. Chlor entfärbt die alkoholische Lösung des Orleans schnell, die Flüssigkeit wird weiß und milchig. Salzsäure und Essigsäure üben keine merkbaren Wirkungen darauf aus, aber Schwefelsäure erzeugt damit merkwürdige Veränderungen. Bringt man concentrirte Schwefelsäure mit gepulvertem Orlean zusammen, so wandelt sich die rothe Farbe schnell in ein schönes Indigblau, diese Farbe geht nach und nach in Grün über, und nach 24 Stunden ist sie violett. Der Orlean zeigt also seine Aehnlichkeit mit dem Safrangelb (Polychroit). Salpetersäure wirkt bei gewöhnlicher Temperatur wenig auf den Orlean, sie ertheilt ihm eine grüne Farbe, welche bald in Gelb übergeht.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0686-9

Beim Erhitzen entwickeln sich viele salpetrigsaure Dämpfe, der Orlean nimmt eine Syrupsconsistenz an und nach einigen Minuten entflammt sich das Gemenge, und hinterläßt eine sehr fein zertheilte Kohle.

Der Orlean löst sich leicht in Terpenthinöl und in fetten Oelen auf. Dieses Gemisches bedienen sich die Karaiben und Otomaken, um sich zu bemahlen.

John (chemische Schriften II. S. 52.), der einen minder reinen Orlean unter den Händen gehabt zu haben scheint, fand in 100 Th.: etwas riechende Materie; gelbes Farbeharz 28,0; extractiven röthlichgelben Farbestoff 20,0; eine dem Schleime und Extractivstoffe ähnliche Substanz 4,0; Gummi 26,5; Holzfaser 20,0; Säure und Verlust 1,5.

Der Orlean dient allein, um einige äußerliche Mittel zu färben.

Ova gallinacea. Hühnereier.

Phasianus Gallus femina Linn.

Die Henne gehört zur Ordnung der Hühnervögel, und zur Gattung der Fasanen. Sie ist durch ihre Sorgfalt und mütterliche Zärtlichkeit für ihre Jungen bekannt genug.

Das Hühnerei ist ein organischer Körper von elliptischer, eigenthümlicher Form. Die Eierschale (Putamen Ovi) besteht größtentheils aus kohlens. Kalkerde, dann aus kohlens. Talkerde, phosphors. Kalkerde, Eisenoxyd und einem thierischen Stoffe, welcher wahrscheinlich Eiweißstoff ist und den Massentheilchen zum Bindemittel dient. Unter der Schale ist das Eihäutchen (Pellicula ovi), aus verdicktem Eiweiß bestehend, wahrscheinlich mit etwas von den fixirten Bestandtheile der Schale. Das Eiweiß dient, so lange das Ei gebrütet wird, dem Hühnchen zur Nahrung, und besteht aus 15,5 Eiweißstoff, 4,5 thierischem Schleime (Mucus) und 80,0 Wasser nebst einigen aufgelösten Natronsalzen; es reagirt alkalisch. Das Eiweiß wird durch Weingeist, Säuren oder Hitze zum Gerinnen gebracht, und diese Eigenschaft eignet es zum Klarmachen der Säfte, indem die Theilchen des kalt mit der Flüssigkeit gemischten Eiweißes während des Gerinnens in der Hitze die Unreinigkeiten der Flüssigkeit einhüllen, und mit sich auf die Oberfläche heben. Der Eidotter (Vitellus seu Vitellum ovi), welcher in dem Eiweiße schwimmt, enthält auch Eiweißstoff, weßwegen er auch in der Hitze hart wird; er wird aber nicht so fest, wie das Eiweiß, weil er außerdem noch fettes Oel und einen riechenden Extractivstoff enthält, welche innig mit dem Eiweißstoffe gemengt sind. Mit Wasser verrieben bildet er eine milchige gelbe Flüssigkeit, deren man sich als Bindemittel für Oele, Campher, Harze u. s. w. bedient.

* Oxalium. Sal Acetosellae. Oxalium. Sauerkleesalz.

Oxalis Acetosella Linn. Der gemeine Sauerklee. Hasenklee.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 4. Pentagynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 13. Geraneae.
Rumex Acetosa Linn. Der gemeine Sauerampfer.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0687-4

Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 5. Polygoneae.

Die erstere kleine, zarte, ausdauernde Pflanze wächst in ganz Deutschland, besonders häufig auf dem Harze, in Schwaben, in der Schweiz und in mehreren Gegenden des nördlichen Europas.

Die Wurzel ist kriechend, dünn, schuppig gegliedert, faserig und roth. Aus der Wurzel entsteht eine ziemlich große Anzahl lang gestielter Blätter, welche aus drei kleinen umgekehrt herzförmigen, aufsitzenden, ganzen, hellgrünen, mit feinen weißlichen Härchen besetzten Blättchen bestehen. Die Blüthen sind etwas nickend, weiß und roth geadert, und stehen einzeln auf langen Stielen, die, so wie auch die Blattstiele, rund und feinhaarig sind.

Die Pflanze ist geruchlos, besitzt aber einen angenehmen, stark sauern Geschmack, durch Trocknen verliert sich die Säure.

Die zweite gleichfalls ausdauernde Pflanze wächst überhaupt durch ganz Europa, und wird häufig auf Wiesen, Feldern und Triften angetroffen.

Die Wurzel ist faserig und von gelblicher Farbe. Der aufrechte Stengel gestreift, glatt, einfach, nur oben ästig, und erreicht eine Höhe von 2 Fuß und drüber. Die pfeilförmigen, länglichen Blätter sind ganz ungetheilt, glatt und stumpf; die Wurzelblätter gestielt, die Stengelblätter abwechselnd, die obersten Blätter sind stiellos und umfassend. Die Blüthen sind klein, von grüner Farbe mit rothem Rande.

Die Blätter sind geruchlos, besitzen aber einen angenehm sauren und zusammenziehenden Geschmack.

Aus diesen Pflanzen, denen noch **Oxalis corniculata** Linn. zuzuzählen ist, wird das Oxalium gewonnen. Die Pflanzen werden nämlich zerstampft und ausgepreßt; der erhaltene Saft wird erhitzt, damit sich der grüne Stoff abscheide, und dann in eine hölzerne Butte gethan, wo man ihm etwas Thon zusetzt. Nach 1—2 Tagen hat sich der Saft geklärt und der Bodensatz abgeschieden. Ersterer wird nun abgegossen, in einem kupfernen Kessel gehörig abgedampft, und zum Krystallisiren gebracht. Zehn Pfund Sauerkleeblätter geben 7—9 Drachmen krystallisirtes Salz. Es wird vorzüglich in der Schweiz, auf dem Harze und dem Thüringerwalde verfertigt.

Das Sauerkleesalz ist weiß, krystallisirt in kurzen undurchsichtigen vierseitigen Säulen, welche luftbeständig sind, und einen bitterlich sauren Geschmack haben. Wenn man mit den Händen in denselben wühlt, so steigt ein Staub auf, der einen starken Reiz in der Nase verursacht. Es löst sich wenig in kaltem, aber in 14 Theilen kochenden Wassers auf, in Alkohol ist es unauflöslich. Nach **Vogel** besteht es aus: Kali 31,44; Kleesäure, welche vorwaltet, 55,93; Wasser 12,63.

Das Kleesalz kann verfälscht vorkommen mit Weinstein oder Weinsteinsäure. Der Weinstein wird schon durch seine Schwerauflöslichkeit in Wasser sich zu erkennen geben; die Weinsteinsäure wird mit Kali gesättigt in einer Auflösung des salpeters. oder salzs. Kalkes keinen Niederschlag hervorbringen, wogegen die Kleesäure den unauflöslichen klees. Kalk erzeugt. Zugemischtes

saures schwefelsaures Kali wird beim Brennen nicht in kohlensaures Kali umgeändert.

Das Sauerkleesalz giebt die als chemisches Reagens unentbehrliche Kleesäure, welche sich in sehr vielen Pflanzen an Kali oder Kalk gebunden findet, auch künstlich durch Einwirkung der Salpetersäure auf die meisten organischen Verbindungen, als Zucker ꝛc. erzeugt wird. Zur Darstellung dieser Säure aus dem Kleesalze wird eine heiße Auflösung desselben mit Kali oder Ammoniak neutralisirt, und dann so lange Bleizuckerauflösung zugesetzt, als ein weißer Niederschlag von kleesaurem Blei entsteht. Dieser von der darüber stehenden essigs. Kalilauge getrennte und gut ausgesüßte Niederschlag wird durch Schwefelsäure dem stöchiometrischen Verhältnisse gemäß, nämlich auf 100 Th. kleesaures Blei 33 Th. Schwefelsäure von 1,85 spec. Gew., die vorher aber mit dem 10fachen Gewichte Wasser verdünnt worden ist, zersetzt, indem man das Gemisch 24 Stunden hindurch unter öfterm Umrühren digerirt, wobei unauflösliches schwefelsaures Bleioxyd entsteht, die Kleesäure aber ausgeschieden wird, welche sich in der Flüssigkeit auflöst. Diese wird vom Niederschlage abfiltrirt, derselbe noch ausgelaugt, die klare Lauge langsam verdunstet, und durch Krystallisation die Säure gewonnen. Die Kleesäure wird nun mittelst salzs. Baryts auf Schwefelsäure, und mittelst schwefelwasserstoffs. Ammoniaks auf Blei untersucht; vom ersteren durch Digeriren mit etwas kleesaurem Blei, von dem letzteren durch einen Strom Schwefelwasserstoffgas befreit. Braconnot hat in mehreren Lichenen viel Kleesäure entdeckt, welche durch Kochen der Flechten mit Wasser und Natron, Sättigen des überschüssigen Natrons durch Salpetersäure, und Verfahren wie vorhin, gewonnen werden kann.

Die Kleesäure krystallisirt in 6seitigen durchsichtigen Säulen, bei sehr langsamen Abdampfen in Tafeln, bei sehr schnellem Abdampfen in Nadeln von 1,507 spec. Gew. Unter allen Pflanzensäuren hat sie den am meisten sauren Geschmack, löst sich unter einem eigenthümlichen Knistern in 8 Th. kalten, in einer geringeren Menge siedenden Wassers, aber auch in Alkohol auf. Die krystallisirte besteht nach Berzelius aus 58 Kleesäure und 42 Wasser; im wasserfreien Zustande berechnet, in welchem sie nämlich nicht dargestellt werden kann, besteht sie aus 2 Volum Kohlenstoff und 3 Volum Sauerstoff oder dem Gewichte nach 33,40 Th. Kohlenstoff und 66,57 Sauerstoff, also ohne allen Wasserstoff, wie Döbereiner zuerst gefunden hat. Ihre Sättigungscapacität ist 22,19, und sie enthält 3 mal soviel Sauerstoff als das Oxyd, durch welches sie neutralisirt wird.

Die Kleesäure ist in der Chemie wegen ihrer starken Verwandtschaft zur Kalkerde merkwürdig, mit welcher sie ein schwer lösliches Salz bildet. Sie sowohl als ihre Salze werden daher sowohl als Reagentien auf Kalkerde, als auch zu deren Ausscheidung bei Analysen gebraucht.

John (Taschenbuch 1825.) hat eine der Weinsteinsäure verwandte Säure, welche man im Handel bisweilen statt der Kleesäure erhält, Voghesensäure genannt.

Das Sauerkleesalz wurde sonst häufig gebraucht, um weißes Leinenzeug, Holz u. dergl. von Tintenflecken zu reinigen. Da indessen nach einigen in neuerer Zeit gemachten Erfahrungen sowohl die Kleesäure als das Kleesalz tödtliche Wirkung äußern, so darf das Sauerkleesalz nicht mehr, sondern es soll statt desselben die Weinsteinsäure verabfolgt werden. Die tödtliche Wirkung ist so schnell, daß gewöhnlich der Tod schon erfolgt ist, ehe ärztliche Hülfe ge- und versucht werden kann. Hierbei dürfen weder Brechmittel noch verdünnende Mittel (die verdünnte Säure soll noch schneller tödten, als die concentrirte) angewendet werden; es ist wegen der Schnelligkeit der Wirkung ein leicht und allgemein anwendbares Gegenmittel erfoderlich, und dieses ist der kohlens. Kalk, also Kreide, da der oxals. Kalk bei Thieren in Gaben von 2 Drachmen nach Thomson keine Unbequemlichkeit verursacht. Mit gleich gutem Erfolge kann auch Magnesia angewandt werden.

Um die Kleesäure in dem Ausgebrochenen, in dem Inhalte des Magens ꝛc. zu entdecken, dienen salzs. Kalk, schwefels. Kupfer und salpeters. Silber als Reagentien. In den thierischen Flüssigkeiten kann die Oxalsäure nach Christison und Coindet nicht entdeckt werden, weil sie wahrscheinlich bei ihrem Durchgange durch die Lungen eine Zersetzung erleidet, und ihre Elemente sich mit dem Blute verbinden; Wöhler hat sie jedoch in dem Harne wieder gefunden.

Paeonia. Die Wurzel. Päonienwurzel.

Paeonia officinalis Linn. Eine perennirende Alpenpflanze des mittägigen Europas.

Eine knollige Wurzel, die Knollen rundlich, länglich, fast walzenförmig, von der Dicke eines kleinen Fingers bis zu der eines Daumens, außen rothbraun, innen weißlich, von fadem kaum bitterlichem Geschmacke, meistentheils geschält und der Länge nach zerschnitten vorkommend. Sie werde im Frühlinge gesammelt.

Paeonia officinalis Linn. Die gemeine Päonie. Pfingstrose.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Nach Dierbach (Geiger's Magazin, August, 1825. S. 105.) ist Paeonia communis Casp. Bauhini diejenige Pflanze, welche bei uns officinell ist, denn nach Decandolle's Zeugniß ist Linné's Paeonia officinalis eine ganz andere, als die in Deutschland unter diesem Namen bekannte, welche als Zierpflanze mit gefüllter Blume so oft gezogen wird.

Die Pfingstrose stand schon lange, ehe sie in die Zahl unsrer schönsten Gartenblumen aufgenommen worden, in großem Rufe bei den berühmtesten Aerzten der Vorzeit; sie bringt in unsern Gärten vortreffliche Abarten mit sehr schön gefüllten Blumen hervor.

Die Wurzel, aus einer Menge länglicher, spindelförmiger oder kugliger,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0690-3

dickfleischiger, seltener schwammiger Knollen bestehend, treibt einen oder mehrere aufrechte, runde, glatte, etwas röthliche, 1—2 Fuß hohe Stengel. Die abwechselnden großen Blätter sind gestielt, fast zweimal geflügelt, und durch tiefe Einschnitte in viele längliche oder breit-lancettförmige, glatte, oben grüne, unten wenig weißliche Lappen getheilt. Die großen dunkelrothen, auch rosenfarbigen oder weißen Blumen stehen einzeln an den Spitzen der Stengel. Der kleine Kelch ist fünfblättrig; die Krone besteht aus fünf oder mehreren sehr großen, vertieften, rundlichen abstehenden, am Grunde schmäleren Blumenblättern. Im Blumenboden steht eine große Menge (ungefähr 800) haarförmiger kurzer Staubfäden, mit großen länglichen, aufrechten Staubbeuteln. Die Frucht besteht in 2—5 oval-länglichen, bauchigen, filzigen, einklappigen Kapseln, die der Länge nach einwärts sich öffnen, inwendig lebhaft roth sind, und viele rundliche schwarze Saamen enthalten.

Die seltnere **Paeonia mascula** mit breitern, dunkelgrünern, glänzenderen Blättern, größern ästigen Stengeln, meist einfachen blässern Blumen, hat eine senkrecht und tief in die Erde gehende, und sich dann in viele von außen röthliche und inwendig weißliche Aeste verbreitende Wurzel. Einige geben dieser von jener den Vorzug; auch wird sie häufig in den Apotheken gefunden.

Veraltete, geschmack- und kraftlose Wurzeln müssen verworfen werden.

Die falsche Päonienwurzel hat einen stärken, widerlichen, etwas betäubenden Geruch, der sich aber zum Theil durch das Trocknen verliert. Der Geschmack ist zuerst süßlich, dann bitter und unangenehm, dabei etwas scharf, und dieser Geschmack erhält sich ziemlich lange. Geruch und Geschmack scheinen in der Rinde der Wurzel etwas stärker zu seyn, als in der übrigen Substanz, und es scheint daher nicht zweckmäßig, die Wurzel, was doch gewöhnlich geschieht, vor dem Gebrauche zu schälen.

Morin (Trommsd. N. J. IX. 2. 1824. S. 92., Buchn. Repert. XIX. S. 76. und Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 93.) fand, daß das stark riechende Princip, welches beim Zerquetschen der frischen Päonienwurzel ausdunstete, mit Wasser überdestillirte und ein Destillat von nauseosem Geruche und Geschmacke gab. Aus der zerquetschten Wurzel wurde Stärkemehl abgeschieden. Der hiervon abgesonderte Saft hatte eine bräunlichgelbe Farbe und röthete das Lackmuspapier. Zur Syrupsconsistenz verdampft wurde beim Durchschütteln mit Aether eine fette Materie aufgelöst, von ranzigem Geruche und Geschmacke und saurer Reaction, von wäßrigem Weingeiste wurde eine zuckerige Materie aufgenommen, die beim Auflösen in Alkohol eine bräunliche Materie von thierisch-vegetabilischer Natur zurückließ. Die weingeistige Lösung röthete die blauen Pflanzenfarben. Mit Bleizucker gefällt, der Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt, und die Flüssigkeit zur Trockne abgeraucht, wurde eine unkrystallisirbare, zähe, sehr saure Masse erhalten, die vor dem Löthrohre auf einem silbernen Plättchen zum Theil verbrannte, — Aepfelsäure — zum Theil noch einen nach dem Schmelzen glasigen Rückstand gab, — Phosphorsäure. Durch die vom Schwefelblei abgetrennte

Flüssigkeit wurde gleichfalls Schwefelwasserstoffgas geleitet; die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit gab unkrystallisirbaren Zucker.

Das wäßrige Extract, auf welches starker Weingeist keine Wirkung mehr zeigte, löste sich größtentheils bis auf einen bräunlichen, flockigen Niederschlag in Wasser auf, welcher aus äpfels. und phosphors. Kalke zusammengesetzt war. Die wäßrige Lösung enthielt außer andern Körpern eine gewisse Menge der animalisirten Materie, Gummi und Gerbestoff.

Das Mark der Wurzel enthielt noch Stärkemehl. Nach dem Auskochen mit Wasser blieb eine faserige Materie zurück, die gänzlich frei von Stärkemehle war. Sie wurde mit schwacher Salzsäure zum Sieden erhitzt, die Flüssigkeit mit Ammoniak versetzt, wodurch ein Kalksalz als Niederschlag erhalten wurde, welches durch Glühen in kohlens. Kalk mit einigen Spuren phosphors. Kalkes verwandelt wurde. Behandelte man den Niederschlag mit verdünnter Schwefelsäure und demnächst mit Weingeist, so wurden Krystalle von Sauerkleesäure erhalten, es war mithin sauerkleesaurer Kalk gewesen.

Die Holzfaser, im Platintiegel eingeäschert, lieferte eine fast ganz aus kohlens. Kalke, nebst Kieselerde und einigen Spuren eines phosphors. Salzes bestehende Asche.

500 Th. frischer Päonienwurzel enthalten nach Morin: Wasser 339,70; Stärkemehl 69,30; sauerkleef. Kalk 3,80; Holzfaser 57,30; fette Materie 1,30; unkrystallisirbaren Zucker 14,00; freie Phosphor- und Aepfelsäure 1,00; äpfels. Kalk und phosphors. Kalk 4,90; Gummi und Gerbestoff 0,60; vegetabilisch-animalische Materie 8,00; äpfels. Kali 0,30; schwefels. Kali 0,10; riechenden Stoff 0,00. S. = 500,30.

Die Päonie, welche in ältern Zeiten so vielfach gegen Epilepsie, Convulsionen ꝛc. gerühmt und gepriesen worden, ist jetzt beinahe ganz außer Gebrauch, vielleicht weil zu viel Außerordentliches von ihr gerühmt wurde, was schon früher berühmte Aerzte, als Boerhaave und Tissot, nicht bestätigt fanden und nicht finden konnten. Man hat aber auch wohl bei dieser zu den Ranunculaceen gehörigen Pflanze nicht hinlänglich das flüchtige scharfe Princip berücksichtigt, was allen Pflanzen dieser Familie eigenthümlich ist, und das auch Morin unbeachtet gelassen hat. Die Wirkung dieses flüchtigen Stoffes scheint vorzugsweise auf das Gehirn und die Nerven gerichtet zu seyn. Es wäre demnach die Anwendung der frischen Wurzel, etwa im ausgepreßten Safte, oder vielleicht auch im abgezogenen Wasser zu versuchen. Jetzt macht die getrocknete Wurzel einen Bestandtheil der antiepileptischen Pulver aus, wo sie nur dann noch von einiger Wirksamkeit seyn kann, wenn sie noch in möglichst frischem kräftigen Zustande angewendet wird.

Auch die Saamen (Semen Paeoniae) werden in den Officinen geführt. Sie sind in den Kapseln der Päonie enthalten, welche an der innern Seite sich öffnen; an der Naht derselben liegen sie zu beiden Seiten, und enthalten auf dem Boden ihres fleischigen Eiweißkörpers den aufrecht stehenden sehr kleinen Embryo. Bei den unreifen Saamen ist die äußere Decke rosenroth gefärbt, welche Farbe allmälig dunkler wird, sich in Purpurroth verwandelt,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0692-5

und zuletzt ganz ins Schwarze übergeht. Diese Decke enthält bei den frischen Saamen einen rothen Saft. Nach Boerhaave machen die Saamen Erbrechen, und nach Gruvius Durchfall; Perleb hält sie für rein schleimig und die den Saamen zugeschriebenen Kräfte bloß für imaginair. Wahrscheinlich ist auch hier das von der Wurzel Angeführte, daß nämlich durch Trocknen das scharfe Princip verloren geht.

Man findet auch die getrockneten Blumenblätter (Flores Paeoniae) in den Apotheken.

Panis albus. Die Krume. Semmel.

Verschiedene Arten von Triticum Linn.

Papaver. Die Köpfe. Mohnköpfe.

Papaver somniferum Linn. Eine morgenländische bei uns angebaute Pflanze.

Die unreifen, mit den Saamen getrockneten Kapseln, von der Größe einer Wallnuß und drüber. Sie müssen nicht über ein Jahr aufbewahrt werden.

Die Saamenkapseln von Papaver somniferum enthalten im unreifen Zustande, in welchem sie zum pharmaceutischen Gebrauche eingesammelt werden, Opium, wie bei Abhandlung dieses Artikels angegeben worden ist. Sie dürfen daher auch nicht ohne ärztliche Autorisation verabfolgt werden, weil durch unzeitigen Gebrauch derselben, nämlich durch die mit Mohnköpfen abgekochte Milch unruhige Kinder zum Schlafen zu bringen, Nachtheil und Lebensgefahr herbeigeführt werden kann. Sie finden daher auch gewöhnlich nur äußerliche Anwendung, wo sie im zerkleinerten Zustande unter erweichende Breiumschläge gemischt werden.

Papaver. Das Oel. Mohnöl.

Wird bei uns aus den Saamen von Papaver somniferum Linn. durch Auspressen bereitet.

Ein fettes, gelbliches Oel, von süßem Geschmacke, fast ohne Geruch, spec. Gew. = 0,929. Man sehe darauf, daß es nicht gelb und ranzig, weder mit Schwefelsäure noch mit Bleioxyd verunreiniget sey.

Dieses Oel ist ziemlich dünnflüssig und mild. Am Sonnenlichte läßt es sich leicht zu einem wasserhellen Oele bleichen, was auch mit der Zeit am dunklen Orte, unter Luftzutritt erfolgt. Es trocknet an der Luft aus, wenn gleich minder schnell, als Leinöl, es darf daher niemals dem Baumöle zu Salben und Pflastern substituirt werden. Etwanige Verunreinigungen mit Schwefelsäure oder Bleioxyd werden auf die bei Olivenöl angegebene Weise leicht zu entdecken seyn.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0693-1

Das Mohnöl findet innerliche und äußerliche Anwendung, wird auch als ein mildes und wohlschmeckendes Oel, welches durch nichts daran erinnert, daß es mit dem Opium von einer und derselben Pflanze abstamme, häufig in den Haushaltungen benutzt.

Papaver. Die Saamen. Mohnsaamen.

Papaver somniferum var. mit weißen Saamen Linn.

Die kugelrunden, etwas runzligen, kleinen, weißen Saamen von süßem Geschmacke.

Diese Saamen geben beim Auspressen gegen den vierten Theil des eben erwähnten Mohnöhles, und werden eben dieses Bestandtheiles wegen zur Bereitung von Emulsionen in der Medicin benutzt. Sie müssen nicht alt und verlegen seyn, weil sie sonst eine scharf und ranzig schmeckende Milch geben.

Passulae majores et minores. Große und kleine Rosinen.

Vitis vinifera Linn.

Von mehreren durch die Größe der Beeren ausgezeichneten Spielarten der Weinrebe (vergl. Vinum) werden durch Trocknen die großen Rosinen bereitet, die wir aus Griechenland, aus Smyrna und aus dem südlichen Europa erhalten. Von einer andern Spielart, die kleine Beeren ohne Saamen bringt (Vitis apyrena), kommen die kleinen Rosinen, Korinthen, die von den griechischen Inseln zu uns gebracht werden.

Petroleum seu Oleum Petrae. Steinöl.

Ein flüssiges Erdharz im Oriente und an verschiedenen Orten in Europa aus der Erde und aus Felsenspalten hervorfließend.

Eine gelbe oder röthliche Flüssigkeit von bituminösem Geschmacke und Geruche, völlig flüchtig, im Feuer verbrennend, in Oelen, keinesweges in höchst rectificirtem Weingeiste, auf welchem sie schwimmt, auflöslich, spec. Gew. = 0,847 — 0,854. Man hüte sich, daß das Steinöl nicht mit Terpenthinöl verfälscht sey, welches auf den Zusatz von concentrirter Schwefelsäure eine rothe Farbe und dickliche Consistenz annimmt.

Das Steinöl, Bergöl, Erdöl, wird bald auf dem Wasser schwimmend, bald in eigenen Quellen, sehr häufig im obern Italien, vorzüglich am Berge Chiaro angetroffen; ferner an den Küsten des kaspischen Meeres, und auf der Insel Okesra, auch in Languedoc, Gasconien, im Elsaß und den benachbarten deutschen Ländern, wo es aus den Felsenritzen und aus der Erde hervorquillt.

Die feinste Sorte dieser natürlichen brennbaren Flüssigkeit wird Naphtha

oder Bergnaphtha genannt; sie ist vollkommen flüssig, und hat nur ein spec. Gew. von 0,80, ist folglich so leicht, als der absolute Alkohol. Diese möchte wohl fast nie zu uns kommen, und was dafür ausgegeben wird, möchte wohl nur destillirtes Steinöl seyn. Dieses unterscheidet sich nämlich von der Naphtha nur durch die aufgelösten harzigen Theile, und je größer das Verhältniß derselben ist, desto übelriechender, desto dickflüssiger und schwärzer ist das Steinöl, so daß es allmälig in den schwarzen, klebrigen, bei kalter Witterung beinahe festen Bergtheer (Pissasphaltus) übergeht, und mit dem Erdpech oder Judenpech endigt, welches völlig fest, trocken und zerreiblich ist, in der Kälte keinen merklichen Geruch hat, diesen aber ziemlich stark beim Reiben entwickelt (vergl. Asphaltum).

Das Steinöl, wie es im Handel vorkommt, ist von gelber oder röthlicher Farbe, flüssig und durchsichtig, hat einen sehr unangenehmen, dem Bernsteinöle ähnlichen Geruch und Geschmack. Das durch Destillation gereinigte ist wasserhell, mehr dünnflüssig, farblos und hat dasselbe spec. Gew. wie die Naphtha. An der Luft wird das Steinöl sehr langsam verdickt; durch Mineralsäuren wird es nicht zersetzt; Wasser erhält von dem Oele Geruch und Geschmack, ohne es aufzulösen. Mit gewöhnlichem Alkohol giebt das Steinöl eine milchartige Flüssigkeit, aus der sich das Oel absondert; in absolutem Alkohol und Aether ist es aber in jedem Verhältnisse löslich, auch mit ätherischen und fetten Oelen verbindet es sich in allen Verhältnissen. Selbst löst es Campher, Phosphor und Schwefel auf; es gehört zu den besten Auflösungsmitteln des Kautschuks, und im rectificirten Zustande ist es die einzige Flüssigkeit, unter welcher die Alkalimetalle aufbewahrt werden können. Es besteht nach Thomson aus: Kohlenstoff 82,2 und Wasserstoff 14,8. Nach Ure aus: Kohlenstoff 83,04; Wasserstoff 12,31 und Sauerstoff 4,65. Nach Scholz aus: Kohlenstoff 87,21 und Wasserstoff 12,79.

Eine Verfälschung mit Terpenthinöl wird auch schon durch den Geruch beim Verflüchtigen erkannt.

Petroselinum. Der Saame. Petersiliensaamen.

Apium Petroselinum Linn. Eine zweijährige im südlichen Europa einheimische, in unsern Gärten angebaute Pflanze.

Kleine, eiförmige, eine fast kugelrunde Frucht darstellende, grünliche, gestreifte Saamen, von gewürzhaftem Geruche, scharfem und aromatischem Geschmacke.

Apium Petroselinum Linn. Petersilien-Eppich. Petersilie.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Diese bekannte Pflanze ist in Sicilien und Griechenland einheimisch, wo sie an unfruchtbaren Orten wächst.

Die Wurzel ist einfach, fingersdick, weiß, außen gelblichgrau und geruntzelt, mit einem gelben Kerne versehen, von schwachem aber angenehmen

Geruche, und einem etwas scharfen und gewürzhaften Geschmacke. Beim Trocknen verliert sie beides und wird leicht wurmstichig. Der Stengel ist walzenrund, unten einfach und röhrig, glatt, der Länge nach gestreift, 1½—2 Fuß hoch. Die Blätter sind doppelt zusammengesetzt, die Blattstiele und die Verzweigungen desselben gerinnt, am Grunde erweitert; die Blättchen tief in spitze Zipfel eingeschnitten, glatt, nicht glänzend. Die Blüthen sind klein, gelblich, die Dolden 15—16 strahlig. Die Frucht besteht, wie bei allen Doldengewächsen, aus zwei auf einander liegenden Saamen. Diese sind klein, grünlichgrau, den Anissaamen ähnlich, eiförmig, gekrönt, auf einer Seite flach, auf der andern erhaben, auf der flachen Seite mit vier gelben Längslinien bezeichnet, von einem unangenehmen Geruche und Geschmacke, der bei den Saamen stärker ist, als bei den übrigen Theilen der Pflanze, denen sie auch als diuretisches Mittel an Wirksamkeit vorgehen.

Bei der Destillation mit Wasser geben sie ein ätherisches Oel von dem Geruche der Saamen, bestehend aus einem dünnflüssigen, auf dem Wasser schwimmenden, und einem butterartigen krystallisirbaren, im Wasser niedersinkenden Oele. Dieses letztere, welches sich auch aus dem Petersilienwasser in weißen Nadeln ausscheidet, nennt man auch Petersiliencampher; die Nadeln scheinen erst über 30 ° Wärme zu schmelzen.

Die Saamen werden wohl nur ausschließlich zur Bereitung des destillirten Wassers gebraucht.

Phellandrium seu Foeniculum aquaticum. Der Saame. Wasserfenchel.

Phellandrium aquaticum Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Längliche, gestreifte, grünlichgelbe oder bräunliche Saamen, bisweilen mit dem Stempelpolster und den fünf kleinen bleibenden Kelchzähnen bezeichnet, von unangenehmen Geruche und etwas widerlichem Geschmacke. Man verwechsele sie nicht mit dem Saamen von **Sium latifolium** und **Cicuta virosa Linn.**, von welchen sie sich vorzüglich durch die Farbe, dann auch durch Geruch und Geschmack unterscheiden. Sie müssen nicht über ein Jahr aufbewahrt werden.

Oenanthe Phellandrium Spr. et Koch. Fenchelartige Rebendolde. Wasserfenchel.

Phellandrium aquaticum Linn.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Der Wasserfenchel findet sich durch ganz Deutschland in stehenden Wässern. Die Wurzel ist zweijährig; im ersten Jahre besteht sie aus einem run-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0696-8

den sehr kurzen Wurzelstocke, der sich in zahlreiche lange weiße Wurzelfasern auflöst, im zweiten Jahre wird sie viel stärker und walzenförmig. Der Stengel ist aufrecht, drei bis vier Fuß hoch, mit langen, sparrigen Aesten, innen hohl, außen glatt, gestreift und gegen die Spitze hin gefurcht. Die Wurzelblätter, die sich nur bei Pflanzen des ersten Jahres finden, ehe die Stengel hervorkommen, stehen aufrecht auf runden hohlen Blattstielen, und sind dreifach gefiedert, mit gefiedert zerschnittenen Blättchen der letzten Ordnung. Die Stengelblätter sind horizontal abstehend, oder hangend auf schlaffen am Grunde den Stengel scheidenartig umfassenden Blattstielen, doppelt gefiedert mit gefiedert zerschnittenen Blättchen; alle sind auf beiden Seiten glatt. Die weißen Blumendolden stehen an der Spitze der Zweige und in den Winkeln der Blätter auf kurzen gefurchten Blüthenstielen, und bestehen aus 6—9 Strahlen, deren jeder ein vielblüthiges etwas gewölbtes Döldchen trägt. Die Früchte bestehen aus 2 dicht zusammenliegenden Saamen. An diesen hängen die beiden Carpellen ohne Fruchthalter zusammen, auf ihrem Rücken sind drei stumpfe Rippen und zwei breitere an den Rändern der Fuge; die vier Thälerchen sind wenig vertieft, von dunklerer Farbe. In jedem Thälerchen ist ein Streifen (vitta), auf der etwas vertieften Fuge liegen zwei derselben in der Mitte genähert beisammen. Sie besitzen einen starken, durchdringenden, unangenehmen, etwas betäubenden Geruch; der Geschmack ist scharf aromatisch, widrig.

Verwechselungen mit den kleineren Saamen des schmal- und breitblättrigen Wassermarkes (Sium angustifolium und latifolium) so wie mit den grünen Saamen des Giftwürtherichs (Cicuta virosa), sind leicht durch Vergleichung mit wahren zu erkennen, da sie an Geruch und Geschmack sehr verschieden sind.

Nach Berthold (Diss. de seminis Phellandrii etc. Halae 1818.) enthalten 16 Unzen Saamen: ätherisches Oel 1 Qut. 55 Gr.; dieses war goldgelb von Farbe, hatte einen erst milden, dann brennenden, etwas süßen, schnell vorübergehenden Geschmack, einen starken Geruch nach den Saamen und war in Weingeist von 75 Procent leicht auflöslich; fettes Oel, ähnlich dem fetten Oele des Bilsensaamens, etwas süßlich, schon in kaltem Wasser löslich, 6 Qut. 30 Gr.; Cerin 3 Qut. 18 Gr.; Harz 5 Qut. 35 Gr.; Extractivstoff 1 Unze 2 Qut. 15 Gr.; Gummi 4 Qut. 26 Gr.; Rückstand 11 Unzen 3 Qut. 56 Gr. Die Asche enthielt viel Kieselerde. Berthold beobachtete in größern Gaben narkotische Wirkungen und Pfaff stellt die Frage auf, ob der Saame vielleicht ein narkotisches Alkaloid enthalte.

Der Wasserfenchel, der beim Blutspeien und daraus entstandener Lungensucht gerühmt wird, indem er auf die Lungengeschwüre vortheilhaft einwirken soll, wird zweckmäßig in Pulverform oder im Aufgusse verordnet; auch eine weingeistige Tinctur würde die wirksamen Bestandtheile enthalten. In der Thierarzneikunde findet der Saame gleichfalls Anwendung.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0697-4

Phosphorus. Phosphor.

Wird in chemischen Fabriken durch trockne Destillation der mit Kohlen gemischten Phosphorsäure bereitet.

Eine feste, biegsame, zähe, frisch gelbe, halb durchscheinende, mit der Zeit mit weißer pulveriger Oberfläche bedeckte Substanz, am dunkeln Orte leuchtend, bei mittlerer Temperatur an der Luft einen weißen nach Knoblauch riechenden Rauch verbreitend, bei einer Temperatur von 28—30 ° schmelzend und bei 58—60 ° Flamme fassend, gemeiniglich in Stangen im Handel vorkommend, vorsichtig unter Wasser aufzubewahren. Die Gabe: bis zu einem halben Grane in der Auflösung.

Der Phosphor, Lichtträger, nach seiner Eigenschaft im Finstern zu leuchten so genannt, wurde im Jahr 1669 von Brandt, einem verunglückten Kaufmanne in Hamburg, zufällig bei alchemistischen Arbeiten entdeckt, und zuerst aus dem menschlichen Harne dargestellt. Kunckel, welcher gleichzeitig lebte und den Phosphor zu Gesichte bekam, jedoch nicht die Darstellungsweise mitgetheilt erhielt, sondern nur soviel erfuhr, daß er aus Harn bereitet sey, entdeckte 1674 ebenfalls eine Methode den Phosphor darzustellen; zugleich soll ihn auch Boyle in England gefunden haben. Margraff verbesserte 1740 seine Bereitungsart, doch wurde er bis zum Jahr 1769 einzig aus den im Harne enthaltenen phosphors. Salzen gewonnen, bis Gahn und Scheele in dieser Zeit zeigten, daß die Knochen größtentheils aus phosphors. Kalke bestehen. Später fand man die phosphors. Salze fast in allen festen, weichen und flüssigen thierischen Theilen. Rein kommt der Phosphor in der Natur niemals vor, sondern er muß künstlich dargestellt werden.

Dieses geschah früher allein aus dem Harnsalze (Sal microcosmicum urinae) — phosphors. Ammoniak und phosphors. Natron — auf die Weise, daß man gefaulten Harn, die obigen Salze enthaltend, zur Honigconsistenz abdampfte, und so lange mit essigs. Blei versetzte, als noch ein Niederschlag von phosphors. Blei entstand. Dieser Niederschlag wurde nach dem Trocknen mit ⅓ Kohlenpulver vermengt, und in einer irdenen Retorte, deren tubulirte Vorlage mit Wasser gefüllt war, der Weißglühhitze ausgesetzt.

Jetzt wird bei der Bereitung im Großen gewöhnlich folgendes Verfahren befolgt. Eine syrupsdicke Auflösung der unreinen, phosphors. Kalk enthaltenden Phosphorsäure wird so lange mit Kohlenpulver gemengt, bis sie zu einer halbtrocknen Masse geworden ist, die man dann gut durch einander arbeitet und in einem eisernen Topfe unter stetem Umrühren trocknet. Man sieht die Masse nicht eher als getrocknet an, bis sie dunkel geglüht hat, wo man sie dann abkühlt, und so schnell als möglich in eine feinere Retorte bringt, die vorher mit feuerfestem Thone beschlagen worden ist. Statt einer

Vorlage kittet man ein Kupferrohr an, welches weit genug ist, um den Hals der Retorte umfassen zu können, und dieses Rohr wird einige Zoll vom Retortenhalse so umgebogen, daß ein Theil davon gerade niederwärts geht. Dieser niedersteigende Schenkel des Rohrs wird in eine Flasche mit weiter Oeffnung geführt, welche man so weit mit Wasser gefüllt hat, daß dasselbe eine oder ein Paar Linien höher als die Oeffnung des Rohrs geht, welche daher unter dem Wasserspiegel sich befindet. Die Flasche wird um das Rohr herum mit einer Korkscheibe verschlossen, durch welche nebenbei eine dünne Glasröhre hineingesteckt wird, um den bei der Destillation sich entwickelnden Gasarten einen Ausweg zu verschaffen. Die Retorte wird in einen Ofen eingesetzt, der mit einer Haube versehen ist, die über und um die Retortenkugel gestellt werden kann, so daß diese auf allen Seiten erhitzt wird. Das Anfeuern geschieht anfangs äußerst langsam, so daß die Retorte etwa in 4 Stunden erst ins Glühen kommt; dann giebt man aber so lange volles Feuer, als man noch etwas Phosphor durch das Kupferrohr in das Wasser herabfallen sieht, was nach der Größe der Retorte 15, 24—30 Stunden fortdauern kann. Eine Retorte, die zwei Quart faßt, und mit jenem kohlenhaltigen Gemenge ziemlich angefüllt ist, kann ungefähr ein Pfund Phosphor geben.

Im Kleinen verfährt man folgendermaßen: 3 Th. geschmolzener und wieder erstarrter Phosphorsäure werden in einem erhitzten Glas- oder Porphyrmörser schnell gepulvert, und mit 1 Th. fein zerstoßener Holzkohle gemengt. Man bringt hierauf das Gemenge so schnell als möglich in eine äußerlich mit Thon und Sand beschlagene gläserne, oder noch lieber in eine Porcellainretorte. Der Hals derselben wird in einen kleinen tubulirten, mit einem Gasleitungsrohre versehenen Glaskolben geführt, der so weit mit Wasser gefüllt ist, daß die Oeffnung des Halses davon bedeckt wird. Die Retorte wird dann in einen guten Zugofen, oder in einen Windofen eingelegt, und vorsichtig bis zum vollen Weißglühen erhitzt. Hierbei verbindet sich die Kohle mit dem Sauerstoffe der Phosphorsäure zu Kohlensäure, größtentheils aber, bei der überflüssigen Menge Kohlenstoff, zu Kohlenoxydgas, welche beide in gasförmigem Zustande entweichen; der Phosphor wird frei und destillirt in Tropfen über, welche im Wasser niederfallen und erstarren. Gegen das Ende der Arbeit wird gekohltes und Phosphorwasserstoffgas, von der Zersetzung des kleinen Antheils noch beigemischt gewesenen Wassers herrührend, frei, welches einen unangenehmen Geruch hat, und sich an der Luft von selbst entzündet.

Der auf die eine oder auf die andere Art erhaltene Phosphor wird auf folgende Weise in Stangen geformt. Man zerschneidet ihn nämlich, und legt ihn in eine Barometerröhre, oder noch lieber in eine etwas kegelförmige Röhre, verschließt die engere Oeffnung derselben gut mit einem Korke, gießt dann oben auf den Phosphor Wasser und stellt die Röhre in ein Gefäß mit kochend heißem Wasser. Der Phosphor schmilzt dabei und bildet eine Stange, die nach dem Abkühlen herausgenommen wird. Die Unreinigkeiten, die er

enthält, und die größtentheils aus gekohltem Phosphor bestehen, fließen beim Schmelzen heraus, und können dann abgesondert werden. Sonst pflegte man ihn theils noch einmal zu destilliren, theils unter warmen Wasser durch sämisch gegerbtes Ziegenleder zu pressen. Ist der Phosphor sehr roth, so muß man ihn erst in etwas erwärmtem ätzendem Ammoniak, und dann in warmen Weingeiste schmelzen, wodurch er seine lichte und klare Farbe erhält.

Der Phosphor nimmt selten eine regelmäßige Krystallform an, kann aber zum Krystallisiren gebracht werden, wenn man in einem verschlossenen Gefäße so viel Phosphor in kochendem Aether auflöst, als darin löslich ist, und dann die Auflösung langsam abkühlen läßt, wodurch derjenige Theil, welchen der kochend heiße Aether mehr als kalter aufgelöst erhalten kann, sich in Krystallen absetzt. Die Krystallform ist nach Mitscherlich ein reguläres Dodekaëder. Wenn geschmolzener Phosphor in eiskaltes Wasser gegossen wird, so nimmt er nach Thénard durch dieses augenblickliche Festwerden eine schwarze Farbe an, welche er aber beim Schmelzen wieder verliert. Phosphor ist durchsichtig, so lange er geschmolzen ist, wird aber im Augenblicke des Gestehens unklar. Bei gewöhnlicher Sommertemperatur ist er biegsam wie Wachs, beim Gefrierpunkte aber und darunter ist er spröde und krystallinisch im Bruche. Die krystallinische Form hat Trautwein (Kastn. Archiv X. 1. 1827. S. 127.) besonders schön bei großen Massen Phosphor von 20—40 Pfunden beobachtet. Spec. Gew. = 1,77. In freier Luft stößt er weiße Dämpfe aus, die einen eigenthümlichen, fast knoblauchartigen Geruch haben und im Dunkeln leuchten. Sie rühren von einer Art langsamer Verbrennung her, weshalb der Phosphor stets unter Wasser in verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden muß, um den Zutritt der Luft von ihm abzuhalten. Bei einer Temperatur von 60 ° entzündet sich der Phosphor an der Luft; wenn mehrere Stangen Phosphor über einander liegen, schon bei der gewöhnlichen Temperatur, und verbrennt ungemein heftig mit hellleuchtender Flamme und dickem Rauche. Dieser Rauch ist Phosphorsäure. Auch durch Reiben entzündet sich der Phosphor leicht, und man muß sich daher in Acht nehmen, daß man nicht Phosphorstücken zwischen den Fingern oder an wollenen Sachen, z. B. an Tuch oder grauem Löschpapier, reibt, weil dadurch leicht Unglück entstehen kann. Der Phosphor schmilzt in verschlossenen Gefäßen bei + 35° C., wird aber erst wieder bei 32 ° fest, fängt bei 103 ° an langsam zu verdampfen, kommt endlich bei + 290 ° ins Kochen, und destillirt aus einem Gefäße in das andere über. Der Dampf des Phosphors ist ungefärbt.

Das Licht bringt eine eigene Veränderung im Phosphor hervor, deren innere Natur unbekannt ist, und wobei, soviel man bis jetzt in Erfahrung gebracht hat, sein Gewicht nicht verändert wird. Der Phosphor wird nämlich durch das Licht geröthet, und dieses geschieht nicht nur im luftleeren Raume, und selbst in der Leere des Barometers, sondern auch im Stickstoffgase, Wasserstoffgase, unter Wasser, Spiritus, Oel und andern Flüssigkeiten; und wenn man den Phosphor in Aether, Oel oder Wasserstoffgas aufgelöst dem

Sonnenlichte aussetzt, so wird er sogleich als rother Phosphor ausgeschieden. Sehr leicht ist er dieser Veränderung im violetten Lichte, oder in Gefäßen von violettem Glase unterworfen. Dieser rothe Phosphor ist specifisch leichter, weniger schmelzbar, und weniger brennbar als reiner Phosphor; er leuchtet nicht an der Luft, oxydirt sich aber leichter, wenn Salpetersäure oder wäßriges Chlor darauf wirken, zu reiner Phosphorsäure.

Wenn Phosphor in einer Flasche unter Wasser aufbewahrt wird, so oxydirt er sich auf Kosten des Wassers theils zu Oxydul, theils zu phosphoriger Säure, und das Wasser wird säuerlich. Dieses Wasser besitzt die sonderbare Eigenschaft, daß es in einer wohlverkorkten Flasche leuchtet, so oft es darin umgeschüttelt wird, und bisweilen, ohne wahrnehmbare äußere Ursache, einen schnell vorüber gehenden Schein von sich giebt. Wenn man den Pfropf öffnet, oder dieser nicht recht schließt, so verschwindet das Leuchtungsvermögen des Wassers augenblicklich und kehrt erst dann wieder zurück, wenn die Flasche wieder eine Zeitlang luftdicht verschlossen gestanden hat. Auch dies ist eine noch nicht erklärte Erscheinung. (Etwa Phosphordampf, der die leuchtende Eigenschaft verliert, wenn er durch den Sauerstoff der hinzugetretenrn Luft oxydulirt wird?)

Die Auflösung des Phosphors in fetten Oelen, z. B. Mohnöl, leuchtet. Dieses Leuchten wird nach Walcker's Bemerkung durch Hinzufügung gewisser Oele augenblicklich zerstört, selbst wenn diese nur $\frac{1}{300}$, sogar nur $\frac{1}{50}$ der Phosphoraufl̈sung betragen. Diese Oele sind das rectificirte Terpenthin- und Bernsteinöl, das Rosmarin-, Bergamotten- und Citronenöl, das Kamillenöl (mit einem Zusatze von Citronenöl destillirt Oleum Chamomillae citratum), das Oel der Angelikawurzel, der Wachholderbeeren, des Petersiliensaamens und der Muskatennuß, so wie das Oel, welches bei der trocknen Destillation der Braunkohle und nachheriger Rectification des Destillats gewonnen wird. Vom Anis-, Cajeput-, Lavendel-, Rauten-, Sassafras-, Reinfarrn-, Cascarillen-, Pfeffermünz-, Pomeranzenblüth-, Fenchel-, Baldrian-, Sadebaum- und Kirschlorbeeröl, sowie vom Copaivabalsam, dem Oele der bittern Mandeln und dem aus der Rinde des Prunus Padus muß man der Phosphoraufl̈sung $\frac{1}{4}$ und selbst noch mehr hinzufügen, um das Leuchten derselben zu zerstören. Das Nelkenöl, das Zimmtcassiaöl, das rectificirte Steinöl, der peruanische Balsam und der Campher heben das Leuchten der Phosphoraufl̈sung nicht auf, sondern schwächen es nur in dem Grade, als sie die Lösung verdünnen. Es ist auffallend, daß selbst rauchende Salpetersäure, tropfenweise bis zu $\frac{1}{5}$ dem Phosphoröle hinzugefügt, das Leuchten desselben nicht so plötzlich aufzuheben vermag, wie die genannten Oele. Um das Leuchten des Phosphoröles am deutlichsten zu erkennen, muß man dasselbe in einer davon bis etwa zum Viertel erfüllten Flasche umschütteln, und durch Oeffnen derselben frische Luft hineinlassen, wenn durch Absorption des Sauerstoffes das Leuchten aufgehört hat.

Mit dem Sauerstoffe giebt der Phosphor 4 Verbindungen: die Phosphorsäure, bestehend aus 44 Phosphor und 56 Sauerstoff, indem sich näm-

lich 100 Phosphor mit 127,45 Sauerstoff vereinigen; die phosphorige Säure, bestehend aus 56,67 Phosphor und 43,33 Sauerstoff, indem 100 Th. Phosphor 76,446 Sauerstoff aufnehmen; die unterphosphorige Säure und das Phosphoroxyd, noch unbestimmte Zusammensetzungen.

Mit dem Wasserstoffe verbindet sich der Phosphor in zweierlei Verhältnissen zu Phosphorwasserstoffgas: mit Phosphor im Maximum, und mit Phosphor im Minimum. Das erstere entzündet sich an der Luft von selbst, das zweite hingegen nicht.

Auch mit andern einfachen Stoffen, dem Chlor, Jod, Schwefel, Selen und den Metallen verbindet sich der Phosphor.

Der Phosphor ist im Wasser unauflöslich, von Alkohol aber wird er vollkommen aufgelöst. Wenn man ihn mit kochendem Alkohol von 0,799 spec. Gew. schmilzt, dann damit bis zum Erkalten schüttelt, so bleiben in jeder Unze der Flüssigkeit 1½ Gran Phosphor bei mittlerer Temperatur aufgelöst. Die Auflösung wird durch Wasser milchig, hat dann einen starken Phosphorgeruch, einen specifischen widerlichen Geschmack und oxydirt sich bald an der Luft. Eben so verhält sich der Phosphor zu Aether und ätherischen Oelen. Ein Unze Schwefeläther kann 5—6 Gran Phosphor aufgelöst erhalten; eine Unze Oleum animale aethereum soll sogar 20 Gran Phosphor auflösen. Eine Unze Mandelöl nimmt 9—10 Gran Phosphor auf; Körper, welche damit bestrichen werden, geben im Finstern ein phosphorisches Licht von sich, indem sich der Phosphor unter Verbreitung eines widerlichen Geruches langsam an der Luft oxydirt.

Reiner Phosphor muß eine hellgelbe Farbe haben, die nicht ins Orangefarbene spielt. Doch kann hier nicht die Oberfläche entscheiden, da diese bei reinem Phosphor durch die oben angeführten Umstände verändert seyn kann; ist die Phosphorstange aber auch im Innern orangefarbig, so enthält er Kohle. Er kann auch Schwefel enthalten, mit welchem sich der Phosphor bei einem gewissen Verhältniß selbst durch bloßes Drücken vereinigen läßt. Er ist dann nicht zähe wie Wachs, sondern spröde, so daß er zerspringt; auch ist er dunkler von Farbe. Die aus einem solchen Phosphor mit Salpetersäure bereitete Phosphorsäure enthält Schwefelsäure und giebt mit Barytsolution Schwerspath. Ein reiner Phosphor muß überhaupt, der Luft ausgesetzt, sich ganz in phosphorige Säure umändern; bleibt ein Rückstand, so enthielt er fremdartige Beimischungen.

Der Phosphor ist ein sehr heftiges Reizmittel; er beschleunigt den Kreislauf, und befördert die Absonderung, und wird in der Regel in Gaben von $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{4}$ Gran verordnet, da ein einziger Gran schon tödtlich wirken soll. Er dient zur Bereitung der reinen Phosphorsäure.

Früher wurde der Phosphor zu den Phosphorfeuerzeugen angewendet, deren Gebrauch Gefahr herbeiführen kann, daher sie auch im Allgemeinen verboten, überdem auch durch zweckmäßigere Vorrichtungen verdrängt sind.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0702-6

* Pichurim. Die Bohnen. Pichurimbohnen.

Die Pichurimbohne ist die Frucht eines bis jetzt noch wenig gekannten südamerikanischen Baumes. Er wächst, wie Hr. v. Humboldt beobachtet hat, in den Missionen von Ariba nahe bei Cumana, den Bächen entlang, welche dem Oronoko zufließen. Man sah den Baum als eine Art Lorbeer an, und nannte ihn Laurus Pichurim; Humboldt fand in Venezuela einen Baum, den er für jenen Lorbeer hielt und ihn Ocotea Pichurim nannte. Sprengel (Berl. Jahrb. XXII. S. 36.) bringt die Mutterpflanze der kleinen Pichurimbohnen zur Tetranthera Jacq., und nennt den Baum Tetranthera Pichurim, mit oblongen, lederartigen, glattrandigen, oben glatten, unten sehr schwach behaarten, mit einem feinen Venennetze durchzogenen Blättern. Die Blumen stehen in kleinen aufrechten Rispen in den Blattachseln; diese Rispen sind kürzer, als die Stammblätter. Die Blüthen bestehen in einem sechstheiligen Kelche, der in dem zur Bestimmung dienenden Exemplar bloß sechs Staubfäden in einer Reihe mit vierfächrigen Antheren und ein behaartes Rudiment des Fruchtknotens zeigte, welches aber fehlschlägt, da die Tetrantheren alle diöcisch sind. In Brasilien und Venezuela einheimisch.

Man unterscheidet im Handel zwei Arten der Pichurimbohnen, die große und die kleine; die größere bezeichnet man gewöhnlich mit dem Namen Sassafrasnuß, (die Sassafrasbeeren von Laurus Sassafras sind aber davon ganz verschieden), weil sie beim Zerreiben einen Geruch nach Sassafras verbreitet. Sie ist gewöhnlich von der Größe eines kleinen Hühnereies, aber länger, theilt sich leicht in die beiden gleichen Kotyledonen, von denen jeder nach außen conver, und mit einer runzligen Haut von dunkelbrauner Farbe bedeckt, nach innen concav und glatt ist. Die Farbe ist im allgemeinen hell kastanienbraun. Man bemerkt oft in der Mitte derselben Spalten, in welchen sich kleine, weiße, stark glänzende, der Benzoësäure ähnliche Krystalle vorfinden; sie bestehen aber nicht aus dieser Säure, denn wenn man sie absondert und in Weingeist löst, so röthen sie nicht das Lackmuspapier; es ist der feste Theil des ätherischen Oeles.

Die zweite Sorte ist kleiner, hat einen angenehmeren Geruch; die Farbe ist brauner, ihre Form mehr rundlich, zeigt aber übrigens viele Uebereinstimmung mit der ersteren, von der sie vielleicht nur eine Abart ist, von Einigen für dieselbe im unreifen Zustande gehalten wird. Der Geschmack ist bei beiden angenehm gewürzhaft.

Robes (Berl. Jahrb. 1800. S. 60.) erhielt aus 8 Unzen der größern Pichurimbohnen ungefähr 4 Scrupel eines hellgelben gewürzhaften ätherischen Oeles und ein wenig fettes Oel; aus den kleineren Bohnen erhielt er weniger ätherisches, aber $\frac{1}{10}$ fettes Oel von Talgconsistenz und dem völligen Geruche der Bohnen. Beide Sorten zeigten etwas Gerbestoff.

Bonastre (Berl. Jahrb. XXVII. 1. 1825. S. 160., Buchn. Repert. XXI. 2. S. 291.) hat die kleinere Art der Pichurimbohnen zerlegt. Durch

Destillation, die wie bei den Lorbeeren schwierig ist, erhielt er wesentliches Oel, als eine leichte dickliche auf der übergegangenen Flüssigkeit schwimmende Materie. Dieses Oel hat eine schmutzigweiße Farbe, bräunt sich der Luft ausgesetzt ein wenig, vorzüglich wenn es zu sehr erhitzt worden, hat einen scharfen bittern Geschmack, ist bei mittlerer Temperatur fest, und besteht aus kleinen ebenen Blättchen und Körnern, die eins unter das andere vertheilt sind, hat einen starken Geruch, der sich mehr den Lorbeeren und dem Sassafras als der Muskatnuß nähert. Dieses Oel scheint aus zwei Substanzen zusammengesetzt; die eine löst sich vollständig in Weingeist, hat einen stärkern Geruch, und ist flüchtiger als die andere, die fast geruchlos, weniger flüchtig und unlöslich in kaltem Weingeist ist, der sie in der Form von kleinen weißen glänzenden glimmerartigen Flittern unangegriffen läßt. Diese letztere Substanz verursacht wahrscheinlich den weißen Beschlag der Glasgefäße, worin die Pichurimbohne eingeschlossen ist.

Der Rückstand von der Destillation ist dick, schleimig, stark gefärbt, fast roth und sehr bitter. Beim Erkälten bildet sich darauf eine fette Lage, die aber härter und dicker ist, als bei den Lorbeeren. Er wurde mit Alkohol behandelt, welcher ein wenig von der fetten Materie auflöste, und beim Abdampfen Stearine fallen ließ; zuletzt blieb gefärbter krystallisirbarer Zucker zurück. Der übrige Rückstand enthielt viel Satzmehl, welches am besten dadurch erhalten wird, daß man die ganze Bohne zu einem Teige zerstößt, diesen mit Wasser anrührt, und dann alles auf ein Filtrum bringt. Es läuft eine schwach gefärbte Flüssigkeit ab, worin thierische Gallerte kaum einen Niederschlag hervorbringt. Wird die Flüssigkeit abgeraucht, so erhält man eine extractartige Substanz, die sehr löslich in Wasser, unlöslich in Weingeist und Aether ist, und einen süßlichen Geschmack besitzt. Durch Digestion mit Weingeist wird ein schmieriges Oel und ein zähes klebriges Harz erhalten, so wie durch eine schwache Kalilauge eine färbende Materie ausgezogen wird, welche durch Säuren gefällt werden kann.

Beim Einäschern liefert die Pichurimbohne $\frac{1}{2}$ Procent Asche, die mit destillirtem Wasser eine sehr kalische Flüssigkeit giebt, welche neutralisirt durch salpeters. Baryt, salpeters. Silber niedergeschlagen wird, und mit Weinsteinsäure Weinstein erzeugt. Der Rückstand löst sich in überschüssiger Salzsäure auf, und sauerkleef. Ammoniak bildet einen weißen Niederschlag, sauerkleef. Kalk.

500 Th. bestehen nach dieser Analyse aus: festem flüchtigem Oele 15; butterartigem nicht flüchtigem Oele 50; Stearine 110; klebrigem Harze 15; brauner färbender Materie 40; Satzmehl 55; löslichem Gummi 60; traganthartigem Gummi 6; Säure, verbunden mit einer fremdartigen Substanz, 2; nicht krystallisirbarem Zucker 4; salzigem Rückstande 7,5; Parenchym 100; Feuchtigkeit 30; Verlust 5,5.

Die Pichurimbohnen werden in Pulverform bei hartnäckigen Ruhren und Durchfällen bis zu 2 Scrupel die Dosis verordnet.

Pimpinella. Die Wurzel. Pimpinellwurzel. Bibernellwurzel.

Pimpinella Saxifraga Linn. Eine perennirende Pflanze Deutschlands, an trocknen Orten sich findend.

Eine fast walzenförmige, etwas ästige Wurzel, von der Dicke eines Fingers, von oben herab geringelt, außen bräunlichgrau, innen weißlichbraun punktirt, mit schwammigem Holze und oft von dem Marke eintretender Höhlung in der Mitte, von scharfem stechendem Geschmacke. Im Frühlinge einzusammeln.

Pimpinella Saxifraga Linn. Die gemeine Bibernell.
Pimpinella dissecta Hoffm. Die schlitzblättrige Bibernell.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Auf trocknen Weiden und an Wegen nicht selten in Deutschland und den übrigen europäischen Ländern.

Die Wurzel ist perennirend, einfach oder an dem obern Ende getheilt, spindelförmig, außen gelblich, innen weiß, mit harzigen Punkten, mit einem holzigen Kerne durchzogen. Aus ihr kommt ein, oder selten mehrere, aufrechte, ästige, gestreifte, glatte oder schwachhaarige, 1—2 Fuß hohe Stengel hervor. Die Wurzelblätter stehen ausgebreitet auf langen am Grunde scheidenartigen Stielen, sind ungleich-gefiedert, und bestehen aus 5 oder 7 sitzenden, eirundlichen, stumpfen, tief und ungleich gezahnten Fiederblättchen. Die Stengelblätter, deren nur wenige vorhanden, sind gefiedert mit gefiedert-zerschnittenen Fiederblättchen, und lancettförmigen, schmalen, etwas gebogenen und rinnenförmigen Abschnitten; gegen die Spitze des Stengels hin werden die Blätter viel kleiner, die Abschnitte schmäler, und zuletzt ist nur noch der scheidenartige Blattstiel übrig. Alle diese Blätter sind glatt, oben dunkelgrün, unten blaß. Die Blüthen stehen in flachen vielstrahligen und vielblüthigen Dolden, die vor dem Aufblühen überhängen. Die allgemeine und die besondere Hülle fehlt. Die Blumenblättchen sind gleichförmig, weiß, an der Spitze eingeschlagen.

Die schlitzblättrige Bibernell unterscheidet sich nur durch die Wurzelblätter, deren Fiederblättchen hier nicht ganz, sondern gefiedert-zerschnitten sind, mit lancettförmigen, schmalen, theils gezahnten, theils ganzrandigen Abschnitten, wie dies bei den Stengelblättern der vorhergehenden der Fall ist.

Von beiden Pflanzen wird die Wurzel im Frühlinge gesammelt, die einen sehr starken, anhaltenden, scharfen und brennenden, bitterlichen und aromatischen Geschmack hat, den sie bei sorgfältigem Trocknen größtentheils behält, durchs Alter jedoch mehr und mehr einbüßt, und zuletzt ganz unwirksam wird. Ihre Wirksamkeit beruht besonders auf einem flüchtigen ätherischen Oele, daher hat auch die geistige Tinctur dieselbe Schärfe, wie die Wurzel selbst.

Die Wurzel der schwarzen Bibernelle (Pimpinella nigra) ist größer,

dicker, auswendig schwärzlich, inwendig von einem blauen Safte, womit sie durchdrungen ist, bläulich gefärbt; auch ist das destillirte Oel von blauer Farbe, daher sich die Branntweindestillateurs dieser Wurzel bedienen sollen, um dem Branntweine beim Ueberdestilliren eine blaue Farbe zu geben. Es soll auch eine Wurzel vorkommen, welcher der starke aromatische Geschmack fast gänzlich fehlt, und die Nees v. Esenbeck für die Wurzel der P. magna hält.

Eine Analyse der Pimpinellwurzel hat Hr. Bley (Trommsd. N. J. XII. S. 2. 1826. 59.) geliefert. Durch Destillation mit Wasser wurde ein ätherisches Oel erhalten von goldgelber Farbe, einem durchdringenden unangenehmen Geruche und widerlichem, bitterlich nachkratzendem Geschmacke, sehr flüchtig. Das Destillat enthielt auch etwas freie Essigsäure. Um diese rein abzuscheiden, wurde kohlensaures Kali hineingeschüttet, und das erhaltene Salz mit einigen Tropfen Schwefelsäure in einer kleinen Retorte der Destillation unterworfen, wobei Essigsäure übergieng, aber auch bei stärkerm Erhitzen im Retortenhalse ein Anflug von weißen nadelförmigen Krystallen bemerkt wurde; dieser verhielt sich ganz wie Benzoësäure. Das Vorkommen zweier flüchtigen Säuren ist merkwürdig.

Resultate der auf übliche Weise ausgeführten Analyse: ätherisches Oel; Satzmehl; Eiweißstoff; krystallinischer Zucker; flüssiger Zucker; Gummi; Weichharz; Harz; Pflanzenfette; harziger Extractivstoff; süßer Extractivstoff; gummiger Extractivstoff; Aepfelsäure, Essigsäure, Benzoësäure und Faserstoff. Durch Verbrennen des letzteren wurde erhalten: salzs., schwefels., phosphors. Kali, Kalk, Talkerde, Manganoxyd, Kieselerde.

Das eigentliche scharfe und kratzende Princip scheint nicht allein im ätherischen Oele, sondern auch in den Harzen zu liegen. Ein Alkaloid konnte bei einem besonders darauf angestellten Versuche nicht erhalten werden.

Auch von der schwarzen Pimpinellwurzel hat Hr. Bley eine Analyse geliefert (Trommsd. N. J. XIII. 2. S. 37.), welche nicht wesentlich verschiedene Resultate ergab.

Die Pimpinellwurzel wird gewöhnlich nur zu Gurgelwässern in der Abkochung, oder auch bei Lähmung der Zunge als Kaumittel verordnet.

Pinus. Resina Burgundica. Burgundisches Harz.

Wird aus verschiedenen europäischen Fichtenarten durch Schmelzen des von selbst auströpfelnden Harzes bereitet.

Ein rothgelbes Harz, durchscheinend, mit glänzendem Bruche, zerreiblich.

Pinus. Das empyreumatische feste Fichtenharz.

Pix navalis. Schiffspech. Wird durch Verdunsten des flüssigen schwarzen Pechs aus **Pinus sylvestris Linn.**, einem Baume des nördlichen Europas bereitet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0706-9

Ein Harz in schwarzen, auf dem Bruche glänzenden, kalt zerbrechlichen, durch die Wärme der Hand zu erweichenden Stücken.

(Vergleiche über beide Artikel Colophonium.)

Pinus. Die Sprossen. Fichtensprossen.

Pinus sylvestris Linn.

Die blättrigen, walzenförmigen, mit trocknen Schuppen besetzten Knospen, die eine Länge von zwei Zoll nicht überschreiten.

Pinus sylvestris Linn. Gemeine Fichte.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Coniferae.

Dieser sehr bekannte Baum wächst vorzugsweise im nördlichen Europa, in Lappland, Schweden, Norwegen und durch ganz Deutschland, auf trocknem, sandigem Boden und bildet ganze Wälder. In ungünstigem Boden ist er klein, gebogen und gekrümmt, in gutem hingegen, und unter günstigem Klima nimmt er eine schöne Gestalt an und erhebt sich zu einer Höhe von 50—100 Fuß.

Der Stamm ist gerade und aufrecht, die Rinde aschfarbig oder zimmtbraun und voller Risse. Die bleibenden, zerstreut sitzenden, nadelförmigen Blätter, zu zwei und zwei, selten zu drei in einer kurzen, häutigen, weißlichen abgestutzten Scheide vereinigt, sind steif, etwas hart, schmal, spitzig, glatt, auf der einen Seite erhaben, auf der andern flach, beinahe 2 Zoll und drüber lang, von etwas bläulichgrüner Farbe, und am Grunde ihrer Scheide mit einer kleinen braunröthlichen Schuppe versehen. Die gelben männlichen Blüthen stehen in mehreren kurzen Endtrauben, haben statt des Kelches bloße Knospenschuppen, keine Blumenkrone; die weiblichen Blüthen sind in kurze, eiförmige, überhängende, purpurrothe, später zimmtbraune, schuppige, am Grunde abgerundete, stumpfe, meist paarweise stehende Zapfen zusammengehäuft. Die Blumenkrone fehlt.

Die jungen Sprossen (Kiefersprossen), fälschlich Zapfen (Strobuli s. Coni Pini) genannt, die sich an den Enden der Zweige ansetzen, werden im Frühlinge gesammelt. Sie sind mit dünnen rothbräunlichen, lancettartigen Schuppen bedeckt, und inwendig grün, fühlen sich harzig und klebrig an, lassen sich leicht zerbrechen, und besitzen einen angenehmen gewürzhaften Geruch und bittern balsamischen Geschmack. Sie dürfen nicht mit den Knospen der Rothtanne (Pinus Abies Linn.) oder mit den jungen Zapfen und den jungen Zweigen, dem Vorschlage der Kiefern, verwechselt werden.

Sie wurden sonst bei scorbutischen, Gicht- und rheumatischen Anfällen gebraucht.

Piper album. Weißer Pfeffer.

Piper nigrum Linn. Ein Strauch Ostindiens.

Die reifen, kugelrunden, von der äußeren Rinde befreiten, daher glatten, weißen, harten, weniger scharfen als die folgenden, Beeren.

Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer.

Die unreifen, getrockneten, kugelrunden, mit der äußern schwarzen runzligen Rinde bekleideten, innen weißen, harten Beeren, von scharfem Geschmacke und aromatischem Geruche.

Piper nigrum Linn. Der schwarze Pfeffer.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Der schwarze Pfeffer ist in Ostindien einheimisch, wo er sowohl auf dem festen Lande, als auf den Inseln, besonders in Java, Borneo, Sumatra und Ceylon angebaut wird.

Der Stengel ist krautartig, kletternd; seine Aeste sind ausgebreitet. Die gestielten Blätter sind eiförmig, an der Basis etwas ungleich, in eine lange Spitze auslaufend, ganzrandig, glatt, schön grün, unten blaß, mit fünf deutlichen und zwei schwächeren Seitennerven durchzogen, 4 Zoll lang und $2\frac{1}{2}$ Zoll breit. Die Blüthenähren entspringen den Blättern gegenüber auf kurzen Blüthenstielchen; sie sind sehr schlank, ungefähr 5 Zoll lang, überhängend, und nach der Blüthe mit 20—25 Früchten besetzt. Diese sind erbsengroße, runde, bei der Reife rothbraune Beeren, die getrocknet schwarz und runzlig werden, und so unter dem Namen: Schwarzer Pfeffer, allgemein bekannt sind.

Werden diese Früchte, wozu die überreifen und abgefallenen genommen werden, von der äußern Hülle befreit, was leicht durch Einweichen in Wasser geschehen kann, so bilden sie den weißen Pfeffer, der sich durch seine gelblichweiße Farbe und den minder scharfen Geschmack unterscheidet.

Oerstedt (Schw. J. XXIX. S. 80.) bemerkte in dem schwarzen Pfeffer eine eigenthümliche Materie, die er zu den Pflanzenalkalien zählte, wovon er jedoch gleich selbst angab, daß sie nur ein sehr schwaches Sättigungsvermögen besitze.

Lucä (Taschenbuch 1822. S. 81.) fand im weißen Pfeffer kein Alkaloid, dagegen in 100 folgende Bestandtheile: Feuchtigkeit 12,50; ätherisches Oel 1,61; Satzmehl 18,50; Eiweißstoff 2,50; Harz 16,60; Gummi und Extractivstoff 12,50; Rückstand 29,00; Verlust 6,79.

Pelletier (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 233.; Schw. N. J. III. S. 435.; Berl. Jahrb. XXIV. 1. 1822. S. 91.) unternahm, als auch Vauquelin in den Kubeben, die von einer andern Art aus derselben natürlichen Familie gesammelt werden, keine alkalische Substanz bemerkt hatte, eine neue Untersuchung des schwarzen Pfeffers. Er erhielt aber, als er der von Oerstedt ertheilten Anweisung nacharbeitete, ein ganz anderes Resultat.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0708-0

Denn in der Lösung, welche das salzsaure Piperin enthalten sollte, brachte Kali gar keinen Niederschlag hervor; auch konnte er kein Piperin erhalten, als er das geistige Extract des Pfeffers mit Salzsäure auskochte. Als er aber das geistige Extract erst nochmals mit Wasser auskochte, dann das Zurückgebliebene in heißem Weingeist löste, und diese Lösung einige Zeit in der Kälte stehen ließ, so setzte sich eine Menge kleiner Krystalle ab, und der überstehende Weingeist hielt eine fettige Materie gelöst. Durch wiederholtes Lösen in heißem Weingeiste und durch nachherige Krystallisation kann man die Krystalle noch mehr von der ihnen anhängenden fetten Materie scheiden.

Diese krystallinische Substanz des Pfeffers ist das Oerstedt'sche Piperin, sie besitzt aber keine alkalischen Eigenschaften. Die Krystalle haben die Form vierseitigen Prismen, die mit zwei breitern parallelen Seitenflächen und schiefer Endfläche versehen sind. Sie sind durchsichtig und farblos, und, wenn man sie mehrmals in Weingeist gelöst, und daraus durch Krystallisation wieder abgeschieden hat, auch fast geschmacklos, weshalb es wahrscheinlich ist, daß der wenige Geschmack von noch etwas anhängender fetter Materie herrührt. Sie sind unlöslich in kaltem Wasser, und kochendes löst auch nur eine geringe Menge, die sich sogleich beim Erkalten wieder abscheidet. Weingeist und Aether lösen sie in der Wärme in größerer Menge, als in der Kälte. In Essigsäure sind sie sehr löslich, und sie scheiden sich daraus beim Abdampfen wieder in federartigen Krystallen ab. Wasser scheidet sie sowohl aus der geistigen Lösung, als auch aus der Essigsäure wieder ab.

Die verdünnte Schwefels., Salzs. und Salpetersäure zeigen fast gar keine Wirkung auf das Piperin und vermehren auch nicht merklich die Löslichkeit desselben in Wasser. Im concentrirten Zustande verändern sie es aber. Die concentrirte Schwefelsäure verändert die Farbe desselben ins Blutrothe, die aber beim Zusatze von Wasser wieder verschwindet, und war die Säure in nicht zu langer Berührung damit, so ist das Piperin auch wenig verändert. Die concentrirte Salzsäure wirkt ähnlich der concentrirten Schwefelsäure auf das Piperin, es erhält aber davon keine rothe Farbe, sondern eine dunkelgelbe. Die concentrirte Salpetersäure verwandelt die Farbe desselben erst in Grünlichgelb, dann in Orangegelb und zuletzt in Roth, und löst es, wenn sie in genugsamer Menge vorhanden ist, ganz auf. Durch diese Behandlung wird es in Sauerkleesäure, und in eine gelbe bittere Materie verwandelt.

Bei der Wärme des kochenden Wassers schmilzt das Piperin, und wird bei höherer zersetzt, und zwar in verschlossenen Gefäßen in Wasser, Essigsäure, Oel und Kohlenwasserstoffgas, wobei man kein Ammoniak bemerkt. Bei der Zerlegung mit Kupferoxyd wird auch kein Stickgas entwickelt, sondern bloß Wasser und Kohlensäure erzeugt.

Hiernach unterscheidet sich das Piperin also vollständig von den Pflanzenalkalien und steht am nächsten den Harzen, von denen auch noch andere (vergl. Colophonium), wie das Harz des Copaivabalsams, Krystallisationsfähigkeit besitzen. Stolze erinnert hier an frühere Versuche von

Dr. Ries, der aus der Lösung des weißen Pechs in Weingeist, wenn er Schwefel-, Salpeter- oder Salzsäure hinzusetzte, unter begünstigenden Umständen Krystalle bis zu einem Zoll Länge erhielt, die durchsichtig, weiß oder gelblich, fettglänzend, und von größerem spec. Gew. waren, als das rohe Harz; durch Wasser ließ sich die Säure vollständig abwaschen, und sie zeigten sich dann in allen Verhältnissen als ein unverändertes Harz. (Auch das Jalappenharz krystallisirt mit der Essigsäure verbunden.)

Der scharfe stechende Geschmack des Pfeffers ist nach Pelletier an die fette Materie gebunden, die man durch Eindampfen der geistigen Flüssigkeiten erhält, aus welchen das Piperin angeschossen ist.

Die Ergebnisse dieser Analyse sind: Piperin; ein festes scharfes Oel, welches beim Frostpunkte fest wird; ein balsamisches flüchtiges Oel (daher das über Pfeffer abgezogene Wasser mehr balsamisch als scharf ist); eine gefärbte gummiartige Materie; Extractivstoff; Aepfels.; Weinsteins.; Stärkemehl; Bassorin; Pflanzenfaser.

Beim Verbrennen lieferte der Pfeffer eine reichliche Menge Asche, die aus salzs. Kali, phosphors. Kali, phosphors. Kalk und phosphors. Bittererde bestand.

Poutet zu Marseille hat, ohne Pelletier's Analyse zu kennen, ebenfalls den schwarzen Pfeffer untersucht, und fast dieselben Resultate erhalten. Das Piperin konnte aus dem schwarzen Pfeffer nicht so leicht farblos erhalten werden, er bereitete es daher aus dem weißen Pfeffer auf folgende Weise. Das geistige Extract des weißen Pfeffers wird mit kaustischem Kali vermischt, das sich mit dem Fette vereinigt, so daß, wenn nachher das Gemisch mit Wasser verdünnt, und durch Leinen geseihet wird, auf dem Seihetuche ein grüngelbes Pulver zurückbleibt, das man mit Wasser auswäscht. Dieses wird in Alkohol von 0,833 spec. Gew. aufgelöst, die Auflösung bis zum schwachen Salzhäutchen abgedampft, worauf dann beim Erkalten die Flüssigkeit zu einer Krystallisation gesteht, welche man abtropfen läßt, und durch Auflösen in Alkohol umkrystallisirt.

Pfeil und Henkenius (Geiger's Magazin Januar 1826. S. 56 u. 59.) haben gleichfalls das Piperin dargestellt, welches jedoch stets den Geschmack des Pfeffers besaß. Die beste Methode scheint nach ihnen folgende zu seyn. Das weingeistige Extract wird mit Wasser ausgekocht, in Weingeist aufgelöst und Kalkhydrat zugesetzt, welches die Ausscheidung des Piperin's sehr zu begünstigen scheint. Auch kann die Lösung durch thierische Kohle noch mehr entfärbt werden. Die geistigen Auszüge des Kalks lassen beim Verdunsten das Piperin in feinen spitzigen Krystallen büschelartig anschießen.

Der Pfeffer ist außer der sonstigen Anwendung, sowohl in Substanz, als vorzüglich das daraus gewonnene Piperin, in neuerer Zeit gegen Wechselfieber sehr empfohlen worden, worüber nur eine vielfache Erfahrung entscheiden kann.

Der Pfeffer hat die besondere Eigenschaft, die Feuchtigkeit an sich zu ziehen und gleichsam zu binden, weswegen leicht zerfließliche Sachen trocken erhalten werden können, wenn sie in Pfeffer eingepackt werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0710-0

* Piper longum. Langer Pfeffer.

Piper longum Linn. Der lange Pfeffer.

Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 3. Trigynia.

Juss. Cl. XV. Ord. 3. Urticeae.

Der lange Pfeffer wächst in feuchten Wäldern der circars'schen Berge wild und wird in Bengalen angebaut. Die Pflanze ist im dritten Jahre am fruchtbarsten.

Aus einer perennirenden holzigen Wurzel kommen mehrere ästige runde windende Stengel mit etwas verdicktem Gelenke hervor. Die Stengelblätter sind langgestielt, herzförmig, spitz, mit weiter und tiefer Bucht, glatt und blaßgrün. Die männlichen Blüthen bilden dünn walzenförmige, stumpfe Kätzchen, die auf Blüthenstielen aus den Winkeln der obern Afterblätter entspringen. Die weiblichen Kätzchen sind sitzend, aufrecht und walzenförmig.

Die Frucht ist von graulicher Farbe, und besteht aus der Vereinigung einer großen Anzahl kleiner Früchte um eine Centralaxe. Linné und Decandolle bezeichnen die kleinen Früchte als einsaamige Beeren. Auf dem Längendurchschnitte der ganzen Frucht bemerkt man, daß sie aus 7—8 kleinen Beeren, wovon einige unfruchtbar sind, zusammengesetzt ist. Die kleinen Beeren haben eine unregelmäßig abgerundete Form, sind rund um die Axe herum mit einer Hülle umgeben, und sondert man sie von dieser, so zeigt sich, daß sie außer derselben noch eine eigenthümliche braunröthliche Haut besitzen, und in ihrem Innern eine weißliche Substanz, welche durch die Loupe betrachtet, ein krystallinisches Ansehen hat. Jede dieser kleinen mit einem äußerst scharfen und reizenden Geschmacke versehenen Beeren bewirkt eine kleine Hervorragung, die zusammengenommen eine Reihe sehr regulärer Spirallinien bildet. Wenn man jede Beere für sich mit dem schwarzen Pfeffer oder mit der Kubebe vergleicht, so findet man unter ihnen sowohl in den äußern Häuten, als auch in der innern Substanz eine solche Uebereinstimmung, daß, obgleich bei der ersten Ansicht der lange Pfeffer vom schwarzen Pfeffer und von der Kubebe sehr verschieden zu seyn scheint, ersterer von letztern beiden doch nicht weiter abweicht, als darin, daß die kleinen Beeren bei ihm sich zu einer Frucht vereinigt haben, hingegen bei den beiden letztern getrennt geblieben sind. Eine solche Vereinigung bemerkt man bekanntlich bei den Früchten mehrerer Pflanzen aus der Familie der Urticeen, z. B. bei denen des Maulbeerbaums und des Brodbaums.

Dulong (Berl. Jahrb. XXVII. S. 115.; Buchn. Repert. XXII. S. 69.; Trommsd. N. J. XI. 1. S. 93. und Geiger's Magazin 1825. August S. 163.) erhielt durch Behandlung des langen Pfeffers mit Weingeist eine graulich braune, zähe Substanz, welche in der Wärme zerfloß, und einen außerordentlich scharfen, stechenden Geschmack besaß. Nachdem er einen Theil der geistigen Tinctur mit Salzsäure versetzt, die harzigen Theile durch Wasser niedergeschlagen und durch Filtriren davon abgesondert hatte, verdampfte er den Alkohol, filtrirte die Flüssigkeit nochmals und sättigte die Säure mit

Kali. Es bildete sich ein geringer flockiger Niederschlag, welcher sich wie ein Theil obiger Substanz verhielt; sie reagirte, nachdem sie gut ausgewaschen und in Alkohol wieder aufgelöst war, nicht alkalisch. Hierauf kochte er einen Theil obigen geistigen Extracts mit durch Salzsäure gesäuertem Wasser, und erhielt dasselbe Resultat, als er die Säure mit Kali saturirte, woraus sich ergiebt, daß der lange Pfeffer keinen alkalischen Stoff enhält.

Das mit Wasser behandelte geistige Extract wurde in Alkohol aufgelöst, wobei Faserstoff zurückblieb. Der Alkohol wurde frei verdunstet, wodurch sich das Piperin (als eine harzige Substanz) in kleinen Krystallen ausschied. Während des Abrauchens der geistigen Auflösungen wurde eine fette Substanz abgesondert, die eine braune Farbe, einen scharfen stechenden Geschmack hatte, bei 0 ° Temperatur gerann, und dem Pfeffer seinen eigenthümlichen Geschmack ertheilt.

Die wäßrigen Auszüge ließen auf dem Filtrum eine grauliche Substanz zurück, welche als Amylum erkannt wurde. Zur Trockne verdunstet und mit Alkohol behandelt, blieb ein Extractivstoff zurück, der Stickstoff enthielt. Die vom Alkohol nicht aufgelösten Theile bestanden aus Amylum und stark gefärbtem gummiartigem Stoffe.

Der mit Alkohol und Wasser erschöpfte Pfeffer wurde mit durch Salzsäure gesäuertem Wasser gekocht, und aus der Flüssigkeit durch Alkohol eine gummiartige Substanz in weißen Flocken niedergeschlagen, welche mit dem Bassorin übereinkam.

Bei der Destillation mit Wasser wurden einige Tropfen eines hellen, scharfen, unangenehmen Oeles erhalten. Bei der trocknen Destillation: kohlens. Ammoniak, und durch Einäscherung kohlens. und phosphors. Kalk, nebst einigen Atomen Eisen und Bittererde, auch kohlens., schwefels. und salzs. Kali.

Bestandtheile des langen Pfeffers: Piperin, eine harzige krystallisirbare Substanz; ein festes sehr scharfes Fett, von welchem der scharfe Geschmack des Pfeffers herrührt; eine geringe Menge ätherischen Oels; eine extractive Materie, welche mit der von Vauquelin in den Kubeben gefundenen Aehnlichkeit hat, aber dadurch verschieden ist, daß sie Stickstoff enthält; ein gefärbtes Gummi; Stärkemehl; eine große Menge Bassorin; ein äpfels. Salz und einige andere Salze. Hiernächst die oben angegebenen Bestandtheile der Asche.

Der lange Pfeffer nähert sich demnach in seinen Bestandtheilen den Kubeben sehr, und kommt dem schwarzen Pfeffer beinahe gleich.

Plantago major. Die Blätter. Wegerichblätter.

Plantago major Linn. Eine ausdauernde an Wegen im nördlichen Europa häufige Pflanze.

Eiförmige, am Grunde in den Blattstiel verschmälerte, am Rande mit seltenen Zähnchen, siebennervige, leicht weichhaarige, fast lederartige Blätter. Nur die frischen dürfen genommen werden.

Plantago major Linn. Großer oder breiter Wegerich.
Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VII. Ord. 2. Plantagineae.

Diese überall bekannte Pflanze hat einen zusammenziehenden bitterlichen scharfen Geschmack. Die Schärfe rührt von einem flüchtigen Stoffe her, daher auch das getrocknete Kraut, seines vorzüglich wirksamen Bestandtheils beraubt, beinahe ganz unwirksam ist. Es kann daher nur im frischen Zustande Anwendung finden; sonst bereitete man auch ein destillirtes Wasser von dem frischen Kraute, welches aber, so gut wie das Kraut selbst, fast ganz außer Gebrauch gekommen ist.

* Plumbum. *Blei.*

Das Blei ist eins der den Menschen am längsten bekannten Metalle; schon in den Büchern Mosis geschieht desselben Erwähnung.

Das Blei kommt sehr selten gediegen vor, häufig aber als Schwefelblei, im Bleiglanz und in einigen complicirten Schwefelmetallen, als Chlorblei, als kohlens., phosphors., schwefels., molybdän-, chrom- und arsenikfaures Bleioxyd.

Aus diesen Verbindungen wird es im Großen dargestellt, und zwar wird der Bleiglanz entweder durch Rösten in Rösthaufen, Roststätten oder Rostöfen, von einem Theile des Schwefels befreit, worauf man das aus Bleioxyd, schwefels. Bleioxyd und unzersetztem Schwefelblei bestehende Erz in Flamm- oder Schachtöfen in Berührung mit Kohle und meist unter Zusatz von Kalk schmelzt, wobei Blei und Schlacken, dazwischen unzersetztes Schwefelblei, Bleistein, erhalten werden, welches letztere wiederholt geröstet und geschmolzen wird. Oder der ungeröstete Bleiglanz wird in Berührung mit Eisen oder einem Eisenerze in einem Schachtofen verschmolzen, wo man Blei, Schlacken und bleihaltiges Schwefeleisen erhält, welches letztere weiter verschmolzen wird. Dieses nennt man Werkblei. Aus dem natürlichen kohlens. Bleioxyde, so wie aus dem künstlich erhaltenen Bleioxyde, welches bei der Ausscheidung des Silbers aus silberhaltigem Bleiglanze in reichlicher Menge erhalten wird, wird es durch Schmelzen in einem Schacht- oder Flammenofen mit Kohle und oft auch unter Kalkzusatz reducirt, und heißt dann Frischblei.

Das Blei, wie es im Handel vorkommt, ist gewöhnlich von Kupfer und Eisen verunreinigt, und enthält bisweilen eine Spur von Silber. Chemisch rein erhält man das Blei im Kleinen entweder dadurch, daß man das durch wiederholte Krystallisation gereinigte salpetersaure Bleioxyd in einem irdenen Tiegel bis zur Verjagung der Salpetersäure glüht, und das Oxyd durch schwarzen Fluß reducirt, oder daß man Bleizuckerlösung durch Schwefelsäure fällt, und das gut ausgewaschene schwefels. Bleioxyd mit ungefähr $\frac{1}{2}$ Potasche und $\frac{1}{8}$ Kohle glüht.

Das Blei ist bläulichgrau, stark glänzend, bei langsamen Erkalten in vierseitigen Pyramiden krystallisirend, weich, leicht mit dem Messer zu schnei-

den, etwas abfärbend, und auf Papier und Leinen einen graphitähnlichen Strich gebend; es läßt sich in dünne Platten ausbreiten, aber nicht zu dünnem Drahte ziehen; zeigt beim Biegen kein Geräusch. Spec. Gew. = 11,35. Es schmilzt bei 262 ° C. und verdampft bei einer heftigen Rothglühhitze.

Bei gewöhnlicher Temperatur überzieht sich das Blei an der Luft mit einer grauen Haut; beim Einwirken von Luft und Wasser zugleich wird es zu einem weißen kohlens. Oxyd. An der Luft geschmolzen überzieht es sich mit einer grauen Haut, und verwandelt sich bei beständiger Erneuerung der Oberfläche gänzlich in ein gelbgraues Pulver, Bleiasche, welche von Berzelius als ein Suboxyd, von Proust jedoch als ein Gemenge von Metall und gelbem Oxyde betrachtet wird, und bei längerem Erhitzen an der Luft gänzlich in dieses übergeht. Bis zum Verdampfen an der Luft erhitzt, verbrennt es mit weißem Lichte zu gelbem Oxyde.

Das Blei verbindet sich mit dem Sauerstoffe nach Berzelius in 4 Verhältnissen, und bildet 4 Oxydationsstufen:

1) Das Oxydul. Es wird gebildet, wenn metallisches Blei der Luft ausgesetzt wird. Der metallische Glanz des Bleies verschwindet nach und nach, und es überzieht sich mit einem graublauen Häutchen, welches immer dunkler wird. Hält man dabei das Blei in einer höheren Temperatur, die jedoch zum Schmelzen nicht hinreichend ist, so nimmt dieses Häutchen an Dicke zu, und wird endlich schwarzgrau. Erhitzt man das Blei bis zum Schmelzen, so wird diese Haut in einem Augenblicke oxydirt und nimmt eine gelbbraune Farbe an.

2) Das Oxyd. Auf die eben angegebene Weise bereitet, oder wenn Blei in Salpetersäure aufgelöst, die Auflösung zur Trockenheit abgedampft und im Platintiegel geglüht wird. Seine Farbe ist gelb, aber es hat einen rothgelben oder beinahe rothen Strich, wenn es geritzt wird, und giebt ein rothgelbes Pulver. Man nannte es sonst Massicot.

Das Bleioxyd schmilzt bei starkem Glühen, und giebt eine durchsichtige, dunkel feuerrothe, glasige Masse, die sich leicht in parallele, etwas biegsame Lamellen spaltet. Das Bleioxyd verbindet sich mit Alkalien und Erden. Die Auflösung ist gelblich, und giebt durch Abdampfung Krystallschuppen; auch schmilzt es mit Erden und Metalloxyden zusammen und bildet Glas. Diese Glasarten schmelzen bei weit niedrigerer Temperatur als gewöhnlich. Die Leichtigkeit, womit Bleioxyd schmilzt und die Erden auflöst, macht, daß es die Tiegel durchbohrt.

Das Bleioxyd besteht aus 92,829 Metall und 7,171 Sauerstoff, oder 100 Th. Metall nehmen 7,725 Sauerstoff auf.

3) Rothes Hyperoxyd, gewöhnlich Mennige, Minium genannt. Besteht aus 89,62 Blei und 10,38 Sauerstoff, oder 100 Metall nehmen 11,59 (= 7,725.1½) auf, d. h. 1½ mal so viel, wie im Oxyde.

4) Braunes Hyperoxyd. Wenn Mennige mit reiner Salpetersäure (oder auch einer andern Säure, nur nicht Chlorwasserstoffsäure) über-

gossen wird, so wird die Mennige auf die Art zerlegt, daß (da die Mennige als solche in Säuren nicht auflöslich ist, sondern nur das gelbe Bleioxyd) ein Theil zu Oxyd reducirt wird, während der Sauerstoff, welcher sich dabei abscheiden sollte, sich mit dem andern Theile der Mennige zu braunem Hyperoxyde verbindet. Hat man eine hinreichende Menge Säure genommen, so geschieht die Zersetzung vollständig und es bleibt ein dunkelbraunes Pulver unaufgelöst, welches mit kochendem Wasser ausgewaschen und getrocknet wird. Beim Glühen giebt dieses Oxyd Sauerstoffgas aus. Es besteht aus 86,62 Blei und 13,38 Sauerstoff, oder 100 Metall nehmen 14,45 (= 7,725.2) auf, d. i. doppelt soviel als im Oxyde.

Mit Schwefel verbindet sich das Blei leicht. Diese Verbindung kann auf trocknem Wege gebildet werden, entsteht aber auch auf nassem Wege, wenn Schwefelwasserstoff mit irgend einem Bleisalze in Berührung kommt. Der erste verdünnte Niederschlag ist bräunlich, wird aber nachher völlig schwarz. Hierauf ist die bekannte Hahnemann'sche Weinprobe gegründet, welche als ein saures mit Schwefelwasserstoffgas angeschwängertes Wasser zu betrachten ist, dessen freie Weinsteinsäure die Reaction auf Eisen verhindert. Das Schwefelblei besteht aus 86,55 Blei und 13,45 Schwefel oder 100 Th. Blei nehmen im Minimum 15,53 Schwefel auf.

Das Blei verbindet sich mit den meisten Metallen. Mit Arsenik, wodurch das Blei eine vollkommene Rundung erhält, wird es zu Schrot verarbeitet; mit Antimonium giebt es die Schriftmasse der Buchdrucker; Blei und Zinn geben das Metall zu Orgelpfeifen; auch ist gewöhnlich das von den Zinngießern verarbeitete Zinn mit etwas Blei versetzt. Gleiche Theile Blei und Zinn geben das Schnellloth der Klempner. Diese Verbindung ist merkwürdig wegen der Leichtigkeit, womit sie sich bei der Glühhitze entzündet, und ohne Mitwirkung äußerer Wärme zu brennen fortfährt, wobei das neugebildete Oxyd in blumenkohlähnlichen Verästelungen herauswächst. Bisweilen erhitzt es sich dabei so, daß ein großer Theil wegraucht. Dieses gemengte Oxyd macht die Basis des Emails und der Glasur auf unsern weißen Stubenöfen aus. Eine Mischung aus 8 Th. Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn (leichtflüssiges Metall) schmilzt bei einer Wärme, die noch nicht hinreichend ist, das Wasser zum Sieden zu bringen. Döbereiner giebt an, daß, wenn 48 Th. fein geraspeltes Zinn, 201 Theil geraspeltes Blei, 284 Th. fein pulverisirtes Wismuth mit 1616 Th. Quecksilber von + 18 ° gemischt worden, sich die Temperatur durch die Auflösung der festeren Metalle von 18 ° bis zu — 10 ° erniedrigt. Eine Erscheinung, die derjenigen bei Auflösung der Salze analog ist.

Die meisten Säuren greifen das Blei an, und die damit gebildeten Bleioxydsalze zeigen im Allgemeinen folgende Eigenschaften: 1) die im Wasser auflöslichen geben farblose Auflösungen, die einen adstringirenden süßlichen Geschmack besitzen. 2) Auf einer Kohle geben sie vor dem Löthrohre ein Bleikorn. 3) Eisenblausaures Kali bewirkt in ihren Auflösungen einen weißen Niederschlag. 4) Schwefelwasserstoff und schwefelwasserstoffs. Alkalien ge-

ben einen schwarzen Niederschlag. 5) Galläpfelsäure und Galläpfelaufguß geben eine weißen Niederschlag. 6) Eine Zinkstange giebt einen weißen Niederschlag oder metallisches Blei.

Das Bleioxyd wird von den Oelen und andern fetten Substanzen aufgelöst, die dadurch dick und zähe werden, und in größerm Verhältnisse zu Pflaster werden.

Die Anwendung des metallischen Bleies zur Dachdeckung, zu Wasserbehältern, Wasserleitungen u. s. w. ist allgemein bekannt. In der Medicin werden die Salze, und hier besonders das basische und das neutrale essigsaure Blei, als Reagens vorzüglich das salpetersaure Blei angewandt. Bei dem innerlichen Gebrauche der Bleipräparate verursachen diese in großen Gaben eine Art von Verstopfung, von Lähmung in den Gedärmen herrührend, und das entsetzliche Reißen, welches unter dem Namen Bleikolik bekannt ist. Als Gegenmittel wird Alaun anempfohlen in so großen Dosen, daß er laxirend wirkt, wodurch zugleich das Bleisalz zersetzt und unauflösliches schwefelsaures Bleioxyd gebildet wird.

Das Blei ist auch der wirksame Bestandtheil in den verschiedenen als Arcana vorkommenden Mitteln, um die Haare schwarz zu färben. Das Bleioxyd ist vermögend, mit den Alkalien Verbindungen einzugehen, in welchen das Bleioxyd den negativen Bestandtheil bildet, so daß diese Verbindungen bleisaure Salze zu nennen sind. Das Kali macht nun zwar (wegen des stärkeren positiv-elektrischen Gegensatzes) das Bleioxyd auflöslicher und eindringender, jedoch wirkt es auch zugleich auf die Substanz der Haare zerstörend ein. Weniger schädlich scheint die Verbindung des Bleioxydes mit Kalk zu wirken, welcher sehr wenig auflöslich ist, und durch Anziehen der Kohlensäure aus der Luft bald unauflöslich und unschädlich wird. Um diese Verbindung darzustellen, wird Minium mit Kalkmilch unter Zutritt der Luft behandelt (mit Ausschluß der Luft erfolgt keine Verbindung, weil durch die positiv-elektrische Kraft des Kalkes das Bleioxyd zur negativ-elektrischen Thätigkeit aufgeregt, noch Sauerstoff aus der Luft aufnehmen und gleichsam Bleisäure bilden muß?). Wenn diese Bleiverbindungen mit dem Haare in Berührung kommen, so wird durch den Schwefel, welcher in dem Oele der Haare enthalten ist, Schwefelblei gebildet, welches fest mit der Substanz der Haare verbunden bleibt, und so eine schwarzbraune Farbe erzeugt. Der dadurch herbeigeführten Trockenheit der Haare kann durch Oel oder Pomade abgeholfen werden.

Plumbum aceticum crudum. Saccharum Saturni. Acetas plumbicus crudus. Rohes essigsaures Blei. Roher Bleizucker.

Ein Präparat chemischer Fabriken, aus Bleioxyd und destillirtem Essig.

Ein Salz in zerkleinerten, prismatischen, sehr oft zusammen-

hängenden, weißen Krystallen, von süßem, etwas zusammenziehendem Geschmacke, in zwei Theilen Wasser und auch in Alkohol auflöslich, aus Bleioxyd und Essigsäure bestehend. Bewahre es vorsichtig in verschlossenen Gefäßen auf. Die Gabe beim innern Gebrauche bis auf zwei Gran.

Dieses Salz wird fabrikmäßig entweder dadurch bereitet, daß man Bleiplatten in weiten Fässern der Luft ausgesetzt mit Essig übergießt, oder daß Bleiglätte in einem Korbe mitten in einen Kessel voll Essig gehängt und erhitzt wird, jedoch nur so lange, daß die Flüssigkeit das Lackmus noch etwas röthet. Durchs Abdampfen und Krystallisiren wird dieses Salz in glänzenden, mehr oder weniger weißen Nadeln erhalten.

Außerdem daß es in der Pharmacie benutzt wird, um durch Auflösen und Krystallisiren das gereinigte essigsaure Blei zu bereiten, wird es auch häufig in den Cattunfabriken gebraucht, um durch eine doppelte Zerlegung die essigsaure Thonerde, welche als Beizmittel dient, zu bereiten. Dieses käufliche Salz soll bisweilen mit essigsaurem Kalke verfälscht seyn.

Polygala amara. Das Kraut. Bittere Kreuzblume.

Polygala amara Linn., und bei uns P. amarella Reichenb. Eine ausdauernde auf den Gebirgen Deutschlands und Schwedens vorkommende Pflanze.

Das blühende Kraut mit den faserigen Wurzeln, die Wurzelfasern dünn gelblich, mit mehreren nach oben zu ästigen, 3—4 Zoll hohen Stengeln, mit mehreren spatelförmigen in einen Kreis gefügten Wurzelblättern, mit lancettförmigen kurzen Stengelblättern und kleinen bläulichen Blüthen von bitterlich-süßem Geschmacke. Man hüte sich, daß man es nicht mit andern Arten Polygala verwechsele, welche dieser oft substituirt werden. Im Monat Mai einzusammeln.

Polygala amara Linn. Die bittere Kreuzblume.
Polygala amarella Reichenb.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 3. Octandria.
Juss. Cl. VIII. Ord. 2. Pedicularideae.

Diese Pflanze gehört zu den seltnern Gewächsen.

Die Wurzel ist sehr dünn, mit einem knotigen Köpfchen versehen, faserig und gelblichweiß. Aus ihr kommen mehrere aufrechte, glatte und krautartige Stengel hervor. Die Wurzelblätter stehen rosenförmig beisammen, sind verhältnißmäßig sehr groß, glatt, stumpf. Die Stengelblätter stehen abwechselnd aufrecht, sind zahlreich, spitz, am Rande ganz, ebenfalls glatt. Die Blüthen bilden eine aufrechte einfache Traube an der Spitze des Stengels.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0717-0

Der Kelch besteht aus fünf ungleichen Blättchen; die Blumenkrone ist aus drei mit einander verwachsenen Blumenblättchen gebildet, so daß scheinbar eine zweilappige Blumenkrone entsteht.

Die ganze Pflanze zeichnet sich durch ihren stark bittern Geschmack aus, sie wurde daher schon früher ganz eingesammelt, obgleich eigentlich nur die Wurzeln zum medicinischen Gebrauche gezogen werden sollten, wodurch wohl zum Theil die bemerkte Verwechselung dieser Pflanze mit Polygala vulgaris herbeigeführt worden seyn mag, da sowohl die letztere Pflanze als auch Polygonum aviculare (dem man brechenerregende Kräfte zuschreibt) stärkere aber ähnliche Wurzeln haben.

Die gemeine Kreuzblume unterscheidet sich leicht durch ihren größern, aufsteigenden (nicht aufrechten) Stengel, durch die schmalen, lancettförmigen Wurzelblätter und den Mangel des bittern Geschmacks. Am meisten Aehnlichkeit hat P. uliginosa Reich., die auch einen wiewohl schwächern, bittern Geschmack besitzt. Die ganze Pflanze ist aber zarter, die Wurzelblätter sind rundlich, ganz stumpf, oft ausgerandet, auch die Blüthen sind kleiner. Die Polygala amara Linn. ist nach Reichenbach eine eigene hinlänglich verschiedene Art, die wahrscheinlich nur in Schweden vorkommt, welches die Veranlassung gegeben, der oben beschriebenen den Namen P. amarella beizulegen.

Martius (Buchn. Repert. VIII. 2. S. 145.) macht außer den botanischen Unterscheidungszeichen der P. amarella von P. vulgaris auch auf das chemische aufmerksam, daß das Decoct der ächten Polygala durch eine Auflösung des oxydirt-salzsauren Eisens eine grünlich schwarze Farbe annimmt.

Der in Weingeist und Wasser auflösliche Extractivstoff ist von sehr bitterm Geschmacke und kann als der wirksame Bestandtheil der Pflanze angesehen werden. Die Pflanze nähert sich nach Peschier, Buchner (Buchn. Repert. X. 3.) in ihrer Mischung der Senega, und enthält auch die in den Polygalaarten von Peschier gefundene eigenthümliche Säure. Die Polygala vulgaris zeigt dagegen völlig abweichende Eigenschaften.

(Vergl. auch Gehlen. Berl. Jahrb. 1804. S. 135.)

Die Kreuzblume, oder vielmehr die Wurzel (Radix Polygalae amarae), hat durch Collin und andere Wiener Aerzte eine große Celebrität gegen Lungenschwindsucht ꝛc. erhalten, wo sie aber in großen Gaben angewandt wurde. Martius (siehe oben) hat aber schon behauptet, daß die aus dem Oestreichischen und Ungarn kommenden Kreuzblumenwurzeln der Polygala vulgaris angehören, und daß die von Collin angestellten Versuche dieser Art zuzuschreiben seyen. Diese Meinung hat noch mehr Gewicht erhalten durch eine sehr lehrreiche Abhandlung des Hrn. Prof. Bernhardi (Trommsd. N. J. XIII. 1. S. 3.), in welcher es wahrscheinlich gemacht wird, daß die von Collin gegen Lungensucht in Gebrauch und Ruf gebrachte Radix Polygalae nicht die von P. amara, sondern vielmehr von P. vulgaris gewesen sey, welches schon in den starken Dosen von 2 Unzen täglich seine Begründung finde,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0718-6

indem nur von P. vulgaris die Wurzel, von der doch allein die Rede ist, in hinreichender Menge gesammelt werden konnte. Auch möchte die stark reizende und purgirende Polygala amara den Lungensüchtigen wenig zusagen.

Die Herba Polygalae amarae bedürfe daher, als ein neues Mittel, erst einer weitern Prüfung, doch müsse auch die Wurzel von P. vulgaris in den Officinen gehalten werden, um vielleicht die von andern Aerzten ohne günstigen Erfolg damit angestellten Versuche zu wiederholen.

Die Polygala wird in der Abkochung verordnet.

* Polypodium. Die Wurzel. Engelsüßwurzel.

Polypodium vulgare Linn. Der gemeine Tüpfelfarrn, Engelsüßfarrn.

Linn. Cl. XXIV. Cryptogamia. Ord. 2. Filices.

Juss. Cl. I. Ord. 5. Filices.

Diese ausdauernde Pflanze wächst in Deutschland und fast in ganz Europa, und man findet sie häufig an steinigen Orten, in Wäldern und an den Wurzeln alter Bäume, besonders an Eichstämmen.

Die kriechende, lange, harte, walzenförmige Wurzel ist gebogen, gegliedert, knotig oder gezahnt gegliedert, zähe, mit vielen länglichen dünnen, lockern, braunröthlichen und häutigen Schuppen dicht bedeckt, und mit haarfeinen schwärzlichen Fasern besetzt. Sie ist von der Dicke einer Schreibfeder bis zu der eines kleinen Fingers, und treibt mehrere Blätter oder Wedel, welche einfach, aufrecht, glatt, graulichgrün, lancettförmig und 8—10 Zoll lang sind. Zu beiden Seiten theilen sie sich in tiefe Lappen, oder abwechselnde, längliche, stumpfe, gegen das Ende des Wedels an Größe abnehmende Blättchen. Der Strunk ist glatt. Die Frucht besteht in kleinen, mit einem elastischen Ringe umgebenen Kapseln ohne Decke, welche auf der Rückseite jedes Blättchens in runden, ziemlich dicken Haufen von schön gelber Farbe vereinigt sind. Diese Haufen stehen in der Länge der Blättchen auf zwei Linien, zwischen der Mittelrippe und dem äußern Rande derselben, und sind zuweilen so zahlreich, daß sie in einander fließen.

Von dieser Pflanze, welche vom Mai bis October blüht, giebt es auch Abänderungen mit eingeschnittenen Lappen.

Die Wurzel wird im Frühjahre gesammelt, und man hält zum Arzneigebrauche die äußerlich rothbraunen, innen gelblichgrünen Wurzeln für die besten. Bei der Einsammlung werden sie von den Schuppen und Zasern gereinigt. Sie besitzen einen ekelhaft süßen, etwas zusammenziehenden, scharfen bitterlichen Geschmack und sehr scharfen Geruch. Man verwirft die alten holzigen, harten, hohlen, inwendig schwarzen, geschmack- und kraftlosen Wurzeln.

Der wäßrige Aufguß der Wurzel ist klar, citronenfarbig und sehr süß; die Abkochung viel weniger angenehm, und hat einen bitterlich herben Nachgeschmack.

Bucholz zog die Wurzel erst mit 70 Proc. haltigem Weingeiste aus, bei dessen Abrauchen sich erst ein Balsamharz abtrennte. Der übrige Rück-

stand wurde dann auch durch Behandlung mit absolutem Alkohole in eigentlichen süßen, in Alkohol leicht auflöslichen Extractivstoff, und in kaum etwas süßen, in Alkohol unauflöslichen gummigen Extractivstoff zerlegt.

Der Wurzelrückstand wurde nun mit Wasser ausgekocht. Aus der Abkochung schied sich beim Erkalten eine seifenartige Materie ab, welche fettig und mild roch und schmeckt, und aus welcher, nachdem sie getrocknet, Schwefeläther ein fettes Oel auszog, wobei verhärtetes weißes Stärkemehl zurückblieb. Als der ausgekochte Rückstand nun noch mit Schwefeläther behandelt wurde, erhielt B. noch eine bedeutendere Menge jenes fetten Oeles. Dieses Oel, von gelber Farbe, hat einen eigenthümlichen, ranzigen, fettigen und bittern Geruch, und einen unangenehmen etwas im Halse kratzenden Geschmack, ist in Schwefeläther leicht, in absolutem Alkohol aber nur zu einem geringen Theile auflöslich. (Sollte dieses Oel mit dem aus der Farrnkrautwurzel durch Aether ausgezogenen hinsichts der Wirksamkeit einige Aehnlichkeit haben?). Am Ende wurde die Wurzel durch anhaltendes Kochen vollends von allem Löslichen erschöpft.

Bucholz fand in 100 Th.: schleimig zuckerartigen Extractivstoff $19\frac{17}{100}$; gummiartigen Extractivstoff $11\frac{19}{100}$; Weichharz oder balsamischen Stoff $4\frac{1}{10}$; fettes Oel $8\frac{12}{100}$; Wasser $9\frac{10}{100}$; verhärtetes Stärkemehl (Inulin?) $2\frac{3}{100}$; Faser oder holzigen Theil 40. Der Gerbestoff in dieser Wurzel ist übersehen.

Diese Wurzel wird gegen katarrhalische Krankheiten, wie die Liquiritia, im Aufgusse, nicht in der Abkochung verordnet.

Poma acidula. Säuerliche Aepfel.

Pyrus Malus Linn. Ein in Gärten angebauter Baum Europas.

Die gemeiniglich sogenannten Rostocker Aepfel sind vorzuziehen.

Pyrus Malus Linn.
Malus communis Lam. et DeC. Der gemeine Aepfelbaum.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 4. Pentagynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Der Apfelbaum ist in Europa einheimisch. Im wilden Zustande ist er ein Baum von mittlerer Dicke und Höhe. Er erreicht ein hohes Alter und in 100 Jahren seine Vollkommenheit. Die Früchte dieses wilden Baumes schmecken herbe sauer und zusammenziehend; die Früchte der durch Cultur veredelten Bäume säuerlich-süßlich. Die verschiedenen Varietäten unterscheiden sich durch ihre Dicke, Größe, Gestalt, Farbe, Consistenz und Geschmack. Die Fortpflanzung geschieht nur durch Pfropfen, Oculiren, Copuliren u. s. w. Durch Säen gehen sie alle in die Hauptart über.

Zum Arzneigebrauche bedient man sich nur der säuerlich-herben Gattungen der Aepfel, besonders der Borsdorfer und Reinetteäpfel. Sie enthalten eine eigenthümliche von Scheele entdeckte Säure, welche er dadurch ab-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0720-6

schied, daß er den ausgepreßten Saft der Aepfel mit Kali sättigte, mit essigs. Blei fällte, den Niederschlag mit verdünnter Schwefelsäure digerirte und die überstehende Flüssigkeit verdampfte.

Die Aepfelsäure ist im ganzen Pflanzenreiche sehr verbreitet, besonders in den sauren Früchten. Zu ihrer Gewinnung im reinen Zustande giebt es verschiedene Methoden aus verschiedenen sauren Säften, als Berberitzen, Vogelbeeren ꝛc. Trommsdorff fällt den ausgepreßten und filtrirten Saft durch Bleizucker, zersetzt den Niederschlag durch eine unzureichende Menge Schwefelsäure, filtrirt, fällt das Blei durch Hydrothionsäure, filtrirt und kocht die rothe Flüssigkeit mit Kohlenpulver, bis sie entfärbt ist, wo er durch Abdampfen gelbliche Krystalle erhielt. Vogel fällt den Saft durch Bleizucker, und kocht den mit kaltem Wasser ausgewaschenen Niederschlag mit Wasser aus, wobei die Verbindung des Bleioxydes mit färbender Materie ungelöst bleibt. Dieser Rückstand kann durch verdünnte Schwefelsäure zersetzt, die saure Flüssigkeit wieder durch Bleizucker gefällt, und das Präcipitat wieder mit kochendem Wasser ausgewaschen, auch das ganze Verfahren nochmals wiederholt werden. Die Fluida enthalten äpfelsaures Blei, welches in farblosen Krystallen anschießt; diese werden durch 2,3 Schwefelsäure von 1,09 spec. Gew. durch ½stündiges Kochen unter beständigem Umrühren zersetzt, die Flüssigkeit filtrirt, das noch aufgelöste Bleioxyd durch Hydrothionsäure entfernt, und dann die Aepfelsäure durch Filtriren und Abdampfen im reinen Zustande erhalten. Sie krystallisirt schwierig in kugelförmig vereinigten kleinen Krystallen, und ist sehr sauer. Die unreine Aepfelsäure ist ein brauner, dicker, klebriger Syrup, nicht krystallisirbar, in dünnen Lagen an trockner Luft zu einem Firniß austrocknend, geruchlos, mäßig sauer. Im offnen Feuer verbrennt sie mit dem Geruch nach verbranntem Zucker; durch Salpetersäure wird sie in Kleesäure verwandelt. Von der Citronen- und Weinsteinsäure unterscheidet sie sich vorzüglich dadurch, daß sie mit Kalk ein in Wasser ziemlich auflösliches Salz bildet.

Der ausgepreßte Saft der Aepfel, welcher in der Pharmacie zur Darstellung des äpfels. Eisens gebraucht wird, giebt, der weinigen Gährung überlassen, den Cyder, der zwar weniger Weingeist enthält, als der Wein, aber wenn er alt ist, ein gesundes und wohlschmeckendes Getränk gewährt. Der Saft enthält nämlich, außer der Aepfelsäure, Zucker, Gummi, Stärkemehl, kleberartige Materie, äpfels. Kalk und eine riechende Materie.

Prunus. Die rohe Pulpa. Rohes Pflaumenmuß.

Prunus domestica Linn. Ein angebauter Baum Europas.

Aus den reifen Früchten dieses ursprünglich in der Gegend von Damaskus wildwachsenden Baumes, die eine große Menge Zuckerstoff enthalten, wird durch Kochen das rohe Pflaumenmuß bereitet, bestehend aus dem fleischigen Theile der von den Kernen und so viel als möglich vermittelst Durchreibens durch ein Perforat von dem feinen häutigen Ueberzuge befreiten Früchte.

* Prunus Padus. Ahlkirschenrinde. Traubenkirschenrinde.

Prunus Padus Linn. Traubenkirsche. Ahlkirsche.
Cerasus Padus DeC.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Die Traubenkirsche kommt durch ganz Europa in etwas feuchten Wäldern vor.

Der Stamm erreicht zuweilen eine Höhe von 30 Fuß; häufiger aber kommt er als ein großer sehr ästiger Strauch vor. Sein Holz ist in der Jugend weiß, im Alter gelblich, zäh und feinfasrig; die Rinde glatt, schwarzgrau. Die gestielten Blätter stehen wechselsweise, sind oval, in eine stumpfe Spitze auslaufend, am Grunde undeutlich herzförmig, 1½—2 Zoll lang, auf beiden Seiten glatt. An der Spitze des Blattstiels stehen zwei runde grüne oder röthliche Drüsen, an seiner Basis zwei Afterblättchen. Die wohlriechenden Blüthen erscheinen nach dem Ausschlagen der Blätter in zahlreichen, abstehenden, 4—5 Zoll langen Trauben, und sind eine Zierde der Wälder. Die Früchte sind runde, glänzend-schwarze, saftige Steinfrüchte von der Größe der Erbsen; der eirunde Steinkern ist bitter und riecht stark nach Blausäure.

Die scharfschmeckenden Blätter geben bei der Destillation mit Wasser ein dem Kirschlorbeer ähnliches Wasser. Die Früchte werden bei uns den Vögeln überlassen, in Schweden und Kamtschatka aber eingesalzen und gegessen.

Die Rinde hat in der Medicin Anwendung gefunden, und muß hierzu von den jüngern Aesten genommen werden. Sie besitzt frisch gesammelt einen dem Kirschlorbeer ähnlichen Geruch, der sich auch beim Trocknen nicht gänzlich verliert, und einen eigenen aromatischen, den bittern Mandeln ähnlichen, etwas zusammenziehenden Geschmack. Im frischen Zustande ist sie außen grünlich-rothbraun, auf der innern Seite gelblich. Beim Trocknen wird sie mehr dunkelbraun.

Die Abkochung ist röthlichgelb, hat ganz den Geruch der bittern Mandeln und einen bittern Geschmack. Eine verdünnte Eisenauflösung wird dadurch olivengrün gefärbt.

John (Berl. Jahrb. I. S. 270.) hatte schon vorher seine Entdeckung der Blausäure in den Rinden der Bäume, und namentlich in der Traubenkirsche, bekannt gemacht, und gab später (Chem. Schriften IV. S. 77.) außer dem eigenthümlichen, gelblichweißen, schweren, blausäurehaltigen, flüchtigen Oele, folgende Bestandtheile in der Traubenkirschenrinde an: Harz; Extractivstoff; Gerbestoff; Gummi; Holzfaser. Die Blüthen enthalten: Spuren von Oel, Harz und Wachs; Extractivstoff 2,5; Gerbestoff mit Schleimzucker und salzs. Kalke 2,0; Gummi 3,0; Holzfaser 10,0; eiweißartige, bloß in Kali lösliche, rothbraune Substanz 12,5; Wasser mit Blausäure und einem Ammoniaksalze 70,0.

Schrader (Berl. Jahrb. XXII. S. 113.) erhielt aus 100 Gran des über Blätter der Traubenkirsche nach dem Verhältnisse des Kirschlorbeerwassers abgezogenen Destillats 0,10 Gran blausaures Eisen.

Die Rinde ist wegen ihres bittern und zusammenziehenden Geschmackes

früher in Wechselfiebern, als Chinasurrogat, später als ein vorzügliches Mittel gegen Rheumatismus und Gicht empfohlen worden, und zwar in folgendem Auszuge: 1 Unze Rinde wird mit 2 Unzen Weingeist und 5 Unzen Wasser digerirt, dann dieselbe Rinde mit 8 Unzen Wasser zu 4 Unzen Colatur abgekocht, und die Abkochung der vorigen Tinctur zugemischt.

Psyllium. Die Saamen. Flöhsaamen.

Plantago Cynops Linn. Ein Staudengewächs des südlichen Europas; und

Plantago arenaria Waldst. Kit. Eine einjährige Pflanze des östlichen Deutschlands und Ungarns.

Kleine eiförmig-längliche, oft auf der einen Seite concave, auf der andern Seite gewölbte, schwarzbraune, glänzende, mit vielem Schleime umgebene Saamen, welche sie dem Wasser mittheilen.

Plantago Psyllium Linn. Der betäubende Wegetritt. Das Flöhsaamenkraut.

Plantago arenaria Waldst. et Kit. Der Sandwegetritt.

Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. VII. Ord. 2. Plantagineae.

Beide Pflanzen sind einjährig und im südlichen Europa einheimisch.

Die Wurzel der erstern ist einfach, faserig, weiß; der Stengel aufrecht, rund, die Aeste stehen sich kreuzweise gegenüber. Die Blätter sind gegenständig, schmal, linien-lancettförmig, die Blüthen stehen in eiförmigen Aehren auf 1½ Zoll langen Blüthenstielen. Die Frucht ist eine häutige Kapsel, die zwei kleine Saamen enthält.

Die zweite Pflanze, von der jetzt aller vorkommende Flohsaamen in Frankreich gesammelt werden soll, hat eine spindelförmige, wenig ästige Wurzel von gelblich-weißer Farbe, einen aufrechten 1½ Fuß hohen Stengel, und 2—3 Zoll lange, gegenständige, horizontal abstehende, schmale, lineallische, rinnenförmige Blätter. Die Blüthen stehen in kopfförmigen Aehren. Kapsel und Saamen wie bei der vorigen Pflanze.

Auch von Plantago Cynops ist der Saame ähnlich, jedoch größer, mehr hellbraun und weniger glänzend.

Der Saame von Aquilegia vulgaris hat mit dem Flöhsaamen viele Aehnlichkeit, ist aber schwärzer und giebt mit Wasser geschüttelt oder gekaut keinen Schleim.

Der Flohsaame hat auf seiner Oberfläche einen so großen Gehalt an Schleim, daß 1 Th. davon 40—48 Th. kochenden Wassers eiweißartig-schleimig mit etwas grünlicher Farbe macht. 1 Unze Saamen giebt eine Drachme trocknen Schleim.

* Ptarmica. Die Wurzel. Wilde Bertramwurzel.

Achillea Ptarmica Linn. Sumpfgarbe. Wilder Bertram. Baruffkraut.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Der wilde Bertram wächst auf feuchten Wiesen und Feldern.

Die Wurzel ist walzenrund, lang, etwas gegliedert, schwach ästig, dünn, zähe, faserig, äußerlich graugelb, inwendig weißlich. Der Stengel ist 1—1½ Fuß hoch, aufrecht, jedoch unten etwas niedergebogen, glatt und endigt sich an der Spitze in einen flachen Strauß, indem er sich oben in mehrere Aeste theilt. Die Blätter stehen wechselsweise, sind ungestielt, halbumfassend, sehr schmal, lancettförmig zugespitzt und am Ende sägeartig gezähnt. An den Spitzen der Zweige, in die sich der Stengel oben theilt, stehen die Blumen, mit weißen Strahlenblüthen und weißlichgelben Scheibenblüthchen.

Die ganze Pflanze hat einen brennenden, scharfen Geschmack und starken Geruch, und erregt Niesen, wenn sie zwischen den Händen gerieben oder geschnupft wird. Auch die Wurzel hat einen beißenden, scharfen, seifenartigen, widrigen Geschmack; sie wird, wie die Bertramwurzel, zum Kauen gebraucht, auch wohl dieser Wurzel untergemengt, welcher sie hinsichts der Bestandtheile sehr ähnlich ist.

* Pulegium. Das Kraut. Poley.

Mentha Pulegium Linn. Poley.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Poley findet sich auf feuchten Grasplätzen in mehreren Gegenden Deutschlands, wird auch häufig in unsern Gärten gezogen.

Die Wurzel ist perennirend, faserig; der Stengel niederliegend und kriechend, undeutlich viereckig, mit sehr kurzen Haaren bekleidet, von bräunlichrother Färbung. Die Blätter sind klein, kurzgestielt, 4—6 Linien lang, oval, stumpf, am Rande ganz, oder mit einigen entfernten kleinen Zähnen besetzt. Die Blüthen stehen in sitzenden vielblättrigen Quirlen in den Winkeln der aufsteigenden Aeste. Der Kelch ist glockenförmig, die Blumenkrone violett, trichterförmig, in 4 Abschnitte gespalten. Die Frucht ist, wie bei allen Menthen, sehr klein, linsenförmig.

Die Blätter werden mit dem obern Theil des blühenden Stengels eingesammelt. Sie besitzen einen eigenthümlichen, etwas campherartigen Geschmack. Nach Trommsdorff giebt das Kraut $\frac{1}{256}$ eines weißen ätherischen Oeles von feurig-gewürzhaftem Geschmacke.

Der Poley gehört zu den erwärmenden und stärkenden Mitteln, und wird im Aufgusse verordnet.

* Pulsatilla. Das Kraut. Küchenschelle.

Anemone Pulsatilla Linn. Die violette Küchenschelle, und
Anemone pratensis Linn. seu A. nigricans Stoerck. Die schwarze Küchenschelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0724-9

Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 7. Polygynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Die erstere Pflanze kommt fast durch ganz Europa, an trocknen, sonnigen Orten vor.

Die Wurzel ist perennirend, stark holzig, schwarz. Aus ihr entspringen langgestielte, doppeltgefiederte, zottige Wurzelblätter, mit gezahnten, schmalen, linienförmigen und spitzen Fiederblättchen, die auf der obern Seite eine vertiefte Linie zeigen. Der Blüthenschaft ist nackt und einblüthig, rund und wollig; seine Länge ist sehr verschieden, bald 3 Zoll, bald 6—8 Zoll. Unter der Blumenkrone ist eine einblättrige, aufrechte, in viele sehr schmale und zottige linienförmige Blättchen tief zertheilte Hülle (involucrum), während der Blüthezeit ist sie von gleicher Länge mit dem etwa 1 Zoll langen Blüthenstiele, nach dem Verblühen verlängert sich dieser letztere, und läßt die Hülle weit unten zurück. Die große und schöne Blumenkrone, welche vor den Blättern erscheint, ist aufrecht, oder doch nur sehr wenig nickend, und besteht aus sechs länglichen violetten Blumenblättern, die auf der innern Seite glatt, und auf der äußern mit langen weißen Haaren bedeckt sind.

Die schwarze Küchenschelle hat eine Blume, die nur halb so groß ist, als bei Pulsatilla; die Blumenkrone überhängend; die Blumenblätter sind an der Spitze zurückgebogen, innen dunkelviolett, außen mit langen, weißen, zottigen Haaren besetzt. In chemischer Hinsicht ist diese Pflanze von der vorigen nicht verschieden, nur äußert sie noch stärkere Wirkung, und ist diejenige, mit welcher Störck seine Versuche angestellt hat.

Die Anemonen, diese fast geruchlosen Pflanzen, besitzen im Allgemeinen im frischen Zustande einen scharfen und beißenden Geschmack, und schon beim Zerstampfen derselben, noch mehr aber beim Verdampfen des ausgepreßten Saftes, empfindet man ein Brennen in der Nase, im Schlunde und in den Augen. Getrocknet verlieren sie fast alle Schärfe, und behalten nur einen krautartigen, bitterlichen, zuletzt etwas salzartigen Geschmack. Man erhält den scharfen Stoff durch Abziehen von Wasser über die frischen Blätter und Blumen sowohl der A. Pulsatilla als A. pratensis. Er setzt sich zum Theil erst in der Ruhe nach längerer Zeit aus dem Wasser ab, und ist als das eigenthümliche flüchtige Princip der Anemonen anzusehen, das man Anemonenstoff, weniger passend Anemonencampher genannt hat. Aus der getrockneten Pflanze läßt sich dieser Stoff nicht darstellen.

Der Anemonenstoff krystallisirt in regelmäßigen gestreiften Prismen, auch wohl in Spießen, hat eine schneeweiße Farbe, und eine mehr trockne Consistenz, so daß er sich leicht in ein feines Pulver zerreiben läßt. Er ist spec. schwerer als das Wasser, ist ferner ganz geruchlos, und bei der gewöhnlichen Temperatur scheint er durch Verdunstung fast gar nichts zu verlieren. Auf einem heißen Bleche verdampft er aber ohne Rückstand als ein scharfer weißlicher Rauch, der besonders auf die Nase und Lungen reizend einwirkt. Sein Geschmack ist, wenn man die ganzen Krystalle kostet, nur etwas fettig, schmelzt man sie aber vorher an der Lichtflamme, so verursachen

sie bald einen im höchsten Grade beißenden und brennenden Geschmack; es bleibt mehrere Tage eine Unempfindlichkeit der Zunge zurück, und auf den Stellen, wo sie eingewirkt haben, finden sich weiße Bläschen. In Wasser ist er nur wenig löslich, der Weingeist nimmt ihn in der Kälte nur schwer und in geringer Menge, in der Siedehitze aber sehr viel davon auf, wovon sich jedoch beim Erkalten ein großer Theil abscheidet. Die Lösung hat einen ungemein scharfen brennenden Geschmack, den wenige Tropfen davon einer großen Quantität Wasser mitzutheilen im Stande sind. Fette sowie ätherische Oele lösen nur in der Hitze diese Substanz auf; erstere erhalten davon einen ungemein scharfen Geschmack; beim Erkalten scheidet sich fast alles wieder aus. Verdünnte Säuren lösen diesen Stoff gleichfalls in der Wärme auf, concentrirte Mineralsäuren zersetzen ihn. Eine Auflösung von kohlens. Kali löst ihn in der Hitze mit rother Farbe auf. In verschlossenen Gefäßen läßt er sich nicht unverändert sublimiren, es geht vielmehr eine im hohen Grade scharfe klare Feuchtigkeit über, im Halse der Retorte legt sich eine gelbliche feste Substanz von brenzligem Geschmacke an, die sich in Alkohol in der Wärme auflöst, ohne ihm Schärfe mitzutheilen, auf dem Boden der Retorte bleibt eine braune Kohle zurück, die sich ohne Rückstand einäschert. An der Lichtflamme verbrennt dieser Stoff mit heller Flamme ohne Rückbleibsel.

Der Anemonenstoff gehört wohl unbezweifelt zu der Classe der ätherischen Oele, und ist wahrscheinlich nur durch einen größern Gehalt von Sauerstoff verschieden; denn er scheidet nicht aus bei der ersten Destillation, sondern bei der Cohobation, das anfänglich klare Wasser trübt sich in der Ruhe, und die Krystalle scheiden aus. Außer diesen scheidet sich ein feines weißes Pulver ab, das ohne Geschmack ist, sich weder in Alkohol, noch in fetten und ätherischen Oelen, selbst nicht durch Hülfe der Wärme auflöst, dagegen von den Laugensalzen unter rother Farbe aufgenommen wird, in einer Lichtflamme sich zwar entzündet, von derselben entfernt aber nur glüht, — vielleicht ein noch stärker oxydirtes ätherisches Oel.

Der Anemonenstoff charakterisirt sich vorzüglich durch seine specifische Einwirkung auf die Augennerven, welche sich durch einen bohrenden oder schneidenden Schmerz in den Augen, und durch seine Heilkräfte im schwarzen Staare verräth. Auch verursacht er Reißen im Kopfe, und vermehrt die Absonderung des Urins. Auch das destillirte Wasser der Küchenschelle hat einen unerträglich scharfen und brennenden Geschmack, der lange im Munde anhält. Nach Funke (Trommsd. J. XVIII. 1. S. 94.) röthet es die Lackmustinctur stark, fällt aber weder die Alaun- noch Eisenauflösung; Kalkwasser und Alkalien stumpfen die Säure ab, ohne die Säure wegzunehmen.

Der wäßrige Aufguß der Pulsatilla ist sattroth, hat einen krautartigen, etwas schwefligen Geschmack; Eisenauflösung verändert die Farbe ins dunkel Olivengrüne.

Die Pulsatille wird am häufigsten im Extract (eine nicht sehr anzupreisende Form) und im Aufgusse gebraucht; auch ist der Anemonenstoff versucht worden. Aeußerlich wirkt die Küchenschelle im frischen Zustande blasenziehend.

Pyrethrum. Die Wurzel. Bertramwurzel.

Anthemis Pyrethrum Linn. Anacyclus Pyrethrum Lk. Eine ausdauernde Pflanze des nördlichen Afrikas und des südlichen Europas; und Anacyclus officinarum Hayn. Eine einjährige bei uns angebaute Pflanze von ungewisser Abstammung.

Die Wurzel der ersteren ist walzenförmig, einfach, dick, 5—6 Linien dick, mit einem vorzüglich dicken schwammigen Holze; die Wurzel der letztern ist walzenförmig, einfach, dünn, 2—3 Linien dick, mit rückständigen Blattstielen versehen, beide von sehr scharfem den Speichel hervorlockendem Geschmacke. Die erstere war früher gebräuchlich, jetzt ist die letztere in den Apotheken viel häufiger.

Anthemis Pyrethrum Linn. Bertram-Kamille.
Anacyclus Pyrethrum DeC. et Lk. und
Anacyclus officinarum Hayne.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Die fleischige, mit wenig Wurzelfasern besetzte Wurzel der ersteren Pflanze wird im ersten Sommer 6—8 Zoll lang, und hat dann ungefähr die Dicke eines Federkiels, in der Folge wird sie rübenförmig und beträchtlich stärker. Aus ihr kommen mehrere am Grunde niederliegende aufsteigende, 8—12 Zoll hohe, einfache glatte oder schwach behaarte einblüthige Stengel hervor. Selten findet man einen Stengel mit zwei Blüthen. Die Wurzelblätter sind gestielt, die des Stengels dagegen sitzend, alle sind doppelt-gefiedert mit schmalen, rundlichen, glatten und etwas fleischigen Federblättchen der ersten und zweiten Ordnung. Die Blumen sind groß und ansehnlich; der gemeinschaftliche Kelch ist halbkugelförmig, dachziegelförmig; die Strahlenblümchen, die zuweilen fehlen, sind weiß, an der Spitze dreizähnig, unten röthlich gefärbt, die Scheibe besteht aus gelben röhrenförmigen Blüthchen.

Die im ersten Jahre sich bildende Wurzel dieser Pflanze ist officinell, nur selten kommt die dickere ältere vor; sie ist außen grauröthlich, inwendig weißlich.

Die Wurzel der zweiten Pflanze (Hayne Arzneigewächse IX. Taf. 46.) ist einjährig, senkrecht, 3—4 Linien dick, gegen die Spitze sich allmälig verdünnend, 7—9 Zoll lang, meist einfach, schwach vielbeugig, hin und wieder einige dünne Aeste oder Wurzelfasern hervortreibend. Der Stengel aufrecht, ästig, fast stielrund, 6—9 Zoll hoch. Die Blätter wechselsweise stehend, gefiedert, etwas haarig; die Blättchen fiederspaltig, mit linienförmigen, ganzen, 2 und 3spaltigen spitzigen Zipfeln, an den untern Blättern entfernt stehend, an den obern mehr genähert. Die Blumen zusammengesetzt, gipfelständig, aufrecht, einzeln an dem Stengel und den Aesten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0727-6

Das Vaterland dieser Pflanze ist nicht bekannt, sie wird in Thüringen und bei Magdeburg gebaut und von da aus werden die Droguerichandlungen und Apotheken damit versorgt, so daß man fast durchgängig diese Wurzel vorfindet.

Der brennend scharfe Geschmack der Wurzel scheint auf einem eigenthümlichen Weichharze zu beruhen, dessen Gehalt in der frischen Wurzel so bedeutend ist, daß diese die Haut röthet; beim Trocknen und Liegen vermindert sich aber die Schärfe. Auch der geringe Gehalt von ätherischem Oele ist als wirksamer Bestandtheil anzusehen. Schönwaldt erhielt $\frac{1}{1024}$ eines butterartigen, geruchlosen, aber brennend-scharf schmeckenden Oeles.

Gauthier fand in der Wurzel von flüchtigem Oele eine Spur; scharfes, fixes Oel (Weichharz) 5; gelben extractiven Farbestoff 14; Gummi 11; Inulin 33; Holzfaser 35; salzs. Kalk eine Spur.

Nach John (Chem. Schriften IV. S. 126.) bestehen 300 Th. aus: Helenin 120; gummösen Theilen 60; Extractivstoff 35; Holzfaser und unauflöslichem Extracte 75; Harze 5; ätherischem Oele, Campher und einigen Salzen.

Die wirksamsten Theile sind in der Rinde der Wurzel enthalten.

Die Bertramwurzel wird vorzüglich nur zum Kauen bei Lähmung der Zunge ꝛc. verordnet, doch ist sie auch innerlich in Pulverform als kräftiges Reizmittel versucht worden.

Quassia. Die Rinde. Quassiarinde.

Quassia amara Linn.

Eine dünne, zerbrechliche, außen aschgraue etwas runzlige, innen weißlichgraue sehr bittere Rinde.

Quassia. Das Holz. Quassiaholz. Bitterholz.

Quassia amara Linn. Ein in Surinam, und

Quassia excelsa Wright., ein in Ostindien einheimischer Baum.

Ein weißliches leichtes, geruchloses Holz, von ausnehmend bitterm Geschmacke, in Knütteln, die von Quassia amara, in größern Stücken, die von Quassia excelsa abstammen, von dem betrügerischer Weise untergeschobenen Holze von Rhus Metopium, dessen Abkochung von einer zugegossenen Auflösung des schwefelsauren Eisenoxyds schwarz gefärbt wird, wohl zu unterscheiden.

Quassia amara Linn. Bittere Quassia. Aechtes Bitterholz.
Quassia excelsa Wright. Hohe Quassia.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 15. Magnoliae.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0728-2

Das Vaterland der bittern Quassia ist Surinam, wo sie trockne Wälder liebt, doch kommt sie nach Martius auch in Brasilien vor.

Der Stamm ist mehr strauchartig, sehr ästig, 12—15 Fuß hoch, sein Holz ist leicht, graulich-weiß, die Rinde dünn, glatt und unter der grünlich-grauen Epidermis, die an vielen Stellen gewöhnlich fehlt, weiß und schwammig; der anhängende dünne Rindenbast ist von graulicher Farbe. Die Blätter stehend abwechselnd, sind am Grunde der Zweige dreizählig (folia ternata), gegen die Spitze hin ungleich gefiedert (f. pinnata cum impari). Die Fiederblättchen, deren gewöhnlich zwei gegenüber, und drei entfernt an der Spitze beisammen stehen, sind länglich-lancettförmig, ganzrandig, glatt, oben dunkel-, unten blaßgrün; die Mittelrippe des Blattstiels und der Fiederblättchen ist purpurroth. Ein größeres Blatt ist 7 Zoll, die Fiederblättchen sind $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$ Zoll lang und 1—$1\frac{1}{2}$ Zoll breit. Die Blüthen stehen an der Spitze der Zweige und auf sehr kurzen Seitenästchen in 5—6 Zoll langen einfachen Trauben. Der Kelch fünftheilig. Die Blüthen sind schön hochroth; die Blumenkrone ist aus fünf lancettförmigen Blumenblättern gebildet. Quassia excelsa (Simaruba excelsa DeC.) wächst auf Jamaika und auf den caraibischen Inseln in bergigen Wäldern.

Der gerade aufrechte Stamm wird an 100 Fuß hoch, das Holz ist fast weißlich, und mit einer rissigen grauen Rinde überzogen. Die Blätter sind abwechselnd, über einen Fuß lang, ungleich gefiedert (impari-pinnata); die Fiederblättchen, deren gewöhnlich 9—13 vorkommen, sind kurzgestielt, gegenständig, länglich-lancettförmig, ganzrandig, auf beiden Seiten glatt, $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$ Zoll lang und 1—$1\frac{1}{2}$ Zoll breit. Die kleinen Blüthen bilden kurze aber vielblüthige und ausgebreitete Rispen mit dichotomisch getheilten Aesten. In derselben Rispe kommen männliche und weibliche Zwitterblüthen vor. Der Kelch ist sehr klein, 4 oder 5zähnig; die Blumenkrone besteht aus 4 oder 5 linienförmigen, gelblichgrünen Blumenblättern.

Die Quassiarinde kommt hinsichtlich ihrer Mischung mit dem Quassiaholze im Wesentlichen überein, nur ist sie noch bitterer und enthält auch mehr ausziehbare Theile als das Holz. Auch hat die Rinde noch eher flüchtige Theile als das Holz, wenigstens bemerkt man sowohl an dem Aufgusse, als an der Abkochung, so wie an dem darüber abgezogenen Wasser einen eigenen nicht unangenehmen Geruch, und letzteres hat auch einen bittern Geschmack und changirt von oben angesehen etwas ins Gelbliche.

Das Quassiaholz kam in den ersten Zeiten, als es bekannt wurde (ungefähr um das Jahr 1742) allein aus Surinam von Quassia amara. Der Name Quassia soll von einem Neger Quassi herstammen, der das Holz zuerst in dem genannten Lande anwandte. Später wurde das gleich bittere Holz der Quassia excelsa aus Jamaika eingeführt.

Das Surinamische Quassiaholz ist weißlich oder blaßgelblich, und kommt in walzenförmigen, geraden, seltner krummen, ästigen oder höckerigen, $\frac{1}{2}$—4 Zoll und drüber, selbst armsdicken, $\frac{1}{2}$—2 Ellen langen Stücken vor, die oft noch mit der Rinde umgeben sind. Es ist geruchlos, aber von gleich an-

fänglich beim Kauen zu empfindender, beim fortgesetzten Kauen nach und nach bis zum äußersten Grade steigender reiner, nicht unangenehmer, im Munde zurückbleibender Bitterkeit. Die dicken, zähen, weißen Stücke vom Stamme, oder auch die gesunden, graugelblichen, welche die meiste Bitterkeit besitzen, sind den ganz dünnen von den Zweigen, so wie den blauschwärzlich gefleckten und gestreiften, besonders denen, wo diese dunklen Streifen und Flecken tiefer eindringen, die allemal weit weniger bitter sind, vorzuziehen.

Das Jamaicensische Quassiaholz kommt in großen, dicken und gewöhnlich gespaltenen Scheiten vor, die durch ihre Stärke schon ihre Abstammung von einem starken Baume bezeugen.

Das Holz des Korallensumach (**Rhus Metopium**), welches die Westindier dem Quassiaholz bisweilen untermengen sollen, ist davon ganz verschieden, und wird theils dadurch entdeckt, daß die Rinde dem Holze fester anhängt, und mit schwarzen Harzflecken bedeckt ist, theils dadurch, daß der Aufguß dieses Holzes, wegen eines Gehaltes an Gerbestoff mit schwefels. Eisen, einen schwarzen Niederschlag giebt, wogegen der Aufguß des ächten Quassiaholzes dadurch nicht verändert wird.

Das Quassiaholz läßt sich meistens gut spalten und zeigt auf dem Querdurchschnitte feine aus der Mitte nach der Peripherie gehende Streifen, und kleine, etwas vertiefte Punkte. Das Pulver ist weiß, nur wenig ins Gelbliche sich ziehend.

Das kalte Wasser zieht die Bitterkeit der Quassia vollkommen aus, und wenn Reiben zur Hülfe genommen wird, sogar besser, als das kochende; eine bei höherer Temperatur eintretende stärkere Oxydation scheint hier den Extractivstoff unauflöslich zu machen.

Der wäßrige Aufguß ist blaßgelb, röthet kaum merklich das Lackmuspapier, besitzt einen rein bittern Geschmack, der nichts Unangenehmes hat, und ist ohne merklichen Geruch. Die Bitterkeit der Quassia wird durch vegetabilische Säuren, als Essig-, Citronensäure, so wie umgekehrt die Säure etwas gemildert, sie wird aber nicht durch Alkalien geschwächt, wie es bei der Aloë der Fall ist. Die Abkochung ist nicht bitterer, als der kalte Aufguß, und nur wenig gelber gefärbt. Sie hat einen eigenthümlichen, nicht unangenehmen, doch nicht starken Geruch.

Ueber die Menge des Extracts, welches die Quassia giebt, sind die Angaben sehr verschieden. **Hagen** erhielt bisweilen aus 16 Unzen 3½ Unzen, bisweilen aus 6 Pfunden nur 8, 9 bis 10 Unzen. **Trommsdorff** (J. III. 1. S. 142.) hat mehrere Versuche hierüber angestellt. Er erhielt durch verschiedenes mehrmaliges Ausziehen aus einem Pfunde 2 Unzen 5 Drachmen und 10 Gran Extract (2½ Unze vom Pfunde ist die gewöhnliche Ausbeute). Die beiden ersten Digestionen gaben äußerst bittere, dunkel- und hellgelb gefärbte Extracte, die dritte Digestion ein Extract, das sehr hellgelb aussah, körnig war und gesalzen schmeckte. Zur Pulvertrockne gebracht zog es Feuchtigkeit aus der Luft an, schmeckte bitter aber doch gesalzen, und be-

stand nach ferneren Untersuchungen aus bitterm Extractivstoffe, kleesaurem oder weinsteinsaurem Kalke, und wie es schien etwas salzsaurem Kalke und Selenit. Beim vierten Auskochen erhielt Trommsdorff ein wenig Extract wie bei 3, beim 5ten Auskochen aber ein Extract, das ziemlich weiß aussah und fast gar nicht bitter war. (Vergl. Extractum Quassiae.)

Auch der Weingeist zieht die Bitterkeit der Quassia vollkommen aus. Die Tinctur hat eine dunkle, gelbe Farbe, und ist von außerordentlicher Bitterkeit, doch ist die Menge des geistigen Extracts viel geringer, als die des wäßrigen, und beträgt nach Trommsdorff nur $\frac{1}{32}$.

Schon die Geruchlosigkeit der Quassia scheint zu beweisen, daß ihr flüchtige Theile fehlen, doch will Ebeling ein wäßriges Destillat von etwas gelblicher Farbe und bitterlichem Geschmacke erhalten haben; Severi aber ist der einzige, der selbst Spuren eines ätherischen Oeles erhalten zu haben glaubt, welches das Wasser in Form einer Haut überzog.

Dem Obigem zufolge besteht also das Quassienholz größtentheils aus Holzfaser und nur zu einem kleinen Theile aus extractiven Stoffen, diese sind: 1) Bitterstoff (Quassin). 2) Eine Modification des Schleimes oder Extractivstoffs, der selbst wohl keine eigentlichen arzneilichen Kräfte zu besitzen scheint, und im Weingeiste nicht auflöslich ist. 3) Kleesaurer Kalk. 4) Salzsaurer Kalk. 5) Schwefelsaurer Kalk und 6) eine Spur von ätherischem Oele (?).

Sowohl Rinde als Holz enthalten aber noch ein ammoniakalisches Salz, dieses beweist der deutliche Geruch nach Ammoniak, der sich beim Uebergießen mit Aetzkalilauge entwickelt. Dieses Salz befindet sich auch im Extracte.

Das bittere Princip der Quassia hat man als eigenthümlichen Stoff mit dem Namen Quassin bezeichnet; doch gehört er zu den sogenannten Extractivstoffen. Die Auflösung desselben wird durch salpetersaures Silber, essigsaures Blei und salzsaures Zinn gefällt; durch die übrigen Metallauflösungen erleidet er keine Veränderung, wird auch weder durch die Gallustinctur, noch durch die thierische Gallerte niedergeschlagen. Durch kalte Digestion der Quassia mit Wasser bereitet röthet er die Lackmustinctur und ist in Wasser und Alkohol sehr auflöslich. Das geistige Extract ist nach Buchner (Repert. XXIV. 1826. S. 256.) fast ganz in Wasser auflöslich und von einem höchst bittern Geschmacke. Wird die Auflösung desselben in Wasser mit essigsaurem Blei niedergeschlagen, so hat die abfiltrirte Flüssigkeit nichts von ihrer Bitterkeit verloren. Das Quassin scheint also zu den Alkaloiden (?) zu gehören, welches an die Essigsäure gebunden in der Auflösung bleibt, während der acide Bestandtheil des Auszugs mit dem Bleioxyd niedergeschlagen wurde. (Der Extractivstoff Pfaff's wird hiernach als zusammengesetzt angesehen, aus einem Alkaloid — Quassin —, und einem aciden Bestandtheile). Ein Gran von diesem geistigen Extracte einem Kaninchen in eine Wunde am Schenkel gelegt, tödtete dasselbe nach 30 Stunden.

Die Quassia in Pulverform zu verordnen, ist der vielen holzigen Theile wegen nicht zweckmäßig; eine bessere Form ist der wäßrige Auszug, $\frac{1}{2}$ Unze zu 2 Unzen. Passende Zusätze, um die Bitterkeit einigermaßen einzuhüllen,

sind Zimmtrinde und Zimmtwasser, Pomeranzentinctur, ein versüßter Geist, und von Syrupen vorzüglich der Pomeranzensyrup. Ein vorzügliches Ausziehungsmittel ist der spanische Wein, womit man die Quassia kalt übergießt und 24 Stunden unter öfterm Umschütteln stehen läßt.

Die Quassia wirkt als ein rein bitteres Mittel, da sie durchaus nichts Zusammenziehendes, keine Spur von Gerbestoff, hat. Sie zeigt auch keine narkotische Wirkung, es sey denn, daß sie im Uebermaße oder im Mißbrauche angewendet wurde, obgleich sie als Mittel gegen die Fliegen bekannt ist.

Quercus. Die Rinde. Eichenrinde.

Quercus Robur et pedunculata Willd. In Deutschland einheimische Bäume.

Die Rinde der jüngeren Aestchen, dünn, außen bräunlichgrau, innen bräunlich, bitter zusammenziehend. Sie werde im Frühlinge eingesammelt.

Quercus. Die Eichelfrüchte. Eicheln.

Die reifen Früchte ohne die Schälchen.

Quercus Robur Linn. Die Steineiche.
Quercus pedunculata Willd. Die Stieleiche.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 7. Polyandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 4. Amentaceae.

Die Steineiche ist in den gemäßigten Theilen Europas einheimisch, steigt gegen Norden bis zum 62 ° N. Br. hinauf, und erreicht ein Alter von 4—500 Jahren. Der Stamm wird über 100 Fuß hoch und erlangt eine Dicke von 5—6 Fuß im Durchmesser.

Die Rinde ist in der Jugend glatt und grünlichgrau, am ältern Holze wird sie braun und rissig. Das Holz selbst ist schwer, fest, grobfaserig, von bräunlichweißer Farbe. Die Knospen sind länglich zugespitzt. Die kurzen gestielten Blätter stehen abwechselnd, sind verkehrt-eiförmig, tief buchtig, oben glatt und glänzend, unten weißlich und schwach behaart. Am Grunde des Blattstiels befinden sich zwei linienförmige, sehr schmale Nebenblättchen. Die Blüthen sind einhäusig und kommen gewöhnlich im Mai gleichzeitig mit den Blättern hervor. Die männlichen Blüthen bilden schlanke, fadenförmige Kätzchen am Grunde der jungen Triebe; die weiblichen sitzen zu dreien in den Blattwinkeln an den Spitzen der jungen Zweige. Die Frucht ist eine Eichelfrucht (glans), der Saamenkern (nucleus) besteht aus den beiden dicken gelblichweißen Kotyledonen, an deren Spitze das nach oben gerichtete Würzelchen liegt.

Mit dieser Eiche ist eine zweite Art, die Stieleiche (Q. pedunculata), die noch häufiger in Deutschland vorkommt, sehr nahe verwandt. Sie wird höher und dicker, so daß man schon Exemplare mit einem Stamme von 25

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0732-3

Fuß im Umfange in Deutschland gefunden hat. Bei Wehlau in Ostpreußen ist eine Eiche gewesen, welche 27 Ellen in Umfange hatte, und in deren hohlen Stamme sich ein Reiter mit seinem Pferde, ja der Markgraf Albrecht mit seinem Sohne zu Pferde herumtummelten. Die Knospen sind eiförmig, kurz und stumpf; die Blätter sehr kurz gestielt, gewöhnlich kleiner und tiefer eingeschnitten. Die weiblichen Blüthen sind gestielt; die Früchte sind walzenförmig und stehen auf langen, dünnen und runden Stielen, welches als Hauptcharakter dieser Art zu betrachten ist.

Von beiden Eichenarten wird die Rinde der jüngeren Aeste wegen ihres reichen Gehaltes an Gerbestoff (Tannin), als ein stark adstringirendes Arzneimittel angewandt. Diese Rinde ist äußerlich bräunlich-aschfarbig, hin und wieder mit weißlichen Flechten bedeckt, und auf der innern Seite weißgelblich, getrocknet braunroth. Ihr Geschmack ist nur unbedeutend bitter, dagegen stark zusammenziehend, hintennach süßlich. Die gefurchten, rissigen, frisch braunen und gewöhnlich ganz mit Moos bedeckten Rindenstücke von alten Aesten und vom Stamme sind von minder kräftiger Wirkung.

Ein concentrirter Aufguß der Eichenrinde hat ein spec. Gew. von 1,05, schmeckt stark zusammenziehend, röthet das Lackmuspapier. 200 Gran dieses Aufgusses gaben in Davy's Versuchen 17 Gran Rückstand, wovon 14 Gerbestoff waren. Die nach Fällung des Gerbestoffes rückständige Flüssigkeit röthete schwach das Lackmuspapier, fällte die Zinnauflösung mit fahler Farbe, und die Eisenauflösung schwarzblau.

Mit den concentrirten Säuren und kohlensauren Laugensalzen entsteht ein dicker Niederschlag von fahler Farbe; auch durch Kalk-, Baryt- und Strontianwasser wird der Aufguß reichlich gefällt. Mit Thonerde, Kalkerde und Talkerde eine Zeitlang gekocht, verliert er seine ganze Wirksamkeit auf Eisensalze und Gallerte, und wird fast ganz ungefärbt. Durch Erhitzung mit kohlens. Kalk- und Talkerde wird dagegen der Aufguß dunkler als vorher, und wiewohl er die Eigenschaft verloren hat, die Gallerte zu fällen, so giebt er doch mit Eisensalzen starke olivenfarbene Niederschläge.

Die Farbe des Niederschlages mit der Gallerte ist anfänglich bräunlich, wird aber an der Luft viel dunkler, und besteht, einer ungefähren Schätzung nach, aus 59 Leim und 41 Gerbestoff.

Davy suchte vergebens Galläpfelsäure rein aus der Eichenrinde darzustellen. Welchen Einfluß das Alter und die Jahreszeit auf den Gehalt der Eichenrinde an Gerbestoff haben, beweisen die Resultate aus vergleichenden Versuchen. Nach Davy gab eine Unze von der weißen innern Rinde (die überhaupt der an Gerbestoff reichste Theil der Rinde ist) 108 Gran festen Rückstand, der 72 Gran an Gerbestoff enthielt. Eine Unze Rinde von einer jungen Eiche gab 111 Gran Rückstand und 77 Gran Gerbestoff. Die Rinde einer im Winter gefällten enthielt nach Biggins 30 Gerbestoff, wogegen dieselbe Menge Rinde von einer im Frühlinge gefällten Eiche 108 Gerbestoff enthielt.

An Extract wird ohngefähr $\frac{1}{3}$ erhalten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0733-9

Die Eichenrinde wird sowohl innerlich als äußerlich als ein kräftiges adstringirendes Mittel angewendet. Die von Autenrieth empfohlene Salbe gegen das Durchliegen (Unguentum Autenriethii contra decubitum) besteht in dem aus einer starken Eichenrindenabkochung durch Bleiextract bewirkten Niederschlage, welcher von der überstehenden Flüssigkeit durch ein Filtrum getrennt wird.

Die Eicheln sind die reifen, länglich eirunden, glatten, von ihren Kelchen befreiten Früchte des Eichbaums. Sie enthalten in einer lederartigen, hell gelbbräunlichen Schale einen mit einem bräunlichen Oberhäutchen bekleideten, weißen, eiförmigen, in die beiden Kotyledonen sehr leicht theilbaren, bitter und herbe zusammenziehend schmeckenden Kern. Sie müssen vor der Aufbewahrung stark gedörrt werden, um sie vor dem Verderben zu schützen. Die gerösteten Eicheln (Glandes Quercus tostae) werden durch sorgfältiges und vorsichtiges Rösten der von der äußern Haut befreiten Kerne in einer Kaffeedrumme bereitet; sie dürfen nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach geröstet werden, und müssen von hellbrauner Farbe seyn. Sie enthalten mehr bitteres als zusammenziehendes Princip, wirken außerdem noch durch das in ihnen entwickelte empyreumatische Oel, und geben unter dem Namen Eichelkaffee ein mit Recht geschätztes Haus- und Arzneimittel.

Auch die Eichenblätter (Folia Quercus) wurden sonst wohl als adstringirendes Mittel gebraucht.

Die Eiche wurde wegen ihrer großen Nutzbarkeit von den alten Preußen heilig verehrt. So stand eine Eiche da, wo jetzt die Stadt Heiligenbeil steht, unter welcher dem Curcho oder Gorcho, der für den Gott der Speisen und Getränke galt, geopfert wurde. Unter einer andern Eiche, die 6 Ellen im Durchschnitte gehabt haben soll, wurde der Donnergott Perkunos, der Ernte- und Regengott Potrimpus und der Todtengott Pykullus heilig verehrt.

* Ratanhia. Die Wurzel. Ratanhiawurzel.

Krameria triandra Ruiz et Pavon. Dreimännige Kramerie.
Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. Polygaleae.

Ein Staudengewächs, welches im südlichen Amerika, vorzüglich in Peru, wild wächst, auf trocknem mit Lehm und Sand gemengtem Boden, und eine Höhe von 2—3 Fuß erreicht. Die Wurzel ist wagerecht, kriechend. Die Stengel sind liegend, sehr ästig ausgebreitet, unten rund, glatt und holzig. Die jungen Zweige sind rund, dicht mit weißlichen etwas anliegenden Haaren, wie die übrigen Theile der Pflanze bedeckt, welche durch sie ein zierliches Ansehen erhält. Die Blätter sind länglich-lancettförmig, wechselsweise, stiellos, ungezahnt, fest und lederartig, an beiden Seiten verdünnt, nicht über 4 Linien lang, und in der Mitte an zwei Linien breit. Die Blumen stehen einzeln an den Spitzen der Zweige. Der Kelch zeigt vier tiefe, innerhalb glatte, äußerlich zottige Abschnitte. Die Krone besteht aus vier unre-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0734-4

gelmäßigen und ungleichen Blumenblättern, ist außerhalb seidenartig, innerhalb blaß violett.

Die Peruaner bezeichnen diesen Strauch mit dem Namen Ratanhia, welches sich auf die kriechende Beschaffenheit der Wurzel bezieht. Die Kenntniß der Pflanze, welche die gebräuchliche Ratanhiawurzel liefert, so wie ihres medicinischen Gebrauches verdankt man dem spanischen Botaniker Ruiz. Diese Wurzel ist sehr ästig, 1—1½ Spannen lang, von der Dicke eines Federkiels bis zu der eines Daumens; die Aeste sind etwas gedreht, und bisweilen auch mit sparsamen feinen Fasern besetzt. Aeußerlich ist sie dunkel braunroth, innerlich hat sie eine gelblichröthliche Farbe. Die innere Substanz ist fest, sehr hart, holzig, und beinahe geschmacklos; die dunkelbraunrothe Rinde, eine Viertellinie dick, hat einen sehr starken zusammenziehenden Geschmack, und nachher eine geringe Bitterkeit. Diese Rinde ist wirksamer als der innere Kern, daher die dünneren Stücke, welche nach Verhältniß mehr Rinde besitzen, vorzuziehen sind.

Eine zweite Art, Krameria Ixina Linn., sowohl auf dem Festlande Südamerikas als auch besonders auf den Antillen einheimisch, liefert die Ratanhia der Antillen, welche mit der peruanischen Ratanhia übereinstimmen soll, aber wohl nur selten angewendet worden zu seyn scheint. Ueberhaupt sind die Wurzeln der Krameriaarten sämmtlich außerordentlich adstringirend. Eine besondere neue Ratanhiawurzel hat Hr. Giesberr (Brandes Archiv II. S. 256.) unter der gewöhnlichen Sorte aufgefunden, welche sich durch weißgelbe Farbe des holzigen Theils, so wie durch die in das Graue fallende Farbe der Rinde und einen weniger zusammenziehenden Geschmack unterscheidet.

Trommsdorff, Vogel und Gmelin (Taschenbuch 1820. S. 34.) haben zu gleicher Zeit diese Rinde einer Untersuchung unterworfen, und folgende Resultate erhalten. Nach Trommsdorff enthalten 100 Th.: eigenthümlichen Gerbestoff 42,5; Gummi 17,5; besondern Extractivstoff 25; Faserstoff 15. Der holzige Rückstand der Wurzel hinterließ nach dem Verbrennen eine Asche, die aus basischem kohlens. Kali, schwefels. Kali, salzs. Kali, Kieselerde, Thonerde, kohlens. Kalk, Eisenoxyd und Kupferoxyd bestand.

Nach Vogel soll der kalte Aufguß durch schwefelsaures Eisen dunkelgrün gefärbt werden, wie ein Chinaaufguß, wogegen Trommsdorff einen violettrothen Aufguß, wie bei dem Galläpfelaufgusse erhalten haben will. Dieser Widerspruch hebt sich dadurch, daß bei Vogel's Verfahren mehr nur der reine Gerbestoff, bei Trommsdorff's Verfahren zugleich die Gallussäure, deren Anwesenheit Peschier bewiesen hat, mit im Spiele war. Denn auch Pfaff erhielt die Farbenänderung ins Grüne, die sich aber schnell ins Olivengrüne und Braungrüne verwandelte. Bei mir erfolgte jedoch diese Umänderung der ursprünglich grünen Farbe, die schnell olivengrün wurde, ins Braungrüne nicht sogleich, sondern erst nach einiger Zeit mit Trübung. Nach Vogel enthalten 100 Th. Ratanhiawurzel: braunes adstringirendes Princip (Modification des Gerbestoffes) 40; Schleim 1,5;

Stärke 0,5; Holzfaser 48; Wasser und Verlust 10. Die Asche enthielt ätzenden, schwefels. und kohlens. Kalk, kohlens. Talkerde und Kieselerde.

Nach C. G. Gmelin enthalten 100 Th. der Wurzel: Gerbestoff 38,233; süßen Stoff 6,666; schleimige stickstoffreiche, in kaltem Wasser unauflösliche Materie 2,466; schleimige Materie ohne Stickstoff mit Wasser verbunden 8,300; Holzfaser mit Kieselerde, kohlens. Kalke u. s. w. 43,333.

Peschier (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 172.) erhielt außer der Gallussäure noch eine eigenthümliche Säure, die er unter dem Namen Kramersäure beschrieb. Aus einer Unze Ratanhiawurzel erhielt er 150 Gran trockenes Extract, welches zusammengesetzt war aus: Gerbestoff 64; Galläpfelsäure 0,5; gummige, extractive und färbende Stoffe 85,0; neue Säure 0,5. In der Asche der Wurzel fand er kohlens. Natron. 500 Gran der Wurzel gaben nämlich: Kalk 2,50; Thonerde 1,90; Kieselerde 1,50; Eisenoxyd 0,55; kohlens. Natron 0,60; salzs. Natron 0,40. S. = 7,45.

Die neue Säure Peschier's konnte von mehreren Chemikern nicht aufgefunden werden; dieses erklärt Peschier dadurch (Trommsd. N. J. IX. 2. S. 142.), daß die Menge der Säure in mehreren im Handel vorkommenden Sorten der Ratanhiawurzel sehr variire, so daß in manchen kaum Spuren aufgefunden werden können, indem die Ratanhia von mehr als einer Art Krameria gesammelt werde. Die Eigenschaften, welche Peschier dieser Säure zuschreibt, sind zum Theil sehr merkwürdig, sie soll eine stärkere Verwandtschaft zum Baryt haben, als die Schwefelsäure, und doch verändert sich die Verbindung mit der Zeit; der kramersaure Baryt, der frisch bereitet Seidenglanz hat, verliert diesen nämlich nach einigen Jahren, wenn er in Gefäßen, die dem Zutritte der Luft ausgesetzt sind, aufbewahrt wird. Die andern Verbindungen bleiben unverändert. Anfangs gab Peschier an, die Säure sey unkrystallisirbar, später erhielt er sie immer krystallisirt in der Form von scharfkantigen Prismen, die an der Luft beständig waren.

Die Ratanhiawurzel wird als ein adstringirendes und tonisches Mittel gewöhnlich und auch am zweckmäßigsten in der Abkochung oder auch im Extracte verordnet. Dieses kann zwar auf gewöhnliche Weise durch Auskochen der Wurzel bereitet werden, gebräuchlich ist aber nur das im Handel vorkommende, schon in Amerika bereitete Extractum Ratanhiae. Gewöhnlich kommt es in großen Massen von schwarzbrauner Farbe und glasigem Bruche vor; Pfaff hat es pulverisirt, von einer braunen Farbe, ungefähr wie Kermes, erhalten, welches an feuchter Luft dunkler, fast schwarz wurde. Es hat einen herben Geschmack, ist in absolutem Alkohol bis auf 0,15 Rückstand auflöslich und färbt denselben schön dunkelroth. Aetzkali bringt in der Tinctur einen reichlichen graubraunen Niederschlag hervor, der in einer großen Menge Wasser vollkommen auflöslich ist, und eine stark carminroth gefärbte Flüssigkeit giebt. Eisenauflösung bringt in der sehr verdünnten Auflösung eine grünlichbraune Färbung hervor. Peschier empfiehlt dieses Extract vorzüglich zur Gewinnung der Kramersäure.

Rheum. Die Wurzel. Rhabarberwurzel.

Eine noch nicht mit Gewißheit erkannte Art Rheum im chinesischen Reiche.

Eine feste, unter den Zähnen knirschende Wurzel, gemeiniglich in sehr häufig durchbohrte Scheiben zerschnitten, schwer, außen nach abgeschälter Rinde gelb, innen rosenfarbig und weiß marmorirt, den Speichel gelb färbend, von specifischem widerlichem Geschmacke und Geruche.

Rheum palmatum Linn.? Die handförmige Rhabarber; ächte Rhabarber.

Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 3. Trigynia.

Juss. Cl. VI. Ord. 5. Polygoneae.

Linné hatte **Rheum undulatum**, die wellenförmige Rabarber, welche in der chinesischen Tatarei einheimisch ist, als die Mutterpflanze unter dem ihr von ihm beigelegten Namen **Rheum Rhabarbarum** angegeben; als aber auf Veranlassung der russischen Regierung ein tatarischer Kaufmann den Auftrag erhielt, Rhabarbersaamen zu verschaffen, und von diesem die schon bekannte Pflanze und das noch unbekannte **Rheum palmatum** gezogen wurde, so nannte Linné die erstere **Rheum undulatum** und das letztere **Rheum palmatum**. Außer diesen beiden Pflanzen ist auch **Rheum compactum**, die dichte Rhabarber, von vielen als die Mutterpflanze bezeichnet worden, Guibourt behauptet aber, daß die Wurzel dieser Pflanze, die sich hinsichtlich der Blätter wenig von **Rheum rhaponticum** unterscheidet, unter allen am meisten verschieden von der Rhabarber, von einem sehr bittern Geschmacke und ganz widerlichem Geruche, auch kleiner als die Rhapontik sey. Nach den in den königl. Gärten zu Paris gezogenen Exemplaren sind, wie Guibourt angiebt, die Wurzeln von **Rheum rhaponticum** und **Rh. undulatum** vollkommen gleich, und nur die Wurzel von **Rh. palmatum** allein besitzt den Geruch und Geschmack der chinesischen Rhabarber (außer dem Knirschen zwischen den Zähnen), so daß dieses als die wahre Mutterpflanze anzusehen sey. Auch die Herren Bousquet und Caventou, von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Paris beauftragt, zu berichten, ob die in Frankreich cultivirte Rhabarber, (deren Anbau man auch in Deutschland an mehreren Orten, namentlich in der Rheinpfalz versucht hat) ohne Nachtheil in pharmaceutischen Zubereitungen der exotischen Rhabarber untergeschoben werden könne, sprechen sich dahin aus, daß die in Frankreich cultivirte Rhabarber **Rheum palmatum** sey, wenn gleich auch **Rheum compactum, undulatum** und **rhaponticum** gezogen werde, daß sie einen feuchten sonnigen Boden und ein 7—8jähriges Alter erfodere; daß die exotische Rhabarber eine mehr ausgesprochene Farbe, einen stärkern Geruch, einen frisch aromatischen und bitterlichen Geschmack habe, wogegen die

französische Rhabarber mehr schleimig und krautartig schmecke und offenbar weniger ausgebildet sey. Chemische Analysen, von den Herren Henry und Caventou angestellt, zeigten, daß, während 100 Th. chinesischer Rhabarber 74 in Wasser und Alkohol lösliche Theile enthielten, eine ähnliche Quantität Wurzel von Rheum palmatum nur 64, von Rh. compactum 50, Rh. undulatum 32 und Rh. rhaponticum 30 Th. zu erkennen gaben. Auch hieraus geht demnach hervor, daß die Wurzel von Rheum palmatum sich am meisten der exotischen nähere, wenn sie gleich dieser nachsteht, und auch in den klinischen Versuchen eine Verstärkung der Gabe um ein Viertel erforderte. Doch ist auch diesem Berichte von mehreren Mitgliedern der Akademie widersprochen worden, daß nämlich hinsichts der botanischen Analogie des Rheum palmatum und der chinesischen Rhabarber noch nicht alle Zweifel gehoben seyen, da man nach Rehmann die Art der Pflanze noch nicht kenne, von welcher die exotische Rhabarber abstammt.

Die handförmige Rhabarber wächst nach Murray wild auf einer langen, zum Theil von Waldungen entblößten Gebirgskette, welche im Norden der chinesischen Tatarei nicht weit von der Stadt Selin ihren Anfang nimmt, sich gegen Westen längs dieses Landes hinzieht, und südlich bis gegen den See Kokonor, an der Grenze von Tibet, erstreckt. Der Boden wird von Maulwürfen umgewühlt. Die Wurzel ist senkrecht, ästig, armsdick, außen mehr schwarzbraun, innen etwas dunkler gelb als bei den andern Rhabarberarten. Die Wurzelblätter stehen ausgebreitet oder in schiefer Richtung aufsteigend auf ungefähr 1½ Fuß langen, glatten, mehr oder minder rothgefleckten Blattstielen. Das Blatt selbst ist fast so lang als breit, herzförmig und in drei Hauptlappen und zwei Seitenlappen getheilt, welche breit, spitz, und wieder in mehrere große spitze und ungleiche Zähne gespalten sind. Die obere Seite ist dunkelgrün, die untere graugrün, und beide sind mit einem sehr kurzen und etwas rauhen Haarüberzuge bekleidet. Die Stengel sind aufrecht und glatt, mit röhrigen Nebenscheiden (ochreae) bekleidet, schwachgestreift, innen hohl, 6—8 Fuß hoch. Die Stengelblätter sind klein, stengelumfassend und zurückgebogen. Die Blüthenstiele entspringen aus den Winkeln der obern Blätter, und die kleinen weißlichen Blüthen bilden vielblüthige Rispen.

Das zum Einsammeln der Wurzeln gehörige Alter wird an der Stärke der Stengel erkannt; gewöhnlich ist es das sechste Jahr. Man gräbt sie in den Monaten April und Mai, manchmal auch im Herbste aus. Sie werden gereinigt, in Stücke geschnitten, und nachdem sie durchlöchert und eingefädelt worden, theils an den benachbarten Bäumen, theils in den Zelten, theils sogar an den Hörnern der Schafe aufgehangen. Wenn die Ernte zu Ende ist, werden sie in die Wohnungen geschafft, wo sie vollends getrocknet werden, welches nach Duhalde bei den Chinesen über Steinplatten geschieht, die von unten durch Feuer erhitzt werden.

Diese Rhabarber gelangt auf zwei Wegen zu uns, theils zu Wasser von Canton aus, und diese heißt indische oder gewöhnlicher chinesische Rha-

barber, theils wird sie von bucharischen Kaufleuten nach Kiachta in Sibirien gebracht, und an die russische Regierung verkauft. In dieser Stadt halten sich Commissarien auf, welche beauftragt sind, die Rhabarber sorgfältig zu durchsuchen, und dieselben Stück für Stück reinigen und schälen zu lassen, denn die Regierung kauft nur die ganz schönen Wurzeln. Diese Rhabarber wird sodann in verpichten Kisten nach Moskau und von da nach Petersburg gebracht, wo sie noch einmal untersucht wird, ehe sie in den Handel kommt. Dieses ist die russische oder moskowitische Rhabarber. Man erhält diese Sorte Rhabarber in vieleckigen, etwas länglich-runden oder flachen, platten, fast handgroßen, zwei Zoll oder weniger dicken, oder in pferdehufähnlichen, mit ¼ Zoll weiten Bohrlöchern versehenen, bisweilen dergestalt ausgehöhlten Stücken, daß manche davon einer Rinde nicht unähnlich sind. Von außen ist sie röthlichgelb und weiß gestreift, bisweilen wie mit einem gelben Pulver bestreut, auf dem Bruche aus Rosenroth, Weiß und Gelb wie eine Muskatennuß marmorirt, oft wie in sternförmigen Schattirungen. Ihr Gewebe läßt sich leicht mit den Fingern zerbröckeln, ihre Substanz knirscht beim Kauen zwischen den Zähnen (von dem eingesprengten kleef. Kalke), und färbt den Speichel gelb. Der Geschmack ist ekelhaft bitter, etwas scharf und zusammenziehend, der Geruch eigenthümlich widrig. Die Löcher rühren zum Theil davon her, daß die verdorbene Substanz der vorhin des Aufhängens wegen gemachten Löcher weggeschnitten wird, daher sie bisweilen ½ bis ¾ Zoll weit sind, zum Theil werden sie in Rußland gebohrt, um die innere Substanz der Stücke zu prüfen.

Die chinesische oder indische Rhabarber, von derselben Abstammung, ist jedoch im Ganzen etwas hellfarbiger, als die russische, matter, schwerer (vom Transport über das Meer), derber. Die meistens 3—4 Zoll langen und einige Zoll dicken Stücke sind bald walzenförmig, bald auf einer Seite erhaben, auf der andern glatt, oder wie zusammengedrückt und gepreßt, auf beiden Seiten flach, mit kleinen Löchern versehen, worin sich bisweilen noch die Schnur findet, welche zum Aufhängen gedient hat. Auch diese Sorte kommt jetzt sehr häufig geschält vor, wie die russische, von welcher sie sich aber durch die festere Textur, durch die kleinen Bohrlöcher und durch die untermischten schlechten Stücke unterscheidet. Beim Einkaufe muß man daher zuerst von den Stücken den täuschenden Staub entfernen, womit sie bedeckt sind, und nicht selten wird man die schwersten Stücken im Innern feucht und schwarz, die leichtesten von Insecten durchbohrt finden. Solche wurmstichige, schwärzlich gefleckte, schwammige, feuchte, leichte, von außen braune, inwendig nicht rosenroth und weiß marmorirte Stücke sind durchaus verwerflich. Bei der russischen Rhabarber werden die Wurmlöcher durch eine Masse von Rhabarber- auch wohl Kurkumepulver und Gummischleim ausgefüllt, was jedoch leicht zu entdecken ist.

Die europäische oder inländische Rhabarber besteht gewöhnlich aus kleinen, in die Quere zerschnittenen, oder in länglichen, grünlichgelben, unansehnlichen, zusammengeschrumpften Stücken, die viel bitterer, aber wenig zusam-

menziehend schmecken, zwischen den Zähnen nicht knirschen und an Wirksamkeit bedeutend nachstehen.

Die Rhapontik, die Wurzel von **Rheum rhaponticum**, einer in Thracien auf dem Rhodopäischen Gebirge wachsenden Pflanze, die nach Decandolle auch in der Auvergne in Frankreich, ferner nach mehreren Autoren am Uralgebirge in Rußland vorkommt, auch bei uns in Gärten angebaut wird, ist eine ästige, mehr lange als breite und dicke Wurzel, außen von dunkelgelber fast brauner, oder auch röthlichweißer Farbe, nicht bestäubt, im Innern mit gelben oder rothen und weißen Ringen, und mit aus dem Mittelpunkte strahlenförmig ausgehenden Streifen gezeichnet, von schwachem, nicht unangenehmen Rhabarbergeruche, von wenig bitterm aber mehr adstringirendem und mehr schleimigem Geschmacke; sie färbt den Speichel zwar gleichfalls rothgelb, knirscht aber nicht unter den Zähnen.

Die Mönchsrhabarber, die Wurzel von **Rumex alpinus**, ist unverkennbar, da diese in runzligen, langen, außen braunen und inwendig schmutzig bräunlichen oder grünlichgelben mit dunkelrothen Adern durchzogenen Stücken vorkommt und zwar einen bitterlich-rhabarberartigen Geschmack besitzt, dieser aber viel stärker zusammenziehend und mehr ekelerregend ist; der Speichel wird safrangelb gefärbt.

Das Wasser entzieht der Rhabarber größtentheils alle wirksamen Theile, der wäßrige Auszug ist gelblichroth, wird durch Alkalien dunkelroth und hat den specifischen Geruch und Geschmack der Rhabarber. Der Weingeist zieht eine dunkelroth gefärbte Tinctur aus.

Nach Schrader's vergleichenden Versuchen (Berl. Jahrb. 1807. S. 123.) zwischen der besten russischen und der inländischen Rhabarber (von **Rheum palmatum**), welchen zufolge die letztere etwas mehr Schleim und kleesaure Kalkerde, weniger Harz und Seifenstoff als die erste enthalten soll, ist die Rhabarber ein Gegenstand vielfältiger chemischer Untersuchungen gewesen.

Pfaff (Syst. der Mat. med. III. S. 23. u. VI. S. 308.) um den bereits von Trommsdorff (dessen J. III. 1. S. 111.) angedeuteten eigenthümlichen Bestandtheil darzustellen, zog die klein zerschnittene Rhabarber erst vollständig mit Wasser aus. Der wäßrige Aufguß wurde abgeraucht, das rückständige Extract abermals in Wasser aufgelöst, wobei gewöhnlich ein kleiner Rückstand bleibt, hierauf die wäßrige Auflösung wieder vorsichtig bis zur Extractdicke gebracht, und der Rückstand mit möglichst wasserfreiem Weingeiste ausgezogen, wo dann nach dem Abrauchen desselben der Rhabarberstoff als eine dunkelbraune, glänzende, undurchsichtige Substanz von ganz eigenthümlich ekelhaft bitterm, kaum merklich zusammenziehendem Geschmacke, und eben so eigenthümlichem, etwas widrigem Geruche zurückblieb. Dieser Rhabarberstoff Pfaff's löst sich in Wasser, Alkohol und Aether unter gelber Färbung vollkommen auf, wird an der Luft feucht, reagirt weder sauer noch alkalisch, verhält sich gegen einige Reagentien als gerbestoffhaltig, und steht überhaupt diesem und den mit ihm verwandten Stoffen am nächsten.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0740-7

Henry (Trommsd. J. XXIV. 2. S. 88.) erschöpfte dagegen die Rhabarber mit Alkohol von 38 ° B., rauchte ab, und wusch das Extract mit kaltem Wasser aus, wobei ein harziges Product zurückblieb, von welchem Farbe, Geruch und Geschmack der Rhabarber herrühren. Dieser Stoff ist gelb, unauflöslich in kaltem, auflöslich in heißem Wasser, in Alkohol und Aether, am Feuer verflüchtigt er sich als ein gelber wohlriechender Rauch, und hat einen bittern herben Geschmack, welcher der in der Rhabarber vorherrschende ist. Mit den Alkalien giebt er Auflösungen von schöner rother Farbe, aus welchen ihn die Säuren mit seiner ursprünglichen Farbe niederschlagen. Die Säuren und verschiedene Metallauflösungen geben gelbe Niederschläge, das schwefelsaure Eisen einen schwärzlichgrünen, die Leimauflösung einen käsigen lederartigen Niederschlag. Dieser Rhabarberstoff Henry's stimmt demnach nicht mit Pfaff's Rhabarberstoff überein, indem er sich mehr der harzigen Natur nähert. Außer diesem eigenthümlichen Stoffe, Rhabarberin, fand Henry: 2) eine geringe Menge eines fetten, milden, in Alkohol auflöslichen Oels (nach Pfaff scheint dieses Oel eher ein Product der Operation, nach Gmelin ein Harz, daher also wohl noch im Ganzen problematisch zu seyn); 3) Gummi; 4) Stärkemehl; 5) mehrere Salze, nämlich sauerkleesauren Kalk, welcher beinahe den dritten Theil des ganzen Gewichts der Wurzel beträgt (nach andern Chemikern $\frac{1}{6}$, von den meisten ist aber ein noch geringeres Verhältniß angegeben), sauren äpfels. Kalk und schwefels. Kalk; 6) Holzfaser. Der kleef. Kalk gilt gewöhnlich als ein Kriterium für die russische Rhabarber, und Henry fand auch wirklich den Gehalt an diesem Salze bei weitem größer bei der russischen, als bei der einheimischen Rhabarber, obgleich Schrader gerade das Entgegengesetzte gefunden hatte.

Hornemann (Berl. Jahrb. 1822. S. 252.) stellte vergleichende Versuche über die ächte und unächte Rhabarber an, und ist dabei zu eigenthümlichen Resultaten gekommen. Um Henry's Rhabarberin darzustellen, wurde der weingeistige Auszug der Rhabarber zur Trockne gebracht, und dann so lange mit kaltem Wasser behandelt, als dieses noch darauf wirkte. Das zuletzt aufgegossene Wasser wurde eine Viertelstunde damit kochen gelassen, und erst nach dem Erkalten wieder abgegossen. Dieses Rhabarberin zeigte im Allgemeinen die von Henry angegebenen Eigenschaften: 50 Gran Rhabarber wurden sechsmal mit wasserfreiem Aether ausgezogen, welcher nach dem Verdampfen 11 Gran Rückstand ließ, worin man deutlich hellgelbe Flocken bemerkte, die in einer rothgelben harzigen Substanz befindlich waren. Um beide zu trennen, wurde wasserfreier Weingeist aufgegossen, in welchem die harzige Substanz sich löste, die Flocken aber in der Flüssigkeit umherschwammen. Die geringe Menge dieser Flocken gestattete nur wenige Versuche. Sie waren hellgelb, mattglänzend, gaben auch unter dem Vergrößerungsglase keine krystallinische Form zu erkennen, fühlten sich fettig oder weich an, kaltes und kochendes Wasser wirkte nicht darauf, Weingeist von 60 Procent löste in der Kälte nichts auf, aber in der Siedehitze löste die Unze einen Gran,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0741-3

der aber beim Erkalten zum größten Theile wieder niederfiel. In absolutem Weingeiste und Aether lösten sie sich sehr schnell auf; Aetzammoniak und Aetzkalilauge lösten sie nur in geringer Menge auf, welche Lösungen schön dunkel rosenroth gefärbt waren. Aus den kalischen Lösungen schlugen die Säuren diese Substanz etwas verändert nieder, denn sie löste sich nun nicht mehr mit rosenrother Farbe in den Kalien auf. Die geistige Lösung verändert Lackmus- und Kurkumepapier nicht. In einem Platinlöffel erhitzt schmelzen sie bei einer Hitze, welche die des kochenden Wassers nur etwas übersteigt, wobei sich gelbe Dämpfe, die einem dem verbrannten Fette ähnlichen Geruch haben, entwickeln; bei stärkerer Hitze verdampft alles, und ein schwarzer Fleck bleibt im Löffel zurück, der beim Glühen verschwindet.

Die weitere Behandlung des Rückstandes mit Aether lieferte bloß ein Harz, welches mit dem früher erhaltenen ein ganz gleiches Verhalten zeigte. Es ist rothgelb, spröde, im Bruche glänzend, hat einen erwärmenden Rhabarbergeschmack, in der Kälte keinen Geruch, erwärmt aber schmilzt es, und verbreitet dann einen Rhabarbergeruch. Wenn der Aether nichts mehr vom Rhabarberin löst, so bleibt ein dunkelbraunes Pulver zurück, welches zum Theil vom wasserhaltigen Weingeiste gelöst wird, und denselben dunkelbraun färbt. Trocknet man diese Lösung ein, so erhält man eine glänzend schwarzbraune Masse, welche die größte Aehnlichkeit mit dem eisengrünenden Gerbestoffe zeigt, widerlich zusammenziehend bitter schmeckt, geruchlos ist, sich in Weingeist und Wasser löst, mit dem thierischen Leime einen starken, zähen, gelbbraunen, mit dem salzs. Eisenoxyd und dem schwefels. Eisenoxydul einen starken dunkelgrünen, mit den Säuren einen flockigen, bräunlichen, auch mit den Metallsalzen verschieden gefärbte Niederschläge giebt; Barytwasser färbt die Lösung roth, und es entsteht später ein brauner Niederschlag.

Der von dem wasserhaltigen Weingeiste unaufgelöst gebliebene Rückstand war ein graubraunes Pulver, welches weder von Weingeist noch von Aether oder von kaltem und kochendem Wasser angegriffen wurde, sich aber in ätzenden Kalien leicht mit dunkelbrauner Farbe löste, und sich wie oxydirter Gerbestoff verhielt.

Das Rhabarberin Henry's ist demnach zusammengesetzt aus einer eigenthümlichen Substanz (Rheumin), aus Harz und Gerbestoff.

Pfaffs Rhabarberstoff wurde von dem Verfasser dargestellt, indem er das wäßrige Extract mit starkem Weingeiste auszog, diesen verdampfte und dann wieder in vielem Wasser löste, um Henry's Rhabarberin davon abzuscheiden. Wird zu wenig Wasser angewandt, so fällt nicht alles Rhabarberin nieder, ja wendet man nur sehr wenig Wasser an, so löst sich fast alles zu einer hellen Flüssigkeit auf, die aber bei stärkerer Verdünnung sogleich gelb und trübe wird, und das Rhabarberin fallen läßt. Der durch Abdampfen der klaren Flüssigkeit erhaltene Rhabarberstoff (Pfaff's) wird von absolut reinem Aether wenig angegriffen. 6 Unzen Aether nahmen von 77 Gran Rhabarberstoff nur 2 Gran auf, die aus Harz und Gallussäure (?) bestanden. Auf Gallussäure, welche darzustellen nicht möglich war, schließt

der Verf. nur aus der Wirkung auf mehrere Reagentien. Die wäßrige Lösung des mit Aether behandelten Rhabarberstoffes wurde mit essigs. Blei niedergeschlagen, die klare Flüssigkeit von dem gelben Niederschlage abfiltrirt, das überschüssig zugesetzte Blei durch Schwefelwasserstoffgas gefällt, die klar filtrirte Flüssigkeit eingedampft, nochmals aufgelöst und verdampft, um die Essigsäure möglichst zu verjagen. Der Rückstand war eine bräunliche, wie arabisches Gummi glänzende Masse, die sich wie Schleimzucker verhielt, noch mit einem Kalksalze verbunden, welches für essigs. Kalk erkannt wurde. Der gelbe Bleiniederschlag wurde in Wasser zertheilt und durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die Flüssigkeit blieb etwas gelblich gefärbt, und hinterließ nach gelindem Verdampfen eine bräunliche Masse, die einen muschligen Bruch und einen widerlich zusammenziehenden Geschmack besaß. Die wäßrige Lösung röthete Lackmuspapier schwach, ward von Säuren nicht verändert, aber von Baryt- und Kalkwasser röthlich gefärbt, und es setzte sich ein blaßgrauer Niederschlag ab. Der Verf. bezeichnet diesen Stoff mit dem Namen Extractivstoff.

Das Schwefelblei wurde noch mit Weingeist digerirt, und dadurch eine gelbbräunliche Masse erhalten, aus der Wasser noch etwas von dem erwähnten Extractivstoffe auszog; den in Weingeist löslichen Rückstand zählt der Verf. zu den Halbharzen.

Pfaff's Rhabarberstoff zerfällt also, wenn ihm zuvor durch Aether ein kleiner Gehalt an Harz und Gallusäure (?) entzogen ist, in Schleimzucker, dem etwas eines Kalksalzes anhängt, in Extractivstoff und Halbharz. Den Extractivstoff weist aber wohl der widerlich zusammenziehende Geschmack zu dem Gerbestoffe hin, da er auch die Leimauflösung fällt, salzs. Eisenoxyd unter Trübung dunkelgrün und schwefels. Eisenoxydul blaugrün fällt.

Hornemann giebt die Bestandtheile in einer Unze russischem Rabarber folgendermaßen an: Rhabarberin (nach Henry) 46 Gran; Rhabarberstoff nach Pfaff 77 Gr.; bitteres zusammenziehendes Extract 70,5; oxydirten Gerbestoff 7; Schleim 48; aus der Faser durch Kalilauge ausgezogene Substanz 136; die Kalilauge enthielt an Kleesäure 5; ungelöster Rückstand 70; Verlust beim Austrocknen der Wurzeln 16; Verlust 4,5. S. = 480 Gran.

Der Rückstand von 70 Gran gab verbrannt 33 Gran Asche, welche bestand aus: Kali einer Spur; Kohle 1 Gr.; Kieselerde 2; kohlens. Talk 1; Thonerde mit einer Spur Eisenoxyd 1; kohlens. Kalk 28. S. = 33.

Zucker wurde auch von Meißner (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 295.) in der Rhabarber gefunden, den er jedoch nicht krystallinisch darstellen konnte, und von welchem er die schnelle Gährung eines wäßrigen Rhabarberauszuges ableitet.

Runge (Materialien zur Phytologie, 2te Lieferung S. 217.) glaubt durch essigs. Blei eine eigenthümliche Säure, die Rhabarbersäure, und eine eigenthümliche Base erhalten zu haben, welche letztere von der damit verbundenen Essigsäure durch bloßes Wasser gefällt werden konnte.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0743-4

Pfaff (Trommsd. N. J. VII. 1. S. 432.) erklärt diese Versuche nicht ohne Grund für ungenau.

Carpenter (Kastn. Archiv VIII. 3. S. 294.; Geiger's Magazin 1826. August S. 144.) will ein schwefelsaures Rhabarberin nach folgender Vorschrift bereitet haben: Es werden sechs Pfund gröblich zerstoßener chinesischer Rhabarberwurzel in 6 Gallonen Wasser, das mit 2½ Unze Schwefelsäure angesäuert ist, eine halbe Stunde hindurch gekocht. Nach Abseihung des Decocts wird der Rückstand auf gleiche Weise noch zweimal ausgekocht. Zu den vereinigten Abkochungen wird in kleinen Portionen frisch gepulverter Kalk (vielleicht besser Kalkhydrat, D.) unter beständigem Umrühren, um die Einwirkung auf die saure Abkochung zu befördern, hinzugethan. Sobald das Decoct leicht alkalisch wird, setzt sich ein rothes flockiges Präcipitat ab, das durch ein leinenes Tuch gesondert, getrocknet, und nachdem es gepulvert ist, mit 3 Gallonen Alkohol von 36 ° B., welcher das Rhabarberin auflöst, in einem Wasserbade einige Stunden hindurch digerirt wird. Der von dem Kalkpräcipitate abgesonderte und bis auf ¼ des Ganzen abgezogene Alkohol hinterläßt eine starke Auflösung des Rhabarberins, die mit Schwefelsäure bis zur Sättigung vermischt, langsam zur Trockenheit verdampft wird. Der Rückstand von braunrother Farbe, untermischt mit glänzenden Flocken, ist von einem stechenden, styptischen Geschmacke, löslich in Wasser, und vom Geruche der Rhabarberwurzel.

Dieses Präparat ist, wie behauptet wird, in concreter Form das wirksame Princip, dem die abführende Wirkung der Rhabarber zukommt, und das, abgeschieden von den holzigen und schleimigen Theilen, in demselben Verhältnisse zu der rohen Rhabarber steht, wie das Chinin zur Chinarinde. Diese Zubereitung würde eine gleichförmige Stärke haben, und könne mit Sicherheit neugebornen Kindern gereicht werden.

Kastner wünscht in einer Anmerkung, daß, um die Fracht und die Kosten zu ersparen, sich in Rußland und in Peru Einige fänden, welche schwefels. Rhabarberin, Chinin und Cinchonin u. s. w. fabrikmäßig bereiteten und in den Handel brächten; Aerzte und Apotheken würden dann nicht mehr Verfälschungen der Rhabarber, China u. s. w. zu fürchten haben, da man jenen Salzen keinen andern Körper unterschieben könne, ohne ihr bekanntes Verhalten abzuändern. Indessen müßten vorerst diese Versuche von Carpenter noch anderweitige Bestätigung erhalten, und selbst in diesem Falle würde wahrscheinlich die an auflöslichen Theilen reiche Rhabarber, deren Gesammtwirkung bekannt ist, nicht entbehrlich seyn, so wie ja selbst die eine so bedeutende Menge Holzfaser enthaltende Chinarinde durch die Chinaalkaloide, deren fiebervertreibende Wirksamkeit hinlänglich bestätigt worden, nicht entbehrlich geworden ist.

Vaudin (Geiger's Magazin 1826. August. S. 145.) glaubt die färbende Substanz der Rhabarber, die er Rhein nennt, dadurch dargestellt zu haben, daß er 1 Th. gepulverte Rhabarber mit 8 Th. Salpetersäure in einer Retorte erhitzte, zur Syrupsconsistenz verdampfte und mit Wasser ver-

dünnte, wodurch das Rheïn niedergeschlagen wurde. Diese Substanz wurde ausgewaschen, bis sie nicht mehr sauer reagirte, wo dieselbe dann trocken, gelb, schwach bitter schmeckend und in Wasser fast vollständig löslich war. Auf glühenden Kohlen verbrannte sie wie Zunder; Alkohol und Aether lösen sie leicht auf, die Lösung des ersten ist karmoisinroth, die des letzten safrangelb. Die Lösungen werden durch Säuren gelb, durch Alkalien rosenroth. Aether zieht aus der Rhabarber dieselbe Substanz aus, welche gleiche Eigenschaften zeigt, was beweisen soll, daß das färbende Princip der Rhabarber durch Salpetersäure nicht verändert werde. Die bekannten Einwirkungen der Salpetersäure aber auf organische Stoffe, mit welchen sie eine gelbe bittere Substanz bildet, unter dem Namen Welter's Bitter bekannt, lassen hier noch einige Zweifel übrig, welche durch das zunderartige Verbrennen dieser Substanz anf glühenden Kohlen nicht gehoben werden.

Die Rhapontik wurde so wie die Rhabarber von Hornemann zerlegt, und er fand in einer Unze folgende Bestandtheile: Rhabarberin nach Henry 10,50; Rhabarberstoff nach Pfaff 48,75; bitteres zusammenziehendes Extract 50; oxydirten Gerbestoff 4; Schleim 17; eigenthümliche Substanz (Rhaponticin) 5; Stärkemehl 70; aus der Faser durch Kalilauge ausgezogene Substanz 197; ungelösten Rückstand 41; beim Austrocknen der Wurzel gingen verloren 29; Verlust 7,75. = 480 Gran. Der Rückstand von 41 Gran gab verbrennt nur 4 Gran Asche, die aus Kali, Kalk, Thonerde und Talkerde bestand. Das Rhaponticin schlägt sich aus den zur Syrupsdicke eingedampften Abkochungen nach mehreren Tagen Hinstellen in der Kälte nieder. Dieser von der obenstehenden Flüssigkeit befreite und mit kaltem Wasser, zuletzt auch mit kaltem Weingeiste ausgewaschene Bodensatz löst sich in der Siedehitze in Weingeist auf, und wird bei der Verdünnung mit Wasser als ein gelbes schimmerndes Pulver ausgeschieden. Durch das Verdampfen des Weingeistes erhält man noch etwas Rhaponticin, aber es ist unreiner, und muß durch ferneres Lösen und Fällen gereinigt werden. Das Rhaponticin hat eine gelbe Farbe, glänzt wie Glimmer, hat eine schuppenförmige Gestalt, und scheint bei langsamen Verdunsten noch mehr eine krystallinische Gestalt, nämlich die einer vierseitigen Pyramide anzunehmen. Es ist geschmack- und geruchlos; in Aether, ätherischen und fetten Oelen, so wie in ätzenden Alkalien unlöslich; es löst sich aber in 240 Th. kochenden Wassers auf, und fällt beim Erkalten zum größten Theil daraus wieder nieder. Alkohol wirkt in der Kälte nur wenig darauf, im Sieden löst er es aber schnell, der absolute Alkohol die Hälfte seines Gewichts auf. Aus der geistigen Lösung scheidet sich beim Erkalten nichts aus.

So belehrend nun auch alle diese angeführten Versuche sind, so ist doch, wie mir scheint, weder der eigentlich wirksame Bestandtheil noch überhaupt die chemische Constitution der Rhabarber festgestellt worden, deren harzige und extractive Bestandtheile vielleicht in einem ähnlichen Verhältnisse sich befinden, wie es bei der Aloë zu seyn scheint. Wahrscheinlich ist auch das purgirende Princip verschieden von dem mehr tonischen und gelind zusammen-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0745-6

ziehenden, vielleicht daß auch die flüchtigen Theile zu den wirksamen gehören.

Die wirksamste Form der Rhabarber, welche magenstärkend, leicht abführend und wurmtreibend wirkt, ist wohl das Pulver. Dieses ist hellgelb, wird an der Luft dunkler, und muß nicht auf lange Zeit vorräthig gehalten werden, weil es bei sorgloser Aufbewahrung Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, an den riechenden Theilen und überhaupt an Wirksamkeit verliert. Aber auch im Aufgusse wird die Rhabarber sehr zweckmäßig gegeben, da sie viele im Wasser auflösliche Theile enthält; überdem geht sie in viele pharmaceutische Zubereitungen ein.

Rhododendron chrysanthum. Die Blätter. Sibirische Schneerosenblätter.

Rhododendron chrysanthum Pallas. Ein im östlichen Sibirien einheimischer Strauch.

Die länglichen, spitzigen, am Rande niedergebogenen Blätter, die jüngeren unterhalb rostfarbig, die ausgewachsenen unterhalb grün, von bitterm und zusammenziehendem Geschmacke.

Rhododendron chrysanthum Pallas. Die Sibirische Schneerose.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 3. Ericeae.

Dieser kleine, von unten auf sehr ästige, weitschweifig ausgebreitete Strauch wächst auf den waldlosen, höchsten und kältesten Gebirgen Tauriens und des östlichen Sibiriens, in Kamtschatka und auf der Behringsinsel. In den höheren Gegenden erreicht er kaum die Höhe eines Fußes, nur auf niedrigern Standorten findet man ihn anderthalb, seltener 2 Fuß hoch.

Der Stamm, welcher wie die Aeste mit aschfarbig brauner, glatter Rinde bedeckt ist, und seltner 2—3 Finger, gewöhnlich nur einen Zoll dick wird, wurzelt tief zwischen den Felsen. Das Holz ist weiß. Die zahlreichen mit rostfarbenen Schuppen bedeckten Aeste sind niederliegend und etwas getrennt, mit der blättrigen blumentragenden Spitze aus dem Moose hervorragend. Die wenigen immergrünen an den Enden der Zweige befindlichen kurzgestielten Blätter sind abwechselnd und zerstreut, eiförmig-länglich, etwas spitz, gegen den Grund zu verdünnt, oben dunkelgrün, netzförmig, sehr scharf anzufühlen, unten blässer oder etwas rostfarbig, mehr geglättet und ganzrandig, am Rande eingerollt, steif und lederartig. Die Blumenstielchen stehen zwischen diesen Schuppen an der Spitze der Aeste abwechselnd und so, daß sie eine Dolde bilden. Gewöhnlich findet man sechs oder weniger, zuweilen wohl zehn. Die großen, schönen nickenden Blumen haben einen kleinen fünfzahnigen Kelch; die einblättrige Blumenkrone ist gelb, glockenförmig ausgebreitet und fünftheilig; die drei obern Abschnitte sind gefleckt und gestreift, die zwei untern fleckenlos. Die Frucht ist eine filzige, fünfklappige, vielsaamige Kapsel. Die Blüthezeit ist Juni und Juli.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0746-2

Die Schneerosenblätter sind erst in neueren Zeiten officinell geworden, seitdem Gmelin und Pallas auf ihren Reisen durch Sibirien den Gebrauch derselben gegen Gliederschmerzen kennen lernten. Man erhält sie aus Rußland sammt spannenlangen, federkieldicken, getrockneten Zweigen und rothbraun wolligen Blüthenknospen. Sie besitzen einen schwachen, einigermaßen der Rhabarber ähnlichen Geruch, und schmecken bitter, herbe, zusammenziehend, und die jungen Zweige zugleich etwas scharf.

Bisweilen erhält man statt derselben die Blätter von Rhododendron maximum und Rh. ferrugineum. Ersteres ist in Sibirien, aber auch in Nordamerika zu Hause, wo es mit gleichem Erfolge angewandt wird; es hat eirunde, stumpfe, glänzende, gerippte, am Rande scharfe, zurückgebogene Blätter; die trichterförmigen Blumen haben eine sehr schöne hochrothe Farbe und werden deshalb, sowie das folgende, bei uns in Gärten gezogen. Rhododendron ferrugineum, auf den Gebirgen des nördlichen Frankreichs, Spaniens, der Schweiz und Sibiriens, auch auf den Alpen Oestreichs einheimisch, diesen Gebirgen zur großen Zierde gereichend, und unter dem Namen der Alpenrose bekannt, hat 2—3 Fuß hohe Stengel, welche graubraun, rund, krumm, rissig und knotig von den abgefallenen Blättern sind. Diese sind kurzgestielt, lancettförmig, lederartig hart, oben dunkelgrün glänzend, glatt und netzförmig geadert, am Rande etwas umgebogen. Anfangs pflegen sie auf beiden Seiten grün zu seyn, älter aber sind sie auf der untern Fläche mit schorfartigen, rostfarbigen und schwärzlichen Punkten bezeichnet, wovon die Pflanze den Namen führt, und wodurch sich diese Blätter hauptsächlich von denen der sibirischen Schneerose unterscheiden. Die Blumen des Rh. ferrugineum sind rosenfarbig. Auch diese Blätter sollen sehr wirksam und nach Orfila nicht minder giftig seyn, daher denn auch das Rhododendron ferrugineum besonders in den Preislisten der Kaufleute aufgeführt ist; doch erstreckt sich sein Gebrauch hauptsächlich auf die Berggegenden, in welchen der Strauch wild wächst.

Stolze (Berl. Jahrb. 1817. S. 145.) hat eine ausführliche Analyse geliefert.

Ein über die Blätter abgezogenes Wasser roch wie schwaches Kirschwasser, opalisirte ein wenig, es war aber durch kein Reagens irgend ein fremder Stoff, auch keine Blausäure zu entdecken. Die Abkochungen der Blätter, die in der Siedehitze braun und vollkommen durchsichtig waren, trübten sich beim Erkalten, und setzten eine braune pulverige Substanz ab, mit der sie zusammen zu einer starken Honigdicke abgeraucht wurden, wodurch ein schwarzbraunes Extract erhalten wurde, aus dessen Auflösung in vielem Wasser sich jener Stoff wieder ausschied, der hellbraun war, fade schmeckte, etwas an der Zunge klebte, und sich nach allen Reactionen wie eine Art von oxydirtem Extractivstoffe verhielt, der am leichtesten sich in Essigsäure auflöste. Die erhaltene Auflösung wurde wieder zur Honigdicke abgeraucht. Jetzt löste es sich klar in Wasser auf, aber durch Zusatz von Weingeist wurde abermals ein Antheil von jenem oxydirten Extractivstoffe

ausgeschieden. Durch neues Abrauchen zur Trockne wurde nur eine durchsichtige, schwarzbraune, leicht zerreibliche Substanz erhalten, welche die Feuchtigkeit der Luft mit Begierde anzog, einen bittern ekelhaft herben und zusammenziehenden Geschmack besaß, sich leicht in Wasser und wäßrigem Weingeist löste, aber in absolutem Weingeist und Aether unlöslich war. Die wäßrige Lösung röthete das Lackmuspapier, wurde nicht getrübt durch Galläpfeltinctur, salzs. Eisenoxyd und salzs. Zinn, wohl aber durch Salz- und Salpetersäure, welche in derselben hellbraune Niederschläge bildeten, die sich wie der oben erwähnte oxydirte Extractivstoff verhielten.

Aus dem Rückstande von den Abkochungen zog absoluter Alkohol grünes Wachsharz aus, das sich von dem gewöhnlichen nur durch seine Schwerlöslichkeit in reinen Alkalien unterschied.

Endlich wurde noch die Ausziehung durch eine verdünnte Aetzlauge veranstaltet, wodurch noch eine Quantität von Extractivstoff erhalten wurde, der aber nach dem Verf. wohl eher für ein Product als für ein Educt zu betrachten ist.

Vier Unzen hatten auf diese Art gegeben: oxydirten Extractivstoff 4 Drachmen 27 Gran; löslichen Extractivstoff 1 Unze 4 Dr. 2 Gr.; grüne Wachssubstanz 2 Dr. 5 Gr.; durch Kali ausgezogene extractartige Substanz 7 Dr. 10 Gr.; Faserstoff 6 Dr.; Verlust 16 Gran.

Aus der Menge der auflöslichen Theile und dem geringen Antheile Faserstoff ersieht man, daß zur Verordnung die Pulverform für die Schneerosenblätter eine sehr angemessene ist; auch die mit wäßrigem Weingeiste bereitete Tinctur enthält die wirksamen Theile.

Die Schneerose gehört zu den scharf narkotischen Mitteln. Der Aufguß, welcher mit einem Theeaufgusse Aehnlichkeit hat, greift den Kopf an, macht Schwindel, Betäubung, Berauschung, Schlaf, aber auch Ekel, Erbrechen, zuweilen vermehrten Abgang des Harns und Stuhlganges. Besonders merkwürdig sind die Schmerzen in den Gliedern, die davon entstehen, ein Gefühl wie von Nadelstichen, Ameisenlaufen u. s. w.

Rhoeas. Die Blumen. Klatschrosen. Feldmohnblumenblätter.

Papaver Rhoeas Linn. Eine einjährige, unter den Saaten in Deutschland sehr häufige Pflanze.

Große Blumenblätter, über einen Daumen breit lang, an dem Grunde verschmälert, etwas wellenförmig, purpurroth, von schleimigem Geschmacke und etwas narkotischem Geruche. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Papaver Rhoeas Linn. Der Klatschrosenmohn. Wilder oder rother Mohn. Feldmohn.

Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 2. Papaveraceae.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0748-3

Diese Pflanze wächst sehr häufig, fast durch ganz Europa als Unkraut auf Aeckern unter dem Getreide. In Gärten hält man ihn zur Zierde, und findet nicht selten sehr schöne Spielarten, mit sowohl einfachen als gefüllten Blumen von verschiedenen Farben.

Die weißliche Wurzel ist dünn, fast einfach und etwas zaserig. Der Stengel aufrecht, ästig, 1—1½ Fuß hoch. Die abwechselnden Blätter sind tief fiederspaltig, deren Lappen lang, unregelmäßig gezahnt und spitz. Die sehr großen lebhaft rothen Blumen stehen an der Spitze des Stengels und der Aeste einzeln auf langen rauhhaarigen Stielen. Der Kelch, welcher nur in der ungeöffneten Blume vorhanden ist, besteht aus 2 Blättchen, die nach außen gewölbt und steifhaarig sind; die Blumenkrone aus vier rundlichen, am Grunde verschmälerten, im Umfange ganzrandigen oder regelmäßig klein gekerbten Blumenblättern, die mit einem schwärzlichen Flecken bezeichnet sind. Die Frucht ist eine kugelrunde Kapsel, mit der sternförmigen, meist 10—12lappigen Narbe gekrönt, und enthält sehr viele kleine Saamen.

Der Klatschrosenmohn blüht im Juni und Juli.

Die officinellen Blumenblätter sind frisch etwas weich, gleichsam fettig anzufühlen, von widrigem Geruche, von fadem, schleimigem, etwas bitterlichem Geschmacke, und getrocknet von dunkelrother Farbe. Bei der Einsammlung werden sie bisweilen verwechselt mit den Blumenblättern des zweifelhaften wilden Mohns (Papaver dubium) und des Ackermohnes (Papaver Argemone). Eine Verwechslung mit den Blumen des ersteren ist wegen der großen Aehnlichkeit kaum zu vermeiden, und auch eben von keinem Nachtheil. Die Blumen des letztern aber sind viel kleiner und von schmutzig dunkelrother Farbe. Die Saamenkapsel ist bei diesem keulenförmig, und bei jenem länglich und borstig. Nach der Einsammlung müssen die Blumenblätter sehr dünn ausgebreitet, schnell getrocknet, und dann an einem trocknen Orte aufbewahrt werden, weil sie die Feuchtigkeit anziehen. Der unangenehme betäubende Geruch verliert sich größtentheils beim Trocknen.

Riffard (Buchn. Repert. XXIV. S. 459.) zog die Blumen mit Aether aus, wodurch ein gelbes butterartiges Oel erhalten wurde. Dann wurde Alkohol angewandt, und durch 12malige Digestion aller Farbestoff ausgezogen, welcher dunkelroth, an der Luft zerfließlich, in Wasser und in Säuren auflöslich war. Kochendes Wasser zog dann Gummi aus, und ließ die Pflanzenfaser zurück, welche eingeäschert kohlens. und schwefels. Kalk, Eisen, Bittererde und Kieselerde gab. 100 Th. Klatschrosenblumen enthielten: gelbes Fett 12; rothen Farbestoff 40; Gummi 20; Pflanzenfaser 28.

Die Klatschrosenblumen werden als reizmilderndes und beruhigendes Brustmittel im Aufgusse gebraucht, und kommen auch unter die sogenannten Species pectorales.

Nach Binder (Buchn. Repert. VII. S. 377.) werden in Würtemberg die rothen Weine, Essig u. s. w. mit diesen Blumen gefärbt.

Ribes rubrum. Die Beeren. Johannisbeeren.

Ribes rubrum Linn. Ein in den Gärten Deutschlands angebauter Strauch.

Kugelrunde, rothe glänzende Beeren, von mehreren nistenden Saamen und einem angenehmen sauren Safte strotzend.

Ribes rubrum Linn. Johannisbeeren.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 3. Nopaleae.

Der gemeine Johannisbeerstrauch, lange Zeit wild und unbekannt auf den Felsen der Alpen, ist erst seit einigen Jahrhunderten in unsern Gärten aufgenommen. Er wird 4—5 Fuß und drüber hoch, und erreicht in 10 Jahren seine Vollkommenheit. Die runden Zweige stehen aufrecht, sind sehr ästig, ohne Stacheln und mit brauner oder aschfarbiger Rinde bedeckt. Die Blätter sind gestielt, 3- oder 5lappig und an der Basis herzförmig ausgeschnitten. Die Blüthen bilden einfache, glatte, einzeln oder zu mehreren hängende Seitentrauben. Der Kelch ist einblättrig, halbfünfspaltig, die grüngelbe Blumenkrone fünfblättrig. Die Frucht besteht in einer kleinen runden, sehr saftigen, genabelten Beere von schön rother Farbe; sie ist einfächrig und enthält mehrere rundliche Saamen.

Man hat von diesem Strauche mehrere Varietäten, wovon die große holländische rothe und die große holländische weiße Johannisbeere die vorzüglichsten sind. Er blüht im April und Mai, und die Früchte reifen im Juni und Juli.

Die Beeren haben einen sauer-süßlichen Geschmack, und werden zur Bereitung des Johannisbeersyrups benutzt. Sie enthalten Aepfel- und Citronensäure beinahe in gleichem Verhältnisse, Zucker, vegetabilischen Eiweißstoff und rothen Farbestoff.

Ueber den gallertartigen Stoff, welchen John für identisch mit dem Bassorin hielt, Andere im Allgemeinen unter dem Namen der Pflanzengallerte begriffen, hat Guibourt (Schw. N. J. XIV. 2. 1825. S. 136.) Untersuchungen angestellt, aus denen hervorgeht, daß er eine Substanz eigenthümlicher Art sey. Wenn man den frisch ausgepreßten Johannisbeersaft untersucht, so bemerkt man darin eine unendliche Menge opaker faseriger Theilchen, welche aus Ueberresten des Markes, der Saamendecken und der Nabelschnur bestehen, mittelst welcher die Saamen am Fruchtboden befestigt waren. Durch diese Fasern wird der Saft eben nicht sehr consistent, weil ihr Volumen gegen das der Flüssigkeit nur sehr gering ist; bei der Maceration aber schwellen sie an, verwandeln sich fast gänzlich in einen sehr dicken, durchsichtigen Schleim, und die Flüssigkeit gerinnt zu einer gallertartigen Masse. Diese Erscheinung geht der Fermentation voraus, und ist unabhängig von letzterer. Wird der Saft nun aufs Filtrum gebracht, so läuft nur wenig Flüssigkeit hindurch, welche nochmals eine Gallerte bildet. Durch die Gährung

wird dieser Zustand aufgehoben und Alkohol gebildet, von dem schon eine sehr geringe Menge hinreicht, die Geleetheile zusammenzuziehen, und eine helle durchsichtige Flüssigkeit auszutreiben. Geschah beides vollkommen, so kann man aus dem getrennten Safte einen nicht gerinnenden Syrup bilden.

Guibourt stellte die Pflanzengallerte auf die Art dar, daß er das Gelee aus mäßig gegohrenem Johannisbeersafte mittelst eines Filters trennte, in Alkohol zerrührte, damit so lange auswusch, selbst aufwallen ließ, als noch etwas ausgezogen wurde, mit Wasser kochte und die Auflösung verdunstete. Er erhielt eine Substanz, welche etwas röthliche durchsichtige Schuppen bildete; beim Erhitzen in einer Glasröhre verkohlt sie sich, ohne zu schmelzen oder sich aufzublähen, und verbreitet dabei einen der brennenden Holzfaser gleichen Geruch. Die verdichtete Flüssigkeit röthet das Lackmuspapier, und entwickelt auf Zusatz von Aetzkali kein Ammoniak. In kaltem Wasser schwillt sie etwas auf und wird undurchsichtig, erhält aber nie ihren ursprünglichen Umfang und ihre Dichtigkeit. Von kaltem Wasser wird nur eine sehr geringe Menge aufgelöst; um eine concentrirte Auflösung zu erhalten, muß man die Substanz mit Wasser kochen. Nach einem Versuche Henry's liefert die mit Salpeter behandelte Gallerte der Johannisbeeren eine große Menge Kleesäure. Die Verschiedenheit dieser Substanz von der eigentlichen Gallerte veranlaßt Guibourt, derselben den Namen Grosselin (so wie man Bassorin sagt) beizulegen.

Auf den folgenden Seiten des citirten Journals beschreibt Braconnot die von ihm entdeckte pektische Säure (von πηκτὶς, Gerinnsel), für welche Meißner den passenden deutschen Namen Gallertsäure vorgeschlagen hat, und deren schon (Seite 26.) Erwähnung geschehen ist, und wenn nun auch Guibourt's Grosselin und Braconnot's pektische Säure nicht völlig identisch seyn sollten, so gehören sie doch, wie alle Pflanzengallerten, in eine Classe.

Ricinus. Das Oel. Ricinusöl.

Wird durchs Auspressen von den Saamen verschiedener Ricinusarten in Westindien bereitet.

Ein fettes, dickliches, weißes oder gelbliches Oel, in alkoholisirtem Weingeist auflöslich, geruchlos, von mildem nicht scharfem Geschmacke. Spec. Gew. = 0,954.

Ricinus communis Linn. Gemeiner Wunderbaum.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. V. Ord. 1. Euphorbiaceae.

Der gemeine Wunderbaum, welcher in seinem Vaterlande, den beiden Indien und Afrika, und in dem südlichen Europa eine Höhe von 20—30 Fuß erreicht, ist in unsern Gärten gezogen nur eine einjährige Pflanze, 6—8 Fuß hoch, die aber ihrer prachtvollen Haltung und schönen Form, und der Größe ihrer Blätter wegen sehr beliebt ist.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0751-8

Die Wurzel ist faserig, der Stengel krautartig, fast rund, glatt, hohl, weißgrünlich oder roth mit bläulichem oder eisengrauem Staube bedeckt und hat wenige abstehende Aeste. Die Blätter stehen abwechselnd, sind langgestielt, handförmig getheilt, mit 7—9 eirund-lancettförmigen, spitzen, doppelt gesägten, glatten und auf beiden Seiten grünen Abschnitten (woher der Name **Palma Christi**). Am Grunde jedes Blattes befindet sich ein fast stengelumfassendes, ovales, abfallendes Nebenblatt. Die Blüthen, denen die Blumenkrone fehlt, sind gewöhnlich einhäusig auf der nämlichen fast pyramidenförmigen Traube vereinigt, bisweilen in getrennten Aehren; die männlichen Blumen, in Gestalt goldgelber Quasten (die Staubbeutel) unten, die weiblichen (die Stempel) dunkelroth und pinselförmig über denselben. Aus diesen letztern bilden sich später dreifächerige, dreiklappige, mit stachlichen Punkten besetzte Kapseln, welche in jedem Fache einen länglich-eiförmigen, etwas flachgedrückten, glänzenden, grauen, und schön schwarzgefleckten Saamen enthalten, unter dessen Schale sich ein weißer, sehr öliger Kern von etwas scharfem Geschmacke befindet.

Die Pflanze blüht im Juli und August, auch wohl später; die Saamen werden bei uns nur in günstigen Sommern reif. Diese waren früher unter dem Namen Purgirkörner, Brechkörner (**Semen Cataputiae majoris s. Ricini vulgaris**) officinell. (Eine Analyse derselben von **Geiger** findet sich in Trommsd. N. J. II. 2. S. 173.). Jetzt werden sie nur noch benutzt, um durch Auspressen das Oel zu gewinnen, welches als Ricinus-, Castor- oder Palmöl bekannt ist, und von dem ein großer Theil jetzt auch im südlichen Frankreich bereitet wird. Frisch ausgepreßt ist es weißlich, trübe, dickflüssig, fast geruchlos, und von einem eignen süßlichen, hintennach etwas scharfen Geschmacke. Von der Ursache dieser Schärfe nahm man sonst fast allgemein an, daß sie in den Schalen enthalten sey; **Geiger** (Trommsd. N. J. II. 2. S. 173.) und **Pfaff** (System der Mat. med. VI. S. 138.) haben aber durch Versuche dargethan, daß diese Annahme unrichtig sey. Beide sind der Meinung, daß der Hauptgrund der Schärfe in dem Ranzigwerden der Saamen oder des Oeles zu suchen sey. Auch **Chalard** und **Henry** d. Sohn (Trommsd. N. J. X. 1. 1825. S. 162.) behaupten, auf ihre Versuche gestützt, daß weder die Keime noch die äußeren Schalen einen Stoff enthalten, welcher dem Oele einen scharfen Geschmack ertheilen könne, sondern daß dieser allein Folge der Bereitungsart mittelst der Wärme sey, durch welche in dem Oele eine Schärfe entwickelt werde, die in dem durch kaltes Auspressen erhaltenen Oele nicht vorhanden sey. Nicht nur werde gewöhnlich in den Colonien Wärme angewandt, sondern in einigen Gegenden Amerikas werden sogar die Saamen zuvor geröstet. Das gewöhnliche Verfahren ist nach ihnen folgendes: die zerstoßenen Saamen werden in einer großen Menge Wasser 5—6 Stunden gekocht, und das während dieser Zeit auf der Oberfläche des Wassers sich sammelnde Oel, welches einen milchigen Schaum bildet, abgeschöpft; hierauf nimmt man diesen Schaum, erhitzt ihn von neuem, um einen Theil der Feuchtigkeit abzudampfen. Hat sich der Schleim und

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0752-4

der größere Theil der fasrigen Substanz der Kerne verdickt, das Oel sich gut getrennt, so läßt man es durch ein dichtes Tuch laufen. Noch warm ist dieses Oel citronengelb, und so hell, daß man bis auf den Boden des Gefäßes sehen kann; sobald es aber erkaltet, trübt es sich, und gleicht nun in der Farbe dem undurchsichtigen Bernstein. Selbst durch nochmaliges Filtriren ist es unmöglich, es heller zu machen; man muß es deshalb abermals erhitzen, und diese letzte Operation hat zum Zwecke, die kleine Menge Schleim, die das Oel trübe macht, zu verdichten, und die übrige Feuchtigkeit abzudampfen, die es kräftig zurückhält. Gerade bei dieser letzten Operation kann das Oel am ersten eine Zersetzung erleiden, und wirklich muß der Zeitpunkt, wenn die letzte Feuchtigkeit verdampft ist, genau beobachtet werden; geschieht dies nicht, und fährt man mit dem Erhitzen fort, so färbt sich das Oel braun, und nimmt einen unangenehmen Geschmack an. Es ist demnach viel zweckmäßiger, das Oel ganz kalt zu pressen, und man scheint auch jetzt in den Colonien das frühere unzweckmäßige Verfahren aufgegeben zu haben, denn wir erhalten jetzt ein ganz mildes, reines und farbloses Oel im Handel.

Hr. Prof. Bernhardi (Trommsd. N. J. I. 2. S. 433.) hält gleichfalls unzweckmäßiges Verfahren bei Gewinnung des Oels und verdorbene Saamen für die Hauptursache der Schärfe in dem Ricinusöle.

Wenn nun auch durch dergleichen Ursachen eine Schärfe in dem Oele erzeugt werden kann, so ist doch nicht anzunehmen, daß die ranzige Beschaffenheit des Oels ihm purgirende Eigenschaften ertheilen könne, weil sonst auch andere Oele dieselben erhalten müßten. Wenn gleich ferner das Ricinusöl, welches selbst allein aus dem die reichste Ausbeute liefernden Eiweißkörper der frischen Saamen, mit Verwerfung der äußern Schale und der Keime (welche letztere Deyeux als mit der Schärfe begabt angesehen hat, die aber, wie die Versuche von Charlard und Henry gezeigt haben, durchaus keinen scharfen Stoff enthalten) bereitet worden, ganz mild zu seyn scheint, so bemerkt man doch bei größerer Aufmerksamkeit, daß es trotz seiner großen Reinheit einen leichten Reiz im Gaumen verursacht, der zwar kaum unangenehm zu nennen ist, aber doch mehr oder weniger Zeit erfodert, ehe er verschwindet. Dieser Reiz entsteht nicht sogleich, indem man das Oel auf die Zunge bringt, sondern erst einige Augenblicke hernach. Es ist daher wohl anzunehmen, daß der Geschmack, welchen man auch an dem reinsten Ricinusöle bemerkt, ihm unzertrennlich beiwohne und mit den Bestandtheilen des Oels verbunden sey.

Hr. Prof. Dierbach (Geiger's Magazin, März 1825. S. 217. und auch 33.) spricht in einer sehr lehrreichen Abhandlung, welche die verschiedenen Arten des Ricinusbaumes abhandelt, und der zwei Abbildungen von **Ricinus inermis Jacq.** und **R. undulatus Besser** beigegeben sind, die Meinung aus, daß das innere weiße Häutchen der Saamen dem ausgepreßten Oele den brennenden Geschmack ertheile, denn vom frischen Saamen losgetrennt erzeugte dieses Häutchen beim Kauen ein höchst lästiges Brennen, welches wohl eine Viertelstunde lang anhielt. Im trocknen Saamen schmeckte

aber das Häutchen nur sehr wenig scharf, und bei mehreren zeigte es sich ganz geschmacklos. Es sey also wahrscheinlich, daß im Ricinus eine flüchtige Schärfe enthalten ist, die sich durch das Trocknen verliert, und in warmen Jahrgängen sich reichlicher ausbilde, als in kühleren, weshalb das Oleum Ricini in einem warmen Jahrgange aus frischen Saamen bereitet viel wirksamer ausfallen müsse, da dieser Schärfe die purgirende Eigenschaft zuzuschreiben sey.

Die große Verschiedenheit in der Schärfe und den drastischen Eigenschaften bei dem amerikanischen Ricinusöle ist nach Dierbach darein zu setzen, daß die Saamen, aus welchen dieses Oel ausgepreßt wird, oft mit andern ähnlichen Saamen, als Jatropha Curcas, J. multifida ꝛc. verwechselt werden.

Nach allem diesen müssen wir es unentschieden lassen, ob die dem Ricinusöle eigenthümliche Schärfe (deren Vorhandenseyn schon durch die Pflanzenfamilie, zu welcher Ricinus gehört, wahrscheinlich wird) in irgend einem Theile der Saamenkerne abgesondert enthalten sey, oder ob dieselbe, wie wahrscheinlich ist, die im Saameneiweiße enthaltenen öligen Theile begleite. Eben so wenig können wir entscheiden, worin diese Schärfe bestehe. Planche fand, daß das über Ricinusöl abgezogene Wasser einen riechbaren unveränderlichen Stoff enthalte, welcher sich auch entwickelt, wenn Ricinussaamen mit Wasser aufgekocht werden, und ein besonderes Gefühl der Trockenheit im Rachen und Kehlkopfe erregt. Buchner fand, daß ranziges Ricinusöl mit gebrannter Magnesia und Wasser ½ Stunde lang gekocht seine Schärfe verlor; er vermuthet daher, daß der scharfe Bestandtheil der Saamen eine der Jatrophasäure ähnliche Säure sey, und daß überhaupt die gebrannte Magnesia ein vorzügliches Gegengift gegen alle drastisch wirkenden Saamen der Euphorbiaceen seyn werde.

Das Ricinusöl erstarrt erst bei einer künstlichen Kälte von 0 ° F., bleibt aber dabei durchsichtig mit Bernsteinfarbe, und nimmt bei + 26 ° F. wieder die vorige Consistenz und Farbe an. In absolutem Alkohol ist es sehr leicht auflöslich und in allen Verhältnissen damit mischbar. Da das Ricinusöl in dieser Auflöslichkeit in Alkohol die übrigen fetten Oele weit übertrifft, so kann ein anderes beigemischtes Oel auf diese Weise sehr leicht entdeckt werden, da durch ein solches in einem etwas bedeutenden Verhältnisse die Auflösung trübe gemacht wird. Die etwanigen Schleimtheile scheiden sich gleichfalls aus der geistigen Auflösung des Ricinusöls ab. Dieses ist auch in Schwefeläther sehr leicht auflöslich. Mit Aetzlauge mischt es sich unter allen fetten Oelen am leichtesten, die Auflösung wird erst milchig, nachher stellt sie ein grünliches Magma dar.

Nach Caventou kommt das Oleum Ricini mit Oleum Crotonis verfälscht vor.

Es wird als abführendes Mittel für sich zu 1 bis 2 Loth gegeben.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0754-6

Rosa incarnata. Die Blumen. Fleischfarbene Rosenblumenblätter.

Rosa centifolia Linn. Ein in Gärten häufiger Strauch.

Die blaß röthlichen Blumenblätter, von sehr angenehmen Geruche.

Rosa centifolia Linn. Die gemeine Gartenrose.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 5. Polygynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Das Vaterland dieser herrlichen Pflanze, die durch ganz Europa mit zahlreichen Spielarten die Gärten ziert, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Nach Guibourt stammt sie aus Persien, und hat z. B. auf dem Kaukasus, wo sie wild wächst, nur fünf Blumenblätter. Der strauchartige Stengel ist mit den aufrechten abstehenden Aesten 3—6 Fuß hoch.

Die Rinde der ältern und jüngern Zweige ist mit vielen stärkern und schwächern, fast geraden Stacheln bewaffnet, nur das ganz alte Holz ist unbewehrt. Die Blätter sind abstehend, ungleich gefiedert. Die Blattstiele sind mit röthlichen Drüsen besetzt, aber ohne Stachel, die Fiederblättchen, 5 oder 7, sind etwas gestielt, oval, am Rande gesägt und mit Drüsen versehen. Die Blumen stehen zu 2—3 auf zwei Zoll langen Blüthenstielen nickend an der Spitze der Zweige. Der Fruchtknoten ist oval, mehr oder weniger länglich. Von den eiförmigen, fein und lang zugespitzten Kelchblättchen sind drei am Rande mit linienförmigen Anhängen gefiedert. Alle diese Blüthentheile sind mit gestielten rothen Drüsen besetzt. Die Blume ist immer mehr oder weniger gefüllt, indem sich die Blumenblätter auf Kosten der Staubgefäße bilden, so daß die letzteren oft gänzlich verschwinden. Durch ihre angenehme blaßrothe Farbe sowohl, als durch ihren ausgezeichneten lieblichen Geruch, an dem sie alle nah verwandten Arten übertrifft, hat sie sich den Rang der Blumenkönigin erworben. Zu viele Cultur scheint jedoch ihren Geruch zu schwächen, und in Frankreich zieht man die Blumen der im freien Felde gezogenen Rosen vor. In Aegypten um Fajum findet man große Aecker, die nur mit Rosenstauden besetzt sind. Die Zeit ihrer Blüthe ist dann ein unbeschreiblicher Genuß für Gesicht und Geruch.

Der Geschmack der Rosenblumenblätter ist anfangs süßlich, hintennach aber bitterlich herbe. Statt dieser Art können auch die Blüthen von Rosa damascena und Rosa bifera, die sich häufig in unsern Gärten finden, gesammelt werden; Rosa turbinata aber kommt ihr an Wohlgeruche nicht gleich.

Man bewahrt die Rosenblumenblätter getrocknet oder auch eingesalzen auf. Die ersteren müssen, nachdem sie rasch in recht warmer Luft oder auf einem Darrofen getrocknet worden, durch Absieben von den vielen dabei befindlichen Insecteneiern gereinigt, und dieses Absieben muß von Zeit zu Zeit wiederholt werden, weil sonst die aus diesen Eiern in der Wärme ausschlüpfenden Insecten die Blätter zerfressen.

Beim Destilliren mit Wasser geben sie eine höchst geringe Menge eines ätherischen, den lieblichsten Rosengeruch verbreitenden Oels. Dieses schwimmt auf dem übergegangenen Rosenwasser unter Gestalt von weißlichgrauen Blättchen oder Häutchen, welche gesammelt und erwärmt zu einem dicklichen, in der Kälte wieder gerinnenden Oele zusammenfließen, wovon unsere Rosen jedoch nur eine äußerst geringe Menge geben. Unter den auszugsfähigen Theilen der Rosenblumenblätter verdient besonders das färbende Princip bemerkt zu werden. Es wird durch Wasser am vollkommensten ausgezogen, welches damit eine schön rothe Tinctur giebt. Die geistige Tinctur ist fast ohne Farbe. Durch die Schwefelsäure erhält die Farbe eine viel größere Intensität, und eine farblose geistige Tinctur der Rosen erhält durch den Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure sogleich eine schön rothe Farbe. Schweflige Säure zerstört dagegen diese Farbe, die durch die vollkommene Schwefelsäure, welche die schweflige Säure austreibt, wieder hergestellt wird. Daß die rothe Farbe der Rosen nicht, wie Clarke behauptet hat, vom Eisen herrühre, geht daraus hervor, daß Gay-Lussac in den weißen Rosen mehr Eisen fand als in den rothen, was auch Cartier (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 42.), der die Blumenblätter der **Rosa gallica** untersuchte, bestätigt hat. Cartier hält das färbende Princip der Rosen für grün, welches erst durch eine Säure geröthet sey. Doch konnte er dasselbe nicht isolirt darstellen. (Vergl. **Malva sylvestris.** Die Blumen.)

Diese Rosenblumenblätter werden größtentheils benutzt zur Bereitung des bekannten Rosenwassers, welches nicht allein in der Heilkunde Anwendung findet, sondern auch als Luxusartikel vorzüglich im Morgenlande sehr beliebt ist, so daß es nebst Roseneſſenz und Rosenzucker in bedeutenden Quantitäten aus Kairo ausgeführt wird. Auch Gazypor, ein Ort in der Provinz Bahar am Ganges, ist durch seine Bereitung des Rosenwassers berühmt, von welchem bedeutende Vorräthe nach allen Theilen von Indien gesandt werden. Als gelind adstringirendes Mittel geben die Rosenblätter mit Wasser ausgezogen und mit Honig versetzt den officinellen Rosenhonig.

Rosa rubra. Die Blumen. Rothe Rosenblumenblätter. Essigrosen. Damascener Rosen.

Rosa gallica Linn. Ein im mittägigen Frankreich einheimischer, bei uns in Gärten angebauter Strauch.

Die bräunlichrothen Blumenblätter von adstringirendem Geschmacke.

Classe und Ordnung wie bei der vorigen.

Diese Rose ist in Frankreich und den übrigen südlichen Ländern Europas zu Hause. Sie bildet mit ihren aufrecht abstehenden Aesten einen buschigen, 2—3 Fuß hohen Strauch. Die jungen Zweige sind mit zahlreichen dünnen und kurzen röthlichen Stacheln besetzt; das alte Holz ist fast unbe-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0756-7

wehrt. Die Blätter stehen abwechselnd auf ziemlich langen runden, mit vielen rothen Drüsen und einzelnen kleinen Stacheln bekleideten Blattstielen, und bestehen aus 5, oder in der Nähe der Blüthen aus 3 elliptischen spitzen am Rande scharf gesägten Fiederblättchen. Der Mittelnerve und die Sägezähne der Blätter, die 2—2½ Zoll langen Blüthenstiele, die eirunden Fruchtknoten und die Kelchabschnitte sind mit gestielten braunrothen Drüsen besetzt. Die Blumen sind groß und bestehen aus fünf, oder durch Füllung aus mehreren, verkehrt eiförmigen, an der Spitze etwas abgerundeten purpurrothen Blumenblättern mit gelben Nägeln.

In unsern Gärten wird diese Rose mehr der schönen Farbe, als des Geruches wegen angebaut, wo sie im Juni und Juli blüht.

Diese Rosenblumenblätter sind adstringirender, als die vorigen. Getrocknet müssen sie eine dunkle, sammtartige Purpurfarbe, einen recht angenehmen Geruch und stark zusammenziehenden Geschmack haben. Der wäßrige Auszug röthet die Lackmustinctur, und giebt mit schwefelsaurem Eisen, Leimauflösung, Alkohol, salpeters. Queckſilber, Kalkwasser und kleef. Ammoniak reichliche Niederschläge. Cartier (Trommsd. N. J. VI. 2. S. 42.) erschöpfte die Blätter zuerst durch Wasser, und zog dann mit Alkohol aus, welcher eine gelbgrünliche fettartige Substanz aufnahm von angenehmen Rosengeruche, die sich zum Theil verflüchtigen ließ (ein Balsamharz mit ätherischem Rosenöle verbunden.).

Als Bestandtheile werden angegeben: eine fette Materie; ein wesentliches Oel; Galläpfelsäure; eine färbende Materie; Gerbestoff; Eiweiß; Gummi; auflösliche Salze, kohlens., phosphors. und salzs. Kali; unauflösliche Salze, kohlens. und phosphors. Kalk; Kieselerde, Eisenoxyd. Auf das Daseyn der Gallussäure schließt Cartier nur aus dem schön schwarzen Niederschlage, den das schwefels. Eisen im Auszuge hervorbringt, der aber eben sowohl durch den Gerbestoff hervorgebracht worden seyn konnte, dessen Daseyn der sehr zusammenziehende Geschmack des kastanienbraunen Extractes, und der starke Niederschlag mit der Leimauflösung außer Zweifel setzt.

Aus den frischen Blumenblättern der Essigrose wird die Rosenconserve, aus den getrockneten die säuerliche Rosentinctur bereitet.

Die bei uns in Hecken und Gebüschen sehr gewöhnliche Hundsrose (**Rosa canina Linn.**) ist ihrer Früchte wegen, der Hahnebutten, beliebt. Dieses sind die stehenbleibenden Kelche, deren Wände dicker, fleischig und dunkelroth werden; im Innern sind die wahren Früchte: beinharte, vieleckige, mit sehr steifen Haaren besetzte Akenien, die in eine Spitze endigen. Nach den Untersuchungen von Bilz (Trommsd. N. J. VIII. 1. S. 63. und Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 197.) enthalten die Hahnebutten: eine beträchtliche Menge Schleimzucker und Gummi; fettes Oel; Gerbestoff; Myricin; Harz von doppelter Art; Citronensäure; Aepfelsäure; Faser; Pflanzenleim; einen Eisen grünenden und bräunenden Stoff: Spuren von ätherischem Oele und einige Salze.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0757-3

* Rosa. Das Oel. Rosenöl.

Ein Destillat aus den Blumenblättern der Rosa moschata Linn., eines orientalischen kleinen Strauches, im Orient bereitet.

Ein ätherisches gelblichweißes Oel, bei einer Temperatur von 8 ° in eine weiße undurchsichtige Masse übergehend, von einem sehr starken äußerst lieblichen Geruche.

Nach Porlier wird in Ostindien das Rosenöl, welches dort Attar genannt wird, auf folgende Weise bereitet. Die Rosen noch mit ihren Kelchen werden mit Wasser in einem Destillirgefäße übergossen, und die Hälfte desselben abgezogen. Dieses wird auf frische Rosen gegossen und hiervon wieder die Hälfte abgezogen. Dieses Wasser wird nun in Schüsseln gegossen, eine Nacht hindurch der kühlen Luft ausgesetzt, worauf man des Morgens das Rosenöl geronnen und auf dem Wasser schwimmend findet. 80 Pfund Rosen sollen 1½ Quentchen Oel geben.

Donald Monro berichtet, daß auch das Rosenöl ohne alle Destillation gewonnen werde, indem man ein weites hölzernes Faß mit gut ausgelesenen Rosenblättern füllt, so viel reines Quellwasser darauf gießt, daß sie bedeckt werden, das Faß beim Sonnenaufgang an die Sonne stellt, es bis zum Abend stehen läßt, und solchergestalt 6—7 Tage nach einander verfährt, wo schon nach dem dritten Tage eine Menge von Theilchen einer schönen gelben öligen Materie sich schwimmend zeigen, die sich in den folgenden Tagen zu einem Schaume versammeln, welcher das wesentliche Rosenöl ist, das man mit Baumwolle abnimmt.

Auch in Persien soll eine große Menge Rosenöl bereitet werden.

Das Rosenöl läßt sich, wie das Aniséöl, in zwei Arten von Oel trennen, in ein bei der mittleren Temperatur festes und in ein flüssiges Oel. Ersteres ist in der Kälte in Alkohol nicht auflöslich, erfodert auch eine etwas höhere Temperatur zum Schmelzen, als das gewöhnliche Rosenöl. Es krystallisirt beim Erkalten in glänzenden, weißen und durchsichtigen Blättchen von der Consistenz des Bienenwachses.

Rosmarinus. Das Kraut. Rosmarinkraut.

Rosmarinus officinalis Linn. Ein Strauch des mittägigen Europas.

Sehr kurzgestielte, linienförmige, spitzige, runzlige, am Rande zurückgebogene, gewürzhafte, scharfe Blätter.

Rosmarinus officinalis Linn. Der ächte Rosmarin.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Rosmarinstrauch wächst wild in den südlichen Gegenden Europas,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0758-9

als in Spanien, Italien, Istrien, im südlichen Frankreich, in der Schweiz, und im Orient. In unsern Gegenden hält er während des Winters nicht aus, und muß in Gewächshäusern unterhalten werden.

Der holzige, aufrechte, sehr ästige Stengel erreicht eine Höhe von 3—4 Fuß und drüber. Die immergrünen Blätter sind gegenüberstehend, stiellos, etwas hart, dick, glatt, schmal, gleich breit, lancettförmig, stumpf, am Rande etwas umgeschlagen, oben von dunkelgrüner Farbe und in der Mitte gefurcht; auf der untern Seite aber in der Mitte gerippt und weißlich-filzig. Die blaß violettbläulichen Blumen stehen zur Seite in den Blattwinkeln dicht bei einander und traubenförmig. Der einblättrige Kelch ist zweilippig; die Blumenkrone einblättrig, rachenförmig mit zweitheiliger Ober- und zurückgebogener dreispaltiger Unterlippe.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli.

Die Blätter haben einen starken, balsamischen, erquickenden Geruch und einen feurigen bitterlichen, campherartigen Geruch. Bei den auch noch hin und wieder gebräuchlichen Blumen ist der Geruch und Geschmack ebenfalls campherartig, stark durchdringend und gewürzhaft; der Kelch, als der vorzüglich wirksame Theil, ist mit einzusammeln. Die Blätter und die Blumenkelche vorzüglich enthalten ein ätherisches Oel; ein Pfund Blätter giebt oft mehr als ein Quentchen Oel. Der wäßrige Aufguß der Blätter ist dunkelbraun, aber wenig aromatisch und nur bitterlich von Geschmacke. Die geistige Tinctur ist gelbgrün, von dem eigenthümlichen Rosmaringeruche und einem balsamischen und ziemlich bittern Geschmacke.

Der Rosmarin wird meistentheils nur äußerlich als ein zertheilendes, belebendes, reizendes Mittel zu Umschlägen mit andern aromatischen Kräutern zusammen gebraucht, geht als solches in die Species aromaticas ein, und dient auch zur Bereitung des Spiritus und Unguentum Rorismarini ꝛc.

Rosmarinus. Das Oel. Rosmarinöl.

Ein Destillat aus dem blühenden Kraute.

Ein ätherisches grünlich-weißliches, stark riechendes Oel. Spec. = 0,905.

Das Rosmarinöl wird vorzüglich in Spanien, in der Provinz Murcia, aus dem blühenden Kraute im Großen bereitet. Es ist sehr dünn und leicht, so daß, wenn von demselben die Hälfte abdestillirt wird, das spec. Gew. bis auf = 0,8886 sinkt; es ist fast farblos, von einem nicht unangenehmen, in der Menge jedoch etwas auffallend schweren Geruche und einem campherartigen Geschmacke. Eine Verfälschung desselben mit Terpenthinöl ist leicht durch den Geruch, besonders in der Wärme, und durch Vergleichung mit ächtem Oele zu erkennen.

Durch Verdunsten setzt dieses Oel nach Proust $\frac{1}{10}$ wirklichen Camphers ab, wenigstens dasjenige, welches in den heißen Ländern, wie in Spanien, bereitet und der Luft ausgesetzt wird. Auch wenn das Oel über ätzen-

des Kali oder ungelöschten Kalk destillirt wird, setzt sich im Retortenhalse Campher ab. Die concentrirte Schwefelsäure verwandelt es in eine schöne braunrothe balsamartige Masse, die mit Wasser vermischt eine dicke Milch bildet, welche auf der Oberfläche etwas gelbliches und dickliches Oel absetzt, und beim Filtriren wasserhell abläuft. Mit rauchender Salpetersäure prasselt es stark auf, und verwandelt sich in einen braunrothen Balsam von dem Geruche des Oels. Unter allen ätherischen Oelen fast äußert das Rosmarinöl die stärksten auflösenden Kräfte, z. B. auf Kopal, Kautschuck ꝛc. 100 Th. Alkohol von 0,837 spec. Gew. lösen nur 2½ Th. Oel auf. Nach Saussure besteht es aus: Kohlenstoff 82,21; Wasserstoff 9,42; Sauerstoff 7,73 und Stickstoff 0,64.

Rubia. Die Wurzel. Färberröthe. Krappwurzel.

Rubia tinctorum Linn. Eine ausdauernde, im Orient einheimische, in Europa häufig angebaute Pflanze.

Die walzenförmige, dünne, ästige Wurzel, außen röthlichbraun, innen mit dunkel gelbrother Rinde, blässerem Holze und einer bisweilen vom Marke eintretenden hohlen Mitte, den Speichel rothfärbend. Im Herbste einzusammeln.

Rubia tinctorum Linn. Die Färberröthe.
Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XI. Ord. 2. Rubiaceae.

Diese auch im südlichen Europa einheimische Pflanze wächst vorzüglich im mittägigen Frankreich, in der Schweiz, in Italien u. s. w., auch in einigen Gegenden Deutschlands, als Steiermark, Kärnthen. In Frankreich, Deutschland, England und mehrern andern Ländern Europas baut man sie der Wurzeln wegen, welche ein wichtiges Farbematerial liefern, unter dem Namen Krapp häufig auf Feldern an.

Die ausdauernde, kriechende, sehr lange Wurzel treibt mehrere vierkantige, ästige, 3—4 Fuß und drüber lange, liegende Stengel, welche schwach und knotig sind. Die Aeste sind abwechselnd; die Blätter aufsitzend, lancettförmig, und stehen gewöhnlich zu sechs sternförmig um die Gelenke des Stengels. Die Blumen sind klein, gelblich, und stehen auf Stielen straußförmig zur Seite und am Ende der Zweige.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli.

Die officinelle Wurzel ist federkieldick, knotig, geruchlos und von einem zusammenziehenden, bitterlichen Geschmacke; sie färbt den Speichel, das Wasser, den Weingeist, die ätherischen Oele und selbst die Knochen der damit gefütterten Thiere roth. Die holzigen, angefressenen, schimmligen, schwärzlichen oder schwarzgefleckten Wurzeln sind verwerflich. Je röther die Wurzeln, desto vorzüglicher.

Bucholz (Taschenbuch 1811. S. 50.) fand in 2000 Th. lufttrockner

Färberröthe: Wasser 240; süßen braunrothen, ins Gelbbraune fallenden Extractivstoff 780; rothbraunen gummigen Stoff 180; beißenden Extractivstoff 12; rothes schmieriges Harz oder Balsam 24; eigenthümliche rothbraune Materie, die in Aether, Weingeist, den Oelen, in Aetzkalilauge, aber nicht in Wasser löslich ist, 33; eine Verbindung von einer Pflanzensäure, wahrscheinlich Weinsteinsäure, mit Kalk und Farbestoff 36; ein Gemenge aus der schon genannten eigenthümlichen rothbraunen, und einer eigenthümlichen, bloß in Aetzkalilauge auflöslichen Materie 92; Wurzelfasern, die noch etwas gefärbt waren, 450; Verlust 148. S. = 2000.

Nach John (Chemische Schrift. IV. S. 94.) enthalten 100 Th.: süße gelblichbraune extractivstoffartige Substanz 20,00; ins Ponceau fallende eigenthümliche Substanz, welche mit den Harzen viel Aehnlichkeit hat (Pseudo-Alkannin), 3,00; bräunlichen modificirten Schleim 8,00; modificirten sogenannten unauflöslichen Extractivstoff mit kleinen Portionen obiger Substanzen zum Theil verbunden 5,00; rothbraunes wachsartiges Fett, ungefähr 1,00; in der Hitze zerstörbares saures Salz, wahrscheinlich eine dreifache Verbindung von Kali, Kalk mit prädominirender Weinsteinsäure, ungefähr 8,00; phosphors. Kali, schwefels. Kali und salzs. Kali, ungefähr 2,00; phosphors. Kalk mit Bittererde 7,50; Eisenoxyd (mit Phosphorsäure?) ungefähr 0,50; Kieselerde 1,50; holzigen Theil der Wurzelgefäße 43,50.

Nach Döbereiner (Schw. J. XXVI. S. 268. und Trommsd. J. XXIV. S. 269.) enthält der Krapp zwei verschiedene Pigmente: ein saures gerbestoffartiges von blaurother Farbe, und ein basisches rosenrothes. Vermischt man einen Absud des Krapps mit einer Auflösung von Bleizucker, so wird das erste Pigment in Verbindung mit Bleioxyd gefällt und letzteres bleibt aufgelöst. Oder: behandelt man den Krapp so lange mit kaltem Wasser, bis dieses sich nicht mehr färbt, und übergießt man ihn nachher mit einer Auflösung von Alaun in Wasser, so wird im erstern Falle das saure Pigment, und im letztern das basische rosenrothe aufgelöst, und man kann dann dieses mit Kalkwasser fällen, und in der größten Schönheit darstellen. Außer diesen Pigmenten enthält der Krapp noch andere Substanzen, besonders aber viel Schleim und Zucker. Rührt man ihn mit Wasser an und vermischt die Flüssigkeit mit etwas Ferment (Hefen), so erfolgt bald eine lebhafte Gährung, welche mehrere Tage lang dauert; der schleimige Zustand des Gemenges verschwindet, es wird eine große Menge Alkohol gebildet, ohne daß eins der Pigmente zerstört wird, und man kann den gebildeten Krappwein auf Branntwein und die rückständige Wurzel zur Darstellung des schönsten adrianopolischen Roths oder des Krapplacks benutzen.

Kuhlmann's Analyse (Buchn. Repert. XVII. 1. S. 120.; Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 133.; Hänle's Magazin, März, 1824. S. 275.; Trommsd. N. J. VIII. 2. S. 111.), bei welcher die früheren Analysen gar nicht berücksichtigt worden sind, giebt folgende Bestandtheile an: rothen Farbestoff; gelben Farbestoff; Holzfaser; Pflanzensäure; Schleim; thierisch-vegetabilische Materie; Gummi; Zucker; bittere Materie; riechendes Harz; sal-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0761-4

zige Substanzen in der Asche, nämlich basisches kohlens. Kali 0,118; schwefels. Kali 0,032; phosphors. Kali 0,037; salzs. Kali 0,703; kohlens. Kalk 0,467; phosphors. Kalk 0,082; Kieselerde 0,020; Verlust 0,031. S. = 1,490, von 20 Grammen Färberröthe nämlich, die in einem Platintiegel eingeäschert worden waren.

Robiquet und Colin (Buchn. Repert. XXIV. S. 455; Geiger's Magazin 1826. October. S. 61.) haben aus der Färberröthe einen eigenthümlichen Stoff ausgeschieden, den sie Alizarin nennen, von Alizari, einem im Handel gebräuchlichen Ausdrucke, um die ganze Färberröthewurzel zu bezeichnen. Die gemahlene Wurzel der Färberröthe wurde mit 3—4 Theilen kalten Wassers angerührt, und nach 10 Minuten das breiartige Gemenge ausgepreßt und colirt. Die durchgeseihte Flüssigkeit wurde bald gelecartig; dieselbe wurde auf ein Filter gebracht, und als sie so weit abgetropft hatte, daß sie etwa halbtrocken war, wurde sie wiederholt mit siedendem absolutem Alkohol behandelt, bis dieser sich nicht mehr roth färbte. Die alkoholischen Flüssigkeiten wurden filtrirt und ¾ abdestillirt. Zu dem Rückstande wurde etwas Schwefelsäure gesetzt, wodurch sich ein Niederschlag erzeugte, der sich leicht wieder auflöste. Diese Flüssigkeit wurde nun mit destillirtem Wasser verdünnt, wodurch gelbe Flocken abgesondert wurden, welche gesammelt und mit Wasser ausgewaschen wurden. Beim Trocknen nahmen sie eine dunklere Farbe an, in mäßiger Hitze entwickelten sich gelbe Dämpfe, und ein Geruch nach erwärmtem Fette. Das (schwefelsaure?) Alizarin sammelte sich in nadelförmigen, durchsichtigen, strahlenartig gruppirten Krystallen, die eine rothe Farbe hatten, ähnlich der des natürlichen chromsauren Bleies.

Das reine Alizarin erscheint in gelblichrothen Krystallen, ist geschmack- und geruchlos, und läßt sich leicht sublimiren. In kaltem Wasser löst es sich wenig, mehr in kochendem Wasser, dem es eine rothe Farbe ertheilt. Vom Alkohol und Aether wird es in allen Verhältnissen gelöst, ersterer wird schön rosenroth, letzterer schön goldgelb gefärbt, Leinöl löst es ebenfalls. Alkalien lösen es sehr leicht; diese Auflösungen sind bei hinlänglicher Concentration violett oder auch blau, und nehmen bei der Verdünnung mit Wasser eine aus dem Violetten ins Rothe gehende Farbe an. Setzt man zu der wäßrigen Lösung des Alizarins etwas Alaunauflösung und fügt dann einige Tropfen Kalilösung hinzu, so schlägt sich ein schöner rosenfarbener Lack nieder.

Die vorhin erwähnte Eigenschaft der Krappwurzel, die Knochen der damit gefütterten Thiere roth zu färben, hat die Wurzel in den Ruf eines großen Heilmittels in Knochenkrankheiten, als Knochenfraß, Rhachitis, gebracht; sie soll aber die Knochen nicht bloß roth, sondern auch mürbe machen. Auch die abgesonderten Flüssigkeiten, Harn, Milch und Schweiß, werden bei fortgesetztem innern Gebrauche der Abkochungen roth gefärbt; Bänder, Knorpel und Beinhaut bleiben ungefärbt.

Häufiger ist der Gebrauch dieser Wurzel als Farbemittel. Zu diesem Behufe wird sie, nachdem sie geschält und getrocknet worden, zermahlen oder gestoßen, und bekommt dann den Namen Krapp oder Röthe. An der Luft

büßt sie viel von ihrer färbenden Kraft ein. Nach Verhältniß der Röthe wird der Krapp mehr oder weniger geschätzt. Auf Baumwolle erzeugt man mit diesem Farbematerial das schöne sogenannte türkische Roth; auch ist es gelungen, diese Farbe auf Wolle haften zu machen.

Rubus fruticosus. Die Beeren. Brombeeren.

Rubus fruticosus Linn. Ein in den Wäldern Europas häufiger Strauch.

Die frischen zusammengesetzten, schwarzen, mit einem tief purpurrothen, säuerlichen Safte erfüllten Beeren.

Rubus fruticosus Linn. Strauchartige Brombeere.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 5. Polygynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Dieser Strauch wächst in Wäldern und an Gräben, wird auch in Gärten gehalten.

Die ziemlich starken Stengel sind eckig, sehr zähe, nicht sehr ästig, kriechend, und so wie die Aeste und Blattstiele mit Stacheln besetzt; die blühenden Zweige stehen aufrecht. Die Stacheln sind sämmtlich hakenförmig gebogen. Die gefiederten Blätter des unfruchtbaren und die untern des fruchtbaren Stengels sind aus 5, die obern des fruchtbaren Stengels aus 3 Blättchen, die eirund doppelt sägeartig sind und Blattstiele haben, zusammengesetzt. Oben sind sie grün und glänzend, unten weißhaarig. Die Blattansätze sind borstenartig. Die Blumen sind weiß, bisweilen röthlich. Die Frucht, Brombeere, Kratzelbeere ist schwarzblau, mit blauem Reife bedeckt und wohlschmeckend. Der in diesen befindliche dunkelrothe säuerliche Saft enthält die gewöhnlichen Pflanzensäuren, Aepfelsäure, Citronensäure u. s. w.

Rubus Idaeus. Die Beeren. Himbeeren.

Rubus Idaeus Linn. Ein in Deutschland einheimischer in Gärten gezogener Strauch.

Die frischen zusammengesetzten, rothen Beeren, mit einem etwas säuerlichen Safte, von sehr angenehmen Geruche.

Rubus Idaeus Linn. Die gemeine Himbeere.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 5. Polygynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Der Himbeerstrauch findet sich durch ganz Deutschland, und wächst überhaupt durch ganz Europa in steinigen, felsigen Gegenden, in großen Wäldern, in Gebüschen, Hecken u. s. w. Seiner wohlschmeckenden Früchte wegen wird er häufig in Gärten gezogen, wo er sich durch Cultur veredeln und ohne Mühe durch die stark wuchernden Wurzeln vermehren läßt.

Die kriechende, ästige Wurzel treibt mehrere schwache, aufrechte, runde,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0763-6

weißbräunliche, 3—4 Fuß hohe, und mit sehr kleinen, geraden, zerstreuten Stacheln versehene Stengel. Die jüngeren Zweige sind weißgrünlich und rund. Die langgestielten abwechselnden Blätter sind ungleichförmig. Die rinnenförmigen sehr fein weißfilzigen Blattstiele haben hie und da kleine Stacheln. Die untern Blätter bestehen meistens aus fünf kurzgestielten, eiförmigen, länglichen, spitzigen, oben grünen und glatten, unten weißlichen und an den Rändern scharf gesägten Blättchen; die obern sind dreizählig und die Afterblättchen pfriemenförmig. Die weißen Blumen stehen an den Spitzen und Seiten der Zweige zu 4—5 auf weißlich-filzigen, mit kleinen Stacheln versehenen und wenig ästigen Stielen. Der einblättrige bleibende Kelch hat fünf längliche abstehende Einschnitte. Die Krone besteht aus fünf rundlichen, aufrecht-abstehenden Blumenblättern, die so lang sind als der Kelch. Die Frucht, eine zusammengesetzte Beere, ist rundlich, fast halb kugelförmig, oben erhaben, unten ausgehöhlt, von rother Farbe, und mit kleinen weißen Haaren besetzt. Sie besteht aus vielen auf einem glatten konischen Fruchtboden befestigten, kleinen länglichen Saamen, wovon jeder mit einem weichen saftigen Marke umgeben ist, und die durch ihre Vereinigung die Beere bilden.

Die Blüthezeit ist Mai bis Juli; die Beeren reifen vom Juni bis September.

In unsern Gärten findet man eine Varietät mit weißen oder gelben Beeren.

Zum Arzneigebrauche sind die Früchte der wildwachsenden den in Gärten gezogenen vorzuziehen. Sie enthalten beinahe gleich viel Aepfel- und Citronensäure, dabei viel Zuckerstoff, Pflanzengallerte ꝛc., und werden zur Bereitung des Himbeersaftes und Essigs gebraucht.

Ruta. Das Kraut. Raute. Gartenraute.

Ruta graveolens Linn. Ein Strauch des südlichen Europas, bei uns in Gärten gezogen.

Ein bitterlich-scharfes, stark riechendes Kraut, von grünlich-bläulicher Farbe, mit vielfach zusammengesetzten Blättern, die letzten Einschnitte keilförmig, drüsig. Im Mai und Juni einzusammeln.

Ruta graveolens Linn. Gemeine Raute.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 20. Rutaceae.

Die gemeine Raute wächst als ein kleiner niedriger Strauch in Nordafrika, Alexandrien, Mauritanien, im südlichen Europa, als Spanien, Frankreich, Italien, in der Schweiz, Krain und Griechenland, auf Bergen und felsigen, unfruchtbaren Gegenden. Bei uns wird sie in Gärten gezogen. Sie liebt einen trocknen etwas sandigen Boden.

Die holzige und faserige Wurzel treibt einen strauchartigen, aufrechten, harten, cylindrischen, 2—3 Fuß hohen, grünlichen oder aschfarbigen Sten-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0764-1

gel, welcher sich in viele Aeste ausbreitet. Die Blätter sind zerstreut, vielfach zusammengesetzt, von blaugrüner oder graugrüner Farbe. Die mehr oder weniger getheilten oder gespaltenen, keilförmigen, kleinen, rundlichen, stumpfen Blättchen derselben sind auf beiden Seiten glatt, ein wenig dick, laufen am Grunde, vorzüglich die Endblättchen, etwas zusammen, und werden daselbst schmaler, so daß der mittlere Lappen der Endblättchen beinahe herzförmig ist. Die Blüthen bilden am Ende der Zweige Blumenbüschel, sind gestielt und grüngelb von Farbe. Der Kelch ist einblättrig, kurz, fünfspaltig. Die Blumenkrone besteht aus 4—5 eiförmigen Blumenblättern. Die Frucht ist eine rundliche höckerige Kapsel, aus 4—5 Fächern und Klappen bestehend, mit vielen kleinen schwärzlichen Saamen.

Die Blüthezeit ist Juni bis August.

Das Kraut, welches, ehe die Blumen hervorbrechen, eingesammelt wird, besitzt einen eigenthümlichen, starken, balsamischen, für viele Personen sehr unangenehmen und widerlichen Geruch, der von dem ätherischen Oele herrührt, welches in zahlreichen, in allen Theilen des Gewächses vorhandenen Drüsen abgesondert wird. Der Geschmack ist bitter, scharf, etwas gewürzhaft. Diese Eigenschaften zeigen sich bei der wildwachsenden Pflanze stärker, als bei der in Gärten gezogenen. Durchs Trocknen werden sie sehr verändert. Das ätherische Oel, welches durch Destillation aus dem Kraute erhalten werden kann, soll in den Saamen reichlicher als in den übrigen Theilen enthalten seyn.

Nach einer Analyse von Mähl (Trommsd. J. XX. 2. S. 29.) enthält die Wein- oder Gartenraute folgende Bestandtheile: ein flüchtiges, gelblichgrünes Oel, von weniger unangenehmen Geruche als das Kraut, und etwas scharfem Geschmacke; Eiweißstoff; grünes Wachsharz; Extractivstoff; freie Aepfelsäure; thierische durch Galläpfeltinctur gefällte Substanz; schwarzgraues Gummi; eigenthümliches Stärkemehl und Faser.

Um einen kräftigen Auszug aus der Raute zu bereiten, wendet man am besten den Wein an. Durch Ausziehen mit Essig wird der Rautenessig bereitet.

Sabadilla. Der Saame. Sabadillsaamen.

Veratrum Sabadilla Retzii. Eine perennirende chinesische Pflanze.

Längliche, runde, spitzige, braunschwarze Saamen, sehr oft in der häutigen gelblichen Kapsel, von denen drei an einander sitzen, eingeschlossen, von sehr scharfem, ekelerregendem Geschmacke.

Veratrum Sabadilla Retzii. Sabadillgermer. Ungeziefergermer.
Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 1. Monoecia.
Juss. Cl. III. Ord. 6. Colchiceae.

Diese Pflanze wächst nach Déscourtilz (Botanische Zeitung Nr. 32. August 1825.) in Menge in Mexiko, und fast an allen den Küsten, welche

dem mexikanischen Meerbusen nahe liegen. (Willdenow hat demnach mit Unrecht China als das Vaterland dieser Pflanze angegeben.) Descourtilz fand sie auf den Antillen in feuchten Hölzern, welche den Fuß der Gebirge umgeben, jedoch in geringer Menge.

Die Pflanze ist krautartig und erhebt sich zu einer Höhe von 3—4 Fuß; der einfache walzenförmige Stengel ist an den Enden schwach gefurcht. Die zahlreichen Blätter stehen sämmtlich, und zwar rosettenförmig, an der Wurzel und aufrecht auf dem am Grunde scheidigen Blattstiele. Sie sind wegbreitähnlich, eiförmig-länglich, am Blattstiele herablaufend, an den Enden stumpf, mit 8—14 einfachen, von dem Grunde des Blattes abstehenden und nach der Spitze zu sich verlierenden, halbcirkelförmigen Nerven versehen. Die Farbe der Blätter ist ein mattes Grün. Unten sind sie graugrün, auf der Oberfläche schwach glänzend. Der Blüthenstengel bildet eine ausgebreitete, einfache (?), bisweilen ästige Rispe. Die zahlreichen Blüthen sind herabgebogen, fast hängend, und werden von sehr kurzen, zu 2—3 vereinigten Stielen getragen. Von den Blüthen sind einige Zwitter, andere männlich, von tief purpurschwärzlicher Farbe. Die Frucht besteht aus drei Kapseln, welche ihrer Gestalt nach den Früchten der Delphinien ähnlich sind. Sie öffnen sich an der Spitze von innen, und aus der Naht entspringen feine Fäden oder Mutterkuchen. Diese dienen den Saamen zur Anheftung, welche zu drei in jeder Klappe dachziegelartig über einander stehen. Der Saame ist gebogen, an einem Ende stumpf, rußschwarz punktirt, von anfangs fadem, bald darauf bitterm, endlich scharfem und ekelerregendem Geschmacke.

Die Indianer, welche mit den Saamen Handel treiben, sind bemüht, das Erkennen der Pflanze zu verhüten, machen deshalb die Rispen durch Zerreiben unkenntlich, und bewirken durch ein schwaches Dörren, daß die Saamen die Keimkraft verlieren.

Was wir im Handel als Sabadillsaamen erhalten, ist ein Gemenge von Saamenkapseln, theils ohne, theils mit noch darin sitzenden Saamen, und von losen Saamen und Blumenstielen. Die Saamenkapseln haben eine bräunlich strohgelbe Farbe; die Saamen sind an einem Ende stumpf, an dem andern zugespitzt, auf der einen Seite ziemlich platt, auf der andern bauchig, scharfrandig, etwas zusammengedrückt und runzlig, auswendig dunkelbraun, inwendig weiß. Sie sind ohne merklichen Geruch, haben aber einen äußerst scharfen, widrigen, bittern, lange anhaltenden Geschmack, und hinterlassen lange eine Trockenheit im Halse.

Meißner (Trommsd. N. J. V. 1. S. 3.; Schw. XXV. S. 337.) hat diese Saamen zerlegt. Er digerirte den mehrere Tage in einem mäßig warmen Sandbade ausgetrockneten und dann gröblich zerstoßenen Saamen mit Aether und erhielt ein gelbliches oben auf schwimmendes Oel, mit etwas talgartiger Materie, und ein fast braunes Harz von einem scharfen, auf der Zunge ein bleibendes Brennen verursachenden Geschmacke, welcher nicht von einem Alkaloid herrührte, da er ihm nicht durch verdünnte Schwefelsäure entzogen werden konnte. Der Saamenrückstand wurde mit absolutem Alkohol

ausgezogen, der beim Erkalten Myricin fallen ließ, und nach dem Abrauchen ein Extract gab, welches durch Schwefeläther und Wasser weiter zerlegt wurde in Extractivstoff mit Pflanzensäure, süßen und gummigen Extractivstoff, Hartharz, scharfes Harz, fettes Oel und Sabadillin. Die Pflanzensäure gab mit den Eisenoxydauflösungen eine grüne Trübung, nach einiger Zeit einen graugrünen Niederschlag. M. hält dieselbe für eine eigenthümliche Säure. Der Saamenrückstand wurde nun ausgekocht. Während des Abrauchens entwickelte sich ein unangenehmer Geruch, und ein pulveriger grauer Bodensatz schied sich ab, der aus kleesaurer Bittererde bestand, welche beim Niederfallen etwas eines traganthähnlichen Stoffes sich verbunden hatte. Das Extract wurde mit Weingeist von 75 Procent behandelt, welcher ein saures pflanzensaures Kali, dessen Säure wahrscheinlich mit der obigen identisch war, salzsaures Kali und eine thierisch-vegetabilische Materie (Phyteumakolla) aufnahm; das Unaufgelöste war der gummige Extractivstoff mit schwefelsaurem, salzsaurem und andern kalischen Salzen verbunden. Hierauf wurde mit Aetzlauge gekocht, wodurch Extractivstoff aufgelöst wurde, und Pflanzenfaser im Rückstande blieb, welcher eingeäschert wurde.

Hiernach bestehen 500 Th. Sabadillsaamen aus: fettem Oele 121,0000; talgartigem fetten Stoffe 2,1250; Sabadillin 2,8801; Myricin 0,5000; Hartharz 42,1250; scharfem Harze 7,2768; Extractivstoffe mit Pflanzensäure verbunden 29,8431; gummigem Extractivstoffe 24,6250; süßem Extractivstoffe 3,2500; Extractivstoffe durch Aetzkalilauge ausgezogen 120,6900; Phyteumakolla mit saurem pflanzensaurem und salzsaurem Kali 5,5625; kleesaurer Bittererde mit Traganthstoff 5,3125; Pflanzenfaser 102,8100; Feuchtigkeit 30,000. Die Asche enthielt: kohlensauren und phosphorsauren Kalk, Thonerde, Eisenoxyd und Kupferoxyd.

Auch von den französischen Chemikern Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. V. 2. S. 93.; Schw. J. XXXI. S. 175.) ist dieser Saame zerlegt, und von ihnen dabei derselbe Weg eingeschlagen worden. Durch die Digestion mit Aether erhielten sie eine gelbe, fette und schmierige Materie, die das Lackmus stark röthete, und einen starken und besondern Geruch hatte. Sie wurde daher mit Kali verseift, die Seife durch Weinsteinsäure zersetzt, und der Destillation unterworfen, wodurch eine wäßrige, sauer und stark riechende Flüssigkeit erhalten wurde. Sie wurde mit Barytwasser versetzt, und dann die neue Säure durch Phosphorsäure und Sublimation mit wenigem Wasser abgeschieden. Sie hat dann die Gestalt schön weißer Nadeln, ist in Wasser auflöslich, daher man sie oft nur in liquider Form erhält, schmilzt bei einer Temperatur von 20 °, sublimirt in einer wenig höheren Temperatur, ist auflöslich in Alkohol und Aether, und hat einen Geruch, der viel Aehnlichkeit mit der Buttersäure hat. Mit den Basen bildet sie Salze, die etwas Geruch haben; ihre Verbindung mit Ammoniak schlägt die Eisenoxydsalze weiß nieder. Die Verf. nennen diese Säure Sabadillsäure (Acide cévadique). Die durch Aether ausgezogene fette Materie bestand demnach aus Stearine, Elaïne und einer riechenden Säure; die fernere Zerlegung wies noch gelben Farbestoff und Sabadillin nach.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0767-9

Hierauf wurde mit Alkohol digerirt, der auch hier beim Erkalten Wachs fallen ließ. Das geistige Extract wurde mit Wasser ausgezogen, wobei noch etwas fette Substanz auf dem Filter blieb. Die wäßrige Auflösung ließ beim Verdunsten einen orangengelben Farbestoff fallen, der durch Alkalien sehr dunkel wurde, durch Säuren hingegen fast gänzlich seine Farbe verlor. Die noch sehr gefärbte Flüssigkeit wurde mit essigs. Blei gefällt. Die klar filtrirte Flüssigkeit wurde nach Abscheidung des überschüssig zugesetzten Bleies durch Schwefelwasserstoffgas mit Magnesia gekocht, diese getrocknet und mit Alkohol ausgezogen, wodurch das Delphinin (Sabadillin, Veratrin) erhalten wurde. Aus dem gelben Bleiniederschlage, durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt, wurde die eigentliche Sabadillsäure erhalten, welche nach den Verfassern die Eigenschaften der Gallussäure (?) zeigte, woher sie annahmen, daß das Alkaloid in dem Saamen als galläpfels. Salz enthalten sey.

Nach der Behandlung des Saamenrückstandes mit Wasser blieb Holziges zurück.

Die Verf. schieden demnach aus den Sabadillsaamen: fette Materie, zusammengesetzt aus Elaïne, Stearine und Sabadillsäure; Wachs; saure gallussaure (?) Veratrine; gelben Farbestoff; Gummi und Holziges. Die Asche war zusammengesetzt aus: kohlens. Kali und Kalke, phosphors. Kali, salzs. Kali und Kiesel.

Das Veratrin, Sabadillin, ist demnach als der wirksame Bestandtheil des Sabadillsaamens, der weißen Nieswurzel und der Zeitlose (daher auch Colchicin) anzusehen. Es ist weiß und pulverig, hat keinen Geruch, erregt aber, in Substanz auf die Nasenhäute gebracht, heftiges und gefährliches Niesen. In sehr kleiner Gabe bringt es durch Reizung der Schleimhäute das heftigste Erbrechen hervor. Diese Reizung verbreitet sich über die Eingeweide, wenn die Gabe etwas stärker ist, und einige Grane können den Tod herbeiführen. In Wasser ist es sehr wenig auflöslich, kochendes löst $\frac{1}{1000}$ auf, und bekommt eine merkliche Schärfe. In Alkohol ist es äußerst auflöslich, auch in Aether, aber nicht in so großer Menge. Bei 50 ° schmilzt es zu einer dem geschmolzenen Wachse ähnlichen Flüssigkeit, welche beim Erkalten zu einer durchscheinenden gelben Masse erstarrt. Im offnen Feuer wird es zersetzt, giebt Wasser, viel brenzliges Oel und hinterläßt eine aufgeblähte Kohle. Mit Kupferoxyd geglüht giebt es kein Stickgas. Nach Dumas und Pelletier (Berl. Jahrb. XXVI. 1. S. 118.) aber besteht es aus Kohlenstoff 66,75; Stickstoff 5,04; Wasserstoff 8,54, Sauerstoff 19,60. Es macht geröthetes Lackmuspapier wieder blau, sättigt die Säuren und bildet mit ihnen unkrystallisirbare Salze, die beim Abdampfen gummiartige Massen darstellen. Hat man eine Säure durch überschüssiges Sabadillin neutralisirt und versetzt die Lösung mit Wasser, so wird die Flüssigkeit wieder sauer (durch Fällung von Sabadillin?). Diese Eigenschaft macht die Erforschung der Salze fast unmöglich. Das schwefels. Sabadillin besteht aus Sabadillin 93,723 und Schwefelsäure 6,277; das salzs. aus Sabadillin 95,8606 und Salzsäure 4,1394. Durch Salpetersäure wird es in eine gelbe verpuffende Materie verwandelt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0768-4

Pfaff nennt das Sabadillin, wegen der heftig reizenden Einwirkung, das weiße Arsenik des Pflanzenreichs, denn auch schon nach dem Einstreuen des gepulverten Sabadillsaamens oder der weißen Nieswurz auf offene Stellen, z. B. bei einem ausgeschlagenem Kopfe, habe man schon Raserei, ja den Tod erfolgen sehen. Die Anwendung des Sabadillsaamens erfodert daher stets große Vorsicht, und wenn er äußerlich gegen Läuse angewendet werden soll, so dürfen keine offenen Stellen auf dem Kopfe seyn.

Das Pulver verliert mit der Zeit an Wirksamkeit, muß daher nicht auf lange vorräthig gehalten werden.

Sabina. Das Kraut. Sadebaum.

Juniperus Sabina Linn. Ein immergrüner Strauch des südlichen Europas, bei uns in Gärten gezogen.

Die Spitzen der Aeste, mit gedrängten, nicht abstehenden Aestchen, gegenüberstehenden oder dreifachen sehr kurzen, spitzigen, aufrechten, herablaufenden Blättern, von scharfem Geschmacke und sehr strengem Geruche. Im Frühlinge einzusammeln.

Juniperus Sabina Linn. Sadewachholder. Sadebaum.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 13. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Coniferae.

Der Sadebaum wächst in Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, der Schweiz, Krain, Kärnthen, Salzburg, Sibirien, der Tartarei und in den Morgenländern auf Bergen, wird aber bei uns in Gärten gezogen, wo er an schattigen Orten sehr gut gedeiht.

Der Stengel ist strauchartig, schief aufsteigend und sehr ästig. Zuweilen wird dieser Strauch baumartig, und erhebt sich aus geradem Stamme zu einer Höhe von 8—10 Fuß. Die Aeste sind zahlreich, gegenüberstehend, aufsteigend, schlank und sehr biegsam, die Rinde der jüngern Zweige ist lichtgrün, die des Stammes und der Aeste rauh, aschgrau, etwas röthlich, sowie auch das Holz. Die sehr kleinen, lancettförmigen, oval zugespitzten Blättchen sind glatt und dunkelgrün. Die Blüthen sind zweihäusig. Die männlichen Blüthen bilden gelbliche, kurze, stiellose Kätzchen, von demselben Baue und der nämlichen Einrichtung, wie die des gemeinen Wachholders. Dasselbe gilt von den weiblichen Blüthen, welche sich an den Seiten der jüngsten Zweige befinden und hakenförmig zurückgebogen sind. Die unter sich und seitwärts hängenden Beeren sind rundlich, bläulichschwarz, kleiner als die des gemeinen Wachholders und enthalten gewöhnlich drei Saamen.

Der Sadebaum blüht im April und seine Früchte reifen im Herbste des zweiten Jahres.

Man sammelt im April die Spitzen der Aeste mit den Blättern. Sie haben einen äußerst starken, widrigen, etwas betäubenden, eigenthümlichen Geruch, und einen harzigbittern, scharfen Geschmack.

Durch Destillation mit Wasser wird ein ätherisches Oel gewonnen; ein Pfund frisches Krout giebt anderthalb Quentchen Oel. Der wäßrige Aufguß ist gelbbräunlich, wird durch schwefelsaures Eisen dunkel olivengrün, hat den Geruch der Blätter und einen bitterlichen Geschmack. Die geistige Tinctur hat eine dunkelgrüne Farbe, und einen bitterlich scharfen harzigen Geschmack.

Die Sabina regt mächtig die Blutgefäße auf, so daß das Blut sich einen Ausgang zu verschaffen sucht. Es bedarf daher beim innerlichen Gebrauche sowohl in Pulverform als im Aufgusse großer Vorsicht. Auch äußerlich ist der Sadebaum ein kräftiges Heilmittel, und wird vorzüglich zu Bädern gebraucht.

Saccharum. Zucker.

Wird aus dem Safte von Saccharum officinarum Linn., einer zwischen den Wendekreisen häufig angebauten Pflanze, bereitet.

Ein krystallinisches, weißes, zerreibliches, süßes Derbes, in der Hälfte Wasser und in heißem Alkohol auflöslich. Arten hiervon sind: der weißeste Zucker (Saccharum albissimum), gemeiniglich Raffinade genannt, mehr rein, und der weiße Zucker (Saccharum album), gemeiniglich Melis genannt, weniger rein.

Saccharum officinarum Linn. Das Zuckerrohr.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. II. Ord. 7. Gramineae.

Dieses herrliche Gras ist ursprünglich an den Ufern des Euphrats und in Ostindien einheimisch, wird aber seit langer Zeit schon in beiden Indien in großer Menge cultivirt.

Die perennirende faserige Wurzel bildet dicht verschlungene Rasen, aus denen sich mehrere starke, runde, gelenkige Halme erheben. Die Dicke derselben beträgt 1 bis 2 Zoll im Durchmesser, ihre Höhe 8, 10 bis 12 Fuß, je nachdem der Boden, in dem sie gepflanzt werden, günstiger oder ungünstiger für sie ist. Diese Halme sind mit einem lockern, zelligen, saftigen Marke erfüllt, und mit einer dichten, festen, glatten und glänzenden Epidermis bekleidet. Die Farbe ist in den verschiedenen Spielarten verschieden, bald grün, bald gelb, bald violett, oder gelb und violett gestreift. Die Blätter, die mit ihrer Basis den Halm scheidenartig umfassen, stehen zweireihig, werden 4—5 Fuß lang, sind schmal und schneidend. Die Blüthen bilden eine sehr große, ästige, ausgebreitete, pyramidalische, aus unzähligen kleinen Blüthen bestehende Rispe, die sich aus der Spitze des Halmes auf einem nackten, glatten, ungefähr 5 Fuß hohen Blüthenstiele erhebt (wie bei unsern Schilfarten). An dem untern Theile des Halms fallen die Blätter bald ab; dann erscheinen hier an den Gelenken Knospen, die von der Anlage zur Verästelung zeigen. Dieser nackte untere Theil des Zuckerrohrs ist es zugleich, in dem sich der Zuckerstoff vorzugsweise ausbildet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0770-4

Das Zuckerrohr verlangt einen sehr heißen Himmelsstrich; je näher es der gemäßigten Zone kommt, desto weniger zuckerhaltig wird dasselbe, und wenn es über den 40 ° hinausgeht, so kann es nicht mehr zur Ausscheidung des Zuckers gebracht werden. Eine merkwürdige Abart des Zuckerrohrs hat der französische Weltumsegler von Bougainville von Otaheite nach den Antillen gebracht, welche größer, stärker ist, der Kälte besser widersteht, und eine viel größere Menge Zucker giebt. Es würde sich dieses Zuckerrohr vielleicht im südlichen Europa anpflanzen und im Großen bauen lassen.

Das Zuckerrohr ist aber nicht die einzige Pflanze, welche Zucker enthält, wiewohl keine andere hinsichtlich des Ertrages mit ihm in Vergleich kommen kann. Am reichhaltigsten nach dem Zuckerrohr ist der Zuckerahorn (Acer saccharinum Linn.), ein in den großen Wäldern von Nordamerika einheimischer Baum, und die Wurzeln der Runkelrübe (Beta vulgaris Linn.), von welchen auch jetzt noch eine nicht unbedeutende Menge Zucker in französischen Fabriken gewonnen wird. Auch die Stengel des Mays oder türkischen Korns (Zea Mays Linn.) enthalten Zucker, der aber mit sehr vielem Schleim verbunden ist. Außerdem findet er sich noch in vielen Gräsern, Wurzeln, in den Früchten und besonders in den Trauben, doch ist dieser Zucker vom Rohrzucker etwas verschieden.

Der Zucker scheint schon seit sehr alten Zeiten bei den Einwohnern von Indien und China bekannt gewesen zu seyn; in Europa wurde er es aber wahrscheinlich erst durch die Eroberungen Alexanders des Großen. Mehrere Jahrhunderte hindurch war sein Gebrauch hier auf die Medicin eingeschränkt; doch vermehrte sich der Bedarf allmälig und nach den Zeiten der Kreuzzüge brachten ihn die Venetianer aus dem Morgenlande, verführten ihn nach den nördlichen Ländern von Europa, und trieben damit einen sehr einträglichen Handel. Der Anbau des Zuckerrohrs dehnte sich dadurch mehr nach den Grenzen Europas aus, nach Arabien, Syrien und Aegypten; ja auch in Sicilien und Italien, ja sogar in der Provence wurde es angepflanzt; doch waren die zuweilen strengen Winter dem Anbau hinderlich. Im Jahr 1420 wurde es auf die damals von den Portugiesen eben entdeckte Insel Madera angepflanzt und es ging von da nach den canarischen Inseln, nach St. Thomas und endlich auf die neue Welt über. Im Jahr 1506 wurde es nämlich auf Hispaniola (dem heutigen Hayti) angepflanzt, und es vervielfältigte sich daselbst mit so erstaunlicher Schnelligkeit, daß es im Jahr 1518 28 Zuckersiedereien auf der Insel gab, und daß man behauptete, die prächtigen von Karl V. in Madrid und Toledo gebauten Paläste wären allein von dem Ertrage der auf Hispaniola gelegten Auflagen bezahlt worden. Jetzt ist das Zuckerrohr in ganz Westindien naturalisirt worden.

Um den Zucker aus dem Zuckerrohre zu gewinnen, wird dieses, bevor es zur Blüthe kommt, abgeschnitten. Der obere Theil des Stengels, der weit weniger zuckerhaltig ist, als der übrige Theil, wird vor der Ernte abgeschnitten und als Steckling benutzt; das übrige Rohr wird zur Zeit der Ernte nahe bei der Erde abgeschnitten, in Bündel zusammengebunden, und

auf die Mühle gebracht, welche so eingerichtet ist, daß das Zuckerrohr zwischen 2 großen eisernen Walzen gequetscht und der ausgepreßte Saft aufgefangen wird. Das ausgepreßte Zuckermehl (Bagasse) wird getrocknet und als Brennmaterial verwandt. Den Saft (Vesou) läßt man etwas sich abklären, dann wird er mit etwas Kalkmilch vermischt und erhitzt, jedoch nicht bis zum Kochen. Der Schaum wird mit einem breiten Schaumlöffel weggenommen, die Flüssigkeit in einen zweiten Kessel geleitet, und hier mit Kalkwasser gekocht, wobei sie sich noch weiter klärt. Dann läßt man sie in einen dritten Kessel laufen, setzt wieder frisches Kalkwasser zu, wenn es noch nöthig scheint. Wenn der Saft vollkommen helle und bis zur Consistenz des gewöhnlichen Syrups eingekocht ist, so bringt man ihn in den letzten Kessel, wo er bis zum Krystallisationspunkt eingekocht wird. Er wird dann in hölzerne Fässer vertheilt, welche auf dem Boden einige mit den Stielen der Palmblätter verstopfte Löcher haben, welche man nach geschehener Krystallisation öffnet, um den flüssigen Zucker (Melasse) abtropfen zu lassen. Der krystallisirte Theil wird unter dem Namen roher Zucker oder Moscovade (Moscowatum) nach Europa gebracht. Hier wird aus diesem in den Raffinerien der weiße Zucker gewonnen und zwar dadurch, daß man den rohen Zucker mit klarem Kalkwasser zusammenbringt, und das Ganze gelind erhitzt. Der sich bildende Schaum wird abgeschöpft, und die Flüssigkeit mit verdünntem Rindsblute vermengt, hierauf bis zum Kochen erhitzt, abgeschäumt, und mit dem Zusetzen von Rindsblut und dem Abschäumen fortgefahren, bis dieselbe vollkommen klar geworden ist. Der geklärte Saft, der jetzt sehr häufig noch mit thierischer Kohle gesotten worden, wird in einen andern Kessel geleitet, und endlich zur Krystallisation eingekocht, d. h. bis er körnig zu werden scheint. Dann wird er in irdene Gefäße, die eine kegelförmige Figur haben, und deren mit einer Oeffnung versehene Spitze nach unten gekehrt ist, gegossen, wo er binnen 24 Stunden gerinnt. Dann wird der Pfropf aus der damit verschlossenen Oeffnung herausgezogen, um den Syrup auslaufen zu lassen, und der nach oben gerichtete breitere Theil der Form wird mit einer angefeuchteten magern Thon- oder der sogenannten Zuckererde bedeckt. Dieser Thon entläßt allmälig sein Wasser, welches die ganze Zuckermasse gleichmäßig durchdringt, und den noch darin enthaltenen Syrup auflöst, welches Verfahren zu verschiedenen Malen wiederholt wird. Wird die Auflösung des gereinigten Zuckers einer regelmäßigen Krystallisation (in großen, mit Fäden durchzogenen Kasten) überlassen, so schießt er in großen vierseitigen Säulen mit zweiseitigen Endspitzen an, die nach dem Grade ihrer Reinheit mehr oder weniger weiß oder gelblich, oder braun, und mehr oder weniger durchsichtig sind, und den weißen oder braunen Zuckerkand, Candiszucker (Saccharum candum s. cantum) geben.

Der Hutzucker, welcher aus einer mehr concentrirten Auflösung durch unregelmäßige Krystallisation gewonnen wird, besteht aus lauter zusammengehäuften Körnern, und ist, je vollkommner er raffinirt ist, desto mehr weiß, trocken, fest, klingend und etwas durchscheinend, und nach dem Grade dieser

Eigenschaften erhält er die gebräuchlichen Benennungen: Raffinade, fein Melis, Melis u. s. w.

Der Zucker ist in Wasser vollkommen und leicht auflöslich; in absolutem Alkohol ist er fast unauflöslich. Nur, wenn er nicht vollkommen raffinirt ist, in welchem Falle er auch in feuchter Luft nicht trocken bleibt, wirkt er auf Lackmuspapier wie eine schwache Säure, und macht die bis zur Wasserklarheit verdünnte Auflösung des salpeters. oder salzs. Eisens gelblichgrün. Eine Verunreinigung des Zuckers mit Kalktheilchen entdeckt man durch einen merklichen Niederschlag, welchen die Kleesäure in der Auflösung des Zuckers hervorbringt, oder auch dadurch, daß man den gepulverten Zucker mit einem gleichen Gewichte gepulvertem Salmiak zusammenreibt, und gelind erwärmt, wo der etwa vorhandene Kalk das Ammoniak aus dem Salmiak frei machen wird. Eine sehr schädliche Verunreinigung ist vor einiger Zeit in Frankreich entdeckt worden; man fand nämlich, daß die bläuliche Farbe, durch welche sich eine Sorte Zucker auszeichnete, von einem Zusatz blauer Smalte herrühre, wodurch mehrere üble Zufälle entstanden waren, da alle Smalte außer dem Kobaltoxyde auch Arsenik enthält. Ueberhaupt kann die Leichtigkeit, mit welcher der Zucker sich mit mehreren Erden und Metalloxyden verbindet, und damit leicht auflösliche Gemische oder Verbindungen giebt, Verunreinigungen herbeiführen. In Ure's Handwörterbuch (Weimarsche Ausgabe S. 1006.) auch in Schw. N. J. V. S. 457., finden sich Versuche von Ramsay, nach welchen in Wasser aufgelöster Zucker sein halbes Gewicht Kalk aufzulösen vermag. Die Auflösung hat eine schöne weiße Weinfarbe und den Geruch nach frischgelöschtem Kalke; sie wird durch alle Säuren und deren Salze, auch durch die Kohlensäure zersetzt. Gleiche Gewichte von Zucker und Strontian lösen sich in siedendem Wasser auf; während des Erkaltens schießen Krystalle an, die an der Luft Kohlensäure anziehen und verwittern. Die Auflösung der Talkerde in Syrup hat wie die vorigen Auflösungen eine reine weiße Farbe, zeigt im Geruche und Geschmacke nichts Abweichendes von reinem Zucker, nur scheint die Süßigkeit noch gewonnen zu haben, und für den Gaumen lieblicher und angenehmer geworden zu seyn. Von der Alaunerde im frisch gefällten Zustande wird durch eine Zuckerauflösung nur sehr wenig aufgelöst. Schon Scheele hatte die Bemerkung gemacht, daß Zucker (und auch Honig) einer Auflösung des Kali in Weingeist beigemischt das Kali daraus fällt, und sich damit in Form eines Schleimes niederschlägt. Berzelius (Trommsd. N. J. I. 1. S. 212.) setzte eine Auflösung von gewöhnlichem Zucker mit Bleioxyd in Digestion. Anfangs wurde das Oxyd aufgelöst, als aber die Digestion eine Zeitlang war fortgesetzt worden, verwandelte es sich in ein leichtes weißes Pulver, welches die ganze Flüssigkeit undurchsichtig machte. Dieses Pulver ist eine Verbindung von Zucker und Bleioxyd, die im Wasser unauflöslich ist, gleichfalls durch alle Säuren, auch die Kohlensäure, zerlegt wird, und in essigsaurem Blei auflöslich ist. Sie besteht aus 41,74 Zucker und 58,26 Bleioxyd. Wenn man dieses Pulver mit

Zuckerauflösung digerirt, so löst sich ein Theil auf, welcher eine helle bleihaltige Flüssigkeit mit schwacher gelber Farbe bildet.

Der desoxydirenden Wirkung des Zuckers ist schon beim Grünspan S. 26. Erwähnung geschehen, und hierüber haben Buchner (Schw. J. XIII. S. 162.) und Vogel (Schw. J. XIV. S. 224.) Versuche angestellt. Der Grünspan mit Zucker gekocht, läßt ein rothes Pulver (metallisches Kupfer) niederfallen, doch enthält die Flüssigkeit noch Zucker aufgelöst. Beim Kochen des salpetersauren Kupfers mit Zucker schlägt sich nichts nieder, doch scheint Kupferoxydul gebildet worden zu seyn, denn Kali erzeugt einen mehr oder weniger gelben Niederschlag. Eben so wirkt der Zucker desoxydirend auf die Quecksilbersalze, auf das salpeters. Silber und salzs. Gold. Diese Wirkung des Zuckers, welche der Milchzucker, der Honig, die Manna und die übrigen Zuckerarten, auch die Schleime gleichfalls äußern, beruht auf einer Anziehung des Sauerstoffes, wodurch der Zucker selbst wesentlich verändert ist, indem er seine Krystallisirbarkeit und seine Cohärenz verliert. Eben so wird der Zucker verändert durch die Pflanzensäuren in den sauren Säften, und wird namentlich in Weingeist auflöslicher. Guibourt (Taschenb. 1823. S. 64.) fand diese Veränderung besonders auffallend im weinsteinsauren Syrup. Der Zucker, der sich in diesen Syrupen erhärtet, ist weiß, von einem süßen, schwachen und mehligen Geschmacke; im Wasser zur Syrupsdicke gekocht und an die freie Luft gestellt, bildet er bald weiße Punkte, die allmälig zunehmen und sich in körnige Rinden voller Höhlen verwandeln, die weit über die Flüssigkeit sich erheben, welche am Ende ganz verschwindet, wobei eine warzenförmige halbdurchsichtige Masse von der Härte des Alabasters zurückbleibt.

Der Zucker besteht in 100	nach Thénard und Gay-Lussac	nach Berzelius
aus Wasserstoff	6,90	6,802
Kohlenstoff	42,47	44,115
Sauerstoff	50,63	49,083
	100,00	100,000

Der frische Zuckerrohrsaft enthält nach Proust (Gehl. J. II. S. 88.): das dem Rum eigenthümliche Aroma; Extractivstoff; gemeinen Zucker; Schleimzucker; Gummi; grünes Satzmehl; Aepfelsäure und Gyps.

Der Zucker hat das Vermögen, in die weinige Gährung überzugehen, wozu er jedoch den Zusatz eines Gährungsmittels bedarf; alsdann zerfallen 100 Th. Zucker in 51,20 Alkohol und 48,80 Kohlensäure. Durch den Gehalt an Zucker wird demnach die Gährungsfähigkeit der Flüssigkeiten, aus welchen weinige Getränke bereitet werden sollen, bedingt, und zugleich die Ausbeute an Weingeist bestimmt. Eine bekannte geistige Flüssigkeit ist der Zuckerbranntwein, Rum, Taffia (Spiritus Sacchari), welcher aus der Melasse, aus den Spühlwassern, womit die Formen und Geräthe abgewaschen werden, aus dem Zuckerschaume ꝛc. durch Gährung gewonnen wird. Im Feuer schmilzt der Zucker, bläht sich auf, wird braun und verbreitet einen

eigenthümlichen angenehmen Geruch, bei einer stärkern Hitze brennt er mit einer schönen weißen Flamme. Die Salpetersäure löst den Zucker auf, und verwandelt ihn, besonders in der Wärme, in Aepfelsäure und Kleesäure.

Der Zucker findet in der Medicin sehr häufige Anwendung, sowohl in trockner als in flüssiger Form.

Sagapenum. Sagapen.

Ein an der Luft erhärteter Saft einer unbekannten morgenländischen zu den Ferulen gehörigen Pflanze.

Ein Gummiharz in Stücken, gemeiniglich aus zusammenhängenden Körnern, außen weißlich-bräunlich, innen weiß und gelb marmorirt, durch die Wärme der Hand zu erweichen, zähe, fett, von fast knoblauchartigem Geruche und bitterm schärflichem Geschmacke.

Ferula persica Linn. Das persische Seckenkraut.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XII. Ord. 2. Umbelliferae.

Ist nach Willdenow's Angabe die Mutterpflanze des Sagapens und mit **Ferula Asa foetida** nahe verwandt. Sie wächst in Persien, Medien und andern Gegenden des Morgenlandes.

Das Sagapenum kommt aus Alexandrien und Persien in unförmlichen Massen zu uns, die aus Klümpchen von verschiedener Größe, bis zu der einer großen Haselnuß, zusammengebacken sind, die theils weißlich, theils röthlich, theils auch braun und gelb aussehen, mehr oder weniger durchscheinen, theils mehr spröde und hart, theils weich und zähe wie Wachs, denen holzige Halme, ganze und zerbrochene Saamen beigemengt sind. Ein **Sagapenum in granis** kommt sehr selten vor. Es hat einen starken, unangenehmen, knoblauchartigen, dem des Stinkasands sehr ähnlichen Geruch, und einen ähnlichen, doch nicht so ekeligen, bitterlichen, scharfen, etwas erwärmenden Geschmack. Beim Kauen hängt es sich an die Zähne, wird weich, weiß und zergeht endlich. An der Flamme entzündet es sich leicht, und brennt unter Verbreitung eines starken Rauches.

Eine ganz schlechte Sorte ist die dunkelfarbige, unreine, undurchsichtige, mehr übelriechende Sorte, die gewöhnlich in blaue Tücher eingewickelt zu uns kommt.

Brandes (Trommsd. N. J. II. S. 55.) erhielt bei einer sehr ausführlichen Analyse ein ätherisches Oel, welches gelblichweiß, und vollkommen durchsichtig und dünnflüssig war. Der Geruch desselben war höchst widerlich, unangenehm, knoblauchartig, wie der concentrirteste Geruch des Stinkasands. Auch das mit überdestillirte Wasser besaß diesen Geruch in hohem Grade. Der Geschmack war anfangs mild, dann gelind stechend, die Speicheldrüsen reizend, erwärmend, hernach etwas bitterlich, dann höchst unangenehm knoblauchartig. An der Luft der Einwirkung der Sonne ausgesetzt verschwand

der unangenehme Geruch nach und nach, und statt dessen trat ein mehr terpenthin- und campherartiger Geruch hervor. In der Hitze verbrannte es mit hellrother Flamme unter Verbreitung eines unangenehmen Geruchs. In Aether und Alkohol war es leicht auflöslich.

Durch Digestion mit Alkohol, Auskochen des geistigen Extracts mit Wasser und darauf folgende Digestion mit Aether, wurde das geistige Extract zerlegt in Harz, in ein in Aether unlösliches Halbharz und in etwas phosphors. Kalk mit einer Spur von Traganthstoff. Das in Aether lösliche Harz war röthlichgelb, vollkommen durchsichtig, in dünnem Ueberzuge gelblichweiß, roch schwach nach Sagapenum, schmeckte anfangs mild, fettig, stechend, nachher etwas verdorbenem Rübsaamenöle ähnlich, hinterher unangenehm bitter; die Consistenz war dickflüssig, zähe, nach einiger Zeit etwas fester (Balsam- oder Weichharz?). Es war in Weingeist auflöslich, Mandelöl und Terpenthinöl zeigten selbst in der Siedehitze eine sehr geringe Wirkung; mit den ätzenden Alkalien ging es keine oder eine nur sehr schwache Verbindung ein. Von Schwefelsäure wurde es gesättigt dunkelroth, von Salpetersäure gelb, von Salzsäure erst blaßroth gefärbt, dann nahm es einen Stich ins Blaue an, wurde violett, bis das Blaue immer mehr vorstach, so daß die Farbe zuletzt in das schönste Berlinerblau überging.

Die in Aether auflösliche Materie (Hartharz) war bräunlichgelb, trocken, spröde, hart, von wenig Geruche und Geschmacke, war weder in Aether noch in Mandel- und Terpenthinöl auflöslich.

Das rückständige Sagapen wurde noch mit Aether, dann mit kaltem Wasser und zuletzt mit kochendem Wasser behandelt, und überhaupt in 500 Th. folgende Bestandtheile gefunden: ätherisches Oel 18,667; eigenthümliches (Weich-) Harz 239,550; Halb (Hart-) Harz, in Aether unlöslich, 11,875; Gummi mit äpfels., schwefels. und phosphors. Kalksalzen 163,800; Traganthstoff 22,400; saurer äpfels. Kalk mit schwefels. Kalk und einer Spur Harz 2,000; phosphors. Kalk mit einer Spur Traganthstoff 1,375; äpfels. Kalk mit schwefels. Kalk und etwas Gummi 2,250; Wasser 23,000; fremde Beimischungen 21,500. S. = 506,417. Der Ueberschuß ist dem feuchten Zustande der dargestellten Stoffe zuzuschreiben.

Das Wirksame und Charakteristische des Sagapens scheint in dem ätherischen Oele (und dem Weichharze?) zu liegen. Der harzige Bestandtheil ist gegen den gummigen in dem Sagapen der überwiegende.

Das Sagapen ist durch den Stinkasand und das Mutterharz so gut wie entbehrlich, wird daher auch nur selten gebraucht; es geht allein in die Zusammensetzung des Schwefelpflasters ein.

Sago. Sago.

Sagus Rumphii Willd.

(Siehe S. 66.)

Salep. Die Wurzel. Salepwurzel.

Unbekannte Orchisarten. Perennirende Pflanzen des Orients.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0776-9 DFG

Eiförmig-längliche, halbdurchscheinende, harte, schwere, gelblichgraue, einfache, seltner handförmige Knollen, gepulvert mit heißem Wasser übergossen eine sehr gelatinöse Masse darstellend.

Orchis mascula Linn. Männliche Orchis. Männliche Ragwurz.
Orchis morio Linn. Weibliche Orchis. Triftenragwurz.
Linn. Cl. XX. Gynandria. Ord. 1. Diandria.
Juss. Cl. IV. Ord. 3, Orchideae.

Beide Pflanzen finden sich durch ganz Deutschland auf Wiesen, gewöhnlich in der Nähe von Wäldern. Die erstere soll vorzüglich häufig in der Türkei und in Asien vorkommen, so wie sie auch vorzugsweise in den südlichern Theilen Deutschlands vorkommt.

Die Wurzel der ersteren besteht aus zwei eiförmigen weißen Knollen (**radix testiculata**), von denen der jüngere fest und fleischig, der alte runzlig und zusammengeschrumpft erscheint. An ihrem obern Ende entspringen aus der Basis des Stengels mehrere einfache, fleischige Wurzelzasern. Der Stengel wird 1—1½ Fuß hoch, und ist größtentheils von den Blattscheiden bedeckt. Die Blätter sind länglich-lancettförmig, etwas stumpf, rinnenförmig, fleischig, gestreift, blaßgrün, mit einem eigenen Glanze. Die violettrothen Blüthen bilden eine ansehnliche 2—3 Zoll lange Aehre.

Die Wurzel der weiblichen Orchis besteht aus zwei runden, weißen, einknospigen Knollen (**tubera testiculata unigemmia**); der kleinere runzlige hat den blühenden Stengel gebracht und stirbt ab, während sich an der Basis desselben am Lebensknoten (**nodus vitalis**) der zweite größere und festere Knollen, für die Pflanze des künftigen Jahres bestimmt, ausgebildet hat; oberhalb dieser Knollen entspringen mehrere fleischige einfache Wurzelfasern. Die ganze Pflanze ist der ersteren sehr ähnlich, welche jedoch bedeutend größer ist; auch sind die Blätter der weiblichen Orchis länglich, kahnförmig gefaltet, bei genauer Betrachtung punktirt und silberähnlich schimmernd, die Farbe der Blüthen geht von dem gesättigten Violett bis in reines Weiß über.

Vorzüglich von diesen beiden Orchisarten, die am häufigsten vorkommen, aber auch von andern Orchideen, als **O. militaris, pyramidalis, maculata, latifolia**, wird die Wurzel als Salepwurzel benutzt. Man sammelt zur Zeit, wenn die Pflanze im Verblühen begriffen ist, die jungen festen Knollen, bringt sie, nachdem sie zuvor gereinigt worden sind, einige Minuten in kochendes Wasser, und trocknet sie hierauf schnell aus. Dadurch erhalten sie das eigenthümliche hornartige Ansehen, und verlieren den unangenehmen Geruch, den sie im frischen Zustande besitzen.

Die im Handel vorkommenden Salepwurzeln erhalten wir großentheils aus der Türkei und Persien. Sie sind gewöhnlich gefädelt, haben einen schwachen Geruch, und einen schleimigen, schwach salzigen Geschmack.

Im kalten Wasser schwillt das Saleppulver auf, ohne eine schleimige Auflösung zu geben; kochendes Wasser löst dagegen das Pulver zu einem

sehr dicken Schleime auf. 1 Th. Pulver macht 48 Th. Wasser zu einem sehr dicken Schleime. Diese Auflösung wird von den metallischen Salzen nicht verändert, nur das essigsaure Blei giebt einen weißen flockigen Niederschlag, und das salpeters. Queckſilberoxydul macht sie opalisirend. Galläpfeltinctur erzeugt aber, wie in der Stärkeauflösung, einen reichlichen, weißen, flockigen Niederschlag, der in Salpetersäure mit gelber Farbe auflöslich ist. Wein und Essig lösen das Saleppulver durch Hülfe der Wärme gleichfalls auf; Alkohol wirkt aber nicht darauf. Durch Salpetersäure läßt sich aus der Salepwurzel, wie aus dem Stärkemehle, Kleesäure und eine eigenthümliche talgartige Substanz darstellen. Saleppulver mit kaltem Wasser übergossen, und bei einer mittleren Temperatur der freien Luft ausgesetzt, geht in eine Art von weiniger Gährung über und verbreitet einen angenehmen Geruch; später tritt die saure Gährung ein.

Dombosla (Trommsd. J. XX. 2. S. 277.) schied das widrig riechende Princip, welches den frischen Wurzeln den unangenehmen Geruch ertheilt, als ein flüchtiges Oel durch Destillation der Wurzeln mit Alkohol ab; auch zog der Alkohol zugleich eine extractartige, bittere, geruchlose Substanz aus.

Man hat die Salepwurzel für reines Stärkemehl gehalten; Pfaff überzeugte sich, daß sie auch Bassorin oder Traganthstoff enthalte. Pelletier und Caventou suchten zu zeigen, daß die Salepwurzel keine stärkemehlartige Substanz, vielmehr eine dem Traganthgummi ähnliche Materie enthalte, da sie mit Jod keine blaue, sondern eine violette Farbe geben. Die Salepauflösung erhält aber von Jod eine schön blaue Farbe, und dies kann gerade zum Beweise dienen, daß die Salepwurzel größtentheils aus Stärkemehl bestehe; und wenn dies Saleppulver, mit Schwefelsäure auf dieselbe Weise wie Kartoffelstärke behandelt, keinen Zucker giebt, so ist nach Pfaff dies der Zubereitung der Wurzel durch eine Art von Aufkochen zuzuschreiben, denn auch gekochte Kartoffeln geben keinen Zucker.

Nach späteren Versuchen von Caventou über die Schleime (Buchn. Repert. XXIV. 1826. S. 245. und Trommsd. N. J. XIII. 2. S. 99.) entzieht Wasser von gewöhnlicher Temperatur der gepulverten Salepwurzel eine etwas salzige gummige Flüssigkeit, welche nach dem Abdampfen ein von Jod nicht veränderliches Gummi hinterläßt. Kochendes Wasser zieht etwas Amylum aus. Der Rest ist eine gelbe Substanz, welche mit Salpetersäure behandelt Sauerkleesäure liefert, und alle Eigenschaften des Bassorins besitzt. 100 Th. Salep liefern 4 Th. Asche, die aus Kochsalz, phosphors. und Spuren von schwefels. Kalke besteht. Die Salepwurzel besteht also aus wenig Gummi, sehr wenig Stärkemehl und viel Bassorin.

Vauquelin hat aus den Wurzelknollen einheimischer Orchisarten viel Amylum erhalten, während Robiquet versichert, keine Spur darin gefunden zu haben. Der Satzmehlgehalt in dieser Wurzel scheint also unbeständig zu seyn.

Merkwürdig ist das Vorhandenseyn des Kochsalzes, wenn es nicht zu-

fällig ist, in den Salepwurzeln, da es doch gewöhnlich nur in Meerpflanzen gefunden wird. Buchner bemerkt, man könne annehmen, daß das Kochen der orientalischen Salepwurzeln in Meer- oder Salzwasser geschehe.

E. Brandes und Hoztou (Brandes's Archiv I. S. 316.) haben bemerkt, daß 20 Gran Salep in 4 Unzen Wasser aufgelöst, mit 30 Gran kaustischer Magnesia versetzt, ein Gemisch hervorbringen, das nach einigen Stunden fest und dem Leim ähnlich wird. Selbst nach Verlauf eines Monats bemerkte man nicht die geringste Spur von Fäulniß an demselben. Weder Eiweiß noch Traganth, noch Kleber, noch Amylum bringen diese Erscheinung mit Magnesia hervor. Eben so wenig thut dies der Kalk oder der Bolus. Dieser aus Salep erzeugte Stoff, der eine chemische Verbindung beider Stoffe zu seyn scheint, ist unauflöslich in Wasser, in fetten Oelen, in Terpenthinöl, in Alkohol und in ätzender Kalilauge. Säuren lösen ihn zum Theil auf, wobei ein dicker opalfarbener Rückstand bleibt.

Die Salepwurzel wird sowohl in Pulverform, als in der Auflösung in heißem Wasser gegeben. Das rechte Verhältniß zu einem guten Schleime ist 5 Gran Saleppulver auf eine Unze Wasser.

Salix. Die Rinde. Weidenrinde.

Salix pentandra und fragilis Linn. In Deutschland, vorzüglich dem nördlichen, häufige Bäume.

Die dünne, biegsame Rinde der zwei- und dreijährigen Aeste, außen braun, glatt, glänzend, innen gelblich, von zusammenziehendem bitterm, nicht unangenehmen Geschmacke. Sie werde im Frühlinge gesammelt.

Salix pentandra Linn. Die Lorbeerweide.
Salix fragilis Linn. Die Bruchweide.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 2. Diandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 4. Amentaceae.

Die Lorbeerweide ist in den nördlichen Gegenden Europas einheimisch, wo sie auf sandigem Boden am Ufer der Flüsse vorkommt; in den südlicheren Ländern findet sie sich seltner in gebirgigen Gegenden.

Der Stamm erreicht eine Höhe von 30—40 Fuß, und einen Fuß im Durchmesser. Zuweilen ist diese Weide aber auch niedrig und strauchartig. Das Holz ist, wie das aller Weiden, weich, leicht und weiß. Die alte Rinde ist aschgrau und aufgerissen, die der jungen Zweige grün und glatt. Die Blätter sind oval-länglich, spitz, am Rande gesägt, glatt, oben dunkelgrün und glänzend, unten blaßgrün. Der kurze Blattstiel ist, wie auch die Spitze der Sägezähne, mit rundlichen gelblichen Drüsen besetzt. Die Blätter, welche ungefähr 3—4 Zoll lang, und 1—1½ Zoll breit sind, haben besonders in der Jugend einen sehr angenehmen balsamischen Geruch, der sie, so wie die beschriebenen Drüsen, von unsern übrigen Weiden auszeichnet. Die Blüthen erscheinen nach den Blättern an der Spitze junger abstehender

1—2 Zoll langer, mit 5—6 Blättern besetzter Aestchen. Die Kätzchen sind $1\frac{1}{2}$—2 Zoll lang, ziemlich dick, stumpf und gelb.

Die Bruchweide kommt in mehreren Gegenden Deutschlands vor. Der Baum wird nicht sehr stark; die Aeste brechen bei starkem Winde. Die ausgewachsenen Blätter haben eine mehr eiförmige Basis, und sind auf beiden Seiten grün. Die Blüthen kommen gleichzeitig mit den Blättern hervor. Die Spindel der Kätzchen ist stark behaart, weißwollig.

Da die Lorbeerweide weit seltener in Deutschland gefunden wird, als andere Arten, so wird die officinelle Rinde größtentheils von der Bruchweide, aber auch wohl von andern Weidenarten, als S. alba, vitellina und Russeliana, im ersten Frühjahr von zwei- und dreijährigen Aesten gesammelt. Der Geschmack ist bitter und stark adstringirend, der Geruch mehr oder weniger balsamisch.

Diese Rinde wurde für ein Surrogat der China gehalten und ist daher auch von den Herren Pelletier und Caventou (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 113.) analysirt, und hiebei besonders nach einem Alkaloid geforscht worden. Der geistige Auszug der Rinde ließ beim Erkalten einige Flocken Wachs fallen. Das durch Verdunsten erhaltene geistige Extract wurde mit Wasser ausgezogen, wobei eine braunröthliche, sehr wenig in Wasser auflösliche Materie, und eine grüne, fette, in Aether auflösliche Materie (Balsamharz mit Chlorophyll) zurückblieben. Die wäßrige Auflösung röthete die Lackmustinctur, präcipitirte weder mit dem Galläpfelaufgusse, noch mit dem Brechweinstein, gab aber einen reichlichen Niederschlag mit dem thierischen Leim; das schwefels. Eisen bildete darin einen dunkelgrünen, sehr reichlichen Niederschlag. Mit der gebrannten Talkerde gekocht schied sich der färbende Stoff (Gerbestoff) ab, der sie rosenroth färbte. Der Alkohol, mit welchem die Magnesia ausgezogen worden, hinterließ nur einen sehr geringen Rückstand, der keine alkalinischen Eigenschaften zeigte, und etwas gelbfärbende Substanz zu seyn schien. Die Säure, welche in der wäßrigen Flüssigkeit mit der Talkerde verbunden zurückgeblieben war, schien Aepfelsäure zu seyn.

Aus der durch Alkohol erschöpften Rinde ließ sich durch Auskochen mit Wasser noch ziemlich viel Gerbestoff und Schleim, aber kein Stärkemehl ausziehen. Die Verfasser halten den Gerbestoff der Weidenrinde, nebst etwas Bitterstoff, der in der wäßrigen Flüssigkeit gleichfalls zurückgeblieben war, für den vorzüglich wirksamen Bestandtheil dieser Rinde, zugleich für verschieden von dem Gerbestoffe der Chinarinde, weil er den Brechweinstein nicht fällt. Aber die Fällung des Brechweinsteins hängt mehr von dem Harze der Chinarinde als von ihrem Gerbestoffe ab.

Es enthält also nach dieser Analyse die Weidenrinde kein den Chinaalkaloiden ähnliches Alkaloid, sondern Gerbestoff; eine noch nicht genau bestimmte Säure, eine rothbraune harzige Materie, ein grünes Balsamharz, einen gelben Farbestoff und Gummi.

Fontana, ein italienischer Pharmaceut, will jedoch in der Weidenrinde eine Salzbasis, Salicin, gefunden haben, deren Verbindung mit

Schwefelsäure bedeutende medicinische Wirkungen haben soll. Bedarf noch Bestätigung.

Die Weidenrinde läßt sich nicht gut pulvern; sie stellt dann ein sehr leichtes und lockeres Pulver dar. Sie wird als chinavertretendes tonisches Mittel in Pulverform, oder zweckmäßiger in der Abkochung und im Extracte gegeben. 16 Unzen Rinde geben 3 Unzen wäßriges Extract.

Salvia. Das Kraut. Salbeikraut.

Salvia officinalis Linn. Ein kleiner Strauch des mittägigen Europas.

Ein bitteres und gewürzhaftes, etwas adstringirendes Kraut, mit gegenüberstehenden, gestielten, lancettförmigen, stumpfen, unausgeschnittenen, etwas gekerbten, runzligen, etwas zottigen Blättern. Im Sommer einzusammeln.

Salvia officinalis Linn. Aechte Salbei.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Diese Pflanze, welche als kleiner Strauch in Spanien, Italien, Frankreich, auf den Inseln des Archipelagus, in Dalmatien ꝛc. in bergigen Gegenden wild wächst, und 16—20 Jahre dauert, wird bei uns in Gärten gezogen, wo sie recht gut gedeiht. In fettem und beschattetem Sandboden artet jedoch die Pflanze aus; die Blätter werden sehr zahlreich, groß, breit und dunkelgrün, der Geruch derselben wird aber so schwach, daß man sie reiben muß, um sie riechen zu können. Pflanzt man sie auf magern, wo möglich mergelartigen oder steinigen, der Mittagssonne ausgesetzten Boden, so werden die Blätter gleich im folgenden Jahre schmäler, grauer und die ganze Pflanze bekommt einen durchdringenden Geruch. (Wiegmann.).

Der Stengel ist vierkantig, behaart, holzig und breitet sich in viele aufrechte, etwas weißliche Aeste aus. Die Blätter sind sanft anzufühlen und von grünlich-grauweißlicher Farbe. Die Blumen bilden eine einfache lockere Aehre am Ende der Zweige, stehen in zusammengedrängten, wenigblüthigen Quirlen, und jede ist mit einem herzförmigen, spitzen Deckblättchen versehen. Der Kelch ist röhrig, einblättrig, mit 5 sehr spitzen gleichen Zähnen; die Blumenkrone unregelmäßig, rachenförmig, einblättrig, zweilippig und oben erweitert.

Die Salbei blüht im Juni bis August.

Es giebt mehrere Abarten dieser Pflanze mit schmalen, gestreiften Blättern, auch mit röthlichen und weißen Blumen.

Das Kraut wird im Mai mit den noch nicht entwickelten Blumen eingesammelt. Der Geruch ist anfangs angenehm, stark gewürzhaft und etwas campherartig; der Geschmack bitterlich gewürzhaft, und ein wenig zusammenziehend. Der Aufguß ist braun, von stark campherartigem und bitterm Geschmacke. Oxydirte Eisenauflösung färbt den sehr verdünnten Aufguß olivenfarbig.

grün; ist er sehr concentrirt, so läßt sich wegen der Schwärze die Farbennuance weniger unterscheiden.

Nach einer Analyse von Ilisch (Trommsd. J. XX. 2. S. 7.) lieferten 6½ Pfund frisches Salbeikraut: 1) 2 Pfund 8 Loth dunkelgrünen ausgepreßten Saft, bestehend a) aus freier Aepfelsäure; b) Extractivstoff mit einem besondern thierischen Stoffe und salpeters. Kali 3 Loth; c) Gummi 1½ Loth; d) grünem Satzmehle 1 Loth, bestehend aus α) grünem Harze 30 Gr. und β) Eiweißstoff 200 Gr. 2) 1 Pfund 12 Loth nach dem Auspressen getrockneten Rückstand, enthaltend: a) grünes Harz 5½ Loth; b) Extractivstoff ½ Loth und 100 Gran; c) Gummi 1½ Loth und 36 Gran; d) Faserstoff 33 Loth. 3) ätherisches Oel 78 Gran.

Von diesem ätherischen, kräftig, etwas campherartig riechenden Oele wurden aus einem Pfunde trocknen Krautes etwa ½ Quentchen erhalten. Von dem jungen Kraute destillirt ist es grün, bald in Braun übergehend, aus den im Herbste gesammelten Blättern ist es gelb. Nach Proust läßt das spanische Salbeiöl beim Verdunsten den achten Theil Salbeicampher zurück, der sich jedoch nicht eigentlich wie Campher verhält.

Die Salbei wird beim innerlichen Gebrauche zur Verminderung der erschöpfenden Schweiße in hektischen Fiebern ꝛc. am besten in einem gesättigten Theeaufgusse verordnet; auch dient sie zu Gurgelwässern, Zahnpulvern ꝛc. Sie äußert eine große Kraft, thierische Theile vor der Fäulniß zu bewahren, und soll in dieser Hinsicht selbst die Chinarinde übertreffen.

Sambucus. Die Blumen. Fliederblumen. Hollunderblumen.

Sambucus nigra Linn. Ein durch ganz Deutschland sehr häufiger Baum.

Die blühenden Afterdolden, mit weißen, einblättrigen, fünflappigen Blumenkronen, mit einem sehr kleinen fünflappigen Kelche, einen etwas narkotischen nicht unangenehmen Geruch aushauchend, und bei trocknem Wetter einzusammeln.

Sambucus nigra Linn. Der gemeine oder schwarze Flieder, Hollunder.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XI. Ord. 4. Caprifoliaceae.

Der Hollunder wächst leicht in jedem Erdreich, obschon er einen etwas feuchten Boden vorzieht. Er findet sich durch ganz Deutschland, überhaupt in den meisten Ländern Europas, auch im nördlichen Asien. Das zierliche Laub desselben, so wie die artigen, weißen, nicht unangenehm riechenden Blumen gewähren bei dem dunkeln Grün der Blätter einen schönen Anblick.

Der Hollunderbaum erhebt sich zu einer Höhe von 8—12 Fuß und drüber. Die Rinde desselben ist aschfarbig, das Holz weiß und zerbrechlich; in diesem befindet sich eine sehr vollkommene Markröhre. Die gegenüberstehenden, ungleich-gefiederten, tief grünen Blätter bestehen aus gleichfalls ge-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0782-1

genüberstehenden, fast aufsitzenden, eiförmig-zugespitzten, am Grunde etwas herzförmig ausgerandeten, am Rande gezähnten Blättchen. Die gelblichweißen, kleinen, zahlreichen Blumen stehen an den Enden der Zweige in Afterdolden auf einzelnen und ästigen Stielchen. Der Kelch ist einblättrig, bleibend, die Blumenkrone radförmig, ausgebreitet. Die Frucht ist eine rundliche, einfächrige, mehrkernige, schwärzliche Steinfrucht von der Größe einer mittelmäßigen Erbse, und von den Kelchzähnen gekrönt. Sie enthält 3 Steinchen oder kleine Kerne, schmeckt süßlich-säuerlich und ist mit einem schwarzröthlichen Safte erfüllt.

Der Fliederbaum blüht im Mai und Juni, zuweilen auch im Herbste zum zweiten Male. Die Früchte, Fliederbeeren, reifen im September.

Sowohl in Hinsicht auf Blätter als auf Beeren giebt es mehrere Abänderungen.

Zum pharmaceutischen Gebrauche sammelt man die ganzen Blumenbüschel ein, von denen man aber die langen Stiele abschneidet. Man trocknet sie schnell, ohne sie zu wenden, wobei sie sehr zusammengehen. Diese Blumen besitzen einen eigenen, stark balsamischen, den Kopf etwas einnehmenden Geruch, und einen schleimig bitterlichen Geschmack. Zuweilen werden sie wohl mit den widrig riechenden Blumen des Attichhollunders (**Sambucus Ebulus Linn.**), deren Farbe ins Röthliche spielt, und welche dreimal gestielte Afterdolden bilden, so wie auch mit den Blumen des rothen oder Traubenhollunders (**Sambucus racemosa Linn.**), die aber eine gelbliche oder grünliche Farbe haben, und keine Afterdolden, sondern eine eiförmige Traube bilden, verwechselt.

In großer Menge destillirt liefern die Fliederblumen nach Lewis eine geringe Menge ätherisches Oel von butterartiger Beschaffenheit. Diese starke Consistenz des Oels verhindert seine Verflüchtigung beim Trocknen der Blumen, daher diese ihn vollkommen beibehalten. Der Aufguß ist röthlich und hat einen eigenthümlichen ekelhaften, etwas bitterlichen Geschmack. Eisenauflösungen verändern seine Farbe ins Dunkelolivengrüne; Galläpfeltinctur bringt einen reichlichen flockigen Niederschlag hervor. Das essigs. und salpeters. Blei, das oxydulirte salpeters. Quecksilber fällen ihn gleichfalls reichlich, auch das salzs. Zinn. Salpeters. Silber ist ohne merkliche Wirkung darauf.

Nach einer Analyse von Ellason (Trommsd. N. J. IX. 1. S. 245.) bestehen die Hollunderblüthen aus: 1) einem eigenthümlichen ätherischen Oele, welches bei gewöhnlicher Temperatur fest und krystallinisch ist, und den Geruch des Hollunders im höchsten Grade besitzt; 2) Schwefel, durch die Reaction des mit essigs. Bleioxyd getränkten Papiers, das in die Destillirblase aufgehängt wurde, wahrgenommen; 3) einer eigenen Art Kleber, mit noch näher zu untersuchenden Krystallen vermengt; 4) Eiweiß; 5) Schleim; 6) Harz; 7) adstringirendem Stoffe; 8) stickstoffhaltigem Extractivstoffe; 9) oxydirtem Extractivstoffe; 10) äpfels. Kali; 11) äpfels. Kalk; 12) kohlens. Bittererde; 13) salzs. Kali; 14) schwefels. Kali; 15) schwefels. Kalk; 16) phosphors. Kalk.

Die Fliederblumen, eins der beliebtesten Hausmittel, werden im Theeaufgusse als schweißtreibendes Mittel benutzt, aber auch äußerlich, als schon etwas narkotisch wirkend, zu schmerzstillenden Umschlägen und Kataplasmen verordnet.

Sambucus. Der rohe eingedickte Saft der Beeren. Roob Sambuci. Fliedermuß.

Wird bei uns durch Eindicken des Saftes der Beeren von Sambucus nigra Linn. bereitet.

Ein dickes Extract, von schwärzlicher Farbe und einem säuerlichen Geschmacke. Man sehe darauf, daß der Saft nicht von empyreumatischem Geschmacke, daß er weder gar zu sauer, noch durch Kupfer verunreinigt sey, was durch ein blankes Eisen entdeckt wird.

Die Fliederbeeren, welche ehemals im getrockneten Zustande unter dem Namen Grana Actes gebräuchlich waren, liefern frisch durchs Auspressen einen süßlich-säuerlichen, schwarzröthlichen Saft, welcher durch die Alkalien violett, durch die Säuren hochroth gefärbt, und durch essigsaures Blei, unter Entfärbung der Flüssigkeit, blau gefällt wird. Sie enthalten vorzüglich Aepfel- und nur wenig Citronensäure, dabei viel Zuckerstoff, aber wenig Pflanzengallerte. Diese Bestandtheile gehen in das aus diesen Beeren bereitete Fliedermuß über.

Das Fliedermuß, auch Fliederkreide genannt, wird häufig und gewöhnlich von den Landleuten bereitet, da die reifen frischen Beeren einen weiten Transport nicht erleiden können, ohne zu verderben, und der Apotheker selten Gelegenheit findet, an seinem Wohnorte selbst eine zu seinem Bedarf hinreichende Menge Fliederbeeren zu sammeln, um daraus den eingedickten Saft selbst bereiten zu können. Häufig wird aber von den Landleuten auf die Bereitung der Fliederkreide nicht die gehörige Sorgfalt verwendet, so daß sie durch zu starke Feuerung einen brenzligen Geschmack erhält, wobei auch die Farbe dunkler als gewöhnlich ausfällt, oder daß der Saft in die saure Gährung übergegangen ist, und der eingedickte Saft nun auch die durch die Gährung gebildete Essigsäure enthält, oder endlich, daß dieser mit Kupfer verunreinigt ist. Das Einkochen des Saftes geschieht nämlich ganz gewöhnlich in kupfernen Kesseln, und eben so gewöhnlich ist es daher auch, daß bei dem Gehalte des Saftes an freier Säure auch ein kupferhaltiges Product gewonnen wird. Es ist daher unerläßliche Pflicht, jedes eingekaufte Fliedermuß auf die Verunreinigung mit Kupfer zu prüfen, nämlich durch eine hineingestellte polirte Messerklinge. Zeigt sich auf dieser ein Beschlag von metallischem Kupfer, so schütte man das Roob in einen eisernen Kessel, verdünne es mit Wasser, und koche es über gelindem Feuer unter beständigem Umrühren mit einem eisernen Spatel, der, sobald er mit einer kupfrigen

Rinde bedeckt ist, mit einem frischen so lange vertauscht wird, bis der zuletzt gebrauchte Spatel nach leichtem Abspühlen mit Wasser auch nicht die geringste Spur von Kupfer zeigt. Dann seihe man, zur Abscheidung der stets noch vorhandenen Unreinigkeiten, das Ganze durch, und rauche es bei gelindem Feuer zur gehörigen Consistenz ab.

Das Fliedermuß, als ein bewährtes schweißtreibendes Mittel bekannt, wird in der Auflösung verordnet.

Zu erwähnen ist hier noch des Hollunderschwammes (Judasohr, Fungus Sambuci), welcher vorzüglich auf alten Hollunderstämmen und zwar im Frühjahre, besonders gegen die Nordseite zu vorkommt. Er sitzt mit seinem Mittelpunkte ohne Stiel auf dem Holze fest, bildet eine mit ungleichen Windungen durchzogene concave Figur, so daß er in seiner Gestalt und Größe einigermaßen dem menschlichen Ohre gleicht. Frisch ist er besonders im Innern und oben glänzend, glatt, fühlt sich schlüpfrig an, die äußere Fläche ist matt mit erhabenen Adern durchzogen und mit sehr feinen zarten, kurzen, dichtanliegenden Härchen besetzt. Die weiche lederartige Substanz ist sehr dünn, $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Linie dick, durchscheinend, nach allen Richtungen zerreißbar, im Bruche glänzend. Die Farbe des frischen oder angefeuchteten Schwammes ist mehr oder weniger, hellbraun. Der Geruch ist eigenthümlich, dumpf; Geschmack nicht bemerkbar. Durchs Trocknen schwindet der Schwamm sehr zusammen, wird hart und zerbrechlich; die innere Fläche ist jetzt mehr dunkelbraun, die äußere hellgrau.

Dieser Schwamm wird häufig verwechselt mit dem buntgestreiften Löcherpilz (Boletus versicolor Linn., Polyporus versicolor Fries), welcher sehr häufig an alten abgehauenen Baumstämmen oder Wurzeln in Wäldern vorkommt, im frischen feuchten Zustande oft sehr schön blau, grün und violett und mit andern Farben, mit Streifen längs der Peripherie gezeichnet ist. Die untere Fläche ist völlig mit sehr feinen Poren bedeckt (daher sein Name Löcherpilz), frisch weißlich, trocken hell- oder dunkelbraun, oft ganz schwarz. Im Wasser schwillt dieser Schwamm nicht wie der vorige auf, sondern sein Umfang bleibt unverändert, wird eher dunkler von Farbe, und bleibt zähe und lederartig.

Der Hollunderschwamm ist den Aerzten des Mittelalters ein heilsames Mittel gegen Augenentzündungen gewesen, jetzt wird er nur noch in einigen Gegenden Deutschlands als Hausmittel von den Landleuten dagegen angewendet. Man legt ihn nämlich in Wasser, gewöhnlich Rosenwasser, bis er fast gallertartig erweicht, und bindet ihn auf das Auge, welches, je nachdem es nöthig ist, wiederholt wird.

Sandaraca. Sandarach.

Der an der Luft verdichtete Saft von Thuja articulata Vahlii, einem Baume des nördlichen Afrikas.

Ein Harz in rundlichen und länglichen Körnern, weißlich-citro-

nengelb, auf der Oberfläche undurchsichtig, innen halbdurchscheinend, zerreiblich, beim Kauen nicht weich werdend, von, wenn sie angezündet werden, angenehmen Geruche, in höchst rectificirtem Weingeist fast gänzlich, in Terpenthinöl zum Theil auflöslich.

Thuja articulata Vahlii. Der gegliederte Lebensbaum.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 8. Monadelphia.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Coniferae.

Dieser Baum, welcher in der ganzen Barbarei auf Hügeln wächst, und besonders auf dem Atlas angetroffen wird, erreicht eine Höhe von 15—20 Fuß. Die kleinen Zweige desselben sind zusammengedrückt. Die vierreihigen Blätter liegen dachziegelförmig über einander, sind lancettförmig, spitzig und angedrückt. Die männlichen Blüthen bilden ein eiförmiges Kätzchen; die weiblichen Blüthen sitzen entgegengesetzt in fast eirunden Zapfen.

Die Blüthezeit ist April und Mai.

Das aus diesem Baume fließende Harz kommt als Sandarach in den Handel, und besteht aus tropfenförmigen, meist länglichen, aber auch aus mehr rundlichen, zum Theil höckerigen Stückchen, die blaßgelb, von ebenem Bruche, glänzend, zerbrechlich, hart und spröde sind, unter den Zähnen beim Kauen nicht weich, sondern in ein immer feineres Pulver zerrieben werden. Der Geruch, besonders auf Kohlen, ist balsamisch, dem Mastix etwas ähnlich, doch nicht so lieblich, mehr terpenthinartig; der Geschmack balsamisch-harzig. Das Pulver ist weiß. Spec. Gew. = 1,050.

Wenn der Sandarach wiederholt mit kaltem Weingeiste ausgezogen wird, so bleibt eine besondere Substanz zurück, welche nach Giese den fünften Theil des Sandarachs ausmacht, und mit dem Namen Sandaracin belegt worden ist. Dieses ist nach dem Trocknen weißlichgrau, sehr zerreiblich, in Wasser und Alkohol unauflöslich, in Aether aber ist es vollständig auflöslich, und wird aus dieser Auflösung durch Weingeist in weißen Flocken gefällt. Dieser Theil des Sandarachs ist in Terpenthinöl auflöslich.

Der Sandarach wird zum Räuchern gebraucht, indem er auf Kohlen gestreut einen starken Rauch von angenehmen Geruche verbreitet; auch dient er zur Bereitung der Firnisse. Des Pulvers bedient man sich, um radirte Stellen des Papiers einzureiben, damit die Dinte nicht auseinander fließe, und die Schrift undeutlich werde.

Sanguis Draconis. Drachenblut.

Wird aus verschiedenen Bäumen Ostindiens, vorzüglich aus Calamus Draco Willd. gesammelt.

Ein schwarz-purpurfarbiges, undurchsichtiges, glänzendes, beim gröblichen Zerreiben sehr rothes Harz, von zusammenziehendem Geschmacke, roth färbend. Verwerflich ist das, was in Kuchen

vorkommt; man nehme das in kleine Kugeln oder Cylinder geformte, mit verdorrten Blättern umwickelte.

Das Drachenblut kommt im Handel in verschiedener Gestalt vor, und diese Verschiedenheit rührt gewiß zum größten Theil von den verschiedenen Pflanzen her, von welchen es gewonnen wird.

Calamus Draco Willd. Der Drachenblutkalmus ist ein kleiner in Ostindien wachsender Baum (**Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia. Juss. Cl. III. Ord. 1. Palmae.**). Aus den mit einem rothen harzigen Safte angefüllten Früchten dieses Baumes wird das Drachenblut als eine von selbst ausschwitzende erhärtete Masse oder dadurch gewonnen, daß diese Masse durch Stampfen oder starkes Rütteln von den Früchten getrennt und nachher in der Wärme zu Kugeln geformt wird. Oder man setzt auch wohl die Früchte den Dämpfen des kochenden Wassers aus, um den Saft herauszuziehen, der alsdann mit Stäbchen abgekratzt, und in Beutel gethan wird, die aus Schilfblättern zusammengesetzt sind, denen, sobald der Saft darinnen ist, durch Bewickeln mit einem Faden eine gegliederte Form gegeben wird, und die man alsdann in der freien Luft so lange hängen läßt, bis der Saft erhärtet ist. Eine schlechtere Sorte wird durch das Auskochen der zerquetschten Früchte, die schlechteste aber dadurch gewonnen, daß man den übrigen Rückstand zu Kuchen formt.

Dracaena Draco Linn. Drachenbaum, ein großer Baum auf den canarischen Inseln (**Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia. Juss. Cl. III. Ord. 2. Asparagineae.**).

Pterocarpus Draco Willd. Amerikanischer Flügelfruchtbaum, in Südamerika; und **Pterocarpus santalinus Linn.** Sandelholzbaum, in Ostindien und auf Ceylon einheimisch (beide **Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria. Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.**). Von diesen Bäumen wird aus den Rissen oder Einschnitten in den Stamm ein rother Saft erhalten, der gleichfalls als Drachenblut in den Handel kommt, welches auch ferner von **Dalbergia monetaria** in Ostindien, so wie von einigen Krotonarten erhalten werden soll.

Als die feinste Sorte Drachenblut wird angegeben **Sanguis Draconis in lacrymis s. in granis**, eine Sorte, die gar nicht mehr im Handel vorkommt. Als beste Sorte erhalten wir jetzt ein in Schilf eingewickeltes in cylindrischen Stangen, von etwa 1 Fuß Länge, $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser. Dieses Drachenblut ist sehr dunkelroth, wo es abgerieben ist hellroth, etwas schimmernd, ganz undurchsichtig, schwer zerbrechlich, noch schwerer zerreiblich, ohne Geruch und ohne Geschmack. Spec. Gew. 1,196. Das Pulver ist carmoisinroth. Dieses Drachenblut verhält sich in jeder Hinsicht wie ein reines Harz. Weingeist löst es ohne Rückstand zu einer hochrothen Tinctur auf, die durch Wasser gefällt wird. Eben so verhält sich der Schwefeläther; auch die ausgepreßten Oele lösen es auf, so wie das Terpenthinöl. An die Flamme gehalten brennt es mit einem storaxähnlichen Geruche. Nach Hat-

chett enthält es etwas weniges (0,06) Benzoësäure (durch Salpetersäure ausgezogen); löst sich ein wenig in Kalkwasser auf, und wird aus dieser Auflösung durch eine Säure mit rother Farbe gefällt.

Das **Sanguis Draconis in placentis**, Drachenblut in Kuchen, besteht aus großen Scheiben und unregelmäßigen Stücken von verschiedener Größe. Die Farbe ist braunroth, auf der äußern Oberfläche mehr hell mennigroth durch das Abreiben, und daher auch etwas bestäubt, der Bruch uneben und etwas schimmernd, leicht zerreiblich. Im Innern sind fremdartige Theile, besonders Spelzen und Spähne eingemengt. Wasser wird schwach röthlich gefärbt; Terpenthinöl löst den größten Theil desselben auf, und nimmt davon eine hellrothe Farbe an.

Beide Sorten geben beim Brennen den storaxähnlichen Geruch, welcher den künstlich producirten fehlt, denen auch überdem durch Wasser der färbende Stoff entzogen werden kann.

Hayne (Getr. Darst. der Pflanzen IX. Taf. 9.), welcher **Pterocarpus Draco W.** als die Mutterpflanze des Drachenblutes beschreibt, theilt eine Untersuchung desselben von dem Prof. Melandri mit, nach welcher von demselben ein eigenes Alkaloid, Draconin genannt, gefunden worden. Das ächte Drachenblut soll fast ganz aus diesem Draconin bestehen (in der Anmerkung wird angeführt, daß das **Sanguis Draconis in guttis s. in lacrymis** nur wenig Draconin enthalte, wohingegen das **Sanguis Draconis in placentis** fast größtentheils aus Draconin bestehe. Hier ist wahrscheinlich dasjenige Drachenblut in Kuchen gemeint, welches aus kleinen, glatten Kuchen, 3—4 Finger breit und 1—3 Unzen schwer, von außen glatt, dunkelroth, undurchsichtig und hart, und auf dem Bruche ziemlich glänzend seyn, sich fast gänzlich in Weingeist, aber nicht in den ausgepreßten Oelen auflösen, sondern diesen nur eine rothe Farbe mittheilen soll, und welches gar nicht mehr vorkommt). Um das Draconin abzuscheiden fällte Melandri die alkoholische Auflösung des Drachenblutes, nachdem er sie mit Schwefelsäure so weit versetzt hatte, daß sie schwach sauer reagirte, mit Wasser, bis dieses nur noch sehr wenig gelblich gefärbt wurde. So erhielt er eine rothe unkrystallisirbare Masse, die sich nur in sehr geringer Menge in Wasser, in bedeutenderer hingegen in Alkohol auflöst, und schwefelsaures Draconin ist. Durch Alkalien wird dieses schwefelsaure Draconin zersetzt, und schon durch einen sehr unbedeutenden Zusatz derselben aus seiner bis fast zu einer wasserhellen Flüssigkeit verdünnten Auflösung roth gefällt, weshalb es denn auch als ein sehr empfindliches Reagens auf Alkalien anzuwenden ist. In gelinder Wärme zerfließt es, und verhält sich in höherer Temperatur wie eine vegetabilische, nicht stickstoffhaltige Substanz. (Kann wohl nicht zu den Alkaloiden gezählt werden, mit den Säuren können auch die Harze schwache Verbindungen eingehen.)

Proust erklärte das Drachenblut für eine besondere Modification des Gerbestoffs, es wurde daher auch früher zu den adstringirenden Mitteln gerechnet; indessen sind seine adstringirenden Kräfte wohl nur sehr gering, da-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0788-6

her es denn auch in der Medicin fast gar nicht mehr, vielmehr allein zum technischen Gebrauche benutzt wird, um den Firnissen und den Beizen Farbe zu geben. Erhitzter Marmor nimmt von der Auflösung eine schön rothe bleibende Farbe an.

Santalum rubrum. Das Holz. Rothes Sandelholz.

Santalum album Linn. Ein Baum Ostindiens.

Rothe Stücken Holz, außen oft von dunklerer Farbe, von gelind adstringirendem Geschmacke. Von dem geraspelten ziehe man das von frisch rother Farbe vor, und verwerfe das mit fremdartigen Dingen verunreinigte.

Santalum album Linn. Der weiße Sandel.
Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VI. Ord. 2. Thymelaeae.

Es ist ein hoher in Ostindien einheimischer Baum, mit gegenüberstehenden, lancettförmigen, gestielten, ganzrandigen, 2 Zoll langen, stumpfen Blättern, und kleinen, eine Art von kurzen Strauß bildenden Blüthen.

Von diesem nur unvollkommen gekannten Baume leitet man sowohl das weiße, als auch das gelbe Sandelholz (**Lignum Santali album** und **citrinum**) ab. Das letztere wird für den Kern des Stammes ausgegeben; es scheint jedoch vielmehr, daß das gelbe Sandelholz von einem wesentlich verschiedenen Baume abstamme. Das weiße Sandelholz ist von blaßweißer Farbe, schwer, und hat weder Geruch noch Geschmack. Das gelbe ist bleichgelb, manchmal dunkelgelb, und pflegt zuweilen sogar roth geadert zu seyn. Es hat einen starken, angenehmen, rosenähnlichen Geruch, besonders wenn es gerieben wird, und einen bittern Geschmack. Bei der Destillation mit Wasser giebt es ein nach Ambra riechendes Oel, welches in der Kälte gerinnt. Der Weingeist zieht daraus ein wohlriechendes Harz.

Als der Baum, von welchem das rothe Sandelholz abstammen soll, wird

Pterocarpus santalinus Linn. Rother Sandelbaum.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

angegeben, aus dessen Stammrinde durch Einschnitte Drachenblut gewonnen wird, wie dort erwähnt worden ist. Das Holz dieses auf Ceylon, im Königreich Golkonda, Timor und auf den benachbarten Inseln einheimischen Baumes wird entweder in viereckigen, von außen schwärzlichen, inwendig blutrothen, schweren, festen Stücken, die eine sehr faserige und merkwürdige Textur haben (denn die Fasern bilden Lagen, die sich abwechselnd durchkreuzen, so daß sich das Holz, wenn es der Quere nach gespalten wird, in 2 Stücke theilt, deren Endflächen gleichsam in einander eingreifen, und daß, wenn man mit dem Hobel darüber hinfährt, die Oberfläche abwechselnd glatt

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0789-4

und aufgerissen erscheint), oder in Raspelspähnen (Scobs, Rasura ligni santali rubri, Lignum santali rubrum raspatum) zu uns gebracht. Das Holz hat einen schwachen Geruch und geringen zusammenziehenden Geschmack. Man zieht das hellrothe Holz dem dunkelrothen vor.

Pelletier hat über dieses Holz Versuche angestellt. Wasser zeigt nur geringe Wirkung auf das Holz. Der rectificirte Stoff besitzt die allgemeinen Eigenschaften der Harze. Er löst sich kaum im kalten, leichter im kochenden Wasser, sehr leicht in Alkohol, in Aether, in der Essigsäure und in den Alkalien auf. In den fetten und ätherischen Oelen ist er unlöslich, ausgenommen im Lavendel- und Rosmarinöl, was ein sehr sonderbarer Charakter desselben ist.

In der Medicin wird von diesem Holze höchstens noch zu Zahnpulvern, desto häufiger aber in der Färbekunst Gebrauch gemacht.

Sapo domesticus. Hausseife.

Sapo Hispanicus albus. Weiße spanische Seife. Wird aus Natron und Olivenöl in chemischen Fabriken des südlichen Frankreichs und Spaniens bereitet.

Eine weiche, weiße, schlüpfrige Masse, in rectificirtem Weingeiste völlig auflöslich, im Wasser mit trüber, schaumiger Auflösung, aus den oben genannten Materien bestehend. Sie sey ohne ranzigen Geruch, immer trocken und leicht zu pulvern.

Die Bereitung der Seife scheint schon einige Jahrhunderte vor Christi Geburt bei den Hebräern und wahrscheinlich auch bei andern Völkern des Morgenlandes bekannt gewesen zu seyn, doch ist dieses noch zweifelhaft. Sicherer ist die Angabe, daß die Seife zuerst im ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung bekannt geworden sey, denn das Wort Seife (Sapo, σάπων) kommt zuerst in den Schriften des Plinius, welcher im ersten, und des Galen, welcher im zweiten Jahrhunderte lebte, vor, und wird wohl nicht mit Unrecht von dem alten deutschen Worte Sepe hergeleitet. Wie Plinius angiebt, ist die Seife eine Erfindung der alten Gallier, die sie aus Talg und Asche bereiteten.

Die Seifen sind im Allgemeinen Verbindungen der fettigen Substanzen mit einer alkalischen Grundlage in bestimmten Verhältnissen. Diese alkalischen Grundlagen können nicht allein Alkalien, sondern auch Erden und basische Metalloxyde seyn, und hiernach kann man die Seifen eintheilen in auflösliche und in unauflösliche Seifen. Nur das Kali, Natron und Ammoniak geben auflösliche Seifen, die Erden und die Oxyde schwerer, Metalle dagegen unauflösliche. Nur von den ersteren kann hier die Rede seyn. Die auflöslichen Seifen sind entweder hart, d. h. sie werden durchs Austrocknen an der Luft vollkommen starr und trocken, oder weich, d. h. sie werden an der Atmosphäre nie ganz trocken, sondern nehmen, wenn sie durch künstliche

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0790-8

Erwärmung ausgetrocknet worden sind, an der Luft durch Anziehen der Feuchtigkeit wieder eine schmierige Consistenz an, weswegen sie auch wohl Schmierseifen genannt werden. Nur diejenigen Seifen sind hart, welche das Natron mit dem Olivenöle, mit dem Mandelöle und mit einigen consistenteren thierischen Fettarten bildet. Die weichen Seifen werden durch Kali mit den schmierigen Oelen, als Rüb-, Hanf-, auch Leinöl, Fischthran u. s. w. gebildet.

Den Bildungsproceß der Seifen nennt man die Verseifung, oder Saponification, und er erfodert, daß die Alkalien im reinen, d. h. im ätzenden Zustande sich befinden. Dieses wird im Großen dadurch erreicht, daß die gepulverte Soda oder die Holzasche, Potasche, zu einem kegelförmigen Haufen aufgeschüttet wird, in dessen Spitze man eine Grube macht, und diese mit lebendigem Kalke füllt. Nachdem der Kalk durch Begießen mit Wasser zerfallen ist, wird er noch heiß mit der Soda oder Asche gut durch einander geschaufelt, und das Gemenge dann mit Wasser ausgelaugt, wodurch Laugen von verschiedener Stärke erhalten werden, die besonders Anwendung finden. Bei Bereitung der harten Seife wird das Oel in dem kupfernen oder eisernen Kessel erst mit schwacher, dann mit immer stärkerer Natronlauge gekocht, wo dann die Flüssigkeit erst milchig, dann gallertartig, später teigig wird, und sich endlich die Seife von körniger Consistenz auf der Oberfläche der Mutterlauge, welche die fremdartigen Salze der Soda aufgelöst enthält, ausscheidet; das Sieden wird aber noch einige Zeit fortgesetzt, um der Seife die gehörige Consistenz zu geben. Sobald sie diese erhalten hat, wird sie von der Mutterlauge in eine große hölzerne Form abgeschöpft, und darin zur Bezweckung der Gleichförmigkeit gut durcheinander gerührt. Nach einigem Uebertrocknen wird die Seife zur Beschleunigung des Austrocknens zerschnitten. Beim Verseifen des Talges mit Kalilauge wird die Seife, sobald sie gebildet ist, ausgesalzt, d. h. unter Zusatz von Kochsalz so lange gesotten, bis die Kaliseife (da das Kali nicht harte Seifen zu bilden vermag) sich in Natronseife (vermöge der Zersetzung des Kochsalzes durch Kali, welches durch nähere Verwandtschaft zur Salzsäure sich mit diesem verbindet und das Natron frei macht) verwandelt hat, welches man an dem griesigen Ansehen einer herausgenommenen Probe erkennt. Nun wird sie ausgeschöpft, durch grobe Leinwand oder durch ein feines Sieb in ein anderes Gefäß geseihet, und darin so lange stehen gelassen, bis sich die Unterlauge ganz abgesondert hat, worauf sie nochmals mit Lauge gekocht, wieder ausgesalzt und dann wie die vorige Seife behandelt wird.

Die französischen Seifenfabrikanten setzen dem Olivenöle gewöhnlich 0,20 Saamenöl zu, weil ohne diesen Zusatz die Seife griesig wird, sich nicht gut schneiden läßt, und keine glatte Schnittfläche bekommt. Hat man aus Glaubersalz bereitete Soda angewendet, so ist die zurückbleibende Seife von einem Gehalte an Alaunerde und schwefelwasserstoffs. Eisen sehr dunkel, beinahe schwarzblau gefärbt, und enthält nur 0,10 Wasser. Sie wird nun entweder in weiße oder in marmorirte Seife verwandelt. Das erste geschieht, indem

man sie in einer kleinen Menge heißer schwacher Aetzlauge zergehen läßt, worin sich eine eisenhaltige Alaunerdeseife zu Boden setzet, reine Seife sich als ein weißer Teig auf der Oberfläche ausscheidet, in die Form geschöpft wird, und nach dem Zerschneiden die Tafelseife giebt. Die Bereitung der weißen spanischen Seife soll daher auch nicht in metallenen Kesseln geschehen, sondern in von Mauersteinen mit einem gewissen Cäment gemachten und auf starken eisernen Stangen befestigten Pfannen. Um die Seife zu marmoriren, muß man ihr eine gehörige Menge warmer schwacher Lauge zusetzen, und sie dann in der Form nicht schnell und nicht zu langsam erkalten lassen, damit die schwarze eisenhaltige Alaunerdeseife durch eine Art von Krystallisation sich von der ganzen Masse absondern, und in einzelnen Adern zusammenziehen könne, welche dann der Seife das marmorirte Ansehn geben. Das Marmoriren geschieht auch wohl durch Einrühren von Eisenvitriol, den man entweder früher durch alkalische Lauge zersetzt hat, oder der diese Zersetzung beim Einrühren durch die in dem Seifenteige noch vorhandene Lauge erfährt; nach Andern wird auch die Farbe durch Indig oder Cochenille hervorgebracht. Diese Seifen werden in bedeutenden Mengen in den Ländern, in welchen das Baumöl gewonnen wird, als Portugal, Spanien, Italien und Frankreich verfertigt, und zu uns gebracht, daher die Benennungen: Spanische und venetische Seife.

Die gemeine weiße Seife (Sapo domesticus nostras) wird in unsern Seifensiedereien aus Potasche und Talg bereitet, und die Kaliseife durch Kochsalz zersetzt.

Die weichen oder Schmierseifen unterscheiden sich von den Natronseifen gewöhnlich nicht allein durch den beträchtlicheren Wassergehalt, durch die Consistenz und durch die größere Schärfe, sondern auch durch einen widrigen Geruch, weil man zu ihrer Verfertigung meistens nur die schlechtesten Oel- und Fettarten verwendet. Nach Verschiedenheit des Oels hat die Seife eine verschiedene Farbe, und Rüböl und Fischthran geben eine gelbe, Hanföl, so wie eine Mischung von Hanf-, Rüb- und Leinöl eine schmutzig grüne Seife, u. dergl. m. Wendet man angebrannte Fett- und Oelarten oder eine Potaschlauge an, die sehr viel brenzliges Oel enthält, so bekommt die Seife eine dunkelbraune Farbe, die man ihr öfters auch absichtlich durch Zusatz von etwas Eisenvitriol und Galläpfelaufguß (so wie die grüne Farbe durch Zusatz von Indig) ertheilt. Diese Schmierseife besitzt die Eigenschaft, sich mit dem Fette und anderm organischen Schmutze zu verbinden und sich in dieser Verbindung von den damit imprägnirten Körpern mit Wasser wegwaschen zu lassen, wegen des Gehalts an überschüssigem Kali noch in höheren Grade als die festeste und weißeste Natronseife. Ihre Bereitung kommt nämlich mit der Bereitung der festen Natronseifen darin überein, daß man das Oel oder Fett mit einer Aetzkalilauge so lange kocht, bis es sich ganz verseift hat, sie weicht aber darin ab, daß das Aussalzen unterlassen, und daß sich die gebildete Kaliseife von der Flüssigkeit nicht absondert, sondern immerfort darin aufgelöst bleibt, daß also selbst nach der Verseifung, dann nach dem Filtriren

durch Leinwand oder durch ein Sieb, dies Kochen so lange fortgesetzt werden muß, bis die Seife durch das Verdampfen des Wassers die gehörige Consistenz erhalten hat, worauf sie in Fässer oder andere Gefäße ausgeschöpft und so in den Handel gebracht wird. Diese Seife ist daher nicht allein immer etwas alkalisch, oder eigentlich eine Auflösung von Kaliseife in einer schwachen Aetzlauge, sondern enthält auch alle fremdartigen Salze, womit die zu ihrer Verfertigung verwendete Seifensiederlauge verunreinigt war.

Die Ammoniakseife ist als flüchtige Salbe (**Linimentum ammoniatum s. volatile**) bekannt. Die Baryt-, Strontian- und Kalkseifen sind in Wasser völlig unauflöslich. Unter den seifenartigen Verbindungen der Oele mit den Metalloxyden, als Mangan-, Wismuth-, Zink, Blei- und Queckſilberoxyd ꝛc. sind besonders die Verbindungen mit dem Bleioxyd von medicinischer Wichtigkeit, weil hierauf die Bereitung der Pflaster, Firnisse beruht.

Es war schon lange bekannt, daß das aus der Seife mittelst einer Säure ausgeschiedene Fett andere Eigenschaften besitzt, als es vor der Verseifung besaß, daß es z. B. in Alkohol auflöslich ist, daß es sauer reagirt ꝛc., welche letztere Eigenschaft man von einem kleinen Rückhalte der zur Ausscheidung angewendeten Säure herleitete. **Chevreul** (Schw. J. XIV. S. 420. u. N. J. IX. S. 172.; Trommsd. J. XXIV. 1. S. 237.; XXV. 2. S. 357. u. N. J. VI. 1. S. 252.) hat durch eine Reihe interessanter Versuche den Verseifungsproceß aufgeklärt.

Die Fette bestehen, wie schon bei dem Artikel **Adeps suillus** gezeigt ist, aus einer flüssigen und einer festen Substanz, aus Elaïne und Stearine. Diese beiden Bestandtheile gehen bei der Verseifung mit der alkalischen Basis eine Art salinischer Verbindung ein, oder vielmehr ihre entfernteren Bestandtheile (Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff) werden unter Beihülfe des Wassers durch die stark basischen Stoffe veranlaßt, sich in solchen Verhältnissen zu verbinden, daß zwei neue Säuren, die Oel- und die Talgsäure und eine andere nicht saure organische Verbindung, das sogenannte **Scheele**'sche Süß, gebildet werden, welche ersteren sich mit dem Alkali verbinden. Durch das mächtig elektro-positive Verhalten des Alkali, welches die entgegengesetzte elektrische Kraft sucht, werden die Fette zur elektro-negativen Thätigkeit aufgeregt, und hierdurch die erwähnten Säuren, damit das Kali mit diesen in Verbindung treten könne, gebildet, und gleichzeitig das süße Princip als ein drittes neues Product gebildet. Wir sehen demnach hier auf eine anschauliche Weise, wie sehr das chemische Verhalten der Stoffe durch die chemische Beschaffenheit derjenigen Stoffe, mit welchen sie in Verbindung gebracht werden, bestimmt wird, und wie im Allgemeinen die fetten Stoffe und Harze zur elektro-negativen Thätigkeit hinneigen, ohne daß sie deshalb zu den Säuren gezählt werden dürften. Denn wenn gleich hier durch das + E. der Alkalien das — E. der Fette so hervorgerufen und gesteigert worden ist, daß diese selbst zu Säuren werden, so können sie doch auch die Rolle des + Gliedes (also der Basis) in einer Verbindung übernehmen, wenn sie mit solchen Körpern in Berührung kommen, die mit mächtigern — E., z. B. die Schwe-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0793-6

felsäure und andere kräftige Säuren, ausgerüstet sind, in welchem Falle gleichfalls seifenartige Verbindungen, die sogenannten sauren Seifen, gebildet werden.

Die gewöhnlichen Seifen müssen wir demnach als Mischungen aus einem ölsauren und einem talgsauren Alkali betrachten, deren Verhältnisse durch die relativen Verhältnisse der beiden Säuren, in welchen diese aus dem angewandten Fette gebildet werden können, bestimmt werden. Es ist daher anzunehmen, daß die aus vegetabilischem Oele gebildeten Seifen zum größten Theile aus ölsaurem Alkali bestehen, wogegen die aus den festeren animalischen Fetten gebildeten Seifen größtentheils aus talgsaurem Alkali gebildet sind. Die Consistenz der Seife hängt aber nicht bloß von der Beschaffenheit der fetten Substanz, sondern, wie wir gesehen haben, auch von der Beschaffenheit der alkalischen Basis ab. Die Elaïne läßt sich weit leichter in Seife verwandeln, als die Stearine.

Die neugebildeten Säuren können aus diesen salzartigen Verbindungen abgeschieden werden, und zwar durch folgendes Verfahren: 100 Th. Schweineschmalz werden mit 60 Th. Aetzkali und 400 Th. Wasser so lange bis auf beinahe + 100 ° C. erwärmt gehalten, bis eine Probe der gebildeten Seife sich ganz im Wasser auflöset, wozu gewöhnlich 5—6 Stunden gehören. Nach abgelassener Mutterlauge wird die Seifenmasse in 600 Th. Wasser bei der Siedehitze aufgelöst. Die Auflösung gesteht beim Erkalten zu einer Gallerte. Diese Gallerte wird dann in viel kaltem Wasser vertheilt, und einige Tage hindurch ruhig stehen gelassen, wodurch sich eine perlmutterartig glänzende Materie absondert, welche saures talgsaures Kali ist. Dieses wird nun mit einem Uebermaße von schwacher, heißer Salzsäure zerlegt, die ausgeschiedene Talgsäure von der anhängenden Salzsäure und von dem salzs. Kali anfangs durch Waschen mit Wasser befreit, dann durch Auflösen in kochendem Alkohol und durch Krystallisation vollständig gereinigt. — Die Oelsäure erhält man, wenn man die Flüssigkeit, aus welcher sich das saure talgs. Kali abgeschieden hat, so weit abdampft, daß sie beim Erkalten wieder zu einer Gallerte gesteht, diese abermals in kaltem Wasser vertheilt, die sich noch ausscheidende perlmutterartige Materie abscheidet und dieses so lange wiederholt, bis die Flüssigkeit kein saures talgsaures Kali mehr, sondern bloß ölsaures Kali enthält. Dieses wird nun durch Weinsteinsäure zersetzt, wobei sich die noch mit etwas Talgsäure verunreinigte Oelsäure in weißen Klümpchen absondert. Um sie zu reinigen, wird sie nochmals mit dem vierten Theile Kali und mit 170 Th. Wasser verseift, das talgs. Kali auf die angeführte Weise abgeschieden, und das so gereinigte ölsaure Kali durch Weinsteinsäure zersetzt, wobei sich die reine Oelsäure ausscheidet, das Scheele'sche Süß aber nebst dem weinsteins. Kali in der Flüssigkeit bleibt. Das Scheele'sche Süß gewinnt man am besten bei der Bereitung des Bleipflasters.

Die Talgsäure ist von weißer Perlfarbe, geschmacklos; ihr Geruch ist schwach, und dem von geschmolzenem Wachse etwas ähnlich; ihr spec. Gew.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0794-2

ist etwas geringer, als das des Wassers. Bei 45,25 ° R. oder 56,56 ° C. schmilzt sie zu einer sehr klaren farblosen Flüssigkeit, welche sich beim Erkalten in glänzenden Nadeln von einer schön weißen Farbe krystallisirt. Im Wasser ist sie unauflöslich, sehr auflöslich aber in Alkohol, der sie beim Verdünnen mit Wasser wieder fallen läßt; 56 Th. Alkohol von 0,816 spec. Gew. lösen bei + 60 ° R. 100 Th. Talgsäure auf, die aber beim Erkalten des Alkohols zum Theil wieder herausfällt. Kalte Talgsäure verändert die Farbe des Lackmuspapiers nicht; erwärmt man sie aber so weit, daß sie weich wird, so röthet sie blaue Pflanzenfarben. Bei der trocknen Destillation wird sie nur zum Theil in die Producte zerlegt, welche alle Fettarten liefern, indem ein Theil unverändert übergeht. Mit den salzfähigen Basen geht sie Verbindungen ein und bildet Neutralsalze, von denen das talgs. Kali, Natron und Ammoniak auch in Wasser auflöslich sind, aber schon durch die Behandlung mit sehr vielem Wasser theilweise zerlegt werden, indem ein Theil als saures talgs. Salz zu Boden fällt, und nur ein Theil in dem alkalisch gewordenen Wasser aufgelöst bleibt; die sauren talgs. Salze sind sämmtlich in Wasser unauflöslich, in Alkohol aber auflöslich. Aus allen Salzen wird die Talgsäure durch alle übrigen Säuren leicht ausgetrieben.

Chevreul scheidet die Talgsäure noch in Margarinsäure und in Stearinsäure, und unterscheidet die letztere von der erstern ihr sehr nahe kommenden nur dadurch, daß sie erst bei 70 ° C. schmilzt und weniger Sauerstoff enthalten soll.

Die Oelsäure ist eine ölige Flüssigkeit ohne Geruch und Geschmack und von 0,914 spec. Gew., gesteht erst bei + 6,5 ° C. in weißen Nadeln, röthet im flüssigen Zustande Lackmus, ist in Wasser gar nicht, in Alkohol in jedem Verhältnisse auflöslich. Sie bildet gleichfalls Salze. Die ölsauren Salze sind weich, manchmal schon bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft tropfbar, oder doch bei gelinder Wärme schmelzbar; nur das neutrale ölsaure Kali, Natron und Ammoniak sind in Wasser, noch leichter in Alkohol auflöslich. Durch das Verhältniß dieser Salze in den Seifen wird die Consistenz derselben bestimmt; stearinsaures Natron giebt die härteste Art, oleïnsaures Kali die weichste Art Seife.

Außer diesen fixen Säuren erklärt Chevreul die riechenden Principe in den verschiedenen Seifenarten gleichfalls für Säuren, die aber den flüchtigen Oelen gleichen, und sich zu diesen eben so verhalten, wie die Stearin-, Margarin- und Oelsäure zu den fixen Oelen. Seife von Butter z. B. riecht nach Butter, Seife von Seehundsthran hat den Geruch des Thrans; Bockstalg in der Seife giebt ihr einen Bocksgeruch u. s. w. Dieser Riechstoff wird von eigenen Säuren gebildet, die mit dem Fette so innig verbunden sind, daß sie, so lange es noch frisch ist, nicht durch reagirende Mittel entdeckt werden können, sie bestehen darin, wie z. B. die Essigsäure in der Essignaphtha. Wird aber das Fett der Luft ausgesetzt, und fängt es an ranzig zu werden, oder wird es durch Alkalien verseift, so scheidet sich die Säure ab (bildet sich?), und giebt sich durch ihren eigenen Geruch zu erkennen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0795-8

Chevreul hat mehrere solcher Säuren ausgeschieden: die Delphin- oder Phocänsäure, die Buttersäure, die Säure im Bock- und Schaaffette (Acide hircique) u. s. w. Im Schweinefette fand er zwei Säuren, die noch nicht näher untersucht sind, von denen er aber glaubt, daß die eine von Stearine, die andere von Elaïne herrühre. Die ganze Classe dieser Körper kommt darin überein, daß sie flüchtig sind, Oelen gleichen, daß die meisten nur in geringer Menge in Wasser auflöslich sind, auf welchem sie schwimmen, in Alkohol sind sie in allen Verhältnissen auflöslich. Man gewinnt sie dadurch, daß man die Seifen mit verdünnter Weinsteinsäure zersetzt, und dann aus einer Retorte so weit destillirt, daß nichts anbrennen kann. Sie sind farblos, haben einen scharfen, sauren, hintennach ätherartigen Geschmack und den eigenthümlichen Geruch der Fettart, aus welcher sie gewonnen werden. Der Geruch, welchen sie den Seifenarten, in welchen sie enthalten sind, mittheilen, rührt davon her, daß ihre Salze im aufgelösten Zustande beständig in geringer Menge durch die Kohlensäure der Luft zersetzt werden, auf die Art, wie dies mit den essigs. Salzen geschieht, wobei die Essigsäure verdunstet, und den Geruch erzeugt; in trockner Form verändern sie sich nicht.

Eine gute Oliven- oder Talg-Natronseife hat eine gelblichweiße Farbe, einen eigenthümlichen schwachen, nicht unangenehmen Geruch, keinen sehr scharfen oder salzigen, sondern einen gelind alkalischen, mandelartigen Geschmack; ist in dünnen Spähnen durchscheinend; zwar etwas aber nicht bedeutend spec. schwerer als Wasser; fühlt sich trocken, keineswegs aber klebrig oder fettig an; zieht aus der Atmosphäre keine Feuchtigkeit an, sondern trocknet immer mehr aus, ohne dabei mit einer Salzhaut zu beschlagen; löst sich in reinem Wasser und Alkohol vollkommen auf, ohne einen Rückstand zu lassen; schmilzt über dem Feuer, blähet sich auf und wird zerlegt. Die Seife kann eine größere Menge Oel, Fett oder organischer Materie aufnehmen, und damit eine im Wasser leicht zertheilbare Emulsion machen, und hierauf gründet sich ihre Anwendung zum Waschen. Die Seife wird durch alle Säuren zerlegt, welche sich mit dem Alkali verbinden, und das veränderte Fett ausscheiden. Eben so wird die Seife beinahe durch alle Salze, mit Ausnahme der Kali- und Natronsalze, zerlegt, indem sich die Säure des Salzes mit dem Natron, die Basis des Salzes dagegen mit den Fettsäuren verbindet; ist die letzte Verbindung unauflöslich, so entsteht eine Trübung und später ein Niederschlag. Diese Zersetzung der Seife durch Neutralsalze, worüber Vauquelin und Herrmann (Schw. N. J. XVII. 2. 1826. S. 186.) belehrende Versuche mitgetheilt haben, macht nicht nur das sogenannte harte Wasser, sondern selbst das Seewasser zum Waschen untauglich; hier ist es aber nicht das Seesalz, welches zersetzend wirkt, sondern die entstehende Trübung bei der Auflösung in Seewasser rührt, wie Herrmann gezeigt hat, von den in dem Wasser enthaltenen erdigen Salzen, vorzüglich Bittererdesalzen, her. Man kann das Seewasser (und auch das harte Wasser) aber zum Waschen mit Seife tauglich machen, wenn man so lange Soda in dasselbe schüttet, als ein Niederschlag, bestehend aus Kalk- und Bittererde, er-

folgt. Die mineralischen Sauerbrunnen wirken vorzüglich durch ihren Gehalt an Kohlensäure auf die Seifen zersetzend.

Wird eine geistige Auflösung von Talgseife bis zu einer gewissen Stärke abgedampft, dann in eigenen Formen dem langsamen Erkalten überlassen, so gesteht sie zu einer durchscheinenden Gallerte, welche nach dem Trocknen selbst in halbzolldicken Tafeln noch durchscheinend bleibt: transparente Seife.

Pelletier fand die gewöhnliche französische Seife in 100 zusammengesetzt aus Natron 8,56; Fettigkeit 60,94; Wasser 30,50.

Die Seife wird in der Medicin zu Bereitung einiger äußerlicher Mittel angewendet.

Saponaria. Die Wurzel. Seifenkrautwurzel.

Saponaria officinalis Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Die verlängerte Wurzel (Wurzelstock), walzenförmig, bis 2 Linien dick, mit gegenüberstehenden Höckern aus den Ansätzen der Aeste, bei den Höckern mit Fasern besetzt, mit rothbrauner Oberhaut, äußerer dünner Rinde, einem ähnlich dünnen Holze, beide weißlich, und mit dickerem Marke. Sie muß nicht verwechselt werden mit der ziemlich ähnlichen, aber durch den Mangel der gegenüberstehenden Höcker zu unterscheidenden Wurzel von Euphorbia Cyparissias. Von der Wurzel der Lychnis dioica weicht sie durch die ganze Gestalt weit ab.

Saponaria officinalis Linn. Gemeines Seifenkraut.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 21. Caryophylleae.

Diese Pflanze wächst in den meisten Gegenden Deutschlands häufig.

Die kriechende, mehrere Fuß lange, runzlige Wurzel treibt mehrere aufrechte, ästige, ungefähr 2 Fuß hohe, feste, walzenrunde, knotige Stengel. Die gegenüberstehenden Blätter sind glatt, eirund-lancettförmig, etwas spitzig, ganz ungetheilt, fast aufsitzend, am Grunde schmäler und zusammengewachsen, mit fünf Längsnerven bezeichnet, von denen die drei mittleren am deutlichsten sind, und von grüner Farbe. Die weißen oder blaßröthlichen, kurzgestielten Blumen stehen in kleinen Büscheln in den Winkeln der obern Blätter sowohl des Stengels als der Zweige, und besitzen einen angenehmen Geruch. Der Kelch ist einblättrig, röhrig; die Blumenkrone ziemlich groß und besteht aus fünf stumpfen ausgeschnittenen Blättchen.

Die Pflanze blüht im Juni bis August.

Die Wurzel wird im Frühjahre ausgegraben, ist ohne merklichen Geruch, und besitzt einen anfangs süßlichen, schleimigen, dann aber bitterlich herben und etwas scharfen, kratzenden, lange anhaltenden Geschmack. Die

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0797-0

Abkochung zeichnet sich durch ihr Schäumen nach Art eines Seifenwassers aus; und kann auch wie dieses zum Auswaschen von Fettflecken benutzt werden. Sie hat eine hellbräunliche Farbe und ganz den eigenthümlichen Geschmack der Wurzel, die bis zur Wasserklarheit verdünnten Auflösungen der oxydirten Eisensalze, namentlich des salzs. und des salpeters. Eisens, werden dadurch gelb gefärbt, und es entsteht ein ziemlich reichlicher, anfangs weißer Niederschlag, der aber bald, so wie die darüber stehende Flüssigkeit, eine schmutzigrothe Farbe annimmt; mit essigs. Blei erfolgt ein weißer Niederschlag, der in Salpetersäure auflöslich ist; das Galläpfeldecoct wird nicht dadurch gefällt. Das Decoct hinterläßt nach dem Abrauchen eine sehr ansehnliche Menge Extract, zwei Unzen Wurzeln geben sechs Quentchen Extract. Weingeist zieht eine gelbrothe ins Bräunliche fallende Tinctur aus.

Bucholz (Taschenb. 1811. S. 33.) zog die Wurzel mit Weingeist aus, dampfte ab, und erhielt dadurch eine durchsichtige hell kolophoniumbraune Substanz, die er in Wasser auflöste, wobei sich ein schmieriges Harz absetzte. Die Auflösung schäumte beim Schütteln sehr stark, schmeckte süßlich, etwas zusammenziehend beißend, und im Halse anhaltend kratzend, wie die Senegawurzel. Den Wurzelrückstand kochte er mit Wasser aus, und erhielt eine blaßgelblich-bräunliche, auf dem Bruche muschlige, schwach süßlich-schleimig schmeckende Substanz, die sich wie Pflanzenschleim verhielt. 1000 Th. einer gehörig lufttrocknen Seifenwurzel enthalten demzufolge: Wasser 130; kratzenden Extractivstoff (Saponin) 340; schmieriges Harz (Weichharz) 2,5; Gummi mit wenig bassorinartigem Stoffe 330; verhärteten Extractivstoff 2,5; Faserstoff 222,5. S. = 1027,5. Der Ueberschuß von 27,5 rührt von den dargestellten Stoffen noch anhängenden Feuchtigkeit her. Auf den bassorinartigen Stoff schloß B. nur aus dem Ansehen des wäßrigen Decocts und dessen Rückstandes, welcher in seinen Theilchen ziemlich zusammenhing und gleichsam wie durch Traganthschleim zusammengeklebt aussah.

John hält den bassorinartigen Stoff für Inulin.

Dr. Osborne (Kastn. Archiv VIII. 3. 1826. S. 293.; Berl. Jahrb. XXVIII. S. 147.; Brandes's Archiv XX. 1. S. 58.) hat in der Saponaria einen vegetabilischen Grundstoff entdeckt, welcher Aehnlichkeit mit dem Pikrotoxin hat, sich aber genugsam durch andere Eigenschaften unterscheidet. Er wurde aus der Abkochung erhalten. Auf welche Weise, ist nicht angegeben. Der Geschmack desselben ist außerordentlich bitter, die Farbe weiß, er krystallisirt in strahligen und federartigen Prismen. Bei langsamer Anwendung der Wärme schmilzt er; bei verstärkter bläht er sich auf und wird schwarz. Er besitzt weder saure noch alkalische Eigenschaften. Mit Schwefelsäure erhitzt, wird er bald ganz zersetzt; ist in Aether und Alkohol, aber auch in kaltem Wasser (nicht ganz das Doppelte) löslich, in Terpenthinöl unlöslich. Nach dem Blühen lieferte die Pflanze diesen (problematischen) Stoff nicht mehr, daher die weitere Untersuchung ausgesetzt werden mußte. Die reinigende Eigenschaft der Pflanze, welche ihr den Namen erworben hat, rührt wahrscheinlich allein von einem klebrigen gummigen Stoffe her,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0798-6

welcher mit öligen Theilen zusammengerieben eine Emulsion giebt, und welcher auch die große Menge von Schaum erzeugt (?), die durch Bewegung der Abkochung entsteht.

Die Seifenkrautwurzel wird am zweckmäßigsten in der Abkochung und im Extracte verordnet. Bisweilen wird auch noch von dem Seifenkraute (Herba Saponariae) Gebrauch gemacht. Die Blätter haben keinen Geruch, aber einen etwas seifenhaften, schleimigen, dann strengen, kratzenden Geschmack, und werden im Juni eingesammelt.

Braconnot zerlegte den aus dem Kraute zu Ende der Blüthezeit ausgepreßten decantirten und zur Trockne abgedampften Saft; er erhielt Saponin nebst wenig essigs. Kali 73,0; in Weingeist, nicht in Wasser lösliche thierische Materie, nebst pflanzens. Kali 27,5; weißliche unbekannte Materie 2,5. S. = 103.

Sarsaparilla. Die Wurzel. Sarsaparillenwurzel.

Smilax syphilitica Humboldt. und andere Smilaxarten im südlichen Amerika.

Eine walzenförmige, einfache, sehr lange Wurzel, von der Dicke einer Schreibfeder, biegsam, der Länge nach runzlig, mit brauner Oberhaut, dünner brauner Rinde, einem etwas schwammigen weißen Holze und von fadem Geschmacke.

Smilax syphilitica Humb. Sarsaparille. Sassaparille.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 4. Hexandria.
Juss. Cl. III. Ord. 2. Asparagineae.

Die Sarsaparille wächst in Amerika; die ächte und wirksamste nach Humboldt am Oronoko. Sie ist eine kletternde, dornige Pflanze, die mit ihren mit Stacheln besetzten Ranken alle nahe stehenden Bäume und Sträucher umwindet. Die Wurzel besteht aus einem holzigen Wurzelstocke, welcher sehr hart, mehr oder weniger dick und mit vielen, oft 6 Fuß langen, federkielbicken und biegsamen Wurzelzasern besetzt ist, die nicht tief in die Erde gehen, sondern sich unter ihrer Oberfläche ausbreiten. Die Stengel sind rund, stark, mit kurzen pfriemenförmigen Stacheln versehen, die an der Basis des Blattstiels stehen. Die Blätter sind 1 — 1½ Zoll lang, länglich-lancettförmig, von starker fester Substanz, dunkelgrün und glänzend, übrigens glatt, mit drei Nerven der Länge nach durchzogen.

Von dieser Pflanze ist Smilax Sarsaparilla Linn. sehr weit verschieden, von welcher die Wurzeln fast gar nicht gebraucht werden. (Willdenow im Berl. Jahrb. 1806. S. 86.)

Um die Wurzeln zu sammeln, begießt man die Erde stark mit Wasser, und wenn diese recht durchfeuchtet ist, so zieht man die Wurzel mit eisernen Hacken aus. Auf diese Weise soll wenigstens in Mexiko die Honduras-Sarsaparille gesammelt werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0799-3

Unter den im Handel vorkommenden Arten Sarsaparillwurzel unterscheidet John Pope (Geiger's Magazin 1825. November. S. 149.) 1) Sarsaparille von Lissabon, welche jetzt im Handel für die beste gehalten wird, aus den brasilianischen Pflanzungen; äußerlich röthlich oder dunkelbraun, aufgeschnitten von weißem mehligem Ansehen; sie ist gewöhnlich freier von Holz und Fasern, als die andern Sorten. 2) Sarsaparille von Honduras, von der Honduras-Bai; schmutzigbraune, manchmal weißliche Rinde, nicht so roth, wie die erste, gewöhnlich fasriger und besitzt mehr Mark. Von Einigen der ersteren vorgezogen. 3) Sarsaparille von Veracruz; mager, dunkelgefärbt und faserig, schlechter als die vorigen. 4) Sarsaparille von Jamaika, seit kurzem in den Handel gebracht. Sie unterscheidet sich sehr von den andern Sorten in ihrem Ansehen; sie hat eine eigenthümlich dunkelrothe Rinde, und der zunächst unter der Rinde liegende Theil (Mark) ist mehr oder weniger von dunkelrother Farbe, daher sie auch den Namen führt rothmarkige Sarsaparille. (Ist wohl noch nicht häufig vorgekommen). Noch ist die falsche oder graue Sarsaparille zu nennen, die im Ansehn der brasilianischen ähnlich, einen bittern Nachgeschmack besitzt; besonders die großen Wurzeln zeigen in ihrem Gewebe viel purpurfarbene Flecken und kein weißes Meditullium. Sie stammt von Aralia nudicaulis ab. (Hufelands Journ. LI. Juni. 1stes Stück. S. 131.)

Sonst unterscheidet man auch im Allgemeinen die ungebundene und die gebundene Sassaparille. Die letztere kommt in 1 Fuß langen, circa 1½ Pf. schweren, an beiden Enden und in der Mitte zusammengebundenen Bündeln vor, die an ihren Enden den mit einem Kreise gezeichneten Durchschnitt der Wurzel zeigen, in ihrer Mitte aber die kleinen abgeschnittenen Enden und die Abgänge enthalten, im übrigen aber keinen Vorzug verdient.

Fontenelle hat in einigen Ballen Sarsaparille in der Mitte Bündel von Spargelwurzel gefunden, die im Aeußern viel Aehnlichkeit hat, aber ein wenig süßlich schmeckt, wogegen die Sarsaparille fast gar keinen Geschmack hat; das Innere ist klein und gelb.

Man hat bei der Sarsaparille darauf zu sehen, daß sie inwendig mehlig, gelblichweiß, nicht zerreiblich oder gar wurmstichig, sondern fest sey, und sich der Länge nach gut spalten lasse. Sie hat keinen Geruch, und beim Kauen einen schleimigen, kaum bittern, etwas kratzenden Geschmack.

Pfaff (Syst. der Mat. med. VII. S. 90.; und analytische Chemie II. S. 642.) zog das Pulver der Sarsaparille durch die Compressionspresse mit Wasser aus. Der Auszug hatte keinen Geruch und einen sehr wenig bittern, hintennach kratzenden Geschmack. Das gelblichbraune Extract wurde mit absolutem Alkohol ausgezogen, der Weingeist bis auf ⅔ abdestillirt, wobei sich nichts Krystallinisches absetzte, und durch völliges Verdampfen ein pulverisirbares, jedoch nicht sprödes, dunkelbraunes, geruchloses, schwach bitteres, hintennach stark kratzendes Extract erhalten, das Feuchtigkeit aus der Luft anzog. Schwefeläther zog ein schmieriges, klebriges, röthlichbraunes Extract von balsamischem Geruche und balsamischbittern Geschmacke aus, das

sich wie ein Balsamharz verhielt. Was der Schwefeläther nicht aufgelöst hatte, stellte eine dicke syrupähnliche Materie von schwarzbrauner Farbe dar. Ohne Zweifel hatte sie von dem nicht absoluten Aether etwas Wasser angezogen. Ihr Geschmack war sehr wenig bitter, aber im höchsten Grade kratzend.

Der Wurzelrückstand wurde dann mit Weingeist von 65 Procent ausgezogen, und dadurch ein schwarzbraunes, pulverisirbares, geruch- und fast geschmackloses, in Wasser leicht, in Alkohol und Aether unauflösliches Extract erhalten, welches sich wie gewöhnlicher Extractivstoff verhielt. Aus dem Rückstande nahm Wasser noch gummigen Extractivstoff auf; durch kochendes Wasser wurde etwas weniges Stärkemehl aufgelöst.

Vier Unzen Sarsaparillwurzel gaben: Balsamharz 38 Gran; kratzenden Extractivstoff 49 Gr.; chinabitterähnlichen Extractivstoff 1 Quentchen 12 Gr.; gemeinen Extractivstoff 3 Quentch. 3 Gr.; gummigen Extractivstoff 27 Gr.; Eiweißstoff 41 Gr.; Stärkemehl eine Spur; Holzfaser 3 Unzen; Feuchtigkeit (durch das Nachtrocknen) 56 Gr.; Verlust 14 Gr. S. = 4 Unzen.

Eine Unze Wurzeln hinterließ beim Einäschern 36 Gran Asche, bestehend aus: kohlens. Kali 12 Gr.; schwefels. Kali 1 Gr.; schwefels. Kalk 3 Gr.; kohlens. Kalk 9 Gr.; Eisenoxyd 3 Gr.; Kieselerde 8 Gr.

Prof. Galileo Palotta (Geig. Magazin. 1825. Februar. S. 140.) berichtet von einer neuen vegetabilischen salzfähigen Basis in der Sarsaparille, die mit dem Namen Parillin belegt und für das arzneiliche Princip der Wurzel ausgegeben wird. Die Darstellung geschah auf die Weise, daß der wäßrige Auszug mit Kalkwasser versetzt, der Niederschlag abgesondert und nach dem Trocknen mit Alkohol ausgezogen wurde. Durch Abziehen des Weingeistes und Verdampfen wird das Parillin als eine solide, compacte, leicht zerfließliche Substanz, zuerst von weißer, das spätere von dunkler Farbe erhalten, welches noch gereinigt werden muß.

Das Parillin ist weiß, pulverartig, leicht und an der atmosphärischen Luft unveränderlich. Der Geschmack ist bitter, sehr herbe, ein wenig adstringirend und nauseos, der Geruch ist eigenthümlich. Es ist specifisch schwerer als Wasser. Im kalten Wasser unauflöslich, in heißem Wasser wenig auflöslich; in kaltem Alkohol wenig auflöslich, in siedendem Alkohol auflöslich. Das unreine ist in Wasser und Alkohol auflöslich. Das Lackmuspapier wird schwach geröthet. In der Wärme zersetzt es sich; vorher schmilzt es, wird schwarz, behält aber noch seine Bitterkeit. Die concentrirte Schwefelsäure zersetzt das Parillin; mit der verdünnten bildet dieses ein Salz. Alle Säuren vereinigen sich mit dem Parillin und bilden Salze. In den von Palotta an sich selbst angestellten Versuchen über die Wirksamkeit des Parillins zu 2, 6, 8, 10 und 18 Granen genommen, zeigte es sich als ein deprimirendes Mittel, oder, daß es im Allgemeinen schwächend auf die Lebensthätigkeit wirke, und daß diese Kraft mit der Dosis zunehme, so wie auch, daß diese Substanz die reizende Kraft mit der deprimirenden vereint besitze. Aus andern Gründen ist Palotta der Meinung, daß das Parillin ein Diaphoreticum sey, und endlich, daß es vorzüglich auf das lymphatische System wirke. ꝛc.

Versuche von Planche geben keine bestätigenden Resultate für das Parillin, welches auch gar nicht dargestellt werden konnte.

Die Sarsaparille wird nur in der Abkochung verordnet.

Sassafras. Das Holz. Sassafrasholz. Fenchelholz.

Laurus Sassafras Linn. Ein in Pennsylvanien, Carolina, Virginien und Florida einheimischer Strauch.

Die große ästige Wurzel, in größeren oder kleineren Stücken im Handel vorkommend, mit einer runzligen Oberhaut, äußerer rostfarbiger und innerer faseriger Rinde, schwammigem aus Ringeln zusammengefügtem Holze, außen braun, innen blässer, von süßlichem Geschmacke und fenchelartigem Geruche.

Laurus Sassafras Linn. Sassafraslorbeer.

Linn. Cl. IX. Enneandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. IV. Ord. 4. Laurineae.

Dieser Baum, dessen Höhe und Dicke sich nach dem Boden und Klima richtet, in welchem er wächst, und welcher in den wärmeren, ihm günstigeren Gegenden Amerikas eine Höhe von 20—30 Fuß erreicht, findet sich sehr häufig in den Wäldern von Virginien u. s. w., so wie auch in Cochinchina. In England und Holland wird er mitunter im Freien gezogen. Da jedoch die jüngeren Pflanzen besonders sehr zärtlich sind, selbst schon mehr erwachsene Stämme eine beschützte Lage erfodern, und bei harten Wintern demnach sehr leiden, so hält man ihn bei uns in Gewächshäusern. In seinem Vaterlande vermehrt er sich sehr stark, theils durch die sich weit ausbreitenden Wurzeln und Wurzelsprossen, theils aus den Saamen.

Er bildet einen schön belaubten sehr ausgebreiteten Wipfel. Die Zweige sind von gelbbrauner Farbe und glatt. Die abwechselnden, gestielten Blätter sind von verschiedener Größe und Gestalt, bald ungetheilt, bald zwei- oder dreilappig, bald oval, etwas stumpf und nach dem Grunde zu verschmälert, ganzrandig, unbestimmt nervig, bald fast herzförmig, mit 2 oder 3 Längsnerven. Sie sind oben grün, unten weißlich, und nebst den blättertragenden Aesten behaart. Die kleinen, gelben, angenehm riechenden Blumen stehen in kurzen aufrechten Doldentrauben; sie sind gewöhnlich ganz getrennten Geschlechts, jedoch finden sich auch Zwitterblüthen.

Der Baum blüht im Mai und Juni.

Die Wurzel dieses Baumes kommt als Sassafrasholz zu uns, in großen, dicken, ästigen, knolligen, zum Theil noch mit der Rinde bedeckten, zum Theil davon entblößten Stücken, deren holzige Substanz weich und beinahe schwammig ist, eine gelbe oder fahlbräunliche, ins Rothe fallende Farbe, und einen süßlichen, gewürzhaften etwas scharfen Geschmack und fenchelartigen Geruch hat. Statt des Wurzelholzes wird auch das Holz vom Stamme und den Zweigen genommen, welches weniger ästig ist, dem Wurzelholze an

Wirksamkeit sehr nachsteht, und daher, so wie die veralteten, geruch- und geschmacklosen Stücke des Wurzelholzes zu verwerfen sind.

Für wirksamer als das Holz wird die Rinde gehalten, daher diese auch abgesondert, als Sassafrasrinde (Cortex ligni Sassafras), im Handel vorkommt. Sie ist dick, leicht, schwammig, zerbrechlich, runzlig, graulichbraunroth, innen rostfarbig, und zeigt den erwähnten Geruch und Geschmack in erhöhtem Grade. Guibourt hat auf der innern Seite der Rinde viele ganz kleine, weiße, glänzende und durchsichtige Krystalle bemerkt, die ihm auf den ersten Anblick den auf den Pichurimbohnen bemerkten ganz ähnlich vorkamen.

Der vorzüglich wirksame Bestandtheil bei Holz und Rinde ist das ätherische Oel, von welchem aus 16 Unzen ungefähr ein halbes Loth erhalten wird. Das Holz brennt daher auch sehr lebhaft in Feuer. Der wäßrige Aufguß ist roth, hat den Geruch und Geschmack des Holzes, und erhält durch schwefels. Eisen eine olivengrüne Farbe. Der geistige Auszug ist dunkelroth, und giebt gelind verdampft ein dunkelbraunes Extract, in welchem das ätherische Oel den harzigen Theilen und dem Gerbestoffe beigemischt bleibt, wovon es schmierig ist und einen sehr scharfen, aromatischen, dabei etwas herben und gelind bittern Geschmack hat. Eine Unze Holz giebt etwa 1 Quentchen und 50 Gran geistiges Extract, wogegen durch den wäßrigen Auszug von einer Unze erhalten werden 2 Quentchen eines braunrothen, nicht aromatischen, sondern bitterlich herbe schmeckenden Extractes.

Das Sassafrasholz wird am zweckmäßigsten im warmen Aufgusse verordnet, weil bei dem Kochen die aromatisch-flüchtigen Theile fast ganz verloren gehen.

Das Sassafrasöl (Oleum ligni Sassafras), welches durch Destillation des Holzes mit Wasser gewonnen wird, ist im frischen Zustande so hell wie Wasser; es sinkt im Wasser zu Boden und ist nach Fr. Hoffmann noch specifisch schwerer als das Gewürznelkenöl. Muschenbröck bestimmte das spec. Gew. desselben auf 1,094, nach neueren Wägungen von Bender ist es aber nur 1,032. Es ist von dem kräftigsten und feinsten Sassafrasgeruche, und ähnlichem sehr feurigem Geschmacke. 1 Th. wird von 2 Th. Weingeist vollkommen aufgelöst. Mit der Zeit wird es gelb und endlich roth, und bildet dann einen krystallinischen Absatz. Es kommt bisweilen verfälscht vor; fette Oele werden durch Auflösen in Weingeist, andere ätherische Oele, als Terpenthinöl, beim Verflüchtigen auf einem heißen Bleche durch den Geruch erkannt.

Scammonium Halepense. Aleppisches Scammonium.

Ein an der Luft verdichteter Saft von Convolvulus Scammonia Linn.?, einer perennirenden orientalischen, vorzüglich in Syrien häufigen Pflanze.

Ein Gummiharz in aschgrauen, leichten, porösen, undurchsich-

tigen, unscheinbaren, auf dem Bruche wenig glänzenden, trocknen und nicht fettigen, befeuchtet grünlich milchenden Stücken von scharfem brennendem Geschmacke. In Wasser wird es zum Theil mit grünlich trüber, in höchst rectificirtem Weingeiste zum Theil mit klarer Auflösung aufgelöst. Das in schwärzlichen Kuchen im Handel vorkommende werde verworfen. Die Gabe bis zu sechs Gran.

Convolvulus Scammonia Linn. Purgirwinde.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 10. Convolvulaceae.

Diese Pflanze, die unserer gemeinen Heckenwinde ähnlich ist, findet sich an ähnlichen Standorten auf der Insel Rhodus, auf den Bergen von Aethiopien, auf dem Libanon und auf dem Berge Taurus in Syrien, überhaupt in mehreren Gegenden des Orients.

Die Wurzel ist stark, lang, spindelförmig, fleischig, gelblich und mit einem drastischen Milchsafte erfüllt. Aus ihr steigen krautartige, einjährige schlanke Stengel windend 4—5 Fuß in die Höhe; sie sind nach unten etwas eckig, oben rund und glatt. Die Blätter, welche abwechselnd an rinnenförmigen Blattstielen herabhängen, sind ungefähr 2 Zoll lang, pfeilförmig, spitz, glatt und ganzrandig. Die Blüthenstiele kommen einzeln aus den Winkeln der Blätter. Die Kelchabschnitte sind glatt, stumpf, oft ausgerandet und bleibend. Die Blumenkrone ist ungefähr einen Zoll lang, weit offen, gelblichweiß mit purpurfarbigen Streifen.

Der aus schiefen Einschnitten in die von der Erde entblößten Wurzelköpfe in ein untergesetztes Gefäß ausfließende, und an der Luft erhärtete Milchsaft ist das Scammonium von Aleppo. Aus jeder Pflanze soll man nur wenige Quentchen Saft erhalten. Es kommt in den beschriebenen Massen vor, hat einen widrigen, bittern, scharfen Geschmack. Das Pulver ist hellgrau.

Eine um vieles schlechtere Sorte Scammonium kommt vor unter dem Namen smyrnisches oder auch antiochisches Scammonium. Nach Einigen wird dieses durch Eindicken des ausgepreßten Saftes von derselben Pflanze gewonnen; nach Andern ist **Periploca Secamone** (zu den Apocyneen gehörig), oder auch **Cynanchum monspeliacum** (zu derselben Pflanzenfamilie gehörig) die Mutterpflanze (aus dieser Pflanze soll in Frankreich Scammonium bereitet werden), sowie denn auch das smyrnische Scammonium von dem antiochischen unterschieden, und das letztere als die schlechteste Sorte angegeben wird. Murray giebt an, daß es aus andern Windenarten, aus Arten von **Apocynum**, **Euphorbia** und ähnlichen milchenden Pflanzen abstamme. Im Handel kommt die schlechtere Sorte Scammonium allein als smyrnisches vor. Dieses besteht mehr aus platten Kuchen, hat ein festeres, dichteres, nicht löcheriges Gewebe, ist schwerer, hat eine mehr schwärzliche

Farbe, einen ebenen etwas glänzenden Bruch und läßt sich nicht gut zerreiben.

Das aleppische Scammonium schmilzt in der Hitze, und sein Pulver vereinigt sich beim Kochen mit Wasser; das smyrnische, dessen Pulver beim Kochen sich nicht vereinigt, sondern krümlich wird, schmilzt nur unvollkommen in der Hitze. Die geistige Tinctur röthet das Lackmuspapier, welche Eigenschaft sie aber mit den mehresten geistigen Auflösungen der Harze gemein hat. Mit Wasser zerrieben bildet das Scammonium eine schmutzig grünlichgelbe Milch; in Kalilauge löst es sich auf; bei der trocknen Destillation liefert es ein braunes sehr saures Wasser, leichtes, schwärzliches Oel und dichte, schwarze glänzende Kohle, welche nach dem Einäschern kohlens. Kali, kohlens. Kalk, Alaunerde, Kieselerde und Eisenoxyd liefert.

Bouillon Lagrange und Vogel (Trommsd. J. XIX. 2. S. 133.) haben das Scammonium zerlegt, und darin gefunden: gelbes, durchscheinendes und zerreibliches Harz, leicht in Weingeist löslich, 60; Gummi 3; bittern Extractivstoff, in Wasser und Alkohol löslich, 2; vegetabilischen Rückstand und erdige Theile (Sand) 35. S. = 100. Das Mengenverhältniß zeigte sich aber auch verschieden nach Beschaffenheit der untersuchten Substanz. Das smyrnische Scammonium enthielt: braunes durchscheinendes Harz, schwieriger zu zerreiben, 29; Gummi 8; bittern Extractivstoff 5; vegetabilische Ueberreste u. s. w. 58. S. = 100.

Dieses Gummiharz, welches ehemals auch Diagrydium genannt, ist ein äußerst heftig wirkendes, drastisches Purgirmittel, dessen Anwendung Vorsicht erfodert, aber auch beinahe ganz aufgehört hat, indem auch das beste Scammonium dem Wurmfraße unterworfen ist, wodurch die harzigen purgirenden Bestandtheile in größerem Verhältnisse zurückbleiben, es also sowohl dadurch, als durch die häufigen Verfälschungen ein unsicheres Mittel wird.

Scilla. Die Wurzel oder Zwiebel. Meerzwiebel.

Scilla maritima Linn. Eine ausdauernde im mittägigen Europa häufige Pflanze.

Die weißlichen an der Basis röthlich werdenden, bis 2 Zoll langen und breiten, 1—2 Linien dicken Schuppen der Zwiebel, von sehr scharfem Geschmacke. Es kommen auch die ganzen nicht getrockneten, mit einer braunrothen Oberhaut bekleideten, von einem schleimigen sehr scharfen Safte strotzenden Zwiebeln vor. Die Gabe bis zu vier Gran.

Scilla maritima Linn. Gemeine Meerzwiebel.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 6. Liliaceae.

Die gemeine Meerzwiebel wächst an den sandigen Küsten des mittelländischen Meeres, an den Ufern von Sicilien, Frankreich, Spanien, Portugal,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0805-9

Syrien und dem nördlichen Afrika. Die Wurzel ist eine birnförmige Zwiebel, welche von der Größe einer Faust bis zu der eines Kinderkopfes oft ein Gewicht von 1—4 Pfund erreicht. Sie ist mit über einander liegenden Schuppen besetzt. An ihrer engern rundlichen Basis bilden sich zahlreiche, dicke, fleischige Wurzelfasern. Ihr Körper ist breiter, und verliert sich in eine gerade, in die Höhe gehende Spitze. Die Blätter kommen aus der Wurzel, sind breit, stumpf, glatt, etwas fleischig, oval-lancettförmig, dunkelgrün. Noch vor den Blättern bildet sich der Schaft, welcher einfach, gerade, 3—4 Fuß hoch, beinahe um die Hälfte seiner Länge mit zahlreichen, weißen, langgestielten Blümchen geziert ist, jede Blume besteht aus einer sechsblättrigen Krone ohne Kelch.

Die Pflanze blüht im August und September.

Die Zwiebel ist äußerlich bei jungen Pflanzen mit mehr weißlichen, bei ältern aber mit braunröthlichen aus dünnen trocknen Schuppen bestehenden gestreiften Häutchen bedeckt, inwendig besteht sie aus vielen breiten, dicken, an den Seiten dünnen, nervigen, weißen, fleischigen, meist ins Grünliche spielenden Schuppen, die im frischen Zustande sehr reichlich mit einem dickschleimigen, weißen, sehr scharfen, an den Händen Jucken, Brennen und Blasen erregenden Safte angefüllt sind. Ihr Geruch ist zwar unbedeutend, jedoch dem der gewöhnlichen Zwiebel nicht ganz unähnlich, und reizt sowohl das Auge als auch die Nase. Ihr Geschmack ist anfangs schleimig, dann aber scharf, sehr bitter und ekelhaft.

Zum Gebrauche werden eigentlich nur die mittleren Schuppen gezogen, denn sowohl die trocknen äußern, als die sehr schleimigen innersten Häute werden als unbrauchbar verworfen. Um diese mittleren Schuppen zu trocknen, werden dieselben in Streifen geschnitten, eingefädelt und in einer Stube aufgehangen. Hier müssen sie lange hängen bleiben, damit man gewiß sey, daß sie gehörig trocken sind. Diese getrockneten Schuppen sind länglich, etwas durchscheinend, zerbrechlich, weißlich, inwendig glatt und mit Linien durchzogen. Beim Kauen sind sie zähe, sehr bitter, lassen jedoch keine Schärfe mehr bemerken. Sie müssen an einem trocknen Orte aufbewahrt werden, weil sie stark die Feuchtigkeit der Luft anziehen.

Nach den ältern Versuchen von Trommsdorff und Athanasius (Trommsd. J. I. S. 205. und III. 1. S. 156.) stellte Vogel (Schw. J. VI. S. 101.) analytische Versuche über die Meerzwiebel an. Er bestätigte die schon früher gemachte Erfahrung von der brennenerregenden Eigenschaft der frischen Wurzel. Der ausgepreßte Saft war milchig, und lief nur langsam durchs Filtrirpapier. Er ist ausnehmend bitter, durch Alkohol wird er gefällt; der Niederschlag löst sich aber in wenigem kalten Wasser wieder auf. Die thierische Gallerte erzeugt einen häufigen, nicht in kaltem wohl aber in kochendem Wasser auflöslichen Niederschlag; schwefels. Eisen bewirkt einen grünschwarzen Niederschlag; essigs. Blei eine sehr reichliche Fällung in gelben Flocken; kleesaures Ammoniak einen mehr körnigen Niederschlag. Diese vorläufigen Versuche deuteten auf Gerbestoff, Extractivstoff und ein Kalksalz.

Bei der Destillation des frischen Saftes wurde kein scharfes Destillat erhalten, auch war das zurückgebliebene Extract ohne Schärfe. (Nach Athanasius röthete das Destillat kaum das Lackmuspapier, war von kaum merklichem Geruche und Geschmacke, bewirkte jedoch im Schlunde einen Reiz.) Vogel trank 6 Unzen des destillirten Wassers ohne die geringste nachtheilige Wirkung (nach Gren und Athanasius starb ein Kaninchen von 2 Unzen desselben binnen 6 Stunden).

Der Meerzwiebelsaft wird unter dem Aufwallen röthlich, und setzt beim Erkalten citronensauren Kalk ab. Die bis zur Honigdicke abgerauchte bittere Masse wurde durch kochenden Alkohol von allem Extractivstoffe erschöpft. Der Rückstand war weiß, nach dem Austrocknen spröde, und überhaupt ein Gummi. Die geistige Lösung gab ein Extract, das eine innige Vereinigung von Gerbestoff mit einer eigenthümlichen sehr bittern Substanz war. Um sie von einander zu trennen, wurde die Auflösung mit essigs. Blei gefällt. Die wasserhelle aber sehr bittere Flüssigkeit gab nach dem Abrauchen eine weiße durchsichtige Substanz von harzigem Bruche, die sich zu Pulver reiben ließ, aber bald Feuchtigkeit anzog. Absoluter Alkohol, Wasser und Essig lösen diese Substanz auf. Die Auflösung ist ungemein bitter, von einem süßen Nachgeschmacke. In einem Tiegel erhitzt, verbreitet sie den Geruch nach verbranntem Zucker. Mit Hefen versetzt geht sie in die geistige Gährung über; Vogel schließt hiernach auf einen Antheil Zucker. Die Zerfließlichkeit möchte von einigen Salzen abhängen. Vogel giebt ihr, als einer eigenthümlichen (wohl noch zusammengesetzten) Materie den Namen Scillitin; in ihr liegen die Heilkräfte der Meerzwiebel. Was mit dem Blei niedergefallen war, verhielt sich nach dem Abscheiden durch Schwefelwasserstoffgas wie eisengrünender Gerbestoff.

In 100 Th. der getrockneten Meerzwiebel läßt sich das ungefähre Verhältniß der Bestandtheile so bestimmen: Pflanzenschleim 6; eigenthümlicher bitterer Extractivstoff 35; Gerbestoff 24; citronens. Kalk, Zucker und Faserstoff 30. S. = 95. Athanasius hatte auch Satzmehl erhalten, welches mit heißem Wasser Kleister gab. Den scharfen ätzenden Stoff konnte Vogel nicht darstellen. Dieser ist aber auch selbst noch in der getrockneten Zwiebel zum Theil vorhanden, denn das Pulver als Breiumschlag aufgelegt wirkt rothmachend.

Die verkohlten Meerzwiebeln lassen sich leicht einäschern. Die Asche fand Vauquelin größtentheils aus kohlens. Kalke bestehend.

Buchner (Berl. Jahrb. 1811. S. 1.) hat eine vergleichende Untersuchung der ächten Meerzwiebeln mit Zwiebeln, die unter dem Namen französischer Meerzwiebeln im Handel vorkamen, angestellt, und giebt die Bestandtheile der ächten Meerzwiebel in 4 Unzen folgendermaßen an: Wasser 1517 Gran; Extractivstoff 182; Schleim 76; besonderer krystallinischer Stoff, welcher sich aus dem Safte der zerquetschten Meerzwiebeln in der Ruhe absondert hatte, auf der Haut Jucken erregte, der aber später als phosphors. Kalk erkannt wurde, dem der juckenerregende nicht abzuscheidende Stoff beigemischt war, 6; gallertartiger Stoff 18; Faserstoff 65.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0807-0

Pfaff erhielt aus der Meerzwiebel mit höchstrectificirtem Weingeiste eine bräunlich-rothe Tinctur, welche die widrige Bitterkeit der Meerzwiebel in hohem Grade besaß, und durch Wasser etwas getrübt wurde.

Die Meerzwiebel erregt in zu großen Gaben heftiges Erbrechen und andere üble Zufälle. Die kräftigste Form ihrer Anwendung ist wohl das Pulver; dieses muß jedoch nicht auf zu lange Zeit vorräthig gehalten werden, auch muß das Trocknen vorsichtig geschehen, und das Pulver in einem gut verschlossenen Glase an einem trocknen Orte aufbewahrt werden, weil es sonst feucht wird und verdirbt. Mit Essig und mit Honig giebt sie gleichfalls sehr kräftige Mittel, den Meerzwiebelessig und den Meerzwiebelsauerhonig. Eine sehr wirksame Form würde unstreitig auch das aus dem frisch ausgepreßten Safte durch vorsichtiges Eindampfen bereitete trockne Extract seyn.

Scordium. Das Kraut. Lachenknoblauchkraut.

Teucrium Scordium Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Ein bitteres Kraut, von etwas knoblauchartigem Geruche, mit gegenüberstehenden, länglichen, sitzenden, grob gesägten, borstigen Blättern. Im Monat Juni einzusammeln.

Teucrium Scordium Linn. Der Knoblauchsgamander. Lachenknoblauch.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Lachenknoblauch wächst in Deutschland und den übrigen Ländern Europas in feuchten Gräben und Wiesen, an Quellen und Flüssen, überhaupt an sumpfigen wäßrigen Orten.

Die Wurzel ist faserig und kriechend. Die schwachen, etwas viereckigen feinhaarigen Stengel sind gewöhnlich am Grunde auf dem Boden liegend, weitschweifig, wenig ästig und fast 1½ Fuß lang. Die etwas runzligen, weißlich-grünen Blätter sind fast 1 Zoll lang. Die wenig zahlreichen Blumen sind hell- oder bläulichroth, und stehen auf kurzen Stielen, gewöhnlich zu 2, zuweilen zu 4 in den Blattwinkeln beisammen. Der Kelch ist röhrig, einblättrig, fünfzähnig; die rachenförmige Blume einblättrig, die Oberlippe zweilappig, die Unterlippe dreilappig.

Die Blüthezeit ist Juni und August.

Man sammelt gewöhnlich die ganze Pflanze mit den Stengeln und Blättern im Juni vor der Blüthe. Im frischen Zustande besitzt das Kraut einen starken gewürzhaften, aber nicht unangenehmen, obgleich knoblauchartigen Geruch, und einen sehr bittern, etwas scharfen und gelind zusammenziehenden Geschmack. Der Geruch vermindert sich beim Trocknen, der Geschmack wird unangenehmer. Der Aufguß hat den Geruch und Geschmack des Aufgusses, und wird durch schwefels. Eisen schwärzlich gefärbt.

Der Lachenknoblauch wird gewöhnlich nur noch äußerlich angewendet, und zu Gurgelwässern im Aufgusse verordnet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0808-6

* Scorzonera. Die Wurzel. Scorzonerwurzel.

Scorzonera hispanica Linn. Spanische Scorzonera. Gartenhaberwurz.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.
Juss. Cl. X. Ord. 1. Cichoraceae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst in Spanien, Ungarn, Sibirien, Palästina, auch in Deutschland in bergigen Gegenden, und wird bei uns ihrer Wurzeln wegen häufig in Gärten und auf Feldern angebaut.

Die Wurzel ist spindelförmig, eine Spanne lang, auch wohl länger, ungefähr einen Zoll dick, zaserig, fleischig, äußerlich mit einer schwarzen Haut bedeckt, mit ringförmigen Runzeln besetzt, und inwendig von weißer Farbe. Der aufrechte Stengel ist 2—3 Fuß hoch, unten ästig, walzenförmig, glatt, und dient den abwechselnden sitzenden, eirund-lancettförmigen, spitzen, am Grunde verschmälerten, ganzrandigen, blaßgrünen Blättern zur Anheftung. Die Blumen sind groß, glänzend gelb und stehen am Ende der Stengelverzweigungen. Sie bestehen aus bloßen fruchtbaren und zwitterigen Halbröhrchen.

Die Scorzonere blüht im Juni und Juli.

Die Wurzel besitzt im frischen Zustande, so wie die ganze Pflanze, einen milchartigen Saft, der beim Zerbrechen herausfließt. Sie ist geruchlos, und schmeckt angenehm zuckerartig-mehlig, getrocknet aber verliert sie den Geschmack, wird schleimig und röthlich. Frisch gekocht giebt sie eine angenehme Speise. Nach Juch enthalten 100 Th. frischer Scorzonerwurzel: Wasser 80; Stärkemehl 11; ätherisches Oel 5; (?) Extractivstoff.

Statt dieser ächten Scorzonere, welche als Heilmittel wohl eigentlich keine Berücksichtigung mehr verdient, wird bisweilen die Wurzel von **Scorzonera humilis**, die bei uns auf Wiesen wild wächst, eingesammelt; sie ist weit holziger, größer, und besitzt einen bitterlichen herben Geschmack.

Sebum ovillum. Hammeltalg.

Ovis Aries Linn. Gemeines Schaaf.

Hammeltalg ist von fester Consistenz, weiß, frisch geruchlos, nimmt aber nach und nach, jedoch später als die flüssigen Fette, an der Luft einen unangenehmen Geruch an, ist von mildem Geschmacke, der aber nach und nach unangenehm und scharf wird. Ein solcher ranziger Talg röthet das Lackmus, giebt bei der Destillation mit Wasser ein ranzig riechendes und Essigsäure haltendes Destillat, und tritt an das Wasser eine Säure und eine in Weingeist lösliche, den Bleizucker fällende und die Galläpfeltinctur trübende (thierische?) Materie ab, worauf der ausgekochte Talg nicht mehr ranzig schmeckt, aber fester ist. Er gesteht nach dem Schmelzen bei 40 ° R. und löst sich in 44 Th. kochenden Alkohols auf. Seine nächsten Bestandtheile sind viel Talg- und wenig Oelstoff (siehe Adeps); die letzten nach Chevreul: Kohlenstoff 78,99; Wasserstoff 11,70 und Sauerstoff 9,31. Durch das Verseifen geben 100 Th. Hammeltalg 96,5 Oel- und Talgsäure. Das

riechende Princip des Hammeltalgs ist nach Chevreul eine eigene Säure von flüchtig öliger Natur, die er Hircinsäure nennt (siehe Sapo).

Die Lichtfabricanten sollen den Talg von im Sommer geschlachtetem Vieh dem von im Winter geschlachtem Vieh erhaltenen, der größern Härte wegen, den Vorzug geben; das Elaïn soll nämlich dem Schweiße des Rindviehes sich mittheilen, hierdurch ein großer Theil desselben durch die Poren der Haut ausgesondert und somit der Talg reichhaltiger an Stearine werden.

Der Talg findet sich zwar vorzugsweise nur in den thierischen Fetten, doch kommt er auch im vegetabilischen und im Mineralreiche vor. Ein vegetabilischer Talg wird aus der Frucht eines Baumes, Vateria indica genannt, gewonnen, der in Canara und andern Provinzen auf der Ostküste der vorderindischen Halbinsel wächst. Das Pfund dieses Talgs kostet zu Mangalore ungefähr 2½ Pence, und wird von den Engländern Piney-tallow genannt. Dieser Talg wird von den Eingebornen nicht zu Kerzen, sondern in medicinischer Hinsicht zu Pflastern und auch zum Verpichen der Böte gebraucht. Doch hat er sich auch bei den damit angestellten Versuchen als sehr brauchbar zur Verfertigung von Lichten empfohlen, da die daraus verfertigten Lichte sehr hell brennen, auch beim Auslöschen keinen unangenehmen Geruch verbreiten, so wie die aus dem besten animalischen Talge gezogenen Lichte. Einer Analyse zufolge besteht der vegetabilische Talg aus 10 At. Kohlenstoff (7,5 × 10 = 75), 9 At. Wasserstoff (1,25 × 9 = 11,25) und 1 At. Sauerstoff (= 10) (S. 96,25). Hiernach berechnet ergiebt sich folgendes Verhältniß der Bestandtheile in 100 Th.: Kohlenstoff 77,92; Wasserstoff 11,69; Sauerstoff 10,39.

Aber auch im Mineralreiche ist, und zwar zuerst 1736 in Finnland, Talg entdeckt worden. Solchen mineralischen Talg hat man unlängst an den Ufern des Loch-Fyn in Schottland gefunden. Die Substanz hat die Farbe des Talgs, fühlt sich wie solcher an und ist dabei geschmacklos. Die Masse schmilzt bei 118 ° und kocht bei 290 °. Geschmolzen ist sie durchsichtig und farblos, beim Kochen aber wird sie schwammig und weiß, jedoch nicht so sehr wie zuvor. Sie ist unauflöslich in Wasser, aber auflöslich in heißem Alkohol, Terpenthinöl, Baumöl oder Naphtha, fällt aber beim Erkalten der Flüssigkeiten wieder nieder. Im natürlichen Zustande ist das spec. Gew. dieses Talges = 0,983, er ist also schwerer als gewöhnlicher Talg. Er verbindet sich nicht mit Alkalien, und läßt sich nicht in Seife umwandeln. In Flüchtigkeit und Verbrennlichkeit ist er den flüchtigen Oelen und der Naphtha (?) gleich.

* Secale cornutum. Mutterkorn.

Mißgestaltete Saamen von Secale cereale Linn. (gemeiner Roggen), einer in Europa häufig angebauten Grasart.

Walzenförmige, meistentheils gekrümmte, oft der Länge nach runzlige, 6 Linien bis einen Zoll und drüber lange Körner, au-

ßen von violettartiger und bräunlichgrauer Farbe, innen mehlig, mißfarbig und von schärflichem Geschmacke.

Mehrere Grasarten, vorzüglich der Roggen, aber auch Gerste und Hafer sind einer Krankheit unterworfen, der die Pflanzenpathologen den Namen Clavus gegeben haben, und in welcher die Saamenkörner sich vergrößern oder verlängern, über die Aehre hinausragen, sich unregelmäßig gestalten, eine dunkle Farbe und unangenehmen Geschmack annehmen und das Mutterkorn bilden, welches als Nahrungsmittel genossen schädliche Wirkungen hervorbringt. Nach Field's Beobachtung (Geiger's Magazin 1826. Mai. S. 201.) entsteht das Mutterkorn durch den Stich einer Fliege, welche die jungen Aehren anbohrt, um den herausfließenden süßen Saft aufzusaugen; anfangs zeigt sich in dem angezapften Korn ein schwarzes Kügelchen, welches sich später in Mutterkorn umwandelt. Man kann, nach Field, selbst künstlich Mutterkorn produciren, wenn man in die unreifen Körner mit einer feinen Nadel einsticht; es schwitzt bald ein süßer Saft heraus, den die Fliegen auffaugen, und es bildet sich später Mutterkorn. Feuchte Witterung begünstigt die Bildung dieses krankhaften Products, während bei warmen trocknem Wetter die Wunden oft schnell heilen, und gesundes Korn reift.

Dr. Winkler (Geiger's Magazin 1826. November. S. 142.) nimmt gleichfalls eine thierische Excretion, z. B. Honigthau, als die nächste Ursache des Mutterkorns an, da er an einigen fast noch ganz unveränderten Roggenkörnern, die sich nach einiger Zeit zu Mutterkorn ausbildeten, eine klebrige, süße Substanz fand.

Das Mutterkorn ist äußerlich violett, inwendig weiß, cylindrisch, an beiden Enden sanft zugespitzt, halbmondförmig gebogen, der Länge nach mit Furchen versehen, 6—8 Linien lang, und 2—3 Linien im größten Durchmesser haltend. Der Geschmack ist anfangs unmerklich, hintennach aber scharf und unangenehm.

Nach einer chemischen Untersuchung des Mutterkorns von Vauquelin (Buchn. Repert. III. S. 48. ff.) enthält dasselbe: 1) einen blaßgelben Farbestoff, in Alkohol auflöslich und von einem Geruche wie Fischöl; 2) eine weiße ölige Substanz; 3) einen violetten Farbestoff, unauflöslich in Alkohol, und leicht anwendbar auf Wolle und Seide; 4) eine Säure, wahrscheinlich Phosphorsäure; 5) eine thierisch-vegetabilische Substanz in großer Menge, die sehr zur Fäulniß geneigt, aber kein Kleber ist, und durch Destillation viel dickes Oel und Ammoniak giebt. Das Amylum verwandelt sich bei dieser krankhaften Mißbildung des Roggenkorns in eine gelatinöse Masse, und der Kleber erleidet eine Veränderung. (Vergleiche hiermit die chemischen Versuche von Dr. Pettenkofer S. 65.)

Unter vielen von Dr. Winkler (a. a. O.) angestellten Versuchen wurde auch das Mutterkorn mit Wasser destillirt, und ein, bis auf einige höchst fein zertheilte weißliche Flocken, wasserhelles Destillat erhalten, welches einen höchst widerlichen stark betäubenden Geruch, der sehr schnell Kopfweh ver-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0811-1

ursachte, und einen faden, ebenfalls widerlichen nicht sehr starken Geschmack hatte. Es enthielt Ammoniak. Nach 12 Stunden der gewöhnlichen Temperatur der Luft ausgesetzt, verhielt es sich wie reines Wasser. Der eigentlich schädliche Bestandtheil des Mutterkorns ist nicht ausgemittelt.

Das Mutterkorn äußert sehr verderbliche Wirkungen, so daß der Genuß desselben den Tod nach sich ziehen kann. Dessenungeachtet hat man dasselbe in den Arzneischatz eingeführt, und es zur Beförderung der Wehen und Beschleunigung der Geburt in Pulverform zu 5—10 Gran oder auch im Aufgusse (eine halbe Drachme zu 5 Unzen), nach Andern in der Abkochung gegeben, jedoch nicht eher, als bis der Muttermund erweitert ist. Nach Charles Hall (Froriep's Notizen 1826. October. Nr. 322. S. 217.) wirkt das Mutterkorn giftig und zerstört alle Functionen des Lebens dadurch, daß es in die Blutmasse übertritt, und die Circulation retardirt, worauf auch seine Wirkungen auf den Uterus und den Fötus beruhen, indem nämlich das Blut unfähig wird, den Uterus und den Fötus länger zu erhalten. Daher wird, wenn die Umstände nicht günstig sind, die Geburt durch einen ungewöhnlichen Widerstand verhindert wird, das Kind seines Lebens beraubt, indem die Circulation des Blutes in der Nabelschnur unterbrochen wird, woraus denn auch erklärlich ist, daß der ausgetriebene todte Fötus dunkel gefärbt erscheint, wenn man auch sichere Kennzeichen hatte, daß das Kind einige Stunden vorher, ehe das Mutterkorn gegeben wurde, noch gelebt hat. Diese Ansicht werde noch durch die Wirksamkeit dieses Mittels in Hemmung der Gebärmutterblutflüsse bestätigt, worin nach des Verf. Meinung auch der Hauptwerth desselben besteht; er fürchtet dagegen, daß es selbst nach den Regeln der Kunst angewendet häufiger nachtheilig als von guter Wirkung seyn werde.

* Secale. Das Mehl. Roggenmehl.

Secale cereale Linn. Gemeiner Roggen.

Die Saamen des Roggens geben beim Mahlen des Getreides Mehl und Kleie; ersteres wird in pulveriger Gestalt aus dem Kerne, die letztere von der dünnen Schale oder Hülse abgesondert. Das Mehl enthält Stärkemehl, Kleber und Schleimzucker, und findet bekanntlich als Nahrungsmittel seine hauptsächlichste Anwendung.

Senega. Die Wurzel. Senegawurzel.

Polygala Senega Linn. Eine ausdauernde Pflanze Virginiens und Pennsylvaniens.

Eine fast walzenförmige, etwas ästige, oberhalb höckerige, gekrümmte, in dem Krümmungen durch einen Kiel bezeichnete Wurzel, mit gelblich brauner Oberhaut, innen weißlicher Rinde und Holze, von scharfem stechendem Geschmacke.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0812-7

Polygala Senega Linn. Giftwidrige Kreuzblume; Senegapflanze; Klapperschlangenwurzel.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 3. Octandria.

Juss. Cl. VIII. Ord. 2. Pedicularideae.

Die Senegapflanze ist in Wäldern in verschiedenen Gegenden Nordamerikas einheimisch.

Die Wurzel ist perennirend, und besteht aus starken, holzigen, wenig ästigen, knotigen, gelblichgrauen Fasern. Aus ihrem etwas verdickten kurzen und abgestutzten Wurzelstocke kommen mehrere aufrechte, ungefähr einen Fuß hohe, krautartige Stengel hervor. Die Blätter sind abwechselnd, lancettförmig, nach beiden Seiten verschmälert, ganzrandig und glatt; sie werden nach der Spitze zu größer, so daß die untersten kaum einen, die obersten $2\frac{1}{2}$—3 Zoll in der Länge erreichen. Die kleinen sitzenden Blüthen bilden $1\frac{1}{2}$—2 Zoll lange dichte Aehren an der Spitze der Stengel.

Die officinelle Wurzel dieser Pflanze erhalten wir in zerbrochenen, gekrümmten, durch Längsfurchen runzligen Stücken von gelblichgrauer Farbe, und von der Dicke einer Schreibfeder, mit dünnen Fasern untermischt; auch kommen viele Stücke mit dem rundlichen knotigen Wurzelstocke vor. Der Geschmack ist anfangs mehlig, bald darauf süßlichsäuerlich, zuletzt kratzend und einen äußerst unangenehmen Reiz im Schlunde erregend, der ziemlich lange anhält; der Geruch ist eigenthümlich, unangenehm, ranzigem Baumöle etwas ähnlich. Der Staub der Wurzel erregt Niesen. Man unterscheidet leicht an der Wurzel die mit der gelblichbraunen Oberhaut überzogene Rinde und einen inwendigen holzigen Faden. Erstere ist ziemlich dick, dicht, gleichartig, gelblich und wie mit einem verdickten Pflanzensafte durchzogen, oder sie scheint vielmehr ganz aus einem verdickten Pflanzensafte zu bestehen, da nach dem Ausziehen mit Alkohol und Wasser nur das Oberhäutchen und etwas zelliges Gewebe zurückbleibt; bei dickern Wurzeln macht sie den dritten, bei zarten dünnern Wurzeln ungefähr den fünften Theil des Ganzen aus und ist der kräftigere Theil. Der innere Theil der Wurzel hat eine hellere weißliche Farbe, ist faserig holzig, und zeigt nur einen geringen Geschmack, der, wenn man von der Süßigkeit abstrahirt, einige Aehnlichkeit mit dem der Lakrizenwurzel hat.

Die erste Kenntniß dieser Wurzel verdanken wir dem schottischen Arzte Tennent, der sie 1735 bekannt machte. Er hatte oft bemerkt, daß die Wilden in Pennsylvanien den so tödtlichen Biß der Klapperschlange aufs glücklichste heilten; sie hielten aber das Mittel geheim, bis er es gegen eine reichliche Belohnung mitgetheilt erhielt.

Gehlen (Berl. Jahrb. 1804.) erhielt, als er 2000 Gran Senegawurzel mit Wasser destillirte, ein vollkommen klares Destillat, von einem schwachen Senegageruche, aber ohne Geschmack. Der wäßrige Aufguß ist nur schwach gefärbt, schmeckt bitterlich-säuerlich und hintennach eigenthümlich, anhaltend kratzend, mit einem Gefühl von Zusammenziehung des Schlundes. Die gesättigte Abkochung hat nach dem Filtriren eine bräunlichgelbe Farbe,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0813-3

den besondern Geruch der Senega und ihren Geschmack in seiner ganzen Stärke. Lackmuspapier zeigt darin freie Säure an. Verdünnte salzs. gelbe Eisenauflösung macht die Farbe des Decocts dunkler, ins Grüne fallend, nach einiger Zeit sondert sich ein graulicher Niederschlag ab, wobei die überstehende Flüssigkeit noch grünlichbraun bleibt. Essigsaures Blei bewirkte einen starken sehr voluminösen gallertartigen Niederschlag, der in Salpetersäure wieder auflöslich war; die überstehende Flüssigkeit war hell strohgelb. Salzsaures Zinn bewirkte gleichfalls einen starken hellgelben Niederschlag.

2000 Gran gröblich zerschnittener Wurzel wurden mit Weingeist behandelt; die Tinctur war dunkelbraun und röthete das Lackmuspapier wie schwacher Essig. Der abdestillirte Weingeist reagirte nicht mehr sauer, der Rückstand in der Retorte besaß ganz den eigenthümlichen Geruch und Geschmack der Senega, hatte sich nach dem Erkalten in zwei Flüssigkeiten geschieden, deren eine das Ansehen eines syrupdicken braunen Oels hatte. Der zur Trockne verdampfte Rückstand hatte ein der Myrrhe ähnliches Ansehen, und wog 1 Unze 5½ Drachme. Schwefeläther zog 2½ Drachme eines schmierigen Harzes aus von dunkel röthlichbrauner Farbe, von dem besondern Geruche der Senega und einem unangenehm bitterlichen Geschmacke, der nur kaum merklich von dem scharfen begleitet war. In einem silbernen Löffel erhitzt wurde es ganz dünnflüssig, entzündete sich zuletzt und brannte mit harziger rußiger Flamme unter Verbreitung eines seifenähnlichen Geruchs. In Aether und Alkohol löste sich diese Substanz gleich gut auf, die Auflösung reagirte sauer; auch Terpenthin- und Olivenöl lösen sie in der Wärme bis auf einige Flocken auf. Aetznatronlauge löste sie in der Wärme zu einer röthlichbraunen Flüssigkeit auf. Der nach der Behandlung mit Aether gebliebene Rückstand wurde mit destillirtem Wasser erhitzt, wobei eine fein zertheilte, graulichweiße Materie unaufgelöst blieb, die ein aufgequollenes, gleichsam kleisterartiges Ansehn hatte, durch das Trocknen aber durchsichtig, braun, hart und brüchig wurde. Beim Zerreiben erregte sie sehr starkes Niesen, und im Munde gekaut das Kratzen und den unangenehmen Reiz im Schlunde im höchsten Grade. Sie war in Aether, Terpenthin- und Olivenöl gänzlich unauflöslich; absoluter Alkohol, noch leichter Alkohol von 80 ° lösten sie auf; auch diese Auflösung röthete das Lackmuspapier. Nach Pfaff läßt sich die Auflösung derselben in Weingeist mit sehr vielem Wasser ohne Trübung vermischen, so daß sie also nicht, wie Gehlen behauptet, im Wasser ganz unauflöslich sey, wogegen auch ihre große Aehnlichkeit mit dem kratzenden Extractivstoffe der Seifenwurzel streite. Mit dem schmierigen Harze geht sie nach Gehlen keine Verbindung ein. Im silbernen Löffel schmilzt sie nicht; Natronlauge löst sie auf. Gehlen erklärt diese Substanz für eine Modification des vegetabilischen Harzes. Es betrug 2 Drachmen 3 Gran. Die vom Wasser aufgenommene Substanz nennt Gehlen im engeren Sinne Pflanzenseifenstoff; die Auflösung hatte den eigenthümlichen Geruch der Senega und den zuerst süßlichen, nachher unangenehmen kratzenden Geschmack. Pfaff sieht dies als einen Beweis an, daß das Wasser auch einen Theil

des kratzenden Extractivstoffes aufgenommen hatte. (Sollte diese Substanz nicht vielmehr mit den vorhergehenden, durch Aufnahme von Sauerstoff unauflöslich gewordenen — oxydirten — von gleicher Beschaffenheit seyn?)

Der Wurzelrückstand wurde wiederholt ausgekocht und 3 Quentchen 10 Gran Extract erhalten. Dieses wurde noch mit Weingeist digerirt, der sich nur schwach gelblich färbte; der Rückstand wurde wieder in Wasser aufgelöst, wobei etwas weniges einer gluten- oder eiweißartigen Substanz zurückblieb, die Auflösung aber die Reactionen eines eigenthümlichen Schleimes gegen metallische Salze zeigte.

Die Säure gelang Gehlen nicht darzustellen.

2000 Gran Senegawurzel enthalten demnach: schmieriges Harz 150; kratzenden Extractivstoff 123; süßen Extractivstoff mit kratzendem vermischt — Gehlen's Seifenstoff — 537; Schleim und etwas Eiweißstoff 190; unauflöslichen Rückstand 920.

Peschier (Buchn. Repert. XI. 2. S. 158.; XIII. 3. S. 457.; Trommsd. N. J. VI. 1. S. 355. u. Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 154.) erhielt durch Ausziehen mit Alkohol drei sehr aneinander grenzende Substanzen. Nämlich aus der geistigen Tinctur scheidet sich nach ihm ein Harz beim Erkalten, ein anderes durch Verdampfen aus, von einem scharfen brennenden Geschmacke, und durch Zusatz von Wasser zu der durch Verdampfen concentrirten Flüssigkeit entsteht ein neuer Niederschlag von gelblicher Farbe, der beim Trocknen eine braune Farbe annimmt, einen hellen harzigen Glanz zeigt, zereiblich ist, von seifenhaftem Geruche und von einem scharf bittern und seifenhaften Geschmacke, mit kaltem und warmen Wasser eine trübe Auflösung giebt, die auch durch ein dichtes Filter sich nicht klären läßt, und dem darüber abgezogenen Wasser den Geruch der Senegawurzel und einen seifenhaften Geschmack mittheilt. Peschier nennt dieses Princip: Polygalin; aus 4 Unzen Wurzel erhielt er 100 Gran. Eine vierte Substanz, welche nach Abscheidung des Polygalins noch aufgelöst blieb, von sehr scharfem und bitterm Geschmacke, in Wasser und Alkohol gleich auflöslich, nennt Peschier Isolusin, das wohl nur der kratzende Extractivstoff ist. Noch will Peschier eine eigenthümliche Säure gefunden haben, die sich auch in andern Polygalaarten finden soll, und zwar in der Senegawurzel mit Kali und Eisen (?) verbunden, nicht krystallisirbar, mit Kali Würfel bildend; sie ist noch problematisch.

Die in der Senegawurzel enthaltenen Bestandtheile sind nach Peschier folgende: zwei harzige Grundstoffe von verschiedenen Graden der Auflöslichkeit; ein flüchtiges Princip von harzigem Ansehn mit seifenartigem Geruche und Geschmacke — Polygalin; ein in Wasser und Alkohol auflösliches Princip — Isolusin; ein gelblicher Farbestoff; Inulin; ein besonderes Alkaloid; eine neue Pflanzensäure — Polygalasäure —; phosphors. Kalk; polygalas. Eisen; Holzfaser.

Feneulle (Geiger's Magazin 1826. October. S. 73.) erschöpfte die Wurzel zuerst mit Wasser. Aus den bis zur Hälfte abgedampften und filtrirten Flüssigkeiten schied sich beim Erkalten ein blaßgelber gelatinöser Nieder-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0815-4

schlag aus. Die hievon abgeschiedene Flüssigkeit wurde mit neutralem essigs. Blei im Ueberschusse versetzt, der Niederschlag gesammelt, gewaschen und durch Hydrothionsäure zerlegt. Die abfiltrirte Flüssigkeit wurde zur Trockne verdunstet, und der Rückstand mit absolutem Alkohol behandelt; es schied sich saurer äpfels. Kalk, etwas schwefels. und phosphors. Kalk ab. Die alkoholische Lösung wurde verdunstet und mit Wasser behandelt, wodurch ein brauner Stoff, wahrscheinlich ein veränderter Farbestoff, ausgeschieden wurde.

Die von dem Bleiniederschlage abgesonderte Flüssigkeit wurde mit etwas Schwefelsäure versetzt, um das überschüssig zugesetzte Blei zu entfernen, filtrirt, verdunstet und mit Alkohol ausgezogen, wodurch Gummi zurückblieb. Die geistigen Tincturen wurden verdunstet, der Rückstand in Wasser aufgenommen, wodurch sich Farbestoff abschied. Die wäßrige Lösung wurde zur Trockne abgedampft, von Alkohol aufgenommen, und mit Schwefelsäure im Ueberschusse versetzt, um das darin enthaltene essigsaure Kali zu zerstören, dann mit thierischer Kohle gekocht und filtrirt. Die Flüssigkeit war bedeutend entfärbt; sie wurde mit gebrannter Bittererde versetzt, um die überschüssige Säure zu entfernen, und dann der freien Verdunstung überlassen. Der trockne Rückstand war nicht krystallisirt, besaß aber den Geschmack der Wurzel und wird von dem Verf. als ein reiner Stoff angesehen, der von gelber Farbe, rein bitterm Geschmacke ist und die Feuchtigkeit der Luft anzieht.

Durch Behandlung der mit Wasser erschöpften Wurzel mit Aether und Alkohol wurde ein fettes Oel erhalten, welches Geruch besaß und dem eine flüchtige Säure anhing, welche dem Oele die Eigenschaft ertheilte, Lackmus zu röthen.

Die Destillation mit Wasser lieferte ein Product, welches einen widrigen Geruch hatte und flüchtiges Oel enthielt. Von den kratzenden Eigenschaften der Wurzel wird nichts erwähnt.

Feneulle, der selbst gesteht, daß ihm keine Untersuchung der Senegawurzel bekannt sey, giebt folgende Bestandtheile derselben an: 1) blaßgelben Farbestoff; 2) bittere Substanz; 3) Gummi; 4) pektische Säure; 5) Eiweiß; 6) ätherisches Oel; 7) fettes Oel; 8) sauren äpfels. Kalk, nebst etwas phosphors. und schwefels. Kalke und ein wenig Kieselerde. Die Asche enthielt: kohlens. und salzs. Kali, schwefels., phosphors. und kohlens. Kalk und Kieselerde.

Die Senegawurzel, die in Europa besonders als Reizmittel benutzt wird in Wassersuchten, in der schleimigen Engbrüstigkeit u. s. w., in größeren Gaben aber Brechen und Purgiren erregt, wird in der Abkochung oder auch in Pulverform verordnet; zu letzterem Behufe schlägt Gehlen vor, nur die äußere Rinde abzustoßen.

An wäßrigem Extracte giebt die Senega durch wiederholtes Auskochen den dritten Theil.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0816-0

Senna. Die Blätter. Sennesblätter.

Cassia lanceolata Forsk. et Nectoux, eine Pflanze Nubiens, und Cassia obtusata Hayne (C. Senna Jacq.), eine Pflanze Oberägyptens.

Längliche, stumpfe, feinstachelspitzige Blättchen, mit einwärts gebogenem Rande, geadert, unterhalb vorzüglich weichhaarig, blaß, und verkehrt eiförmige, stumpfe oder eingedrückte, höchst kurz feinstachelspitzige nicht ausgerandete, unterhalb vorzüglich weichhaarige Blättchen, von schärflichem, bitterlichem, etwas widerlichen Geschmacke. Seltener sind die größeren, lancettförmigen, spitzigen, ungleichseitigen, weichhaarigen Blätter von Cynanchum Arguel Delile beigemengt.

Cassia lanceolata Forsk. et Nectoux. Die lancettblättrige Cassia.

Cassia obtusata Hayne (Cassia Senna Jacq.). Die gestumpftblättrige Cassia.

Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Die lancettblättrige Cassia wächst in Nubien, im Lande der Barabras. Der Stamm ist staudenstrauchig, aufrecht, vielästig, nicht über 1½ Fuß hoch und mit einer hell graulichbraunen Rinde bedeckt. Die Blätter stehen wechselsweise, sind drei- bis fünfjochig gefiedert, 2—4 Zoll lang; die Blättchen sehr kurz gestielt, fast lederartig, eirund oder auch länglich-lancettförmig, gegen die Basis ungleichseitig, kurz stachelspitzig, ganzrandig, mit etwas zurückgekrümmtem, dem bewaffneten Auge knorplig erscheinendem Rande, auf beiden Flächen, vorzüglich unterhalb, mit mehr oder weniger kurzen Haaren besetzt. Die Blumen sind gestielt, traubenständig. Die Blumenkrone fünfblättrig; die Kronenblätter blaßgelb, umgekehrt-eirund, zugerundet. Die Fruchthülle eine flach zusammengedrückte, fast sichelförmig-elliptische, auf beiden Seiten in der Mitte über den Saamen etwas aufgetriebene, adrige, am Rande gelblich-olivengrüne, in der Mitte kastanienbraune, hautartige, zweiklappige, durch Querscheidewände gewöhnlich 4—7- (selten 8-) fächrige Hülse ohne Muß, mit kaum aufspringenden Klappen, 1—1½ Zoll lang.

Die gestumpftblättrige Cassia wächst in Oberägypten, ihr Stamm ist gleichfalls staudenstrauchig, aufrecht, mehrästig oder einfach, vielbeugig, mit einer erbsengrünen Rinde bedeckt, 1—1½ Fuß hoch. Die Blätter stehen wechselsweise, sind 4—6jochig-gefiedert, 3½—4 Zoll lang; die Blättchen drüsig-gestielt, länglich-umgekehrt-eirund, gestumpft, oder, vorzüglich die obersten, zurückgedrückt, und daher gleichsam umgekehrt-herzförmig, sehr kurz stachelspitzig, ganzrandig, auf beiden Flächen, vorzüglich unterhalb, dem bewaffneten Auge mit zerstreuten, kurzen Haaren besetzt erscheinend. Die Blumen gestielt, traubenständig. Die Blumenkrone fünfblättrig; die Kronenblät-

ter umgekehrt-eirund, ungenagelt, vertieft, citronengelb. Die Fruchthülle eine flach zusammengedrückte, stark sichelförmige, auf beiden Seiten in der Mitte über den Saamen kammartig-aufgetriebene, adrige, röthlich-wachholderbeerbraune, mehr oder weniger ins Rothe oder Olivengrüne fallende, etwas schillernde, hautartige, zweiklappige, durch Querscheidewände gewöhnlich 8—10, zuweilen 12fächrige Hülse ohne Muß, mit kaum aufspringenden Klappen, 1—1½ Zoll lang, durch den bleibenden Griffel stachelspitzig.

Von der ersteren Pflanze, welche in Aegypten Séná-guebelly, Sena-Mecky genannt wird, kommen die alexandrinischen Sennesblätter (Folia Sennae Alexandrinae), die ihren Namen daher erhalten haben, weil sie über Alexandria zu uns kommen, und die auch den französischen Namen Séné de la Palthe erhalten haben, von dem Tribut, den der Pascha für den Alleinhandel damit an den Großherrn entrichten muß, und welcher Palthe heißt. Aber nicht sie allein kommen nach Hayne von der Cassia lanceolata, sondern auch die tripolitanischen, und beide unterscheiden sich nur dadurch, daß erstere weniger Stengel und Blattstiele enthalten, und überhaupt von besserm Ansehn sind. Unter beiden Sorten findet man gewöhnlich die Hülsen, welche unter dem Namen Folliculi Sennae bekannt sind, so wie auch stets die Blätter von Solenostemma Arguel (Cynanchum Arguel Delil.), und von der Cassia obtusata, seltener von der Cassia obovata untergemengt. Die Blätter von Solenostemma (Cynanchum oleaefolium Nectoux), von den Arabern Arguel oder Árghel, von den Kaufleuten daselbst aber Séné Makky, Séné de la Mecque genannt, sind oval-länglich und gleichseitig, nicht eirund-länglich ꝛc.; sie sind stets nur spitzig, niemals stachelspitzig, ihre Oberfläche ist, mit bewaffnetem Auge betrachtet, runzlig mit gedrängten, verschieden gekrümmten Runzeln, nicht aber fast glatt; auf der untern Fläche ist die Mittelrippe viel stärker hervortretend und breiter; endlich sind sie vollkommen lederartig, nicht aber nur fast lederartig. In mit diesen Blättern angestellten Versuchen haben sich dieselben eben so wirksam gezeigt, wie die Sennesblätter. Die Blätter der Cassia obtusata, welche Pflanze ehedem auch in Italien, Frankreich und Spanien angebaut wurde, und die italienischen und provençalischen Sennesblätter in den Handel lieferte, kommen niemals für sich allein vor, sondern sind stets den Blättern der Cassia lanceolata beigemengt. Die alexandrinischen Sennesblätter sind also ein Gemenge von den Blättern dieser drei Pflanzen, welches aus 500 Th. Cassia lanceolata, 300 Th. Cassia obtusata und 200 Th. Cynanchum Arguel zusammengesetzt werden soll; Hayne hat aber die beiden letztern Arten in einem so großen Verhältnisse weder unter den alexandrinischen noch unter den tripolitanischen Sennesblättern finden können. Hr. Prof. Ficinus hat in einem Pfunde alexandrinischer Sennesblätter ein reichliches Loth Cassia obtusata und 36 Gran Solenostemma gefunden. Die Blättchen der eiblättrigen Cassia (Cassia obovata) sind drüsig-gestielt, umgekehrt eirund, fast zugerundet, stachelspitzig, ganzrandig, auf beiden Flächen, vorzüglich unterhalb, dem bewaffneten Auge mit zerstreuten, kurzen Haaren besetzt erscheinend. Eine

Verfälschung der Sennesblätter mit den Blättchen des Blasenstrauchs (Colutea arborescens L.) kann wohl nur bei den sogenannten kleinen Sennesblättern (Folia Sennae parvae) stattfinden; sie haben nur mit den Blättchen der Cassia obtusata Aehnlichkeit, unterscheiden sich aber von diesen dadurch, daß sie umgekehrt-eirund, an der Spitze zurückgedrückt, oder auch ausgerandet, und daher oft fast umgekehrt-herzförmig sind, daß sie an der Basis fast keilförmig, nicht fast zugerundet und daß sie gleichseitig sind. Der Aufguß dieser Blätter hat einen gras- oder krautartigen Geruch, einen stark bittern, wenig zusammenziehenden Geschmack und eine schwach grünlichgelbe Farbe, die durch Kali nicht verändert wird. Oft sind aber die kleinen Sennesblätter nur die zerstückelten tripolitanischen, mit denen sie denn auch in der Wirkung übereinkommen, jedoch können sie nicht zum pharmaceutischen Gebrauche benutzt werden.

Seit dem Jahre 1821 ist auch eine Sorte Sennesblätter unter dem Namen der indischen (Folia Sennae indicae oder Folia Sennae de Mokka) im Handel vorgekommen, die sich durch ihre größere Länge im Verhältniß der Breite, durch ihre blaß gelblichgrüne, in das Graue ziehende Farbe und durch den anscheinenden Mangel der Haare unterscheiden (Buchn. Repert. XVII. 1. S. 80.). Sie kommen in Kisten oder Ballen von 100—200 Pfund sehr dicht gepackt vor und sollen auf der Westküste Afrikas von der Insel Gorea bis Sierra Leone und in ganz Senagambien von Cassia elongata Lemaire gesammelt werden. Nees v. Esenbeck d. J. (Brandes's Archiv 1823. III. S. 264.) hat aus dem Saamen Pflanzen gezogen, welche mit Lemaire's Beschreibung übereinstimmten. Hayne erklärt sich aber dahin, daß diese Blätter von der Cassia acutifolia, welche Cassia gleichfalls in Oberägypten wächst, abstammen, deren Blättchen kurz gestielt sind, hautartig, lancettförmig, gegen die Basis ungleichseitig, gegen die Spitze verschmälert, lang stachelspitzig, ganzrandig, dem bewaffneten Auge mit etwas knorpligem Rande, und auf beiden Flächen, vorzüglich unterhalb, mit sehr kurzen Haaren besetzt erscheinend. Das Vorkommen dieser Pflanze scheint sich sehr weit auszudehnen, denn Forskål bemerkt, daß diese Sorte Sennesblätter, welche von Hagen und Pfaff auch unter dem Namen der mochaischen oder arabischen aufgeführt werden, aus der Umgegend von Abu-Arisch alljährlich in großer Menge nach Odjida — welches bei Mecca liegt — gebracht werde, und eben dieselbe sey, welche man in Kairo Senna Meccae nenne. Hayne meint nun, auf eine Bemerkung Nectoux's gestützt, daß in der neueren Zeit diese Sennesblätter von den Schiffen in den Seeplätzen des rothen Meeres aufgenommen und nach den ostindischen Besitzungen der Engländer geführt, von dort aus aber wieder nach Europa geschickt werden, und hier unter dem Namen der indischen vorkommen, wenn sie gleich ihre Abstammung nicht Ostindien, sondern Arabien und Oberägypten verdanken. Die abweichende Art der Verpackung lasse zwar auf auf einen andern Ort der Verpackung, aber nicht auf einen andern ihrer Abkunft schließen. Diese unter so verschiedenen Namen vorkommenden Sennesblätter stehen den alexandrini-

schen weit nach, und dürfen daher nicht angewendet werden; sie gehen durch den Handel nach Polen und Rußland.

In Nordamerika werden die Blätter der maryländischen Cassia (Cassia marylandica Linn.) gebraucht. Die Blättchen dieser Cassia sind länglich, stumpf, mit einem feinen Spitzchen (mucro), auf der obern Seite dunkelgrün und glatt, auf der untern blaß, mit einzelnen zarten Haaren auf den Nerven und am Rande. Sie sind statt der alexandrinischen Sennesblätter empfohlen worden, und sollen diesen an Wirksamkeit nicht nachstehen (Hufeland's Journ. 1823. 3. S. 129.; Buchn. Repert. IX. S. 97.; Horn's Archiv 1824. Jul. Aug. S. 28.).

In Rücksicht des Einsammelns der Sennesblätter ist im Allgemeinen Folgendes zu bemerken. Man erntet im Jahre zweimal. Die erste Ernte, welche mit dem Aufhören der Regenzeit ihren Anfang nimmt, und von dem Ausgange des Juni bis zum Anfange des Septembers dauert, ist die reichste; die zweite, welche im April gehalten wird, ist viel weniger einträglich; das Einsammeln selbst, so wie das Zubereiten erfodert nicht viel Mühe. Man schneidet die Gewächse ab und trocknet sie auf den Felsen an der Sonne, wozu wenig Zeit erfoderlich ist. Hier wird zuweilen schon von den Barabras die Séna-guebelly (Cassia lanceolata) mit dem Arguel zusammengemengt, die Séna-belledy (Cassia obovata oder vielmehr obtusata) wird erst in den Niederlagen zu Syene, Darao, Eschnech, Kenne u. s. w. darunter gemengt, weil die Barabras, die dieser mancherlei üble Wirkung zuschreiben, zu gewissenhaft sind, sie mit in den Handel zu bringen. Der Transport aus Nubien, bis Syene und Darao, wenn sie in Ballen von ungefähr einem Centner gepackt werden, geschieht durch Karavanen mit Kameelen; dann aber gehen sie weiter den Nil hinunter bis Kairo, Boulac und Alexandria, wo die Hauptniederlagen sich befinden. Auch nehmen die Schiffe in den Seeplätzen des rothen Meeres, welche die indischen Waaren und den Kaffee von Yemen nach Cossir und Suez führen, um ihre Ladung voll zu machen, zuweilen Ballen von Sennesblättern mit, was viel weniger kostbar ist, als der Transport durch Karavanen.

Der Aufguß der Sennesblätter hat eine gesättigt gelbbraune Farbe, die durch Kali ins Rothbraune verändert wird, einen eigenthümlichen faden, süßlichen Geruch und ähnlichen wenig bittern Geschmack.

Bouillon Lagrange's unvollkommene Analyse der alexandrinischen Sennesblätter giebt folgende Bestandtheile an: ätherisches Oel; purgirenden Seifenstoff; purgirendes Harz; Schleim; schleimigen Extractivstoff und Pflanzenfaser.

Auch die Resultate der genaueren Untersuchung von Braconnot sind durch die folgende Arbeit ergänzt worden.

Lassaigne und Feneulle (Trommsd. N. J. VI. 1. S. 149.; Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 85.) zogen die zerkleinerten alexandrinischen Sennesblätter mit Schwefeläther aus, welcher grünes Pflanzenharz (Chlorophyll) und ein fettes Oel aufnahm. Der abgezogene Aether hatte einen schwachen

Beigeruch nach Sennesblättern. Die mit Aether ausgezogenen Sennesblätter gaben, mit Wasser destillirt, ein milchiges Destillat, welches den den Sennesblättern eigenen nauseosen Geruch besaß. Der dabei erhaltene wäßrige Absud hatte eine gelbbräunliche Farbe, einen bittern Geschmack und röthete das Lackmuspapier. Er wurde so lange mit Bleizucker versetzt, als noch ein Niederschlag erschien; der letztere von der Flüssigkeit getrennt, ausgewaschen, mit etwas Wasser angerührt und dann durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die vom Schwefelblei getrennte Flüssigkeit wurde eingedickt und mit Weingeist übergossen, der alles bis auf einen weißen Rückstand von äpfelsaurem Kalke löste. Die geistige Lösung war sehr sauer und gab beim Abrauchen keine Krystalle. Hierauf in Wasser gelöst, schlug sie das Kalk- und Barytwasser nieder, und erzeugte mit Salpetersäure etwas Sauerkleesäure und eine Substanz, die durch Zusatz von Kali eine schöne rothe Farbe erhielt. Sie bestand daher aus Aepfelsäure und einem gelben Farbestoffe.

Das bei der vorigen Arbeit erhaltene Schwefelblei wurde mit Weingeist gekocht, und aus der Tinctur nach dem Eintrocknen eine braungelbe Masse erhalten, welche sich in Wasser auflöste und aus der mit Alaun versetzten Auflösung durch kohlens. Natron mit gelber Ocherfarbe niedergeschlagen wurde, die durch Behandlung mit Salpetersäure eine schöne lebhaft rothe Farbe erhielt. Dieser Farbestoff ließ sich vermittelst Alauns leicht auf Geweben befestigen. Durch die Flüssigkeiten, welche bei der Niederschlagung mit Bleizucker erhalten worden waren, wurde so lange Schwefelwasserstoffgas hindurchgeleitet, als noch ein Niederschlag erschien, dann filtrirt und zum Trocknen gebracht. Dieses Extract wurde mit Weingeist ausgezogen, der eine braune Materie, die aus Schleim und etwas Farbestoff bestand, ungelöst ließ. Die weingeistigen Lösungen wurden bis zur Extractdicke verdampft, und dann, um das in denselben befindliche essigs. Kali abzuscheiden, mit Weingeist, dem etwas Schwefelsäure zugesetzt war, behandelt. Das neu gebildete schwefels. Kali blieb ungelöst am Boden liegen. Das in der Flüssigkeit befindliche Uebermaß an Schwefelsäure wurde durch Bleizucker und das überschüssige Blei wieder durch Schwefelwasserstoff abgeschieden. Auf diese Art wurde nach dem Eintrocknen diejenige Substanz erhalten, welche die abführende Eigenschaft der Sennesblätter besitzt, und von den Verfassern den Namen Kathartin erhalten hat. Das Kathartin (Sennastoff) krystallisirt nicht, hat eine röthlichgelbe Farbe, einen eigenthümlichen Geruch, einen bittern nauseosen Geschmack, ist in Weingeist und Wasser in allen Verhältnissen auflöslich, in Aether unlöslich und zieht die Feuchtigkeit der Luft an. Aus der wäßrigen Auflösung fällt Galläpfelauszug und Bleiessig gelbliche Flocken; Jod, Bleizucker, Brechweinstein und der Leim bringen keine Veränderung hervor; durch schwefels. Eisenoxyd wird die Auflösung braungefärbt, und die Kalien machen ihre Farbe dunkler. In einem verschlossenen Gefäße der Hitze ausgesetzt, wird diese Substanz zerstört, indem sie in Kohlensäure, Essigs., empyreumatisches Oel, Kohlenwasserstoffgas und einen kohligen Rückstand zerlegt wird. Der letztere verbrennt an der Luft, ohne einen Rückstand zu hinter-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0821-7

lassen. Werden die Sennesblätter einige Stunden mit Wasser macerirt, und die Flüssigkeit filtrirt, so setzt diese beim Aufkochen grüne Flocken von geronnenem Eiweiße ab, und zur Trockne gebracht, entwickelte Schwefelsäure daraus Essigsäure, die darin an Kali gebunden enthalten ist.

Nach dieser Analyse enthalten die alexandrinischen Sennesblätter: grünes Pflanzenharz; fettes Oel; flüchtiges Oel; Eiweiß; Kathartin; gelben Farbestoff; Schleim; Aepfelsäure; äpfels. und weinsteins. Kalk und essigs. Kali.

Die Asche der Sennesblätter enthält basisches kohlens., salzs. und schwefels. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk, und Spuren von schwefels. Kalk und Kieselerde.

Bisweilen kommen im Handel auch die Sennesbälglein (Folliculi Sennae) vor, die nach der Analyse von Feneulle (Kastn. Archiv I. 4. S. 465.; Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 155.) eine ziemlich mit den Sennesblättern übereinstimmende Zusammensetzung haben, jedoch von schwächerer Wirkung und daher auch wenig im Gebrauche sind.

Die Sennesblätter, deren purgirende Eigenschaften schon den arabischen Aerzten bekannt waren, werden verordnet in Pulvergestalt, am zweckmäßigsten aber im Aufgusse. Ein langes Kochen ist sorgfältig zu vermeiden, weil dadurch nicht allein die flüchtigen Theile verloren gehen, sondern auch der Sennastoff durch Oxydation zu einem Bauchgrimmen erregenden Harze wird. Sehr zweckmäßig werden dem Sennaaufgusse Manna und Mittelsalze zugesetzt, wodurch das bekannte Wienertränkchen erhalten wird. In Pulverform gehen die Sennesblätter in das Electuarium lenitivum ein.

Sepia. Der Knochen. Weißes Fischbein.

Sepia officinalis Linn. Ein zu den Weichthieren gehöriges Thier des mittelländischen Meeres.

Der auf dem Rücken des Thieres befindliche längliche, auf der einen Seite fast flache, auf der andern convexe, zerreibliche Knochen, aus dünnen Lamellen, die durch äußerst feine hohle Säulchen verbunden sind, zusammengesetzt, und aus kohlensaurer Kalkerde bestehend.

Der Black- oder Tintenfisch (Sepia officinalis Linn.; Octopus vulgaris Cuv.), zu den Weichthieren (Mollusken), zu der Ordnung der Kopffüßler gehörig, findet sich an den Küsten des mittelländischen und atlantischen Meeres, wo er von kleinen Fischen, Krebsen und andern weichen Seethieren lebt. Er ist gallertartig, hält manchmal einen Fuß im Durchmesser, und hat zwei lange Fühlfäden und acht mit Warzen besetzte Arme, mit denen er sich sehr fest anzuklammern fähig ist. In der Mitte zwischen diesen Armen befindet sich der Mund. Er hat die Gewohnheit, bei annähernder Gefahr eine schwarze Feuchtigkeit von sich zu spritzen, wodurch er das Wasser

für seinen Feind undurchsichtig macht, und Zeit gewinnt, flüchten zu können. Hiervon hat er den Namen Tintenfisch erhalten. Er hat nur einen einzigen Knochen oder innere Schale, welche auf dem Rücken liegt, die Größe einer Hand erreicht, in der Mitte daumensdick ist, gegen den Rand hin aber dünn und scharf wird; oben ist dieselbe hart und fest, unten schwammig und zerreiblich.

Dieser Knochen ist das in den Apotheken vorkommende weiße Fischbein oder Meerschaum (Os Sepiae). Es wird häufig auf dem mittelländischen und atlantischen Meere schwimmend gefunden, welches theils von den gestorbenen und verfaulten Thieren, theils davon herrühren kann, daß, wie einige Naturforscher behaupten, diese Thiere die Gewohnheit haben, manchmal den harten Rücken abzuwerfen. Das Wasser und die Sonnenhitze ziehen aus dem schwimmenden Knochen alle fetten und gallertartigen Theile heraus, und die salzigen Bestandtheile des Meerwassers treten ein, wovon der salzige Geschmack desselben abzuleiten ist. Uebrigens besteht er ganz aus kohlensaurer Kalkerde.

Das weiße Fischbein wird auch bisweilen zu Zahnpulvern gebraucht, zu welchem Behufe aber nur der zerreibliche, schwammige Theil, von dem obern harten und festen Theile befreit, zu verwenden ist. Das Pulver dient auch zum Poliren.

Die Blackfische werden in Italien gegessen.

Serpentaria Virginiana. Die Wurzel. Virginische Schlangenwurzel.

Aristolochia Serpentaria Linn. Eine ausdauernde Pflanze Virginiens und Carolinas.

Eine faserige Wurzel, mit kurzem, sehr gewundenem (aus den Anfängen der Zweige) höckerigem Kopfe (Wurzelstocke), mit langen, sehr dünnen, zahlreichen, in einander geflochtenen, bräunlichgelblichen Wurzelfasern, von scharfem gewürzhaftem Geschmacke, und durchdringendem campherartigem Geruche.

Aristolochia Serpentaria Linn. Virginische Osterluzei oder Schlangenwurzel.

Linn. Cl. XX. Gynandria. Ord. 3. Hexandria.

Juss. Cl. V. Ord. 1. Aristolochieae.

Diese Pflanze, welche zuerst 1633 von Thomas Johnson beschrieben zu seyn scheint, wächst in Virginien, Pennsylvanien und Carolina an bergigen Stellen.

Die Wurzel ist kriechend, aus einer großen Anzahl weißlicher, etwas ästiger Fasern bestehend. Der Stengel aufsteigend, gebogen, schlank, 8—10 Zoll hoch, fast einfach und schwach behaart. Die Blätter stehen abwechselnd, sind gestielt, herzförmig, zugespitzt, ganzrandig, am Rande leicht gewimpert

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0823-8

und etwas behaart. Die Blüthen klein, röthlichbraun, gestielt, am untern Theile des Stengels sitzend, und scheinen gleichsam aus der Erde hervorzukommen.

Die officinelle Wurzel dieser Pflanze, welche öfters an dem Wurzelkopfe noch Ueberbleibsel des Krautes zeigt, ist auswendig von bräunlich-gelblicher oder bräunlich-grüner, inwendig von weißlicher oder gelblicher Farbe, in der Mitte mit einem rostfarbenen Punkte versehen. Sie hat einen sehr durchdringenden, gewürzhaften, campherartigen und etwas der Baldrianwurzel ähnlichen Geruch, und einen ähnlichen beißenden und erwärmenden bitterlichen Geschmack.

Sie soll bisweilen mit der virginischen Haselwurzel (Asarum virginicum) vermischt vorkommen, die sich aber schon durch ihre schwarze Farbe unterscheidet.

Bucholz (Berl. Jahrb. 1807. S. 129.) erhielt durch Destillation der zerkleinerten Wurzel mit Wasser ein Destillat von dem starken durchdringenden Geruche der Wurzel, nebenbei aber auch einem faden, dem der Kantharide, wenn sie zu Pflaster bereitet werden, ähnlichen Geruche. Der Geschmack war schwach brennend, dem des Cajeputöls nicht unähnlich. Ueber frische Wurzel cohobirt klärte sich das milchige und trübe Destillat in der Ruhe ab, und es konnten einige Grane eines gelben ätherischen Oels von blaßgelber Farbe, dünnflüssiger Beschaffenheit, von bitterlichem, ziemlich brennendem Geschmacke, und im Geruche einem Gemische von Campher und Baldriandl ähnlich, abgesondert werden.

Die in der Retorte enthaltenen Wurzeln, 1000 Gran an Gewicht, wurden mit Wasser ausgekocht. Der Rückstand wog 816 Gran, und sah etwas dunkler grau als vorher aus. Die klar filtrirten Absude gaben zur Trockne verdunstet 280 Gran eines schwarzbraunen, auf der Oberfläche glänzenden, gepulvert gelbbraunen, etwas ins Röthliche fallenden Extracts, welches scharf und bitter schmeckte, ein Gefühl von Wärme im Munde erregte, einen kaum merklichen faden Geruch besaß, und aus der Luft leicht Feuchtigkeit anzog. Eine Auflösung davon wurde durch schwefels. Eisen und kohlens. Kali nicht getrübt; salpeters. und salzs. Baryt hingegen bewirkten Trübungen, die durch Erhitzen mit Salpetersäure nicht gänzlich wieder verschwanden.

Aus dem staubig trocknen Rückstande zog siedender Alkohol 12 Gran aus, die mit Wasser behandelt in 3 Gran eines dunkel röthlichbraunen Harzes und in 9 Gran sogenannten Seifenstoff von stark bitterm und scharfem Geschmacke zerfielen.

Die mit Wasser ausgekochten Wurzeln wurden nun mit absolutem Alkohol digerirt, wodurch 5 Gran einer schmierigen, grünlichgelben, ins Bräunliche fallenden Masse, die erwärmt schwach vanillenartig roch, erhalten wurden, die sich in Terpenthinöl und Schwefeläther leicht auflöste, und zu den Weichharzen zu zählen ist.

Der Rückstand auf dem Filter, beim Filtriren der Abkochung, wog 170 Gran. 70 Gran davon hinterließen beim Einäschern, wobei sich saure bran-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0824-4

stige Dämpfe entwickelten, 40 Gran, die sich als Gemisch von Thonerde, Eisenoxyd, Kalk- und Kieselerde zeigten, wonach jener Satz von den, alles Reibens und Abschlagens ungeachtet, den Würzelchen noch anhängenden erdigen Theilchen herrührt.

In einer andern Analyse digerirte Bucholz zuerst mit Weingeist, die Tinctur war dunkel gelbbraun, roch und schmeckte stark nach Serpentaria. Das geistige Extract wurde mit Wasser ausgekocht; das unaufgelöst bleibende Harz hatte die Consistenz einer Salbe, eine grünlichbraune Farbe, und einen bittern, etwas beißenden, dem Oele nicht unähnlichen Geschmack. Aus der wäßrigen Auflösung sonderte sich noch etwas Harz ab; zur Trockne verdunstet bestand der Rückstand aus Seifenstoff und schleimigen Theilen. Der Seifenstoff war gelbbraun, ins Rothe fallend, zog die Feuchtigkeit stark an, schmeckte durchdringend bitter und etwas weniges beißend, und war in absolutem Alkohol auflöslich.

1000 Th. der Wurzel enthalten: ätherisches Oel, als vorzüglich charakteristischen Bestandtheil 5; ein schmieriges, bitteres, dem Oele in seinen Eigenschaften ähnliches Harz 28½; einen noch bitterern Seifenstoff 17; gummigen Extractivstoff 181; Pflanzenfaser 624; Verlust, größtentheils der Feuchtigkeit der Wurzel zuzuschreiben, da 1000 Th. bei sehr mäßiger Wärme schon 120 Th. verloren, 144½. S. = 1000.

Chevallier (Trommsd. N. J. V. 2. S. 78.) erhielt gleichfalls ein wesentliches Oel. Der Rückstand von der Destillation röthete das Lackmuspapier. Das Extract wurde mit Alkohol behandelt, welcher alle Bitterkeit aufnahm, und so eine geringe Menge einer harzigen Materie, eine in Wasser und Alkohol auflösliche gelbe Materie, Gummi und Eiweißstoff geschieden. Ein anderer Theil des Extractes wurde mit essigs. Blei niedergeschlagen; die gefällte Säure war Aepfelsäure und eine kleine Menge Phosphorsäure. Jod zeigte in der Abkochung kein Stärkemehl an; jedoch hinderte bloß die Härte der Oberhaut die auflösende Kraft des Wassers, denn wenn man die gekochte Wurzel zerreibt und einen Tropfen Jodauflösung zusetzt, so entsteht sogleich eine violette Farbe.

Nach Chevallier enthält die Schlangenwurzel: 1) ein flüchtiges Oel, welches den Geruch der Wurzel hat; 2) Stärkemehl; 3) eine harzige Materie; 4) eine gummige Materie; 5) Eiweiß; 6) eine gelbe bittere Materie, die eine Reizung im Schlunde verursacht, in Alkohol und Wasser auflöslich und als der wirksame Bestandtheil anzusehen ist (Bucholz's Seifenstoff); 7) Aepfelsäure und Phosphorsäure mit Kali verbunden; 8) eine kleine Menge äpfels. Kalk; 9) phosphors. Kalk; 10) Eisen; 11) Kieselerde.

Peschier (Taschenb. 1823. S. 130.) fand in 10 Unzen Wurzeln: flüchtiges Oel, einige Tropfen; ein fettes aromatisches Oel 42 Gran; ein braunes Harz 100 Gran; Isolusin, eine von P. auch in der Senegawurzel aufgefundene Substanz, mit dem Seifenstoffe mehrerer Chemiker übereinkommend, 150 Gr.; einen gelbfärbenden Stoff; eine gummöse Substanz; Aepfel- und Phosphorsäure. Durch ihre gegenseitige Einwirkung auf einander sind

nach Peschier alle diese Stoffe in kochendem Wasser auflöslich, und ein stärkerer Aufguß der Wurzel besitzt demnach die ganze Wirksamkeit derselben.

Das frische Kraut der Serpentaria und dessen Saft soll ein beinahe sicheres specifisches Mittel gegen den Biß mehrerer giftigen Schlangen, und sogar den Schlangen selbst schädlich seyn. Bei uns wird die Wurzel als ein die Blutwärme vermehrendes, fieberstillendes und antihysterisches Mittel in Pulverform oder auch zweckmäßig im heißen Aufgusse verordnet. Sie muß sorgfältig, am besten in steinernen mit doppeltem Papier verschlossenen Kruken, verwahrt, auch das Pulver nicht auf zu lange Zeit vorräthig gehalten werden.

Serpyllum. Das Kraut. Feldkümmelkraut. Quendel.

Thymus Serpyllum Linn. Ein europäischer, an sonnigen Stellen sehr häufiger kleiner Strauch.

Das bittere und gewürzhafte Kraut, von angenehmen Geruche, mit gestrecktem Stengel, kleinen, gegenüberstehenden, kurz gestielten, eiförmigen, stumpfen, an der Basis wimperigen Blättern, mit kopfförmigen, purpurröthlichen Blumen. Im Monat Juni und Juli einzusammeln. Die Varietät oder Art mit lancettförmigen Blättern ist von derselben Wirksamkeit.

Thymus Serpyllum Linn. Der Feldkümmel. Quendel.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 1. Gymnospermia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 6. Labiatae.

Der Quendel ist durch ganz Europa an trocknen sonnigen Stellen gemein. Er ist ein kleines niederliegendes Strauchgewächs, mit sehr ästigen, an der Spitze aufsteigenden und oft dichte Rasen bildenden Stengeln. Die Wirtel der Blumen sind unten weitläufig, nach oben, wo sie eine fast kugelige Aehre bilden, gedrängt.

Man unterscheidet drei verschiedene Formen dieser Pflanze, die gemeinschaftlich unter dem Namen **Herba Serpylli** eingesammelt werden, nämlich **Thymus sylvestris Schr., Th. parviflorus** und **Th. angustifolius Pers.** Nees v. Esenbeck betrachtet diese verschiedenen Formen als eigene Arten.

Zum Gebrauche wird die blühende Pflanze eingesammelt; sie besitzt im blühenden Zustande einen sehr angenehmen, durchdringenden, citronenartigen Geruch und gewürzhaften Geschmack. Sie enthält nur wenig ätherisches Oel; 15 Pfund Kraut geben nach Hagen 4 Scrupel Oel von rother Farbe und dem durchdringendsten Geruche.

Der Feldkümmel wird vorzüglich äußerlich und zur Bereitung des **Spir. Serpylli** angewandt.

Siliqua dulcis. Johannisbrod.

Ceratonia Siliqua Linn. Ein im Orient und im südlichen Europa häufiger Baum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0826-6

Die lederartige, zusammengedrückte, kastanienbraune Hülse, von vier oder fünf Zoll Länge und drüber, mit einem trocknen, süßen, zwischen den Saamen liegenden Marke angefüllt.

Ceratonia Siliqua Linn. Der Johannisbrodbaum.
Linn. Cl. XXIII. Polygamia. Ord. 3. Trioecia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Der Johannisbrodbaum, schon seit den frühesten Zeiten bekannt, und in den ältesten Schriften erwähnt, wächst auf den Inseln des Archipelagus, in Aegypten und Syrien, auch in den mittägigen und wärmeren Gegenden Europas, in Spanien, Provence, Sicilien. Bei uns wird er in Gewächshäusern gezogen. Er ist ein Baum von mittlerer Größe, immergrün, mit ausgebreiteter Krone, wie die des Aepfelbaumes. Der Stamm ist mit einer braunen und unebenen Rinde bedeckt; die Aeste sind gekrümmt. Die immergrünen Blätter stehen abwechselnd, sind gepaart-gefiedert, und bestehen aus 6—8 eirund-stumpfen, lederartigen, oben dunkelgrünen, unten blassen und geaderten Blättchen. Die traubenförmigen Blüthen kommen an dem nackten Theile der Zweige und den Achseln der Blätter hervor; sie sind anfangs purpurroth, und werden weißlicher, je mehr sie in ihrer Entwickelung fortschreiten.

Die Frucht ist eine Art Schote, oder vielmehr Hülse, welche 4, 6 bis 8 Zoll lang, gegen einen Zoll breit, stumpf, zusammengedrückt, lederartig, gewöhnlich bogenförmig gekrümmt, glatt, an den Rändern dick, frisch grün, getrocknet kastanienbraun, und inwendig durch Querwände in viele Fächer getheilt ist, wovon jedes Fach in einem frisch saftigen Marke einen rundlichen, etwas elliptischen, zusammengedrückten, flachen, gelbbräunlichen, sehr harten und glänzenden Saamen enthält.

Der Baum blüht im März und die Früchte reifen im Herbste.

Die unreife Frucht schmeckt herbe, die reife sehr süß. Das Mark ist süß, weich, dick und hellbraun. Die zum Arzneigebrauche bestimmten Früchte müssen gehörig reif, nicht alt, nicht schimmlig und verlegen, nicht von Würmern zerfressen, zusammengeschrumpft und holzig seyn. Auch sind diejenigen verwerflich, die entweder gar keinen Saamen enthalten, oder in denen die Saamen beim Schütteln klappern.

Die der Länge nach aufgeschnittenen und von ihren Saamen befreiten Hülsen wurden sonst gegen Brustbeschwerden gebraucht, als Zusatz zu den Brustptisanen. An den Orten, wo der Baum einheimisch und sehr häufig ist, werden die Früchte gegessen, auch selbst zur Fütterung des Viehes angewandt.

* Siliqua hirsuta. Kratzbohne.

Dolichos pruriens Linn. Juckende Fasel.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Die juckende Fasel ist eine in Ostindien einheimische Pflanze. Sie win-

det sich an Stangen in die Höhe, und trägt Hülsen, die lederartig, 4—5 Zoll lang, fingersdick und wie ein lateinisches S gebogen sind. Von außen sind sie ganz dicht mit rothbraunen, kurzen, scharfen, leicht abzureibenden Haaren besetzt, welche auf die Haut gebracht erst ein lästiges Jucken, bald aber, wenn man die Stellen der Haut reibt, ein heftiges Brennen erregen. Diese Haare, die man Kuhkratze (Setae s. Lanugo Siliquae hirsutae, Stizolobium) und in Amerika Couhage oder Cowitch nennt, sind sonst in sehr kleinen Gaben gegen Eingeweidewürmer, in einen dicken Syrup oder in eine Latwerge gemischt, empfohlen worden, kommen aber, da ihr Gebrauch gefährlich scheint, gar nicht mehr in Anwendung.

Simaruba. Die Rinde. Simarubarinde. Ruhrrinde.

Quassia Simaruba Linn. Simaruba officinalis De Candoll.

Ein amerikanischer in Guiana sehr häufiger Baum.

Die sehr bittere Rinde der Wurzel, in langen, zähen, 2 Linien dicken Stücken, mit röthlichgelber Oberhaut, sehr dünner äußerer, sehr dicker innerer, durchweg faseriger Rinde, die Faser dünn, leicht zu trennen, gelblich.

Quassia Simaruba Linn. Simaruba officinalis DeC. Simaruba Guyanensis Rich. Simaruba amara Aubl. Officinelle Simaruba. Guianensische Simaruba.

Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 1. Triandria.

Juss. Cl. XIII. Ord. 15. Magnoliae.

Dieser große, 60—70 Fuß hohe Baum, ungefähr von dem Ansehen einer Esche, wächst an sandigen Orten Guianas, auf St. Domingo und Jamaika wild. Der Stamm ist aufrecht und hält bis 2 Fuß im Durchmesser. Die Blätter sind abwechselnd, nach der Spitze der Aeste zu mehr genähert, gefiedert, glatt. Der gemeinschaftliche Blattstiel 1—1½ Fuß lang, etwas gerinnt, besonders nach der Spitze zu. 10—16 abwechselnde, kurz gestielte, längliche, zugerundete, stumpfe Blättchen, welche etwas ausgerandet oder mit einer sehr kurzen Spitze versehen, glatt, dick und lederartig, ohne deutliche Seitenadern sind. Die zweihäusigen, kleinen Blüthen stehen in einer großen, verzweigten Rispe; jeder Blüthenzweig ist mit einem spatelförmigen, langgestielten, blüthenständigen Blatte versehen. Die sehr kurzgestielten Blüthen sind weißlich.

Die officinelle Wurzelrinde erhalten wir in zwei Fuß und darüber langen, etliche Zoll breiten, zusammengerollten, der Länge nach mehrmals zusammengewickelten Stücken, 1—2 Linien dick, von faserigem Gewebe, biegsam, ungemein zäh, von hellbräunlich grauer Farbe, äußerlich mit rundlichen scharf anzufühlenden Erhabenheiten besetzt, auf der inwendigen Fläche meistens glatt, zuweilen noch von einem aufsitzenden Splinte rauh, ohne Geruch und von einem rein bittern, sich allmälig erst beim Kauen entwickelnden Geschmacke, ohne irgend etwas Zusammenziehendes.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0828-7

Verwerflich sind die Stücke, welche auf der äußern und innern Oberfläche dunkelbraun und dabei fast ohne Geschmack sind, so wie die holzigen, weniger zähen Stücke, denen die rundlichen Erhabenheiten fehlen.

Das Wasser zieht aus dieser Rinde in der mittleren Temperatur die Bitterkeit besser aus, als in der Hitze, wovon der Grund ohne Zweifel in der durch die Hitze begünstigten Oxydation, wodurch der Extractivstoff unauflöslicher wird, liegt. Der wäßrige Aufguß ist hell, und hat eine gelbliche Farbe, welche nach Pfaff durch die oxydirten Eisensalze noch erhöht wird, wobei sich ein röthlicher Niederschlag absetzt. Das über die Rinde abgezogene Wasser ist völlig geruchlos. Die wäßrige Abkochung, so lange sie noch heiß ist, ist durchsichtig und gelb, beim Erkalten wird sie trübe und röthlichbraun. Weingeist zieht eine bräunlichgelbe Tinctur aus.

Morin (Taschenb. 1824. S. 118.; Berl. Jahrb. XXIV. 2. S. 81.) behandelte die Rinde mit Aether, welcher ein gelbes Weichharz von scharfem und gewürzhaftem Geschmacke auszog, welches seine Weichheit und seinen Geschmack vorzüglich einem kleinen Antheile von ätherischem Oele verdankte, das durch darüber abgezogenes Wasser davon getrennt, diesem den Geschmack der harzigen Substanz und einen der Benzoësäure ähnlichen Geruch mittheilte, während das Harz nach dem Erkalten sich nur von brüchiger Beschaffenheit zeigte. Kalilauge löste das Harz leicht auf, und gab damit eine prächtig röthlichgelbe Flüssigkeit. Weingeist von 83 Procent zog nur aus der Rinde noch einen Antheil jenes Harzes, bittern Extractivstoff und Salze aus. Durch Abziehen des Weingeistes und durch Abwaschen des Rückstandes mit Weingeist konnte ersteres getrennt und von allem Bitterstoffe befreit werden. Das Wasser enthielt nur das bittere Princip mit Säure und Salz verbunden, welche der Geschmack verrieth. Durch Krystallisation wurde salzs. Kali, durch essigs. Blei die Säure abgeschieden, welche sich als Aepfelsäure mit einem kleinen Antheile Gallussäure (Eisensalze wurden geschwärzt und die Gallerte niedergeschlagen) bewies, und auf diese Weise das wirksame bittere Princip der Simarubarinde in seiner Reinheit dargestellt. Dieses kam in allen seinen Eigenschaften, und namentlich in dem indifferenten Verhalten gegen Metallauflösungen mit dem bittern Princip der Quassia überein. Es ist extractförmig, löst sich in Weingeist und Wasser auf, wird weder von schwefels. Eisen, noch salpeters. Kupfer und Blei, noch ätzendem salzs. Quecksilber niedergeschlagen; es besitzt einen sehr heftig bittern Geschmack; die Alkalien machen die Auflösung des Stoffes dunkler, schlagen aber daraus nichts nieder. Auch zeigte sich darin eine Aehnlichkeit des Verhaltens des auf obige Weise durch den Alkohol erhaltenen Extracts der Simaruba mit der Quassia, daß es, wie dieses, ein ammoniakalisches Salz, und zwar wie es schien essigs. Ammoniak, enthielt.

Die durch Aether und Weingeist erschöpfte Rinde gab an das Wasser, womit sie gekocht wurde, noch etwas Harz, Aepfelsäure und sauren äpfels. Kalk, an die Salzsäure, die dann angewandt wurde, kleesauren Kalk, und endlich an die Kalilauge Ulmin ab.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0829-6

Nach dieser Analyse enthält die Simarubarinde: 1) eine harzige Materie; 2) ein flüchtiges, den Geruch der Benzoësäure habendes Oel; 3) salzs. Kali; 4) ein Ammoniaksalz; 5) Aepfelsäure und Spuren von Galläpfelsäure; 6) Quassin; 7) äpfels. und sauerkleesaur. Kalk; 8) einige Mineralsalze, Eisenoxyd und Kieselerde; 9) Ulmin und Holzfaser.

Die Simaruba wird gegen Diarrhöe und Ruhr in Pulvergestalt oder passender im Aufgusse oder auch in der Abkochung verordnet; in starker Dosis erregt sie Erbrechen und lästige Schweiße.

Sinapis. Der Saame. Schwarzer Senfsaame.

Sinapis nigra Linn. Eine einjährige überall angebaute Pflanze Europas.

Kleine, kugelrunde, braune, sehr scharfe Saamen. Sie müssen nicht mit den Saamen der Brassicaarten, welche größer und weniger scharf sind, verwechselt werden.

Sinapis nigra Linn. Schwarzer Senf.
Linn. Cl. XV. Tetradynamia. Ord. 2. Siliquosa.
Juss. Cl. XIII. Ord. 3. Cruciferae.

Der schwarze Senf wächst fast in ganz Europa, die nördlichen Theile ausgenommen, an feuchten Orten und an den Ufern der Flüsse.

Die Wurzel ist einjährig, aber ziemlich fest und fast holzig. Der Stengel aufrecht, rund, platt, blaugrün bereift, und zuweilen mit einzelnstehenden kurzen und steifen Borsten besetzt, er theilt sich gegen die Spitze hin in viele lange aufrechtstehende Aeste. Die untern Blätter sind leierförmig, mit einen oder zwei kleinen Seitenblättchen und einem großen dreilappigen unregelmäßig gezahnten Endblatte, nach oben werden die Blätter schmäler, die Seitenblättchen verschwinden, und gehen so in lancettförmige hängende Blätter über. Die gelben, kleinen, gestielten Blüthen stehen in langen Trauben am obern Theile der Verzweigungen des Stengels. Die viereckigen Schoten legen sich aufrecht an den Stengel an; sie sind kurzgestielt, vierseitig, glatt, ungefähr einen halben Zoll lang, mit dem kurzen Griffel gekrönt, und enthalten 4—6 rundliche, etwas plattgedrückte, mit concentrischen Strichen bezeichnete braunrothe oder schwärzliche Saamen, von bitterlichem, sehr scharfem Geschmacke, und zerrieben von einem reizenden niesenerregenden Geruche.

Die Vermengung dieser Saamen mit Kohlsaamen ist leicht zu entdecken.

Thitierge (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 250.) erhielt bei der Destillation des Senfsaamens mit Wasser ein milchiges Destillat und etwas ätherisches Oel von goldgelber Farbe, scharfem und brennendem Geschmacke. Letzteres ist so flüchtig, daß es, wenn man es ein wenig schüttelt, einen so durchdringenden Geruch verbreitet, daß es unmöglich ist, an dem Orte zu bleiben, wo es sich ausbreitet, ohne zu starken Thränen gereizt zu werden. Auf der Haut wirkt es wie ein Vesicatorium. Die Auflösung des Oels in Wasser, so wie das destillirte Senfwasser verlieren an der Luft in eini-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0830-7

gen Stunden ihren beißenden Geschmack, werden fade und setzen ein graulicheres Pulver ab, welches als Schwefel mit einer kleinen Menge Oel erkannt wurde.

Wasser und Wein zogen aus den ganzen Senfsaamen nur etwas Schleim aus. In Essig erlangte er sein doppeltes Volumen und einen bei weitem wärmern und beißenden Geschmack. Aether und Alkohol nahmen aus dem gepulverten Senfe nur etwas fettes Oel auf. Durch Auspressen wurde ein fettes Oel von grünlicher Farbe erhalten, die goldgelb erscheint, wenn es verdünnt wird, von einem süßen und angenehmen Geschmacke, und von einem sehr leichten Senfgeruche, der ihm durch Alkohol entzogen werden konnte. Es ist in Aether und Alkohol auflöslich, und giebt mit ätzendem Natron eine sehr feste Seife.

Bei der trocknen Destillation giebt der Senf die gewöhnlichen Producte, gegen das Ende Schwefeldämpfe und ein ammoniakalisches Salz.

Der schwarze Senfsaamen enthält hiernach: 1) ein ätherisches, scharfes, brennendes Oel, specifisch schwerer als Wasser, in welchem die Schärfe des Saamens liegt; 2) ein fettes süßes Oel; 3) eine vegetabilisch-eiweißartige Materie; 4) eine große Menge Schleim; 5) Schwefel und 6) Stickstoff. Die Asche der Saamen enthält schwefels. und phosphors. Kalk und ein wenig Kieselerde.

Glaser (Buchn. Repert. XXII. S. 102.) schließt aus seinen Versuchen: 1) daß der scharfe Stoff des Senfes (des Rapses und vielleicht auch der übrigen Cruciferen) von äußerst flüchtiger Natur sey, sich aber erst bei der Berührung mit einer wäßrigen Flüssigkeit häufig entwickele; 2) daß er zum Theil im fetten Oele der Saamen aufgelöst, und sich durch öfteres Auswaschen mit Wasser und Behandlung mit Schwefelsäure nicht völlig davon trennen läßt, sondern erst bei dem Erhitzen entweiche; 3) daß dieser Stoff ätherisch-öliger, nicht ammoniakalisch-salziger Natur sey u. s. w.

Nach Fontenelle (Geiger's Magazin 1825. October. S. 81.) enthält der Aufguß der Senfsaamen viel Eiweißstoff und freie Kohlensäure; er röthet das Lackmus und färbt den Veilchensaft grün. Der Verf. glaubt dieses Phänomen einem übersaurem kohlensauren Salze zuschreiben zu müssen; wird der Aufguß erhitzt, so werden Lackmustinctur und Veilchensaft grün gefärbt. Der eingeäscherte Senfsaamen enthält keine phosphorsauren Salze.

Durch starkes Pressen der frisch beinahe zu einem Teige zerstoßenen Senfsaamen erhielt F. ungefähr zum fünften Theile ihres Gewichts ein sehr süßes, beinahe geruchloses Oel, das eine stärkere Consistenz als das Olivenöl und eine Bernsteinfarbe zeigte; spec. Gew. 0,9202. Es gesteht nur bei einer Temperatur unter 0 °, ist in 4 Th. Aether und in 1000 Th. höchst rectificirten Weingeistes auflöslich. Es wirkt als Wurmmittel beinahe eben so constant, als das Ricinusöl.

Durch Destillation mit Wasser wurde ein flüchtiges Senföl erhalten, von welchem allein die medicinischen Eigenschaften des Senfsaamens herrühren. Es ist citronengelb, und besitzt einen eben so starken und eben so durchdrin-

genden Geruch, wie das Ammoniak. Spec. Gew. 1,0387; es übertrifft darin bis jetzt alle einheimischen ätherischen Oele. Es wird etwas vom Wasser (eine halbe Drachme von zwei Pfunden), sehr leicht aber von Alkohol aufgenommen, löst selbst Schwefel und Phosphor auf, und hat die merkwürdige Eigenschaft, die Gährung des Traubenmostes zu hindern, und sie zu hemmen, wenn sie schon angefangen hat. Es enthält etwas Schwefel; denn sowohl die Auflösung desselben in Wasser, als der Aufguß der Saamen setzen ein weißes Pulver ab, das aus Schwefel und flüchtigem Senföl besteht. Dieses Oel besitzt die blasenziehende Eigenschaft im hohen Grade, und eine Auflösung desselben in Wasser (Senfwasser) ist zum Waschen als rothmachendes Mittel von schneller Einwirkung zu empfehlen. Auch gegen die Krätze soll es sehr heilsam seyn.

Durch Benutzung der Senfsaamen auf fettes Oel wird ihnen an Wirksamkeit nichts entzogen.

Henry jun. und Garrot (Schw. N. J. 1826. 2. S. 470.; Berzelius Jahresbericht 1827. S. 242.) haben Versuche angestellt, um den Zustand des in den Senfsaamen befindlichen Schwefels auszumitteln. Sie behandelten fettes Senföl mit Alkohol und erhielten an den Wandungen des Gefäßes eine röthliche, körnige, im Wasser auflösliche, sehr saure Substanz von stechendem bittern Geschmacke, der an den Geruch der antiscorbutischen Pflanzen, während der Destillation, erinnerte. Sie haben gefunden, daß diese Substanz eine neue Säure sey, der sie dem Namen Schwefelsenfsäure gegeben haben, weil sich unter ihren Grundbestandtheilen Schwefel befindet. Die Schwefelsenfsäure wird aus dem fetten Oele auf folgende Art erhalten. Das ausgepreßte Oel, am besten aus dem gelben Senf, welcher am meisten giebt, wird mit $1\frac{1}{2}$ seines Volums Alkohol von 0,827 oder noch stärkerem kalt macerirt, und die Flüssigkeit nach 12—15 Tagen und nach öfters geschehenem Umschütteln abgegossen. Sie wird dann mit wenigem Wasser vermischt, und der Alkohol zur Hälfte abdestillirt. Beim Erkalten schießen perlmutterglänzende Schuppen an, die ein eigenes Fett bilden, welches dem Gallenfette (Cholesterin) darin gleicht, daß es von Alkali nicht saponificirt wird. Die geklärte Flüssigkeit wird der freiwilligen Abdampfung überlassen, während dessen eine körnige rothe Masse anschießt, die man abscheidet. Sie ist die unreine Säure. Mehrere Male nach einander mit Aether behandelt, löst dieser einen fetten Stoff auf, welcher den Aether carminroth färbt, und welcher, wenigstens theilweise, flüchtig ist. Die Aetherauflösung wird abgegossen, wobei die reine Säure zurückbleibt. Sie wird in wenig Wasser aufgelöst, und die Auflösung freiwillig oder im luftleeren Raume über Schwefelsäure abgedampft. Die Säure bildet dann kleine, halbkugelförmige Gruppen, die aus kleinen glänzenden Krystallblättern bestehen; auf den Stellen, wo die Auflösung nur einen dünnen Ueberzug bildete, giebt sie sternförmige Krystallisationen, ähnlich dem Moirée metallique. Sie hat eine schwach gelbliche Farbe, schmeckt bitter, stinkend und schwefelartig. Sowohl von Wasser als von Alkohol wird sie aufgelöst. Die Lackmustinctur röthet sie nicht, sondern

bleicht sie, gerade wie die Auflösung der unterschwefligsauren Salze, aber die Malventinctur wird davon geröthet. Bei + 110 ° kann sie ohne Zersetzung vollkommen ausgetrocknet werden. Wird die Auflösung gekocht, so zersetzt sich die Säure nach und nach, und ein im Gefäße aufgehängtes mit einem Bleisalze bestrichenes Papier wird dabei geschwärzt. Salpeters. Silber, salpeters. Queckſilberoxydul und basisches essigsaures Bleioxyd werden weiß, die Eisenoxydsalze mehr oder weniger tief purpurroth gefällt, und diese sind dabei so empfindlich, daß man damit sehr unbedeutende Mengen von Senfsäure entdecken kann. Sie bildet mit den ungefärbten Basen eigene ungefärbte, durch einen bittern Geschmack ausgezeichnete Salze. In Metallgefäßen wird sie zersetzt, und es werden Schwefelmetalle gebildet. (Diese Säure könne durch Behandlung mit Alkohol und durch Anwendung eines reagirenden Eisenoxydsalzes in der Infusion und im destillirten Wasser anderer Cruciferen, als Meerrettig, Rothkohl, Rübel, Radieschen u. s. w. dargethan werden). Bestandtheile dieser Säure sind: Kohlenstoff 49,50; Wasserstoff 8,30; Schwefel 17,33; Stickstoff 12,96; Sauerstoff 11,91. Die Verf. vermuthen, daß sich der Schwefel in verschiedenen Zuständen der Verbindung in den Vegetabilien befinden könne.'

Schweigger-Seidel (Schw. N. J. XIX. 1. S. 58.) hat die Vermuthung ausgesprochen, daß die Schwefelsenfsäure nichts anderes sey, als eine Verbindung von schwefelsaurem Ammoniak und organischen Stoffen. Wenn Henry und Garrot es ausdrücklich hervorgehoben haben, daß bei der Hinzufügung von Kalk-, Strontian- und Barytwasser sich kein Ammoniak entwickele, so widerspricht der Verf. dieser Angabe geradezu, indem nicht bloß die Krystalle, sondern selbst die geistigen und wäßrigen Auszüge des Senfsaamens mit Kalk und Alkalien aufs deutlichste Ammoniak entwickeln, was die erstere Vermuthung wahrscheinlich macht.

Noch zweifelhafter wird die Existenz der Schwefelsenfsäure durch die Untersuchungen Hornemann's (Berl. Jahrb. XXIX. 1. 1827. S. 29.), welcher schon im vorigen Bande desselben Jahrbuches S. 217. angekündigt hatte, daß ihm die Darstellung der Schwefelsenfsäure nach Henry und Garrot nicht gelungen sey. Er zerlegte mittelst Baryterdehydrat, Schwefelsäure, Destillation ꝛc. das destillirte Senfwasser in Schwefelblausäure, Schwefel, Ammoniak, flüchtiges ätherisches Oel und nicht bei der Siedehitze des Wassers sich verflüchtigendes Oel. Die Reaction auf die Eisenoxydsalze bliebe hiernach eine Eigenthümlichkeit der Schwefelblausäure, als der in den Senfsaamen enthaltenen Säure. Daß Schwefelblausäure auch in den Vegetabilien vorkommen könne, beweisen die Versuche von Schuster (Ebend. S. 39.), welcher diese Säure durch Destillation aus den Blumen der Spiraea ulmaria erhielt.

Vauquelin hat darauf aufmerksam gemacht, daß er mit Margraff im Senfsaamen Phosphor gefunden habe.

Die blasenziehende Eigenschaft des Senfs wird, wie Planche behauptet, durch Essig nicht verstärkt.

Als der wirksame Bestandtheil der Senfsaamen ist, den obigen Analysen zufolge, das ätherische Oel anzusehen.

* Spina cervina. Die Beeren. Kreuzdornbeeren.

Rhamnus catharticus Linn. Ein in Europa ziemlich häufig vorkommender Strauch.

Die frischen kugligen Beeren, von der Größe einer Erbse, außen schwärzlich, glänzend, innen grün, 3—4 eiförmige fast dreieckige Saamen enthaltend, von bitterlich-scharfem Geschmacke.

Rhamnus catharticus Linn. Der gemeine Wegdorn.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 13. Franguleae.

Dieser dornige Strauch, der 8—10 Fuß hoch und drüber, zuweilen auch baumartig wird, wächst in Gebüschen, an Hecken und ungebauten Orten.

Der Stengel ist strauchartig, gerade, ziemlich stark und ästig; die Rinde glatt, das Holz gelblich. Die entgegengesetzten Aeste sind rund, graubraun, etwas gefurcht, und an der Spitze mit einem sehr harten Dorne versehen. Die schön grünen, glänzenden, glatten Blätter sind abwechselnd, gestielt, rundlich oder eiförmig, spitzig, scharf, fein gesägt und gerippt. Die Blumen sind klein, sehr oft ganz getrennten Geschlechts, von gelbgrüner Farbe, und sitzen büschelweise auf kurzen Stielen zwischen Blättern. Blüht im Mai und Juni; die Früchte reifen im September.

Die Früchte sind runde, erbsengroße, glänzende, schwarze, an der Spitze mit einer hervorstehenden Narbe bezeichnete Beeren; sie enthalten ein saftiges, dunkelgrünes Mark und vier Saamen. Sie besitzen einen unangenehmen, widrigen Geruch und bittern ekelhaften, etwas scharfen Geschmack.

Die Beeren des Faulbaums (Rhamnus Frangula Linn.), mit denen sie verwechselt werden könnten, enthalten nur zwei Saamenkörner, die rund und etwas platt sind. Die Beeren des gemeinen Hartriegels (Ligustrum vulgare Linn.) reifen erst im October und November, haben ein dunkelviolettes mehliges Mark und vier längliche Saamen.

Der ausgepreßte Saft der Kreuzdornbeeren, von grünschwärzlicher Farbe, wurde ehedem zur Bereitung des Kreuzbeerensyrups (Syrupus spinae cervinae) von purgirender Wirkung angewandt. Auch giebt er ein gutes Reagens ab, indem er von den Säuren geröthet, von den Alkalien grün gefärbt wird. Durch Vermischung des Saftes mit gepülvertem Alaun, kohlens. Kalk, Potasche oder Magnesia wird das Saftgrün oder Blasengrün (Succus viridis) bereitet.

Spongia marina. Meerschwamm. Badeschwamm.

Spongia officinalis Linn. Ein Pflanzenthier des mittelländischen und des rothen Meeres.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0834-0 DFG

Aus sehr dünnen Fasern ganz zusammengewebt, porös, etwas schmutzig gelb, leicht, weich, elastisch, Flüssigkeiten einsaugend, oft mit eingewebten Steinchen und andern fremdartigen Körpern. Der Schwamm in kleineren Stücken, von brauner Farbe, mit größeren Poren, Pferdeschwamm genannt, ist zur Bereitung der Meerschwammkohle genügend.

Von einigen Naturforschern, und auch unlängst noch von Leuckart und Gray, ist behauptet worden, daß die Schwämme zu den Vegetabilien gezählt werden müßten, weil die Kieselerde (in dem Schwamme reichlich enthalten) so selten als ein Product des Thierreichs vorkomme, und noch nicht in den Zoophyten gefunden worden sey. Es darf indessen wohl nicht auffallend scheinend, wenn in diesen nebst den Infusionsthierchen gleichsam den Uebergang aus dem Pflanzenreich in das Thierreich bildenden Geschöpfen auch solche Bestandtheile gefunden werden, welche beiden Naturreichen zukommen.

Die Schwämme sind vielgestaltige faserige Stämme, deren Fasern mit einander verfilzt und verwebt sind. Eine thierische Materie, Gallertmasse, überzieht die Oberfläche und füllt die Zwischenräume. In ihr erzeugen sich eiförmige Schleimkörner, die zu jungen Schwämmen auswachsen. Als Aeußerung thierischer Bewegung haben mehrere eine schwache Contractibilität. Sie enthalten, außer der in Wasser löslichen thierischen Materie, Jodnatrium, phosphor- und kohlensauren Kalk und bedeutende Quantitäten Kieselerde.

Die officinellen Badeschwämme werden im rothen Meere und im mittelländischen Meere, vorzüglich bei den Inseln des Archipelagus gefischt, wo sie auf den Klippen festsitzen. Sie werden durch Abwaschen von dem thierischen Schleime befreit, und kommen nach der Feinheit sortirt und zu verschiedenen Preisen in den Handel. Wenn sie durch Schlagen und Auswaschen von den jederzeit darin enthaltenen Conchylien, steinigen und andern fremdartigen Theilen befreit worden, so sind sie weich, leicht, biegsam, elastisch, saugen das Wasser begierig ein, wovon sie eine große Menge zurückbehalten und beträchtlich aufschwellen. Bei ihrer Verbrennung verbreiten sie einen den übrigen thierischen Substanzen ähnlichen Geruch. Außer der medicinischen Anwendung, als Meerschwammkohle, finden die Badeschwämme im gemeinen Leben häufige Anwendung, und man hat ihnen durch chemische Bearbeitung ein gefälligeres Aeußere zu geben, nämlich durch Bleichen ihnen die Farbe zu entziehen gesucht. Vogel hat hierzu folgende Vorschrift gegeben: Man läßt die Badeschwämme 5—6 Tage in Wasser weichen, drückt sie während dieser Zeit alle 3—4 Stunden stark aus und wechselt das Wasser. Dieses löst aus den Schwämmen, außer einigen salzs. und schwefels. Salzen, eine braune animalische, im wasserfreien Weingeiste unauflösliche Substanz auf. Befinden sich im Innern der Schwämme kleine Conchylien und Kalksteine, welche durchs Klopfen nicht entfernt werden können, so läßt man sie 24 Stunden in einer mit 30 Th. Wasser verdünnten Salzsäure liegen, welche

dieselben löst. Die wieder sorgfältig ausgewaschenen Schwämme bringt man dann in schweflige Säure, die ein spec. Gew. von 1,024 besitzt. Nachdem sie 8 Tage darin zugebracht, und während dieser Zeit zuweilen ausgedrückt worden, legt man sie 24 Stunden in fließendes Wasser, und wenn sie genugsam ausgewaschen sind, trocknet man sie langsam an der Luft.

Die schweflige Säure hierzu bereitet man aus einem Pfunde Kohlenpulver mit einem Pfunde Schwefelsäure übergossen, und läßt das durch Wärme entwickelte Gas (indem der Schwefelsäure durch die Kohle, bei Anwendung der Wärme, ein Theil ihres Sauerstoffs entzogen, hierdurch Kohlensäure, zugleich aber auch schweflige Säure gebildet wird) in 18 Pfund Wasser streichen, oder in 4½ Pfund, die man dann noch mit 13½ Pfund Wasser verdünnt.

Heißes Wasser darf zum Auslaugen der Schwämme nicht angewandt werden, denn sie werden dadurch sehr zusammengezogen, die Poren verkleinern sich und sie nehmen eine gewisse Härte an, die sie fast zerbrechlich und zum Bleichen ganz untauglich macht.

Man hat auch Chlor als Bleichmittel angewandt.

Stannum. Zinn.

Wird aus den Zinnerzen vorzüglich in England und Ostindien bereitet.

Ein weißes, dehnbares Metall, beim Biegen knisternd, auf dem Bruche hakig, glänzend, im Feuer leicht schmelzend, in Salzsäure aufgelöst auf den Zusatz von salzsaurer Goldauflösung einen purpurfarbigen Niederschlag gebend. Spec. Gew. = fast 7,3. Das Malakkische ist vorzüglich. Das durch Kupfer und eine zu große Menge Arsenik verunreinigte werde verworfen; jenes kann in der Auflösung durch blausaure Eisenkaliflüssigkeit, dieses durch den Geruch, wenn es der Löthrohrflamme ausgesetzt wird, erkannt werden.

Das Zinn ist eins der ältesten bekannten Metalle. Es ist schon in den Büchern Mosis erwähnt. Die Phönicier haben dieses Metall aus Spanien und England geholt. Jetzt wird es in Europa, in England, Deutschland, Böhmen, Ungarn, und außer Europa, in Ostindien, auf der Insel Banca, auf Malakka, in Chili und in Mexiko gewonnen. Malakka liefert das reinste und Cornwall in England das meiste Zinn.

Das Zinn kommt selten in Verbindung mit Schwefel vor, meistens in Form eines mehr oder weniger reinen Oxyds. Das Zinnoxyd ist das gewöhnlichste Erz des Zinns. Es kommt nur im Urgebirge vor, und wird von Arsenik, Wolfram, Antimon, Kupfer und Zink begleitet, welche, wenn sie während der Processe zum Ausziehen des Zinns reducirt werden, und sich

mit dem Zinne mischen, ein weniger reines Zinn geben. Das aus den Gruben erhaltene Zinnerz muß durch Pochen und Waschen von der anhängenden Bergart befreit, und darauf geröstet werden, um Schwefel, Arsenik, und einen Theil Antimon zu entfernen, worauf es in eigenen Oefen mit Steinkohlen reducirt wird. Das Zinn, welches man bei der ersten Schmelzung erhält, wird aufs neue in einem Reverberirofen bei gelinder Hitze der sogenannten Saigerung ausgesetzt. Es schmilzt dabei zuerst das reine Zinn, und fließt von einer schwerflüssigeren Verbindung von Zinn mit Kupfer, Arsenik, Eisen und Antimon ab. Dieses Ausfließende wird in England common grain-tin genannt. Das Rückständige wird darauf niedergeschmolzen und bildet das Blockzinn (ordinary-tin). Das sogenannte grain-tin wird meistens in England selbst verbraucht, und die unreinen Arten sind die im Handel gewöhnlichsten. Malakkazinn wird für eben so gut, wie englisches grain-tin gehalten, aber das von Deutschland kommende Zinn ist immer von demselben Gehalte wie das ordinary-tin der Engländer.

Da das im Handel vorkommende Zinn theils in Folge der Gewinnung, theils durch Verfälschung oft mit einer solchen Menge fremder Metalle verunreinigt ist, daß es dadurch für verschiedene Zwecke weniger anwendbar ist, so ist es nützlich, das reine vom unreinen unterscheiden zu können, um so mehr, da die Stempel oft falsch sind. Vauquelin giebt folgende Merkmale an: Reines Zinn ist silberweiß; zieht es ins Blaue oder Graue, so enthält es Kupfer, Blei, Eisen oder Antimon. Ein Gehalt von Arsenik macht es weißer, aber zugleich härter. Bei der Biegung des reinen Zinns entsteht ein starker einzelner Laut, da hingegen bei dem unreinen Zinn der Laut schwach ist und sich schnell wiederholt, woran Einmischungen von Blei und Kupfer besonders erkannt werden. Schneidet man ein Stück Zinn zur Hälfte ab, und zerbricht es darauf, indem es hin und her gebogen wird, so verlängert sich das reine Zinn im Bruche, die Bruchflächen endigen sich in eine Spitze, haben eine matte weiße Farbe, und ein weiches mußartiges Ansehn. Blei, Kupfer und Eisen machen das Zinn leichter zerbrechlich, und geben ihm einen grauen, körnigen Bruch. Eine der leichteren und sicherern Methoden, ein reines Zinn zu erkennen, ist, es zu schmelzen und zu einer platten Scheibe in eine Form von Stein oder Metall auszugießen. Ist das Zinn rein, so ist seine Oberfläche polirt und gleichsam amalgamirt; enthielt es aber Kupfer, Blei oder Eisen, so hat die Oberfläche eine matte weiße Farbe mit noch matteren Flecken, die eine anfangende Krystallisation anzeigen.

Der Arsenikgehalt des verkäuflichen Zinns wurde von Marggraff und Henkel zu beträchtlich angenommen, weil sie den schwarzen Rückstand, den das Zinn beim Auflösen in Salzsäure läßt, für Arsenik hielten; dieser besteht aber größtentheils aus Blei, Kupfer und Wismuth, nach Wollaston bloß aus Kupferoxydul. Später ist, besonders von Klaproth und Holme, behauptet worden, daß in dem ostindischen und englischen Zinne gar kein Arsenik zu finden, und in demjenigen Handelszinne, worin Arsenik vorkommt, etwa nur 0,001 davon enthalten sey. Neuere Erfahrungen haben

indessen gezeigt, daß fast in jedem Zinne, selbst auch in dem englischen, Arsenik enthalten sey; man hat jedoch die Bemerkung gemacht, daß dieser geringe Arsenikgehalt im metallischen Zustande nicht nachtheilig wirke. Um selbst Spuren von Arsenik in dem Zinne zu entdecken, ist die von Serullas angegebene Methode am besten geeignet. Das Zinn wird in concentrirter Salzsäure aufgelöst, und das hierbei sich enthindende Wasserstoffgas in eine Sublimatauflösung geleitet. War Arsenik vorhanden, so wird dasselbe mit dem Wasserstoffgase im Entstehungsmomente sich verbinden, und entweder als fester Arsenikwasserstoff in kastanienbraunen Flocken aus der Auflösung sich abscheiden, oder als Arsenikwasserstoffgas sich verflüchtigen. Sobald diese Gasart mit der vorgeschlagenen Sublimatauflösung (der Verbindung des Queckſilbers mit 2 At. Chlor — doppelt Chlorqueckſilber, Bichloretum Hydrargyri —) in Berührung kommt, so geht eine gegenseitige Zersetzung vor sich: der Wasserstoff entzieht dem Sublimat ein Atom Chlor, wodurch jenes in Kalomel — einfaches Chlorqueckſilber — Chloretum hydrargyri — umgewandelt und jetzt im Wasser unauflöslich wird. Zugleich folgt das ausgeschiedene Arsenik bei der so höchst feinen Zertheilung seinem Bestreben, sich mit Sauerstoffe zu verbinden, um so leichter, und wird zu arseniger Säure, welche gleichzeitig mit dem Kalomel die Auflösung mit einem Häutchen bedeckt. Bei fernerer Einwirkung des einströmenden Gases nimmt dieses Häutchen ein metallisches Ansehn an, indem sich auf seiner Oberfläche ein Arsenikamalgam bildet, welches aber durch Oxydation bald dunkler gefärbt wird. Das bei der Auflösung des Zinnes in Salzsäure entweichende Gas wird auch schon durch den das Arsenikwasserstoffgas kenntlich machenden stinkenden Geruch den Arsenikgehalt in dem Zinne erkennen lassen. Wegen der tödtlichen Eigenschaften dieses Gases hat man aber auch alle Ursache, bei Anfertigung der Zinnsolution sehr vorsichtig zu seyn; einige Kubikzolle desselben raubten dem verdienten Gehlen das Leben.

Am häufigsten, zugleich aber auch am schädlichsten ist die Verfälschung des Zinnes mit Blei, obschon in einigen Ländern das Versetzen des Zinnes mit einem gewissen Verhältnisse von Blei (Probezinn, Pfundzinn) erlaubt ist, und Proust (Gehlen's N. J. III. S. 146.) und Gummi (Schw. J. VI. S. 225.) durch Versuche zu beweisen gesucht haben, daß Essig, welcher in bleihaltigen Zinngefäßen gekocht und aufbewahrt wurde, eher das Zinn als das Blei auflöst, und daher von ihnen nicht bleihaltig gefunden worden ist. Man findet den Bleigehalt eines verdächtigen Zinnes, wenn man dasselbe in Salpetersäure auflöst, und so lange kocht, bis sich kein Salpetergas mehr entwickelt, und alles Zinnoxyd sich niedergeschlagen hat. Die von demselben abfiltrirte Flüssigkeit hält nun das salpeters. Bleioxyd gefällt, welches ausgewaschen, getrocknet und durch schwarzen Fluß reducirt, oder aus dem auch durch Rechnung der Bleigehalt des Zinnes gefunden werden kann. Die von dem schwefelsauren Bleioxyd abfiltrirte Flüssigkeit kann nun mit blausaurem Eisenkali geprüft werden, welches das Eisen durch einen blauen, das Kupfer durch einen purpurfarbigen, beide durch einen veilchenblauen, das reine Zinn

aber durch einen weißen Niederschlag wird erkennen lassen. Diese Prüfung kann auch durch Ammoniak im Ueberschusse gemacht werden, welches das Eisenoxyd fällen, das Kupfer aber mit blauer Farbe auflösen wird.

Um chemisch reines Zinn zu gewinnen, wird das durch Behandeln des Zinnes mit Salpetersäure gewonnene Zinnoxyd mit Salzsäure und Wasser ausgewaschen und dann in einem verschlossenen Kohlentiegel durch schwaches Weißglühfeuer reducirt.

Das reine Zinn hat eine silberweiße Farbe, ist sehr weich und geschmeidig, so daß es zu dünnen Blättern von $\frac{1}{1000}$ Zoll Dicke und darunter ausgeschlagen werden kann, welche unter dem Namen Zinnfolie oder Stanniol zum Belegen der Spiegel angewandt werden. Es giebt beim Biegen einen eigenen Laut, welcher von einem Zerreißen des Zusammenhanges zwischen seinen Theilen herrührt, und dieser Umstand macht, daß das Zinn, zum Drath gezogen, sehr spröde ist. Wird das Zinn gebogen oder gerieben, so giebt es einen eigenen Geruch, welcher oft lange an den Fingern festsitzt. Sein spec. Gew. ist 7,285, nach dem Auswalzen 7,293, und es ist im Allgemeinen um so leichter, je reiner es ist. Das im Handel vorkommende Zinn hat zwischen 7,56 und 7,6 spec. Gewicht. Es schmilzt bei + 288 °. In einer sehr starken Hitze wird es langsam verflüchtigt.

Das Zinn verbindet sich leicht mit Sauerstoff. Es wird in Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure mit Entwickelung von Wasserstoffgas aufgelöst, obgleich die Auflösung nur langsam geschieht, und eine gewisse Concentration der Säure erfodert. Es wird auch wegen der Verwandtschaft seiner Oxyde zu den Alkalien aufgelöst, wenn man es mit einer Auflösung von kaustischem Alkali digerirt. In der gewöhnlichen Temperatur der Luft hält es sich lange unverändert, aber es bekommt mit der Zeit eine mattere Farbe und einen Stich ins Gelbe, welches ein anfangendes Anlaufen mit Regenbogenfarben zu seyn scheint. Wird das Zinn zum Schmelzen erhitzt, und bei dieser Temperatur gehalten, so überzieht es sich mit einem aschgrauen Häutchen, welches nach der Abkühlung mit Regenbogenfarben spielt, und welches, wenn man sich zu dem Versuche der Zinnfolie bedient hat, größtentheils aus metallischem Zinn, mit einem äußerst dünnen Häutchen von Zinnoxyd überzogen, besteht. Bei einer noch höheren Temperatur wird das graue Zinnoxyd weiß gebrannt, und giebt ein weißgraues Pulver, welches man Zinnasche nennt. In einer sehr hohen Temperatur entzündet sich das Zinn, und brennt wie Antimon, wobei ein weißes Zinnoxyd sublimirt wird.

Wir kennen zwei Oxydationsstufen vom Zinn, das Oxydul und das Oxyd.

Das Zinnoxydul bildet sich theils bei der Oxydation des Zinns bei niedrigeren Graden von Hitze, theils wenn es zu seiner Auflösung in Schwefelsäure auf Kosten des Wassers oxydirt wird. Es besteht nach Berzelius aus 88,03 Zinn und 11,97 Sauerstoff, oder 100 Zinn nehmen 13,6 Sauerstoff auf. Von den Säuren wird es ohne Aufbrausen, das Hydrat leichter als das geglühte aufgenommen. Die dadurch gebildeten Salze sind meistens

ungefärbt oder gelblich, zum Theil krystallisirbar; sie schmecken unangenehm metallisch, werden durch kohlens., bernsteins., benzoës. und eisenblaus. Alkalien weiß, durch Hydrothionsäure und ihre Salze bräunlichschwarz, durch salzs. Goldauflösung purpurfarbig niedergeschlagen. Zink erzeugt darin einen baumförmigen metallischen Niederschlag. Die Zinnoxydulsalze ziehen begierig aus der Luft und aus mehreren Verbindungen den Sauerstoff in sich, wodurch sie in Zinnoxydsalze verwandelt werden. Ein in der Färberei sehr gebräuchliches Salz ist das salzsaure Zinnoxyd (Zinnchlorür, Zinnsalz), durch Auflösen des Zinnes in concentrirter Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) bis zur völligen Sättigung, und Abdampfen der Auflösung zur Krystallisation bereitet, wobei es leicht in großen farblosen Krystallen anschießt, aber gleichfalls vor dem Zutritte der Luft verwahrt werden muß. Das Zinnoxydul wird auch von kaustischem Kali und Natron aufgelöst, aber die Auflösung wird mit der Zeit zerlegt, setzt Zinn ab und enthält Zinnoxyd in Verbindung mit dem Alkali. Das Zinnoxyd wird durch Behandeln des metallischen Zinns mit Salpetersäure erhalten, wovon das Zinn in ein weißes Oxyd verwandelt wird, welches mit Wasser so lange ausgewaschen wird als das durchgehende Wasser etwas freie Säure enthält. Auf angefeuchtetes Lackmus gelegt, röthet es dasselbe, von den kohlensauren sowohl als von den kaustischen Alkalien wird es aufgelöst und verhält sich überhaupt gegen die Salzbasen wie eine schwache Säure, mit denen es zinnsaure Salze bildet, die schon durch schwache Säuren zersetzt werden. Es besteht aus 78,67 Zinn und 21,33 Sauerstoff, oder 100 Metall nehmen 27,2 Sauerstoff auf. Das Glas wird durch Zusammenschmelzen mit Zinnoxyd milchweiß und undurchsichtig, zu Schmelz, Email, welches wahrscheinlich der Strengflüssigkeit des Zinnoxyds zuzuschreiben ist. Das Zinnoxyd wird auch als Polirpulver für aus harten Stoffen gearbeitete Sachen gebraucht. Mit dem Schwefel verbindet sich das Zinn in 3 Verhältnissen. Die Verbindung mit Schwefel im Maximum giebt das Musivgold (Aurum musivum oder mosaicum), mit welchem die Alchymisten viel gearbeitet haben, und das nach folgender Vorschrift bereitet wird: 12 Th. Zinn werden mit 6 Th. Quecksilber amalgamirt, und in einem gläsernen Mörser mit 7 Th. Schwefelblumen und 6 Th. Salmiak zusammengerieben, worauf die Masse in einen gläsernen Kolben gelegt wird, welchen man im Sandbade langsam erhitzt, bis keine weißen nach Schwefelwasserstoff riechenden Dämpfe sich mehr zeigen. Darauf wird die Hitze bis zum dunkeln Rothglühen verstärkt, wobei Zinnober und Zinnchlorür sich sublimiren; das Musivgold bleibt am Boden in Form einer goldglänzenden schuppigen Masse zurück. Das Quecksilber dient bei dieser Operation dazu, das Zinn leichtflüssiger zu machen, und seine Verbindung mit dem Schwefel zu befördern. Die Anwesenheit des Salmiaks hindert die hohe Temperatur, welche durch die Schwefelung entsteht, und die das Zinn sogleich zum Minimum des Schwefelgehalts reduciren würde, welches jetzt durch die Anwesenheit dieses flüchtigen Stoffes zwischen den kleinsten Theilen des Metalls und des Schwefels verhindert wird. Man bedient sich des Musivgoldes zum Bronziren und zur

Goldfarbe auf Holz; man hat es auch als Belegung der Kissen bei Elektrisirmaschinen benutzt. Das Musivgold besteht aus 64,63 Zinn und 35,37 Schwefel.

Mit Chlor verbindet sich das Zinn, wie mit dem Sauerstoffe, in 2 Verhältnissen, zu Zinnchlorür (salzs. Zinnoxydul), und zu Zinnchlorid (salzs. Zinnoxyd, Libav's rauchender Geist).

Das Zinn verbindet sich mit den andern Metallen. Die meisten geschmeidigen werden durch einen Zusatz von Zinn spröde und weniger geschmeidig. Eine Metallmischung aus 3 Th. Zinn, 2 Th. Blei und 1 Th. Antimon ist so hart, daß sie, zu Nägeln gegossen, sich durch eichene Bretter schlagen läßt und dem Roste sehr gut widersteht. Dagegen ist die Rose'sche Mischung (2 Th. Wismuth, 1 Th. Blei und 1 Th. Zinn) oder die Darcet'sche (8 Th. Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn) durch ihre Schmelzbarkeit noch unter dem Siedepunkte des Wassers ausgezeichnet, und ist daher zur Vervielfältigung metallener Abdrücke von einem hölzernen Modelle, zur Darstellung von Stereotypen, von Modellen in der Kattundruckerei u. s. w. empfohlen worden. Mit Quecksilber giebt das Zinn ein Amalgam, dessen man sich zur Belegung von Spiegeln bedient. 1 Th. Zink, 1 Th. Zinn und 2—3 Th. Quecksilber geben das Amalgam zum Bestreichen des Reibzeuges an Elektrisirmaschinen. Kupfer und Zinn bilden die Metalllegirungen, welche wir Bronze und Glockenmetall nennen. Ein kleiner Zusatz von Zinn zum Kupfer giebt der Mischung eine gelbliche Farbe und mehr Härte, daher es von den Alten, ehe der Stahl bekannt war, zu Schwertern und andern Waffen benutzt wurde. 10 Th. Kupfer und 1 Th. Zinn ist die Mischung zu Metallkanonen. Mit mehr als 20 bis 25 Procent wird die Masse elastisch, klingend und spröde, und wird zu Glocken angewandt. Ein noch größerer Zusatz von Zinn giebt eine weiße, silberähnliche Metallmischung, welche Politur annimmt und zu Metallspiegeln gebraucht wird.

Das Zinn, mit den feinsten Raspeln gefeilt (**Stannum limatum, Limatura Stanni**), wird in Latwergen als Mittel gegen die Würmer verordnet, besonders gegen den Bandwurm, wo es mechanisch durch die scharfen Spitzen wirken soll; nur das feinste Zinn kann hierzu gebraucht werden. Seiner geringen Auflöslichkeit wegen in schwachen Säuren ist es zu Geschirren und Kochgefäßen sehr anwendbar. Seine Verbindungen mit Chlor sind in der Färberei sehr wichtig.

* Staphisagria. Die Saamen. Stephans- oder Lausekörner.

Delphinium Staphisagria Linn. Stephanskraut. Scharfer Rittersporn.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 1. Ranunculaceae.

Die zweijährige Pflanze ist im südlichen Europa einheimisch, in Portugal, Spanien, in der Provence, in Griechenland und auf der Insel Teneriffa; in mehreren Provinzen wird sie angebaut. Sie hat einen aufrechten,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0841-8

ästigen, walzenrunden, stark zottigen, purpur-grünlichen, ungefähr 2 Fuß hohen Stengel; abwechselnde, gestielte Blätter, von denen die untern kreisförmig, am Grunde herzförmig ausgerandet, in 5, 7 oder 9 tiefe, ei-lancettförmige, spitze, ganzrandige, oder mit einigen seitlichen Einschnitten versehene Lappen getheilt, dunkelgrün und oben fast glatt, unten aber blaß und zottig sind. Die Blüthen von schmutzig linnengrauer Farbe bilden lange einfache Trauben an der Spitze des Stengels und der Aeste, und sind dem Ritterspron ähnlich. Die Frucht besteht aus drei verhältnißmäßig großen, bauchig erweiterten, zugespitzten und behaarten einfächrigen Spaltkapseln (Cyamia). Die Saamen sind unregelmäßig dreiseitig, braun, mit Vertiefungen und netzförmigen, erhabenen Linien; sie schließen einen gelblichen oder bräunlichen, sehr fetten Kern ein.

Diese Saamen sind die officinellen Stephans- oder Lausekörner. Ihr Geruch ist schwach, aber unangenehm, ihr Geschmack unerträglich bitter, ekelhaft, hintennach brennend scharf.

Brandes (Trommsd. N. J. III. 2. S. 143.; Berl. Jahrb. XXI. S. S. 269.; Schw. J. XXV. S. 369.) macerirte die Saamen mit kaltem Wasser. Beim Verdunsten des Auszugs schied sich etwas Pflanzeneiweiß aus. Das trockne Extract wurde in wenig Wasser gelöst, und mit Weingeist von 88 Procent versetzt, wodurch eine Substanz von gummiartiger Natur, welche höchst wahrscheinlich auch phosphorsauren Kalk enthielt, niedergeschlagen wurde. Die in dem Alkohol aufgelöst gebliebene Substanz schien größtentheils aus Phyteumakolla zu bestehen, mit äpfels., salzs., schwefels. und essigs. Kali, vielleicht auch mit Spuren von Extractivstoff.

Die mit kaltem Wasser ausgezogenen Saamen wurden mit Alkohol behandelt. Der hell weingelb gefärbte Auszug wurde beim Erkalten trübe und hellte sich nach einigen Tagen durch einen flockigen Niederschlag auf. Dieser war das Alkaloid der Stephanskörner, das Delphinin. Beim Abdampfen der geistigen Tincturen schied sich eine fettwachsartige Materie aus; außerdem sonderte sich ein hellbräunliches Oel aus von äußerst unangenehmen Geschmacke nach etwas ranzigem Rüböle, später sonderte sich ein von jenem verschiedenes olivenfarbenes, gleichfalls unangenehm widerlich riechendes Oel aus, dem verdorbenen Rüböl täuschend ähnlich.

Der Saamenrückstand wurde dann mit Wasser ausgekocht, das Extract mit kaltem Wasser behandelt, wobei eine stärkemehlartige Materie ungelöst blieb, die Auflösung eingeengt und dann mit Alkohol versetzt, wodurch Gummi mit phosphors. und pflanzens. Kalksalzen gefällt wurde. Das im Alkohol Aufgelöste gab wie oben Phyteumakolla mit saurem äpfels., essigs., schwefels. und salzs. Kali- und Kalksalzen, ohne allen Extractivstoff, indem die Galläpfeltinctur und die Säuren die ganze gelöste Masse aus der Flüssigkeit niederschlugen.

Die rückständigen Saamen wurden nun noch mit absolutem Alkohol behandelt, und dadurch noch etwas von dem außerordentlich bittern, scharfen, ekelerregenden Oele erhalten; absoluter Aether zog noch etwas davon aus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0842-4

Dann wurde der Rückstand noch mit kaltem Wasser zerstoßen, und dadurch eine milchige Flüssigkeit erhalten, die etwas Delphinin, fettes Oel und eine eiweißstoffartige Substanz enthielt.

Endlich wurde auch die Romershausen'sche Presse angewandt, und zwar zuerst siedend heißer Alkohol durchgepreßt, wodurch wachsartige Flocken und Delphinin erhalten wurden; dann siedendes destillirtes Wasser, wodurch gleichfalls noch Delphinin und eine salzartige Masse, aus schwefels. Kali, Kalk- und Bittererdesalz bestehend erhalten wurde.

Die Behandlung mit Aetzkalilauge gab erhärtetes Pflanzeneiweiß und Phyteumakolla mit Spuren eines phosphors. Kalisalzes; die mit Salzsäure gab phosphors. Kalk und phosphors. Bittererde mit Spuren einer thierisch-vegetabilischen Substanz.

Eine Destillation mit Wasser gab keine Spur eines ätherischen Oels.

Als Resultate dieser Analyse ergeben sich in 500 Th. Stephanskörner folgende Bestandtheile: Delphinin 40½ (nach einer spätern Angabe, Brandes's Archiv V. S. 160., soll dieser Gehalt zu groß angegeben seyn); Phyteumakolla (thierisch-vegetabilisch-leimartige Substanz) mit Spuren von äpfels. schwefels. salzs. und essigs. Kali- und Kalksalzen 153½; fettes Oel, in Alkohol leicht löslich, 72; fettes Oel, in Alkohol schwer löslich, 23½; fettwachsartige Materie 7; Pflanzeneiweiß 2½; verhärtetes Pflanzeneiweiß 16; Gummi mit Spuren von phosphors. und pflanzens. Kalke 15¾; Stärkemehl 12; schwefels. Kalk mit Bittererde und schwefels. Kali 8; schwefels. Kalk 2¾; phosphors. Kalk mit phosphors. Bittererde 18½; Faser 86; Wasser 50. S. = 507½ (der Ueberschuß von 7½ bestand in Feuchtigkeit).

Die Asche enthielt: kohlens., salzs. und schwefels. Kali; phosphors., schwefels. und kohlens. Kalk; phosphors. Bittererde; Kupferoxyd, Eisenoxyd und Manganoxyd.

Lassaigne und Feneulle (Trommsd. N. J. IV. 2. S. 199.) haben gleichzeitig mit Brandes eine Analyse der Stephanskörner unternommen. Sie digerirten mit Aether, Alkohol, kochten mit Wasser aus, und glauben durch Destillation mit Wasser etwas flüchtiges Oel erhalten zu haben. Sie fanden folgende Bestandtheile: 1) braunes bitteres Princip, welches durch essigsaures Blei niedergeschlagen wird (Extractivstoff); 2) flüchtiges Oel; 3) blaßgelbes fettes Oel; 4) Eiweißstoff; 5) animalisirte Materie (Phyteumakolla); 6) Schleim; 7) Schleimzucker; 8) saures äpfels. Delphinin; 9) gelbes bitteres Princip, welches durch essigs. Blei nicht niedergeschlagen wird; 10) einige Mineralsalze. Die Asche gab: kohlens., schwefels., salzs. und viel phosphors. Kali; kohlens. und phosphors. Kalk und Kieselerde.

Das Delphinin kann man aus den Stephanskörnern dadurch gewinnen, daß man die Abkochung derselben mit Ammoniak fällt, den Niederschlag mit Weingeist kocht, siedend heiß filtrirt, wo sich dann beim Erkalten weißliche Flocken von Delphinin und etwas Fett abscheiden, von dem es durch verdünnte Schwefelsäure getrennt wird; das schwefels. Delphinin wird krystallisirt, mit Bittererde zersetzt und durch Alkohol das Delphinin ausgezogen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0843-0

Oder die zum Brei gestoßenen Körner werden mit Wasser ausgekocht, die Abkochung mit Bittererde gekocht, und diese mit Weingeist ausgezogen. Auch durch Digestion der zerstoßenen Saamen mit verdünnter Schwefelsäure, Fällen durch Ammoniak oder Kali, Auflösen in Salzsäure, Kochen mit Bittererde und Ausziehen mit Weingeist kann das Delphinin erhalten werden.

Das Delphinin ist im reinen Zustande ein frisch krystallinisches, beim Trocknen undurchsichtig werdendes Pulver, es schmilzt in der Wärme wie Wachs und gesteht beim Erkalten zu einer harzähnlichen Masse, hat einen sehr bittern, dann scharfen Geschmack, ist im Wasser sehr wenig, im heißen Weingeiste und Aether sehr leicht löslich, beim Erkalten sich wieder ausscheidend; auch in erhitzten fetten Oelen ist es auflöslich, wobei ein scharfer Dampf entwickelt wird; es bläuet geröthetes Lackmuspapier, und grünt den Veilchensaft; es giebt mit Säuren sehr bitter und scharf schmeckende, in Wasser leicht lösliche Salze, aus denen durch ein Alkali das Delphinin ausgeschieden wird. Es hat nur einen geringen Sättigungsgrad, 100 Delphinin erfodern z. B. nur 3,129 Schwefelsäure zur Sättigung ꝛc. (Berl. Jahrb. XXV. S. 183.)

Die Stephanskörner wirken innerlich sehr drastisch, und verdanken diese Eigenschaft dem Delphinin, äußerlich werden sie zur Vertreibung des Ungeziefers auf dem Kopfe gebraucht, wobei jedoch wunde Stellen zu vermeiden sind.

Stibium venale. Regulus Antimonii. Käufliches Spießglanz. (Spießglanzkönig. Antimon.)

Wird aus dem schwarzen rohen Schwefelspießglanz durch Schmelzen mit einem Zusatze von Eisen in Hüttenwerken bereitet.

Ein bläulichweißes Metall, zerbrechlich, blättrig, glänzend, an der Luft geglüht mit einem weißen Rauche sich verflüchtigend. Spec. Gew. = fast 6,8. Mit dem Löthrohre auf einer Kohle geprüft, verbreite es nicht einen knoblauchartigen Geruch, eine zu große Menge Arsenik, auch nicht einen röthlichen Rauch, eine zu große Menge Blei anzeigend.

Die Erze des Spießglanzes sind schon sehr lange bekannt, die Reduction des Metalles aus demselben ist aber erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts von Basilius Valentinus gelehrt worden. Der Name Antimonium war schon im 8. Jahrhundert bekannt. Bei den Alchymisten hat es so viele Aufmerksamkeit gewonnen, daß gewiß kein Metall, selbst nicht Quecksilber und Eisen, nach so vielen verschiedenen Methoden bearbeitet worden ist, als dieses.

Das Antimon kommt beinahe in allen Ländern vor. Man trifft es bis-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0844-6

weilen in gediegenem Zustande (meistens mit etwas Arsenik), bisweilen oxydirt, als Weißspießglanzerz und Spießglanzocher, am gewöhnlichsten aber mit Schwefel verbunden, als Grauspießglanzerz.

Um aus dem Schwefelspießglanze den Spießglanzkönig im Großen zu bereiten, wird jenes in zweckmäßigen Röstvorrichtungen so lange bei gelinder Hitze geröstet, als noch der Geruch von schwefliger Säure bemerkt wird. Das erhaltene graue, noch etwas Schwefelantimon enthaltende Antimonoxyd oder die Spießglanzasche wird nun zwischen Kohlen in dem Schachte eines zweckmäßig vorgerichteten Windofens niedergeschmolzen. Man erhält den Spießglanzkönig mit einer Schicht von Schwefelspießglanz bedeckt. Nach einer andern Methode erhitzt man einen Tiegel bis zum Weißglühen, und wirft eine bestimmte Quantität kleiner Nägel hinein. Wenn auch diese weißglühen, setzt man doppelt soviel Schwefelantimon zu, bedeckt den Tiegel und bringt die Masse zum Schmelzen. Der Schwefel verbindet sich dann mit dem Eisen, und das Antimon wird metallisch ausgeschieden. Das erhaltene Metall ist eisenhaltig. Als das leichteste Verfahren empfiehlt Berzelius folgendes: 4 Th. Schwefelantimon, 3 Th. roher Weinstein und 1½ Th. Salpeter, werden fein gerieben und sehr genau gemischt. Die Masse wird dann nur in kleinen Portionen in einen glühenden Tiegel hineingeworfen und nach beendigter Verpuffung läßt man es noch im Feuer, bis daß es vollständig geschmolzen ist. Je schneller dies geschieht, um so weniger Antimon geht verloren. Man kann nachher die geschmolzene Masse ausgießen, wobei das Salz auf einer steinernen Platte ausgeschlagen, und das geschmolzene Metall, welches am Boden des Tiegels liegt, in einen Gießpuckel gegossen wird. Im Kleinen läßt man Alles im Tiegel erkalten und zerschlägt diesen nachher. Der Kohlenstoff aus der Weinsäure und der Schwefel im Antimon werden bei dieser Reduction auf Kosten des Salpeters oxydirt, wobei das metallische Antimon ausgeschieden wird und in der geschmolzenen Salzmasse zu Boden sinkt. Diese Salzmasse enthält ein Gemenge von schwefels. und kohlens. Kali mit Schwefelkalium, worin eine nicht unbedeutende Portion von Schwefelantimon aufgelöst ist. Man erhält etwa nur den vierten Theil des angewandten Schwefelspießglanzes, obgleich in diesem das Metall in dem Verhältniß von 4 : 11 mit dem Schwefel verbunden war. Aber auch das auf diese Art erhaltene Metall ist nicht rein; es enthält Eisen, Schwefel, und zuweilen eine Spur von Arsenik. Um es völlig rein zu erhalten, wird es zum feinen Pulver gestoßen, und mit der Hälfte seines Gewichts, oder, wenn es sehr unrein ist, mit gleichen Theilen Antimonoxyd gemischt und damit in einem Tiegel geschmolzen. Die fremden Einmischungen, welche zum Sauerstoffe eine größere Verwandtschaft als das Antimon haben, oxydiren sich auf Kosten des Oxyds, und der gesammelte Regulus ist dann rein.

Die meisten Arsenikerze führen, wie Serullas gezeigt hat, Arsenik mit sich, welcher dann auch auf das reducirte Metall übergeht. Serullas fand, daß 17 Sorten der gewöhnlich im Handel vorkommenden Schwefelspießglanzarten Arsenik enthielten und zwar 5 im Mittel über 1½ Procent; im

käuflichen reguliniſchen Spießglanze fand er 1 bis 2 Procent. Bei der Probe vor dem Löthrohre erzeugt nun zwar das reine Spießglanzmetall keinen dem Arſenik ſich annähernden Geruch, es äußert aber eine leichte reizende Empfindung auf die Geruchsnerven, und dabei, wenn man mehrere Sorten Spießglanz hinter einander vor dem Löthrohre geprüft hat, ein ſtarkes Uebelbefinden und ein Uebelſeyn, wie nach einem Brechmittel. Da nun das Arſenik, wenigſtens zum Theil auch in die Spießglanzpräparate, mit Ausnahme des kryſtalliſirten Brechweinſteins und der deſtillirten Spießglanzbutter, übergeht, ſo iſt es wichtig, ſich der Reinheit des Antimons zu vergewiſſern. Serullas wändte hierzu eine Legirung des Kaliums mit Antimon an, die er dadurch bereitete, daß er das metalliſche Spießglanz oder auch das geröſtete Schwefelſpießglanz mit Weinſtein röſtete, wodurch das Kali des Weinſteins zu Kalium reducirt wird, welches, in einem Glascylinder verbrannt, eine braune Rinde an die Glasfläche abſetzt. (Die beim Zinn erwähnte Prüfungsmethode auf Arſenik findet hier gleichfalls Anwendung). Später iſt, als dem Zwecke mehr entſprechend, empfohlen worden, das Spießglanz mit 3 Th. Salpeter zu verpuffen, wodurch das Arſenik in Arſenikſäure verwandelt wird. Der Rückſtand, welcher den Arſenikgehalt durch den knoblauchartigen Geruch auf Kohlen verrathen wird, giebt an das Waſſer, mit welchem er ausgelaugt wird, die Arſenikſäure ab, welche mit Silberſolution einen gelben oder braunrothen, mit Schwefelwaſſerſtoffgas einen gelben, mit ſchwefelſaurem Kupferammoniak einen grünen Niederſchlag geben wird (Vergl. Arſenik). Sicherer verfährt man wohl noch, wenn man das Antimon mit Salpeterſäure kocht, bis ſich alles in ein weißes Pulver umgeändert hat, wodurch das Arſenik gleichfalls in auflösliche Arſenikſäure verwandelt wird, welche in der abfiltrirten Flüſſigkeit, die vorſichtig mit Ammoniak verſetzt werden muß, bis ſie nur noch ſchwach ſauer reagirt, enthalten iſt, und durch die angezeigten Reagentien nachgewieſen wird. Der nicht verbrauchte Theil der Flüſſigkeit kann verdampft, mit Kohlenpulver oder ſchwarzem Fluß gemengt und zur Reduction des metalliſchen Arſeniks benutzt werden. Dieſe Prüfungsmethode iſt auf alle Stibiumpräparate anwendbar. Man hat ſich auch ſpäter überzeugt, daß die Beſorgniß der Arſenikvergiftung nicht von ſo großer Wichtigkeit ſey, indem man den Arſenikgehalt der Stibiumpräparate doch nicht ſo allgemein, wie man anfänglich geglaubt hat, noch weniger von einiger Bedeutung fand. Sollte dieſes ja gefunden werden, ſo bliebe nichts übrig, als das Spießglanzmetall aus dem kryſtalliſirten Brechweinſtein zu reduciren, und dieſes zu den Präparaten anzuwenden.

Die Beimiſchung anderer Metalle wird ſich an dem Rückſtande nach der Verpuffung mit 3 Th. Salpeter erkennen laſſen. Eiſen ertheilt demſelben eine gelbe, Mangan eine grüne Farbe. Um das Blei mit Sicherheit zu erkennen, übergieße man den weißen Rückſtand mit Schwefelwaſſerſtoffwaſſer, wodurch das Antimon eine rothgelbe, das Blei aber eine ſchwarze Farbe annimmt. Dieſe metalliſchen Beimiſchungen werden auch erkannt, wenn man das Antimon in Salzſäure auflöſt, die ungefärbte Auflöſung durch Zuſatz von

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0846-7

Wasser fällt, und die überstehende Flüssigkeit, welche, wenn das Antimon rein war, nichts Metallisches mehr enthalten muß, durch blaus. Eisenkali und Galläpfeltinctur auf Eisen prüft. Das Blei bleibt nach der Behandlung des Antimons mit Salpetersäure in dieser aufgelöst, und wird durch schwefelsaures Natron als schwefelsaures Bleioxyd gefällt.

Im reinen Zustande hat das Antimon eine silberweiße Farbe, die bei dem im Handel vorkommenden mehr zinnweiß ist, vielen Glanz, und eine strahlige blättrige Textur. Das gereinigte Metall ist feinblättrig oder körnig im Bruche, wogegen das im Handel vorkommende weniger reine oft so sehr blättrig ist, daß die Blätter beinahe Durchgänge sind. Man erhält es leicht krystallisirt, wenn man es langsam erkalten läßt, und nach Erstarrung der Oberfläche den noch in der Mitte flüssigen Theil abgießt. Die primitive Form der Krystalle ist nach Hauy die oktaëdrische. Hat man Antimon, um es erkalten zu lassen, in ein kugelförmiges Gefäß gegossen, so ist es sternförmig krystallisirt, mit Strahlen, die von der Achse ausgehen (**Regulus Antimonii stellatus**). Es ist spröde und leicht zum Pulver zu reiben. Spec. Gew. 6,702 bis 6,86. In der Luft wird es nicht verändert. Erhizt man es in der Luft, so kommt es ins Kochen, entzündet sich beim Rothglühen, und glimmt unter Ausstoßung eines weißen Rauches, der sich auf den kalten ihn umgebenden Körpern condensirt, und öfters in weißen, glänzenden Krystallen anschießt, die ehedem **Flores Antimonii argentei** oder **Nix Antimonii** genannt wurden.

Das Antimon hat 3 Oxydationsstufen, und bildet ein Oxyd und zwei Säuren. Ein Suboxyd scheinen nach Berzelius die grauen Flocken zu seyn, welche sich bei Entladung der elektrischen Säule, wenn man das Antimon als positiven Leiter anwendet, abscheiden, deren Form und Volumen beim Uebergießen mit Chlorwasserstoffsäure verändert wird; sie werden zu Antimon reducirt und die Säure hält Antimonoxyd aufgelöst.

Das Oxyd erhält man, wenn Antimon in Salpetersäure aufgelöst, und das dabei erhaltene basische Oxydulsalz mehreremal nach einander mit Wasser digerirt wird, bis das Wasser nicht mehr auf Lackmuspapier sauer reagirt. Es bildet dann ein weißes Pulver, welches ein etwas unreines Ansehn hat. Es ist dieses Oxyd, welches die glänzenden Krystallnadeln bildet, die sich um brennendes Antimon sublimiren. Es macht die Base der Antimonsalze aus; geht aber auch mit Kali, Natron und Ammoniak Verbindungen ein und verhält sich gegen dieselben wie eine schwache Säure. Es geht in mehrere pharmaceutische Präparate ein. (Siehe **Stibium oxydatum griseum.**). Es besteht aus 84,32 Antimon und 15,68 Sauerstoff, oder 100 Metall nehmen darin 18,6 Sauerstoff auf.

Die antimonige Säure erhält man, wenn Antimon auf Kosten der Salpetersäure oxydirt, die Masse zur Trockne abgedampft und geglüht wird. Sie ist schneeweiß, nimmt aber geglüht eine gelbe Farbe an. Sie röthet Lackmus und geht mit den Alkalien Verbindungen ein. In Salpetersäure ist sie unauflöslich; von Chlorwasserstoffsäure wird sie aufgelöst, beim Ver-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0847-3

dünnen mit Wasser setzt sie sich aber sogleich ab. Sie besteht aus 80,13 Antimon und 19,87 Sauerstoff, oder 100 Metall sind darin mit 24,8 Sauerstoff, d. h. mit $1\frac{1}{2}$ so viel als im Oxyd, verbunden.

Die Antimonsäure wird erhalten, wenn Antimon in Königswasser aufgelöst und die Auflösung zur Trockne abgedampft wird, worauf man concentrirte Salpetersäure zusetzt, und die Masse bei einer Temperatur, die nicht bis zum Glühen gehen darf, so lange erhitzt bis alle Salpetersäure verdampft ist. Man erhält sie dann als ein blaßgelbes Pulver, welches, wenn es noch Salpetersäure zurückhält, dunkelgelb ist. Man erhält diese Säure auch, wenn Antimon mit dem vierfachen Gewicht Salpeter verpufft, und die Masse zuerst mit Wasser und darauf mit Salpetersäure ausgelaugt wird. Sie besteht aus 76,34 Antimon und 23,66 Sauerstoff, oder 100 Metall nehmen darin 30,99 Sauerstoff auf, d. h. $1\frac{2}{3}$ Mal so viel, als im Oxyd. Der Sauerstoff in den 3 bestimmten Oxydationsstufen des Antimons verhält sich also, wie 1, $1\frac{1}{2}$ und $1\frac{2}{3}$, oder wie 3, 4 und 5.

Mit Schwefel kann sich das Antimon in mehreren Verhältnissen verbinden.

1) Erstes oder gewöhnliches Schwefelantimon. Es kommt als **Antimonium crudum** natürlich vor, kann aber auch künstlich bereitet werden. Es kommt auch als **Kermes minerale** unter den pharmaceutischen Präparaten vor. Bestandtheile desselben sind 72,77 Antimon und 27,23 Schwefel.

2) Das zweite Schwefelantimon wird erhalten, wenn antimonigsaures Kali in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, die Flüssigkeit mit vielem Wasser verdünnt und ein Strom Schwefelwasserstoffgas durchgeleitet wird. Der entstehende Niederschlag ist feuerroth, und besteht aus 66,72 Antimon und 33,28 Schwefel.

3) Das dritte Schwefelantimon ist der Goldschwefel, bestehend aus 61,59 Antimon und 38,41 Schwefel. Die Verbindung des Antimons mit Chlor ist lange unter dem Namen **Butyrum Antimonii** bekannt.

Daß das Antimon mit andern Metallen sich verbindet, ist bereits bei andern Metallen erwähnt worden. Man setzt das Antimon dem Zinn und Blei zu, um diese Metalle härter zu machen; es macht einen Hauptbestandtheil der Metallmasse aus, deren man sich zum Schriftgießen bedient. Die Goldarbeiter gebrauchen es zum Reinigen des Goldes ꝛc.

Das Antimon liefert viele von den Aerzten sehr geschätzte Arzneimittel; in vorigen Zeiten ist es in viel zahlreicheren Formen versucht worden. Die Antimonpräparate wirken, in größerer Dosis eingenommen, als heftige Brechmittel, die bisweilen zugleich laxiren; in geringerer Gabe machen sie Ekel, befördern das Aufhusten in Brustkrankheiten, unterhalten auch die unmerkliche Ausdünstung. Ihr Gebrauch als Heilmittel wurde zuerst von Mönchen eingeführt, des durch diese gemachten Mißbrauchs und der dadurch hervorgebrachten schädlichen Erfolge wegen aber im Jahre 1566 von der Facultät in Paris gänzlich verboten. Gui Patin hat ein Verzeichniß der durch den Gebrauch des Spießglanzes umgekommenen Martyrer geschrieben. Das Verbot

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0848-9

erhielt sich beinahe 100 Jahre, bis endlich die Aerzte in Paris durch eine Mehrheit von Stimmen es wieder für nützlich erklärten. Man berichtet, es sey von Basil bemerkt worden, daß einige junge Schweine nach dem Genusse des Spießglanzes in kurzer Zeit sehr fett geworden, er habe diesen Dienst auch einigen Klosterbrüdern erzeigen wollen, wodurch aber viele ums Leben gekommen seyn. Hiernach habe auch das Metall seinen Namen erhalten, von dem griechischen Worte ἀντι (gegen) und dem französischen Worte moine (Mönch). Daß aber der Name Antimonium schon sehr früh gebraucht worden sey, ist bereits erwähnt.

Ehemals bereitete man aus dem Regulus Antimonii Kugeln von 8 bis 10 Gran, deren man sich als Brech- und Purgirmittel bediente. Da nun diese Kugeln wieder ausgebrochen oder mit den Excrementen wieder ausgeleert wurden, so nannte man sie Pilulae perpetuae. Aus demselben Metall mit etwas Zinn versetzt waren die sogenannten Brechbecher (Pocula emetica) verfertigt, in welche man Wein goß, welcher, eine Zeitlang mit demselben in Berührung, vermöge seiner Säure bald mehr bald weniger auflösend wirkte, und dadurch brechenerregende und purgirende Kräfte erhielt.

Stibium sulphuratum nigrum crudum, seu Antimonium crudum. Sulphuretum Stibii nigrum crudum. Rohes Schwefelspießglanz.

Wird aus den Erzen des Schwefelspießglanzes ausgeschmolzen.

Eine dichte, strahlige Masse, mit bündelförmigen gleichlaufenden, etwas breiten Strahlen, schwarz, metallisch-glänzend, beim Reiben abschmutzend, schwer, im Feuer leicht schmelzend und sich verflüchtigend. Es wird zur Bereitung des Spießglanzes angewandt.

Das Schwefelspießglanz war schon den asiatischen und griechischen Frauenzimmern bekannt; es wurde von ihnen zum Schwarzfärben der Augenbraunen benutzt. Es wird in der Natur als Grauspießglanzerz in großer Menge gefunden. Von der Bergart wird es auf die Weise gereinigt, daß man das Erz in steinerne Krüge bringt, die über andere in die Erde eingegrabene Krüge gestellt sind. Darauf legt man Feuer an die obersten, wodurch das Schwefelantimon geschmolzen wird, und durch ein im Boden der Krüge befindliches Loch in die unteren fließt; die ungeschmolzene Bergart bleibt in der obern zurück.

Das im Handel vorkommende Schwefelspießglanz bildet dicke runde Kuchen, die auswendig schwarzgrau, auf dem Bruche aber mehr bleifarbig sind. Der obere Theil der Kuchen ist schwammiger, leichter und unreiner, als der untere. Es ist geruch- und geschmacklos. Spec. Gew. 4,7 bis 5,0. Sehr häufig enthält es Eisen, Blei, Mangan, Arsenik. Die letztere Verunreinigung, nämlich mit Arsenikkies oder Mißpickel, erkennt man daran,

daß die Masse nicht strahlig, sondern körnig und von weißgraulicher metallischer Farbe ist, auch beim Aufstreuen des Pulvers auf glühende Kohlen einen knoblauchartigen Geruch verbreitet. Der Bleiglanz ist auf dem Bruche mehr blättrig als spießig; das Mangan ist weniger glänzend, die Spieße sind kürzer und laufen aus einem gemeinschaftlichen Punkte aus.

Die chemische Prüfung auf diese Verunreinigungen ist auf die bei **Stibium venale** angegebene Weise zu verrichten.

Die Bereitung des metallischen Spießglanzes aus dem Schwefelspießglanz ist gleichfalls bei diesem Artikel angegeben worden. Außer dieser Anwendung ist dasselbe schon sehr früh zur Darstellung der Spießglanzasche und des Spießglanzglases benutzt worden, worüber sich das Ausführlichere bei **Stibium oxydulatum fuscum** findet.

Da das Antimon zum Schwefel eine schwächere Verwandtschaft hat, als die meisten Metalle, so hat man sich schon lange des Schwefelantimons zur Reinigung des Goldes bedient, wobei die fremden Metalle geschwefelt werden, und das Antimon mit dem Golde zusammenschmilzt. Die Alchymisten nannten das Schwefelantimon in dieser Hinsicht **Lupus metallorum**.

Die Schlacke enthält noch Gold, und wird daher mit einer neuen Menge Schwefelantimon wieder in den Tiegel eingelegt, wobei mehr antimonhaltiges Gold erhalten wird. Die gesammelten Metallkönige von Gold und Antimon werden noch einmal mit 2 Th. Schwefelantimon umgeschmolzen, und der dabei erhaltene König wird durch Schmelzung in offenen Gefäßen zersetzt, wobei das Antimon verdampft, welches man durch gelindes Anblasen mit einem Handblasebalge unterstützt, bis das Gold metallisch zurückbleibt.

* Stomachus vitulinus exsiccatus. Kälberlaab.

Bos Taurus Linn.

Der frische Kälbermagen werde mit Wasser gut ausgewaschen, vier und zwanzig Stunden hindurch in Essig eingetaucht, darauf herausgenommen, aufgeblasen, bei gelinder Wärme getrocknet und an einem trocknen Orte aufbewahrt.

Der Kälberlaab dient zur Bereitung der süßen Molken, indem durch denselben eine Zusammenziehung der Milch hervorgebracht wird.

Stramonium. Das Kraut. Stechapfelkraut.

Datura Stramonium Linn. Eine einjährige aus Ostindien abstammende Pflanze, jetzt an Zäunen, Wegen und auf Schutthaufen häufig.

Die großen gestielten, eiförmigen, gezähnt-buchtigen, kahlen, sattgrünen Blätter der giftigen Pflanze, von widrigem, narkoti-

schem Geruche. Einzusammeln im Monat Juni und Juli. Bewahre sie vorsichtig und nicht über ein Jahr auf.

Stramonium. Der Saame. Stechapfelsaame.

Außen schwarze, innen weiße, rinnenförmige, etwas runzlige, aufs höchste narkotische, vorsichtig aufzubewahrende Saamen. Die Gabe von beiden bis zu einem Gran.

Datura Stramonium Linn. Gemeiner Stechapfel.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Der Stechapfel oder Tollstechapfel, ursprünglich in Ostindien (nach Andern in Amerika) zu Hause, wurde in Europa zuerst in Gärten gezogen, ist aber seit mehreren Jahrhunderten einheimisch geworden.

Die Wurzel ist weiß, holzig, dick und hat viele Fasern. Der Stengel aufrecht, krautartig, sehr ästig, glatt, dick, ziemlich rund und 2—4 Fuß hoch. Die Aeste sind ausgebreitet. Die großen, spitzigen, weichen Blätter stehen abwechselnd in den Winkeln der Zweige und sind niedergebogen. Die weißen oder veilchenblauen sehr großen Blüthen stehen einzeln außerhalb der Blattachseln aufrecht auf kurzen, behaarten Blüthenstielen. Der Kelch ist röhrig, einblättrig, unten etwas aufgetrieben, mit fünf vorspringenden Kanten versehen, welche sich oben in fünf ungleichen, spitzen Zähnen endigen. Die Krone ist noch einmal so lang als der Kelch, der Länge nach gefaltet, und endigt oben in eine große fünfeckige Mündung, deren jede Ecke in eine schmale Spitze ausläuft. Die eingeschlossenen Staubfäden sind hoch in der Kronenröhre eingefügt. Die Frucht ist eine grüne, eiförmige, aufrechtstehende, mit kurzen, dicken, scharfen Stacheln dicht bekleidete Kapsel, von der Größe eines Apfels. Sie sitzt auf dem Boden des Kelchs, zertheilt sich zur Zeit der Reife in vier Schalenstücke und hat inwendig vier mit zahlreichen nierenförmigen, etwas zusammengedrückten platten, schwarzen Saamen angefüllte Fächer.

Die Pflanze blüht vom Mai bis September, und scheint schon durch ihr Ansehen etwas Warnendes zu verrathen; kein Thier rührt sie an, und die Bienen sollen sterben, wenn sie auf die Blumen fliegen.

Promnitz (Berl. Jahrb. XVI. S. 177.) erhielt aus dem ausgepreßten Safte der Blätter, welcher vom grünen Satzmehle und Eiweiß gereinigt worden war, durch Abrauchen bis zur Syrupdicke eine bedeutende Menge krystallisirten Salpeters, und außerdem einen erdigen Niederschlag, der gehörig ausgewaschen weiß erschien, und aus Phosphorsäure nebst einer vegetabilischen Säure (Weinstein-, Aepfel- und Kleesäure) und aus Bittererde mit etwas Kalkerde bestand. Nach der weiteren Zerlegung des Extracts und des rückständigen Krauts wurden in 10,000 Th. des frischen Krauts gefunden: Wasser 9,125; grünes Satzmehl 64; Eiweißstoff 15; trockne Faser 515;

gummigen Extractivstoff 58; erdigen Niederschlag 23; Extractiv- oder Seifenstoff 60; Harz 12; Verlust 128. S. = 10,000.

Die Saamen des Stechapfels können mit denen des Schwarzkümmels (Nigella sativa) verwechselt werden. Diese sind aber kleiner, fast dreikantig, nicht so bestimmt nierenförmig, auch nicht so platt, zwar auch runzlig, doch nicht mit so regelmäßig wellenförmigen Runzeln, innen weißgrünlich, von einem nicht unangenehmen Geruche, und einem gewürzhaft beißenden, entfernt sassafrasähnlichen Geschmacke.

Promnitz (a. a. O.) erhielt aus 16 Unzen des frischen Saamens durch Auspressen 2 Unzen eines klaren, grünlichgelben Oels von völliger Geruch- und Geschmacklosigkeit, das dem Mandelöle am meisten glich. Aether und Weingeist zogen noch Harz aus den Saamen aus.

Brandes (Buchn. Repert. VIII. S. 1.; auch Schw. J. XXVI. S. 98.) hat eine sorgfältige Analyse der Saamen geliefert, und dabei als wirksames Princip ein Alkaloid, das Daturium, Daturin, aufgefunden. Die von Br. angegebenen Bestandtheile in 500 sind folgende: Wasser 75,5; thierisch-vegetabilische Materie 22,75; Eiweißstoff 9,5; Gummi mit verschiedenen Salzen 39,5; Wachs 7,0; Halbharz 49,5; fette butterartige Materie mit Grünharz 7,0; fettes Oel 69,25; dickflüssiges fettes Oel 4,0, Schleimzucker mit Daturiumsalz 4,0; Glutenoin (eine Modification des Klebers; wahrscheinlich ein Product der Ausziehung mit Aetzlauge) 27,5; gummiger Extractivstoff 30,0; röthlichgelbe extractartige Materie 3,0; Traganthstoff, Alaunerde, phosphors. Kalk 17,0; häutige kieselerdige Absonderung 6,75; äpfels. Daturium 5,0; essigs. und äpfels. Kali, saurer äpfels. Kalk, äpfels. Daturium 3,0; Hülsenfaser 110. S. = 490,75.

Das Daturium wird, wie das Morphium, durch Kochen des wäßrigen Auszugs mit gebrannter Talkerde dargestellt. Bei sehr gelindem Verdunsten der geistigen Lösung krystallisirt es in vierseitigen, rechtwinkligen, sehr kleinen Prismen mit 2 breiten Seitenflächen, gewöhnlich schlägt es sich aber aus der geistigen Auflösung in zarten Flocken nieder. Es ist weiß und glänzend, geruch- und geschmacklos, in Wasser fast unlöslich, eben so in kaltem Alkohol, dagegen ziemlich auflöslich in siedendem Alkohol und Aether. Mit den Säuren bildet es neutrale Verbindungen. Nach dem Kosten der Daturiumsalze empfand Brandes jedesmal Kopfweh und Brustbeengungen.

Auch Peschier will in den unreifen Kapseln und Saamen des Stechapfels ein körnig krystallisirendes Alkaloid gefunden haben; doch sind unsere Kenntnisse über das Daturium noch als unvollkommen anzusehen.

Der Stechapfel gehört zu den narkotischen Pflanzen; die Wirkung der Saamen ist heftiger als die der Blätter. Man gebraucht es vorzüglich in Extractform, gewiß würde sich aber auch ein geistiger Auszug als sehr wirksam empfehlen. Außer der Anwendung gegen Wahnsinn und Wasserscheu ist der Stechapfel als Präservativ gegen die Ansteckung des Scharlachs empfohlen und vielseitig bewährt gefunden worden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0852-0

* Styrax calamita. Storax.

Der an der Luft erhärtete Saft von Styrax officinalis Linn., einem im mittägigen Europa wild wachsenden Baume.

Ein Harz in größeren und kleineren, etwas weichen, außerhalb undurchsichtigen, grauen, innerhalb kleinkörnigen, schimmernden rothbraunen Massen von angenehmen Geruche.

Styrax officinalis Linn. Aechter Storaxbaum.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 1. Ebenaceae.

Dieser Baum ist von mittelmäßiger Größe, wächst in Menge im Orient, in Aethiopien, Syrien, Judäa, Arabien, auf mehreren Inseln des Archipelagus, findet sich auch in Italien, Provence, Spanien.

Der Stamm ist aufrecht, 15—25 Fuß hoch, die Aeste stehen kronenartig. Die gestielten Blätter stehen abwechselnd, sind eirund, ganzrandig, weich, von beiden Seiten behaart, besonders aber auf der untern Seite weiß und filzig. Die weißen Blüthen stehen zu 3—4 am Ende der Aeste vereinigt, und haben ungefähr die Größe und Gestalt der Orangenblüthen. Der Kelch ist kurz, fast schalenförmig, die Krone mit 5 oder 6 schmalen tiefen Lappen versehen.

Das durch Einschnitte aus der Rinde dieses Baumes ausfließende wohlriechende Harz ist der Storax, wovon man 3 Sorten unterscheidet, die wir sämmtlich aus der Levante über Marseille erhalten. Die beste Sorte ist die in Körnern (Storax in granis), welche aus einzelnen oder leicht an einander hängenden durchscheinenden, gelblichen oder gelbröthlichen, erbsengroßen, wachsweichen, zähen Körnern von dem angenehmsten Vanillegeruche bestehen soll; sie kommt gar nicht mehr vor, und wurde vielleicht durch freiwilliges Auströpfeln aus dem Baume gesammelt. Die zweite Sorte ist der Storax in Stücken (Storax in massis), aus hellbraunen oder röthlichen, weniger durchsichtigen, harzigen Stücken bestehend, die durch eine klebrige Masse verbunden sind. Auch diese Sorte kommt selten vor; sie wird jetzt gewöhnlich in Blasen verschickt, ehemals war sie in Schilf oder Rohr eingepackt, woher sie den Namen Rohrstorax, Storax calamita oder cannulata führte. Auch diese Sorte hatte einen angenehmen, dem Peru- und Mekkabalsam ähnlichen Geruch, einen gewürzhaften balsamischen Geschmack und war an dem Lichte entzündlich. Die dritte Sorte, welche jetzt fast nur allein vorkommt, und zwar gewöhnlich unter dem Namen Storax calamita, ist der gemeine Storax (Storax vulgaris, Scobs storacina). Sie ist von der vorigen gänzlich verschieden, und besteht aus sehr großen, leichten, zusammengepreßten, hellbraunen, rundgeformten oder ungestalteten Stücken, die im Aeußern unsern Loh- oder Torfkuchen nicht unähnlich und leicht zerreiblich sind. Diese Sorte ist offenbar ein künstliches Gemenge vielleicht aus Sägespähnen und andern Unreinigkeiten mit ächtem Storax, oder, wie Andere meinen, aus dem Rück-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0853-5

stande vom Auskochen des schwarzen peruvianischen Balsams. Wenn er recht gut ist, so muß er durch Pressen zwischen zwei heißen Platten ein flüssiges, braunes, nach Storax riechendes Harz von sich geben.

Der Storax enthält Benzoësäure; seine Anwendung als Heilmittel hat aufgehört, da reiner Storax anzuschaffen nicht möglich ist, er wird daher jetzt nur noch zu Räucherkerzen, zu Räucherpulver u. s. w. benutzt.

Styrax liquidus. Flüssiger Storax.

Ein aus den Aesten des Liquidambar styraciflua Linn., eines Baumes des nördlichen Amerikas, ausgeflossener Saft.

Ein dicker, grünlichbrauner, undurchsichtiger, stark riechender natürlicher Balsam von gewürzhaft scharfem Geschmacke.

Liquidambar styraciflua Linn. Der virginische Amberbaum.
Liquidambar imberbis H. Kew.? Der morgenländische Amberbaum.
Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 4. Polyandria.
Juss. Cl. XV. Ord. 5. Amentaceae.

Der virginische Amberbaum ist in den sumpfigen Wäldern von Virginien, Carolina und in Mexiko einheimisch, und gehört zu den höchsten und ansehnlichsten Bäumen Amerikas, welcher durch seinen Wohlgeruch schon aus der Ferne zu erkennen ist. Er erreicht eine Höhe von 40 Fuß. Die gestielten, handförmigen, 5- auch 7lappigen Blätter mit länglichen spitzen Lappen stehen an den ältern Aesten büschelartig, an den jüngern abwechselnd. Die handgroßen Blätter sind oben glänzend, unten und besonders stark in den Achseln der Nerven behaart; bei großer Wärme klebrig. Die Blüthenkätzchen sind gehäuft, endständig; die männlichen kegelförmig, die weiblichen kugelig.

Durch Einschnittte in die Rinde dieses Baumes wird der flüssige Amber (Liquidambar, Ambra liquida) erhalten, dessen Consistenz dicklicher als die des Perubalsams ist, von dunkelröthlicher oder fast schwarzer Farbe, durchsichtig, von einem angenehmen, gleichsam aus Ambra und Storax zusammengesetzten Geruche. Des besseren Erhaltens wegen ist er meistens mit der kleingestoßenen Rinde des Baumes vermischt. Er erhärtet mit der Zeit zu einem trocknen zerbrechlichen Harze, und ist jetzt eine große Seltenheit.

Derselbe Baum soll durch Auskochen der Aeste, als eine geringere Sorte, den gebräuchlichen frischen Storax geben. Guibourt hält diese Annahme nicht für wahrscheinlich, vielmehr glaubt er, daß dieser Balsam von dem morgenländischen Amberbaume genommen werde.

Was als flüssiger Storax vorkommt, ist eine zähe Materie von der Consistenz einer Salbe, bräunlichgrau, sehr häufig mehr aschgrau, undurchsichtig, von einem starken in größerer Masse etwas widrigen Storax- oder Benzoëgeruche, und einem bitterlichen, etwas scharfen, brennenden, aromatischen Geschmacke. Durch die Einwirkung der Luft überzieht er sich mit

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0854-1

einem Häutchen, und der ganze Balsam soll dadurch körnig und bitter werden und seinen Geruch verlieren.

Bouillon Lagrange schied aus dem flüssigen Storax durch Wasser (auch durch Hülfe des Aetzkalkes) Benzoësäure. Weingeist nahm den größten Theil des Storax auf, erhielt eine braune Farbe und einen aromatischen scharfen Geschmack; von 122 Th. waren nur 11 Th. zurückgeblieben. Nach Abziehen des Weingeistes blieb eine durchscheinende rothbraune Substanz von angenehmen Benzoëgeruche zurück, auf glühenden Kohlen blähete sie sich auf, und verbreitete den Geruch nach Benzoësäure.

Nach Guibourt löst sich der flüssige Storax in heißem Alkohol vollständig bis auf die Unreinigkeien auf; beim Erkalten wird die Flüssigkeit trübe, läßt einen Stoff (Wachs?) fallen, setzt bei freiwilligem Verdunsten ein weiches Harz ab, und zuletzt bilden sich Krystalle von Benzoësäure ($\frac{1}{10}$). Der Rückstand, 0,16 Gewichtstheile, besteht aus erdigen Theilen und Rindenstückchen. Er enthält immer etwas Wasser.

Der flüssige Storax geht in die Styraxsalbe ein.

Succinum. – Bernstein.

Ein an den Küsten des baltischen Meeres, vorzüglich an denen Preußens, häufiges Erdharz.

Durchsichtige, seltener undurchsichtige, glänzende, zerbrechliche, citronengelbe oder gelblichbraune Stückchen, auf Kohlen geworfen einen angenehmen Geruch verbreitend.

Der Bernstein war schon im Alterthume ein Gegenstand des Handels, den die Phönicier von der Nordküste Deutschlands holten. Er war den Griechen und Römern bekannt, und besonders bei den letzteren beliebt, die großen Aufwand damit in Ausschmückung der Waffen ꝛc. trieben. Die Deutschen sollen nach Plinius den Bernstein Glessum (Glas?) genannt haben. Das Wort Succinum kommt nach Plinius her von Succus arboris, und dieser Schriftsteller läßt den Bernstein von einem Baume herkommen, welcher zu dem Geschlechte der Fichten gehört, eine Annahme, welche durch die Untersuchungen unserer Zeit einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit gewonnen hat.

Das eigentliche Mutterland des Bernsteins ist, wie schon den Alten bekannt war, das eigentliche Preußen, wo er längs den Küsten der Ostsee theils im aufgeschwemmten Lande, theils im Meere gefunden, und aus ersterem auf bergmännische Art durch Stollen und Schachten gewonnen, aus dem Meere aber mit Netzen gefischt, oder auch aus demselben, besonders im Spätherbste bei durch Sturm bewegter See, ausgeworfen wird, indem die auf dem Meeresgrunde lagernden Bernsteinstücke aufgenommen, und gewöhnlich in Tangarten eingewickelt dem Ufer zugeführt werden. Bei den zu unternehmenden Nachgrabungen nach Bernstein wird sehr auf die Erdschichten geachtet, die das Daseyn des Bernsteins verbürgen. Die oberste Schicht be-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0855-7

steht nämlich aus Sand; unter derselben befindet sich ein Lehmlager und unter diesem stößt man auf Schichten fossilen Holzes, in dessen Nähe der Bernstein lagert, gewöhnlich auf einer Schicht Schwefelkies, oder auch wohl Alaunmineral. Mit kleinen spatenförmigen, etwa 1½ Zoll breiten Eisen wird nun vorsichtig der Bernstein, um das Zerbrechen der größeren Stücke zu verhüten, ausgegraben. Eine Untersuchung der sogenannten Bernsteinerde von Hagen findet sich in Schweigger's N. J. 1822. IV. S. 273. Schweigger (dessen Beobachtungen auf naturhistorischen Reisen S. 125. und daraus in Schw. N. J. 1822. IV. S. 278.) sah mehrmals 3—5 Zoll lange Schichten von Bernstein zwischen gleichen Schichten des fossilen Holzes, ja öfters mehrere abwechselnde Lagen von Bernstein und Holz, oder letzteres mit Bernsteinkörnern reichlich angefüllt. Die vorkommenden Stücke sind von sehr verschiedener Größe bis zu mehreren Pfunden. Das größte Stück Bernstein, welches wohl je gefunden worden, ist wahrscheinlich dasjenige, welches in Ostpreußen zwischen Gumbinnen und Insterburg in einem Graben gefunden, und von dem Herrn Medicinalrath Hagen (Beiträge zur Kunde Preußens 1824. S. 507.) beschrieben worden ist. Es ist 13¾ Zoll lang, 8½ Zoll breit, auf der einen Seite 5⅝ Zoll, auf der andern 3½ Zoll dick, und wiegt 18 Pfund 15¾ Loth. Die Farbe ist eine vorzüglich schöne Kummtfarbe. Es befindet sich in dem Mineraliencabinet des königl. Bergwerks- und Hüttendepartements in Berlin. Eine getreue kunstvolle Nachbildung dieses merkwürdigen Stückes wird in dem Cabinet der ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg aufbewahrt. Hr. Medicinalrath Hagen hat a. a. O. zugleich eine sehr interessante Sammlung von Nachrichten über andere große Stücke Bernstein gegeben. Kein jetziger europäischer Baum liefert, bemerkt Schweigger, Harz in so großen Massen und in solcher Menge, als Bernstein ausgeflossen seyn muß, wohl aber giebt das südliche Amerika Beispiele der reichlichsten Harzergüsse, wovon Schw. mehrere merkwürdige, ganz mit Insecten angefüllte Stücke, unter dem Namen Copal, in England sah.

Hinsichtlich der Frage, zu welcher Familie der Baum, aus welchem das nun unter dem Namen Bernstein bekannte Harz floß, gehöre, erklärt sich Schweigger gegen die frühere Annahme, daß er eine Palme gewesen sey, und beweißt, daß er unter die Dikotyledonen gehörte, mithin keine Palme seyn könne. Schw. sah eine Frucht im Bernstein, welche ihm der Erle sehr ähnlich schien; in einem andern Stücke sah er einen kleinen Strobilus, der allem Anscheine nach einer (unbekannten) Species der Gattung Pinus angehörte, wenigstens nur zur Familie der Coniferen sich bringen ließ. Auch Herr Hofapotheker Gärtner (Geiger's Magazin 1826. März. S. 213.) tritt bei Zusammenstellung der Meinungen über den Baum, welcher den Bernstein geliefert hat, derjenigen bei, daß er zu der Gattung Pinus gehörte, um so mehr, als man auch aus Terpenthinarten Bernsteinsäure erhalten hat (Vergl. S. 12.). Es wird von Schweigger für wahrscheinlich erklärt, daß nicht aller Bernstein von einer einzigen Baumspecies kam, und als unzweifelhaft angegeben, daß der

Bernsteinbaum unter diejenigen Körper gehört, die erst bei der letzten Revolution, welche die Erde erlitt, untergingen, und vor welcher der Norden nicht ein tropisches, wohl aber ein warmes Klima hatte, wie der Anblick der Fossilien der obersten Erdschicht lehrt. Palmen finden sich in den Bernsteinlagen nicht, doch sind Bäume, welche ein so flüssiges Harz liefern, als das Bernsteinharz gewesen seyn muß, auch keinesweges bloß der heißen Zone eigen. Kein in Bernstein eingeschlossenes Blatt oder Insect, welche gar nicht selten vorkommen, und die Annahme, daß der Bernstein ein ausgeflossenes Baumharz sey, bedeutend unterstützen, wurde bis jetzt bekannt, aus dessen Bildung man schließen könnte, daß es einem heißen Erdstriche angehörte. Die Umstände, welche beweisen, daß zur Zeit der Bernsteinbildung Preußen ein südliches aber nicht ein tropisches Klima hatte, leiten auf den Satz, daß damals ein Klima, wie es jetzt in Gegenden sich findet, welche den Tropenländern nahe liegen, nahe an die Pole sich erstreckte, und mithin die kalte Zone auf einen schmaleren Erdstrich beschränkt war, als gegenwärtig.

Daß Wasser den Untergang des Bernsteinbaumes herbeiführte, läßt sich aus der Neigung der Bernsteinlager vom Lande abwärts in den Boden der See, und aus dem Umstande, daß das preußische Gestade aufgeschwemmtes Erdreich ist, mit Sicherheit annehmen. Der Untergang dieser Bäume war bei den stets plötzlich eingetretenen Revolutionen der Erde plötzlich, und einiger Bernstein muß noch weich ins Wasser gekommen seyn. Das merkwürdigste Beispiel dieser Art, das Schweigger sah, besitzt Herr Medicinalrath Hagen, nämlich einen Fucus, der zwischen zwei Bernsteinstückchen liegt, die mit einander sich verbunden hatten.

Wenn die Bernsteinsäure in ihrem chemischen Verhalten von den Pflanzensäuren abweichende Eigenschaften zeige, so sey anzunehmen, daß die Schwefelsäure, welche nach Barth's Erfahrung von so entschiedenem Einflusse bei Gewinnung der Bernsteinsäure aus dem Bernstein ist, die Umbildung derselben veranlaßt habe, denn diejenigen Stellen der Ostseeufer, an welchen Bernstein gegraben wird, sind stets reich an Vitriol. Die vermehrte Ausbeute an Bernsteinsäure bei einem Zusatze von Schwefelsäure möchte indeß auch wohl eine andere Erklärung gestatten (siehe Acidum succinicum S. 13.), auch die Bernsteinsäure als eine Pflanzensäure ihren Eigenschaften nach nicht vereinzelt stehen, da die auf der Rinde des weißen Maulbeerbaums in Palermo von Klaproth entdeckte Maulbeerholzsäure, welche hier an Kalk gebunden vorkommt, wenig verschieden von der Bernsteinsäure ist.

Auch aus dem optischen Verhalten des Bernsteins folgert Brewster, daß er ein verhärteter vegetabilischer Saft, und daß die Spuren einer regelmäßigen Structur, die durch seine Wirkung auf polarisches Licht angezeigt ist, nicht die Wirkung der gewöhnlichen Gesetze der Krystallisation, sondern durch dieselben Ursachen hervorgebracht sind, welche auf die mechanische Beschaffenheit des arabischen Gummis und anderer Gummiarten einwirken.

Der Bernstein ist, wie bemerkt worden, vorzüglich in Preußen einheimisch und zwar hauptsächlich an den Küsten der Ostsee. In einzelnen Stücken

wird er aber auch tiefer im Lande, ferner in andern Ländern, jedoch hier seltener, gefunden. So hat man ihn in der Nähe von London in Kieslagern, Becquerel hat ihn in einem niederen Thonlager des Seinethales bei Paris von mehreren verschiedenen Abänderungen, so wie sie an der samländischen Küste vorkommen, gefunden; in Frankreich hat man ihn an mehreren Orten in einem grauen schiefrigen Thone, begleitet von bituminösem Holze, an andern in Steinkohlen und auch in einer Schicht schwefelkieshaltiger Erde, ferner in der niederländischen Provinz Hennegau, in Schweden, Polen, Deutschand, Italien, Sicilien und Spanien, auch in Nordamerika (Schw. N. J. IV. S. 434.) angetroffen.

Der Bernstein, Agtstein (Succinum, Electrum, Ambra flava), ist eine harte, spröde, auf dem Bruche muschelige Substanz, von glänzend glatter Oberfläche, die in meistentheils halbdurchsichtigen, auch wohl nur durchscheinenden und selbst beinahe undurchsichtigen Stücken von sehr verschiedener Größe vorkommt. Die Farbe des Bernsteins ist leicht citronengelb, aber auch in verschiedenen Graden dunkelgelb und röthlichbraun, welche Farben bisweilen in Streifen und Adern zusammen vorkommen. Spec. Gew. 1,065 bis 1,070. Er hat kaum einigen Geschmack, auch an sich keinen merklichen Geruch, gerieben aber und noch mehr auf glühende Kohlen gestreut verbreitet er einen ganz eigenthümlichen nicht unangenehmen, aromatischen Geruch. Durch gelindes Reiben mit Wollenzeuch wird er (der durchsichtige stärker) negativ elektrisch und diese Eigenschaft war schon den Alten bekannt, daher sein Namen ἤλεκτρον, mit welchem ihn die Griechen belegten wegen der Aehnlichkeit seiner Farbe mit derjenigen einer Goldlegirung, den elektrischen Erscheinungen den Namen gegeben hat.

Der Bernstein ist in Wasser und Weingeist unauflöslich, jedoch zieht starker Alkohol eine gelbröthliche Tinctur aus, die etwas Bernsteinsäure enthält. Salpetersäure verwandelt ihn zuerst in eine leichte harzige Substanz, und löst ihn dann auf; mit Vitriolöl giebt er eine schwarze harzige Masse, die viel künstlichen Gerbestoff enthält. In wäßrigem Kali löst er sich zu einer mit Wasser und Weingeist mischbaren Flüssigkeit auf. Flüchtige und fette Oele zeigen keine oder eine sehr geringe auflösende Wirkung auf ihn, wenn er nicht durch Schmelzen in seiner Mischung verändert worden ist. Durch Kochen in Leinöl wird er jedoch weich, so daß er sich biegen und pressen läßt, auch verliert der trübe und wolkige Bernstein durch dieses Sieden in Leinöl (wobei man nur das Springen durch schnellen Temperaturwechsel zu vermeiden suchen muß) öfters seine Fehler. Er schmilzt bei 230° R. unter starkem Aufblähen, verliert dabei aber seine Durchsichtigkeit. Bei der trocknen Destillation schmilzt er, bräunt sich, schwillt auf, giebt kohlens. und brennbares Gas, Wasser, welches Bernsteinsäure und Essigsäure enthält, sich sublimirende Bernsteinsäure und ein blasses dünnes brenzliges Oel, welches später braun und dick wird. Im Rückstande bleibt eine harzige in Weingeist und den Oelen lösliche Materie (Colophonium Succini), die zu Firnissen benutzt wird. Wird die Destillation noch weiter fortgesetzt und das

Feuer bis zum Glühen des Retortenbodens verstärkt, so sublimirt sich eine gelbe, wachsähnliche Substanz, welche von dem anhängenden Oele durch Kochen mit Wasser, Schmelzen und Behandeln mit Aether gereinigt, gelbe glimmerartige Blättchen bildet, die weder in Wasser noch in Alkohol, und kaum in Aether, in Alkalien und den meisten Säuren löslich sind, bei + 70 bis 80 ° R. schmelzen und mit Zurücklassung einer holzigen Kohle sublimiren (Vogel's Bernsteincampher).

Der gegrabene Bernstein ist von demjenigen, welchen der See auswirft, nicht wesentlich verschieden, nur pflegt an dem ersteren häufiger eine Kruste und diese auch dicker als an dem letzteren zu seyn, bei welchem die Oberfläche durch Wasser und Sand abgerieben wird; auch soll der gegrabene Bernstein häufig spröder seyn. Nach einer Bemerkung von Lichtenberg giebt aber auch der gegrabene Bernstein eine reichere Ausbeute an Bernsteinsäure, als der von der See ausgeworfene. Dieses scheint für die Annahme zu sprechen, daß ein Theil der Bernsteinsäure, derjenige nämlich, welcher ohne Zusatz von Schwefelsäure bei der trocknen Destillation erhalten wird, in dem Bernstein im freien Zustande vorhanden sey, und daher vom Wasser zum Theil ausgewaschen werden könne (Vergl. S. 13.). Auch die Menge des Bernsteinöls soll nach den verschiedenen Sorten Bernstein verschieden ausfallen.

Aehnlichkeit mit dem Bernstein haben der Mellit oder Honigstein und der Kopal. Ersterer ist nicht in der Hitze schmelzbar. Der Kopal ist weniger spröde, zeigt auf Kohlen einen terpenthinartigen Geruch, und ist scharf getrocknet in absolutem Alkohol auflöslich. Nach Hauy unterscheidet er sich dadurch, daß ein Stück Kopal an die Spitze eines Messers gesteckt zu brennen anfängt, und dabei in Tropfen zerschmilzt, die beim Niederfallen breit werden; brennender Bernstein dagegen sprüht Funken, bläht sich auf, und wenn seine flüssigen Theile tropfenweise herabfallen, so hüpfen sie von der Fläche, auf welche sie fallen, wieder etwas in die Höhe.

Nach einer Analyse des im Hennegau gefundenen Bernsteins von Drapiez (Schw. J. XXX. S. 114.) enthalten 100 Th.: gasförmige Flüssigkeit und zwar ölerzeugendes Gas (nach Gewicht) 1,40; Bernsteinsäure 4,65; Essigsäure 1,15; flüssiges Oel 16,50; zähes Oel 24,00; festes Oel 7,50; vom Schwefeläther aufgelöstes Oel; kohligen Rückstand 39,50; Verlust 2,10. Werden diese verschiedenen nächsten Bestandtheile auf ihre letzten Elemente berechnet, so besteht der Bernstein aus: Kohlenstoff 80,59; Wasserstoff 7,31; Sauerstoff 6,73; Kalkerde 1,54; Thonerde 1,10; Kieselerde 0,63. S. = 97,90.

Ure giebt folgendes Verhältniß der letzten Bestandtheile an: Kohlenstoff 70,68; Wasserstoff 11,62; Sauerstoff 17,77. S. = 100.

Zum pharmaceutischen Gebrauche bedient man sich vorzüglich der kleinern Stücke, auch des Abfalls bei der Bearbeitung des Bernsteins durch Drehen und Schneiden, des sogenannten Bernsteingruses (**Rasura Succini, Succinum raspatum**), vorzüglich zum Räuchern. Dieser Bernsteingrus ist jedoch bisweilen mit zerkleinertem Kolophonium verfälscht, welche Verfälschung

sich aber durch den Geruch auf glühenden Kohlen und auch dadurch zu erkennen giebt, daß der Weingeist eine harzige rothbraune Tinctur auszieht. Der Bernstein dient auch zur Bereitung des Bernsteinfirnisses. Da derselbe aber, wie oben erwähnt, an sich in fetten Oelen nicht auflöslich ist, so muß er zur Firnißbereitung, eben so wie der Kopal, in einem bedeckten am besten eisernen Topfe, in dessen Deckel ein Loch ist, bei gelindem Feuer geschmolzen werden. Auf ein Pfund geschmolzenen Bernstein, der vom Feuer entfernt worden, werden zwei Pund heißgemachtes Leinöl nach und nach zugemischt, welches sich ohne neue Wärmeanwendung sehr gut zu vereinigen pflegt. Dann wird diese Auflösung ohne alle Wärme mit zwei Pfunden Terpenthinöl verdünnt und aufbewahrt.

Succinum. Das rohe Oel. Rohes Bernsteinöl.

Wird in chemischen Fabriken durch trockne Destillation des Bernsteins bereitet.

Ein empyreumatisches, dickliches, braunes Oel von bituminösem Geruche. Auf Zusatz von concentrirter Salpetersäure erhitzt es sich, entzündet sich oft, und hinterläßt eine einigermaßen nach Moschus riechende Masse. Es sey nicht mit Terpenthinöl verunreinigt. Spec. Gew. = 0,886.

Das Bernsteinöl wird bei der Bereitung der Bernsteinsäure gewonnen; das zuletzt übergehende ist dunkler, dickflüssiger und übelriechender.

Die harzartige Masse, welche bei Einwirkung der concentrirten Salpetersäure auf das Bernsteinöl gebildet wird, ist besonders früher unter dem Namen Moschus artificialis als Heilmittel innerlich, mit Eigelb abgerieben, gebraucht worden. 1 Th. helles klares Bernsteinöl wird mit 3 Th. concentrirter Salpetersäure in einer geräumigen gläsernen Reibschale zusammengemischt. Es entsteht bedeutende Erhitzung und Aufblähung, und es bildet sich ein orangegelbes oder bräunliches, weiches, zähes Harz, welches mit Wasser wohl ausgewaschen wird. Es ist in Weingeist löslich, und hat einen eigenthümlichen bisamartigen Geruch.

Sulphur citrinum seu in baculis. Gelber oder Stangenschwefel.

Wird aus Schwefel enthaltenden Erzen an verschiedenen Orten ausgeschmolzen.

Eine entzündliche, in Stangen geformte, zerreibliche Materie, von citronengelber Farbe, mit erstickendem Geruche und blauer Flamme verbrennend.

Sulphur. Blumen. Schwefelblumen.

Werden in chemischen Fabriken aus dem Schwefel, oder aus Schwefel enthaltenden Erzen durch Sublimation bereitet.

Ein sehr feines Pulver von citronengelber Farbe, im Feuer mit blauer Flamme verbrennend, und das erstickende schwefligsaure Gas entwickelnd. Das nicht ausgewaschene wird gemeiniglich durch anhängende Schwefelsäure verunreinigt. Man hüte sich, daß der Schwefel nicht durch Arsenik, auch nicht durch Selen verunreinigt sey, was an der ins Pomeranzengelbe übergehenden Farbe ersichtlich ist.

Der Schwefel, schon in den ältesten Zeiten bekannt, kommt häufig vor und zwar gediegen, in durchscheinenden oder undurchsichtigen Massen, welche lagenweise den Gyps, den Thon und andere Erdarten durchziehen; der Schwefelberg in Amerika, zwischen Quito und Cuença (2° 10′ S. B.) enthält den Schwefel in Gestalt kleiner, 2—3 Zoll großer abgesonderter Klumpen in den Quarz eingesprengt; dann auch als natürliche Schwefelblumen in der Nähe von Vulcanen, als zu Solfatara im Neapolitanischen, im Kirchenstaate, in Sicilien, Island, Guadeloupe, in Amerika u. s. w., und er findet sich in manchen Gegenden von Sicilien und Italien in solcher Menge, daß er durch Bergbau gewonnen, und als Handelswaare verführt wird, und zwar zum Theil ohne weitere Reinigung. Sehr häufig ist auch sein Vorkommen in Verbindung mit Metallen, im Schwefeleisen, Schwefelkupfer ꝛc.; ferner mit Sauerstoff und Wasserstoff zu Schwefelsäure und zu Hydrothionsäure, und als solche mit Salzbasen zu Salzen verbunden; er findet sich endlich auch als Bestandtheil der Pflanzen und Thiere, so z. B. in dem Senfe, dem Stinkasand, mehreren Hülsenfrüchten, der Eibischwurzel ꝛc., im Thierreiche in den Eiern, Haaren ꝛc.

Der natürliche Schwefel wird durch Schmelzen und Abgießen vom gebildeten Bodensatze oder durch Destillation gereinigt. Aus den Schwefelmetallen, vorzüglich dem Schwefeleisen, welches in der Natur ziemlich häufig vorkommt und Schwefelkies genannt wird, erhält man den Schwefel durch Destillation in großen, länglichen, cylindrischen Gefäßen, die theils aus Eisen, wie in Schweden, theils aus Töpfergut, wie an mehreren Orten Deutschlands, verfertigt sind. Diese werden in einen besonders dazu eingerichteten Ofen in horizontaler Stellung eingemauert, und an der Oeffnung derselben werden kleine eiserne Kolben eingekittet. Wenn der Schwefelkies in diesen Destillationsgefäßen bis zu einem gewissen Grade erhitzt ist, verflüchtigt sich ein großer Theil seines Schwefels, und sammelt sich in den kleinen Eisenkolben, welche kühl erhalten werden. Nebenbei sickert ein Theil Schwefel durch die Masse des Kolbens durch. Dieser heißt Tropfschwefel und ist ganz rein. Der im Kolben selbst angelegte Schwefel wird nachher herausgenom-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0861-0

men, umgeschmolzen und in besondere Holzformen zu Stängen ausgegossen. Dies ist der im Handel vorkommende Stangenschwefel. Eine wohlfeilere Gewinnungsweise ist jetzt an einigen Orten gebräuchlich geworden, die darin besteht, daß man den Schwefelkies in eigene Oefen einsetzt, welche lange, liegende Schornsteine haben, die zunächst am Ofen von Ziegeln gemauert, übrigens aber aus Holz gebaut sind. Die Schwefelkiese werden im Ofen angezündet, und brennen dann von selbst fort. Durch die dabei erzeugte Hitze wird der Schwefel ausgetrieben, und folgt dem aufsteigenden Rauche, setzt sich aber in den Holzschloten, durch welche er zieht, ab. Im Schwefelkiese ist das Eisen mit zwei Theilen Schwefel vereinigt, wovon der eine Theil durch Erhitzung ausgetrieben werden kann. Wird der Schwefelkies unten angezündet, so wird in den zunächst darüber befindlichen Lagen die eine Hälfte des Schwefels ausgetrieben, welche als Dampf weggeht; hierauf, wenn die Hitze näher kommt, entzündet sich und verbrennt das Eisen zugleich mit der andern Hälfte des Schwefels, und durch die hierdurch erregte Hitze destillirt der Schwefel aus dem zunächst darüber liegenden Schwefelkiese, was auf ähnliche Art immer weiter aufwärts geht, so lange noch vom Kiese etwas unverbrannt ist. Wenn diese Operation ohne allen Verlust vor sich ginge, so würde die eine Hälfte des Schwefels in dem Rauchfange sublimirt erhalten werden, während die andere, in schwefels. Gas verwandelt, wegginge; aber man erhält weit weniger Schwefel, als die Theorie voraussetzt, weil viel davon verbrennt. Der erhaltene Schwefel ist mehlförmig und sehr unrein; er wird durch Destillation in eisernen Gefäßen gereinigt.

An mehreren Orten Deutschlands erhält man Schwefel beim Rösten arsenikhaltiger Erze. Dieser Schwefel ist von Arsenik verunreinigt, und man kann den Arsenikgehalt leicht entdecken, wenn man die Schwefelblumen mit Salzsäure (nach Westrumb auf 500 Gran Schwefel 600 Gran Salpetersäure und 400 Gran Salzsäure) in der Wärme behandelt, die Auflösung zur Trockne abdunstet, und darauf in verdünntem Weingeiste auflöst. Diese Auflösung enthält nun eine Verbindung von Arsenik und Salzsäure, und wenn man eine kleine glänzende Zinkstange hineinstellt, so scheidet dieses den Arsenik aus, und überzieht sich mit kleinen dünnen dunkelfarbigen Metallschuppen, welche, auf glühende Kohlen gelegt, sich mit dem knoblauchartigen Geruche des Arseniks verflüchtigen. Die Verunreinigung des Schwefels mit Selen giebt sich durch eine schmutzige, orangengelbe Farbe zu erkennen, und diese Verbindung von Schwefel mit Selen wird leicht von Königswasser zersetzt. Der unaufgelöste Schwefel hat hier und da röthliche Flecken, und behält das Selen sehr lange zurück; wenn er aber in der concentrirten sauren Flüssigkeit schmilzt, und nach der Abkühlung eine gelbe Farbe annimmt, so ist er von Selen frei. Nach Vauquelin's Untersuchungen enthält der meiste natürliche Schwefel Bitumen. Von diesem leitet derselbe auch den stinkenden Geruch ab, den manche im Handel vorkommende Schwefelsorten beim Erwärmen von sich geben, indem der flüchtigste Theil des Bitumens bei der Reinigung des Schwefels durch Destillation mit übergehe.

Der Schwefel hat eine schöne hellgelbe Farbe, und der krystallisirte gediegene ist zugleich halbdurchsichtig. Der Stangenschwefel ist zuweilen hellgrau und äußerst unrein. Der Schwefel hat große Neigung zu krystallisiren, und bildet, wie der gediegene, ein längliches Oktaëder mit rhombischer Basis, oder, wenn Schwefel geschmolzen, und nachdem er auf der Oberfläche und an den Seiten gestanden ist, in die erstarrte Fläche ein Loch gemacht wird, wodurch man schnell den noch flüssigen Theil ausfließen läßt, worauf man die innere Seite mit langen prismatischen Krystallen bekleidet findet, ein schiefes Prisma mit rhombischer Basis. Das spec. Gew. des reineren Schwefels ist 1,98; der unreinere aber ist bis 2,35 schwer. Er ist hart, giebt einen eigenen Geruch beim Reiben und einen schwachen Geschmack, wenn man ihn lange auf der Zunge behält. Durch Reiben wird er elektrisch und springt bei schneller Erwärmung von einander. Daher knistert ein Stück Schwefel, wenn man es in die warme Hand nimmt, es bekommt Risse und zerfällt manchmal in Stücke (die durch die Wärme der Hand in dem Schwefel erregte Elektricität wird nicht fortgeleitet und veranlaßt das Abstoßen der Theilchen). Der Schwefel schmilzt bei + 100 ° oder bei der Wärme des siedenden Wassers; bei + 104½ ° wird er völlig flüssig und durchscheinend, nimmt aber beim Abkühlen seine gelbe Farbe wieder an. Erhitzt man den Schwefel noch höher, so wird er allmälig braun, zähe und verliert bei + 165 ° seinen flüssigen Zustand ganz; beim Erkalten aber verschwindet die braune Farbe und der Schwefel wird wieder dünnflüssig. Schmilzt man den Schwefel lange, oder setzt man ihn schnell einer sehr erhöhten Temperatur aus, und gießt ihn dann in Wasser, so erhält man eine teigige braune Masse, die erst nach einiger Zeit ihre Festigkeit und Farbe wieder erlangt. Man kann dieselbe formen und zu Münzabdrücken gebrauchen, welche in der Luft allmälig erhärten; sein specifisches Gewicht soll sich dann bis zu 2,32 erhöhen.

Erhitzt man den Schwefel in verdeckten Gefäßen bis zu 143 °, so wird er in ein pomeranzenfarbiges Gas verwandelt, welches sich bei dieser Temperatur gasförmig erhält und in welchem mehrere Metalle, z. B. Kupfer und Silber, wie im Sauerstoffgase brennen. Wird das Schwefelgas durch kalte Luft oder durch Berührung mit kalten Körpern condensirt, so setzt sich der Schwefel in Form eines hell citronengelben Mehles ab, welches man Schwefelblumen (Flores Sulphuris) nennt. Wenn man den Schwefel bis zu + 316 ° erhitzt, so geräth er völlig ins Kochen. Auf diese Weise werden in England und Holland, durch Destilliren in eigens dazu eingerichteten Gefäßen, die Schwefelblumen fabrikmäßig bereitet. Damit sich der Schwefel in Mehlgestalt absetze, muß das Destillirgefäß einen weiten Hals haben, so daß der größere Theil des Schwefels sich in der Luft verdichten kann, wo er sich dann als Pulver niederschlägt, und an den Wänden herabfällt. Die dabei erhaltenen Schwefelblumen sind reiner Schwefel, der indessen mechanisch mit etwas Schwefelsäure verunreinigt ist, welche sich beim Verbrennen des Schwefels auf Kosten der in den Destillationsgefäßen befindlichen Luft erzeugt hat. Daher reagiren alle Schwefelblumen auf Lackmuspapier, und sind

bisweilen so sauer, daß sie feucht werden und in der Luft zusammenbacken, weshalb sie mit Wasser ausgewaschen werden müssen. Der Schwefel ist unauflöslich in Wasser, etwas auflöslich in Alkohol und Aether, aber in größerem Grade auflöslich in Oel. Er verbindet sich mit Sauerstoff in mehreren Verhältnissen; aber nur eine Verbindungsstufe entsteht durch Verbrennung des Schwefels an der Luft oder im Sauerstoffgase, nämlich das schwefligsaure Gas. Der Schwefel hat 4 bekannte Oxydationsgrade, welche alle Säuren sind, nämlich:

1) Die unterschweflige Säure, bestehend aus 66,80 Schwefel und 33,20 Sauerstoff, oder 100 Schwefel nehmen 49,71 Sauerstoff auf. Sie ist noch nicht in isolirter Gestalt dargestellt worden, indem sie bei der Abscheidung aus ihren Salzen (sonst geschwefelte schwefligsaure Salze genannt) sogleich in Schwefel und schweflige Säure zerlegt wird.

2) Die schweflige Säure. Bildet sich beim Verbrennen des Schwefels, oder wenn der concentrirten Schwefelsäure durch brennbare Stoffe, als Kupfer, Quecksilber, Kohle u. s. w., ein Theil ihres Sauerstoffs entzogen wird. Sie ist bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft gasförmig, kann aber durch hohe Kältegrade oder durch starken Druck tropfbar flüssig erhalten werden. Sie röthet nicht die Lackmustinctur, sondern vertilgt die Farbe; wegen dieser Eigenschaft wird sie gebraucht, um Pflanzenfarben zu vertilgen und thierische Körper zu bleichen (zu schwefeln), welcher Erfolg nach v. Grotthuß davon abhängt, daß die schweflige Säure sich mit den färbenden Stoffen zu farblosen (salzartigen) Körpern verbindet, welche durch stärkere Säure, oder dadurch, daß die Säure sich an der Luft verflüchtigt, ihre Farbe wieder erhalten. An der Luft saugt diese Säure Sauerstoff ein, und verwandelt sich in Schwefelsäure. Sie besteht aus 50,144 Schwefel und 49,856 Sauerstoff, oder 100 Schwefel verbinden sich in ihr mit 99,42 Sauerstoff, d. h. mit der doppelten Menge, wie in der vorigen.

3) Die Unterschwefelsäure, im J. 1819 von Welther gelegentlich entdeckt und von Gay-Lussac untersucht. Sie besteht aus 44,59 Schwefel und 55,41 Sauerstoff, oder 100 nehmen in ihr 124,27, d. h. 2½mal Sauerstoff auf. (Vergl. Poggendorff's Annalen 1826. V. S. 55. u. VI. S. 171.)

4) Die Schwefelsäure, bestehend aus 40,14 Schwefel und 59,86 Sauerstoff, oder aus 100 Schwefel und 149,135 Sauerstoff, d. h. 3mal der Gehalt von der ersten Verbindungsstufe.

In diesen 4 Verbindungen verhalten sich also die Mengen des Sauerstoffs wie 1, 2, 2½ und 3 oder wie 2, 4, 5 und 6. Es giebt aber noch eine braune oder rothe, eine grüne und indigblaue Verbindung des Schwefels mit dem Sauerstoffe, deren Zusammensetzung aber unbekannt ist.

Mit dem Wasserstoffe verbindet sich der Schwefel zu einer eigenen Säure, Schwefelwasserstoff, Schwefelwasserstoffsäure, Hydrothionsäure, bestehend aus 94,176 Schwefel und 5,824 Wasserstoff. Diese Verbindung geschieht nicht direct, so daß man Schwefel in Wasserstoffgas schmelzen und sublimiren kann. Aber wenn ein Schwefelmetall in einer verdünnten Säure aufgelöst

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0864-7

wird, und das Metall, wenn es sich auf Kosten des Wassers oxydirt, seinen Schwefel an demselben Punkte, wo es Wasserstoff entwickelt, frei werden läßt, so verbinden sich beide zu Schwefelwasserstoff. Eine andere Verbindung des Schwefels mit dem Wasserstoffe ist das Sulphur praecipitatum, welches beim Schmelzen etwas Schwefelwasserstoffgas entweichen läßt, und nach dem Erkalten gelb wird. Selbst der Stangenschwefel enthält einen kleinen Antheil Wasserstoff, der nicht durch Schmelzen abgeschieden werden kann, und der ungefähr 0,004 vom Gewichte des Schwefels beträgt. Er offenbart sich als Wasser, wenn Schwefel mit einem wasserfreien Metalloxyde vermischt und erhitzt wird. Auch giebt es noch eine andere Verbindung des Schwefels mit Wasserstoff, welche ein ölartiges Liquidum bildet.

Die Verbindung des Schwefels mit Kohlenstoff — tropfbar-flüssiger Schwefelkohlenstoff —, von Lampadius zufällig entdeckt, von Clement und Désormes untersucht, von seinem Entdecker Schwefelalkohol genannt, bildet im reinen Zustande ein völlig klares, farbenloses, höchst flüchtiges Liquidum, von einem eklen, dem des Schwefelwasserstoffgases etwas ähnlichen, jedoch auch verschiedenen Geruche, und von einem scharfen an Schwefel erinnernden, etwas aromatischem Geschmacke. Er kocht schon bei + 42 °, ist höchst entzündlich, und brennt mit blauer Flamme. Von Alkohol und Aether wird er in allen Verhältnissen aufgelöst; läßt sich leicht mit fetten und flüchtigen Oelen mengen, und löst den Campher, Phosphor, Jod u. s. w. auf. Besteht aus 84,23 Schwefel und 15,77 Kohlenstoff. Dieser Stoff ist von Lampadius (Ueber den Schwefelalkohol ꝛc. 1826.) als innerliches und äußerliches Heilmittel sehr empfohlen werden.

Mit den Metallen verbindet sich der Schwefel zu Schwefelmetallen, und bei den meisten zeigt sich, wenn sie als feines Pulver mit Schwefel gemengt und erhitzt werden, die Feuererscheinung, welche entsteht, wenn sich Metalle im Schwefelgase entzünden und brennen. Zuerst schmilzt der Schwefel, und dann geht nach einigen Augenblicken die Verbindung vor sich, wobei die Masse aufschwillt nnd glühend wird. Der Schwefel verbindet sich dabei mit den Metallen nach gleichen multipeln Verhältnissen, wie der Sauerstoff, und es nimmt dabei ein Metall doppelt so viel Schwefel als Sauerstoff auf. Die Ursache des Brennens und der Verbindung ist hier dieselbe, wie beim Sauerstoffgase.

Der Schwefel ist ein bewährtes innerliches und äußerliches Heilmittel. Der Stangenschwefel kann nur zur Bereitung des zu Bädern zu verwendenden Schwefelkaliums gebraucht werden; häufiger ist die Anwendung der Schwefelblumen. Bei dem innerlichen Gebrauche äußert der Schwefel seine Einwirkung auf den menschlichen Körper auch dadurch, daß er dem Schweiße und andern Excretionen seinen Geruch mittheilt, daß Zierden von Silber, welche auf dem Körper getragen werden, schwarz werden u. s. w.

Die von der Reinigung des Schwefels in den Geräthschaften zurückbleibenden Unreinigkeiten, die gemeiniglich aus Eisen, Gyps und erdigen Theilen

bestehen, werden als grauer oder Roßschwefel (Sulphur griseum s. caballinum) in den Handel gebracht; oft ist dieser jedoch Kunstproduct.

Syrupus communis. Gemeiner Syrup.

Wird bei der Reinigung des Zuckers erhalten.

Eine dicke Flüssigkeit von der Consistenz eines dünnern Extracts, von braunschwarzer Farbe und von süßem Geschmacke. Er sey weder durch Kupfer noch durch andere fremdartige Dinge verunreinigt.

Diese bekannte Flüssigkeit enthält den unkrystallisirbaren Schleimzucker und die färbenden Theile. Die Verunreinigung mit Kupfer wird eine hineingestellte polirte Messerklinge erkennen lassen.

Tacamahaca. Takamahak.

Ein an der Luft erhärteter Saft eines unbekannten amerikanischen Baumes.

Ein Harz in braungelben, oft weiß gefleckten, zerbrechlichen, auf dem Bruche glänzenden, im Feuer leicht zu schmelzenden und wohlriechenden Stücken, von mit weißem Pulver bestreuter Oberfläche.

Calophyllum Inophyllum Linn. Das große Schönblatt.
Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 9. Guttiferae.
(Willdenow im Berl. Jahrb. 1801. S. 109.

Das große Schönblatt ist in Malabar, auf den Amboinischen Inseln, auf Java und wahrscheinlich auch in andern Gegenden Ostindiens einheimisch, wo der Baum in der Nähe des Seestrandes vorkommt. Nach Blume bildet er an dem südlichen Ufer von Java ganze Wälder.

Der Stamm dieses Baumes ist, im Verhältnisse seiner ausgezeichneten Dicke, sehr niedrig, gewöhnlich nach der See hingeneigt, und mit langen unregelmäßigen Aesten besetzt, so daß er in Ansehung des Wuchses keinesweges zu den schönen Bäumen gerechnet werden kann. Die ältere Rinde ist sehr dick, runzlig, schwarz; das Holz zeichnet sich durch eine ausnehmende Härte und Dauerhaftigkeit aus. Die Blätter, von deren Schönheit der Baum seinen Namen führt, sind gegenständig, auf 6—8 Linien langen Blattstielen, oval-länglich, stumpf und zuweilen ausgerandet, ganzrandig, von fester lederartiger Substanz, mit zahlreichen feinen parallelen Nerven durchzogen, vollkommen glatt und glänzend; ihre Länge beträgt 6—8, ihre Breite 3—4 Zoll. Die Blüthen bilden in den Winkeln der Blätter einfache 6—9blüthige Trauben. Der Kelch ist aus 4 ungleichen, abgerundeten, weißen, hinfälligen Blättchen gebildet; die Blumenkrone besteht aus 4 (nach Blume aus

3) verkehrt-eiförmigen, stumpfen, auf einer Seite ungleichen, weißen Blumenblättern.

Nach Blume's Beobachtungen tritt aus der Rinde dieses Baumes ein gelber Balsam hervor, der an der Luft zu einem gelbbraunen Harze von eigenthümlichem Geruche erhärtet, welches das ächte ostindische Takamahak darstellt. Dieses Harz könnte, nach Blume, in Java in hinlänglicher Menge gesammelt werden, und aus der nahen Verwandtschaft dieses Baumes mit dem Calophyllum Tacamahaca Willd., welches auf den Inseln Madagaskar und Mauritius wächst, läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit auf die Aehnlichkeit ihrer harzigen Educte schließen und annehmen, daß beide Arten dasselbe oder ein sehr ähnliches Harz liefern.

Die feinste Sorte des Takamahaks, die sehr selten ist, kommt in kleinen Kürbisschalen vor, ist blaßgelb, und soll sich vorzugsweise durch einen angenehmen Geruch nach Lavendel und Ambra auszeichnen.

Im Handel kommen 3 verschiedene Sorten vor:

Die erste erscheint in unregelmäßigen, trocknen, zerbrechlichen Stücken, die gegen das Licht gehalten halbdurchscheinend, von bräunlichgelber Farbe, außen mehr oder minder weiß bestäubt, auf dem Bruche schwach glänzend, gleichförmig sind. Der Geschmack ist unbedeutend, der Geruch bei der Erwärmung eigenthümlich, aber gerade nicht sehr angenehm.

Die zweite Sorte kommt in mehr flachen, weniger bestäubten Stücken vor; sie lassen sich leichter in der Hand erwärmen, sind auf dem Bruche mehr glasartig glänzend, und in einzelnen Stücken fast ganz durchsichtig, von einer gelblichbraunen Farbe.

Die dritte Sorte, welche bald als Takamahak, bald als Anime von unsern Droguisten verkauft wird, erhalten wir in kleinen rundlichen, aber auch in größern mehr flachen Stücken. Diese sind sehr leicht, stark weiß bestäubt, und zeigen auf dem Bruche unter einer mehr gelben Rindenschicht einen weißen oder gelblichen matten Kern. Die Farbe und auch der Geruch ist dem Elemiharze zu vergleichen, wodurch sich diese Sorte leicht unterscheidet. Unsere deutschen Autoren nehmen dies für Resina anime, nach Guibourt hingegen ist es das wahre Takamahak.

Außerdem soll auch noch ein amerikanisches Takamahak, von Fagara octandra L., Amyris tomentosa Spr., Elaphrium tomentosum Jacq., einem in Mexiko und Curaçao vorkommenden Baume (Linn. Cl. IV. Tetrandria. Ord. 1. Monogynia; Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.) im Handel vorkommen, in derben Stücken von verschiedener Größe, undurchsichtig, bräunlich, mit untergemischten gelblichen und röthlichen Flecken, zerbrechlich, von angenehmen, angelikaähnlichem Geruche und balsamisch-scharfem Geschmacke; bisweilen erhält man auch als Takamahak nur eine spröde, trockne Masse, die halb graulichblau, halb gelb und von schwach balsamischem Geruche ist, so daß es fast unmöglich ist, mit voller Sicherheit über den Ursprung dieser verschiedenen Sorten Takamahaka zu entscheiden.

Das Takamahak verhält sich wie ein Harz, das einen kleinen Rückhalt

von ätherischem Oele hat, welches bei der Destillation mit Wasser übergeht. Das Harz schmilzt in der Wärme, und löst sich in Alkohol bis auf einen ganz geringen weißen Rückstand auf, welcher aus einem in Wasser löslichen Gummi, und aus einem in Alkohol und Aether unauflöslichen Harze besteht.

Das Takamahak findet nur äußerlich zu Räucherungen Anwendung.

Tamarindi seu Fructus Tamarindorum. Tamarinden.

Tamarindus Indica Linn. Ein Baum Arabiens und Ostindiens.

Das schwarzbraune Muß der Hülsen, mit dazwischenliegenden Saamen, mit holzigen Fäden durchwebt, von einem angenehmen sauren Geschmacke. Das amerikanische, an dem herben Geschmacke und an der braungelben Farbe zu unterscheiden, auch das süßliche, schimmlige, durch Gährung verdorbene und mit erweichten Saamen vollgestopfte, gar zu flüssige oder zu trockene werde verworfen. Man sehe darauf, daß es nicht durch Kupfer verunreinigt sey.

Tamarindus indica Linn. Der indische Tamarindenbaum.
Linn. Cl. XVI. Monadelphia. Ord. 1. Triandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Dieser schöne Baum von 30—40 Fuß Höhe, im Wuchse und in der Blattform der Acacie ähnlich, wächst in Ostindien, Arabien und Aegypten, ist aber auch nach Amerika verpflanzt worden.

Der Stamm ist aufrecht, dick, mit einer braunen schuppigen Rinde bedeckt, in weit ausgebreitete, abstehende, etwas aschfarbige Aeste getheilt, und hat zuweilen 3 Fuß im Durchschnitte. Das Holz ist braun, sehr hart und schwer. Die abwechselnden Blätter sind von schön grüner Farbe, gestielt, gefiedert und bis 5 Zoll lang. Die Blättchen sind klein, zahlreich, gegenüberstehend, fast aufsitzend, eiförmig-länglich, ganz ungetheilt, stumpf und 6—10 Linien lang. Die abwechselnden, wohlriechenden, großen, gelben, carmoisinroth gestreiften Blumen stehen ungefähr zu zwölf in schlaffen etwas hängenden Seitentrauben. Die Frucht, eine gewöhnlich fingerslange und eben so dicke, etwas zusammengedrückte, bald gerade, bald einwärts gekrümmte, mit einer doppelten Rinde versehene Hülse ist ein- bis dreifächerig, und enthält mehrere (öfters drei) ziemlich große, glänzende, glatte, etwas winklig-rundliche zusammengedrückte Saamen. Zwischen den beiden Rinden, wovon die äußere trocken, dünn und zerbrechlich, die innere häutig ist, findet sich auch ein dickes Mark.

Der Tamarindenbaum blüht im October und November; die Frucht reift gegen Ostern.

Die enthülseten und zu Muß zerstoßenen Früchte dieses Baumes geben die officinellen Tamarinden. Wir erhalten dieselben als eine mußige, schlei-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0868-0

mige, zähe Masse mit den beschriebenen harten Saamen und den starken Fasern, wodurch die Saamen in den Hülsen befestigt sind, vermengt. Die westindischen Tamarinden sind viel weicher, feuchter, weniger zähe, und haben wegen des Zuckers, der ihnen, um ihr Verderbniß zu verhüten, zugesetzt werden muß, einen schwächern und minder sauern Geschmack, daher sie eben so wenig als die dumpfig riechenden Tamarinden mit aufgequollenen, glanzlosen Saamen angewendet werden dürfen.

Die Abdunstung der Tamarinden in kupfernen Kesseln, oft noch mit einem Zusatze von Essig, macht sie stets eines Kupfergehalts verdächtig, worauf sie durch eine polirte Messerklinge zu prüfen sind.

Vauquelin erhielt durch Abrauchen eines kalten Aufgusses der Tamarinden Weinsteinkrystalle, von denen auf Zusatz von einigen Tropfen Kalilösung noch mehr erhalten wurden. Die dann noch merklich saure Flüssigkeit wurde mit pulverisirter Kreide gekocht, worauf sie unter Aufbrausen citronensauren Kalk abschied, der durch Schwefelsäure zerlegt wurde. Die übrige jetzt neutrale Flüssigkeit wurde mit kohlens. Kali versetzt, wodurch kohlens. Kalk gefällt wurde. Dieser Kalk war dennoch an eine Säure gebunden gewesen, die ein auflösliches Kalksalz giebt, und dies konnte keine andere als die Aepfelsäure seyn, wie auch die ferneren Versuche bewiesen. Aus der zur Syrupsdicke abgerauchten zähen Flüssigkeit sonderte Alkohol eine graue, zähe, schleimige und klebrige Materie ab; die übrige zur Trockne abgerauchte Flüssigkeit gab eine zuckerartige Materie.

Dann wurden die Tamarinden mit Wasser gekocht; die durchgeseihte Flüssigkeit gerann nach mehreren Stunden zu einer braunen zitternden Masse, die sich in 2 Theile trennte, in eine flüssige untere und eine darauf schwimmende, weiche, halbdurchsichtige, gallertartige, welche letztere sich im kalten Wasser wenig auflöslich zeigte, von kochendem Wasser leicht aufgelöst wurde, aber wieder gerann, durch langes Kochen jedoch die Eigenschaft zu gerinnen verlor (Gallertsäure?). Der andere flüssige Theil setzte beim Verdampfen noch Weinstein ab, und Alkohol schied noch etwas schleimige Materie ab.

Was weder von kaltem noch von kochendem Wasser aufgelöst worden war, verhielt sich als ein Gemenge von trocknen, hornartigen Häuten, einigen Saamen und parenchymatöser Materie.

16 Unzen Tamarinden bestehen diesen Versuchen zufolge aus: Weinstein 4 Quentchen 12 Gran; Gummi 6 Quentchen; Zucker 2 Unzen; Gallerte 1 Unze; Citronensäure 1 Unze 4 Quentchen; freier Weinsteinsäure 2 Quentchen; Aepfelsäure 40 Gran: parenchymatöser Materie 5 Unzen; Wasser 5 Unzen 6 Quentchen 52 Gran, wobei der Ueberschuß der den ausgeschiedenen Stoffen adhärirenden Feuchtigkeit zuzuschreiben ist.

Die Tamarinden werden zu Abkochungen, zur Bereitung des Tamarindenmarkes ꝛc. wobei aber kupferne Gefäße zu vermeiden sind, als kühlendes, oder in größerer Gabe als abführendes Mittel verordnet. Von den Amerikanern werden die Früchte in großer Menge gegessen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0869-8

Tanacetum. Die Blumen. Rainfarrnblumen.

Tanacetum vulgare Linn. Eine ausdauernde, an Wegen und unter den Saaten häufige Pflanze.

Zusammengesetzte, halbkugelförmige Blumen, mit dachziegelförmigem Kelche, röhrenförmigen, fünfzähnigen gelben Blümchen, von bitterm Geschmacke und gewürzhaftem Geruche.

Tanacetum. Das Kraut. Rainfarrnkraut.

Ein bitter gewürzhaftes Kraut, mit gefiederten Blättern, die Fiederblättchen lancettförmig-linienförmig, eingeschnitten sägeförmig. Im Monat Juli einzusammeln.

Tanacetum. Das Oel. Rainfarrnöl.

Ein Destillat aus dem blühenden Kraute des Tanacetum vulgare Linn.

Ein ätherisches, gelbliches, starkriechendes Oel. Spec. Gew. = 0,932.

Tanacetum vulgare Linn. Gemeiner Rainfarrn. Gemeines Wurmkraut.

Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 2. Polygamia superflua.
Juss. Cl. X. Ord. 3. Corymbiferae.

Der gemeine Rainfarrn, der durch ganz Europa wächst, findet sich häufig in ungebauten, steinigen, etwas feuchten Gegenden, an Rändern der Aecker, an Wegen, Zäunen, Hecken und Gräben.

Die Wurzel ist ästig, kriechend und hart. Der aufrechte Stengel ist fast glatt, eckig, hart, gestreift, vorzüglich oben sich in zahlreiche Aeste theilend, und erreicht eine Höhe von 2—4 Fuß. Die Blätter sind abwechselnd, etwas gestielt, tief fiedertheilig, glatt, oben mit vielen sehr feinen kleinen hohlen Pünktchen bezeichnet und von dunkelgrüner Farbe, mit länglichen, spitzen, fast gefiederten Abschnitten. Die halbkugelförmigen, schön goldgelben Blüthen in flachen Doldentrauben an der Spitze des Stengels und der Aeste mit kleinen, kurzen, spitzigen Nebenblättchen versehen. Der gemeinschaftliche, halbkugelförmige Kelch besteht aus dachziegelförmig fest übereinander liegenden Schuppen, und ist von etwas gelblichgrüner Farbe. Die zusammengesetzte Blüthe ist erhaben, und besteht aus sehr vielen röhrigen Zwitterblümchen in der Mitte, und einigen weiblichen Randblümchen. Der Saame ist klein, länglich, etwas gekrümmt, mit tiefen Furchen bezogen, am obern Ende mit einem kleinen Rande eingefaßt und breiter als am untern.

Die Blüthezeit ist Juli bis September und die Saamenreife August bis October.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0870-9

Kraut, Blumen und Saamen haben einen stark balsamischen campherartigen Geruch und bittern gewürzhaften Geschmack; ätherisches Oel ist in allen Theilen der Pflanze enthalten.

Der wäßrige Aufguß der Blätter ist bräunlich, und wird durch Eisenauflösung dunkelgrün. Das wäßrige Extract ist braun und sehr bitter. Die geistige Tinctur ist dunkelgrün. Der Auszug der Blumen ist, nicht sehr gesättigt, gelbgrün.

Prof. Frommherz (Geiger's Magazin 1824. October. S. 35.) hat eine sehr genaue chemische Untersuchung des Rainfarrns und zwar über das Kraut, die Blumen und die Saamen besonders, angestellt.

Die Blätter mit Wasser destillirt gaben an ätherischem Oele $\frac{1}{300}$. Andern Erfahrungen zufolge soll $\frac{1}{200}$ erhalten werden.

Eine andere Menge frischer Blätter wurde mit kochendem Alkohol von 0,847 spec. Gew. bis zur Erschöpfung behandelt. Die dunkelgrüne Tinctur setzte nach dem Erkalten keine Flocken ab. Der durchs Abdampfen erhaltene Rückstand ward hierauf mit siedendem Wasser ausgezogen, und die wäßrige Flüssigkeit abfiltrirt. Der in Wasser unlösliche Rückstand besaß alle Eigenschaften des harzigen Blattgrüns oder Chlorophylls. Die wäßrige Flüssigkeit hatte eine dunkelbraune Farbe, keinen oder nur einen faden Geruch und einen bittern herben Geschmack. Neutrales essigs. Blei erzeugte einen gelben Niederschlag, welcher abgesondert wurde. Die Flüssigkeit wurde durch Hydrothionsäure von dem überschüssigen Blei befreit und dann abgedampft, wodurch flüssiger Zucker (Schleimzucker) erhalten wurde. Der durch essigs. Bleioxyd gebildete Niederschlag wurde ausgewaschen, in Wasser suspendirt und durch Hydrothiongas zersetzt. Die Flüssigkeit über dem erzeugten Schwefelblei wurde einige Zeit an die Luft gestellt, um die Hydrothionsäure zu entfernen. Sie röthete das Lackmuspapier stark, und schmeckte sauer adstringirend. Zur Trockne verdampft mit Alkohol von 34 ° B. behandelt, erhielt man eine gelblichbraune Tinctur. Ein Theil freiwillig an der Luft verdunstet gab keine Krystalle; der andere Theil gab mit essigs. Blei einen hellgelben Niederschlag, welcher sich in Salpetersäure wieder auflöste. Kalkwasser bis zur Neutralisirung zugesetzt färbte die Flüssigkeit dunkler, ohne daß sich jedoch ein Niederschlag bildete. Alkohol zu diesem Kalksalze gesetzt, bewirkte augenblickliche Trübung, und nach einigen Minuten schieden sich viele bräunliche Flocken ab. Berzelius giebt dieses Verhalten als charakteristisch für die Aepfelsäure an; der Verf. erklärt also die hier vorgefundene Säure für Aepfelsäure. Die Substanz, welche die Aepfelsäure braun färbte, war ein Antheil des sogleich vorkommenden Bitterstoffs und Gerbestoffs. Der durch kalten Alkohol nicht gelöste Rückstand von der abgedampften Flüssigkeit besaß die charakteristischen Eigenschaften des eisengrünenden Gerbestoffs.

Das durch Zersetzung des Niederschlages mittelst Hydrothionsäure erhaltene Schwefelblei hatte eine dunkelbraune Farbe, woraus sich schon auf die Gegenwart einer organischen Substanz schließen ließ. Ausgewaschen und mit kochendem Alkohol ausgezogen ließ die erhaltene Tinctur beim Verdampfen

bis auf ein Drittheil und Erkalten Schwefelhydrat als weiße Substanz mit gelben Körnern, reinem Schwefel, gemischt fallen. Nach dem völligen Abdampfen blieb Bitterstoff mit Gerbestoff gemengt zurück. Diese Verbindung ist die Ursache, warum schwefels. Eisen in dem Decoct der Rainfarrnblätter einen schmutzig grünen Niederschlag und nicht bloß eine dunkelgrüne Färbung hervorbringt.

Die mit Alkohol erschöpften Blätter hatten eine strohgelbe Farbe und weder Geruch noch Geschmack. Erst mit kaltem und dann mit warmen Wasser behandelt, wurde bloß Gummi, keine Spur von Amylum erhalten. Der Rückstand war Holzfaser.

Frische Blätter ausgepreßt gaben einen Saft von schmutzig dunkelgrüner Farbe, und von dem Geruche und Geschmacke der Blätter. Beim Aufkochen schieden sich nur wenige Flocken von Eiweißstoff ab.

Die eingeäscherten Blätter gaben: kohlens. Kali, salzs. Kali, kohlens. Kalk, schwefels. Kalk, kohlens. Magnesia, Eisenoxyd und Kieselerde. Da die kohlens. Salze als Producte der Verbrennung angesehen werden müssen, und sich Aepfelsäure in den Blättern findet, so sind dort das Kali, der Kalk, die Magnesia als äpfels. Salze anzusehen.

Die Bestandtheile der Blätter sind also ätherisches Oel; Chlorophyll; eisengrünender Gerbestoff; Bitterstoff; flüssiger Zucker; Gummi; wenig Eiweiß; Holzfaser; freie Aepfelsäure; äpfels. Kali, Kalk und Magnesia; salzs. Kali; schwefels. Kalk, Eisenoxyd und Kieselerde.

Die Blumen, auf dieselbe Weise zerlegt, gaben: ätherisches Oel; Wachs; Weichharz; eisengrünenden Gerbestoff; Bitterstoff; flüssigen Zucker; Gummi; Holzfaser; freie Aepfelsäure; äpfels. Kali, Kalk und Magnesia; salzs. Kali, schwefels. Kalk, Eisenoxyd und Spuren von Kieselerde. Oel wurde $\frac{1}{253}$ erhalten.

Die Saamen enthielten ätherisches Oel; wenig fettes Oel; Wachs; Weichharz; Bitterstoff; eisengrünenden Gerbestoff; Gummi; Holzfaser, freie Aepfelsäure; äpfels. Kali, Kalk und Magnesia; salzs. Kali; schwefels. Kalk; Eisenoxyd und Spuren von Kieselerde.

Die Wirksamkeit des Rainfarrns scheint vorzüglich in dem ätherischen Oele und im Bitterstoffe zu liegen, und dieser letztere scheint besonders wurmwidrige Kräfte zu haben, weil die Saamen, welche gegen die Würmer am kräftigsten wirken, vorzüglich viel Bitterstoff und wenig ätherisches Oel enthalten.

Der Rainfarrn wird im Aufgusse oder auch in Pulverform, als Latwerge verordnet. Ein Extract, so wie ein **Oleum Tanaceti infusum**, würden nicht unwirksame Zubereitungen seyn.

Das ätherische Oel soll, nach Geoffroy d. J., wenn die Pflanze auf feuchtem Boden wuchs, grün, von Pflanzen auf trocknem Boden gelb seyn. Frommherz fand es in einem mäßig trocknen Sommer immer gelb. Es besitzt den Geruch der Blüthen, und einen bittern, scharfen und brennenden Geschmack. Frisch entwickelte Blüthen scheinen die größte Menge des ätheri-

schen Oels zu geben. Es wird mit fetten Oelen vermischt zu Einreibungen angewandt.

Taraxacum. Das Kraut. Löwenzahnkraut.

Leontodon Taraxacum Linn. Eine ausdauernde auf den Weiden Deutschlands sehr häufige Pflanze.

Ein bitterliches, frisch milchendes Kraut, mit schrotsägeförmigen, fein gezähnten, fast kahlen Blättern. Es werde im Frühlinge vor der Blüthe eingesammelt.

Taraxacum. Die Wurzel. Löwenzahnwurzel.

Eine walzenförmige, etwas ästige, mit Wurzelzasern besetzte Wurzel, mit fast schwarzer Oberhaut, weißer schwammiger Rinde, dürrem weißlichem Holze, eintretendem gelblichem Marke, frisch milchend, von süßlich-bitterlichem Geschmacke, gemeiniglich der Länge nach zerschnitten. Im ersten Frühlinge mit dem jüngern Kraute einzusammeln.

Leontodon Taraxacum Linn. Der gemeine Löwenzahn.
Linn. Cl. XIX. Syngenesia. Ord. 1. Polygamia aequalis.
Juss. Cl. X. Ord. 1. Cichoraceae.

Der gemeine Löwenzahn wächst sehr häufig durch ganz Deutschland und in andern Ländern des nördlichen Europas, in Asien und Amerika, auf Wiesen, Weiden, Triften, Gärten und Feldern.

Die Wurzel ist spindelförmig, 1—2 Spannen lang, fingersdick, zuweilen ästig, befasert. Die Blätter sind lang, meistens auf der Erde liegend, von hellgrüner Farbe. Die großen gelben Blüthen stehen einzeln auf einem runden, röhrigen, glatten, selten 1 Fuß hohen Schafte. Der gemeinschaftliche Kelch ist doppelblättrig, länglich und schuppig; die äußeren Kelchschuppen sind zurückgeschlagen, die inneren aufrecht. Der Blüthenboden ist schwach gewölbt und mit kleinen oberflächlichen Höhlen versehen; auf den Früchten steht eine gestielte Saamenkrone. Zur Zeit der vollkommenen Reife, besonders bei trockenem Wetter, wird der Blüthenboden vollkommen kugelig, die Früchte breiten sich aus, die Saamenkronen erweitern sich, und bilden eine Art leichter Kugel, deren Theile sehr bald durch den Wind zerstreut werden.

Die Pflanze blüht vom März bis Mai, und zuweilen im Herbste zum zweiten Male.

Die ganze Pflanze ist, besonders im Frühlinge, von einem Milchsafte durchdrungen, der frisch eine dickliche Consistenz hat, von Milchfarbe ist, dem Milchrahm vollkommen ähnlich, von einem anfangs etwas süßlichen, dann salzig-bittern Geschmacke. Er findet sich im Stengel in eigenen Gefäßen, aus denen er beim Durchschneiden desselben sogleich hervorquillt, auch in den

Blattstielen und der Hauptrippe, aber nicht in der Substanz der Blätter. Bei der aus lauter concentrischen Lagen bestehenden Wurzel dringt der Milchsaft, beim Durchschneiden derselben, zwischen den Häuten hervor, die aber selbst nicht milchig sind, eben so wenig, wie der holzige Centraltheil der Wurzel. Wird dieser Milchsaft etwas dick auf Papier gestrichen, so hinterläßt er einen röthlichen Fleck. In Gefäßen aufgesammelt, nimmt er (durch Oxydation) eine braunrothe Farbe an, wird dick, überzieht sich mit einer braunen Haut, geht endlich in eine trockne, brüchige, einem Gummiharze ähnliche Masse über mit brauner Oberfläche, und weiß auf dem Bruche, die ohne Geruch und von etwas zusammenziehendem Geschmacke ist. Durch anhaltendes Zusammenreiben mit Wasser wird die Milch größtentheils aufgelöst; die Auflösung ist erst milchig und grau, wird mit der Zeit allmälig roth, trübe und setzt einen Bodensatz ab. In Weingeist löst sich ein geringerer Theil von dem eingetrockneten Milchsafte auf, als im Wasser; die Auflösung ist trübe, milchig und wird nicht roth. Mit wenigem Wasser behandelt wird diese Masse zähe, weich, und hängt sich etwas an den Fingern an. An der Lichtflamme entzündet sich die trockene Masse und brennt mit lebhafter nicht rauchender Flamme; wird die Flamme während des Brennens ausgelöscht, so raucht die Masse und verbreitet den Geruch nach angezündetem Baumöl. Das damit gekochte Wasser nahm nach John's Versuchen (dessen chemische Schriften IV. S. 1.) eine bräunliche Farbe und bittern Geschmack an, röthete schwach das Lackmuspapier, und enthielt phosphors., salzs. und schwefels. Salze mit alkalischer und mit Kalkbasis. Die im Wasser nicht aufgelöste elastische Materie hatte eine beinahe weiße Farbe angenommen, färbte sich aber in wenigen Stunden braun. Alkohol nahm kaum eine Spur von Harz daraus auf. John hält den Rückstand für Kautschuck. Dieser Milchsaft enthielt demzufolge: bittern Extractivstoff, Gummi, Kautschuck, Salze, eine Spur von Harz und eine freie Säure.

Der Saft, welcher aus den im Frühlinge und Herbste ausgegrabenen Wurzeln ausgepreßt, und sorgfältig eingedickt wird, wird zähe, honigartig, hell von röthlicher Farbe, und von einem Geschmacke wie eingedicktes Malzdecoct. Der aus den im Sommer ausgegrabenen Wurzeln bereitete Saft wird trübe, braun, und bitter durchs Eindicken. Der reichliche Gehalt an süßem Extractivstoffe (Schleimzucker?) bewährt sich auch durch die weinige Gährung, in welche diese Wurzel mit Wasser zusammengerieben übergeht, welcher jedoch bald die saure und die faulige folgen. Auch der Standort ist von Einflusse; so besitzt die auf magern Triften gewachsene Pflanze weit mehr Salzgehalt und bittern Milchsaft, der sich bei der auf fettem Boden gewachsenen Pflanze zu einem mehr süßlichen und minder salzigen umwandelt. Es müssen demnach nicht die auf fetten Weiden ausgegrabenen Pflanzen zum Extract gesammelt werden, wenn sie gleich ein kräftigeres Ansehn haben.

Das Kraut verliert durchs Trocknen $\frac{7}{8\frac{1}{2}}$ Feuchtigkeit und giebt dann $\frac{1}{8}$ geistiges und $\frac{3}{16}$ wäßriges Extract; die Wurzel verliert durchs Trocknen $\frac{4}{5}$.

Der Löwenzahn wird häufig im ausgepreßten Safte, oder wenn dieser

zur Consistenz eines Honigs abgeraucht worden, als Mellago Taraxaci, wovon man ½ erhält, gebraucht, die getrocknete Wurzel wird in der Abkochung verordnet.

Tartarus crudus. Bitartras kalicus cum aqua crudus. Roher Weinstein.

Wird aus den Fässern, welche zur Aufbewahrung des Weins gedient haben, vorzüglich in Frankreich erhalten.

Ein dichtes, rindenartiges, krystallinisches, weißliches oder rothes, saures Salz, aus Kali und vorwaltender Weinsteinsäure, mit eingemischtem Farbestoffe und andern fremdartigen Theilen bestehend.

Tartarus. Die Krystalle. Bitrartras kalicus cum aqua. Weinsteinkrystalle.

Wird in chemischen Fabriken durch Reinigung des rohen Weinsteins im südlichen Europa bereitet.

Ein dichtes Salz, in harten, weißen, in 80—90 Theilen Wasser auflöslichen Krystallen, von saurem Geschmacke, aus Kali und vorwaltender Weinsteinsäure bestehend. Man sehe darauf, daß es nicht durch Kupfer verunreinigt sey, an der grünlichen Farbe kenntlich.

Der Weinstein findet sich in den Säften einiger Früchte, namentlich der Tamarinden und der Weintrauben. Aus den letztern wird er in großer Menge gewonnen, indem nach der Gährung des Mostes, und besonders während der stillen Gährung, welche in den auf Fässer gefüllten Weinen fortwährt, durch das hierbei zunehmende Verhältniß des Alkohols dem Weinstein das Wasser entzogen wird, dieser sich ausscheidet, und am Boden und an den Wänden der Gefäße als eine krystallinische Rinde sich ansetzt, die nach der Farbe des Weins roth oder graulichgelb ist. Dieser Weinstein ist von saurer weinsteinsaurer Kalkerde, Farbestoff, Hefen und andern beim Klären des Weins sich absetzenden Körpern verunreinigt. Nach einer Bemerkung von Prof. Walchner sitzen auf dem rohen Weinstein hin und wieder kleine Krystalle, die sich beim ersten Anblick durch ihre eigenthümliche Beschaffenheit von dem sauren weinsteinsauren Kali unterscheiden. Sie sind farblos oder graulichweiß, glasglänzend, durchscheinend, weicher als Kalkspath, haben eine Größe von 2—5 Linien, und sind nach der damit vorgenommenen Untersuchung wasserhaltiger neutraler weinsteins. Kalk. Hat die Weinsteinrinde eine gewisse Dicke erlangt, so wird sie (gewöhnlich von den Bindern bei dem Repariren der Fässer) von den Dauben des zerlegten Fasses losge-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0875-8

schlagen und kommt in Gestalt einer ziemlich harten und schweren Rinde, die aus festen, an der einen Seite zu einer dichten Masse zusammengewachsenen, an der andern Seite von einander getrennten und ausgebildeten prismatischen Krystallen besteht, als roher Weinstein in den Handel. Nicht alle Weine geben eine gleiche Menge Weinstein; die ungarischen Weine z. B. setzen nur eine ganz dünne Schicht ab, die französischen schon mehr, die Rheinweine aber geben den meisten und reinsten Weinstein.

Der rohe Weinstein kommt bisweilen mit Sand, Thon und dergl. verfälscht vor, welches leicht dadurch entdeckt wird, daß man ihn in einer warmen kalischen Lauge auflöst, wobei diese Stoffe unaufgelöst bleiben, er verbrennt auf Kohlen unter Verbreitung eines eigenthümlichen säuerlichen Geruches, mit Hinterlassung einer kalihaltigen Kohle.

Die Weinsteinkrystalle werden im Großen, in Frankreich vorzüglich zu Montpellier und in Deutschland am Rhein, aus dem rohen Weinstein bereitet. In einem kupfernen verzinnten Kessel werden 18—20 Eimer Wasser siedend gemacht, dann 75—90 Pfund fein gepulverter roher Weinstein eingetragen, und eine halbe Stunde hindurch gesotten, dann wird die siedend heiße Flüssigkeit in einen Bottich filtrirt, und 24—30 Stunden hindurch dem ruhigen Erkalten überlassen. Am Boden des Bottichs finden sich unreinere, an den Wänden aber reinere Weinsteinkrystalle. Beide werden nach abgegossener Mutterlauge abgesondert in reinem siedenden Wasser aufgelöst, einige Zeit hindurch im Sieden erhalten (damit der Extractivstoff durch höhere Oxydation unauflöslich werde), und das beschriebene Verfahren noch einmal wiederholt. Ist der nun krystallisirte Weinstein noch nicht weiß, so löst man ihn wieder in Wasser auf, setzt aber jetzt ein Pfund eines weißen, magern Thones zu, welcher durch seinen Kalkgehalt den sauren weinsteins. Kalk neutralisirt, und dadurch in Wasser unauflöslich macht, durch seinen Alaunerdegehalt aber die färbenden Theile anzieht und sie auf dem Filtrum zurückhält. Die weißen Weinsteinkrystalle werden noch schöner, wenn sie auf Leinwand ausgebreitet einige Tage hindurch dem directen Sonnenlichte und der freien Luft ausgesetzt werden. Doch enthält der auch noch so sorgfältig raffinirte Weinstein immer noch weinsteins. Kalk, nach Vauquelin 5—7 Procent, Bucholz fand 14,3 Procent, welcher sich auch bei der Sättigung des Salzes mit Kali nicht ausscheidet. Ehemals hielt man denjenigen Weinstein, der sich während des Raffinirens auf der Oberfläche der Lauge als ein Häutchen abscheidet, für besonders rein, und nannte ihn Weinsteinrahm, **Cremor Tartari**, welcher aus sehr feinen pulverförmigen Krystallen bestand.

Die im Handel vorkommenden **Crystalli Tartari** bestehen aus kleinen, weißen, halbdurchsichtigen, vierseitig prismatischen, schief abgeschnittenen, theils einzelnen, theils an einander hängenden Krystallen, von kühlendem säuerlichem Geschmacke. Sie sind in Wasser schwer löslich, und erfodern 95 Th. kaltes und 15 Th. kochendes Wasser; in Alkohol sind sie unauflöslich. Die wäßrige Auflösung schimmelt mit der Zeit, es erzeugt sich Schleim, Kohlensäure und eine blartige Substanz, welche erstern färbt. Im Glühfeuer verbrennt der Wein-

stein mit stark rußendem Rauche und Flamme, unter Verbreitung eines brenzligen säuerlichen Geruchs, und hinterläßt ein kohliges, schwammiges Kali, das sich schwer weiß brennen läßt und ausgelaugt das reinste kohlens. Kali giebt. Bei der trocknen Destillation giebt er Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, brenzliges Oel, Wasser, brenzlige Weinsteinsäure, und im Rückstande kohlens. Kali und Kohle. 2 Th. Weinstein mit 1 Th. Salpeter verpufft geben den sogenannten schwarzen, gleiche Theile den weißen Fluß. (Vgl. Tartarus depuratus im 2ten Theile.)

Terebinthina cocta. Gekochter Terpenthin.

Der Rückstand von der Destillation des Terpenthinöls.

Ein zerreibliches, gelbliches, beim Reiben weißes, gemeiniglich gedrehtes Harz von schwachem Geruche.

Terebinthina communis. Gemeiner Terpenthin.

Ein aus dem verwundeten Stamme der Pinus sylvestris Linn. tröpfelnder Saft.

Ein etwas flüssiger, zäher, schmutziggelblich trüber natürlicher Balsam, von eigenthümlichem Geruche, bitterm und scharfem Geschmacke.

Terebinthina laricina seu Veneta. Venetischer Terpenthin.

Ein aus dem Pinus Larix Linn., einem europäischen Baume, tröpfelnder Saft.

Ein dicklicher, zäher, durchsichtiger, gelblicher natürlicher Balsam, von unangenehmen Geruche, von bitterm und scharfem Geschmacke.

Terebinthina. Das Oel. Terpenthinöl.

Ein Destillat aus dem gemeinen und dem venetischen Terpenthin.

Ein weißes ätherisches Oel von unangenehmen Geruche. Spec. Gew. = 0,810. Man sehe sich vor, daß es nicht mit dem aus dem Holze und den Zapfen destillirten Oele von schlechterem Geruche verfälscht sey.

Die verschiedenen Fichtenarten (Linn. Cl. XXI. Monoecia. Ord. 2. Monadelphia. Juss. Cl. XV. Ord. 5. Coniferae) geben die verschiedenen Sorten Terpenthin. Die gemeine Fichte (Pinus sylvestris Linn.), die Tanne (Pinus Abies Linn., Abies excelsa DC.) welche bei uns ganze Wälder bilden, lassen aus den bis ins Holz eingehauenen Löchern einen bal-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0877-0

samischen Saft von der Consistenz des rohen Honigs ausfließen, welcher in untergesetzte Gefäße eingesammelt wird, und den gemeinen Terpenthin giebt. Eine feinere Sorte ist der sogenannte Strasburger Terpenthin (Terebinthina Argentoratensis), der aus der Weißtanne (Pinus picea Linn.), einem auf Alpen und Bergen fast in ganz Europa wachsenden Baume erhalten wird; er ist durchsichtig, weißgelb, ziemlich dünnflüssig, von einem angenehmen, frisch etwas citronenartigen Geruche, und einem hervorstechenden bittern Geschmacke, im Alter wird er dunkler und dickflüssiger. Der französische Terpenthin von der Strandfichte (Pinus maritima), die an den Küsten des südlichen Europas und besonders in den mittägigen Provinzen Frankreichs im Ueberflusse wächst, ist blaßgelb, durchsichtig, von angenehmen Geruche u.s.w.

Der venetische Terpenthin kommt von der auf hohen Bergen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und andern Ländern einheimischen Lerchenfichte (Pinus Larix Linn.). Dieser Terpenthin ist sehr klar und durchsichtig, zähe, weißlich oder blaßgelb, von erhitzendem bitterlich-beißendem Geschmacke, und starkem etwas citronenartigem, balsamischem Geruche. Er ist weit dünnflüssiger und nicht so scharf, als der gemeine Terpenthin; mit der Zeit wird er dicker und fast harzartig.

Die feinste Terpenthinsorte ist der canadische Terpenthin, canadischer Balsam (Terebinthina canadensis, Balsamum canadense), von der Balsamtanne (Pinus s. Abies balsamea) und der Halmlockstanne oder Schierlingstanne (Abies canadensis), zweien in Canada und Virginien wachsenden Bäumen. Er ist zähe und dickflüssig, so daß er sich in Fäden ziehen läßt, leicht erhärtend, durchsichtig, röthlichgelb, von angenehmen gewürzhaftem Geruche und balsamisch-bitterlichem Geschmacke.

Der gemeine Terpenthin zertheilt sich, wenn er mit Weingeist zusammengeschüttelt wird, in lauter runde Körner, und löst sich dann bald auf. Wird diese geistige Lösung mit Wasser vermischt, so entsteht eine concentrirte Milch, und es sondern sich dabei schnell kleine öhlähnliche Tropfen auf der Oberfläche ab, welche den reinen Balsam von allem Harze gesondert darstellen. Das Harz schlägt sich allmälig aus der milchigen Flüssigkeit mit weißer Farbe nieder, und läßt diese klar zurück. Der auf der Oberfläche schwimmende rein balsamische Theil wird an der Luft in wenigen Tagen harzartig hart.

Der venetische Terpenthin löst sich in Alkohol völlig klar auf, ohne sich vorher, wie der gemeine Terpenthin, zu zertheilen, und wenn man zu dieser Auflösung 4 Theile Wasser gießt, so erhält man durch Umschütteln eine dickliche, gleichförmige Mischung, die auf der Oberfläche Oel absetzt, und mehr nach Weingeist als nach Terpenthin riecht. Löst sich ein sehr dickflüssiger, nicht völlig durchsichtiger Terpenthin nur mit Trübung in Weingeist auf, so ist er weniger rein, oder wohl auch nur ein künstliches Gemisch aus gemeinem Terpenthin, Baumöl und Geigenharz.

Der canadische Terpenthin enthält nach einer Analyse von Bonastre (Geiger's Magazin 1826. April. S. 67.) in 100 Th.: flüssiges ätheri-

sches Oel 18,6; lösliches Harz 40,0; Unterharz 33,4; faseriges (kautschuckartiges) Unterharz 4; Essigsäure, Spuren; bitteres Extract und Salze 4.

Scopoli erhielt durch trockne Destillation aus dem Terpenthin eine saure Flüssigkeit, welche außer der Essigsäure auch eine eigenthümliche Säure enthielt, die in vielen Eigenschaften der Bernsteinsäure ähnlich war, was auch Sangiorgio (Buchn. Repert. XV. S. 102.) fand. (Vergl. S. 12). Schon Buchner (Repert. IX. S. 276.) hatte eine krystallinisch-prismatische Concretion gefunden, die sich im Wasser, über welchem rectificirtes Terpenthinöl aufbewahrt war, abgesetzt hatte, und von salziger Natur, aus einer flüchtigen Säure (vielleicht Bernsteinsäure) und einer Base zu bestehen schien, welche Vermuthung sich aber durch spätere Versuche (Repert. XXII. S. 419.) nicht bestätigt hat.

Werden die Terpenthine mit Wasser destillirt, so geht ein ätherisches Oel, ungefähr der vierte Theil an Gewicht, über, welches, von dem gemeinen Terpenthin gewonnen, auch wohl Kienöl (Oleum Pini), von den feineren Terpenthinen gewonnen, Terpenthinöl (Oleum Terebinthinae) genannt wird. Der Rückstand ist ein geruch- und geschmackloses Harz, der gekochte Terpenthin. Das Terpenthinöl ist ein wasserhelles, sehr dünnflüssiges Oel, von durchdringend widerlichem Geruche, und brennend scharfem, terpenthinartigem Geschmacke. Es wird an der Luft nach und nach gelblich und dickflüssig. Nach Saussure besteht es aus 87,788 Kohlenstoff und 11,646 Wasserstoff (enthält hiernach keinen Sauerstoff).

Mit dem salzsauren Gase bildet es eine eigenthümliche Verbindung, welche man künstlichen Campher genannt hat. Man leitet salzs. Gas langsam in Terpenthinöl, welches mit einer kaltmachenden Mischung, Eis oder Schnee umgeben ist, so lange noch Gas absorbirt wird. Es erzeugt sich eine flüssige und eine feste Verbindung, welche letztere durch Abpressen zwischen Fließpapier erhalten wird. Man sublimirt nun den künstlichen Campher für sich oder mit Zusatz von Kreide; oder löst ihn in Alkohol auf und läßt ihn krystallisiren. Er bildet dann eine feste, weiße, durchscheinende, körnig-krystallinische, oder in Nadeln krystallisirte Masse, die leicht schmelzbar und flüchtig ist. Nach H. Labillardiere besteht er aus 82,5 Kohlenstoff; 10,4 Wasserstoff und 15,2 Salzsäure. Beim Hindurchleiten durch eine glühende Röhre, und beim Verbrennen entwickelt er Salzsäure. Durch wiederholte Sublimation, so wie durch Einwirkung ätzender Alkalien wird er nur schwierig zerlegt.

Ueber eine besondere feste Materie, die sich in Terpenthinöl, welches lange der Luft ausgesetzt gewesen war, gebildet hatte, auch Terpenthincampher genannt (die sich aber den Harzen zu nähern scheint) sehe man Trommsdorff's N. J. XIII. 1. S. 223. u. Buchner's Repert. XXII. S. 418. Auch in Geiger's Magazin 1826. October. S. 63. geschieht einer ähnlichen krystallinischen Substanz Erwähnung, deren Bildung in einem Falle auch sogar mit Ausschluß der atmosphärischen Luft, wie es schien, erfolgt war, und die Geiger für eine einfache flüchtige (also nicht salzartige) organische Substanz erklärt, deren etwa sich zeigende saure Reaction von anhängender Essigsäure

herzurühren scheine. — Solche krystallinische Substanzen werden nicht selten durch Aufnahme von Sauerstoff in den ätherischen Oelen gebildet, welche ihnen auch den Geruch ertheilen.

Das sogenannte Krummholzöl (Oleum templinum) ist das aus den Aesten der Krummholzfichte (Pinus Pumilio Waldst. et Kit.), ihres sehr krumm gebogenen Stammes und der Aeste wegen so genannt, und der Bergfichte (Pinus Mughus Jacq.), beide in Ungarn, Tyrol und der Schweiz zu Hause, durch Destillation gewonnene ätherische Oel, welches dem Terpenthinöle nahe kommt. Von diesen Bäumen erhält man auch den ungarischen Balsam.

Der Terpenthin macht einen häufigen Bestandtheil der Salben und Pflaster aus. Der gekochte Terpenthin wird auch wohl innerlich gebraucht, eben so der venetische, mit Eidotter und Mimosenschleim zur Emulsion gemacht; der Urin nimmt davon einen Veilchengeruch an. Das Terpenthinöl findet größtentheils nur äußerliche Anwendung; soll es innerlich gebraucht werden, so muß es hierzu gereinigt werden. (Siehe Oleum Terebinthinae rectificatum im 2ten Theile.)

* Thea. Die Blätter. Thee.

Thea sinensis Rich. (DC.) Chinesischer Thee.

Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 1. Monogynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 9. Aurantiaceae.

Der Thee wurde zuerst im Jahre 1666 durch die Holländer, als die einzige europäische Nation, welcher die Häfen von China und Japan offen standen, in Europa eingeführt, obgleich der Gebrauch des Thees in China sich ins höchste Alterthum zu verlieren scheint. Der Gebrauch desselben ist jetzt so allgemein verbreitet, daß über 30,000,000 Thaler für dieses Kraut an China gezahlt werden.

Linné gab an, daß die verschiedenen Theesorten von zwei Pflanzen, nämlich von Thea Bohea und Th. viridis gesammelt werden und Hayne fügte die von Aiton als Varietät aufgeführte Thea stricta noch als eigene Art hinzu, so daß diese drei Pflanzen als die Mutterpflanzen der verschiedenen Theesorten von Hayne beschrieben werden. Decandolle, Richard u. A. behaupten jedoch, daß diese Arten nur als Abarten einer Pflanze anzusehen seyen, und daß die verschiedene Beschaffenheit der Theesorten von der Zeit des Einsammelns und von der verschiedenen Behandlung allein abhängig sey.

Der Theestrauch ist in China, Japan und in den benachbarten Ländern einheimisch, er wird aber auch vielfach angebaut. In Japan säet man ihn zwischen den Aeckern auf die Raine, in China aber auf besondere Plätze mitten im Felde. Sich selbst überlassen erreicht er eine Höhe von 25—30 Fuß; angebaut aber wird er selten über 5—6 Fuß, bei uns 2½—3 Fuß hoch. Er trägt abwechselnde, kurzgestielte, völlig glatte, eirunde, längliche, am Ende etwas zugespitzte, ungefähr 2—3 Zoll lange und zollbreite Blätter,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0880-5

welche steif und lederartig, am Rande sägeartig gezähnt, etwas glänzend und dunkelgrün sind. Die der jungen Triebe erscheinen zart und schwach behaart. Die weißen gehäuften Blüthen stehen auf glatten, nach dem Ende zu verdickten, 4—5 Linien langen Stielen zu 3—4 in den Blattachseln. Der Kelch ist sehr kurz, mit fünf eiförmig-zugerundeten, stumpfen Abschnitten. Die Krone ist weit größer als der Kelch, und aus 5, 6 oder einer größern Anzahl etwas ungleicher, rundlicher Blättchen zusammengesetzt. Die äußerst zahlreichen Staubfäden, ungefähr 100, sind etwas kürzer als die Krone. Die Frucht ist eine dreihäusige Kapsel; jedes der Gehäuse enthält einen, seltener zwei Saamen. Dieser Strauch ist erst zum Einsammeln brauchbar, wenn derselbe 3 Jahre alt ist; hat er 7 oder höchstens 10 Jahre erreicht, so haut man den Stamm ab, damit er neue Sprößlinge treibe, die alsdann sehr reiche Lesen geben. Bei dem Einsammeln werden die Blätter einzeln abgepflückt. Den besten Thee geben diejenigen, welche man im Ausgange des Februars oder spätestens im Anfange des Mais sammelt, wo sie noch zart und noch nicht gänzlich entwickelt sind. Einen Monat später findet die zweite Sammlung statt, wobei man ohne Unterschied vollkommen ausgebreitete und auch noch nicht entwickelte Blätter nimmt, sie nachher aber nach ihrer verschiedenen Güte sondert. Noch einen Monat später schreitet man zur dritten und letzten Sammlung, welche die ergiebigste ist, aber auch nur einen Thee von minderer Güte giebt, der jedoch auch in dieser Hinsicht in mehrere Sorten zerfällt. Die Zubereitung ist folgende: man taucht die Blätter in kochendes Wasser, und läßt sie nur eine halbe Minute lang darin. Hierauf nimmt man sie heraus, läßt sie abtropfen, und wirft sie auf große, flache, eiserne Pfannen, welche über einem Ofen stehen. Diese Pfannen müssen so heiß seyn, daß die Hand des Arbeiters die Hitze kaum erträgt. Die Blätter müssen darin unaufhörlich umgerührt werden. Glaubt man, daß sie genug erhitzt sind, so nimmt man sie hinweg, und breitet sie auf großen mit Matten bedeckten Tischen aus. Einige Arbeiter beschäftigen sich, sie mit der flachen Hand zu rollen, indem ein andrer sie abzukühlen sucht, und mit großen Fächern Luft hinzuwedelt. Dieses Verfahren muß so lange fortgesetzt werden, bis die Blätter unter der Hand dessen, der sie rollt, vollkommen abgekühlt sind.

Dieser erste Proceß dient dazu, die Blätter zu reinigen und ihnen den scharfen und widrigen Saft, den sie enthalten, zu nehmen. Diese Art von Röstung auf Eisenplatten muß 2—3mal wiederholt werden, indem man Sorge trägt, sie immer weniger und weniger zu erhitzen, und die Blätter immer sorgfältiger zu rollen. Bei einigen sehr geschätzten Theesorten muß jedes Blatt einzeln gerollt werden.

Ist der Thee auf diese Weise vorbereitet und vollkommen ausgetrocknet, so wird er, bevor man ihn in Schachteln oder Kisten verschließt, mit verschiedenen Pflanzen wohlriechend gemacht. Die Kenntniß dieser Gewächse ist für die Europäer ein Geheimniß gewesen, jetzt weiß man aber, daß die Chinesen zu diesem Zwecke die Blüthen der Olea fragrans, der Camellia Sasangua Thunb., vielleicht auch der seit einigen Jahren in unsern Gärten

eingeführten Theerose benutzen Zum Auslegen der Theekisten brauchen die Chinesen die Blätter einer Pflanze, die man bald einer Scitaminea, bald einer Palme zugeschrieben hat. Lambert glaubt, daß sie von einer unbeschriebenen Art von Pharus abstammen, die er P. officinalis nennt, aber freilich nie mit Blüthen sah.

Man theilt die Theesorten in zwei Classen ein, in die grünen und schwarzen Theesorten. Die ersteren sind von grünlicher oder grauer Farbe, schärfer und gewürzhafter, als die andern, deren Farbe mehr oder weniger braun ist, welche einen dunkel gefärbten Aufguß geben, und überhaupt milder sind. Nach Dr. Dön soll der gewöhnliche schwarze Thee besonders aus den alten Blättern der Thea viridis bestehen, mit Blättern der Camellia Sasangua oder oleifera oder der Olea fragrans vermischt.

Unter den grünen Theesorten werden unterschieden: 1) der Kaiserthee oder Blumenthee; die Blätter der ersten Sammlung, welche nicht gerollt sind, eine hellgrüne Farbe und einen angenehmen Geruch besitzen. 2) Der Haysan- oder Hyssanthee, der seinen Namen von einem indischen Kaufmanne hat, durch den er nach Europa kam, dessen Blätter klein und stark gerollt sind, und eine grüne ins Blaue fallende Farbe haben; der Geruch ist angenehm, der Geschmack zusammenziehend. Es ist eine der besten Sorten und in Deutschland sehr gewöhnlich. Wenn man ihn mit Wasser übergießt, so rollen sich die Blätter auf, werden 1—2 Zoll lang, 6—9 Linien breit, und nehmen eine grünere Farbe an. Der Aufguß selbst ist gelb, durchsichtig, schmeckt bitterlich, röthet die Lackmustinctur, schlägt weder den salpetersauren Baryt noch das kleesaure Ammoniak nieder (enthält also weder Schwefelsäure noch Kalk in den Salzen), bildet mit dem salpeters. Silber einen schwarzen, oder einen weißen Niederschlag, der durch die Reduction des Silbers schwarz wird, und reducirt auf gleiche Weise die Gold- und basisch salpeters. Queckſilberauflösung, welches die Gegenwart eines sehr oxydirbaren Stoffes in dieser Theesorte nachweiset. 3) Der Schuhlang- oder Tehulan-Thee; er ist selten im Handel und dem Haysanthee ganz ähnlich, hat aber einen weit lieblichern Geruch, welcher sich auch dem Aufgusse mittheilt. 4) Der Perlenthee unterscheidet sich von dem Haysanthee durch seine feste, gewissermaßen zugerundete Form, und durch seine braune und doch dabei graulichе Farbe; auch ist sein Geruch angenehmer. Wenn man ihn mit heißem Wasser übergießt, so saugt er dieses ein, und rollt sich schwerer auf. Man bemerkt dann, daß seine runde Gestalt daher rührt, daß die ganzen Theeblätter zuerst von der Seite und dann noch einmal nach der Länge zusammengerollt sind; die aufgerollten Blätter sind denen des Haysanthees ganz ähnlich, nur etwas kleiner. Dieser Thee behält seinen Wohlgeruch und seine übrigen Eigenschaften länger bei. 5) Der Schießpulverthee scheint noch feiner zusammengerollt zu seyn, als der Perlenthee; doch kommt er von größeren dem Haysanthee ähnlichen Blättern her, welche aber vor dem Zusammenrollen drei- oder viermal quer durchschnitten worden sind. Der Aufguß kommt dem des Perlenthees ganz gleich.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0882-7

Zu den Sorten des schwarzen Thees, Thee-Bou, gehören: 1) der Souchong-, Sochout-, Saoutchon-, Souchon- oder Karavanen-Thee. Er kommt durch Rußland, ist schwärzlichbraun, von schwächerem Geruche und Geschmacke, als der grüne Thee überhaupt. Er besteht aus jungen, schwach der Länge nach gerollten Blättern. Der Aufguß ist stärker gefärbt und weniger scharf; er röthet die Lackmustinctur, schlägt den salpeters. Baryt nicht nieder, reducirt die Goldauflösung, giebt mit dem salpeters. Blei einen schmutzig-gelben Niederschlag, und fällt das salpeters. Silber und Quecksilber, ohne sie zu reduciren, was für die fast gänzliche Abwesenheit des in den vorigen Sorten enthaltenen oxydirbaren Stoffes zeugt. 2) Der Pekao- oder Pekothee weicht wenig von dem vorigen ab; Farbe und Geschmack sind gleich, der Geruch ist angenehmer. Er scheint aus jüngeren, stärker behaarten Blättern zu bestehen. Man findet in ihm, so wie in dem vorigen, bisweilen Stückchen von jungen Aesten. 3) Der Congo-Thee, der einen stark gefärbten Aufguß giebt u. s. w. Die braune Farbe und die Abwesenheit des oxydirbaren Stoffes in diesen Theesorten, wodurch sie sich von den vorigen unterscheiden, kann nach Guibourt von einer Ortverschiedenheit der Mutterpflanze herrühren, vielleicht entstehen sie aber auch durch eine Art von Gährung, in welche man die eingesammelten Blätter vor dem Trocknen übergehen läßt; denn eine solche Behandlungsweise würde wirklich die braune Farbe der Blätter und die Veränderung des oxydirbaren Stoffes zur Folge haben. Was diese Meinung unterstütze, sey die Erfahrung, daß der Thee-Bou nicht immer ganz die Eigenschaft verloren habe, die Silber- und Quecksilberauflösungen zu reduciren.

Von den mannigfaltigen Gewächsen, welche an verschiedenen Orten der Erde statt des eigentlichen Thees gebraucht werden, hat Dr. Dön (Dingler's polytechnisches Journal XVIII. 4. S. 488. Froriep's Notizen XII. 6. Nr. 248.) eine Uebersicht gegeben. Der berühmteste Thee in Südamerika ist der Paraguay-Thee, von welchem jährlich große Quantitäten nach Perú, Chili und Buenos-Ayres eingeführt werden, und den man in allen Häusern findet. Der Handel damit ist so wichtig, daß der Regent von Paraguay, Dr. Francia, der Verwendung mehrerer Regierungen ungeachtet, den berühmten Reisegefährten Humboldt's und Botaniker Bonpland nur deshalb widerrechtlich in seinen Staaten gefangen hält, weil dieser mit dem Anbaue und der Behandlungsart der Pflanze, welche diesen Thee liefert, bekannt ist. Diese Pflanze ist **Ilex paraguariensis St. Hilaire (Cassine Gongonha Martius)**. Der Theeaufguß soll eine berauschende und zum Kriege begeisternde Wirkung besitzen, in größern Gaben aber Erbrechen und Lariren hervorbringen. In Mexiko und Guatimala bedient man sich der Blätter der **Psoralea glandulosa**; in Neu-Granada der **Alstonia theaeformis Mut. (Symplocos Alstonia Humb. et Bonpl.)**, welche einen dem chinesischen gleichzusetzenden Thee giebt. In Nordamerika sind **Gaultheria procumbens L., Ceanothus americanus L.** und **Ledum latifolium L.**, Thee von Labrador, von New-Jersey und St. James-Thee, gebräuchlich. In Neu-Holland ge-

ben die Blätter der Correa alba L. und die des Leptospermum Thea L., in Neu-Seeland Smilax glycyphylla und Ripogonum scandens gute theeartige Getränke u. s. w.

Der chinesische Thee enthält nach Frank's Untersuchung in zwei Unzen: Gerbestoff 5 Drachmen, 32 Gran; Schleim 37 Gr.; Kleber 55 Gr.; Faserstoff 8 Dr. 12 Gr. Dudry (Froriep's Notizen XVII. 5. 1827 April S. 70.) hat Theïne ausgeschieden, indem Souchong-Thee mit einer Auflösung von Seesalz digerirt, und die abfiltrirte Flüssigkeit zur Trockne verdunstet; der Rückstand mit Alkohol von 40 ° behandelt und dieser hierauf zur Consistenz eines sehr dicken Syrups verdunstet wurde. Dieser Auszug wurde sodann mit kochendem destillirtem Wasser behandelt und ganz warm filtrirt. Beim Kaltwerden trübte sich die Flüssigkeit sehr merklich, und nach 24 Stunden hatte sich ein rothbraunes aromatisches Harz von geringer Bitterkeit niedergeschlagen. Nachdem die Flüssigkeit abermals filtrirt worden war, setzte man gebrannte Talkerde im Ueberschusse hinzu, und ließ die Mischung einige Augenblicke ins Kochen kommen. Ein abermaliges Filtriren schied den Talkniederschlag von der wäßrigen Auflösung, und beide Portionen wurden besonders untersucht. Mit Alkohol schied man den mit der Talkerde niedergefallenen Antheil der Theïne, und erhielt durch freiwillige Verdunstung nadelförmige Krystalle, die eine schwammförmige Anordnung hatten. Bruchstücke davon hatten das Ansehn der Federfahnen. Die wäßrige Flüssigkeit war gelb gefärbt, und ließ bei der Verdunstung sehr schöne vollkommen prismatische Krystalle fallen, die man mit den anders gestalteten, die sich im Alkohol gebildet hatten, für identisch erkannte. Man schrieb diese verschiedene Krystallisation der Flüssigkeit zu, in welcher die Theïne aufgelöst war.

Die Theïne ist auflöslich in 35—40 Th. Wasser von 10 °; sie krystallisirt in demselben immer in Gestalt von Prismen, während sie in Gestalt eines Sterns, eines Schwamms, oder einer Federfahne in Alkohol krystallisirt, in welchem sie in jeder Quantität auflöslich ist. Sie kann Salze bilden, aber ihre Fähigkeit, die Säuren zu sättigen, ist nicht sehr merklich. In wäßrigen und alkoholischen Auflösungen giebt sie dem selbst durch schwache Säuren gerötheten Lackmuspapier seine blaue Farbe nicht wieder, und verräth nur sehr zweifelhafte Spuren von Alkalicität. Mit dem 16. Theil ihres Gewichtes Schwefelsäure verbunden giebt sie ein Salz, welches in Gestalt kleiner einzelner Nadeln von amianthartigem Aussehen krystallisirt. Auf glühende Kohlen gebracht, schmolz die Theïne anfänglich, und ließ alsdann eine nicht sehr voluminöse Kohle zurück, welche, wiewohl schwierig, gänzlich eingeäschert wurde.

Diese Substanz ist weit auflöslicher in Wasser, als die andern bis jetzt bekannten salzfähigen Grundlagen, und wird durch die Behandlung mit Talkerde daher nur zum Theil niedergeschlagen.

Die Säure, mit welcher die Theïne ohne Zweifel im Thee verbunden ist, hat man noch nicht untersucht.

Wesentliches Oel wurde nicht gefunden. Der Verf. hat sich vorgenom-

men, noch fernerweit zu untersuchen, ob der Thee seine ökonomischen und medicinischen Eigenschaften dem Harze oder der Theïne verdankt.

Eine Bestätigung dieser unvollständigen Versuche ist bis jetzt noch nicht erfolgt.

Der Thee ist als erwärmendes Getränk in allgemeinem Gebrauche, und wird vorzüglich von den Engländern, Holländern, Dänen, Schweden, Russen und Nordamerikanern häufig getrunken. In den von diesen Völkern bewohnten Ländern, welche den größten Theil des Jahres mit Nebel bedeckt sind, wo die Atmosphäre kalt und feucht ist, unterhält der Thee durch seinen leichten Reiz, und vorzüglich durch die Menge des dabei in den Magen gebrachten warmen Wassers den Körper in einer Ausdünstung, die unter jenen Umständen zur Erhaltung des normalen Gesundheitszustandes sehr zweckmäßig ist.

Thymus. Das Kraut. Thymiankraut.

Thymus vulgaris. Ein in Gärten gezogener, im südlichen Europa wild wachsender kleiner Strauch.

Das blühende gewürzhafte Kraut, mit aufrechtem, ästigem Stengel, gegenüberstehenden, länglichen, eiförmigen, am Rande umgerollten, punktirten, oberhalb feinborstigen, unterhalb weißlichen Blättern mit quirlförmig-ährenförmigen, weißen oder weißpurpurfarbenen Blumen. Im Monat Juni und Juli einzusammeln.

Thymus. Das Oel. Thymianöl.

Wird durch Destillation aus dem blühenden Kraute von Thymus vulgaris erhalten.

Ein ätherisches, röthliches, durchdringend riechendes Oel. Spec. Gew. = 0,902.

Thymus vulgaris Linn. Gemeiner Thymian.
Linn. Cl. XIV. Didynamia. Ord. 13. Gymnospermia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 6. Labiatae.

Ein kleiner, dickästiger Strauch von 6—8 Zoll Höhe, dessen sämmtliche Theile mit einem grauen, fast aschfarbigen Staube bedeckt sind; nur die jüngern Aeste sind krautartig, röthlich oder grünlich, und mit sehr kurzen, dem bloßen Auge kaum sichtbaren Haaren bedeckt. Die Blätter sind sehr kurzgestielt, klein, ohngefähr 2—3 Linien lang, und halb so breit. Die Blüthen sind blaßröthlich.

Die ganze Pflanze besitzt einen starken, angenehm aromatischen Geruch; der Geschmack ist bitterlich, etwas campherartig. Sie enthält in reichlicher Menge ein ätherisches Oel, dessen Ausbeute verschieden ausfällt.

Der Thymian wird selten als äußerliches Heilmittel gebraucht, häufiger

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0885-4

zur Bereitung des ätherischen Oeles, welches an der Luft Krystalle ausscheiden läßt, die sich dem Campher ähnlich verhalten.

* Tonco. Die Bohne. Tonkobohne.

Baryosma Tongo Gaertn. et Pers.; Dipterix odorata Willd.; Coumarouna odorata Aublet.

Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.

Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Dieser bis 60 Fuß hohe, in Südamerika einheimische Baum wächst vorzüglich in den Wäldern von Gujana. Die Frucht dieses Baumes besteht in einer trocknen, gelblichen, außen faserigen Schale, welche einer Mandel, die noch ihre grüne Hülle hat, ähnlich sieht. Diese äußere Schale enthält einen einzelnen, platten, 12—20 Linien langen Saamen, der die Gestalt einer etwas in die Länge gezogenen türkischen Bohne hat. So wie wir diesen Saamen erhalten, besteht derselbe aus einer dünnen leichten, glänzenden, schwärzlichbraunen, stark gerunzelten Saamenhaut, und aus einem zweilappigen Kerne, von einem fettigen und öligen Ansehn. Am Ende und zwischen den beiden Lappen befindet sich ein bedeutender Keim, der seiner Form nach einem Phallus nicht unähnlich sieht. Die Lappen haben einen milden, angenehmen, öligen, schwach gewürzhaften Geschmack, und einen beinahe mit dem Steinklee übereinkommenden Geruch.

Auf dem Kerne und zwischen den beiden Saamenlappen findet sich oft eine krystallinische Substanz, welche so wie der ganze Kern den Steinkleegeruch zeigt, und welche Vogel (Gilb. Ann. LXIV. 4. S. 163. und Berl. Jahrb. XXIV. 1. S. 180.) für Benzoësäure erklärte. Guibourt überzeugte sich aber, daß diese Substanz weder Benzoësäure noch Campher, sondern eine besondere Pflanzensubstanz sey, welche er Coumarin nannte. Boullay und Boutron-Charlard (Buchn. Repert. XXIII. S. 225., Trommsd. N. J. XII. 1. 1826. S. 160.) fanden bei der Untersuchung der Tonkabohne die Angabe Guibourt's bestätigt. Als Bestandtheile der Tonkabohne geben sie an: eine aus Elaïn und Stearin bestehendes, seifebildendes Fett; eine krystallinische Substanz, die sich durch mehrere Eigenschaften an die ätherischen Oele anschließt, keine Benzoësäure, sondern, wie sie Guibourt betrachtet, eine besondere neutrale Pflanzensubstanz ist, für welche der Name Coumarin gilt; eine zunderartige der Gährung fähige Substanz; freie Aepfelsäure; sauren äpfels. Kalk; Gummi; Amylum; ein Ammoniaksalz und Pflanzenfaser. Trommsdorff bemerkt aber hiebei, daß ihm die Eigenthümlichkeit des Coumarins durch diese Versuche noch nicht begründet erscheine, und daß die Untersuchung noch einer näheren Prüfung bedürfe. Hiemit übereinstimmend fand denn auch Buchner (Repert. XXIV. S. 126.), daß die krystallisirbare Substanz der Tonkobohnen sich ganz wie eine Campherspecies verhalte, und der mehr für ein Alkaloid geeignete Name Coumarin hier nicht passend sey, besser Tonkocampher.

Die Emulsion der Tonkobohnen schmeckt sehr bitter und riecht schwach

nach Blausäure; Blausäure haltende ätherische Oele können aber durch Aufnahme von Sauerstoff in Benzoësäure übergehen (Berl. Jahrb. XXV. 1. S. 155.), diese Säure könnte daher auch wohl in den Tonkobohnen vorkommen.

Die Tonkobohnen werden bis jetzt nur benutzt, um dem Schnupftabak einen angenehmen Geruch zu ertheilen.

Tormentilla. Die Wurzel. Tormentillwurzel.

Tormentilla erecta Linn. Eine ausdauernde Pflanze Europas.

Eine walzenförmige, oberhalb fingersdicke, über zwei Zoll lange höckerige, harte, mit zahlreichen Wurzelzasern besetzte Wurzel (Wurzelstock), mit rothbrauner Oberhaut, schwarz-purpurrother dichter Rinde, hellröthlichem Holze und Marke, von sehr zusammenziehendem Geschmacke. Sie werde im Frühlinge eingesammelt.

Tormentilla erecta Linn. Die aufrechte Tormentill.
Potentilla Tormentilla Schrk. Tormentillfingerkraut.
Linn. Cl. XII. Icosandria. Ord. 5. Polygynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 10. Rosaceae.

Die Tormentille wächst häufig auf trocknen Wiesen und in Wäldern.

Aus einer Wurzel kommen mehrere Stengel, welche schwach, feinhaarig, ästig, höchstens einen Fuß hoch, fast aufrecht sind, und öfters am Grunde niederliegen. Die Blätter sind sitzend, abwechselnd, gewöhnlich fünf- zuweilen siebenzählig. Von den eiförmig-lancettförmigen, gesägten oder tief eingeschnittenen, unten feinhaarigen Blättchen sind die drei mittleren größer und etwas gestielt. Die gelben Blumen stehen in den Blattwinkeln auf langen, fadenförmigen, einblüthigen Stielen. Der Kelch ist einblättrig, achtspaltig; die Blumenkrone vierblättrig, die umgekehrt-herzförmigen Blumenblätter sind ausgebreitet.

Die Blüthezeit dieser Pflanze ist Juni und Juli.

Die officinelle Wurzel enthält im frischen Zustande einen rothen Saft. Sie ist geruchlos, besitzt aber einen äußerst herben zusammenziehenden Geschmack. Der kalte wäßrige Aufguß ist röthlich gefärbt, wird durch Gallertauflösung ganz milchig, und setzt einen hellröthlichen Niederschlag ab; mit schwefelsaurem Eisenoxydul wird er purpurfarbig, welche Farbe aber allmälig durch Grün und Dunkelgrün in Schwarz übergeht; die oxydirten Eisenauflösungen geben sogleich eine schöne dunkelgrüne Farbe.

Die Abkochung der Wurzel ist hellbraun, der Geschmack schwach bitterlich, sehr stark zusammenziehend, hintennach süßlich, der Geruch etwas aromatisch, wie nach Rosenholz. Durch Eisenauflösungen wird sie blau und blaugrün gefärbt. Das mit Gallerte vollkommen (fleischfarbig) niedergeschlagene und filtrirte Decoct giebt mit der Auflösung des salzs. Eisens eine

schön grasgrüne Farbe. Die Abkochung schimmelt sehr bald, ohne daß sich jedoch Gallusſäure abſetzt.

Das über Tormentillwurzel abgezogene Waſſer hat den Geruch nach Roſenholz. Der Alkohol zieht eine ſchöne dunkelrothe Tinctur aus.

Die Tormentillwurzel hat nach dieſen von Pfaff angeſtellten Verſuchen (Syſt. d. Mat. med. II. S. 209.) viel Aehnlichkeit mit dem Catechu, iſt der Biſtorte etwas ähnlich, und gehört zu den adſtringirenden Mitteln.

Bahlmann (Kaſtn. Archiv I. S. 481. und Berl. Jahrb. XXVI. 2. S. 220.) hat aus dem Aufguſſe der Tormentillwurzel auf dieſelbe Art wie Braconnot aus dem Galläpfelaufguſſe Ellaginſäure abgeſchieden. Griſchow hat an derſelben alle Eigenſchaften beſtätigt gefunden, welche Braconnot von dieſer Subſtanz angiebt und unter andern auch die, daß ſie im ſublimirten Zuſtande auffallende Aehnlichkeit mit ſublimirtem Indig habe.

Die Tormentillwurzel wird in Pulverform oder auch in der Abkochung verordnet; ehemals war auch das Extract, wovon die Wurzeln den vierten Theil geben, gebräuchlich. Die Wurzel kann auch zum Gerben benutzt werden.

Die Wurzeln von alten Pflanzen ſollen wie faules Holz leuchten.

Toxicodendron. Die Blätter. Giftſumachblätter.

Rhus radicans Linn. Ein Strauch des nördlichen Amerikas, bei uns in Gärten angebaut.

Dreizählige Blätter, mit eiförmigen, langzugeſpitzten ausgeſchweiften, etwas gezähnten, an der Baſis ungleichen, faſt kahlen Blättchen. Vorſichtig und nicht mit nackten Händen im Monat Juni und Juli einzuſammeln, und mit Vorſicht aufzubewahren. Die beim Austrocknen ſchwärzlich gewordenen müſſen verworfen werden. Die Gabe bis zu zwei Gran.

Rhus radicans Linn. Der wurzelnde Sumach.
Rhus Toxicodendron Linn. Der Giftſumach.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 3. Trigynia.
Juss. Cl. XIV. Ord. 12. Terebinthaceae.
(Vergl. Berl. Jahrb. XIX. 1818. S. 55.)

Die beiden Linnéiſchen Arten werden von den Neueren in eine einzige vereinigt, indem der Unterſchied ausſchließlich darin liegt, daß Rhus radicans glatte Blättchen hat, dieſe aber bei Rh. Toxicodendron unten behaart ſind.

Der Giftſumach wächſt in Canada, Virginien, Carolina, und wird 3—4 Fuß hoch; bisweilen ſoll er eine Höhe von 20—30 Fuß, und ſein Stamm eine Dicke von faſt 4 Zoll im Durchmeſſer erreichen, indem ſeine wurzelnden Stengel und Aeſte, ſobald ſie einem Baum begegnen, ſich an dem Stamme deſſelben durch kleine Seitenwurzeln feſthalten und umſchlingen, ſich

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0888-1

in viele Aeste zertheilen, und gleich unserm Epheu bis zu den Gipfeln der Bäume steigen. Er wird zu den gefährlichsten Giftpflanzen gezählt.

Die Wurzel ist holzig, seitwärts treibend, röthlich und hat wenige Fasern. Der holzige Stamm ist dünn, wurzelnd, ästig, oft gebogen und läßt sich brechen. Die Rinde desselben ist graubraun und die der jüngern Zweige grünlich, etwas gestreift und gefleckt. Die runden, gefurchten, feinbehaarten Aeste stehen wechselsweise, sind lang, fein, selten gezweigt, und tragen nur an den jährigen Trieben Blätter und Blüthen. Die Blätter sind abwechselnd, langgestielt, abstehend, die Blättchen fast 3 Zoll lang, oben dunkelgrün, unten blaßgrün. Gewöhnlich finden sich 4—5 Blätter an den jährigen Trieben. Die kleinen, gelbgrünlichen Blumen bilden in den Blattwinkeln kurze, ästige Rispen. Gewöhnlich findet man Zwitterblumen, besonders bei den cultivirten; zuweilen sind die Geschlechter ganz getrennt, oft auch gemischt.

Die Pflanze blüht im Juni, Juli und August.

Der Giftsumach enthält in allen seinen Theilen einen weißlichen, harzigen und äußerst scharfen, schwarzfärbenden Saft. Die Schärfe dieser Pflanze ist wohl, zum Theil wenigstens, flüchtiger Natur, da schon die Ausdünstungen jene Wirkungen hervorbringen, welche noch unfehlbarer bei Berührung, und besonders beim Abpflücken der Blätter, wobei wahrscheinlich die Bläschen, welche die giftige Schärfe einschließen, zerrissen werden, sich zeigen. Diese bestehen in einer ganz eigenthümlichen Ausschlagskrankheit, welche mit den hitzigen Ausschlagskrankheiten die größte Aehnlichkeit hat. Diese Krankheit beginnt mit einem Jucken, das gewöhnlich erst einige Stunden, ja selbst einige Tage nach der Berührung, oder nachdem man sich den Ausdünstungen ausgesetzt hat, eintritt, worauf Blasen, Entzündung der Haut, Auffschwellen des Körpers folgen, und diese Krankheit kann selbst lebensgefährlich werden. Diese Wirkungen der flüchtigen Schärfe hat Krüger (Archiv für die Pharmacie von Schaub und Piepenbring 1802. S. 261.) an sich selbst erfahren, und dabei bemerkt, daß die Ausdünstung und Berührung der Blätter bei heiterm Wetter und hellem Sonnenschein gefahrlos, bei trübem regnigem Wetter und gegen Abend vorzüglich gefährlich sey. Schwarze Flecken bekam Krüger jedesmal an den Händen, mit welchen er die Blätter gepflückt hatte, auch wenn die eigentliche Ausschlagskrankheit wegblieb. Dr. Hunold zu Cassel (Ebend.) sah im nordamerikanischen Kriege, die Folgen von den Ausdünstungen des Giftsumachs an Soldaten, welche um ein Feuer gelagert gewesen waren, das zum Theil durch grünes Reisig vom Giftsumach unterhalten worden war; kein einziger Mann blieb verschont.

Die von Van Mons (Trommsd. J. IX. 1. S. 209.) angestellten Versuche, nach welchen die flüchtige Schärfe in Kohlenwasserstoffgas bestehen soll, in welchem ein giftiges Miasma aufgelöst sey, sind völlig unbefriedigend. Auch Achard's Versuche (Crell's Ann. 1787. I. S. 387 und 494.) geben keinen Aufschluß über die Natur der Schärfe. Der aus den Blättern ausgepreßte Milchsaft erschien grün und trübe, klärte sich aber durch Absetzung

des gewöhnlichen grünen Satzmehls nach 24 Stunden vollkommen auf. Dieser Saft hatte einen starken und widrigen Geruch, der mit dem Geruche kleingehackter Blätter von grünem Kohle die meiste Aehnlichkeit hatte. Der zur dicken Syrupsconsistenz abgerauchte Saft hatte allen Geruch verloren. Der Saft selbst röthete die Lackmustinctur nicht; durch salpeters. Silber wurde ein reichlicher erst weißer, dann aber auch an einem finstern Orte schwarz werdender, und durch salpeters. Quecksilber ein gelber Niederschlag darin hervorgebracht.

Außer dem flüchtigen Stoffe enthalten die Blätter des Giftsumachs besonders Gerbestoff, Gallussäure, Stärkemehl, Schleim, wahrscheinlich auch Harz. Eine genaue Untersuchung fehlt noch.

Der Giftsumach wird in Pulverform, im Aufgusse, in der geistigen Tinctur, auch wohl im Extract verordnet. Die geringe Gabe, in welcher dieses Mittel gereicht wird, spricht dafür, daß ihm auch im trocknen Zustande nicht alle narkotische Wirkung abgehe; doch ist es auch vom Prof. Fouquier in sehr großen Gaben ohne den geringsten Nutzen gegeben worden.

Tragacantha. Das Gummi. Traganth.

Ein an der Luft erhärteter Saft irgend einer unbekannten Art Astragalus Linn. aus Kleinasien.

Ein Gummi in verschieden gestalteten, oft auf mancherlei Art gedrehten, halbdurchscheinenden, auf dem Bruche glänzenden, weißen und gelblichen, geruchlosen, in Wasser zu einem dicken Schleime aufschwellenden, sehr schwer aufzulösenden Stücken, von fadem Geschmacke.

Astragalus verus Olivier. Der wahre Traganthstrauch.
Linn. Cl. XVII. Diadelphia. Ord. 4. Decandria.
Juss. Cl. XIV. Ord. 11. Leguminosae.

Tournefort hatte Astragalus creticus Linn. als die Mutterpflanze des Traganths angegeben. Später wurde Astragalus gummifer Labillardière als Mutterpflanze genannt, was von Sieber zweifelhaft gemacht wurde (Hänle's Magazin. 1823. März. S. 323.). Der Traganth wird nicht aus Kreta, sondern aus Kleinasien, hauptsächlich vom Berge Ida bezogen (Buchn. Repert. XVII. S. 455.), und die Art, welche ihn liefert, ist sowohl von A. creticus als von A. gummifer verschieden, wächst auf diesem Berge in einer Höhe von 4—500 Klaftern, und ist von Olivier als Astragalus verus beschrieben. Daß A. Creticus nicht die Mutterpflanze seyn könne, hat Sieber dargethan, und er sowohl als auch Nees v. Esenbeck nehmen den A. verus als die wahre Mutterpflanze an.

Der Stengel dieser Pflanze ist strauchartig, sehr ästig, 2—3 Fuß hoch und ungefähr einen Zoll dick. Die zahlreichen Aeste stehen aufrecht, und sind dicht mit an der Spitze abstehenden dornigen Schuppen bedeckt, die von dem

stehenbleibenden untern Theile der Blattstiele und der Afterblätter gebildet werden. Die Blätter stehen genähert an den Spitzen der Aeste, sind ungefähr 15 Linien lang, aus 6—8 Paaren gegenständiger Fiederblättchen zusammengesetzt, und am Grunde mit zwei zugespitzten Nebenblättchen umhüllt. Die Blättchen sind sehr schmal, borstenartig zugespitzt und behaart. Die Blüthen sind gelb und sitzen in den Blattwinkeln an der Spitze der Aeste. Der kurze Kelch und die Deckelblättchen sind mit wolligen Haaren bekleidet.

Der Saft dieser Pflanze, der in den Monaten Juli bis September, theils von selbst aus dem Stengel, theils an verwundeten Stellen desselben heraustritt und an der Luft erhärtet, ist das Traganthgummi. Wir erhalten dasselbe in schmalen, fadenförmigen, gedrehten und gewundenen Stückchen. Je heller und weißer das Gummi ist, desto mehr wird es geschätzt, und hiernach bestimmt sich auch der Preis der im Handel vorkommenden Sorten, nämlich Gummi Tragacanthae electum, naturale und sordidum, welches letztere nur höchstens zur Bereitung der Räucherkerzenmasse angewendet werden darf.

In kaltem Wasser schwillt der Traganth stark auf, und giebt eine kleisterartige Masse, er läßt sich aber bis zur völligen Durchsichtigkeit darin nicht auflösen, und setzt einen stärkemehlartigen Bodensatz ab, der in der Siedehitze zur opalartigen Durchsichtigkeit sich in dem übrigen Schleime auflöst.

Bucholz (Almanach 1815. S. 61.) hat über den Traganth eine sehr genaue Arbeit geliefert. Auch bei der stärksten Verdünnung der Auflösung des Traganths in Wasser, von welchem 1 Th. mit 100 Th. Wasser einen eben so dicken Schleim gaben, als ein Th. Mimosengummi mit 4 Th. Wasser, lief die Lösung nicht klar durch, indem aufgequollene Theile beigemischt waren, die allmälig die Poren des Filters verstopften. Die durch den aufgequollenen gallertartigen Stoff trübe und dickliche Lösung wurde durch Ammoniak, und besonders durch Salzsäure vollkommen klar und dünnflüssiger; Salpetersäure klärte dagegen nicht. Es ergab sich aus diesen Versuchen, daß die Traganthlösung aus zwei Substanzen bestand: 1) aus einem eigentlichen gummigen Stoffe, und 2) aus eingemengter Traganthgallerte, die durch einen eigenthümlichen Traganthstoff gebildet war.

Behufs einer genauen Analyse wurden also 100 Gran Traganth mit 256 Unzen Wasser allmälig übergossen, und zum Absetzen der Traganthgallerte hingestellt. Die klare Gummilösung wurde mit einem Heber abgenommen, der Rückstand von neuem mit kaltem Wasser umgerührt, und dadurch auf einen immer kleineren Raum zurückgebracht. Die klare filtrirte (wozu 8 Tage erfoderlich waren) Gummilösung gab nach dem Verdampfen einen gelblichweißen Rückstand, der mit dem arabischen Gummi ganz übereinkam.

Ganz anders verhielt sich dagegen der eigentliche Traganthstoff, der sich als ein eigenthümliches Princip des Pflanzenreichs bewies. Im trocknen Zustande erscheint er schmutzig weiß oder gelblich, durchsichtig oder durchscheinend, von muschligem Bruche, leicht pulverisirbar, geschmack- und geruchlos.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0891-0

Er zeigte gegen Wasser die beim Bassorin erwähnten Eigenschaften, und wurde gleichfalls durch längeres Kochen in ein dem arabischen gleiches Gummi verwandelt. Diese Verwandlung wird beschleunigt durch Zusatz von etwas Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure oder Ammoniak. Die verdünnte wäßrige Auflösung desselben wird durch Bleizuckerauflösung kaum getrübt, dagegen durch Bleiextract gefällt, eben so durch salzs. Zinnoxydul und salpeters. Queckſilberoxydul, dagegen durch Eisenauflösungen, sowohl oxydulirte als oxydirte, und Kieselkalilösung nicht afficirt.

In 100 Th. Traganth fand Bucholz 43 Th. Traganthstoff und 57 Th. eigentliches Gummi.

Gehlen hat eigentlich zuerst die Zusammensetzung des Traganths aus 2 Substanzen dargethan. Bostock führt es noch als etwas Charakteristisches an, daß der Traganthschleim von der Goldauflösung purpurroth und beinahe schwarz gefärbt wird. Nach einer Beobachtung von Vogel wird dicker Traganthschleim durch Zusatz von pulverisirtem arabischem Gummi ganz dünnflüssig, wie arabischer Gummischleim.

Prof. Trommsdorff (Geiger's Magazin 1826. August. S. 169.) bemerkt, daß jedes Traganthgummi Stärkemehl enthalte, das unreine braune mehr, als das reine weiße. Die Reaction ist am stärksten, wenn man das zerstoßene Gummi mit Wasser kocht, und zu der noch heißen Lösung einige Tropfen Jodtinctur bringt; der reine Traganth färbt sich dadurch gesättigt blau, der unreine ganz dunkelblau, wie reines Stärkemehl. Das Stärkemehl ist aber nicht eins mit dem Bassorin, und der in kaltem Wasser unlösliche Theil des Traganths ist ein Gemenge von Stärkemehl und Bassorin, welches letztere aus der Auflösung in kochendem Wasser beim Erkalten zu Boden fällt. Der Traganth ist demnach das einzige von selbst ausfließende Gummi, in welchem man bis jetzt Stärkemehl gefunden hat.

Das Traganthgummi wird wie das arabische Gummi gebraucht; es macht das kochende Wasser in geringer Quantität sehr schleimig, ist aber nicht so geeignet zur Mischbarmachung der Oele, Harze, Balsame u. s. w. wie das arabische Gummi; auch zur Bildung von Pillenmassen ist es nicht zu empfehlen, da diese bald sehr austrocknen, und dann unauflöslich werden.

Trifolium fibrinum seu aquaticum. Das Kraut. Fieberkleekraut. Bitterkleekraut.

Menyanthes trifoliata Linn. Eine ausdauernde Sumpfpflanze Deutschlands.

Bittere dreizählige Blätter, mit festsitzenden, länglichen, stumpfen, leicht gekerbten, kahlen blaßgrünen Blättchen. Im Monat Mai und Juni einzusammeln.

Menyanthes trifoliata Linn. Die dreiblättrige Zottenblume. Der Fieberklee.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 1. Gentianeae.

Diese schöne Wasserpflanze wächst häufig in Moräften, an den Rändern der Teiche und Seen, auf nassen Wiesen u. s. w.

Aus der wagerechten, gegliederten Wurzel entspringen fußhohe, am Grunde mit Scheiden versehene Blumenschafte, welche mit mehreren langen Blattstielen umgeben sind, deren jeder 3 glatte, 2—3 Zoll lange und weniger breite Blättchen trägt. Am Ende des aufrechten Schaftes bilden die weiß röthlichen Blumen eine schöne Traube. Jede Blume ist durch einen kleinen Stiel unterstützt, an dessen Grunde sich ein eiförmiges Nebenblättchen befindet. Der einblättrige Kelch ist glatt und fünfspaltig; die einblättrige Blumenkrone regelmäßig und trichterförmig; die Röhre ist kurz, die Mündung in fünf Lappen getheilt.

Der Fieberklee blüht im Mai und Juni.

Die Blätter, Dreiblatt, behalten, gut getrocknet, ihre Wirksamkeit einige Jahre. Der Geruch derselben ist schwach widerlich, der Geschmack bitter. Die junge Pflanze ist weniger bitter, als die schon etwas ältere. Die Blätter verlieren beim Trocknen $\frac{4}{5}$ an Feuchtigkeit. Der bittere Stoff des Fieberklees läßt sich durch Wasser und Weingeist ausziehen, doch giebt der Weingeist einen viel reinern und kräftigern bittern Auszug. Die Farbe des wäßrigen Auszuges ist bräunlich, die der Tinctur bräunlich-grün. Beide Auszüge werden durch oxydirte Eisenauflösungen schön smaragdgrün, besonders aber der geistige verdünnte Auszug, und es setzt sich nach einiger Zeit ein Niederschlag ab. Der ausgepreßte frische Saft, der im März noch wenig bitter ist, enthält sehr viel Eiweißstoff. Eingedickt giebt er ein dunkelbraunes Extract, aus welchem Alkohol den die Eisenauflösungen smaragdgrün färbenden Bestandtheil vollkommen auszieht. Diese geistige Tinctur wird durch andere Reagentien nicht merklich verändert. Der Rückstand wird durch Eisenauflösungen nicht mehr grün, wohl aber dunkler gefärbt.

Trommsdorff (Dessen J. d. Ph. XVIII. 2. S. 72.) fand in dem Bitterklee keine Spur von einem flüchtigen Oele, eben so wenig von Gerbestoff. Das frische Kraut verlor 0,75 an wäßrigen Theilen. Im ausgepreßten Safte wurden gefunden: 1) grünes Satzmehl, aus 0,75 Eiweißstoff und 0,25 einer harzähnlichen Substanz bestehend, von welcher letzteren die grüne Farbe der geistigen Tinctur herrührt; 2) eine vegetabilisch-thierische, durch Gerbestoff fällbare, mit dem Bitterstoffe innigst verbundene Substanz; 3) bitterer Extractivstoff, in Wasser und wäßrigem Weingeist leicht löslich, die oxydulirten Eisenauflösungen schön smaragdgrün färbend; 4) ein braunes, dem arabischen ähnliches Gummi; 5) ein Satzmehl eigener Art, dem Inulin sehr ähnlich, von Trommsdorff Menyanthin genannt, kleine, runde, weiße Körner darstellend, in siedendem Wasser auflöslich, beim Erkalten daraus niederfallend. (Von Inulin wohl nicht verschieden.)

Das getrocknete Kraut giebt $\frac{1}{5}$ sehr bitteres Extract.

Der Fieberklee wird im Aufgusse, in der Abkochung oder auch in Pul-

verform in Lattwergen verordnet; an manchen Orten wird er auch dem Biere zugesetzt, um das Sauerwerden desselben zu verhüten.

Ulmus. Die innere Rinde. Innere Ulmenrinde. Rüsterrinde.

Ulmus campestris Linn. et effusa Willd. Bäume Deutschlands.

Die innere gelbbräunliche, glatte, dünne, zähe, bitterliche Rinde, von nicht gar zu dünnen Aesten. Im Frühlinge einzusammeln.

Ulmus campestris Linn. Die gemeine Rüster oder Ulme, und
Ulmus effusa Willd. Die Traubenrüster.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.
Juss. Cl. XV. Ord. 4. Amentaceae.

Die gemeine dreiblättrige Ulme ist ein schnell wachsender, starker, gerader und ansehnlicher Baum, welcher eine Höhe von 60—80 Fuß erreicht. Er findet sich an den Rändern der Wälder und Dörfer, und wird häufig in Alleen gepflanzt. Die glatte Rinde desselben ist bräunlich-aschgrau und an alten Stämmen etwas rissig; die Aeste sind immer glatt. Die abwechselnden Blätter sind kurzgestielt, dunkelgrün, eiförmig, zugespitzt, am Grunde ungleich und doppelt gesägt. Die grün-röthlichen, fast stiellosen Blumen stehen in Haufen zusammengedrängt an den äußersten Zweigen. Der Kelch ist bleibend, einblättrig, inwendig gefärbt und fünfspaltig. Die Blumenkrone fehlt. Die 5 Staubfäden haben dunkelrothe Staubbeutel. Die Frucht (Flügelfrucht) ist glatt, kreisrund, dünn, an der Spitze herzförmig ausgeschnitten, einfächerig und einsaamig.

Die Traubenrüster erreicht gleichfalls eine bedeutende Höhe und Stärke, wächst aber langsamer. Die Aeste sind lang, abstehend und mit zahlreichen kurzen zweireihigen, sparrig abstehenden Zweigen besetzt. Die Rinde ist an dem jungen Stamme und den Aesten glatt, bräunlich oder schwärzlich, und nur an den jüngsten Zweigen behaart. Die vor den Blättern ausbrechenden Blüthen sind hier gestielt, wodurch sich diese Art unterscheidet. Die Frucht ist eine runde, häutige, gelbliche, flach zusammengedrückte einsaamige Flügelfrucht, die am Rande mit zarten Haaren gewimpert ist.

Von beiden Bäumen wird die officinelle Ulmenrinde, Rüsterborke, von den dünnern Aesten alter Bäume oder von den Stämmen junger Bäume gesammelt, und von der äußern, spröden, rauhen, braunen, geruch- und geschmacklosen Oberrinde befreit. Die innere Rinde ist im frischen Zustande gelblich, getrocknet aber rothbräunlich, und hat einen sehr schleimigen, etwas scharfen, bitterlichen, zusammenziehenden Geschmack, aber keinen Geruch. Die Rinde der ganz jungen Zweige enthält eine solche Menge des Schleims, daß er sich in Fäden ziehen läßt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0894-8

Nach Vauquelin (Scher. J. IV. S. 82.) enthält der im Mai aus dem Stamme gezapfte Saft essigs. Kali, essigs. Kalk, vegetabilische Materie, kohlens. Kalk und Talk, Kohlensäure, eine Spur Syrup, schwefels. und salzs. Kali. Durch das Aufbewahren zersetzt sich der Saft, und enthält dann freies Kali. Vauquelin untersuchte auch eine schwarze und weiße Substanz, aus den Geschwüren alter kranker Ulmenbäume fließend, und an der Rinde trocknend. Er fand, daß die Bildung und Absonderung des Kalis, im Vergleiche zu dem Kaligehalte des gesunden Saftes, erstaunend groß sey.

Das über die Rinde abgezogene Wasser hat einen bittermandelwasserähnlichen Geruch, der sich auch beim frisch bereiteten Decocte zeigt. Eine Unze der Rinde enthält nach Davy 13 Gran Gerbestoff. Außerdem enthält die Rinde viel gummige und schleimige Theile, etwas Kochsalz, sauerkleesaure Kalkerde, und sehr wenig harzige Theile.

Die Ulmenrinde wird in der Abkochung verordnet; wegen des Gehalts an Kochsalze darf diese nicht mit Queckſilbersalzen, und wegen des adstringirenden Stoffes nicht mit Eisensalzen, oder überhaupt mit metallischen Salzen vermischt werden.

Die polnischen Bauern verfertigen aus der zähen Rinde eine Art Schuhe, welche sie Paräsken nennen.

Uva ursi. Die Blätter. Bärentraubenblätter.

Arbutus Uva ursi Linn. Ein immergrünender kleiner Strauch Deutschlands.

Kurzgestielte, verkehrt-eiförmige, ganzrandige, kahle, etwas steife, auf der untern Seite durch Adern netzförmige Blätter, von zusammenziehendem Geschmacke. Sie müssen nicht mit den auf der untern Seite punktirten Blättern von Vaccinium Vitis Idaea verwechselt werden. Im Sommer einzusammeln.

Arbutus Uva ursi. Die gemeine Sandbeere oder Bärentraube.
Linn. Cl. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IX. Ord. 3. Ericineae.

Dieser niedrige Strauch liebt gebirgige, steinige, sandige und schattige Orte, und wird an kalten unfruchtbaren Orten angetroffen.

Die Stengel sind schwach, dünn, strauchartig, gewöhnlich niedergestreckt, glatt, ästig, 2—4 Fuß lang, und entspringen zu mehreren aus einer Wurzel. Die jungen Triebe sind röthlich und leicht wollig. Die längs den Aesten zerstreuten, abwechselnden Blätter stehen ziemlich nahe bei einander, sind kurz gestielt, klein, immergrün, lederartig, dick, steif und ziemlich hart. Die Oberfläche ist dunkelgrün, die Unterfläche mit feinen netzförmigen Adern durchzogen und hellgrün; beide Flächen sind etwas glänzend. Die Blüthen sind weiß-röthlich, hängend und bilden an den Enden der Zweige kurze einfache

Trauben. Der Kelch ist fünftheilig; die Blumenkrone einblättrig, fünfspaltig. Die Frucht ist eine rundliche, erst grüne, bei der Reife schön rothe Beere.

Die Blüthezeit ist April bis Juni.

Die officinellen Blätter dieser Pflanze findet man bisweilen verwechselt mit den Blättern der Preißelsbeere. Man erkennt diese daran, daß sie größer, dünner, eirund, am Grunde breiter, oben schmäler, auf der Oberfläche dunkelgrün, glatt, auf der Unterfläche aber weißlich, mit blaß bräunlichen oder schwarzbräunlichen Punkten bezeichnet sind. Sehr leicht zu erkennen ist die Verwechselung mit den Blättern des Buxbaums, welche größer, eirund oder rundlich, heller grün, unten weder netzförmig geadert, noch braun punktirt sind, frisch einen unangenehmen Geruch und widrig bitterlichen Geschmack haben, wogegen der Geschmack der Bärentraubenblätter bitterlich-zusammenziehend ist, und diese auch nach dem Trocknen einen schwachen, süßholzähnlichen Geruch haben.

Die Abkochung der Bärentraubenblätter ist bräunlich, schlägt den Leim ziemlich reichlich nieder (enthält also Gerbestoff), und bringt in den oxydirten Eisenauflösungen eine dunkelblaue Färbung, und in kurzer Zeit einen bläulich schwarzen Niederschlag hervor. Dieses giebt auch ein Unterscheidungszeichen von den Preißelsbeeren ab, deren Abkochung bloß eine schwache, ins Graugrüne ziehende Trübung, und nach einiger Zeit einen feinen schmutzig-grünen Niederschlag bewirkt. Die Buxbaumblätter verhalten sich eben so.

Der vorzüglich wirksame Bestandtheil der Bärentraubenblätter scheint der Gerbestoff zu seyn, und zwar von der Art, wie er sich in den Galläpfeln findet. Sie werden in der Abkochung und auch in Pulverform als harntreibendes Mittel, besonders gegen Steinbeschwerden, gebraucht. Ihr Gerbestoff macht sie auch tauglich zur Färberei, wo sie die Stelle des Schmacks und des Blauholzes vertreten können, und wirklich werden sie auch in einigen Gegenden hiezu benutzt. In Kasan wird der Saffian und in Rußland das Kalbleder damit gegerbt. In England soll man sie dem Rauchtabak beimischen, um ihm einen angenehmen Geruch und Geschmack zu ertheilen. Endlich bereiten die Schweden aus den Beeren durch Auspressen einen dem Zuckersafte nicht ganz unähnlichen Saft.

Valeriana minor. Die Wurzel. Baldrianwurzel.

Valeriana officinalis Linn. Eine ausdauernde Pflanze Europas.

Eine kurze, höckerige, sehr zahlreiche, lange, dünne, eine halbe Linie dicke, zusammengedrehte Wurzelzasern ausschickende Wurzel (Wurzelstock), mit braunschwärzlicher Oberhaut, dicklicher, gleichsam mit Oel getränkter, um das Holz herum brauner Rinde, sehr dünnem, weißlichem Holze, von bitter-scharfem Geschmacke, und starkem etwas widrigem Geruche. Im Frühlinge einzusam-

meln, ehe die Stengel hervorwachsen, und schnell zu trocknen. Verwerflich ist die Wurzel der Valeriana Phu, mit längerem Wurzelstocke, von weniger durchdringendem Geruche. Vorzüglich ist die englische Valeriana, mit dünnern, kürzeren Fasern von stärkerem Geruche.

Valeriana officinalis Linn. Der gemeine Baldrian.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XI. Ord. 2. Valerianeae.

Der gemeine Baldrian wächst durch ganz Europa, liebt feuchte, sumpfige Orte und Gebüsche, findet sich aber auch an trocknen, bergigen Orten. Es giebt von dieser Pflanze zwei Varietäten, eine mit schmäleren und eine mit breiteren Blättern. Von der ersteren hatte man die Meinung, daß diese die vorzüglichste Wurzel liefere, und daß die letztere, an sumpfigen Stellen vorkommend, eine viel unwirksamere Wurzel gebe. Geiger (Magazin 1824. VII. S. 14.) hat diese Meinung widerlegt, denn er fand die schmalblättrige Varietät in einer waldigen, sumpfigen Gegend, wogegen in den nahen Gebirgen nur der gemeine mittlere Baldrian mit breitern gezähnten Blattfiedern vorkommt; der Geruch der Wurzel vom gemeinen Baldrian war sowohl im frischen als im getrockneten Zustande weit stärker, als von dem schmalblättrigen, es muß also die Wurzel von dieser Pflanze, und zwar von der auf Bergen und an trocknen Orten gewachsenen gesammelt werden.

Die Wurzel des Baldrians ist aus einem Büschel dicker, weißlicher, länglicher Fasern gebildet, welche wieder mit dünnen und feinen Fäserchen besetzt sind. Der aufrechte Stengel, welcher unten einfach, nach oben zu bisweilen 2—3 dichotomische Aeste zeigt, ist walzenrund, gestreift, zottig, besonders nach unten zu, ungefähr 3—4 Fuß hoch. Die Blätter sind gegenüberstehend, die untern gestielt, die obern sitzend, tief siederspaltig, gleichsam gefiedert, mit schmalen, spitzen, fast ganzrandigen Abschnitten. Die kleinen, blaß rosenfarbenen Blüthen stehen in einer Art von Afterdolde, am Ende des Stengels, und besitzen einen dem Hollunder ähnlichen Geruch.

Der Baldrian blüht im Juni und Juli.

Die frische Wurzel ist weißlich und fast geruchlos, getrocknet wird sie braunschwärzlich, und erhält einen sehr durchdringenden, eigenthümlichen, etwas campherartigen Geruch, und einen gewürzhaften, scharfen, anfangs etwas süßlichen, hintennach mehr bitterlichen Geschmack. Die Hauptwurzel erreicht selten die Dicke eines Fingers, ist länglich, kurz und von allen Seiten mit langen, rabenkieldicken und dünnern, schlanken, zähen, mit kleinen haarigen Zäserchen besetzten Fasern umgeben. Die an feuchten Orten gesammelten sind dicker, weniger haarig, holzig, zerbrechlich, auswendig aschfarbenbraun oder braungelb, inwendig dunkelfarbiger, zuweilen fast schwarz, oft hohl in der Mitte, riechen unangenehmer, sind von schärferem, aber nicht gewürzhaftem Geschmacke und nicht so wirksam.

Die Wurzeln der Valeriana Phu (Radix Valerianae majoris) zeichnen sich aus durch ihren daumens- und fingersdicken länglichen, ringartig runzligen, knotigen, äußerlich aschgrauen oder bläulichgrauen, innerlich weißlichen, mit sehr langen, dicken und blässern Fasern überall besetzten Wurzelkopf, durch den minder scharfen aber unangenehmen bittern Geschmack, und durch einen dem kleinen Baldrian zwar ähnlichen aber unangenehmen Geruch. Die Wurzel der Valeriana dioica sind viel dünnzaseriger, sehen weißer aus, und sind viel weniger kräftig an Geruche und an Geschmacke.

Nach Hrn. Prof. Hoppe werden auf dem Fichtelgebirge betrügerischerweise die Wurzeln verschiedener Ranunkelarten untergemischt, ja Hr. Hoppe fand unter 30 Pfunden nur 3 Pfund wirklichen Baldrian. Die Ranunkelwurzeln (von Ranunculus polyanthemos, repens und bulbosus) bestehen aus mehr oder weniger ins Weißliche fallenden, einfachen, geruchlosen, rabenkieldicken Fasern, die durch ihre obere Vereinigung eine Art Knollen zu bilden scheinen.

Die Katzen lieben den Geruch des Baldrians sehr, wälzen sich auf den zu trocknenden Wurzeln und verunreinigen sie, daher man diese Wurzel beim Trocknen sehr dagegen zu hüten hat.

Trommsdorff (J. d. Ph. XVIII. 1. S. 3.) erhielt aus 12 Pfunden der getrockneten Wurzel 2 Unzen ätherisches Oel, die größte Menge, welche Trommsdorff je erhielt; gewöhnlich ist die Ausbeute geringer. (Hagen erhielt aus 13 Pfunden Wurzel 3 Loth 1½ Quentchen Oel; Gehlen aus 45 Pfunden 9 Unzen 7 Scrupel Oel.)

Der aus 16 Unzen der frischen Wurzel mit Zusatz von destillirtem Wasser ausgepreßte Saft war sehr trübe, von schmutzig dunkelgrauer Farbe und setzte beim ruhigen Stehen ein weißliches Satzmehl ab, das zwei Quentchen betrug. Es besaß einen durchdringenden Geruch und ganz den Geschmack der Wurzel. Der klar filtrirte Saft wurde von oxydulirtem salzsaurem Zinn, oxydulirtem salpeters. Quecksilber, essigs. Blei und salpeters. Blei reichlich niedergeschlagen; auch Brechweinstein gab einen ziemlichen grünlichweißen Niederschlag, der sich nicht wieder in Salpetersäure, sehr leicht aber in Salzsäure auflöste. Grünes schwefels. Eisen brachte keine Farbenänderung darin hervor, rothe Eisenauflösung veränderte die Farbe ins Grüne. Hausenblase trübte den Saft nicht. Gallussäure brachte erst nach einiger Zeit eine leichte Trübung hervor.

Abgeraucht wurde ein gelbschwarzes Extract erhalten, das sich vollkommen in Wasser auflöste, auch von gewöhnlichem Alkohol nach einiger Zeit gänzlich aufgenommen wurde, in absolutem Alkohol und in Schwefeläther aber unauflöslich war. Es ist also ein Extractivstoff, den man zu der Gattung des harzähnlichen Extractivstoffs rechnen kann, von welchem sich noch ein Antheil abtrennen ließ, der sich schon mehr dem Gummi näherte.

Auch die getrocknete Wurzel wurde untersucht, das durch Auskochen bereitete Extract in den Extractivstoff und Harz zerlegt, von welchem letzteren von weicher Consistenz Alkohol noch mehr auszog.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0898-1

16 Unzen Baldrian enthalten: Satzmehl 2 Quentchen; harzartigen Extractivstoff 2 Unzen; gummigen Extractivstoff 1 Unze 4 Quentchen; Harz 1 Unze; ätherisches Oel 1 Quentchen 1 Scrupel; holzigen Rückstand 11 Unzen 2 Scrupel.

Braconnot will auch noch äpfels. Kalk und ein schwefels. Salz darin bemerkt haben.

Die Baldrianwurzel gehört zu den kräftigsten Arzneimitteln, und erfreut sich daher auch einer vorzüglich häufigen Anwendung, und zwar im Aufgusse. Sehr wirksam ist auch das Pulver, jedoch muß es in gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt, und nicht auf sehr lange Zeit vorräthig gehalten werden.

Vanilla. Vanille.

Vanilla aromatica Swartzii. Eine klimmende Schmarotzerpflanze Neuspaniens.

Die unreifen zusammengedrückten, gestreiften Saamenkapseln, von fast sechs Zoll Länge, von der Dicke einer Schreibfeder, von braunschwarzer Farbe, oft mit Krystallchen von Benzoësäure bestreut, mit Saamen, die einem fetten röthlichem Muße gleichen, angefüllt, von balsamischem benzoëartigem Geruche, und gewürzhaftem angenehmen Geschmacke.

Vanilla aromatica Linn. Die gewürzhafte Vanille.
Linn. Cl. XX. Gynandria. Ord. 1. Diandria.
Juss. Cl. IV. Ord. 3. Orchideae.

Die Vanille ist in verschiedenen Theilen Südamerikas, besonders in Peru und Mexiko einheimisch, und wird auch häufig angebaut. Sie hat einen kriechenden Stengel, der sich in viele Ranken theilt, und bis 20 Fuß hoch wird. Er ist mit kleinen Würzelchen besetzt, welche in die Rinde der benachbarten Bäume einwachsen, und sowohl zur Ernährung als zur Stütze desselben dienen, weil die Pflanze, auch nachdem sie von der Erde getrennt worden, fortwachsen kann. Die Blätter sind abwechselnd, länglich-eiförmig, sitzend, dick, fleischig-lederartig, glatt, vollgrün, glänzend, gerippt, und an den Rändern schwach gewellt. Die 5—6 großen, purpurfarbenen, wohlriechenden Blüthen stehen in einer Art von Traube in den Blattwinkeln. Die 5 obern Kelchabtheilungen sind lancettförmig, etwas gewellt. Die Lippe ist verkehrt-eiförmig, rinnenartig ausgehöhlt und am Rande etwas buchtig. Die Schoten sind die bekannte Vanille.

Man sammelt die Vanille vor ihrer völligen Reife ein, hängt sie im Schatten auf um sie gehörig zu trocknen, und überstreicht sie hierauf zweimal mit Oel, damit sie nicht weiter eintrockne und vor Insecten geschützt sey. Sie wird alsdann in kleine Bündel von 7—8 Unzen zusammengebunden, jedes derselben in Blei eingewickelt, in kleine Kisten gepackt und versendet.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0899-9

Die Vanilleschote ist 5—6 Zoll lang, gerade, cylindrisch, doch etwas zusammengedrückt, in der Mitte etwas verdickt, an beiden Enden verschmälert, und daselbst gekrümmt, der Länge nach (durch das Austrocknen) runzligefurcht, röthlichbraun, schimmernd, auf der Oberfläche fettig anzufühlen, zwar biegsam, aber doch zerbrechlich. Von außen ist sie öfters mit einem weißen, krystallinischen, nadelförmigen Anfluge von Benzoësäure überzogen, inwendig enthält sie ein weiches, öliges, schwärzliches Mark, und eine große Menge kleiner, schwarzer, runder und glänzender Saamen. Die Vanille hat einen äußerst angenehmen, gewürzhaften, eigenthümlichen, dem Perubalsam ähnlichen Geruch, einen fettigen, gewürzhaften, säuerlichen, angenehm balsamischen Geschmack.

Es giebt noch andere Sorten Vanille, von Spielarten der Pflanze eingesammelt, die sich zum Theil durch ihre größere Dicke bei geringerer Länge, durch theils schwärzliche, theils weißliche, nicht glänzende Farbe, durch den geringern Wohlgeruch (nach peruvianischem Balsam, mit welchem sie überstrichen worden) und dadurch unterscheiden, daß sie mehr gerundet und mehr krumm gebogen sind, als die ächten. Auch soll verfälschte Vanille vorkommen; wenn nämlich die Früchte am Stocke zu reif werden, so springen sie auf und lassen eine balsamische Flüssigkeit ausfließen, welche an der Luft dick wird und ein wahrer Vanillebalsam ist, der aber nicht bei uns bekannt ist. Die Vanille, aus welcher derselbe geflossen, ist begreiflich von weit geringerer Güte, als die andere, dessenungeachtet wird sie von den dortigen Einwohnern unter dieselbe gemengt, nachdem sie mit einem fremdartigen Stoffe angefüllt, und die Oeffnung verklebt oder zugenäht worden, was jene Leute sehr geschickt bewirken. Man muß daher die Schoten genau besichtigen.

Das ätherische riechende Princip scheint wohl der vorzüglich wirksame Bestandtheil der Vanille zu seyn, doch ist es nicht gelungen, ein ätherisches Oel in Substanz zu erhalten, obgleich das Destillat den Vanillegeruch besitzt. Das ölige Mark läßt auf dem Papier einen Fettfleck zurück. Der Weingeist zieht die ganze Kraft der Vanille aus, und hinterläßt beim Abdampfen ein schmieriges Harz.

C. F. Bucholz (Buchn. Repert. II. S. 254.) erhielt auch nicht einmal ein riechenes Destillat, und weil der Geruch auch nicht bei dem Destillationsrückstande vorgefunden wurde, so glaubt er, daß das riechende Princip bei der Destillationswärme zerstört worden sey. Als Resultate der Zerlegung von 500 Th. Vanille werden folgende Bestandtheile angegeben: Extractivstoff 84; Extractivstoff, durch Aetzkali ausgezogen, $85\frac{3}{4}$; Extractivstoff, chinaartiger mit Benzoësäure 45; süßer Extractivstoff $6\frac{1}{50}$; zuckerartige Materie mit Benzoësäure $30\frac{2}{50}$; Gummi 56; Gummi, durch Aetzkali ausgezogen, $29\frac{1}{2}$; fettartiges, in absolutem Alkohol auflösliches Oel $54\frac{1}{2}$; Harz $11\frac{1}{2}$; Benzoësäure mit Extractivstoff $5\frac{1}{4}$; amylumartiger Stoff $14\frac{1}{4}$; Faser 100. S. = $471\frac{2}{50}$.

Die Asche der unauflöslichen Faser der Vanilleschoten besteht aus kohlens.

Natron, Kali, Kalk, Bittererde; schwefelf. Kalk; schwefelf. Salzen; salzf. Salze; Alaunerde, Eisenoxyd und Kupferoxyd.

Eine Vanilletinctur aus 1 Unze Vanille und 6 Unzen rectificirtem Weingeiste ist gewiß ein sehr kräftiges Arzneimittel; sie wird auch wohl mit Zucker abgerieben gegeben. Häufiger ist ihr Gebrauch zum Würzen der Chocolade ꝛc.

Verbascum. Die Blumen. Wollkrautblumen.

Verbascum Thapsus Linn. et thapsiforme Schr. Zweijährige, an ungebauten Orten häufige Pflanzen.

Einblättrige, fünflappige, unregelmäßige, mehr oder weniger gelbe, mit Schleim angefüllte Blumenkronen, von schwachem rosenartigen Geruche, bei trockner Witterung mit den Kelchen einzusammeln, und an einem trocknen Orte schnell zu trocknen und aufzubewahren.

Verbascum. Das Kraut. Wollkraut.

Längliche, herablaufende, auf beiden Seiten mit einem dichten, dicken, weißen, weichen Filze bedeckte Blätter. Im Sommer einzusammeln.

Verbascum Thapsus Linn. Wollkraut. Königskerze.
Verbascum thapsiforme Schrader. Großblumiges Wollkraut.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 8. Solaneae.

Man findet diese Pflanzen durch ganz Deutschland an ungebauten, sonnigen Stellen, doch mehr in den südlichern als in den nördlichen Gegenden.

Verbascum Thapsus Linn. Die Wurzel ist stark, holzig und faserig. Der Stengel ist gerade, aufrecht, einfach, stielrund, von den ganz hinablaufenden Blattstielen und Blättern geflügelt, dicht-filzig, 2—6 Fuß hoch. Die Blätter flach gekerbt, etwas runzlig, auf beiden Seiten filzig, mehr jedoch auf der untern, und daselbst mit einem hoch aufliegenden Adernetze durchzogen, die am Grunde stehenden Blätter ½—1 Fuß lang, lancettförmig oder länglich-lancettförmig, stumpf oder spitzlich, gestielt, in den Blattstiel verschmälert; die untern stengelständigen kürzer gestielt, mit schmalen Rändern herablaufend; die weiter folgenden länglich-lancettförmig, sitzend, spitz oder kurz zugespitzt, und wie die übrigen alle mit breiten Flügeln am Stengel herabziehend; die obersten kürzer, darum eiförmig, länger zugespitzt. Die ährenförmige Traube ½—1 Fuß lang, einfach, gedrungen, am Grunde jedoch oft unterbrochen, nach dem Verblühen verlängert. Die Blüthen zu 3—4 in Büscheln, auch einzeln. Die Blüthenstiele zur Blüthezeit sehr kurz, und auch bei der Frucht noch um das Doppelte oder Dreifache kürzer, als der Kelch. Dieser groß, 3 Linien lang, bei der Frucht fast 6 Linien, die Zipfel lancettförmig, zugespitzt. Die Blume mehr trichter- als radförmig,

nicht doppelt so lang, als der Kelch, oft kaum ein Drittel länger, bis zur Hälfte fünfspaltig, die Lappen länglich verkehrt-eirund, aufrecht abstehend, die Röhre dick. Die Staubfäden gelb, zwei von unten bis oben, einer von der Mitte bis ans Ende, mit weißer Wolle besetzt, die übrigen zwei kahl, oder mit einigen zerstreuten Härchen angeflogen. Die Staubkölbchen der beiden längern Träger etwas größer, aber nach dem Verblühen nicht sehr in die Länge gezogen. Der Blumenstaub safrangelb.

Verbascum thapsiforme Schrad. Der vorhergehenden Art beim ersten Anblick sehr ähnlich, aber durch die schönen großen Blumen, welche 1—1½ Zoll im Durchmesser haben, sogleich zu erkennen. Die Blume der vorhergehenden Art hat nur ½ Zoll im Durchmesser. Die Pflanze ist ferner meist niedriger, die Blätter breiter, elliptischer, deutlicher und spitzer gekerbt und mehr zugespitzt. Die Blüthenstiele sind etwas länger, jedoch zur Blüthezeit kürzer als der Kelch, die der Frucht aber etwas länger, als derselbe. Die Kelchzipfel eiförmig, zugespitzt, die großen Blumen flach ausgebreitet, die Zipfel breit und rundlich. Die Kölbchen der längern Träger nach dem Ausleeren des Blüthenstaubes noch einmal so lang, als die der übrigen. Die zwei längeren Träger sind ebenfalls kahl, oder nur an der Spitze mit einem schwachen Büschel von Haaren besetzt.

Die Pflanze erscheint auch mit höherem Stengel zu 4 Fuß und drüber; mit mehreren Aesten, mit dichterm und dünnerm Filze, mit obern Blättern, welche sich in eine lange Spitze verlaufen. Das großblumige Wollkraut kommt in unserer Gegend häufiger vor, als **V. Thapsus L.**

Verbascum nigrum Linn. Schweifiges Wollkraut, hat gestielte, gekerbte, oben dunkelgrüne, ziemlich kahle, unten fein filzige Blätter; die untern sind länglich-eiförmig, am Grunde herzförmig, langgestielt, die obersten länglich-eiförmig, fast sitzend, die Traube aus mehrblüthigen, etwas entfernten Büscheln gebildet, die Mitteltraube stets auffallend stärker. Die Blume gelb, gewöhnlich vor dem Schlunde mit fünf braunen dreieckigen Fleckchen, und einem Kreise solcher im Schlunde. Die Staubgefäße safrangelb, die Wolle violett. Hiernach ist diese abweichende Art sehr leicht zu unterscheiden.

Die officinellen **Flores Verbasci** werden von **Verbascum Thapsus** und **thapsiforme**, oder auch von **V. phlomoides** und einigen verwandten Arten gesammelt.

Die Wollkrautblumen haben frisch einen etwas betäubenden, getrocknet einen angenehmen Geruch, und geben mit Wasser destillirt ein nach Rosen (nach Andern nach Veilchen) riechendes Wasser, auf welchem Häutchen eines butterartigen Oeles bemerkt sind. Der wäßrige Aufguß ist etwas schleimig-süßlich von Geschmacke, und wird durch schwefels. Eisen nur schwach olivengrün gefärbt. Mit den andern Metallsalzen zeigt er die vom Schleimzucker abhängenden Reactionen. Galläpfeltinctur trübt ihn nicht; salzs. Zinn wird etwas davon opalisirend.

Nach einer Analyse von **Morin** (Berl. Jahrb. XXVIII. 2. S. 90.; Geiger's Magazin 1826. October S. 71.) enthalten die Wollkrautblumen:

ein gelbliches flüchtiges Oel; eine saure, grüne, fette Materie, in Aether, Alkohol, in den fetten und flüchtigen Oelen leicht auflöslich, mit der Oelsäure übereinstimmend; freie Aepfel- und Phosphorsäure; essigs. Kali; unkrystallisirbaren Zucker; Gummi; Pflanzengrün; einen harzigen gelben Farbestoff, der in kaltem Wasser wenig, in kochendem viel mehr auflöslich ist, woraus sich jedoch beim Erkalten ein Theil wieder abscheidet, in Alkohol auflöslich, fast geschmacklos, nur beim Kauen eine schwache Bitterkeit entwickelnd, wobei der Speichel gelb gefärbt erscheint, und einige Mineralsalze.

Die Wollkrautblätter haben im frischen Zustande einen schwach betäubenden, getrocknet einen nicht angenehmen Geruch, frisch einen schwach rettigartigen, bitterlichen, getrocknet einen etwas ranzigen schleimigen Geschmack.

Die Blumen verlieren sehr bald ihre schöne gelbe Farbe, und müssen, wenn sie dieselbe behalten sollen, sehr schnell getrocknet und in fest verschlossenen Gläsern aufbewahrt werden. Sie werden, so wie die Blätter, als schleimige, erweichende Mittel im Aufgusse gegeben; der Aufguß der Blumen muß durch ein feines Seihetuch gegossen werden, um die kleinen Haare von den Staubfäden davon zu trennen, welche durch mechanische Reizung des Schlundes Husten erregen würden.

Veronica. Das Kraut. Ehrenpreiskraut.

Veronica officinalis Linn. Eine ausdauernde Pflanze Deutschlands.

Das blühende, bitterliche Kraut, mit gestrecktem Stengel, winkelständigen, gestielten, Trauben, einblättrigen, vierlappigen, bläulichen Blumenkronen, gegenüberstehenden, eiförmigen stumpfen, gekerbten, haarigen Blättern. Im Frühlinge einzusammeln und schnell zu trocknen.

Veronica officinalis Linn. Der gemeine oder ächte Ehrenpreis.
Linn. Cl. II. Diandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. VIII. Ord. 1. Primuleae.

Der gemeine Ehrenpreis findet sich durch ganz Europa, im nördlichen Amerika und Asien, wächst in Deutschland häufig auf waldigen Hügeln und liebt einen trocknen Boden.

Die Wurzel ist zaserig und kriechend. Der Stengel krautartig, niederliegend und verwirrt, bisweilen kriechend, nach oben aufsteigend, hart, rund, haarig, 6—10 Zoll lang, einfach oder von der Basis an in dem Stengel ähnliche Zweige getheilt. Die gegenüberstehenden, kurzgestielten Blätter sind von mattgrüner Farbe und an ihrem Grunde etwas eingezogen; zuweilen sind einige fast rund und kleiner. Die kleinen blaßblauen mit röthlichen Aederchen bezeichneten Blumen stehen in gestielten, aufrechten, haarigen, 3—4 Zoll langen Aehren. Der Kelch ist einblättrig, haarig, und in 4, zuweilen in 5 spitzige Einschnitte getheilt; die einblättrige radförmige Blu-

menkrone theilt sich in 4 etwas ungleiche stumpfe Lappen, wovon der obere am breitesten, der untere am schmalsten ist. Die Röhre der Krone ist sehr kurz.

Die Blüthezeit ist Juni und Juli. Das Kraut besitzt einen schwachen Geruch, und bitterlichen, zusammenziehenden, etwas balsamischen Geschmack.

Der Gamanderehrenpreis (Veronica Chamaedrys Linn.), mit welchem der ächte Ehrenpreis bisweilen verwechselt wird, unterscheidet sich durch seine nicht wurzelnden, bloß zweireihig behaarten Stengel, durch die breit-eiförmigen, am Grunde fast herzförmigen, stumpfen und tief stumpf-gesägten Blätter, und durch die länger gestielten, mehr blaß violetten Blumen.

Der Ehrenpreis wird gegen Brustkrankheiten im Aufgusse, welcher durch schwefels. Eisen schwärzlich gefärbt wird, empfohlen, ist jedoch mehr als Volksmittel gebräuchlich.

* Victorialis longa. Die Wurzel. Lange Allermannsharnischwurzel.

Allium Victorialis Linn. Langer Allermannsharnisch.
Linn. Cl. VI. Hexandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 7. Liliaceae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst auf den schweizerischen, italienischen, östreichischen und schlesischen Alpen und hohen Gebirgen. Die Wurzel besteht aus einer oder mehreren zusammensitzenden Zwiebeln, die lang, cylindrisch, geringelt und mit mehreren dicken, braungelben Häuten umgeben sind; die äußern Häute sind netzförmig. Sie trägt einen nackten, unterwärts bauchigen Blumenschaft, der länger als die runden Blätter ist.

Die getrocknete Wurzel — lange Siegmarswurzel — hat weder Geruch noch Geschmack, und wurde sonst häufiger, jetzt nur noch selten auf abergläubische Weise als Mittel gegen Viehkrankheiten gebraucht.

* Victorialis rotunda. Die Wurzel. Runde Allermannsharnischwurzel.

Gladiolus communis Linn. Schwertlilie.
Linn. Cl. III. Triandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. III. Ord. 7. Liliaceae.

Diese vornehmlich in den südlichern Gegenden Europas einheimische Pflanze wird in unsern Gärten häufig gezogen. Die Wurzel ist eine runde Zwiebel, die mit vielen netzartigen bräunlichen Häuten umgeben ist. Der Stengel wird einige Fuß hoch, und an demselben stehen an der Spitze 4—6 purpurrothe, irreguläre, sechsblättrige Blumen, die sämmtlich nach einer Seite des Stengels gebogen sind. Die Blätter sind lang, spitz, schwertförmig und mattgrün.

Die getrocknete geruch- und geschmacklose Wurzel — runde Siegmarswurzel — wird noch bisweilen zu ähnlichen Zwecken, wie die vorige, verlangt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0904-3

* Vincetoxicum. Die Wurzel. Schwalbenwurzel.

Cynanchum Vincetoxicum R. Brown. Der gemeine Hundswürger. Die gemeine Schwalbenwurzel.

Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 2. Digynia.

Juss. Cl. VIII. Ord. 14. Apocyneae.

Diese ausdauernde Pflanze wächst sehr häufig auf waldigen, trocknen Anhöhen und an ungebauten Orten.

Die Wurzel kriecht schief unter der Erde in geringer Tiefe, ist knollig, fast 2 Zoll lang, auswendig gelbröthlich und runzlig, mit schwieligen Narben oder Warzen bezeichnet, und treibt eine große Menge fadenförmiger Fasern, die sehr lang und weißlich sind. Der Stengel ist 2—3 Fuß hoch, krautartig, walzenrund, völlig glatt, wie die ganze Pflanze, sehr biegsam, fast einfach, und trägt gegenüberstehende, kurzgestielte, eiförmige, zugespitzte, ganz ungetheilte, am Grunde wenig herzförmige, glänzende und dunkelgrüne Blätter. Die ziemlich kleinen, weißen oder gelblichen, wohlriechenden Blumen stehen in kleinen gestielten Dolden, die aus den Blattwinkeln, besonders den obern, hervorkommen. Der Kelch ist einblättrig. Die Blumenkrone einblättrig, radförmig, in 5 Lappen getheilt.

Die Blüthezeit ist Mai bis Juli.

Die Wurzel, welche im Frühjahr eingesammelt werden muß, hat frisch einen starken, widrigen, haselwurzartigen, getrocknet einen kaum merklichen Geruch, und einen süßlichen, nachher bitterlichen und etwas scharfen Geschmack.

Feneulle (Geiger's Magazin. October 1825. S. 76.) wurde durch die Entdeckung des Emetins in der Ipecacuanha und in mehreren Pflanzen der Gattung Viola veranlaßt, diese Substanz auch in der Schwalbenwurzel zu suchen, die sonst als Brechmittel und gegen die Wassersucht im Gebrauche war. Auch in der weißen Ipecacuanha (Cynanchum Ipecacuanha), welche so wie die Schwalbenwurzel zur Familie der Apocyneen gehört, hat Pelletier unter andern Substanzen eine Materie gefunden, die er für Emetin hielt, später aber für eine alkalisch reagirende Verbindung einer färbenden Substanz mit einer Säure erkannte. Feneulle fand gleichfalls im Laufe seiner Analyse, daß das brechenerregende Princip der Schwalbenwurzel mit dem Emetin nichts gemein habe.

Die getrocknete Wurzel wurde nach einander mit Wasser, Alkohol und Aether behandelt. Die wäßrigen Auszüge wurden mit Bleiessig gefällt, und der Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Es war Aepfelsäure durch das Bleioxyd gefällt worden. Die Flüssigkeit, aus welcher der Niederschlag erhalten worden war, wurde durch einen Strom von Schwefelwasserstoffgas von Blei gereinigt, abgedampft und mit Alkohol digerirt, wobei Schleim zurückblieb.

Die geistige Auflösung erhielt Harz und eine in Wasser lösliche bittere Substanz (an Essigsäure gebunden? D.), welche aus dem durch Abdampfen erhaltenen Rückstande durch Wasser ausgezogen, und ohne Erfolg auf Eme-

tin behandelt wurde. Jetzt wurde die durch Alkohol erhaltene bittere Substanz, und die von der Prüfung auf Emetin übrig gebliebenen Waschwasser, mit schwacher Schwefelsäure digerirt, Magnesia im Ueberschusse zugesetzt, die Flüssigkeit mit thierischer Kohle gereinigt, abgedampft und Alkohol von 96 Procent hinzugefügt, wodurch die schwefels. Salze abgeschieden, und durch Verdampfen des Alkohols eine nicht krystallisirbare, bittere, blaßgelbe, an der Luft feucht werdende Substanz erhalten wurde. In diesem Zustande verursachten 3 Gran derselben bald ein allgemeines Uebelbefinden, Ekel und Erbrechen; in geringerer Menge verursachte dieselbe einen leichten Reiz im Magen, worauf Schweiß und nach einiger Zeit Stuhlgang folgte. Diese Substanz enthält keinen Stickstoff, ist in Wasser, Weingeist und Aetherweingeist völlig auflöslich und zeigt keine Spur von Alkalinität. Feneulle vermuthet, daß auch die brechenerregende Substanz in den übrigen Apocyneen, welche Brechwurzeln liefern, verschieden von dem Emetin sey.

Die von Feneulle gefundenen Bestandtheile der Schwalbenwurzel sind folgende: 1) eine brechenerregende Substanz, die von Emetin verschieden ist; 2) eine Art Harz; 3) Schleim; 4) Satzmehl; 5) fettes Oel, von beinahe wachsartiger Consistenz; 6) flüchtiges Oel; 7) Gallerte (Braconnot's Acide pectique); 8) Faserstoff; 9) äpfels. Kali und Kalk, Kieselerde, sauerklees. Kalk und andere Mineralsalze. Aus den eingeäscherten Wurzeln erhielt er: salzs. Kali; schwefels. Kali Spuren; schwefels., halbphosphors. Kalk und Kieselerde.

Die Abkochung dieser vielleicht mit Unrecht ganz außer Gebrauch gekommenen Wurzel bewirkt Erbrechen, in kleineren Gaben soll sie schweiß- und harntreibend seyn.

Vinum Gallicum. Der Spiritus. Franzbranntwein.

Wird durch Destillation aus französischen Weinen und aus den der weinigen Gährung unterworfenen Weintrestern bereitet.

Eine gelbliche, aus Alkohol, Wasser und irgend einem eigenen ätherischen Principe bestehende Flüssigkeit. Spec. Gew. = 0,940 — 0,950.

Vinum Gallicum. Der stärkere Spiritus. Sprit.

Wird durch vorsichtiger als bei der vorhergehenden angestellte Destillation aus französischen Weinen bereitet.

Eine farblose, vorzüglich aus Alkohol und Wasser bestehende Flüssigkeit. Spec. Gew. = 0,875 — 0,885.

Vinum Gallicum album. Weißer Franzwein.

Vinum Gallicum rubrum. Rother Franzwein.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0906-5 DFG

Vinum Hispanicum seu Malacense. Spanischer oder Malagawein.

Vinum Hungaricum. Ungarwein.

Vinum Rhenanum. Rheinwein.

Vitis vinifera Linn. Der gemeine Weinstock.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 12. Viniferae.

Der Weinstock ist ursprünglich in Asien, am kaspischen Meere, in Armenien und Karamanien einheimisch, von wo er zuerst nach Griechenland und Italien und von da in die übrigen benachbarten Länder Europas verpflanzt wurde. Nach Frankreich haben ihn, wie man glaubt, die Phönicier gebracht, als sie in der Nähe von Marseille Colonien gegründet hatten.

Der strauchartige, holzige und rankende Stengel erreicht, wenn er sich selbst überlassen bleibt, eine bedeutende Höhe; er ist ästig, rund, glatt und an den Knoten verdickt; die Rinde ist an dem jüngern Holze gelblichbraun und gestreift, an dem ältern löst sich die graue Epidermis in Längsstreifen ab, und die Rinde erscheint rissig aufgesprungen. Die Blätter stehen abwechselnd, sind herzförmig dreilappig, die obere Seite ist glatt, die untere netzförmig geadert. Den Blättern gegenüber entspringt eine lange ästige, glatte Ranke; in den Winkeln eine eiförmige spitze Knospe. Die kleinen, grünlichen Blüthen bilden eine aufrechte, sparrige, zusammengesetzte Traube (Racemus compositus). Die Frucht ist eine obere, gewöhnliche zweisaamige, sehr saftige Beere; die Saamen sind birnförmig und etwas zusammengedrückt.

Von dieser herrlichen Pflanze kommen zahlreiche durch die Cultur entstandene Spielarten vor, die sich theils durch die abweichende Form der Blätter, besonders aber durch die Gestalt, Größe, Farbe und den Geschmack der Früchte unterscheiden. Bei den weißen Trauben erscheinen viele Nuancen von Grün und Goldgelb, bei den rothen von rother, violetter und dunkelblauer Farbe. Auch ihre Gestalt und Größe ist sehr veränderlich, sie sind rund oder eiförmig, bei einigen Spielarten erreichen sie die Größe eines Zolles, bei andern werden sie nicht größer als eine Erbse; sie sind bald mehr bald weniger schmackhaft. In Spanien allein hat man 120 Spielarten gezählt.

Die reifen Weintrauben sind mit einem außerordentlich saftigen, milden und süßen Brei angefüllt, und gehören zu den angenehmsten und schmackhaftesten Früchten. Der ausgepreßte Saft dieser Trauben giebt durch die Gährung die verschiedenen Sorten des Weins, dessen Eigenthümlichkeit demnach von der Art der Traube, dessen Güte aber größtentheils von den klimatischen Verhältnissen, und der günstigen Witterung abhängt; denn es ist bekannt, daß heiße und trockne Sommer süßere und wohlschmeckendere Trauben, und demnach geistreichere und vorzüglichere Weine geben, als kalte und nasse Sommer.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0907-0

Zur Zeit der Reife werden die Trauben gelesen, in Butten zerstampft oder mit den Füßen zertreten. Der dabei auslaufende Saft heißt Most. Man läßt denselben 3 oder 4 Tage lang auf seinen Trebern stehen, während welcher Zeit die Gährung eintritt, die sich durch aufsteigende Blasen von kohlensaurem Gas ankündigt, welches sich in so ungeheurer Menge entwickelt, daß die Keller, in welchen die Gährungsfässer aufgestellt sind, für diese Zeit unzugänglich werden. Die entweichenden Gasblasen heben die festen Theile der Früchte in die Höhe und bilden einen dicken Schaum, den sogenannten Gäscht, der aus dem in einen andern Zustand übergegangenen Gährungsmittel und den zähen Theilen besteht. Allmälig läßt das Aufbrausen nach, und der Gäscht setzt sich zu Boden. Die Flüssigkeit wird jetzt in Fässer abgelassen, und ist nun der Wein. Dieser fährt zwar in den Fässern noch fort zu gähren, aber die Gährung ist langsamer, weil der größte Theil der zur Gährung beitragenden Stoffe schon zerstört ist, wodurch er noch an Weingeistgehalt gewinnt, welcher seinerseits die Abscheidung des Weinsteins und der Hefen bewirkt. Da der Farbestoff der rothen Weine in den äußern Hülsen enthalten ist, so werden aus diesen nur dann rothe Weine erhalten, wenn man, wie erwähnt, den Most mit den Trebern der Gährung unterwirft, wodurch nämlich der Farbestoff ausgezogen wird. Wenn man aber den Saft, gleich nachdem die Frucht zerstampft ist, abgießt, und in Fässern zur Gährung hinstellt, so erhält man auch aus rothen Trauben weißen Wein.

Die moussirenden Weine werden dadurch erhalten, daß man in den auf Fässer gezogenen Weinen die Gährung nicht ganz zu Ende gehen läßt, sondern sie vorher in Flaschen füllt. Die Kohlensäure wird dadurch gezwungen, sich in dem Weine aufzulösen, und übt dann zugleich auf die Flüssigkeit einen solchen Druck aus, daß die Gährung aufhört. Beim Oeffnen der Flasche erregt die große Menge Kohlensäure den perlenden Schaum; auch beginnt jetzt in der Flüssigkeit die zurückgehaltene Gährung wieder.

Die süßen Weine werden in Spanien, Italien, im südlichen Frankreich, und in allen heißen Ländern bereitet, wo der Saft schon in den Trauben durch die Sonne concentrirt wird, wozu man sie noch einige Zeit am Stocke hängen läßt, und welche mehr Zucker enthalten, als durch das vorhandene Ferment in Weingeist verwandelt werden kann. Ein an Ferment reicher, an Zucker aber armer Traubenmost läßt sich dagegen oft durch einen Zusatz von Zucker verbessern.

Der frische Traubenmost, welcher trübe und von sehr süßem Geschmacke war, ist durch die Gährung gänzlich verändert worden, und hat jetzt einen geistigen und stechenden Geschmack, indem der Zuckergehalt durch die geistige Gährung in Weingeist verwandelt worden ist. Je weiter diese Gährung allmälig vorschreitet, desto reichhaltiger an Alkohol und zugleich desto mehr von dem Weinsteine befreit werden die Weine, daher alter Wein höher geschätzt wird, als junger, welcher letztere von dem vielen aufgelösten Weinstein einen sauern Geschmack erhält.

Der weiße Franzwein hat eine weißgelbliche, lichtgelbe oder gelbe Farbe,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0908-6

einen geistigen belebenden Geruch, und einen süß-säuerlichen, angenehmen Geschmack. Er muß nicht die Zähne stumpfen, und bei gelindem Feuer so lange abgedampft, bis alles Geistige verflogen ist, muß er einen etwas säuerlich und herbe schmeckenden Rückstand lassen.

Der rothe Franzwein hat einen angenehm herben, etwas zusammenziehenden Geschmack.

Der Malagawein hat eine gesättigt gelbrothe Farbe, und einen geistigen, süßen, hintennach kaum etwas bitterlichen Geschmack. Dieser Wein ist häufig nachgekünstelt aus gewöhnlichem Wein, Rosinen ꝛc.

Der Ungarwein ist gelblich gefärbt, reich an Weingeist, und auch noch unzersetzten Zucker enthaltend.

Der Rheinwein hat einen etwas säuerlichen Geschmack und eigenthümlichen, lieblichen, nach den verschiedenen Sorten verschiedenen Geruch.

Der Alkoholgehalt ist in den verschiedenen Weinen verschieden, von 9 bis 26 Procent.

Alle Weine bestehen aus Wasser, Alkohol, Schleim, einer vegetabilisch-animalischen Materie, Essigsäure, saurem weinsteins. Kali, weinsteins. Kalke, schwefels. Kali, salzs. Natron und aus einer Spur Gerbestoff, Extractivstoff, zu welchen Bestandtheilen bei den rothen Weinen noch ein in Alkohol auflöslicher Farbestoff kommt.

Ein geringer Essiggehalt, wenn gleich nicht wesentlich zum Bestehen des Weins, findet sich wohl jederzeit, indem ein kleiner Theil Alkohol durch die Essiggährung in Essig übergeht; jedoch ist der Wein um so besser, je weniger er davon enthält, und je schwächer er die Lackmustinctur röthet. Ist die saure Gährung zu weit vorgeschritten, so werden bisweilen von den Weinhändlern Mittel versucht, durch absorbirende Stoffe — Alkalien, Erden — die entstandene Essigsäure wegzunehmen. Diese Substanzen geben aber dem Weine eine dunkelgrünliche Farbe, und einen Geschmack, der zwar nicht sauer, doch aber etwas unangenehm ist. Kalkerden tragen überdies auch in hohem Grade zur Zersetzung und Fäulniß des Weins bei, auch würde in diesem Falle kleef. Kali oder kleef. Ammoniak einen bedeutenden Niederschlag hervorbringen, wogegen der durch diese Reagentien in einem natürlichen Weine hervorgebrachte Niederschlag, wegen des stets in demselben jedoch gewöhnlich in geringer Menge vorhandenen weinsteinsauren Kalkes, nur unbedeutend seyn wird. Sollte die Säure durch Kali oder Natron abgestumpft seyn, so wird man schon das essigs. Kali oder Natron am Geschmacke erkennen. Nach Deyeux soll man einen solchen Wein mit einer Auflösung des salzs. Kalkes vermischen, wo durch das Alkali der salzs. Kalk zersetzt, und eine Trübung erzeugt werden soll. Wenn das Alkali aber nicht im Uebermaße vorhanden ist, was wohl selten eintreffen möchte, so wird hier nur auflöslicher essigs. Kalk gebildet. Besser ist es, daß man einen solchen Wein abraucht, und aus dem gewonnenen Salze (Weinsteinkrystalle werden aus jedem Weine erhalten werden) die Essigsäure durch Schwefelsäure entbindet. Auch Magnesia wird zur Abstumpfung der Säure angewandt; diese Verfälschung wird aber

durch ätzendes Kali erkannt, welches aus der Flüssigkeit die Magnesia niederschlägt; doch findet sich auch wohl diese Erde in unverfälschten Weinen.

Die Benutzung der Silberglätte, um den sauer gewordenen Weinen den sauren Geschmack zu benehmen, kommt wohl, da die hierdurch bewirkte Vergiftung der Weine allgemein bekannt ist, gewiß nur noch selten vor. Ein solcher Wein wird schon durch einen süßen zusammenziehenden Geschmack verdächtig, welcher Verdacht durch Hahnemann's Probeflüssigkeit, welche das Blei schwarzbraun fällt, bestätigt werden wird. Sicherer entdeckt sich diese Verfälschung dadurch, daß man den durch kohlens. oder schwefels. Natron erzeugten Niederschlag von kohlens. oder schwefels. Bleioxyd gehörig abwäscht, und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Die geringste Menge des in dem Niederschlage enthaltenen Bleies wird sich durch die schwarze Färbung verrathen. Man kann auch eine Quantität Wein eindampfen und den Rückstand in einem Tiegel schmelzen, auf dessen Boden das reducirte Bleikügelchen wahrgenommen werden wird. Hydrothions. Ammoniak darf hier, wie Buchner (Repert XXIV. 2. S. 169.) mit Recht bemerkt, nicht als Reagens angewendet werden, da schon die weißen Weine bei Vermischung mit alkalischen Flüssigkeiten eine dunkle Farbe annehmen. Auch ist es schon längst bekannt, daß alter Moselwein oder Rheinwein bei Vermischung mit Selter-, Fachinger- und einigen andern Mineralwässern eine schwärzliche Farbe annehmen; ferner, daß ein Ei, in weißen säuerlichen Wein gelegt, nach wenigen Stunden mit einem dunkeln Niederschlage bedeckt wird. Dieser Niederschlag rührt zum Theil vom Farbestoffe des Weins her, zum Theil aber auch von Eisen- und andern Metalloxyden. Die mineralischen Wässer wirken durch ihren Gehalt an kohlens. Natron. Aus Moselwein und Markebrunner Rheinwein schlägt Aetzammoniak röthlichbraune Flocken nieder, die hauptsächlich aus Alaunerde mit einer sehr geringen Menge Eisenoxyd und einer braun gefärbten vegetabilischen Substanz bestehen. Beide Weine werden auf Thonschiefer gezogen.

Aehnliche Niederschläge zeigen bisweilen Weinessige, wenn sie aus solchen viel Alaunerde und Farbestoff enthaltenden Weinen bereitet worden sind. Bei polizeilichen Untersuchungen der Weine und Weinessige muß man daher, um nicht getäuscht zu werden, möglichste Vorsicht und Gegenversuche mit reinen Proben anwenden.

Den rothen Weinen soll bisweilen Alaun zugesetzt werden, um ihnen den zusammenziehenden Geschmack zu ertheilen. Als Prüfungsmittel für diese Verfälschung werden der stark zusammenziehende Geschmack, die Niederschläge mit salzs. oder salpeters. Baryt und mit kohlens. Ammoniak, und die Darstellung der Alaunkrystalle angegeben, dadurch, daß man den Wein bis zum vierten Theile verdampft, mit Alkohol vermischt und ruhig hinstellt. Allein diese Verfälschung kommt wohl auch nur selten vor, und wenn auch ein rother Wein mit salzsaurem Baryt einen ziemlichen röthlichweißen Niederschlag giebt, und dieser Wein durch kohlens. Ammoniak auch merklich getrübt wird, so folgt daraus noch nicht die Verfälschung dieses Weins mit Alaun, da die

Bestandtheile des Bodens, auf welchem der Weinstock wächst, zum Theil in den Wein mit übergehen. Pfeiffer fand in 100 Unzen guten Pisporter Weins 22 Gran salzs. Alaunerde und 100 Gr. äpfels. und essigs. Magnesia.

Die meisten Künsteleien, welche mit rothen Weinen vorgehen, betreffen die Farbe desselben. Um eine solche Verfälschung zu entdecken, ist von Cadet de Gassicourt vorgeschlagen, den zu prüfenden Wein mit Alaunsolution zu versetzen, und dann mit Kali niederzuschlagen. Später schlug Vogel (Schw. J. XX. S. 412.) zu diesem Endzwecke eine Auflösung des Bleizuckers vor, indem ein ächter rother Wein dadurch grünlichgrau, andere Farbestoffe aber mit andern Farben gefällt würden, was jedoch keine sichern Resultate giebt. Nees v. Esenbeck (Ueber die künstliche Färbung der rothen Weine. Düsseldorf 1826, u. Brandes's Archiv XVII. S. 269.) hat wieder der von Cadet de Gassicourt gewählten Probe den Vorzug gegeben, und folgende Vorschrift gegeben: 3 Drachmen Alaun löse man in 4 Unzen destillirten Wassers auf, und mische davon in einem Cylinderglase mit dem zu prüfenden Wein ein gleiches Volumen zusammen, wodurch die Farbe des letztern erhöht und blässer wird. Nun tröpfelt man zu dem Gemische eine Auflösung von gereinigter Potasche in ihrem vierfachen Gewichte, doch so, daß davon nicht zu viel, wenigstens nicht bis zur alkalischen Reaction dazu kommt. Der hierdurch gefällte Lack, d. h. die Verbindung von Farbestoff mit Alaunerde, zeigt, noch in der Flüssigkeit betrachtet, in der Regel eine schmutziggraue, mehr oder weniger ins Rothe neigende Farbe, und hat nur bei gewissen jungen rothen Weinen einen ins Grüne gehenden Schein. Alle künstlich gefärbten Weinproben gaben anders gefärbte Niederschläge, und zwar die mit Klatschrosenblumen einen bläulichgrauen, die mit den Beeren des Hartriegels (Ligustrum vulgare) einen violettblauen, die mit Heidelbeeren (Vaccinium Myrtillus) einen noch mehr ins Blaue neigenden, die mit Attichbeeren (Sambucus Ebulus) und mit Kirschen einen violetten, die mit Blauholz (Haematoxylon campechianum) einen violettgrauen, die mit Scharlachbeeren (Phytolacca decandra) und mit Fernambukholz (Caesalpinia Sappan und C. vesicaria) gefärbten Weine einen rosenrothen Lack.

Nees v. Esenbeck (Brandes's Archiv. XX. S. 193.) hat seine Versuche fortgesetzt, und eine Untersuchung des natürlichen Farbestoffs der blauen Weintrauben unternommen. Die schwarzblaue Farbe der Trauben rührt von einem purpurrothen Farbestoffe her, welcher sich aus der äußern Fruchthülle (Epicarpium) auf der innern Seite absondert, nach außen tritt der sogenannte Reif (Pflanzenwachs) hervor. Der innere markige Theil der Traubenbeere besteht aus einem weiten und unregelmäßig eckigen mit grünlichem Safte erfüllten Zellgewebe.

Aus den blauen Traubenhülsen wurden als nähere Bestandtheile abgeschieden: 1) ein grünlichgelbes eigenthümliches Hartharz; 2) Pflanzenwachs (der Reif der Trauben); 3) ein violetter extractiver veränderlicher Farbestoff; 4) ein brauner eisengrünender Gerbestoff; 5) ein gummiger Extractivstoff;

6) Traubenzucker; 7) Chlorophyll; 8) Weinstein und eine Spur einer freien in Weingeist löslichen Säure (Aepfelsäure).

Der violette Farbestoff ist, nach dem Verf., ein nur durch die freie Säure gerbtheter Extractivstoff. Die getrockneten Hülsen gaben mit Weingeist von 80 Procent digerirt eine bräunlich gefärbte Tinctur, die durch Säuren hochroth, durch Alkalien grün gefärbt wurde. Beim Verdunsten des Weingeistes wurde ein dunkelrothes Extract erhalten, welches jetzt schwach sauer reagirte, aus dem durch Aether das Hartharz ausgezogen, und welches dann mit Alkohol so lange ausgewaschen wurde, als dieser noch roth gefärbt erschien; im Rückstande blieb Traubenzucker mit Gerbestoff und etwas anhängendem Farbestoffe. Der auf diese Weise gereinigte Farbestoff lieferte eine purpurrothe, fast geschmacklose, in dünnen Lagen durchscheinende Substanz, die leicht Feuchtigkeit aus der Luft anzog, sehr wenig sauer reagirte, durch Säuren schön hochroth, durch Alkalien schön grün gefärbt, durch Alaun und kohlens. Kali, wie der reine rothe Wein, graulichweiß niedergeschlagen wurde. Dieser Farbestoff ist im wäßrigem Weingeiste leichter, als in Wasser löslich, wird daher von einem stärkern Weine in größerer Menge aufgenommen, als von einem schwächern. Da derselbe ferner nur durch die freie Säure roth erscheint, so erklärt sich hieraus leicht, warum die edlern Weinsorten stets mehr violettroth, die geringern Landweine hingegen, welche weniger Weingeist und mehr Säure enthalten, mehr hochroth gefärbt sind.

Da alle übrigen Pflanzensäfte aus reifen saftigen Früchten der weinigen Gährung fähig sind, und derselben unterworfen weinige Flüssigkeiten geben, als Cyderwein u. s. w., so könnte auch wohl ein solcher Wein zur Versetzung der wahren Weine gebraucht worden seyn. Um dieses zu erkennen raucht man den Wein bis zur Syrupsdicke ab, und löst den Rückstand in Wasser wieder auf, um die Abscheidung des Weinsteins zu bewirken, worauf man bei neuem Verdampfen einen Syrup erhält, der sehr ausgezeichnet nach Birnmost ꝛc. riecht und schmeckt, und bis zur Trockne abgedampft eine halbdurchsichtige sehr zuckerhaltige Materie darstellt. Pagenstecher (Berl. Jahrb. XXV. 1. S. 205.) hat Platinlösung als Reagens empfohlen. 8—10 Unzen Wein werden abgedampft, der Rückstand mit Weingeist von 70 Procent so lange ausgewaschen, bis derselbe nichts mehr davon aufnimmt. Hierauf wird er mit 3 Drachmen destillirten Wassers übergossen, und das Ganze nach mehrmaligem Durchschütteln auf ein vorher naß gemachtes Filter gebracht. Wird die klar abgelaufene Flüssigkeit mit Platinlösung reichlich niedergeschlagen, so war Obstwein vorhanden. Der Rückstand vom Traubenweine giebt nämlich an den Weingeist seine kalischen Salze bis auf den Weingeist und das schwefels. Kali ab, daher die nachherige wäßrige Auflösung nur wenig Kali enthält, welches aber in dem Rückstande des Obstweines noch immer in sehr reichlicher Menge vorhanden ist, und daher das gelbe Platinsalz noch reichlich erzeugen wird.

Ueberschwefelter Wein wird von salpeters. Silber schwarz oder braun, auch wohl bei geringerer Ueberschwefelung nur braunroth gefärbt.

Die Bereitung des Franzbranntweins wird in großen Destillirblasen vorgenommen, welche 5—6 Centner Wein enthalten. Auch werden die Weintrestern hierzu benutzt. Die gelbe Farbe des Franzbranntweins rührt von den eichenen Fässern her, in welchen er verführt wird, der eigenthümliche Geschmack aber ohne Zweifel von den flüchtigen Bestandtheilen des Weins, einem wesentlichen Oele, welches bei der Destillation mit übergeht. Der Sprit ist nur durch größeren Alkoholgehalt vom Franzbranntwein unterschieden.

Viola tricolor seu Jacea. Das Kraut. Freisamkraut. Stiefmütterchenkraut.

Viola tricolor Linn. Eine einjährige an sandigen Orten und in Gärten häufige Pflanze.

Das blühende, etwas scharfe Kraut, mit wechselsweise stehenden, eiförmigen und länglichen, stumpfen, gekerbten Blättern, halbgefiederten Afterblättern, fünfblättrigen, großlippigen, bläulichen oder gelben Blumenkronen. Im Sommer einzusammeln.

Viola tricolor Linn. Das dreifarbige Veilchen. Stiefmütterchen.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 19. Cistineae.

Diese Pflanze wächst durch ganz Europa auf sonnigen Plätzen, sandigen Aeckern und in Gärten.

Die Stengel sind dreikantig, ästig, weitschweifig und liegend. Die Blätter sind abwechselnd, herunterlaufend, gestielt, von gelblichgrüner Farbe. Die Blumen sind oft zwei- auch dreifarbig, die gemeinsten sind gelb und weiß, etwas seltner sind die blaßblauen und gelben, die ganz purpurblauen oder purpurblauen und gelben, die wirklich dreifarbigen sind nur in Gärten anzutreffen, wo sie wegen ihrer Größe und angenehmen Farbe sehr bald in die Augen fallen, da hingegen die auf den Aeckern wildwachsenden meistens kaum halb so große Blumen hervorbringen. Diese stehen einzeln auf langen Stielen in den Blattwinkeln. Die zwei, meistentheils abwechselnden Deckblättchen sind klein und gefärbt. Der Kelch ist glatt und fünfblättrig; die Blumenkrone fünfblättrig, unregelmäßig und noch einmal so groß als der Kelch.

Die Blüthezeit ist vom März den ganzen Sommer hindurch.

Wenn gleich das dreifarbige, auf fetten Wiesen gewachsene Veilchen meistentheils in den Apotheken verlangt wird, so ist doch das zartere zweifarbige, entweder blau und weiß, gelb und weiß, oder blau und gelb blühende Veilchen die heilkräftigere Pflanze, da sie weit schärfer und bitterer schmeckt.

Die blühende Pflanze hat gerieben einen pfirsichähnlichen Geruch, und einen bitterlichen, schleimigen, etwas scharfen Geschmack. Bei der Destillation mit Wasser soll es eine geringe Quantität ätherisches Oel von etwas

scharfem Geschmacke geben. Das Kraut wird in der Abkochung oder als Thee sehr gegen Hautausschläge gerühmt; in größeren Gaben soll es brechenerregende und purgirende Eigenschaften zeigen. (Vergl. den folgenden Artikel).

Viola. Die Blume. Veilchenblume.

Viola odorata Linn. Eine ausdauernde in Wäldern wild wachsende, in Gärten häufig gezogene Pflanze.

Die Blumen mit einem gesperrten, fünfblättrigen Kelche, fünfblättrigen, großlippigen, gesättigt blauen Blumenkronen, von sehr angenehmen Geruche.

Viola odorata Linn. Das wohlriechende Veilchen.
Linn. Cl. V. Pentandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. XIII. Ord. 19. Cistineae.

Diese allgemein bekannte Pflanze wächst fast durch ganz Europa in schattigen Wäldern, in Obstgärten, an Zäunen und auf Wiesen. Ihrer wohlriechenden Blumen wegen wird sie auch in Gärten gezogen, wo sie auch mit gefüllten Blumen angetroffen wird. Sie ist eine von den ersten Blumen, welche den Frühling ankündigen.

Der Stamm bildet einen unterirdischen, wagerechten, ungleichen und schuppigen Wurzelstock von schmutzig weißer Farbe und der Stärke einer Schreibfeder. Er treibt eine Menge ästiger, schopfartiger Würzelchen. Dieser Wurzelstock, den man gewöhnlich als Wurzel betrachtet, ist aus einer weißen, zelligen Achse, und einer fleischigen, jene einschließenden Lage zusammengesetzt. Die Blätter entstehen büschelweise am Ende des Stammes und seinen Verzweigungen, und sind am Grunde mit zwei Schuppen, oder dünnen, eirunden, spitzen, gewimperten Nebenblättern besetzt. Der Blattstiel ist 3—4 Zoll lang, und an der Innenseite rinnenförmig, stumpf, am Rande fein gekerbt und schwach behaart. Die einzelnen Blüthen stehen auf achselständigen, dünnen Stielen, welche von der Länge der Blattstiele, und am Ende umgebogen sind. Ihre Farbe ist ein schönes Violettblau, und ihr Geruch äußerst angenehm. Der Kelch besteht aus fünf tiefen Abschnitten. Die Krone ist unregelmäßig, fünfblättrig; die beiden obern Blumenblätter sind zurückgebogen, das untere, größte, geht am Grunde in einen kurzen stumpfen Sporn über.

Die Blumenblätter der Viola canina und der V. hirta sind größer, blässer von Farbe und ohne Geruch.

Nach Dubac's Bemerkungen über Veilchensaft und Veilchentinctur (Trommsd. J. VIII. 1. S. 280.) hat Pagenstecher (Buchn. Repert. XIV. S. 219. und Berl. Jahrb. XXV. 1. S. 197.) eine Untersuchung des Aufgusses der Veilchenblumen angestellt und gefunden: Pflanzeneiweiß; einen blauen Farbestoff, der von den essigs. Bleisalzen nicht gefällt wird, und die Eigenschaft besitzt, von Schwefelwasserstoffgas völlig entfärbt zu werden;

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0914-9

einen hochrothen sauren Farbestoff, der die Lösung des Bleizuckers blaugrün fällt; einen violettrothen Farbestoff, der in der Lösung des Bleizuckers keinen Niederschlag bewirkt, hingegen die des basischen essigs. Bleioxyds grüngelb niederschlägt; ferner Gummi; krystallinischen Zucker, Schleimzucker, Kalk- und Kalisalze.

Boullay (Kastn. Archiv I. 4. S. 478.) fand, daß das wohlriechende Veilchen ein eigenthümliches, bitteres, scharfes, giftiges, dem Emetin der Ipecacuanha ähnliches Alkaloid als wirksamen Bestandtheil enthalte, welches er mit dem Namen Violin bezeichnet. Die kräftigen giftigen Eigenschaften dieser Substanz sind von Orfila bestätigt worden. Dieses Princip befindet sich sowohl in der Wurzel, als in den Blättern und Blumen, ja selbst in den Saamen des wohlriechenden Veilchens. In jedem dieser Theile ist es mit andern Pflanzenstoffen verbunden, die seine Wirkung auf den thierischen Körper abändern. Anfangs erhielt Boullay dasselbe in einem dem braunen Emetin ähnlichen Zustande; es zeigte auch mit demselben sehr übereinstimmende Eigenschaften, nur mit dem Unterschiede, daß sich statt der in dem Emetin befindlichen Gallussäure bei diesem Aepfelsäure vorfand.

Boullay hat außerdem in den Blumen des wohlriechenden Veilchens die Gegenwart von Ammoniak nachgewiesen, und dieses zur Erklärung des Farbezustandes der Blumen und dessen Veränderung benutzt. Freies Ammoniak sowohl als an Säuren gebundenes ist in einer großen Anzahl Pflanzen bei voller Vegetation vorgefunden worden. Concentrirtes destillirtes Wasser von Chenopodium Vulvaria enthält kohlens. und essigs. Ammoniak, ja die Ausdünstungen dieser Pflanze haben sich ammoniakhaltig gezeigt; ferner Ysop, Wegebreit, Lattich, Lindenblüthen u. s. w.

Gewöhnlich werden die von den Kelchen befreiten Blumen der Veilchen im frischen Zustande mit Wasser übergossen (wozu man sich zinnerner Gefäße zu bedienen pflegt, wodurch die Farbe des Aufgusses schöner und beständiger wird, ohne daß wir eine hinreichende Ursache dafür angeben können), und aus dem colirten Aufgusse der Veilchensyrup bereitet. Die Blätter der eben aufgeblühten Blume geben die dauerhafteste und zugleich schönste Blumenfarbe; von etwas älteren Blättern ist die Tinctur schon etwas mehr ins Rothe sich ziehend, und die Farbe vergänglicher; die noch ältern Blätter geben eine schmutzigblaue Tinctur, die am schnellsten ihre Farbe verliert. Alkohol mit Veilchen digerirt, macht sie ganz weiß, ohne sich selbst zu färben. Säuren verwandeln die blaue Farbe in die rothe, Alkalien in die grüne, daher auch der Veilchensaft als Reagens hierauf benutzt wird.

Viscum album. Mistel.

Viscum album Linn. Ein kleiner Schmarotzerstrauch der Eiche, Buche, Linde, Fichte und anderer Bäume.

Die jüngern, gabelförmigen, bei ihrem Ursprunge ringförmiggegliederten Aestchen mit grün-gelblicher Oberhaut, zugleich

mit den gegenüberstehenden, länglichen, stumpfen, ganzrandigen, lederartigen, gelbgrünen Blättern.

Viscum album Linn. Der weiße oder gemeine Mistel.
Linn. Cl. XXII. Dioecia. Ord. 1. Tetrandria.
Juss. Cl. XI. Ord. 3. Caprifoliaceae.

Der weiße Mistel wird fast durch ganz Deutschland, überhaupt durch ganz Europa angetroffen, und wächst auf den Stämmen und Aesten vieler Wald- und Obstbäume, deren Saft er aussaugt. Die Stengel sind aufrecht, holzig, von der Dicke eines kleinen Fingers, 1—2 Fuß hoch, und in zahlreiche, auseinander gesperrte, gabelförmig gegenüberstehende, runde, etwas rauhe, gegliederte, oft zu 2, 3 und 4 aus einem Punkte entspringende und nach allen Seiten ausgebreitete Aeste getheilt. Die gegenüberstehenden immergrünen Blätter sind stiellos, aufrecht, abstehend, steif, etwas dick, auf beiden Seiten glatt, mit 3 oder 5 schwachen Nerven durchzogen. Die Blüthen stehen an den Spitzen und in den Theilungswinkeln der Stengel und der Aeste zu 2 oder 3 beisammen in fast viereckiger Blumenhülle, sind stiellos und grünlichgelb. Die Frucht ist eine kugelrunde, glatte, weiße, fast durchsichtige, einfächerige, einen herzförmigen, zusammengedrückten, stumpfen Saamenkern enthaltende, und mit schleimig-klebrigem Safte angefüllte Beere.

Die Blüthezeit des weißen Mistels ist Februar und April, die der Fruchtreife October bis December.

Die Stengel und Zweige des vorzüglich von den Eichen genommenen Mistels, Eichenmistel, **Viscum quernum s. quercinum**, sind officinell. Im frischen Zustande haben sie einen ekelhaften, harzigen Geruch und etwas zusammenziehenden Geschmack. Durch das Trocknen vergeht der Geruch, und der Geschmack wird bitterlich, etwas zusammenziehend. Man sammelt den Mistel, dessen frische Rinde, vorzüglich aber die Beeren, eine große Menge einer eigenthümlichen klebrigen Materie enthalten, im December, und hebt das gleich nach dem Trocknen davon bereitete Pulver in fest verstopften Gläsern auf. Der an Eichbäumen wachsende Mistel ist von jeher zum Arzneigebrauche vorgezogen worden, und stand vormals gegen Epilepsie in großem Ansehn.

Henry (Geiger's Magaz. 1824. Oktober S. 50.) hat die Beeren von dem an Aepfelbäumen wachsenden Mistel untersucht, und besonders die in ihnen befindliche klebrige Materie. Diese ist unauflöslich in Weingeist, Aether, fetten und ätherischen Oelen und in Essigsäure. Wasser bildet damit eine klebrige undurchsichtige Flüssigkeit, aber aufzulösen vermag es dieselbe weder in der Kälte noch in der Wärme; bei Concentrirung der Flüssigkeit wird sie klebriger, erhält aber nie eine gallertartige Beschaffenheit. Alkalien lösen dieselben auf, verändern sie aber auch zugleich; durch Salpetersäure wird sie zu Kleesäure verwandelt. Sie besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, enthält keinen Stickstoff, weshalb sie auf Kohlen auch keinen thierischen Geruch verbreitet. Die einzige Substanz, der sie sich in etwas nä-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0916-0

hert, ist der unlösliche Schleim einiger Gummiarten (Bassorin), sie unterscheidet sich aber davon durch ihre gänzliche Unlöslichkeit in heißem Wasser, und dadurch, daß sie mit der Salpetersäure keine Schleimsäure (Milchzuckersäure) bildet.

Auch Funke (Taschenbuch für 1825. S. 30.; Buchn. Repert. XIII. S. 86.) untersuchte den Mistel, und fand in 100 Th. frischer Beeren: Schleimstoff, der innigst mit dem Farbestoffe zusammenhängt, und sich nur durch vieles Wasser abscheiden läßt, 10; Faser, Häute und Saamen mit grünem Weichharze 10; wäßrige Feuchtigkeit 80. In der getrockneten Pflanze: Harzstoff 2,5; Schleimstoff 65,0; Extractivstoff mit essigs. Salzen und mit prädominirender Säure 5,0; Faserstoff 27,5.

100 Th. Asche der Mistelpflanze enthielten: schwefels. Kali 6; salzs. Kali 0,5; kohlens. Kali 19,0; Kieselerde 1,5; phosphors. Kali 30,0; Talkerde 43,0. Merkwürdig ist der große Gehalt an phosphors. Kali und an Talkerde, sowie die gänzliche Abwesenheit der Metalloxyde.

Der Saft der Beeren wird zur Bereitung des Vogelleims (Viscus aucuparius) benutzt, zu welchem auf jedes Pfund des zur gehörigen Dicke verdunsteten Schleims 3—4 Loth Terpenthin zugemischt werden.

* Vitis. Pampini cum Foliis. Weinranken mit den Blättern.

Vitis vinifera Linn.

Die Blätter des Weinstocks schmecken herbe und adstringirend; sie sind gegen Diarrhöe, so wie gegen chronische Katarrhe empfohlen worden. Man fand die getrockneten Blätter aus viel Gerbestoff und Weinsteinsäure, etwas Gummi und harzigem Stoffe bestehend.

Vitriolum album. Zincum sulphuricum venale. Sulphas zincicus venalis. Weißer Vitriol. Käufliches schwefelsaures Zink.

Wird auf Hüttenwerken aus den Zinkerzen bereitet.

Ein krystallinisches, dichtes, weißes Salz, von zusammenziehendem metallischem Geschmacke, in 2—3 Theilen Wasser auflöslich, aus Zinkoxyd und Schwefelsäure bestehend, gemeiniglich mit Eisen und Kupfer verunreinigt, was durch blausaure Eisenkali-Auflösung und durch Aetzammoniakflüssigkeit erkannt wird. Dasjenige, welches mit Kupfer verunreinigt ist, werde verworfen.

Das schwefelsaure Zinkoxyd, Zinkvitriol, weißer Gallizenstein, Kupferrauch, kommt sehr häufig in Grubenwässern gewisser Bergwerke aufgelöst vor, z. B. zu Fahlun, wo es mit schwefelsaurer Talkerde, schwefels. Kupferoxyd

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0917-6

und schwefels. Eisenoxydul gemischt ist. In Goslar wird dasselbe aus zinkhaltigen Silbererzen, durch Röstung derselben und Auslaugen mit Wasser, fabrikmäßig bereitet. Die gerösteten Erze werden nämlich noch glühend in Wasser geworfen, worin sich das durch Rösten in den Erzen erzeugte schwefelsaure Zinkoxyd, sammt dem schwefels. Kupfer und Eisen, auflöset. Das Ablöschen der gerösteten Erze in Wasser wird so oft wiederholt, bis dieses den gehörigen Grad von Sättigung erlangt hat. Die abgelassene Lauge läßt man während einiger Zeit durch Absetzen sich klären, dann versiedet man sie in bleiernen Pfannen, mit Zusatz von etwas metallischem Zinke. Die durch Abdampfen krystallrecht gewordene Lauge läßt man, nachdem sie sich in der Siedpfanne durch ruhiges Stehen geklärt hat, noch heiß in hölzerne Bottiche ab, wo sie beim gänzlichen Erkalten krystallisirt Die Krystalle bringt man in einem kupfernen Kessel in den Wasserfluß, nimmt den Schaum mittelst eines Haarsiebes ab, schöpft die Flüssigkeit dann in hölzerne Tröge, läßt sie hier unter fortwährendem Umrühren erkalten, und preßt die griesige Salzmasse in hölzerne Kasten oder konische Formen, in denen sie zu einer weißen, festen, dem Hutzucker ähnlichen Masse zusammenbackt. Der eisenhaltige Zinkvitriol wird an der Luft gelb, der kupferhaltige bläulich.

Du Menil hat den käuflichen goslarischen Zinkvitriol untersucht, und ihn in 100 zusammengesetzt gefunden aus 59,50 Zinkvitriol, 16,62 Eisenvitriol, 5,26 Manganvitriol uud 1,12 Kupfervitriol. Der Verlust von 18,5 besteht größtentheils aus Wasser, da der Zinkvitriol so wie er im Handel vorkommt, also nicht vollkommen trocken, zur Untersuchung angewendet wurde.

*Winteranus. Die Rinde. Winter'sche Rinde.

Drymis Winteri Forst. Winter's Rindenbaum.

Linn. Cl. XIII. Polyandria. Ord. 7. Polygynia.

Juss. Cl. XIII. Ord. 15. Magnoliaceae.

Dieser Baum ist in den sonnigen Thälern des südlichen Amerikas, bei der Magellanischen Meerenge, wo er zuerst 1577 von dem Capitain Winter entdeckt wurde, nach v. Martius auch in Brasilien einheimisch.

Der Stamm ist in Hinsicht der Größe sehr verschieden, so daß er von 6—40 Fuß Höhe vorkommt; er ist mit einer außen grauen, innen braunen aromatischen Rinde bekleidet. Die Blätter stehen abwechselnd, sind gestielt, länglich, gegen das Ende etwas breiter und stumpf zugespitzt, glatt, lederartig, oben dunkelgrün, unten blaugrün, 3—4 Zoll lang, 1—1½ Zoll breit. Die Blüthen sind ziemlich klein und stehen bald einzeln, öfter zu 5—8 vereinigt an den Spitzen der Zweige. Der Kelch besteht aus drei bräunlichen Blättchen. Die Blumenkrone ist aus 6—10 weißen Blumenblättern gebildet. Die Staubfäden sind kurz, die Staubbeutel groß und gelb. Die Frucht besteht aus 2—3 schwarzen Beeren.

Die Rinde (Cortex Winteri, C. Winteranus verus, C. Magellanicus) wurde im Jahr 1577 von Winter nach Europa gebracht und nach

ihm benannt. Sie kommt in Stücken von verschiedener Länge, 3—6 Zoll, im Handel vor. Die Dicke dieser zusammengerollten Stücke beträgt oft kaum einen Zoll, oft zwei Zoll und drüber. Die Rinde selbst ist ungefähr 3 Linien dick, außen bald mit einer dicken, runzligen Oberhaut versehen, bald glatt, gelblich, gerunzelt oder röthlichgrau, mit oder ohne dunklere Narben von sternförmigen Erhabenheiten, die in ihrem frischen Zustande auf der Oberhaut fest haften, innen röthlichbraun, zimmtfarbig, auf dem Bruche dicht und körnig. Die Rinde verbreitet, besonders wenn sie gerieben wird, einen eigenthümlichen aromatischen Geruch, und besitzt einen sehr starken brennendscharfen, aromatischen Geschmack, der beim längern Kauen etwas zusammenziehend, wenig bitter wird.

Diese Rinde giebt bei der Destillation ein gelbes, durchdringend riechendes, ätherisches Oel von terpenthinartigem Geschmacke, welches nach Henry specifisch leichter als das Wasser ist, nach einiger Zeit aber butterhaft wird, und zu Boden sinkt.

Henry (Almanach 1821. S. 118.) hat die Untersuchung dieser Rinde auf die bei Canella alba beschriebene Weise ausgeführt. Das erhaltene Weichharz hatte einen anhaltend scharfen Geschmack. Aus der durch Aether erschöpften Rinde zog Alkohol neben einem Farbestoffe auch wahren Gerbestoff aus, der die Eisenauflösungen blauschwarz fällt, und schwärzliche Flocken niederschlägt. Eben so wirkt das Decoct der Rinde. Durch diesen blauschwarzen, und durch den mit salpetersaurem Baryt hervorgebrachten graulichweißen Niederschlag unterscheidet sich die Winter'sche Rinde von dem weißen Kaneel, dessen Aufguß durch beide Reagentien nicht verändert wird. Die Winter'sche Rinde enthielt auch weit weniger Stärkemehl, und ihre Asche Eisenoxyd.

1000 Th. der Winter'schen Rinde lieferten: ätherisches Oel 5; Harz 110; Farbestoff und Gerbestoff 70; Stärkemehl und Farbestoff 24; essigs. Kali; salzs. Kali; schwefels. Kali, kleesaures Kali, Rindensubstanz 791.

Der Gebrauch dieser Rinde ist wie der des weißen Kaneels. Winter hatte sich bei der Rückfahrt nach England derselben als Gewürz bedient, und glaubte ihrer Anwendung die Genesung der Schiffsmannschaft vom Scharbock zuschreiben zu können, wodurch sie einigen Ruf erlangte, den sie aber nicht behauptet hat, und daher nur noch selten im Gebrauche ist.

Zedoaria. Die Wurzel. Zittwerwurzel.

Curcuma Zedoaria Roscoe, C. Zerumbet Roxburgh. Eine ausdauernde Pflanze Ostindiens.

Eine längliche oder fast kegelförmige Wurzel (Wurzelstock), mit gemeiniglich abgeschnittenen Wurzelzasern und abgeschnittener Oberhaut, selbst der Länge nach zerschnitten, dicht, außen bräunlichgrau, innen weißlich, mit kleinen harzführenden Bälgen, von scharfem bitterlichem Geschmacke, und durchdringendem, etwas cam-

pherartigem Geruche. Man hat größere oder lange Zittwerwurzel und kleinere oder runde Zittwerwurzel.

Curcuma Zedoaria Rosc., C. Zerumb. Roxb. Die Zittwer-Kurkuma. Linn. Cl. I. Monandria. Ord. 1. Monogynia. Juss. Cl. IV. Ord. 2. Scitamineae.

Diese Pflanze ist auf dem festen Lande von Ostindien einheimisch und soll auch in China und Madagaskar vorkommen. Sie wird häufig angebaut.

Die Wurzel besteht aus einem zwiebelartigen Wurzelstocke, aus dem theils handförmige, blaßgelbliche Knollen, theils lange einfache, fleischige Fasern hervorkommen, die sich wieder in längliche, weiße und fast geschmacklose Knollen endigen, während Aroma und Farbestoff reichlich in der Zwiebel und in den handförmigen Knollen enthalten sind. Der Stengel besteht aus den dicht übereinander liegenden Blattscheiden. Die Blätter sind breit-lancettförmig, in der Mitte mit einem dunkelpurpurrothen Flecken gezeichnet, oben und unten verschmälert, 1—2 Fuß lang, glatt, am Grunde scheidenartig, völlig grün. Der Blumenschaft kommt etwas von den Blättern hervor, steht in der Mitte derselben, ist 5—6 Zoll lang und mit einigen stumpfen, losen Schuppen umgeben. Die Blüthenähre ist 4—5 Zoll lang, und besteht aus dachziegelförmig übereinander liegenden, stumpfen und concaven Brakteen, die nach unten mit den Rändern verwachsen, gleichsam Taschen bilden, in denen sich die schönen gelben Blumen entfalten. Die untern Brakteen sind grünlichgelb, die obern schön roth und unfruchtbar.

Die knollige Wurzel dieser Pflanze ist die officinelle Zittwerwurzel, welche schwer, theils, jedoch seltner, in runden, einen Zoll langen, auf einer Seite uneben runzligen Stücken, als runder Zittwer (Zedoaria rotunda), theils in einigen Zoll langen, gegen einen halben Zoll dicken, dreieckigen, an beiden Enden zugespitzten Stücken mit zwei ebenen und einer rundlichen Fläche, die durch Zerschneiden der Wurzel, der Länge nach, in mehrere Stücke entstanden sind, als langer Zittwer (Zedoaria longa) zu uns kommt. Sie besitzt einen hitzig gewürzhaften, dem Rosmarin nicht unähnlichen Geschmack, und starken, gewürzhaften, fast campherartigen Geruch; den runden Zittwer hält man für weniger kräftig.

Die runde Zittwerwurzel kommt nach Banks's Angabe nicht von der hier genannten Pflanze, sondern von Curcuma aromatica Salisb., Curcuma Zedoaria Roxb. her, einer zweijährigen, gleichfalls in Ostindien, auch auf den Inseln und in China wachsenden Pflanze, die kleine Zwiebeln und handförmige, innen gelbe Knollen hat, deren Schaft seitlich oft entfernt von den Blättern aus der Erde steigt. Ehedem leitete man diese Wurzel von Kaempferia rotunda her; allein die Wurzel dieser Pflanze ist nach Roxburgh's Angabe kaum aromatisch und zugleich zu selten, als daß sie in so großer Menge gesammelt werden könnte.

Bucholz (Taschenbuch 1817. S. 1.) digerirte die Zittwerwurzel mit Alkohol, zog aus dem Extract durch Schwefeläther ein Balsamharz aus, wel-

ches dunkelgelbbraun, von feinem Zittwergeruche, schwach brennendem, gelind aromatischem, angenehm bitterm Geschmacke, von Extractconsistenz, bei mäßiger Wärme leicht flüssig, in rectificirtem Weingeiste leicht auflöslich, ohne Rückhalt in fettem Oele, in Terpenthin- und Mandelöle nur durch Hülfe der Wärme vollkommen auflöslich war. Das vom Schwefeläther nicht Aufgenommene war ein eigenthümlicher Extractivstoff, in Wasser und Alkohol gleich auflöslich, geruchlos, von anfangs entfernt salzigem, etwas erwärmendem, schwach bitterlichem, eigenthümlichem Geschmacke, mit einem kleinen Antheil eines salzs. Salzes und einer Spur von Harz.

Der Wurzelrückstand wurde mit Wasser ausgekocht. Die Decocte ließen in der Ruhe den aufgequollenen Traganthstoff absetzen, und gaben dann ein dunkel rothbraunes Extract von schwach erwärmendem, gelind scharfem, säuerlichem, extractartigem Geschmacke, das in Satzmehl, Gummi und einen eigenthümlichen Extractivstoff (dessen Lösung durch salzs. Eisenoxyd schwarzbraun getrübt, und durch Galläpfeltinctur in reichlich schmutziggelben Flocken gefällt wurde — also eine Art von thierisch-vegetabilischer Materie — und welchem salz- und schwefels. Salze beigemischt waren) zerlegt wurde.

Die rückständige Wurzel wurde dann mit Aetzlauge gekocht, und zuletzt die Wurzelfaser verbrannt. Die Asche enthielt keine auflöslichen alkalischen Salze, und bestand aus kohlens., schwefels. und phosphors. Kali, schwefels. und phosphors. auflöslichen Salzen, Kieselerde, Alaunerde und Kupferoxyd.

1000 Th. Zittwerwurzel enthalten nach dieser Analyse: ätherisches Oel, gelblichweiß, trübe, undurchsichtig, von stark kampferartigem Geruche, bitterlich-feurigem, campherartigem Geschmacke und dickflüssiger Consistenz, 14,5; Balsamharz 36; Extractivstoff mit einigen Salzen 117,5; Extractivstoff mit Gummi, durch Aetzlauge geschieden, 312; Gummi 45; Amylum 86; Amylum durch Aetzkali geschieden 80; Traganthstoff 90; unauflösliche Faser 128; Feuchtigkeit 150.

Zur nähern Erforschung des in der Asche gefundenen Kupfergehalts werden noch 5 Unzen auserlesener Wurzel eingeäschert. Die Asche war hellgrau und wog 90 Gran; sie erhielt außer den angeführten Bestandtheilen auch noch kohlens. Kali, Eisenoxyd und Manganoxyd, die also in den extractiven Bestandtheilen, ersteres wahrscheinlich mit Pflanzensäuren verbunden, sich befunden haben mußten. In der sauren Auflösung der Asche überzog sich ein blankes Eisen deutlich mit einer Kupferhaut. Der Niederschlag mit blaus. Eisenkali war wegen des Mangangehalts (weißer Niederschlag) nur blaß pfirsichblüthroth; auch Ammoniak wurde nicht blau gefärbt (es ist aber auch weniger empfindlich).

Morin (Berl. Jahrb. XXV. 2. 1824. S. 66.) zog die zerquetschten Wurzeln mit wasserfreiem Weingeiste aus. Der abdestillirte Weingeist enthält ein flüchtiges Oel, welches durch Wasser abgeschieden werden konnte. Im Rückstande war eine braune, schmierige Materie geblieben. Diese wurde mehrmals mit siedendem destillirtem Wasser ausgezogen, und dann wie Aether behandelt; es blieb eine kleine Menge einer in Wasser und Aether unlöslichen

Materie zurück, auf welche die Oele nur eine geringe Wirkung zeigten, und die von Kali nicht aufgelöst wurde. Diese Materie hält Morin für ein Halbharz. Die ätherische Auflösung gab nach dem Verdunsten einen Rückstand von weicher Beschaffenheit, von bräunlichgelber Farbe, scharfem Geschmacke und einem sehr gewürzhaftem Geruche, der in Weingeist und Aether sich löste (nicht in Wasser) und sich gelb färbte. Mit Wasser destillirt gab die Substanz ätherisches Oel, und wurde dann fester; in der Wärme erweichte sie, und wurde in der Hitze zersetzt; mit den Kalien bildete sie eine schmierige Seife; durch Salpetersäure wurde sie gelb und härter, und es bildete sich etwas Sauerkleesäure; am Lichte brannte sie nach Art der sehr wasserstoffhaltigen Körper.

Die Waschwasser vom geistigen Extracte wurden abgeraucht. Aether entzog dem Rückstande eine kleine Menge der eben betrachteten Materie, die aber mit etwas Essigsäure verbunden war. Das von Aether nicht Gelöste war in Wasser und Weingeist löslich, und bestand aus Osmazom, essigs. Kali und etwas von der schon erwähnten scharfen Materie.

Die durch Weingeist ausgezogenen Wurzeln wurden mit kaltem Wasser behandelt, die Auszüge zur Syrupsdicke abgeraucht und mit Weingeist vermischt. Es entstand ein flockiger Niederschlag, der mit Weingeist abgewaschen wurde. Die weingeistigen Flüssigkeiten lieferten eine braune Materie, die alle Eigenschaften des Osmazoms besaß. Der flockige Niederschlag war zusammengesetzt aus Gummi und thierisch-vegetabilischer Materie, welche beide Stoffe durch kaltes Wasser von einander zu scheiden sind.

Die mit Weingeist und Wasser ausgezogenen Wurzeln wurden zu einem Muße zerstoßen, und in einem Siebe mit Wasser gewaschen; das Wasser setzte Stärkemehl ab. Die auf dem Siebe zurückgebliebene Materie wurde mit schwacher Salzsäure ausgezogen; Ammoniak erzeugte in der Lösung einen flockigen Niederschlag, der durch Calciniren keine kalischen Eigenschaften erhielt, und sich mit Leichtigkeit in Salpetersäure auflöste. Die Lösung wurde durch sauerklees. Ammoniak und essigs. Bleioxyd weiß gefällt.

Morin erhielt als Bestandtheil der Zittwerwurzel: scharfes Harz; flüchtiges Oel; freie Essigsäure; essigs. Kali; Osmazom; Gummi; thierisch-vegetabilische Materie; Schwefel; Amylum und holzige Theile. Die Asche enthält: kohlens., salzs. und schwefels. Kali, phosphors. Kalk, Thonerde, Kieselerde, Eisen- und Manganoxyd. (Hier ist kein Kupfergehalt angegeben, dessen Anwesenheit jedoch auch in vielen andern Vegetabilien nachgewiesen ist, als in den Paradieskörnern, kleinem Kardamom, Kurkume, Galgant, Kalmus u. s. w. [siehe Berl. Jahrb. 1819. S. 100.]). Die Zittwerwurzel ist in ihrer Wirkung dem Ingwer sehr ähnlich, und geht in einige ältere zusammengesetzte Heilmittel ein, z. B. **Tinctura carminativa, Tinctura calami composita** u. s. w.

In Ostindien dient das aus dieser und einigen andern Wurzeln bereitete Satzmehl als Heilmittel gegen Ruhr und Durchfälle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0922-3

* Zibethum. Zibeth.

Viverra Zibetha Linn. Die asiatische Zibethkatze und Viverra Civetta. Die afrikanische Zibethkatze.

Die Zibethkatze gehört zu den Raubthieren, welche auf den Zehen gehen (Digitigrada), zu der Familie der hundsartigen Thiere (steht zwischen den Hunden und Katzen). Das Vaterland der asiatischen Zibethkatze ist zwischen dem 31 ° N. B. und 9 ° S. B., und zwar Hindostan, Malabar, Ceylon, Bengalen, Pegu, Siam, Malakka, Sumatra, Java, die Philippinen und die Insel Buro; auch sollen sie verwildert auf Amboina und andern Molukken seyn. Nach Amerika wurden sie aus Asien, namentlich den Philippinen hinübergebracht, und verwilderten in Guatimala, Mexiko, Nicaragua, Cuba u. s. w. Man fängt sie in Schlingen oder in Fallen, oder schießt sie; die eingefangenen nährt man in Ostindien in Käfigen, und füttert sie mit Geflügel und Früchten. Wöchentlich 2—3mal wird von den Thieren der Zibeth genommen, jedesmal etwa ein Quentchen. Man zieht sie an einem um den Leib gelegten Stricke vor, hält sie am Schwanze rückwärts, und stülpt die Wülste des Zibethsacks sanft um, drückt ihn etwas, damit der Zibeth aus den einzelnen Säcken in die Tasche fließe, aus der man ihn mit einem Löffelchen oder Bambusstäbchen nimmt. Den Zibeth streicht man nun dünn auf Ziri-Blätter (von Piper malabaricum), entfernt die beigemischten Härchen, spült ihn dann mit Meerwasser und später mit dem sauren Saft von Limonien ab, trocknet ihn an der Sonne, und bewahrt ihn in bleiernen oder zinnernen Büchschen. Die Männchen liefern zwar weniger aber dickern Zibeth, der von den Malayen und Javanern mehr geschätzt wird, als der dünnere, mit Harn vermischte von den Weibchen. Die Zibethkatzen von Buro werden für besser gehalten, als die javanischen, bengalischen, molukkischen und siamesischen, obgleich letztere größer seyn sollen.

Die asiatische Zibethkatze hat ein bräunlich-birkenweißes und eichelbraunes Fell mit rußbraunen und pechschwarzen Flecken und Bändern. Die Kehle weißlich, auf jeder Seite mit pechschwarzen winkligen Streifen. Die Mähne klein. Der Schwanz kurzhaarig, pechschwarz und weiß geringelt. Der Kopf ist dreieckig, zwischen Hunde- und Marderkopf, die Schnauze spitz, mit langen weißen Barthaaren besetzt. Das Gebiß hundeähnlich. Die Augen im Dunkeln leuchtend, wild, schiefstehend, bei Tage halb geschlossen. Die Ohren rundlich, aufrecht, behaart. Hals und Leib schlank. Die Glieder kurz und dünn; fünf abgesonderte Zehen mit halbmondförmigen, scharfen, gelblichbraunen Krallnägeln, die, weil sie zur Hälfte in eine kleine Scheide zurückgezogen werden können, sich nicht abschleifen. Schwanz dünn, länger als bei der afrikanischen Zibethkatze, mit wenig abstehenden, bei Männchen längern Haaren bekleidet. Gesammtlänge des Körpers von der Schnauzenspitze zur Schwanzwurzel 2 Fuß 5 Zoll. Der Drüsenapparat, welcher zur Absonderung und Aufbewahrung des Zibeths dient, liegt unter dem After, über der Geschlechtsöffnung beim Weibchen, und über der Ruthe beim Männ-

chen. Den Eingang dazu bildet eine Spalte, welche in eine Tasche führt, die $\frac{3}{4}$ Zoll lang und tief, und $\frac{1}{4}$ Zoll breit, in der Mitte dreieckig, oben und unten halbmondförmig ist, und von der äußern Haut gebildet wird, die hier dünn und zart wird, und ihre kurzen dünnen Haare von außen nach innen richtet, wodurch das Ausfließen des Zibeths erschwert wird. Nach oben und seitlich von demselben ist jederzeit eine rundliche, etwa haselnußgroße Oeffnung, die in einem seitlich und nach vorn liegenden hohlen, ovalen, taubeneigroßen Drüsensack führt, der als Fortsetzung der Tasche zu betrachten ist, und eine große Menge kleiner Oeffnungen von verschiedener Größe zeigt, in denen, so wie in der Umgegend, viel feine Haare stehen. Die zur Bildung des Sacks beitragenden, von der Tasche aus sich noch immer fortsetzenden äußern Bedeckungen umgiebt eine gelblichbräunliche, etwa eine Linie dicke Drüsenmasse, die aus sehr gefäßreichem Zellgewebe besteht, mit einer gelblichen Masse, die sich herausdrücken läßt, und sich ganz wie ächter Zibeth verhält, angefüllt. Die Seiten eines jeden Zibethsacks werden von einem sehr starken halbmondförmigen Muskel bedeckt, der mit dem der andern Seiten unter der Scheide entspringt, und unter dem After wieder mit ihm zusammenläuft. Sein Zweck ist, die Säcke zusammenzudrücken, um den theils durch die drüsige Masse abgesonderten, und in jene zelligen Säckchen gelangten Zibeth durch ihre Oeffnung in die große, zur Ansammlung bestimmte eiförmige Höhle eines jeden Sackes zu treiben, theils durch noch größere Zusammenziehung sie selbst vom Zibeth zu entleeren.

Die Lebensweise der Zibethkatze erinnert sogleich an die der Katzen und Marder; wie diese hat sie die Gewohnheit, Bäume zu ersteigen, Nester zu plündern und Vögel zu jagen, mit List in Hühnerhöfe einzudringen, in denen sie oft großen Schaden anrichtet. Zuweilen soll sie ihren Schwanz in das Wasser stecken, um Fische aus demselben herauszuziehen. In Ermangelung thierischer Nahrung begnügt sie sich auch mit pflanzlicher, als Wurzeln und Früchte. Sie säuft wenig. Ihre Stimme ist heiser, aber erzürnt soll sie wie ein an den Beinen aufgehobener Hund schreien, und zuweilen auch wie eine zornige Katze blasen. Ihr scharfes Gebiß durchnagt in einer Nacht das stärkste Brett. Wenn der zu sehr angehäufte Zibeth sie belästiget, werden sie unruhig, reiben den Steiß gegen Bäume oder an der Erde und entledigen sich so des Zibeths. Der Geruch davon ist so stark, daß er sich allen Theilen, sogar dem Schweiße mittheilt.

Die afrikanische Zibethkatze bewohnt die trocknen und gebirgigen Gegenden von Afrika vom 31 ° N. B. bis zum 25 ° S. B. Sie wohnt am Atlas, in Senegambien, Ober- und Nieder-Guinea, besonders in den Provinzen Loango, Congo, Sierra Leone, Angola bis gegen das Kafferland, in den Mondgebirgen, in Abessinien, Mozambique und Madagaskar. Ihr Fell ist bräunlich-birkenweiß mit braunschwarzen Flecken und Bändern. Auf der Kehle ein dreieckiger, kaffeebrauner Fleck. Mähne sehr bedeutend. Schwanz lang behaart, mit wenigen birkenweißen Flecken. Der Kopf ist weniger spitz, als bei der asiatischen, mehr hundeähnlich. Schnauze stumpfer, dicker, ge-

wölbter. Der Leib kürzer. Im Allgemeinen der vorhin beschriebenen sehr ähnlich.

Von dieser afrikanischen Zibethkatze scheint der meiste Zibeth gekommen zu seyn. Die Zibethkatze gewöhnt sich mit Leichtigkeit an unsere gemäßigten Gegenden, daher wurde sie zur Gewinnung des Zibeths in Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und Holland gehalten.

Der Zibeth ist eine eigenthümliche fettige Substanz, halbflüssig, wie geläuterter Honig, sieht, frisch aus dem Thiere genommen, weiß aus, wie Eiter, später wird er gelb, und dann immer mehr und mehr braun und von stärkerer Consistenz. Er riecht in der Ferne moschusähnlich, in der Nähe aber und in größerer Menge sehr stark, unangenehm, ammoniakalisch; bei sehr geringer Menge wird der Geruch lieblich und angenehm. Der Geschmack ist bitter.

Der Zibeth ist sehr der Verfälschung unterworfen. Schon die Neger sollen durch in die Tasche gebrachtes Fett eine größere Ausbeute an Zibeth bewirken. Ueberdies wird er seiner Kostbarkeit wegen verfälscht mit ranzigem Fett, Butter, Honig, Rindsgalle, Ladanum, Storax u. s. w.; oder man künstelt ihn aus Schweinfett, Honig, ausgepreßtem Muscatöl, Moschus und dergleichen nach. Für den reinsten Zibeth hält man den von Guinea und dann den holländischen. Reiner Zibeth soll ohne dickliche Klümpchen seyn, auf Papier gestrichen eine gleichförmige Masse darstellen, ans Licht gehalten einen Zibethgeruch verbreiten, sich entzünden, sprißeln, und beim Verlöschen wie versenkte Haare riechen.

Boutron-Charlard (Trommsd. N. J. X. 2. 1825. S. 261.; Schweigg. J. XIII. 3. S. 290.; Buchn. Repert. XXI. S. 394.; Geiger's Magazin 1825. Februar S. 171.) hatte Gelegenheit, mit Zibeth, dessen Aechtheit ihm verbürgt wurde, mehrere Versuche anzustellen. Ein Schälchen mit Zibeth, 24 Stunden hindurch bei 16—18 ° R. unter eine Glasglocke gestellt, ertheilte dem am Gewölbe der Glocke befestigten Streifen gerötheten Lackmuspapiers eine blaue Farbe. Bei der trocknen Destillation wurden einige Tropfen einer nach Ammoniak riechenden Flüssigkeit erhalten. Schwefeläther, bis zum Kochen erhitzt, wurde von Zibeth gelb gefärbt, und ließ nach dem Erkalten eine unauflösliche gelbe Substanz fallen. Filtrirt und abdestillirt war der Aether ungefärbt, und roch nur schwach nach Zibeth. Der Rückstand der Destillation, in ein Porcellanschälchen ausgegossen und an der Luft verdampft, ließ eine röthlichgelbe Materie von unerträglichem Geruche zurück, welcher in Masse dem des Koths sehr nahe kam. Sie war zum Theil in Alkohol auflöslich, dagegen wenig oder gar nicht in Wasser. Die Alkalien verwandelten sie fast gänzlich in Seife, welche in Wasser auflöslich war, auf Zusatz einiger Tropfen Salzsäure aber die fette Substanz fallen ließ. Daß diese aus einer flüssigen und einer festen fetten Materie bestehe, lehrte die Folge.

Der in Aether unauflösliche, auf dem Filter gebliebene Theil wurde in der Wärme, mit Ausnahme einiger Haare und fremder Beimengungen, von

Aetzkalilösung völlig aufgenommen. Aus der filtrirten Flüssigkeit schlug Salpetersäure Flocken nieder, welche getrocknet beim Verbrennen einen starken thierischen Geruch ausstießen, und Ammoniak entwickelten.

Absoluter Alkohol schien bei der gewöhnlichen Temperatur wenig auf den Zibeth einzuwirken; wurde aber eine lange Maceration und Wärme angewandt, so löste sich der Zibeth gänzlich auf, und hinterließ nur Sand und Haare. Die kochend heiß filtrirte Auflösung hatte nach 48 Stunden auf der ganzen Fläche des Schälchens, welche von der Luft berührt wurde, eine weißliche, weiche, zwischen den Fingern zergehende, auf Papier einen Fleck hinterlassende Materie abgesetzt, welche alle Eigenschaften eines Fettes besaß. Die über dieser Substanz befindliche Flüssigkeit ging ganz klar durch das Filter; sie zeigte eine dunkelgelbe Farbe und einen durchdringenden Geruch. Ließ man einige Tropfen in Wasser fallen, so wurde es, wie von den Harzen, milchweiß. Nach dem Verdampfen der Flüssigkeit blieb eine orangengelbe, halbflüssige, starkriechende Substanz. Diese Materie, welche aus einem Harze und flüssigem Fett zusammengesetzt zu seyn schien, wurde mit durch 2 Th. Wasser verdünnter Salpetersäure in der Wärme behandelt, und die saure Flüssigkeit nach einigen Minuten Kochen filtrirt, wo das Fett auf dem Filter blieb. Als man die Säure mit Alkali sättigte, fielen sogleich kleine Flocken nieder, welche die Natur eines Harzes besaßen.

Bei der Destillation des Zibeths mit Wasser wurde eine milchige Flüssigkeit erhalten mit einigen Tropfen eines gelblichweißen, einen starken Zibethgeruch, so wie einen erwärmenden und scharfen Geschmack besitzenden, flüchtigen Oels bedeckt. Der Rückstand in der Retorte war gelb gefärbt. Er wurde nach dem Erkalten filtrirt, und die durchgelaufene Flüssigkeit gelind verdampft, wo eine bräunlichgelbe Substanz von schwachen Zibethgeruche zurückblieb, welche man zur Trennung des Fettes und Harzes mit absolutem Alkohol digerirte. Dieser färbte sich nur sehr schwach, und nahm etwas Riechstoff auf. Die zurückgebliebene Substanz war nun sehr auflöslich in Wasser geworden; die Alkalien zeigten eine sehr starke Einwirkung, und die basischen Salze bildeten mit ihr gelbe Niederschläge, wobei sie die Flüssigkeit ganz entfärbten.

Zuletzt wurde der Zibeth in einem Silbertiegel eingeäschert und nach Zerstörung der voluminösen Kohle die Asche mit warmen Wasser ausgelaugt. Der Auszug färbte den Veilchensaft grün, das geröthete Lackmuspapier blau, brauste mit Säuren auf, gab mit salpeters. Baryt einen in Salpetersäure unauflöslichen Niederschlag, und mit Platinauflösung eine geringe Menge des gelben dreifachen Salzes. Der in kochendem Wasser unauflösliche Rückstand löste sich schon in der Kälte in verdünnter Salzsäure vollständig auf; auf Zusatz von Ammoniak entstand ein gelblichweißer Niederschlag; bernsteins. Ammoniak, so wie blaus. Eisenkali zeigten die Gegenwart des Eisens.

Nach dem Angeführten besteht der Zibeth aus: 1) freiem Ammoniak; 2) einem festen und einem flüssigen Fette (Stearin und Elaïn); 3) Schleim;

4) Harz; 5) flüchtigem Oel; 6) gelbem Farbestoff; 7) kohlens. und schwefels. Kali; 8) phosphors. Kalk und Eisen.

Benzoësäure, wie im Castoreum (vergl. S. 222.) konnte nicht aufgefunden werden.

Die medicinische Anwendung des Zibeths, deren zuerst von Avicenna erwähnt wird, hat fast gänzlich aufgehört, da er wohl selten unverfälscht zu erhalten ist. Die Wirkung desselben ist — dem Moschus und Bibergeil ähnlich — erregend auf das Nervensystem, zugleich aber erhitzend auf das Gefäßsystem, und daher krampfstillend, schweißtreibend und stimulirend; jetzt bedient man sich desselben nur noch zum Wohlgeruche.

Zincum. Zink.

Wird aus den mit Kohlen gemengten Zinkerzen durch Sublimation in Ostindien, England und Schlesien bereitet.

Ein weißlich-bläuliches, auf dem Bruche blättriges, zerbrechliches, erhitzt hämmerbares, sich verflüchtigendes Metall. Geglüht wird es beim Zutritte der Luft, eine weiße grünliche Flamme fassend, in ein im glühenden Zustande citronengelbes, dann weißes Oxyd verändert.

Das Zink ist schon in früherer Zeit bekannt gewesen, besonders sein Erz, der Galmei, aus welchem man seit geraumer Zeit mit Kupfer Messing bereitet hat. Den Chinesen soll das Zink schon seit den ältesten Zeiten bekannt gewesen seyn. Aristoteles spricht von Messing, als einem den Indiern bekannten gelben Kupfer. Die Griechen nannten den Galmei Cadmia, zum Andenken des Kadmus, welcher ihnen den Gebrauch desselben zuerst lehrte. Albert v. Bollstädt beschrieb im 13. Jahrh. Zink unter dem Namen Marcasita aurea; der Name Zink wurde erst im Anfange des 16. Jahrh. von Paracelsus eingeführt. Glauber erkannte dasselbe als ein eignes, das Kupfer gelbfärbendes Metall, und den Galmei als das Erz desselben. Pott, Henkel, Marggraf lehrten die Ausscheidungen des Zinkmetalls aus Galmei und Blende. In Großen wurden im Jahr 1492 von dem schwedischen Bergrath v. Svab die ersten Versuche gemacht, das Zink aus gerösteter Blende durch Destillation mit Kohlenpulver zu erhalten, aber die Ausbeute lohnte bei dieser Unternehmung nicht die Kosten. Wirklich hüttenmännisch gewonnen wurde es zuerst in England. Vor der Gewinnung des Zinks in Europa brachte man alles metallische Zink unter dem Namen Tutanego aus China und Ostindien, woher auch jetzt noch das reinste Zink bezogen wird.

Das Zink ist noch nicht im gediegenen Zustande gefunden worden. Es kommt theils mit Schwefel verbunden unter dem Namen Blende, theils oxydirt, mit Kieselerde oder mit Kohlensäure, unter dem Namen Galmei, theils als schwefelsaures Zinkoxyd vor.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0927-2

Um das Zink in metallischer Form zu erhalten, muß man sich ganz anderer Reductionsapparate, als der bisher erwähnten, bedienen, weil es bei starker Glühhitze flüchtig ist. Man legt gerösteten Galmei mit Kohlenpulver gemengt in große konische Tiegel, die im Boden eine eiserne Röhre haben, welche durch eine im Rost des Ofens angebrachte Oeffnung geht, und sich über einem Recipienten öffnet, worein man Wasser gegossen hat. Die obere Oeffnung des Tiegels wird mit Thon verschlossen, und man giebt eine zur Reduction des Zinks hinreichende Hitze, wobei die Dämpfe dieses Metalls durch die Röhre heruntergetrieben, condensirt und abgekühlt werden. Man hütet sich, daß die Hitze nicht so stark wird, daß das Erz schmilzt, weil dann auch dieses durch die Röhre herunterfließen würde. Das Metall wird geschmolzen und in Formen gegossen. Das auf diese Weise gewonnene Zink ist jedoch nicht rein, es enthält öfters Eisen, Blei, Arsenik, Kupfer und Kohle, und muß, um davon befreit zu werden, noch einmal umdestillirt werden. Dieses geschieht in einem Tiegel, in dessen Boden man eine Röhre von Tiegelmasse feuerfest eingekittet hat, welche etwas über die halbe Höhe im Tiegel hinaufsteigt, und die durch den Rost hinunter geht, wo sie über einem mit Wasser gefüllten Gefäße offen steht. Das Zink wird in den Tiegel so eingelegt, daß es nach dem Schmelzen bis zur halben Röhre hinaufreicht, und der Tiegel wird oben luftdicht verkittet. Man erhitzt den Tigel, bis er eine mäßige Rothglühhitze erlangt, wobei das Metall ins Kochen geräth, und die Dämpfe desselben nach unten hin durch die Röhre getrieben werden, die durch diese Anstalt immer so heiß erhalten wird, daß kein Zinkmetall darin erstarren und sie verstopfen kann, welches in einer auf gewöhnliche Art geformten Retorte geschehen würde. Bisweilen muß das Zink noch einmal umdestillirt werden, um es völlig rein zu erhalten. Wenn die Destillation in einer Retorte geschieht, so muß man stets mit einem gekrümmten Eisen das erstarrte Zink abkratzen, weil sonst der Hals leicht verstopft wird. Ein Centner gerösteter Galmei giebt 25 bis 45 Pfund Zink.

Man bedient sich zum Zinkausbringen auch des Ofenbruchs, d. h. jener Krusten, welche sich beim Schmelzen zinkhaltiger Eisen-, Blei- oder anderer Erze im Schachtofen ansetzen, und die gewöhnlich noch reicher an Zink als der Galmei sind, indem sie bis über 53 Procent Ausbeute geben. Das Zink wird ferner auch gleich, wie bei Goslar, beim Ausschmelzen der zinkhaltigen Bleierze erhalten, wo eine solche Vorrichtung getroffen ist, daß die Zinkdämpfe sich oberhalb des Schmelzraums verdichten, und auf einem schiefen Steine aus dem Schachtofen abfließen.

Man unterscheidet den ostindischen und den goslarischen Zink. Ersterer ist reiner, auch specifisch schwerer, kömmt in länglich-viereckigen Blöcken von 18—20, auch 40 Pfunden Schwere vor. Das goslarische Zink kommt in 3—8 Pfund schweren mit dem braunschweigischen Pferde gestempelten Barden vor; er enthält gewöhnlich Arsenik, Blei, Eisen und Kupfer. Jetzt wird auch viel Zink aus den schlesischen Bergwerken gewonnen. In den

schlesischen Zinkerzen ist vor einigen Jahren ein neues Metall von Herrmann und Stromeyer gleichzeitig entdeckt worden, das Kadmium, welches aus seinen Auflösungen ähnlich wie Arsenik niedergeschlagen wird.

Das Zink, Spiauter, hat eine glänzend weiße Farbe. Es schießt unter langsamer Abkühlung in Gruppen von vierseitigen oder flachen sechsseitigen Prismen an. Es läßt sich kaum biegen, sondern zerspringt mit einem krystallinischen Bruche. Reines Zink läßt sich bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft zu dünnen Blechen ausschmieden, ohne in den Kanten zu bersten, wobei es bis $\frac{1}{10}$ an Dichtigkeit zunimmt. Das im Handel gewöhnlich vorkommende Zink ist nicht so geschmeidig, und bricht leicht bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft; aber bei der Hitze von kochendem Wasser, und einige Grade darüber bis zu + 150 °, läßt es sich schmieden, zu dünnen Scheiben walzen, kann auch zu sehr feinem Drathe gezogen werden u. s. w., und man hat durch diese Dehnbarkeit in der erhöhten Temperatur das Zink zu recht wichtigen ökonomischen Bedürfnissen anwenden können. Bei + 205 ° wird es wieder spröde, und es kann in einem bis zu diesem Grade erhitzten eisernen Mörser zu Pulver gestoßen werden. Bei + 360 ° schmilzt es, und in der Weißglühhitze geräth es ins Kochen und destillirt in verschlossenen Gefäßen über, aber in der Luft entzündet es sich und brennt mit einer blendend weißen Flamme, und einem dicken weißen Rauche. Das eigenthümliche Gewicht des geschmolzenen Zinks ist 6,862, und das des geschmiedeten soll bis auf 7,215 steigen. Das Zink hat eine eigene Weichheit, indem es in den Feilen und an der Schneide der Meißel, womit es gearbeitet wird, sitzen bleibt, welches bei dem weit weicheren Blei nicht statt findet.

Das Zink hat bei einer höheren Temperatur eine starke Verwandtschaft zum Sauerstoffe, welche diejenigen der meisten andern Metalle, die auch durch dasselbe reducirt werden, überwiegt. In der gewöhnlichen Temperatur der Luft zersetzt es nicht das Wasser, wenn die Luft ausgeschlossen ist; aber wenn Zinkfeilspähne mit Wasser durchfeuchtet und sich selbst überlassen werden, so nimmt die Masse nach einiger Zeit eine dunkle Farbe an, schwillt auf, entwickelt Wasserstoffgas mit sichtbarem Aufbrausen, und wird endlich in ein hellgraues Oxyd verwandelt. Das Zink zersetzt in der Glühhitze Wasserdämpfe, wird mit Entwickelung von Wasserstoffgas fast in allen Säuren aufgelöst, und schlägt fast alle geschmeidigen Metalle, Eisen und Nickel ausgenommen, aus ihren Auflösungen metallisch nieder. Von den ungeschmeidigen Metallen wird Antimon, Tellur, Arsenik und Wismuth durch Zink reducirt und niedergeschlagen. Mehrere von den Metallen, die vom Zink nicht reducirt werden, fällt es als Oxyde, während das Zink auf Kosten des Wassers und der Luft reducirt wird, und das Zinkoxyd, als die stärkere Base, das vorher aufgelöste Oxyd niederschlägt.

Das Zink hat 3 bekannte Oxydationsstufen:

a) Das Suboxyd wird an der Oberfläche des metallischen Zinks gebildet, wenn es lange der Luft ausgesetzt, oder wenn Zink lange in einer etwas höheren Temperatur gehalten wird. Es ist schwarzgrau, so lange

es naß ist, wird aber bei dem Trocknen hellgrau. Es bildet gewöhnlich eine dünne Rinde, die nicht zunimmt und nicht weiter von der Luft verändert wird.

b) Das Zinkoxyd erhält man theils durch die Auflösung des Zinks in mit Wasser vermischten Säuren, wobei das Wasser zersetzt, Wasserstoffgas entwickelt und durch den Sauerstoff das Zink oxydirt wird, worauf das Zinkoxyd durch Alkali gefällt werden kann, theils durch Verbrennen des Zinks in offenen Gefäßen, welches mit blendend bläulich- oder grünlichweißer Flamme erfolgt. Ein solches Zinkoxyd wird gebildet beim Rösten der Zinkerze oder beim Schmelzen des Galmeis mit Kupfer zu Messing, das hierbei sich verflüchtigende Zinkoxyd legt sich zum Theil an den obersten Theilen der Oefen und Gefäße als ein weißer feiner Ueberzug an, welcher den weißen Nicht, Augennicht — **Nihilum album, Pompholyx** — bildet, häufig aber mit weißer Thon- oder Kalkerde verfälscht wird (verdünnte Schwefelsäure läßt diese Beimischungen in der Kälte zurück), zum Theil setzt es sich tiefer in den Oefen ab, und wird dann Ofenbruch oder Tutia — **Tutia s. Tutia Alexandrina, Cadmia, Nihilum griseum** — genannt. Man erhält die graue Tutia auch unter der Gestalt einer schwarzgrauen gebogenen Rinde, die im Bruche gelblich ist; sie wird vorzüglich aus den Oefen der Rothgießer beim Messingschmelzen, wo sie sich an den Walzen, die deswegen in den Oefen aufgestellt werden, als noch nicht völlig ausgebranntes Zinkoxyd anlegt, erhalten. Man brachte die Tutia vor Zeiten aus Alexandrien. Sehr oft ist sie aber nur ein künstliches Gemisch, das aus Thon mit etwas Kupfer- oder Messingfeile verfertigt wird, welches gleichfalls durch verdünnte Schwefelsäure entdeckt wird. Der Galmei (**Lapis calaminaris**) findet sich in Schlesien, Polen, Böhmen, Kärnthen, Tyrol, den Niederlanden, England u. s. w., und stellt einen mehr oder weniger harten, festen, bald hellbraunen bald röthlichen, gelblichen oder rothgelben Körper dar. Er enthält nebst dem Zinkoxyd meistens auch entweder Kohlensäure oder Kieselerde (Kieselsäure) in chemischer Verbindung.

Das reine Zinkoxyd ist als **Zincum oxydatum album** officinell.

c) Das Hyperoxyd, von Thénard entdeckt, ist vermittelst des Wasserstoffhyperoxyds darstellbar, weiß, in Wasser unauflöslich, ohne Geruch und Geschmack, und zersetzt sich von selbst, wenn es im nassen Zustande aufbewahrt, oder wenn es erwärmt wird.

Die Zinksalze, in welchen das Zinkoxyd die Basis bildet, zeichnen sich durch einen höchst unangenehmen Metallgeschmack aus, der zugleich zusammenziehend ist. Sie sind farblos, werden von kaustischem Ammoniak ohne Rückstand aufgelöst, von kohlens. Alkalien unter Entwickelung von kohlens. Gas und von wasserstoffschwefligen Salzen gefällt; in beiden Fällen ist der Niederschlag weiß. Einen gleichen Niederschlag erzeugen das blaus. Eisenkali und das iodwasserstoffs. Kali. Von Galläpfelinfusion werden sie nicht getrübt.

Das Zink geht mit Schwefel, Phosphor und mehreren Metallen Verbindungen ein. 2—3 Th. Kupfer gegen 1 Th. Zink geben das gewöhnliche

Messing von hellgelber Farbe. Wird die Oberfläche von Messing mit kaustischem Ammoniak gewaschen, so wird sie weiß, weil das Kupfer vom Alkali eher aufgelöst wird, als das Zink, welches zurückbleibt; wäscht man sie mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, so löst sich umgekehrt das Zink von dem Kupfer auf, und das Messing wird roth (in dem Messing ist das Kupfer das elektro-negative Glied der Verbindung — die Säure —, das Zink das elektro-positive Glied — die Basis —, ersteres wird also von dem Alkali, letzteres von der Säure vorzugsweise aufgenommen werden müssen). Gleiche Theile Zink und Kupfer oder 1 Th. des ersteren und 4 Th. des letzteren geben eine tiefere gelbe Metallmischung, die dem Golde ähnlich ist, und deswegen Similor genannt wird. Mehrere andere Mischungen von Zink und Kupfer kommen unter dem Namen Tomback, Pinschbeck u. s. w. vor.

Das Zink giebt als Oxyd und in den Salzen innere und äußere Heilmittel. Nach Leonhard wird das käufliche Zink zwar nicht absolut chemisch rein, aber doch zur Darstellung der pharmaceutischen Präparate hinreichend rein erhalten, wenn man das käufliche Zink bis zum Fluß erhitzt, und nun Schwefel so lange hineinträgt, als man sieht, daß es noch Schlacken bildet; brennt es dann ohne Schlacken zu bilden, auf der Oberfläche ab, so läßt man die Masse erkalten, und nimmt die Schlacken von dem jetzt gereinigten Zinke ab. Ist das Zink rein, so löst es sich in verdünnter Schwefelsäure und Salpetersäure vollkommen auf, und giebt farblose Auflösungen. Bei der Auflösung des käuflichen Zinks bleibt gewöhnlich ein schwarzes Pulver liegen, welches nach Einigen Graphit ist, nach Andern aus Schwefel, Kohle, Blei, Eisen, nach v. Gersdorff aus Antimon, wahrscheinlich bei verschiedenen Zinksorten aus verschiedenen Substanzen besteht. Blei wird von der Schwefelsäure als unauflösliches schwefels. Bleioxyd unaufgelöst gelassen, aus der salpeters. Auflösung aber durch schwefels. Natron niedergeschlagen; Schwefelwasserstoffgas schlägt Schwefelblei nieder. War das Zink eisenhaltig, so wird Aetzammoniak den durch dasselbe gebildeten Niederschlag nicht vollkommen wieder auflösen, sondern braune Flocken von Eisenoxyd unaufgelöst lassen; die wasserstoffschwefligen Salze und die Gallapfeltinctur erzeugen dann einen schwärzlichen, das blaus. Eisenkali einen bläulichen Niederschlag. Giebt dieses letztere Reagens einen röthlichen Niederschlag, so war Kupfer vorhanden, welches so wie das Blei durch Schwefelwasserstoffgas gefällt wird, wogegen die etwas angesäuerte Zinkauflösung durch Schwefelwasserstoffgas weder gefällt noch geschwärzt werden darf. Ein durch dasselbe erzeugter gelber oder röthlichgelber, dem Auripigment ähnlicher Niederschlag würde Kadmium nachweisen, welches auch bei Niederschlagung und Wiederauflösung des Zinksalzes durch kohlens. Ammoniak als weißer Rückstand unaufgelöst bleiben wird.

Das Zink wird auch zu technischen Zwecken häufig benutzt, als zur Bereitung des Messings ꝛc., in Form von gewalzten Blechen zu Dachbedeckungen u. s. w. Zu Küchengeräthen ist es nicht anwendbar, weil es von freier Säure sehr leicht angegriffen wird. Zu galvanischen Apparaten ist es als

stark positiv elektrisches Metall vorzüglich geeignet, aus welcher Ursache auch das Zink, wo es mit andern Metallen in Berührung, wo es also gelöthet, genietet oder genagelt ist, immer der leidende Theil ist, und am frühesten an diesen Stellen durchfressen wird.

Zingiber. Die Wurzel. Ingber. Ingwer.

Zingiber officinarum Roscoe. Eine ausdauernde Pflanze Ostindiens.

Die mit abgeschälter Oberhaut an der Luft getrocknete, zusammengedrückte, gedrehte, höckrige, runzlige, dichte, schwere, außen weißgraue, innen röthlichweiße Wurzel (Wurzelstock), mit kleinen, harzführenden Bälgen, von sehr scharfem Geschmacke und gewürzhaftem Geruche.

Zingiber officinarum Rosc. Gemeiner Ingwer.
Amomum Zingiber Linn.
Linn. Cl. I. Monandria. Ord. 1. Monogynia.
Juss. Cl. IV. Ord. 2. Scitamineae.

Der gemeine Ingwer wächst ursprünglich in Ostindien, häufig in Bengalen, auf Java, Malabar u. s. w., wird auch jetzt schon wild in Westindien angetroffen, und ist auch in den wärmern Himmelsstrichen von China, in Jamaika und auf den Antillen gebaut worden.

Die Wurzel ist ausdauernd, kriechend, aus knotigen, handförmigen, etwas ästigen, zusammengedrückten, fleischigen, mit zarten, kurzen Fasern besetzten Knollen bestehend, von der Dicke eines Fingers, inwendig weiß oder röthlich, und außen von blasser oder gelblicher Farbe. Sie treibt 3—4 unfruchtbare, einfache, runde, blättrige Stengel, von 2—3 Fuß Höhe. Die Blätter sind abwechselnd, gleichbreit-lancettförmig oder schwertförmig, 6—7 Zoll lang und 1½ Zoll breit. Zur Seite der blättrigen Stengel entstehen unmittelbar aus der Wurzel einige nackte, dicke, runde, schuppige Schafte, die kaum die Höhe eines Fußes erreichen. Jeder trägt an der Spitze eine eiförmige Aehre, ähnlich dem Ende einer Keule, und dachziegelförmig bedeckt mit eiförmigen, anfangs grünlichen Schuppen, welche an der Spitze und am Rande weißgelblich sind, und später eine schön rothe Farbe annehmen. Diese Aehren enthalten mehrere gelbliche Blumen, die sich nach und nach öffnen, und in dem kurzen Zeitraum eines Tages verblühen. Die Blumen öffnen sich im Monat September, gegen den December sterben die Stengel ab, und im folgenden Januar müssen die Wurzeln herausgenommen werden, später werden sie holzig.

Im Handel hat man 2 Sorten, nämlich den braunen oder gemeinen Ingwer (Zingiber commune s. nigrum s. vulgare) und den weißen Ingwer (Zingiber album). Die Wurzeln der ersteren Sorte sind fest, dick, knotig, hornartig, runzlig, bei 2 Zoll lang, und außen gelbgrau oder weiß-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134416-p0932-8

grau, und inwendig röthlichgelb oder bräunlich. Die Wurzel des weißen Ingwers ist gelblichweiß oder weißlichgrau, knollig, fest und inwendig röthlichgelb. Beide Sorten kommen von derselben Pflanze, und sind nur dadurch verschieden, daß die ersteren, vorher von Fasern und Schmutz gereinigten Wurzeln mit kochendem Wasser abgebrüht, und dann schnell durch Ofenwärme; die andern hingegen von der äußeren Rinde gereinigt, und dann ohne Abbrühen sorgfältig an der freien Luft getrocknet werden, und nur diese letztere ist zum pharmaceutischen Gebrauche zu verwenden. Beide Sorten sind flach gedrückt, knotig, zuweilen fast handförmig, auf dem Bruche glatt und harzig. Die besten Stücke sind die, welche fest, schwer, von starkem, angenehm aromatischem Geruche sind, und einen scharfen, feurigen Geschmack besitzen. Wurmstichige, zerbrechliche, weiche, mürbe, sehr zaserige, leichte Stücke sind untauglich. Den meisten Ingwer erhalten wir aus Jamaika; für den besten hält man den ostindischen, den von Malabar und Bengalen.

Bucholz (Almanach 1817. S. 62.) zerlegte den Ingwer nach der bei der Zittwerwurzel befolgten Methode, und fand in 1000 Th. derselben: ätherisches Oel von blaß weingelber Farbe, einem sehr feinen flüchtigen Ingwergeruche, einem ziemlich milden, hinterher nur gering beißenden, schwach bitterlichen Geschmacke, und einer sehr dünnflüssigen Consistenz, $15\frac{1}{2}$; Weichharz, dunkel gelbbraun, von fein aromatischem ingwerartigem Geruche, einem stark brennenden, aromatischem ingwerartigen Geschmacke, von der Consistenz eines weichen Extracts, in Aether, Alkohol und Terpenthinöl leicht, in Mandelöl erst in der Wärme auflöslich, 36; Extractivstoff $111\frac{1}{2}$; gummigen Extractivstoff, durch Aetzkali geschieden, 260; Gummi $120\frac{1}{2}$; Amylum $197\frac{1}{2}$; Traganthstoff 83; unauflösliche Faser 80; Feuchtigkeit 119. S. = $1025\frac{1}{10}$. Der Ueberschuß ist dem unvollkommnen Austrocknen zuzuschreiben.

Die Asche enthielt kein Kupferoxyd.

Morin (Berl. Jahrb. XXV. 2. 1824. S. 66.) fand bei der auf dieselbe Weise, wie bei Zedoaria ausgeführten Analyse des Ingwers folgende Bestandtheile: harzige Materie; Halbharz; ein graulichblaues flüchtiges Oel; freie Essigsäure; essigs. Kali; Osmazom; Gummi; thierische vegetabilische Materie; Schwefel; Stärkemehl nnd Holzfaser. Die Asche enthielt kohlens. und salzs. Kali, Spuren von schwefels. Kali, phosphors. Kalk, Thonerde, Kieselerde, Eisen- und Manganoxyd.

Der Ingwer wird häufig als Gewürz gebraucht, geht auch in einige zusammengesetzte Mittel ein. Die Indianer lassen die frische Wurzel in Zucker kochen, und bereiten auf diese Weise den eingemachten Ingwer (Conditum Zingiberis), ein wohlschmeckendes reizendes Magenmittel.