



PHARMACOPŒÆ
TAURINENSIS
PARS PRIMA,

*In qua Simplicia cujusque generis Medicamenta
litterarum ordine servato recensentur: Peregrina
insuper ex precipuis eorumdem notis pleraque
describuntur.*

A



BIETIS rubræ Coni, & Resina.

ABROTONUM mas angustifolium
majus,

Abrotonum vulgare.

ABSINTHIUM Ponticum latifolium,
seu Romanum Officin.

Absinthium vulgare majus.

ABSINTHIUM Ponticum tenuifolium incanum.

ABSINTHIUM Alpinum candidum humile,

Vulgo Genepi.

A

ACACIA

ACACIA vera, seu Ægyptia

Succus è fructu immaturo Spinæ Ægyptiæ expret-
sus, & densatus, ponderosus, compactus, luci-
dus, coloris rufi, saporis austeri. Hæc autem Aca-
cia vera in Officinis nostris obsolevit, cui Nostras,
vel Germanica subrogari solet.

ACACIA Germanica

E prunis silvestribus immaturis elicetus succus est,
atque inspissatus.

ACANTHUS sativus,

Branca Ursina.

ACETOSA arvensis lanceolata.

ACETOSA rotundifolia hortensis.

ACETOSELLA.

ACETUM vini.

ACMELLA,

Atemella, Atmella.

Folia hujus Plantæ Ceylanicæ subacria sunt, foliis
Lamii, aut Urticæ longiora.

ACONITUM salutiferum,

Anthora.

ACORUS verus.

Radix hæc, quæ pro Calamo aromatico substituitur,
albida sit, suaveolens, subamara, fungosa, &
fractu difficilis, non cariota.

ACTE,

Sambucus.

ADEPS

Anatis,

Equi,

Gallinæ,

Gallinæ,
Hominis,
Muris alpini,
Suis,
Taxi,
Viperæ,
Vulpis.

ADIANTHUM album fol. Filicis,
Filicula Fontana.

ADIANTHUM Aureum.

ADIANTHUM fol. Coriandri,
Capillus Veneris.

ÆGAGROPILUS, vel Ægagropila
Pila ovalis, aut rotunda, sæpius oblonga, admo-
dum levis, plerumque ex rufo obscuri coloris,
fragmentis, & fibrillis herbarum coagmentata sub
involucro coriaceo.

ÆS.

AGALLOCHUM, *vide* Lignum Aloes.

AGARICUS, vel Agaricum

Probatur albus, levis, friabilis, sapore primum
subdulci, mox subamaro, tandem acri.

AGNI casti Semen.

AGRIMONIA.

ALBUM Græcum,
Stercus Canis.

ALCHIMILLA,
Stellaria.

ALCIS Ungula.

ALKEKENGI Fructus.

A 2

ALLE-

ALLELUIA,

Acetofella.

ALLII hortensis, seu fativi Radix.

ALOE Soccotrina,

Epatica,

Caballina.

Soccotrina, quæ ad usum internum cæteris præstantior, lucida esse debet, sicca, friabilis, amarissima, odore non ingrato. Integra ad fuscum colorem, pulverata ex flavo ad subrubrum vergat.

ALSINE media, seu vulgaris,

Morsus Galline.

ALTHÆA.

ALUMEN Rupeum

Laudatur Romanum, translucens, albidus coloris, qui ad subrubrum inclinet.

AMARACUS,

Majorana.

AMBRA cineracea, seu *grisea* vulgo.

Optima censetur ea, quæ sordium experta est, levis, cinerei coloris ad fuscum vergentis, odoris grati, & suavis, maculis tum subnigris, tum albidis signata, quæ demum igni admota instar cere liquefit.

AMBUTUA, V. Pareira brava.

AMMI, vel Ammeos

Oblongum semen nonnihil inflexum, striatum, Cumino minus, & pallidius. Mundum sit, nutritum, sapore acri subamaro, odore ad Origanum accedente.

AMMONIACUM Gummi

In

In grummos concretum sit, mundum, extrinsecus flavum, intus album, & lucidum, subamarum, Castorei, Galbanique odorem quodammodo referens; quod digitis tractatum, vel modice calefactum facile mollescat.

AMOMUM racemosum.

In folliculis Avellanam fere æquantibus, ac tripartitis semina continentur aspera, & quasi triquetra, quorum color obscurus ad purpureum inclinat: odor aromaticus est, sapor acer ad Caphuram accedens.

AMURCA,

Fex Olei.

AMYGDALÆ amaræ.

AMYGDALÆ dulces.

AMYLUM.

ANACAMPSEOS,

Fabaria.

ANACARDIUM.

Deligendus hic fructus ponderosus, externo cortice subnigro, lævi, ac lucido; interno autem citrino, quo nucleus albidus saporis subdulcis, & inter utrumque corticem glutinosus, ex nigro rufi coloris, lucidusque liquor inclusus sit.

ANAGALLIS aquatica,

Beccabunga.

ANAGALLIS phœniceo flore.

ANAGALLIS cœruleo flore.

ANETHUM hortense.

ANGELICA major, seu sativa,

Bohemica.

6 DE SIMPLICIBUS

Bohemica.

Oblonga hæc radix est capite crasso, ex quo radice-
læ pollicares, aliæque tenuiores producuntur. Sit
recens, extrinsecus fusca, intus albida, odore aroma-
tico, sapore acri cum levi quadam amaritudine.

ANGURIAE Fructus, & Semen.

ANIME Gummi

Resinosum, in superficie albidum, veluti farina as-
persum, intus fere citrinum, lucidum, odore, dum
contrectatur, Elemi, dum uritur, Olibano quo-
dammodo simili.

ANISI vulgaris Semen

Sit nutritum, mundum, suaveolens, sapore suba-
cri, & subdulci.

ANISUM stellatum, seu Sinense.

Capulae fragrantæ quinque, sex, septemve instar
radiatorum uno petiolo simul junctæ sunt, quibus
grana continentur oblonga, seminis Lini fere simi-
lia, cortice lævi, lucido, tenui, maculis subni-
gris distincto. Ejusmodi semen sapore, odoreque
Anisum vulgare superat.

ANONIS, sive Ononis.

ANTHORÆ, seu Antithoræ Radix.

ANTHOS,

Rosmarinus.

ANTIMONIUM

Adhibendum præcipue Hungaricum purum, niti-
dum, ex longis, ac lucidis radiantibus striis con-
flatum.

APES.

APIUM

APIUM dulce.

APIUM hortense, seu Petroselinum vulgo.

APIUM Macedonicum, V. Petroselinum Macedo-
nicum.

APRI Dens.

AQUILEGIA.

ARABICUM Gummi, V. Gummi Arabicum.

ARCIUM,

Bardana.

ARGENTINA,

Potentilla.

ARGENTUM.

ARGENTUM vivum.

ARGILLA.

ARGYRITIS,

Lithargyrium Argenti.

ARI Radix.

ARISTOLOCHIAE longæ)
rotundæ) Radix:
tenuis)

ARMORACIA,

Raphanus rusticus.

ARTHANITÆ Radix.

ARTHEMISIA vulgaris major.

ARUNDINIS sativæ Radix.

ASA, vel Assa dulcis, V. Benzoinum.

ASA, vel Assa fetida

Ex pluribus grumis subrubris coacta, acris, & ama-
ra, gravem, & alliatum odorem spirans.

ASARI Folia, & Radix.

ASCLEPIAS,

8 DE SIMPLICIBUS

ASCLEPIAS,

Vincetoxicum.

ASELLI,

Millepedæ.

ASPALATHUS, V. Lignum Rhodium.

ASPARAGUS.

ASPHALTHUS, V. Bitumen Judaicum.

ASPLENIUM,

Ceterach Officinarum.

ASTACI fluviatiles,

Cancris fluviatiles.

ATRIPLEX hortensis;

Spinachia vulgaris.

AVELLANÆ Lignum, & Nuclei.

AVENÆ vulgaris, five albæ Semen.

AURANTIÆ, vel Arantiæ Mali, Folia, Flores,
Fructus.

AURICULA Judæ,

Fungus sambucinus.

AURUM.

AXUNGIA, V. Adeps.

B

BACCÆ Ebuli;

Hederæ;

Juniperi,

Lauri,

Myrti,

Rhamni Cathartici;

Sambuci.

BA-

BALANUS myrepfica

Avellanæ nucis magnitudinem habet, subtilem corticem, & pelliculam fungosam, qua nucleus includitur albus, pinguis, & subdulcis.

BALAUSTIA,

Mali Punica silvestris Flores.

BALSAMINA mas,

Momordica vulgaris.

BALSAMITA,

Mentha Græca.

BALSAMUM Ægyptium,

De Mecca,

Judaicum,

Syriacum.

Balsamelaum

Resinosus liquor, ut ajunt, odoris acuti, & jucundissimi dum recens est, idemque albidus, vel subflavus; cum vero inveteravit, spissus, tenax, rufus, subamarus, & subacris. Hoc enim genuinum, minimeque fucatum Balsamum plane rarissimum est.

BALSAMUM Copaiba, vel Copaliba

Liquor oleosus, pallidus, vel subflavus, limpidus, Terebinthina minus tenax, sapore acri subamaro, odore fragrante.

BALSAMUM Peruvianum album

Resinosum, limpidum, acre, Peruviano nigro glutinosius, odoreque præstantius. Quod recens, subflavum est; vetus autem rubescit.

BALSAMUM Peruvianum nigrum

Instar syrupi viscosum est, sapore acri; ex rufo ad fuscum

B

fuscum

fuscum colorem, odoreque ad Stryracem calamitam
accedit.

BALSAMUM Peruvianum siccum

In cucurbitis ad nos deferitur concretum, pingue;
perlucidum, & rufum, suavi odore, vix ulla acri-
tudine.

BALSAMUM Tolutanum, seu de Tolu

In modum Terebinthinae tenax, Mali citrei odorem
quodammodo spirat; color ejus subrubeus, acris-
tudo fere nulla.

BARBA Caprae floribus compactis,

Ulmaria.

BARBA Hirci,

Tragopogon.

BARDANÆ Radix, & Semen:

BASILICUM,

Ocimum citratum.

BDELLIUM

In lacrymas concretum fit, odoratum, subama-
rum, pingue; confractumque luceat, & calore mol-
lescat. Illud reiiciatur, quod in glebas coactum, quod
nigrum, & sordidum.

BECCABUNGA.

BECHION,

Farfara.

BELLIS minor, seu pratensis:

BENZOINUM,

Belzoe,

Benjoinum

Probatur sincerum, lucidum, suaveolens, sine acri-
tudine,

rudine, ex flavo ad subrubrum colorem vergens;
albis frustulis interspersis, quæ contractas Amygda-
las referant.

BERBERIS, seu Oxyacanthæ Fructus.

BETA alba, vel palleicens.

BETONICA.

BETULÆ Aqua, & Cortex.

BEZAAR, seu Bezoar

Orientalis in superficie lævis est, & nitidus, figuræ;
& magnitudinis diversæ. Ex plurimis lamellis con-
stat, quarum aliæ super alias positæ sunt, iisdem-
que extrinsecus politis, ac splendentibus, intus stria-
tis: color varius, ut plurimum ex atro, vel pallido;
quandoque cinereo ad subviridem colorem incli-
nans: sapor, odorque nullus. Occidentalis fere al-
bidus, aut cinereus, fragilior, & ex multis etiam
laminis sibi invicem incumbentibus conflatus. Uter-
que in centro cavus est, ubi paleæ, pili, diversæ-
que res aliæ inclusæ sunt; quibus præcipue notis na-
tivi ejusmodi Lapides a falsitiis discerni solent.

BEZOAR Germanicum, V. Ægagropilus.

BISMALVA,

Althæa.

BISTORTÆ Radix.

BITUMEN Judaicum

Purum sit, ponderosum, siccum, graveolens, sub-
nigrum, & splendidum.

BOLUS Armenia,

Orientalis,

Pinguis, ponderosa, subrubra, lucida, foliacea, quæ
labiis,

B 2

labiis , aut linguæ apposita prompte adhæret.

BOMBACIS Semen.

BOMBYCUM Folliculi,

Sericum crudum.

BORAX nativa

Sit pura , crySTALLINA , pallida , & subviridis , saporis
nitrosi.

BORRAGO.

BOTRYS.

BOTUA , vel Butua , V. Pareira Brava.

BRANCA Ursina.

BRASSICA sativa ;

Caulis.

BRUNELLA ,

Consolida minor.

BRUSCI , sive Rusci Radix , & Semen.

BRYONIÆ Radix.

BUFONES.

BUGLOSSUM vulgare , seu angustifolium majus.

BUGLOSSUM Latifolium,

Borrage.

BUGULA ,

Consolida media.

BUNIAS ,

Napus sativa dulcis , vel silvestris.

BURSA Pastoris major.

BUXI Lignum.



C

C A C A O.

Laudatur id præcipue, quod *Caraque* majus vulgo appellatur, fusco, & subrufo colore, maturum, recens, crassum, pingue, & subamarum.

CÆP A vulgaris.

CALAMINARIS Lapis

Alius cinereus, alius subruber, lineisque albidis distinctus, qui præstantior censetur.

CALAMINTHA montana vulgaris.

CALAMUS aromaticus Officinarum, V. Acorus verus.

CALCANTHUM,

Vitriolum.

CALENDULÆ, seu Calthæ Flores.

CALX viva.

CAMPHORA

Candida, crystallina, friabilis, valde odorata, acris, & subamara, ita ignis tenax, ut semel accensa non facile extinguatur; atque adeo volatilis, ut igne leni tota penitus sublimetur. Dosis a granis quatuor ad octo.

CANCRI fluviatiles.

CANELLA alba

Cortex albidus exteriori involucri spoliatus, in longos tubulos convolutus, acer, aromaticus, fragrans. Ita nimirum talis cortex rarissimus a quibusdam auctoribus describitur; cujus loco utimur Costo corticoso.

CA-

CANELLA Ceylanica, V. Cinnamomum.

CANNABIS sativæ Semen.

CANTHARIDES.

CAPILLUS Veneris.

CAPPARIS Radix, & Flores nondum aperti, vulgo
Fructus.

CAPRIFOLIUM.

Matrisylva.

CAPSICI Fructus.

CARABE, V. Succinum.

CARANNA, five Caragna.

Resina hæc eligatur tenax, ex cinereo ad subviridem
colorem vergens, amara, suaveolens dum accen-
ditur. Vetustate exarescit, & friabilis fit.

CARDAMINDUM,

Nasturtium Indicum.

CARDAMOMI majoris Semen.

CARDAMOMUM minus

Siliqua membranacea triangularis tribus donatur cel-
lulis, quibus semina exigua, angulosa, tenui, &
albida pellicula involuta includuntur, coloris rufi,
odoris aromatici, saporis acris. Præstantior ea, quæ
integra, gravis, nec rugosa est.

CARDIACA.

CARDUUS benedictus,

Carduus sanctus.

CARDUUS stellatus,

Calcitrapa.

CARICÆ,

Ficus passæ.

CARLINÆ acaulos magno flore Radix.

CAROBÆ

CAROBÆ Officinarum.

CARPOBALSAMUM

Bacciformis fructus, Piperis paullo major, & aliquantulum oblongus, rugosus, tenuique pediculo instructus. Recens sit, gravis, nucleum albidum, & pinguem continens, odoris aromatici suavis, saporis subacris piperati.

CARTHAMI Officinarum Semen.

CARVI Semen.

CARYOPHILLATÆ Radix.

CARYOPHILLI hortensis Flores.

CARYOPHILLUS aromaticus

Sit capite globofo, circumpositis quatuor apiculis; colore subrubro fusco, sapore acri aromatico, odore fragrante, & quo compresso oleosum quiddam eliciatur.

CASCARILLA

Cortex resinofus convexa parte cinereus, concava ferrugineus, lucidus, fractu difficilis, levi odore aromatico, &c, dum comburitur, Moschum redolens, gustu denique acer, & paullulum amarus.

CASSIA fistula,

Alexandrina,

Optima est Ægyptia, recens, siliquis crassis, ponderosa, haud resonans dum concutitur, cortice tenui, & lævi.

CASSIA lignea,

Odorata,

Cinnamomo crassior, fractuque difficilior, intus lucida, atque ferruginea, saporis acris, & subdulcis.

Diu

Diu mansa mollietur omnino, & glutinosa fit, lignosa parte vix ulla superstite.

CASTOREUM

Duobus folliculis in summa eorum parte junctis constat, in quibus materia continetur cerosa, inflammabilis, ex rufo ad obscurum colorem vergens, quæ tractu temporis induratur, & fragilis fit. Castorei odor gravis est, sapor subacer, & subamarus. Ex Russia allatum cæteris præstantius.

CATAPUTIA major.

CATECHU

Eligendum est compactum, lucidum, subnigrum, quod in ore detentum lique scat, saporeque primum subamaro, ac styptico, postea subdulci gustum afficiat.

CATELLI.

CAUDA EQUINA.

CAUDA Porcina,

Peucedanum.

CAULIS.

CENTAURIJ majoris Radix.

CENTAURIUM minus.

CENTINODIA.

CERA alba, & citrina.

CERASA sativa rubra, & acida.

CERASA silvestria nigra, & dulcia.

CEREFOLIUM,

Cherefolium.

CERUSSA.

CETERACH:

CHA-

CHALYBS.

CHAMÆACTE,

Ebulus.

CHAMÆCISSUS,

Hedera terrestris.

CHAMÆDRYS.

CHAMÆLEON albus;

Carlina acaulos magno flore.

CHAMÆMELI vulgaris Flores.

CHAMÆPITYS lutea vulgaris.

Iva arthritica.

CHEIRI Flores.

CHELÆ Cancrorum.

CHELIDONIUM majus.

CHELIDONIUM minus.

CHERMES, seu Kerres

Sit recens siccatum, integrum, nutritum, rubicundum, lucidum, & sordium expers, saporis subamari, odoris grati.

CHINACHINA.

Hujus Corticis mediocris crassitudo sit, superficies interior lavis, exterior scabra, & passim incana; idemque compactus deligatur, & quemdam mucorem redolens, saporis subamari, & styptici, coloris ad Cinnamomum accedentis; quique non facile, nec sine aliquo strepitu frangatur.

CHINA Radix

Crassa est, tuberosa, & nodosa. Alia, quæ facile conciditur, coloris ex pallido rubri, Carnosa in Officinis nostris appellatur; alia, quæ dura,

C

magis

magis gummosa, lucida, subnigra, aut rufa est, Petrosula, aut Semipetrosula dicitur.

CHRYSOCOLLA, V. Borax.

CHRYSITIS,

Lithargyrium Auri.

CICERBITA aspera, & laevis.

CICHORIUM sativum, & silvestre;

CICLA Officinarum,

Beta alba, vel pallescens.

CICUTA major.

CINNABARIS nativa.

Laudatur ea, quæ lapillorum formam habet, superficiem lævem, & splendentem: confracta micat, ut vitrum, nullasque strias exhibet; pulverata eximie rubet. Hujus purgandæ ratio duplex docetur pag. 65. Dosis autem a granis decem ad viginti.

CINNAMOMUM

Cortex cannulatus, subrufus, odoris fragrantis, saporis initio subdulcis, tum acris, & grati,

CITRAGO,

Melissa hortensis.

CITREUM Malum.

CITRULLUS,

Anguria.

CLEMATIS Daphnoides;

Vinca Peruvincia.

CNICUS sativus,

Carthamus.

CNICUS silvestris,

Carduus benedictus.

COCCI

COCCI Orientales,

Coccula Officinarum

Recentes deligantur, qui pinguem nucleum subflavum contineant. Hic enim vetustate ita extenuatur, ut vacua fere putamina remaneant.

COCCINELLA, vel Cochinilla

Sicca, ponderosa, extrinsecus albida, intus rubra sit; ac dentibus trita salivam rubicundo colore inficiat.

COCHLEARIA.

COCHLEARIA folio cubitali,

Raphanus rusticus.

COCHLEÆ terrestres,

Limaces testaceæ.

COLOCYNTHIS

Levis, alba, & cortice denudata præcipue deligi solet. *Ufus ejus in Trochiscis Alhandal.*

COLOPHONIA,

Quæ sic appellata est Fæx Terebinthinæ post elicium spiritum & oleum, sicca & tamen pinguis deligatur, translucens, subrufa; quæ autem nigra, ac nimium friabilis, minus probanda.

CONCHA margaritifera,

Mater Perlarum.

CONI Abietis,

Cupressi,

Pini.

CONSOLIDA major.

CONSOLIDA media.

CONSOLIDA minima;

Bellis minor.

C z

CON:

CONSOLIDA minor.

CONSOLIDÆ regalis Semen.

CONTRAYERVA Hispanica,

Drakena Radix

Oblonga, nodosa, extrinsecus rufa, intus albida,
odoris aromatici, saporis subacris, & paullulum
amari. Sit recens, densa, gravis, non cariosa.

CONTRAYERVA tuberosa Indica, subrotunda,
fulvo colore, cortice scabro.

CORALLINA

Integra, & munda sit, Musci formam habens, sub
dentibus stridula, colore cinereo & subviridi, sapore
falso, odore Concharum.

CORALLIUM album,
rubrum.

CORIANDRI majoris Semen.

CORNI Fructus.

CORNU Cervi.

CORTEX Guaiaci, V. Guaiaci Cortex.

CORTEX Peruvianus, V. Chinachina.

CORTEX Winteranus

Crassus, cannulatus, integumento cinereo fungoso,
inæquali, pluribus rimis hiantes, intus solidus, den-
sus, pallidus, acer, aromaticus, fragrantissimus.
Ejus loco, qui rarissimus omnino est, adhibetur
Costus corticosus, & a nonnullis Canella alba, quam
spurium Corticem Winteranum appellant.

CORYLUS,

Avellana.

COSTUS Arabicus,

Amayus

Amarus Officinarum.

Radiciſ huius forma, qualis fere Helenii. Optima cenſetur, quæ extrinſecus ex cinereo ad ruſum, intrinſecus ad flavum colorem vergat, fungoſa, & fractu difficilis, ſaporis acris, ſubamari, aromatici, odoris fere violacei.

COSTUS corticoſus, ſeu dulcis Officinarum

Convolutus, craſſus, ex ruſo ad flavum, quandoque ad cinereum colorem inclinans, ſaporis acris quaſi piperati, odoris aromatici.

COTONEUM, ſeu Cydonium Malum.

CRANIUM Humanum.

CRASSULA,

Fabaria.

CREPITUS Lupi.

CRESCIO,

Najurtium aquaticum.

CRESPINUS,

Berberis.

CROCUS Indicus, V. Curcuma.

CROCUS fativus.

CUBEBAE

Recentes ſint, odoræ, nucleo oleoſo præditæ, ſapore acri aromatico.

CUCUMERIS fativi Semen.

CUCUMERIS ſilveſtris, ſeu aſinini Radix, & Fructus.

CUCURBITÆ longæ flore albo Fructus.

CUCURBITÆ majoris Folia, & Semen.

CUMINI, yel Cymini Semen.

CUMI-

CUMINUM pratense,

Carvi.

CUPRESSI Nuces.

CUPRUM,

Æs.

CURCUMA

Radix dura admodum, & tuberosa, quæ Zingiberi formam, & odorem quodammodo refert. Sit gravis, densa, intus lucida, & crocea.

CUSCUTA major.

CUSCUTA minor,

Epithymum.

CYANI Flores.

CYCLAMEN,

Arthanita.

CYNOGLOSSI Radix.

CYNORRHODON, seu Cynosbatos.

CYPERI longi odorati Radix.

CYPERUS rotundus

Radix Olivæ figura, cortice subflavo, ductisque in orbem zonis distincto, substantia albida. Sit compacta, non cariota, odore gravi ad Nardum accedente, sapore acri subamaro.

CYTINI,

Punica sativa Flores.

D

DACTYLI Indi, V. Tamarindi.
DACTYLUS

Sit

Sit recens, pinguis, maturus, & subdulcis.

DAUCUS Creticus

Oblongum, exile, villosum, striatum, incanum
femen est; idemque eligatur mundum, odoratum,
sapore acri aromatico.

DELPHINIUM,

Consolida regalis.

DENS Leonis latiore folio;

Taraxacum.

DIAPENSIA,

Sanicula Officinarum.

DICTAMNI albi Radix:

DICTAMNUS Creticus,

Folia sint lanuginosa, & odorata, summitates floride.

DORONICI Radix.

DRACUNCULUS *hortensis.*

DRACUNCULUS polyphyllus;

Serpentaria major.

DRAKENA Radix, V. Contrayerva Hispanica.

E

EBULUS.

EBUR.

EBUR fossile, V. Unicornu fossile.

ECHINUS terrestris.

ELECTRUM, V. Succinum.

ELEMI.

Resina hæc pinguis sit, ex albo ad subviridem colorem

rem

rem vergens, flavisque sparsim maculis signata;
 odoris aromatici gravis, &, dum comburitur, fragrantis.

ELLEBORUS, V. Helleborus.

ENDIVIA sativa, seu vulgaris.

ENULÆ Campanæ Radix.

EPITHYMUM.

EQUISETUM,

Cauda equina.

ERINACEUS,

Echinus terrestris.

ERUCA tenuifolia flore luteo.

ERVUM verum,

Orobus semine majore.

ERYNGII vulgaris Radix.

ERYSIMUM vulgare.

ESULÆ minoris Radix.

EUPATORIUM Græcorum,

Agrimonia.

EUPHORBIIUM

In guttas concretum fit, pallidum, pellucidum;
 sapore acerrimo exurente.

EUPHRAGIA.

EXUVIÆ Viperarum.

F

FABÆ majoris Flos, Semen, Siliquæ.

FARINA Avenæ,

Cicerum;

Cicerum,
 Fabarum,
 Fœni Græci,
 Hordei,
 Lini,
 Lupinorum,
 Orobi,
 Secalis,
 Tritici.

FARINA volatilis.

FARFARA.

FEL Taurinum.

FEL Terræ,

Centaurium minus.

FERRUM.

FEX Olei.

FICUS passæ.

FILICIS fœminæ, & maris Radix :

FILICIS floridæ Radix.

FILIPENDULÆ vulgaris Radix :

FLORES quatuor cordiales Officinarum ;

Borraginis,

Buglossi,

Rosarum rubrarum,

Violarum.

FLOS Terræ,

Noſtoch.

FœNICULUM porcinum,

Peucedanum.

FœNICULUM dulce Officinarum :

D

Fœ-

FŒNICULUM tortuosum, V. Sefeli Massiliense.

FŒNI Græci Semen.

FOLIA Orientalia, V. Senna.

FOLIUM Indum, V. Malabarhrum.

FOLLICULI Bombycini, seu Serici.

FORMICÆ majores.

FRAGARIA.

FRAMBŒSIA,

Rubus Idaeus.

FRAXINELLA,

Dictamnus albus.

FRAXINUS.

FULIGO.

FUMARIA.

FUNGUS Laricis, V. Agaricum.

FUNGUS Melitensis, V. Fungus Typhoides;

FUNGUS pulverulentus,

Crepitus Lupi.

FUNGUS Sambuci.

FUNGUS Typhoides tuberosus.

Melitenses, qui ad nos deferuntur hujusmodi Fungi;
aridi, oblongi, & fere capitati sunt; extrinsecus
ferruginei coloris, intus subrufi, vel fusci, eorum-
que subsalsus, ac terrestris sapor est.

FURFUR.

G

GALANGA minor

Radix tuberosa, extrinsecus ductis in orbem palli-
dis

dis funiculis , velut in plures zonas distincta. Tota est rufa , sapore acri , & styptico , odore fragrante aromatico .

GALANGA major

Minore crassior est , minus odorata , minus acris , colore autem magis diluto .

GALBANUM

Sive in guttas Olibano fere similes , sive in massam coactum , deligatur flavum , resinosum , purum , pingue , nec valde tenax , nec penitus aridum ; odore gravi , sapore acri subamaro .

GALEGA vulgaris.

GALEOPSIS,

Urtica iners flore purpureo .

GALLA Nostras.

GALLA Orientalis

Probatur gravis , densa , intus lucida , & subnigra .

GENEPI,

Absinthium Alpinum candidum , humile .

GENISTÆ junceæ Flores , & Semen .

GENTIANÆ majoris Radix .

GIN-SENG

Oblonga radix auricularis digiti , vel calami scriptorii crassitie , interdum bifida , ambientibus signata rimulis , subflava , solida , insipida primum , mox subdulcis cum levi quadam acritudine , & amaritie , odore suavi . Rarissima est , maximoque pretio venditur .

GLANS Unguentaria , V. Balanus Myrepfica .

GLUTEN Piscium .

D 2

GLY-

GLYCYRRHIZA filiquosa,

Liquiritia.

GOSSIPIUM,

Bombax Officinarum.

GRAMINIS Canini arvensis Radix;

GRANA Paradisi,

Cardamomi majoris Semina.

GRATIOLA.

GROSSULARIA non spinosa,

Ribes Officinarum.

GUAIACI Cortex

Probaturn tenuis, durus, ex pluribus lamellis tenuissimis conflatus, qui ex cinereo, vel cæruleo ad subviridem colorem vergat, intus lucidus, & fractu difficilis.

GUAIACI Gummi

Mundum sit, colore subnigro rubente, perlucidum, friabile, suaveolens dum incalescit, sapore acri.

GUAIACI Lignum

Solidum, densum, resinofum est, & in aqua demergitur; lucidum quoque, & suaveolens dum calefcit; exteriori parte buxei coloris, interiore subnigra.

GUMMI Ammoniacum, V. Ammoniacum Gummi.

GUMMI Anime, V. Anime.

GUMMI Arabicum

Eligendum est nitidum, siccum, pellucidum, insipidum, quod aqua facile dissolvatur.

GUMMI Caranna, V. Caranna.

GUMMI Elemi, V. Elemi.

GUMMI

GUMMI Gutta

Probatur siccum, purum, lucidum, colore flavo sub-
ruffo, quod vini spiritu prorsus diffolubile fit. Dosis
a granis quatuor ad octo.

GUMMI Hederae, V. Hederae Gummi.

GUMMI Juniperi, V. Juniperi Gummi.

GUMMI Lacca, V. Lacca.

GUMMI Sagapenum, V. Sagapenum.

GUMMI Tacamahaca, V. Tacamahaca.

GUMMI Tragacanthum, V. Tragacanthum.

GUTTA Gamba, V. Gummi Gutta.

H

HÆMATITES

Sit gravis, purus, nitidus, oblongis fibris cuspidatis
constans, cui pulverato saturata rubedo accedat.

HALANDAL, V. Colocynthis.

HALICACABUM,

Alkekengi.

HEDERA arborea.

HEDERA terrestris.

HEDERÆ Gummi

Sit purum, perlucidum; obscuro colore subrubro,
sapore subamaro, odore gravi, intus nitore vitreo.

HELENIMUM,

Enula Campana.

HELLEBORI ^{albi}) Radix.
 ^{nigri})

HEL-

HELXINE,

Parietaria.

HEPATICA Fontana:

HEPTAPHYLLUM,

Tormentilla.

HERBA Paralyfis,

Primula veris.

HERBÆ quinque Capillares Officinarum:

Adiantum album,

Capillus Veneris,

Ceterach,

Lingua Cervina,

Polytrichum.

HERBÆ quinque Emollientes Officinarum:

Althæa,

Beta,

Malva,

Mercurialis,

Viola.

HERMODACTYLUS Officinarum.

Tuberosa hæc radix albida sit, ponderosa, sine carie, sapore subacri.

HERNIARIA,

Polygonum minus.

HIPPOLAPATHUM,

Rhabarbarum Monachorum.

HIPPURIS,

Cauda Equina.

HIRCI montani Sanguis concretus:

HIRUNDINARIA,

Chel

Chelidonium majus.

HIRUNDINES.

HISPIDULA.

HORDEI Semen.

HORMINUM,

Sclarea.

HYACINTHUS Lapis.

HYDRARGYRUS,

Argentum vivum.

HYDROPIPER,

Persicaria urens.

HYOSCYAMUS albus;

niger.

HYPERICUM vulgare.

HYPOCISTIS.

Concretus hic Succus niger, lucidus, gravis sit, arenularum expers, sapore acido austero, sine empyreumate.

HYSSOPUS.

I

JACOBÆA.

JALAPPA

Extrinsecus subnigra sit, intus cinerea & subrufa; solida, fractu contumax, & in plures circulos dispositis resinosis partibus nitens; quæ in ignem injecta flammam facile concipiat. Dosis a drachma dimidia ad drachmam unam.

IBISCUS,

Althea.

ICH-

ICHTYOCOLLA,

Gluten Piscium.

JECORARIA,

Hepatica Fontana.

IMPERATORIÆ Radix.

INTYBUS,

Endivia.

INULA,

Enula Campana.

IPECACUANHA

Radix Americana calamo scriptorio plerumque ex-
lior, tortuosa, superficie inæquali, fusco, vel albi-
do colore, vel cinereo ad rufum inclinante. Eliga-
tur crassa, compacta, resinosa.

IRIS Florentina

Cortice denudata radix, alba, compacta, gravis &
intus lucida sit, odore violaceo, sapore paullulum
acri & subamaro, non cariosa.

IRIS vulgaris, sive silvestris.

IVA Arthetica, sive Arthritica,

Chamaepitys lutea vulgaris.

JUIUBÆ.

JUNCUS odoratus, V. Schoenanthum.

JUNIPERI vulgaris fruticosæ Lignum, & Baccæ:

JUNIPERI Gummi

In lacrymas oblongas concretum, sincerum, niti-
dum, translucens, albidum, & cum inveterascit
subflavum, odoris, dum accenditur, fragrantis.

JUPITER,

Stannum.

JUS-

JUSQUIAMUS,

Hyoscyamus.

K

KARABE, V. Succinum.

KERMES, V. Chermes.

KINAKINA, V. Chinachina.

L

LABDANUM, seu Ladanum

Probatur leve, pingue, resinofum, subamarum, colore fulco, quod tactu facile mollescat, & dum accenditur, gratum odorem spiret.

LACCA in ramulis

Pellucida, inæqualiter granosa eligatur, intus cavernosa, quæque dentibus trita rubicundo colore salivam inficiat.

LACERTÆ virides.

LACTUCA hortensis.

LACTUCA silvestris,

Scariola.

LAMIUM album,

Urtica iners flore albo.

LANA succida.

LAPATHI acuti Radix.

LAPATHUM hortense latifolium,

Rhabarbarum Monachorum.

LAPIS Bezoardicus, V. Bezoar.

E

LAPIS

LAPIS Calaminaris, V. Calaminaris Lapis.

LAPPA major,

Bardana major.

LAVANDULÆ Spicæ florentes.

LAURUS tenuifolia.

LAURUS vulgaris latifolia.

LENTISCI Lignum

E Chio delatum, & ponderosum præcipue commendatur; cujus corticis color cinereus, vel fuscus in subrufum, albida substantia solida, & compacta in flavum vergat. Quandoque Mastices lacrymæ passim cortici inhærescunt.

LEPORIS Pili, & Sanguis.

LEUCANTHEMUM,

Chamamelum vulgare.

LEUCOIUM luteum vulgare,

Cheiri.

LEVISTICUM,

Siler montanum.

LICHEN arboreus.

LICHEN petraeus latifolius,

Hepatica Fontana.

LIGNI sancti Cortex, V. Guajaci Cortex.

LIGNUM Aloës

Omnino rarissimum est, cujus tamen nomine appellari solent in Officinis quædam lignorum fragmenta, quæ magnitudine, gravitate, & colore inter sese differunt. Illud autem genuinum censetur, quod ponderosum, durum, versicolor, pingue, & subamarum sit, ac, dum comburitur, suavem odorem spiret.

LI-

LIGNUM fœniculatum, V. Sassafras.

LIGNUM Nephriticum, V. Nephriticum Lignum.

LIGNUM Pavanum, V. Sassafras.

LIGNUM Rhodium,

Cyprium,

Rosaceum,

Radix lignosa, nodosa, densa, solida, pinguis, sub-
flava, sabamari saporis, odorisque rosei.

LIGNUM sanctum, V. Guajacum.

LIGUSTICUM,

Siler montanum.

LILII Convallium Flores:

LILIUM album.

LIMACES testaceæ:

LIMONES,

Mala Limonia.

LINGUA Canina;

Cynoglossum.

LINGUA Cervina Officinarum,

Scolopendrium.

LINI sativi Semen.

LIQUIRITIÆ Radix:

LIQUIRITIÆ Succus concretus

Sit densus, lucidus, ac dulcis: contrectatus facile mol-
lescat, & in ore detentus prorsus liquetur.

LITHARGYRUS, seu Lithargyrium Auri,

Argenti.

LITHOSPERMUM,

Milium Solis.

LUCII Piscis Mandibulæ.

LUJULA,

E 2

Aceto-

Acetosella.

LUMBRICI terrestres,

Vermes terrestres.

LUNA,

Argentum.

LUNARIA Botrytis.

LUPINI Semen.

LUPULUS.

LYCOPERDON vulgare,

Crepitus Lupi.

M

MACIS.

Medium hoc Nucis moschatae involucrium subrufi coloris sit, odoris grati aromatici, saporis subacris, & jucundi.

MACROPIPER, V. Piper longum.

MAJORANA vulgaris.

MALABATHRUM, seu Folium Indum Officinarum Lauri vulgaris folio amplius est. Nervi tres a petiolo ad apicem folii producuntur. Densum est, fractu contumax, glabrum, splendens, subviride.

MALICORIUM,

Granatorum Cortex.

MALI Granatae fativae Flores, & Fructus.

MALI Granatae silvestris Flores.

MALI Persicae Flores, & Nuclei.

MALVA vulgaris.

MALUM

MALUM Aurantium Vulgare,
Lusitanicum,
Sinense.

Citreum,
Citreum Florentinum odoratissimum, vul-
go *Cedrato*.

MALUM Cotoneum, vel Cydonium.

MALUM Limonium.

MANDRAGORA.

MANNA

Calabrica laudatur, recens, granosa, albida; sin-
cera, saporis subdulcis, quæ facile aqua dissolvatur.

MARGARITÆ

Eligantur tam Orientales, quam Occidentales, can-
didæ, & pellucidæ, quæ tum cito in pulverem re-
digantur, tum aquam lactescentem efficiant.

MARRUBIUM album vulgare.

MARS,

Ferrum.

MARUM

Cum raro ad nos deferatur, ejus loco Majorana uti-
mur.

MASTICHE, vel Mastice,

Resina Lentisci

Optima ex Chio, quæ sincera, translucens, odora,
& friabilis sit, tum in oleo facile lique scat.

MATER Perlarum.

MATRICARIA vulgaris,

MATRISYLVA.

MECHOACANNA

Crassa

Crassa Radix, albida, circulis distincta, sapore farinaceo, odore nullo. Improbanda est acris, subamara, & cariosa. Exhibetur a scrupulis duobus ad quatuor.

MEDULLA cruris Bovis,
Cervi,
Vituli.

MEL Hispanicum.

MEL Nostras.

MELILOTUS vulgaris flore luteo.

MELISSA hortensis.

MELONIS Fructus, & Semina.

MENTHA cataria,

Nepeta.

MENTHA sativa, vel hortensis.

MENTHA silvestris,

Mentastrum.

MENYANTHES,

Trifolium fibrinum.

MERCURIALIS.

MERCURIUS,

Argentum vivum:

MESPILI vulgaris Fructus.

MEU, vel Meum Athamanticum

Oblonga Radix capite barbato, digitum fere crassa, vel amplius; extrinsecus subnigra, intus albida, & subflava. Probatum recens, cujus odor aromaticus, sapor acer, & subamarus.

MILII Solis Semen.

MILLEFOLIUM vulgare.

MILLE-

MILLEGRANA major,

Herniaria.

MILLEGUETA,

Cardamomi majoris Semen.

MILLEPEDÆ.

MINIUM.

MOMORDICÆ vulgaris Fructus.

MORI nigræ Fructus.

MORSUS Diaboli,

Succisa.

MOSCHUS.

Laudatur is, qui admodum olet, ex rufo ad obscurum colorem inclinans, subamarus, arenularum expers, nec valde humidus, nec siccus omnino.

MUMIA Officinarum

Pura sit, compacta, subnigra, lucida, odore gravi, non ingrato.

MUSCERDA,

Stercus Murium.

MUSCUS arboreus villosus.

MUSCUS aureus, seu capillaris,

Adiantum aureum.

MUSCUS marinus, V. Corallina.

MUSCUS terrestris clavatus,

Lycopodium.

MYRISTICA Nux, V. Nux Moschata.

MYROBALANI quinque:

Citrina densa, carnosæ, gravis, angulosa.

Bellerica rotunda, ponderosa, rufo cortice, pulpa abundans, qua inclusum est officulum.

Che-

Chebula omnium maxima, oblonga, paullulum rugosa, colore fusco, cortice crasso, officulo oblongo.

Emblīcæ subrotunda figura, obscurusque color. Quod in pulpa includitur os angulosum, persæpe deest in hac Myrobalano, quæ raro integra ad nos defertur.

Inda oblonga, parva, nigra, rugosa, densa, & dura; plerumque caret officulo.

MYRRHA

In lacrymas concreta sit, concolor, & resinosa, quæ contracta albidas intus micas habeat: lucida etiam, odora, pinguis, & amara.

MYRTUS latifolia communis.

MYXA, V. Sebesten.

N

NAPI dulcis fativæ, vel silvestris Semen.

NARDUS Celtica,

Spica Celtica.

NARDUS Indica

Oblonga radix, in modum spicæ comosa, fibris convolutis, levis, colore fusco subrufo, aromatica, subacris, & paullulum amara.

NARDUS Italica,

Lavandula.

NASTURTIUM aquaticum.

NASTURTIUM hortense.

NASTURTIUM Indicum.

NENU-

NENUPHAR,

Nymphaea.

NEPETA.

NEPHRITICUM Lignum.

Exterior Ligni pars pallida, & subflava; interior obscura, solidior, gravior, & subamara. Huic Ligno peculiare illud est, quod aqua ex eodem infuso colorem varium referat; si enim in vitreo vase ad solis radios spectetur, flava; e contraria parte caerulea apparet.

NERIUM,

Oleander.

NICOTIANA,

Tabacum.

NIGELLÆ flore minori simplici Semen.

NISI, V. Ginseng.

NITRUM.

NOSTOCH,

Cælisolium,

Flos Terræ.

NUCLEI Persici.

NUCLEI Pinei.

NUMMULARIA.

NUX Avellana, seu Corylina,

Ben, V. Balanus Myrepfica,

Cupressi,

Juglans.

NUX Moschata, seu Nucista

In superficie cineracea, intus subrufa; albidisque venis distincta. Sit gravis, odorata, non cariota.

F

NYM-

NYMPHÆÆ Radix, & Flores.

O

OCIMUM citratum.

OCULI, seu Lapilli Cancrorum

Albidi sint, orbiculati, ex lamellis compositi, altera parte convexi, ubi sulculi ramosi apparent; altera compressi, & circulatim sinuosi, ut rudem quandam sigilli formam referant.

OCULI Populi,

Populi Gemma.

OLEANDER.

OLEUM Olivarum,

Commune.

OLEUM Petræ, V. Petroleum.

OLIBANUM

In guttas concretum sit albidus, pellucidus, & pinguis, saporis amari, odoris, dum accenditur, suavis.

ONONIS, seu Anonis.

OPTHALMICA,

Euphrasia.

OPIUM

Eligendum est compactum, sordium expers, fuscum, lucidum, graveolens, subamarum, & inflammabile: cavernosum vero, nigrum, acerrimumque reiiciendum. Exhibetur a grano dimidio ad granum unum.

OPOBALSAMUM, V. Balsamum Ægyptium.

OPOPANAX

In

In croceos grumos coactus, friabilis, facile in aqua
liquefcens, fapore acri, amaro; gravique odore ad
Galbanum accedente.

ORCHIS,

Satyrium.

ORIGANUM vulgare.

OROBİ Semen.

OSMUNDA foliis lunatis,

Lunaria Botrytis.

OSMUNDA regalis,

Filix florida.

OS Sepiæ.

OSTEOCOLLA.

OXALIS minor,

Acetosa arvensis lanceolata.

OXALIS fativa,

Acetosa hortensis.

OXYACANTHA,

Berberis.

OXYLAPATHUM,

Lapathum acutum.

OXYS flore albo,

Acetofella.

P

PÆONIÆ maris Radix, & Semen.

PÆONIÆ fœminæ Flores.

PALMULA, V. Dactylus.

PANIS porcinus,

Arthanita.

F 2

PAPA-

PAPAVERIS albi Capita, & Semina.

PAPAVERIS erratici, rubri, seu rheados Flores.

PARADISI Grana,

Cardamomi majoris Semina.

PARALYSIS herba,

Primula veris.

PAREIRA brava

Tortuosa Radix pollicari, & amplius, interdum brachiali crassitudine, extrinsecus fusca, aut nigricans, intus subpallida, paullulum dulcis, & subamara.

PARIETARIA.

PARONYCHIA.

PARTHENIUM,

Matricaria.

PASSULÆ majores,

Passula Damascena.

PASSULÆ minores,

Passule Corinthiaca.

PAVONIS Stercus.

PEDICULARE Granum, V. Staphisagria.

PENTAPHYLLUM,

Quinquesolium.

PERFORATA,

Hypericum.

PERICLIMENUM,

Matrisilva.

PERLÆ, V. Margaritæ.

PERSICARIA mitis maculosa.

PERSICARIA urens.

PERSONATA,

Bardana.

Bardana.

PER VINCA,

Vinca pervinca.

PES Cati Offinarum,

Hispidula.

PETASITES major vulgaris.

PETROLEUM

Limpidum sit, tenue, subflavum, odoris bituminosi
acuti, saporis subacris subamari.

PETROSELINUM,

Apium hortense.

PETROSELINUM Macedonicum

Exile Semen oblongum, leve, striatum, ex fusco ad
subviridem colorem vergens. Mundum sit, nutri-
tum, odore aromatico, sapore acri, & subamaro.

PETUM,

Tabacum.

PEUCEDANI Radix.

PHU,

Valeriana.

PHYLLITIS,

Lingua Cervina.

PICEA Latinorum,

Abies rubra.

PILA marina.

PILOSELLA major repens hirsuta.

PIMPINELLA sanguisorba.

PINGUEDO, V. Adeps.

PINI Nuclei, Resina, Strobili.

PIPER longum

Sit ponderosum, albida superficie granosa, aroma-
ticum, & acerrimum.

PIPER

PIPER nigrum, & album.

Utrumque probatur, quod bene nutritum, ponderosum, parum rugosum, intus albidum, saporis acris, & fervidi aromatici, odoris fragrantis acuti.

PIPER Indicum,

Capsicum.

PISTACIA.

PITYUSA,

Esula minor.

PIX Burgundica

Ex albido ad citrinum colorem vergat; mollis, & pinguis sit in modum ceræ, odore non ingrato.

PIX navalis.

PIX nigra, cujus loco navalis adhiberi solet.

PIX Resina,

Resina pinea.

PLANTAGO angustifolia,

Quinquenervia.

PLANTAGO latifolia.

PLUMBUM.

POLII montani Summitates floridæ.

POLYGONATUM latifolium,

Sigillum Salomonis Officinarum.

POLYGONUM majus,

Centinodia.

POLYGONUM minus,

Herniaria.

POLYPODII querni Radix.

POLYTRICHUM Officinarum,

Trichomanes.

POMA

POMA curripendula fragrantia.

POMPHOLIX

Quod raro inveniri soleat, ejus loco Tuthia adhibetur.

POPULI Gemmæ, five Oculi.

PORRI sativi Radix.

PORTULACA sativa, seu latifolia.

POTENTILLA.

PRASSIUM album,

Marrubium album vulgare.

PRIMULA veris flore luteo simplici.

PRUNA Damascena.

PRUNELLA,

Consolida minor.

PRUNI silvestris Flores, & Fructus.

PSYLLII Semen.

PULEGIUM vulgare, seu latifolium.

PULMONARIA arborea,

Lichen arboreus.

PULMONARIA maculosa latifolia.

PUMEX.

PUNICA,

Malus Granata.

PYRETHRUM

Sit ponderosum, fractu difficile, sapore acerrimo.

PYROLA rotundifolia major.

Q

QUERCULA,

Chamedrys.

QUERCUS.

QUIN-

QUINQUEFOLIUM.
QUINQUENERVIA.

R

RADICES quinque Aperientes Officinarum:
 Apii dulcis,
 Asparagi,
 Brusci,
 Foeniculi,
 Petroselini.

RANARUM Sperma.

RANÆ aquaticæ.

RANUNCULUS minor,

Chelidonium minus.

RAPÆ fativæ Radix, & Semen.

RAPHANI hortensis Radix, & Semen.

RAPHANI rustici Radix.

RAPUM Terræ,

Arihanita.

REGINA Prati,

Ulmaria.

RESINA pinea.

RESTA Bovis,

Anonis.

RHABARBARUM, Rha, vel Rheum

Sit grave, odorum, sine carie, intus versicolor, rubrisque intermistis venis ad carneum colorem accedens, quod salivam croceo colore mansum intingat, & gustu subamarum, ac stypticum percipiatur. Dosis

a scrupulis duobus ad quatuor.

RHABARBARI Monachorum Radix.

RHAPONTICUM

Adhibendum est Orientale, vel Thracicum, faciem habens Rhabarbari, magis tamen oblongum, & rufum, minusque crassum. Levi quadam acritudine, amaritie, lentore, & astrictione gustum afficit, atque in eo transversim secto circuli radiati cernuntur.

RHEUM, V. Rhabarbarum.

RHUS Obsoniorum, V. Sumach.

RIBES Officinarum,

Ribesii Fructus ruber.

RICINUS,

Cataputia major.

ROSA alba.

ROSA Damascena.

ROSA pallida.

ROSA rubra.

ROSA silvestris, seu canina;

Cynorrhodon.

ROSMARINUS.

RUBI Idæi spinosi Fructus, qui *Frambæsia* vulgo appellantur.

RUBI vulgaris Fructus, Mori silvestres dicti.

RUBIÆ Tinctorum Radix.

RUMEX,

Lapathum acutum.

RUSCUS,

Bruscus.

ruta Capraria,

G

Galega.

Galega.

RUTA hortensis latifolia.

RUTA muraria.

S

SABADILIA;

*Sabadilli,**Sabaidilla.*

In folliculo Delphinii siliquæ non multum absimili;
 triquetro, subrufo continentur Semina tria oblonga,
 nonnihil curva, extrinsecus nigra, intus albida, sa-
 poris acris, & amari.

SABINA.

SACCHARUM album;

rubrum,

candum, vel cantum.

SAGAPENUM

Optimum est, quod purum, nitidum, & in guttas
 concretum, extrinsecus fulvas, intus albidas, sapore
 acri, odore gravi, & alliato.

SAL Ammoniacum, vel Armoniacum

In superficie cinereum, intus crystallinum, can-
 didum purum, & siccum, gustu salsum, & pera-
 curum.

SAL commune.

SAL gemmæ.

SAL marinum,

Sal commune.

SAL Nitri,

Nitrum.

Nitrum.

SALIX Amerina,

Agnus castus.

SALIX vulgaris alba arborescens.

SALSA Parilla

Sit flexilis, non cariosa, nec pulverulenta dum frangitur; & assulatim facile scindatur; cujus substantia candida, parvumque meditullium. Quæ crassior est maxime probanda.

SALVIA hortensis.

SALVIA vitæ,

Ruta muraria.

SAMBUCUS vulgaris.

SAMBUCUS humilis,

Ebulus.

SAMPSUCUS,

Majorana vulgaris.

SANDARACA Arabum, V. Juniperi Gummi.

SANGUIS Draconis.

In grumos puros, lucidos, fragiles, & admodum rubicundos hoc Gummi concretum sit.

SANICULA Officinarum.

SANICULA Alpina,

Auricula Urfi.

SANTALUM, vel Sandalum album.

SANTALUM citrinum

Eligendum est solidum, ponderosum, sine carie, subflavum, & odoriferum.

SANTALUM rubrum

Solidum sit, densum, grave, in aqua subsidens, ru-

G 2

bicundo

bicundo colore obscuro : idemque mansum nec gustu dulce sit, nec salivam intingat.

SANTONICUM

Mundum sit, recens, pallidum, & subviride, gravi odore aromatico, sapore acri & amaro.

SAPONARIA vulgaris, seu lævis.

SARCOCOLLA

Gummi leve, friabile, spongiosum, lucidisque micis intermixtum, gustu subamarum, cum quadam dulcedine. Quod recens pallidum est, vetustum nonnihil rubet.

SARSA Parilla, V. Salsa Parilla.

SASSAFRAS.

Ligno præcellit Radix, quæ cortice extrinsecus cinereo, intus rubro obtegatur. Ipsa autem lignosa Radix ponderosa sit, subrufa, Fœniculi odorem spirans, sapore subdulci, & subacri.

SATIRII Radix.

SATUREJÆ sativæ Summitates.

SATURNUS,

Plumbum.

SAXIFRAGÆ Radix.

SCABIOSA vulgaris major.

SCAMMONIUM

Syriacum, seu ex Alepo delatum cæteris præstantius habetur; sitque purum cinerei obscuri coloris, lucidum, leve, friabile, resinofum, subamarum, graveolens; idemque madidis contrectatum digitis albescat. Illud rejiciendum, quod acre admodum sit, nigrum, durum, fractu contumax, & ponderosum.

Exhi-

Exhibetur a granis decem ad quindecim.

SCARIOLA.

SCHŒNANTHUM.

Eligantur Flores, vel Summitates floridæ, carnei coloris, odoris suavis, &, cum incalescunt, resinosi, saporis acris subamari.

SCILLÆ vulgaris Radix.

SCINCUS Marinus

Cum Lacerta viridi quamdam habet similitudinem; sed magis exiguum, atque oblongum Scinci caput est, rostrum acutius, dorsum latius, & squamosa cute argentea tectum, quæ transversis subnigris zonis passim distincta est.

SCLAREA.

SCOLOPENDRIA;

Lingua Cervina.

SCORDIUM.

SCORPIONES.

SCORZONERA latifolia sinuata, seu Hispanica:

SCROPHULARIÆ majoris nodosæ Radix.

SCROPHULARIA minor,

Chelidonium minus.

SEBESTEN.

Pruno similis Fructus hic eligatur recens, carnosus, subdulcis, & nigricans.

SEBUM, vel Sevum

Bovinum,

Cervinum,

Hircinum,

Ovillum.

SE-

SEDUM majus,

Sempervivum majus.

SEDUM minus.

SEDUM minimum,

Vermicularis.

SEMEN Badianum, V. Anisum stellatum:

SEMEN sanctum, V. Santonicum.

SEMINA quatuor calida majora Officinarum:

Anisi,

Cumini,

Carvi,

Fœniculi.

SEMINA quatuor calida minora:

Ammeos,

Amomi,

Apii hortensis;

Dauci.

SEMINA quatuor frigida majora:

Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonis.

SEMINA quatuor frigida minora:

Cichorii,

Endiviæ,

Lactucæ,

Portulacæ.

SEMPERVIVUM.

SENNA Orientalis

Integra sit, munda, tactu lævis, nec maculata, nec
pulverulenta.

SEPIÆ

SEPIÆ Os.

SERICI Folliculi.

SERPENTARIÆ majoris Radix.

SERPENTARIA Virginiana

Valde odorata est, russeo colore diluto, sapore acri
subamaro. Quæ vetustate, aut corruptione nigruit,
& multum odoris amisit, repudianda.

SERPILLUM vulgare.

SERTULA Campana,

Melilotus.

SESELI Massiliense

Angulosum Semen ad Fœniculi formam accedens;
odoris grati, saporis acris aromatici.

SIGILLI Salomonis Radix.

SILERIS montani Semen.

SILQUA edulis,

Caroba Officinarum.

SIMAROUBÆ Cortex, & Lignum.

Corticis superficies inæqualis, vel aspera est; palli-
dus color, qui ad subflavum vergit; idemque fibro-
sus Cortex, inodorus, & subamarus est, a subjecto
Ligno candido, levissimoque facile separabilis.

SINAPI Semen.

SISYMBRIUM aquaticum,

Nasturtium aquaticum.

SMILACIS asperæ Radix.

SMILAX aspera Peruana, V. Salsa Parilla:

SOL,

Aurum.

SOLANUM Officinarum acinis nigricantibus, seu
hortense.

SOLA-

SOLANUM vesicarium,

Alkekengi.

SONCHUS asper,

Cicerbita aspera.

SONCHUS lævis,

Cicerbita lævis.

SORBI fativæ Fructus.

SPARTIUM arborescens;

Genista juncea.

SPERMA Ceti

Sit recens, candidum, tenerum, pingue, ex nitidis
squamulis conflatum, non rancidum, nec flavum.

SPERNIOLA,

Ranarum Sperma.

SPICA Celtica.

SPICA Nardi, V. Nardus Indica:

SPICA vulgaris,

Lavandula.

SPINA acida,

Berberis.

SPINA Cervina, seu infectoria;

Rhamnus Catharticus.

SPINA solstitialis,

Carduus stellatus.

SPINACHIA vulgaris:

SPONGIA marina.

SPONGIA Rosæ sylvestris:

STANNUM,

Jupiter.

STAPHISAGRIA

Semen

Semen fere triquetrum, subnigrum, asperum, intus
albidum, aut flavesceus, valde amarum, acerrimum-
que.

STELLARIA.

STIBIUM,

Antimonium.

STOËCHAS Arabica.

Eligenda hæc Spica florida, odorata, saporis suba-
cris, subamari.

STROBILI, V. Coni.

STYRAX Calamita

Sit purus, pinguis, resinosus, rufus, albidis micis
interstinctus, odore suavi, sapore subacri.

STYRAX liquidus Officinarum

Terebinthina crassior, cinerei coloris, odorisque gra-
vis; licet Styracem Calamitam paullulum redoleat.

SUBER.

SUCCINUM album,

citrinum

Sit purum, & perlucidum, quod festucas, paleas-
que attrahat, accensumque gratum odorem exhalet.

SUCCISA.

SUCCUS Liquiritiæ inspissatus, V. Liquiritiæ Succus.

SULPHUR nativum, seu vivum.

SULPHUR fusum, seu citrinum.

SUMACH

Racemosus fructus baccis, seu acinis rubris constans,
acidi saporis, quibus inclusum est semen prædurum,
planum, coloris fere spadicei.

SYMPHYTUM maculosum,

H

Pulmo.

Pulmonaria maculosa latifolia.

SYMPHYTUM majus,

Consolida major.

SYMPHYTUM medium;

Consolida media.

SYMPHYTUM minimum;

Bellis minor.

SYMPHYTUM minus;

Prunella.

T

T ABACUM.

TACAMAHACA

Sicca, resinosa, rufa, nitida, albidisque micis distincta, suaveolens, & aromatica.

TAMARINDI

Plurimis fibris intertexti sunt, cum ossiculis duris fere quadratis, & lucidis. Sint recentes, teneri, rufi obscuri coloris, saporis subacidi vinosi.

TAMARISCUS.

TANACETI vulgaris lutei Flores.

TAPSI barbati Flores.

TARAXACUM,

Dens Leonis.

TARTARUM album;

rubrum.

TEREBINTHINA

Ceteris præstantior Chia, vel Cypria, quæ Nostrate crassior est, pura, translucida, ex flavo colore ad viridem,

dem, vel caeruleum vergens, odorata, & subacris.

TERRA Japonica, V. Catechu.

TERRA Lemnia,

Terra sigillata.

TESTUDO terrestris.

THLASPI, vel Thlaspios Semen:

THE, vel Thea.

THUS, V. Olibanum.

THYMELÆÆ Radix

Adhibetur Romana, extrinsecus rufa, intus albida,
ex mollibus lanuginosis fibris conflata.

THYMUS vulgaris.

TILIÆ feminae folio minori Flores:

TITHYMALUS folio Pini,

Esula minor.

TORMENTILLÆ Radix.

TRAGACANTHUM

Sit album, lucidum, leve, gracile, vermiculatum,

TRAGOPOGON,

Barba Hirci.

TRIBULUS terrestris.

TRICHOMANES.

TRIFOLIUM acetosum,

Acetofella.

TRIFOLIUM fibrinum.

TRIFOLIUM hepaticum,

Herba Trinitatis.

TRIFOLIUM odoratum,

Melilotus vulgaris.

TRIXAGO,

H 2

Chamae-

Chamedrys.

TUNICA,

Caryophyllus hortensis.

TURBITH, seu Turpethum.

Crassa hæc Radix, & resinosa sit, extrinsecus fusca, intus albida, fractu contumax, non cariola. Dosis a Drachma dimidia ad drachmam.

TUSSILAGO,

Farfara.

TUSSILAGO major,

Petasites major vulgaris.

TUTHIA

Ponderosa, & fractu difficilis, ex cinereo ad ceruleum colorem vergens; convexa ejus pars tuberculis aspera, concava lævis, gustu acris, odore nullo.

Ignita, dein frigefacta nativum colorem retinet.

TYPHI cervini,

Tenella, & lanuginosa Cervorum Cornua.

V

VALERIANÆ silvestris Radix.

VANILLA, vel Vanilia

Pinguis sit, gravis, mollis, flexilis, odoratissima; jucundi, & subacris saporis, nigra, & lucida semina includens.

VENUS,

Æs.

VERATRUM,

Helleborus.

VERBASCULUM,

Primula veris.

VER-

VERBASCUM mas latifolium luteum,

Tapsus barbatus.

VERBENA vulgaris.

VERMES terrestres.

VERMICULARIS,

Sedum minimum.

VERONICA mas supina vulgatissima.

VERONICA aquatica,

Beccabunga.

VINCA Pervinca.

VINCETOXICI Radix.

VIOLA Martia flore simplici odoro,

Violaria.

VIPERARIA;

Scorzonera.

VIPERÆ.

VIPERINA Radix, V. *Serpentaria Virginiana.*

VIRGA aurea vulgaris latifolia.

VISCUS quernus

Sit ponderosus, fusca superficie, intus ex flavo ad
rufum colorem inclinans, & radiatus.

VITEX,

Agnus castus.

VITIS alba,

Bryonia alba.

VITRIOLUM album;

caeruleum, seu Cyprium;

viride.

ULMARIA.

ULMI Cortex, Folia, & Liquor Vesicularum.

UN-

UNGULA Alcis.

UNICORNU, vel Cornu fossile

Cortex subcinereus, vel subniger, durior medulla,
quæ ex laminis composita, albida, friabilis est instar
offis usti, & linguæ facile adharet.

UNIONES, V. Margaritæ.

URTICA urens major, & minor.

URTICA iners flore albo.

URTICA iners flore purpureo.

UVÆ passæ.

VULPES.

X

XYLOALOE, V. Lignum Aloes.

XYLOCASSIA, V. Cassia lignea.

XYLON,

Bombax Officinarum.

Z

ZEDOARIA

Radix tuberosa, extrinsecus cinerea, parum rugosa,
intus subrufa, resinosa, lucida, saporis acris tuba-
mati, odoris ad Caphuram accedentis.

ZINZIBER, vel Zingiberi

Radix nodosa, odorata, resinosa, saporis acris pi-
perati. Deligatur solida, & fractu contumax.

ZIZYPHA,

Jujuba.

PHAR-