



PHARMACOPŒÆ
TAURINENSIS
PARS PRIMA,

*In qua Simplicia cujusque generis Medicamenta
litterarum ordine servato recensentur: Peregrina
insuper ex precipuis eorumdem notis pleraque
describuntur.*

A



BIETIS rubræ Coni, & Resina.

ABROTONUM mas angustifolium
majus,

Abrotonum vulgare.

ABSINTHIUM Ponticum latifolium,
seu Romanum Officin.

Absinthium vulgare majus.

ABSINTHIUM Ponticum tenuifolium incanum.

ABSINTHIUM Alpinum candidum humile,

Vulgo Genepi.

A

ACACIA

ACACIA vera, seu Ægyptia

Succus è fructu immaturo Spinæ Ægyptiæ expret-
sus, & densatus, ponderosus, compactus, luci-
dus, coloris rufi, saporis austeri. Hæc autem Aca-
cia vera in Officinis nostris obsolevit, cui Nostras,
vel Germanica subrogari solet.

ACACIA Germanica

E prunis silvestribus immaturis elicitus succus est,
atque inspissatus.

ACANTHUS sativus,

Branca Ursina.

ACETOSA arvensis lanceolata.

ACETOSA rotundifolia hortensis.

ACETOSELLA.

ACETUM vini.

ACMELLA,

Atemella, Atmella.

Folia hujus Plantæ Ceylanicæ subacria sunt, foliis
Lamii, aut Urticæ longiora.

ACONITUM salutiferum,

Anthora.

ACORUS verus.

Radix hæc, quæ pro Calamo aromatico substituitur,
albida sit, suaveolens, subamara, fungosa, &
fractu difficilis, non cariota.

ACTE,

Sambucus.

ADEPS

Anatis,

Equi,

Gallinæ,

Gallinæ,
Hominis,
Muris alpini,
Suis,
Taxi,
Viperæ,
Vulpis.

ADIANTHUM album fol. Filicis,
Filicula Fontana.

ADIANTHUM Aureum.

ADIANTHUM fol. Coriandri,
Capillus Veneris.

ÆGAGROPILUS, vel Ægagropila
Pila ovalis, aut rotunda, sæpius oblonga, admo-
dum levis, plerumque ex rufo obscuri coloris,
fragmentis, & fibrillis herbarum coagmentata sub
involucro coriaceo.

ÆS.

AGALLOCHUM, *vide* Lignum Aloes.

AGARICUS, vel Agaricum

Probatur albus, levis, friabilis, sapore primum
subdulci, mox subamaro, tandem acri.

AGNI casti Semen.

AGRIMONIA.

ALBUM Græcum,
Stercus Canis.

ALCHIMILLA,
Stellaria.

ALCIS Ungula.

ALKEKENGI Fructus.

A 2

ALLE-

ALLELUIA,

Acetofella.

ALLII hortensis, seu fativi Radix.

ALOE Soccotrina,

Epatica,

Caballina.

Soccotrina, quæ ad usum internum cæteris præstantior, lucida esse debet, sicca, friabilis, amarissima, odore non ingrato. Integra ad fuscum colorem, pulverata ex flavo ad subrubrum vergat.

ALSINE media, seu vulgaris,

Morsus Galline.

ALTHÆA.

ALUMEN Rupeum

Laudatur Romanum, translucens, albidus coloris, qui ad subrubrum inclinet.

AMARACUS,

Majorana.

AMBRA cineracea, seu *grisea* vulgo.

Optima censetur ea, quæ sordium experta est, levis, cinerei coloris ad fuscum vergentis, odoris grati, & suavis, maculis tum subnigris, tum albidis signata, quæ demum igni admota instar cere liquefit.

AMBUTUA, V. Pareira brava.

AMMI, vel Ammeos

Oblongum semen nonnihil inflexum, striatum, Cumino minus, & pallidius. Mundum sit, nutritum, sapore acris subamaro, odore ad Origanum accedente.

AMMONIACUM Gummi

In

In grummos concretum sit, mundum, extrinsecus flavum, intus album, & lucidum, subamarum, Castorei, Galbanique odorem quodammodo referens; quod digitis tractatum, vel modice calefactum facile mollescat.

AMOMUM racemosum.

In folliculis Avellanam fere æquantibus, ac tripartitis semina continentur aspera, & quasi triquetra, quorum color obscurus ad purpureum inclinat: odor aromaticus est, sapor acer ad Caphuram accedens.

AMURCA,

Fex Olei.

AMYGDALÆ amaræ.

AMYGDALÆ dulces.

AMYLUM.

ANACAMPSEOS,

Fabaria.

ANACARDIUM.

Deligendus hic fructus ponderosus, externo cortice subnigro, lævi, ac lucido; interno autem citrino, quo nucleus albidus saporis subdulcis, & inter utrumque corticem glutinosus, ex nigro rufi coloris, lucidusque liquor inclusus sit.

ANAGALLIS aquatica,

Beccabunga.

ANAGALLIS phœniceo flore.

ANAGALLIS cœruleo flore.

ANETHUM hortense.

ANGELICA major, seu sativa,

Bohemica.

6 DE SIMPLICIBUS

Bohemica.

Oblonga hæc radix est capite crasso, ex quo radice-
læ pollicares, aliæque tenuiores producuntur. Sit
recens, extrinsecus fusca, intus albida, odore aroma-
tico, sapore acri cum levi quadam amaritudine.

ANGURIAE Fructus, & Semen.

ANIME Gummi

Resinosum, in superficie albidum, veluti farina as-
persum, intus fere citrinum, lucidum, odore, dum
contrectatur, Elemi, dum uritur, Olibano quo-
dammodo simili.

ANISI vulgaris Semen

Sit nutritum, mundum, suaveolens, sapore suba-
cri, & subdulci.

ANISUM stellatum, seu Sinense.

Capsulæ fragrantæ quinque, sex, septemve instar
radiatorum uno petiolo simul junctæ sunt, quibus
grana continentur oblonga, seminis Lini fere simi-
lia, cortice lævi, lucido, tenui, maculis subni-
gris distincto. Ejusmodi semen sapore, odoreque
Anisum vulgare superat.

ANONIS, sive Ononis.

ANTHORÆ, seu Antithoræ Radix.

ANTHOS,

Rosmarinus.

ANTIMONIUM

Adhibendum præcipue Hungaricum purum, niti-
dum, ex longis, ac lucidis radiantibus striis con-
flatum.

APES.

APIUM

APIUM dulce.

APIUM hortense, seu Petroselinum vulgo.

APIUM Macedonicum, V. Petroselinum Macedo-
nicum.

APRI Dens.

AQUILEGIA.

ARABICUM Gummi, V. Gummi Arabicum.

ARCIUM,

Bardana.

ARGENTINA,

Potentilla.

ARGENTUM.

ARGENTUM vivum.

ARGILLA.

ARGYRITIS,

Lithargyrium Argenti.

ARI Radix.

ARISTOLOCHIAE longæ)
rotundæ) Radix:
tenuis)

ARMORACIA,

Raphanus rusticus.

ARTHANITÆ Radix.

ARTHEMISIA vulgaris major.

ARUNDINIS sativæ Radix.

ASA, vel Assa dulcis, V. Benzoinum.

ASA, vel Assa fetida

Ex pluribus grumis subrubris coacta, acris, & ama-
ra, gravem, & alliatum odorem spirans.

ASARI Folia, & Radix.

ASCLEPIAS,

8 DE SIMPLICIBUS

ASCLEPIAS,

Vincetoxicum.

ASELLI,

Millepedæ.

ASPALATHUS, V. Lignum Rhodium.

ASPARAGUS.

ASPHALTHUS, V. Bitumen Judaicum.

ASPLENIUM,

Ceterach Officinarum.

ASTACI fluviatiles,

Cancris fluviatiles.

ATRIPLEX hortensis;

Spinachia vulgaris.

AVELLANÆ Lignum, & Nuclei.

AVENÆ vulgaris, five albæ Semen.

AURANTIÆ, vel Arantiæ Mali, Folia, Flores,
Fructus.

AURICULA Judæ,

Fungus sambucinus.

AURUM.

AXUNGIA, V. Adeps.

B

BACCÆ Ebuli;

Hederæ;

Juniperi,

Lauri,

Myrti,

Rhamni Cathartici;

Sambuci.

BA-