

C

C A C A O.

Laudatur id præcipue, quod *Caraque* majus vulgo appellatur, fusco, & subrufo colore, maturum, recens, crassum, pingue, & subamarum.

CÆP A vulgaris.

CALAMINARIS Lapis

Alius cinereus, alius subruber, lineisque albidis distinctus, qui præstantior censetur.

CALAMINTHA montana vulgaris.

CALAMUS aromaticus Officinarum, V. Acorus verus.

CALCANTHUM,

Vitriolum.

CALENDULÆ, seu Calthæ Flores.

CALX viva.

CAMPHORA

Candida, crystallina, friabilis, valde odorata, acris, & subamara, ita ignis tenax, ut semel accensa non facile extinguatur; atque adeo volatilis, ut igne leni tota penitus sublimetur. Dosis a granis quatuor ad octo.

CANCRI fluviatiles.

CANELLA alba

Cortex albidus exteriori involucri spoliatus, in longos tubulos convolutus, acer, aromaticus, fragrans. Ita nimirum talis cortex rarissimus a quibusdam auctoribus describitur; cujus loco utimur Costo corticoso.

CA-

CANELLA Ceylanica, V. Cinnamomum.

CANNABIS sativæ Semen.

CANTHARIDES.

CAPILLUS Veneris.

CAPPARIS Radix, & Flores nondum aperti, vulgo
Fructus.

CAPRIFOLIUM.

Matrisylva.

CAPSICI Fructus.

CARABE, V. Succinum.

CARANNA, five Caragna.

Resina hæc eligatur tenax, ex cinereo ad subviridem
colorem vergens, amara, suaveolens dum accen-
ditur. Vetustate exarescit, & friabilis fit.

CARDAMINDUM,

Nasturtium Indicum.

CARDAMOMI majoris Semen.

CARDAMOMUM minus

Siliqua membranacea triangularis tribus donatur cel-
lulis, quibus semina exigua, angulosa, tenui, &
albida pellicula involuta includuntur, coloris rufi,
odoris aromatici, saporis acris. Præstantior ea, quæ
integra, gravis, nec rugosa est.

CARDIACA.

CARDUUS benedictus,

Carduus sanctus.

CARDUUS stellatus,

Calcitrapa.

CARICÆ,

Ficus passæ.

CARLINÆ acaulos magno flore Radix.

CAROBÆ

CAROBÆ Officinarum.

CARPOBALSAMUM

Bacciformis fructus, Piperis paullo major, & aliquantulum oblongus, rugosus, tenuique pediculo instructus. Recens sit, gravis, nucleum albidum, & pinguem continens, odoris aromatici suavis, saporis subacris piperati.

CARTHAMI Officinarum Semen.

CARVI Semen.

CARYOPHILLATÆ Radix.

CARYOPHILLI hortensis Flores.

CARYOPHILLUS aromaticus

Sit capite globoso, circumpositis quatuor apiculis; colore subrubro fusco, sapore acri aromatico, odore fragrante, & quo compresso oleosum quiddam eliciatur.

CASCARILLA

Cortex resinofus convexa parte cinereus, concava ferrugineus, lucidus, fractu difficilis, levi odore aromatico, &c, dum comburitur, Moschum redolens, gustu denique acer, & paullulum amarus.

CASSIA fistula,

Alexandrina,

Optima est Ægyptia, recens, siliquis crassis, ponderosa, haud resonans dum concuritur, cortice tenui, & lævi.

CASSIA lignea,

Odorata,

Cinnamomo crassior, fractuque difficilior, intus lucida, atque ferruginea, saporis acris, & subdulcis.

Diu

Diu mansa mollietur omnino, & glutinosa fit, lignosa parte vix ulla superstite.

CASTOREUM

Duobus folliculis in summa eorum parte junctis constat, in quibus materia continetur cerosa, inflammabilis, ex rufo ad obscurum colorem vergens, quæ tractu temporis induratur, & fragilis fit. Castorei odor gravis est, sapor subacer, & subamarus. Ex Russia allatum cæteris præstantius.

CATAPUTIA major.

CATECHU

Eligendum est compactum, lucidum, subnigrum, quod in ore detentum lique scat, saporeque primum subamaro, ac styptico, postea subdulci gustum afficiat.

CATELLI.

CAUDA EQUINA.

CAUDA Porcina,

Peucedanum.

CAULIS.

CENTAURIJ majoris Radix.

CENTAURIUM minus.

CENTINODIA.

CERA alba, & citrina.

CERASA sativa rubra, & acida.

CERASA silvestria nigra, & dulcia.

CEREFOLIUM,

Cherefolium.

CERUSSA.

CETERACH:

CHA-

CHALYBS.

CHAMÆACTE,

Ebulus.

CHAMÆCISSUS,

Hedera terrestris.

CHAMÆDRYS.

CHAMÆLEON albus;

Carlina acaulos magno flore.

CHAMÆMELI vulgaris Flores.

CHAMÆPITYS lutea vulgaris.

Iva arthritica.

CHEIRI Flores.

CHELÆ Cancrorum.

CHELIDONIUM majus.

CHELIDONIUM minus.

CHERMES, seu Kerres

Sit recens siccatum, integrum, nutritum, rubicundum, lucidum, & sordium expers, saporis subamari, odoris grati.

CHINACHINA.

Hujus Corticis mediocris crassitudo sit, superficies interior lavis, exterior scabra, & passim incana; idemque compactus deligatur, & quemdam mucorem redolens, saporis subamari, & styptici, coloris ad Cinnamomum accedentis; quique non facile, nec sine aliquo strepitu frangatur.

CHINA Radix

Crassa est, tuberosa, & nodosa. Alia, quæ facile conciditur, coloris ex pallido rubri, Carnosa in Officinis nostris appellatur; alia, quæ dura,

C

magis

magis gummosa, lucida, subnigra, aut rufa est, Petrosula, aut Semipetrosula dicitur.

CHRYSOCOLLA, V. Borax.

CHRYSITIS,

Lithargyrium Auri.

CICERBITA aspera, & laevis.

CICHORIUM sativum, & silvestre;

CICLA Officinarum,

Beta alba, vel pallescens.

CICUTA major.

CINNABARIS nativa.

Laudatur ea, quæ lapillorum formam habet, superficiem lævem, & splendentem: confracta micat, ut vitrum, nullasque strias exhibet; pulverata eximie rubet. Hujus purgandæ ratio duplex docetur pag. 65. Dosis autem a granis decem ad viginti.

CINNAMOMUM

Cortex cannulatus, subrufus, odoris fragrantis, saporis initio subdulcis, tum acris, & grati,

CITRAGO,

Melissa hortensis.

CITREUM Malum.

CITRULLUS,

Anguria.

CLEMATIS Daphnoides;

Vinca Peruvincia.

CNICUS sativus,

Carthamus.

CNICUS silvestris,

Carduus benedictus.

COCCI

COCCI Orientales,

Coccula Officinarum

Recentes deligantur, qui pinguem nucleum subflavum contineant. Hic enim vetustate ita extenuantur, ut vacua fere putamina remaneant.

COCCINELLA, vel Cochinilla

Sicca, ponderosa, extrinsecus albida, intus rubra sit; ac dentibus trita salivam rubicundo colore inficiat.

COCHLEARIA.

COCHLEARIA folio cubitali,

Raphanus rusticus.

COCHLEÆ terrestres,

Limaces testaceæ.

COLOCYNTHIS

Levis, alba, & cortice denudata præcipue deligi solet. *Ufus ejus in Trochiscis Alhandal.*

COLOPHONIA,

Quæ sic appellata est Fæx Terebinthinæ post elicium spiritum & oleum, sicca & tamen pinguis deligatur, translucens, subrufa; quæ autem nigra, ac nimium friabilis, minus probanda.

CONCHA margaritifera,

Mater Perlarum.

CONI Abietis,

Cupressi,

Pini.

CONSOLIDA major.

CONSOLIDA media.

CONSOLIDA minima;

Bellis minor.

C z

CON:

CONSOLIDA minor.

CONSOLIDÆ regalis Semen.

CONTRAYERVA Hispanica,

Drakena Radix

Oblonga, nodosa, extrinsecus rufa, intus albida,
odoris aromatici, saporis subacris, & paullulum
amari. Sit recens, densa, gravis, non cariosa.

CONTRAYERVA tuberosa Indica, subrotunda,
fulvo colore, cortice scabro.

CORALLINA

Integra, & munda sit, Musci formam habens, sub
dentibus stridula, colore cinereo & subviridi, sapore
falso, odore Concharum.

CORALLIUM album,
rubrum.

CORIANDR I majoris Semen.

CORNI Fructus.

CORNU Cervi.

CORTEX Guaiaci, V. Guaiaci Cortex.

CORTEX Peruvianus, V. Chinachina.

CORTEX Winteranus

Crassus, cannulatus, integumento cinereo fungoso,
inæquali, pluribus rimis hiantes, intus solidus, den-
sus, pallidus, acer, aromaticus, fragrantissimus.
Ejus loco, qui rarissimus omnino est, adhibetur
Costus corticosus, & a nonnullis Canella alba, quam
spurium Corticem Winteranum appellant.

CORYLUS,

Avellana.

COSTUS Arabicus,

Amayus

Amarus Officinarum.

Radiciſ huius forma, qualis fere Helenii. Optima cenſetur, quæ extrinſecus ex cinereo ad ruſum, intrinſecus ad flavum colorem vergat, fungoſa, & fractu difficilis, ſaporis acris, ſubamari, aromatici, odoris fere violacei.

COSTUS corticoſus, ſeu dulcis Officinarum

Convolutus, craſſus, ex ruſo ad flavum, quandoque ad cinereum colorem inclinans, ſaporis acris quaſi piperati, odoris aromatici.

COTONEUM, ſeu Cydonium Malum.

CRANIUM Humanum.

CRASSULA,

Fabaria.

CREPITUS Lupi.

CRESCIO,

Najurtium aquaticum.

CRESPINUS,

Berberis.

CROCUS Indicus, V. Curcuma.

CROCUS fativus.

CUBEBAE

Recentes ſint, odoræ, nucleo oleoſo præditæ, ſapore acri aromatico.

CUCUMERIS fativi Semen.

CUCUMERIS ſilveſtris, ſeu aſinini Radix, & Fructus.

CUCURBITÆ longæ flore albo Fructus.

CUCURBITÆ maioris Folia, & Semen.

CUMINI, yel Cymini Semen.

CUMI-

CUMINUM pratense,

Carvi.

CUPRESSI Nuces.

CUPRUM,

Æs.

CURCUMA

Radix dura admodum, & tuberosa, quæ Zingiberi formam, & odorem quodammodo refert. Sit gravis, densa, intus lucida, & crocea.

CUSCUTA major.

CUSCUTA minor,

Epithymum.

CYANI Flores.

CYCLAMEN,

Arthanita.

CYNOGLOSSI Radix.

CYNORRHODON, seu Cynosbatos.

CYPERI longi odorati Radix.

CYPERUS rotundus

Radix Olivæ figura, cortice subflavo, ductisque in orbem zonis distincto, substantia albida. Sit compacta, non cariola, odore gravi ad Nardum accedente, sapore acri subamaro.

CYTINI,

Punica sativa Flores.

D

DACTYLI Indi, V. Tamarindi.
DACTYLUS

Sit