

Galega.

RUTA hortensis latifolia.

RUTA muraria.

S

SABADILIA;

*Sabadilli,**Sabaidilla.*

In folliculo Delphinii siliquæ non multum absimili;
 triquetro, subrufo continentur Semina tria oblonga,
 nonnihil curva, extrinsecus nigra, intus albida, sa-
 poris acris, & amari.

SABINA.

SACCHARUM album;

rubrum,

candum, vel cantum.

SAGAPENUM

Optimum est, quod purum, nitidum, & in guttas
 concretum, extrinsecus fulvas, intus albidas, sapore
 acri, odore gravi, & alliato.

SAL Ammoniacum, vel Armoniacum

In superficie cineraceum, intus crystallinum, can-
 didum purum, & siccum, gustu salsum, & pera-
 curum.

SAL commune.

SAL gemmæ.

SAL marinum,

Sal commune.

SAL Nitri,

Nitrum.

Nitrum.

SALIX Amerina,

Agnus castus.

SALIX vulgaris alba arborescens.

SALSA Parilla

Sit flexilis, non cariosa, nec pulverulenta dum frangitur; & assulatim facile scindatur; cujus substantia candida, parvumque meditullium. Quæ crassior est maxime probanda.

SALVIA hortensis.

SALVIA vitæ,

Ruta muraria.

SAMBUCUS vulgaris.

SAMBUCUS humilis,

Ebulus.

SAMPSUCUS,

Majorana vulgaris.

SANDARACA Arabum, V. Juniperi Gummi.

SANGUIS Draconis.

In grumos puros, lucidos, fragiles, & admodum rubicundos hoc Gummi concretum sit.

SANICULA Officinarum.

SANICULA Alpina,

Auricula Urfi.

SANTALUM, vel Sandalum album.

SANTALUM citrinum

Eligendum est solidum, ponderosum, sine carie, subflavum, & odoriferum.

SANTALUM rubrum

Solidum sit, densum, grave, in aqua subsidens, ru-

G 2

bicundo

bicundo colore obscuro : idemque mansum nec gustu dulce sit, nec salivam intingat.

SANTONICUM

Mundum sit, recens, pallidum, & subviride, gravi odore aromatico, sapore acri & amaro.

SAPONARIA vulgaris, seu lævis.

SARCOCOLLA

Gummi leve, friabile, spongiosum, lucidisque micis intermixtum, gustu subamarum, cum quadam dulcedine. Quod recens pallidum est, vetustum nonnihil rubet.

SARSA Parilla, V. Salsa Parilla.

SASSAFRAS.

Ligno præcellit Radix, quæ cortice extrinsecus cinereo, intus rubro obtegitur. Ipsa autem lignosa Radix ponderosa sit, subrufa, Fœniculi odorem spirans, sapore subdulci, & subacri.

SATIRII Radix.

SATUREJÆ sativæ Summitates.

SATURNUS,

Plumbum.

SAXIFRAGÆ Radix.

SCABIOSA vulgaris major.

SCAMMONIUM

Syriacum, seu ex Alepo delatum cæteris præstantius habetur; sitque purum cinerei obscuri coloris, lucidum, leve, friabile, resinofum, subamarum, graveolens; idemque madidis contrectatum digitis albescat. Illud rejiciendum, quod acre admodum sit, nigrum, durum, fractu contumax, & ponderosum.

Exhi-

Exhibetur a granis decem ad quindecim.

SCARIOLA.

SCHŒNANTHUM.

Eligantur Flores, vel Summitates floridæ, carnei coloris, odoris suavis, &, cum incalescunt, resinosi, saporis acris subamari.

SCILLÆ vulgaris Radix.

SCINCUS Marinus

Cum Lacerta viridi quamdam habet similitudinem; sed magis exiguum, atque oblongum Scinci caput est, rostrum acutius, dorsum latius, & squamosa cute argentea tectum, quæ transversis subnigris zonis passim distincta est.

SCLAREA.

SCOLOPENDRIA;

Lingua Cervina.

SCORDIUM.

SCORPIONES.

SCORZONERA latifolia sinuata, seu Hispanica:

SCROPHULARIÆ majoris nodosæ Radix.

SCROPHULARIA minor,

Chelidonium minus.

SEBESTEN.

Pruno similis Fructus hic eligatur recens, carnosus, subdulcis, & nigricans.

SEBUM, vel Sevum

Bovinum,

Cervinum,

Hircinum,

Ovillum.

SE-

SEDUM majus,

Sempervivum majus.

SEDUM minus.

SEDUM minimum,

Vermicularis.

SEMEN Badianum, V. Anisum stellatum:

SEMEN sanctum, V. Santonicum.

SEMINA quatuor calida majora Officinarum:

Anisi,

Cumini,

Carvi,

Fœniculi.

SEMINA quatuor calida minora:

Ammeos,

Amomi,

Apii hortensis;

Dauci.

SEMINA quatuor frigida majora:

Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonis.

SEMINA quatuor frigida minora:

Cichorii,

Endiviæ,

Lactucæ,

Portulacæ.

SEMPERVIVUM.

SENNA Orientalis

Integra sit, munda, tactu lævis, nec maculata, nec
pulverulenta.

SEPIÆ

SEPIÆ Os.

SERICI Folliculi.

SERPENTARIÆ majoris Radix.

SERPENTARIA Virginiana

Valde odorata est, russeo colore diluto, sapore acri
subamaro. Quæ vetustate, aut corruptione nigrum,
& multum odoris amisit, repudianda.

SERPILLUM vulgare.

SERTULA Campana,

Melilotus.

SESELI Massiliense

Angulosum Semen ad Fœniculi formam accedens;
odoris grati, saporis acris aromatici.

SIGILLI Salomonis Radix.

SILERIS montani Semen.

SILQUA edulis,

Caroba Officinarum.

SIMAROUBÆ Cortex, & Lignum.

Corticis superficies inæqualis, vel aspera est; palli-
dus color, qui ad subflavum vergit; idemque fibro-
sus Cortex, inodorus, & subamarus est, a subjecto
Ligno candido, levissimoque facile separabilis.

SINAPI Semen.

SISYMBRIUM aquaticum,

Nasturtium aquaticum.

SMILACIS asperæ Radix.

SMILAX aspera Peruana, V. Salsa Parilla:

SOL,

Aurum.

SOLANUM Officinarum acinis nigricantibus, seu
hortense.

SOLA-

SOLANUM vesicarium,

Alkekengi.

SONCHUS asper,

Cicerbita aspera.

SONCHUS lævis,

Cicerbita lævis.

SORBI fativæ Fructus.

SPARTIUM arborescens;

Genista juncea.

SPERMA Ceti

Sit recens, candidum, tenerum, pingue, ex nitidis
squamulis conflatum, non rancidum, nec flavum.

SPERNIOLA,

Ranarum Sperma.

SPICA Celtica.

SPICA Nardi, V. Nardus Indica:

SPICA vulgaris,

Lavandula.

SPINA acida,

Berberis.

SPINA Cervina, seu infectoria;

Rhamnus Catharticus.

SPINA solstitialis,

Carduus stellatus.

SPINACHIA vulgaris.

SPONGIA marina.

SPONGIA Rosæ sylvestris:

STANNUM,

Jupiter.

STAPHISAGRIA

Semen

Semen fere triquetrum, subnigrum, asperum, intus
albidum, aut flavesceus, valde amarum, acerrimum-
que.

STELLARIA.

STIBIUM,

Antimonium.

STOËCHAS Arabica.

Eligenda hæc Spica florida, odorata, saporis suba-
cris, subamari.

STROBILI, V. Coni.

STYRAX Calamita

Sit purus, pinguis, resinosus, rufus, albidis micis
interstinctus, odore suavi, sapore subacri.

STYRAX liquidus Officinarum

Terebinthina crassior, cinerei coloris, odorisque gra-
vis; licet Styracem Calamitam paullulum redoleat.

SUBER.

SUCCINUM album,

citrinum

Sit purum, & perlucidum, quod festucas, paleas-
que attrahat, accensumque gratum odorem exhalet.

SUCCISA.

SUCCUS Liquiritiæ inspissatus, V. Liquiritiæ Succus.

SULPHUR nativum, seu vivum.

SULPHUR fusum, seu citrinum.

SUMACH

Racemosus fructus baccis, seu acinis rubris constans,
acidi saporis, quibus inclusum est semen prædurum,
planum, coloris fere spadicei.

SYMPHYTUM maculosum,

H

Pulmo.

Pulmonaria maculosa latifolia.

SYMPHYTUM majus,

Consolida major.

SYMPHYTUM medium;

Consolida media.

SYMPHYTUM minimum;

Bellis minor.

SYMPHYTUM minus;

Prunella.

T

T ABACUM.

TACAMAHACA

Sicca, resinosa, rufa, nitida, albidisque micis distincta, suaveolens, & aromatica.

TAMARINDI

Plurimis fibris intertexti sunt, cum ossiculis duris fere quadratis, & lucidis. Sint recentes, teneri, rufi obscuri coloris, saporis subacidi vinosi.

TAMARISCUS.

TANACETI vulgaris lutei Flores.

TAPSI barbati Flores.

TARAXACUM,

Dens Leonis.

TARTARUM album;

rubrum.

TEREBINTHINA

Ceteris præstantior Chia, vel Cypria, quæ Nostrate crassior est, pura, translucida, ex flavo colore ad viridem,