

BOLO. Bolus Off.

Terra barrenta.

Argilla, Bolus. Linn. Syst. Nat.

Lugar: Habita em Portugal, e n'outros Paizes.

Forma: Terra barrenta em pedaços de diferentes tamanhos, compostos de particulas extremadamente finas, e como untosas ao tacto; quando se quebra, fica como brilhante, e de cor branca, amarela, ou vermelha. (Destes bolos se ha de escolher o que for em pedaços, limpos de impuridades, e aréas, suave ao tocar, resplandecente, que com facilidade se reduza em pó, e que tocando-o na lingua se apegue a ella, ou aos beiços.)

Propried. Não tem cheiro, nem sabor. Botado em agua, a forve facilmente, e se desfaz nella, o que tambem acontece mettido na boca: no fogo endurece, e se torna aspero como todas as outras terras barrentas.

BORAX, vej. TINCAL.

BUTUA, vej. ABUTUA.

C

CACAO. Cacao Off.

Sementes.

Theobroma Cacao. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos terrenos baixos, e sombrios d'America Meridional, no Mexico, &c. Arvore.

Forma: As sementes são do tamanho, e figura quasi das Amendoas, cuja pelle he como papel, membranacea, cinzenta tirante a ruiva, e o miolo, ou parenchyma untoso, denegrido, ou arroxoado, e divisivel em muitas particulas desiguaes, torcidas, entremeadas de hum a delgada pellezinha.

Propried. O cheiro nenhum; o sabor algum tanto untoso, estitico, e amargo, affaz agradável. Mastigadas se esmigalhão, e desfazem pouco, e pouco na

na boca: chegadas á chamma do fogo, accendem-se, e ardem em lavareda clara sem fumo.

CAL VIVA, ou **VIRGEM**. Calx viva Off. *Terra. Lapis calcareus purus recens ustas.*

Lugar: Acha-se em torno dos Vulcões; mas a cal virgem, de que se usa, he artificial.

Forma: A cal virgem he em torrões brancos, assás quebradiços, que se desfazem facilmente n' hum pó farinhoso, alvissimo.

Propried. O sabor he acre, queima, e he ourinoso. Exposta ao ar incha, racha, augmenta de volume, aquece, e se converte n' hum pó subtil, alvissimo, que se chama *Cal extinta ao ar*, a qual perdêra sua causticidade, em razão da humidade que attrahio, e ao mesmo tempo adquirira a propriedade de ferver com os acidos, que d' antes não tinha, e isto porque sorvêra d' atmosfera o *acido aereo*, ou *mesytico*. Enverdece o xarope de violetas, ou sua infusão, e a do tornesol; dissolve-se em 700 vezes o seu pezo d' agua, a qual aquece quando se misturão; e a dissolução, que resulta, chama-se *Agua de cal*, cujas propriedades são as mesmas que as da *Cal virgem*. Exposta a fogo fortissimo, nem se altera, nem se funde; afora sendo misturada com outras materias terreas, ou salinas.

CALAMINAR, vej. **PEDRA CALAMINAR**.

CALAMO AROMATICO. *Calamus aromaticus* Off. f. *Calamus vulgaris. Calamus verus*, f. *Acorus Indicus*, vel *Asiaticus* Off. *Raiz.*

Acorus Calamus. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: O *Calamo aromatico* vulgar habita nas algôas, e tanques da Europa; e o *Asiatico* nos terrenos humidos, e tambem nos seccos, e altos da India Oriental, e do Brazil; e se cultiva na Europa. *Perennial.*

Forma: A raiz recente do calamo vulgar he cylindrica,

ca, algum tanto comprimida, ramosa, da grossura de hum dedo, e mais; articulada, ou nodosa, com os nós cubertos de huma escama estopenta, e guarnecida de infinitas raizinhas como fios brancos, que sahem debaixo, e estas de outras como cabellos. O parenchyma he carnudo, branco, o qual cortado contra fio, apparece furado todo de burachinhos, com o amago oval furado tambem, e salpicado de pontos cõr de ferrugem; mas a raiz secca he em pedaços compridos exteriormente asperos com pontos levantados de cõr parda, ou pallida desmaiada, e por dentro alvacentas, com o parenchyma quasi farinhoso, quebradiço. A raiz do Calamo Asiatico he singela, mais delgada, e dura, cheia de maior numero de nós, e de cõr ruiva, parda desmaiada, e por dentro alvacentas, e esponjosa.

Propried. O cheiro he fragrante; o sabor aromatico, acre, e levemente amargoso, qualidades estas, que são igualmente notaveis assim na raiz recente, como na secca: só com a differença de ser a recente mais acre. A raiz do Calamo Asiatico he superior em tudo á raiz do Europeo.

CALUMBA. Columba, Colomba Off. Raiz.
Desconhecido o genero de planta.

Lugar: Habita na Asia.

Forma: A raiz secca he em talhadas redondas, ou rodélas, cujo diametro he de meia pollegada até tres, ou em pedaços, do comprimento da quarta parte de huma pollegada até duas, com a casca afilada engelhada, algum tanto grossa, de cõr verdeenga, e o miolo, ou parenchyma ao pé da casca amarelado, no centro alguma cousa pardo, marcado de riscos parallelos tirantes a negro, e de pontos amarelos.

Propried. O cheiro levemente aromatico; o sabor amargoso algum tanto acre. *Mastigada* amollece, quasi se desfaz na saliva, e a tinge de cõr amarelada, e pi-

pica na lingua , e gorgomilos com certo amargo ,
que dura muito tempo.

CAMEDRIOS , ou HERVA CARVALHINHA.

Chamaedris Off.

Herva.

Teucrium Chamaedris. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita nos terrenos secos de Portugal , &c.

(*Florece em Junho , e Julho.*) *Perennial* , vulgar.

Forma: As folhas são ovadas oblongas , obtusas , oppostas , de huma , e outra parte pennugentas , retalhadas , e recortadas , fustidas por pézinhos curtos.

Propried. O cheiro he levemente fragrante ; o sabor amargo.

CAMPHORA , vej. ALCANFOR.

CANA FISTULA. *Cassia fistula* , f. *fistularis* Off. *Fruto.*

Cassia Fistula. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na India , Egypto , Brazil , &c. *Arvore.*

Forma: Legume de feição de cana , cylindrico , do comprimento de meio braço , e mais , da grossura do dedo pollegar , e mais , ora mui direito , ora arqueado , terminado n' huma cabecinha , ou tuberosidade arredondada , com a casca quasi lenhosa , quebradiça , denegrida , algum tanto liza , na qual ha huma costura ao comprido assas visivel , e outra opposta a esta safada : de espaço em espaço se divide sua concavidade n' humas casinhas divididas por repartimentos transversaes , parallellos , cheias de huma polpa como mel , denegrida , algum tanto resplandecente , em cada huma das quaes ha de ordinario huma sô semente do tamanho de feijão , ovada , romba , achatada de ambos os lados , dura , luzidia , e de côr de ferrugem. (*Devem-se escolher as maiores canas , mais grossas , pezadas , inteiras , e que quando se maneam se não sintão dentro as sementes ; que sejam negras por fóra , resplandecentes , e as que interiormente tiverem mais polpa doce , de bom cheiro , e que não seja azeda.*)

Tom. II.

D

Pro-

Propried. O *sabor* da polpa he doce, mui levemente azedo, alguma cousa enjoativo. Dissolve-se quasi toda em agua, e pouca no espirito de vinho.

CANELLA. *Cinnamomum* Off.

Casca.

Laurus Cinnamomum. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita em Ceilão, e se cultiva em Samatra, Java, Malabar, Brazil, &c.

Arvore.

Forma: A *casca* secca he delgada, enrolada em canudos compridos, liza, algum tanto quebradiça; aonde quebra he fibrosa, aspera, plana, de cor pallida, ou avermelhada, mas por dentro mais pallida. (Deve-se escolher a mais delgada, que se dobre, de cor avermelhada, de sabor alguma cousa doce, e pouco acre; e rejeitar por tanto a que for dura, e grossa, de cor parda, e que ferir muito a lingua, isto he, cujo sabor tire para o do Cravo da India, e seja seguido do estitico amargofo, ou viscoso.)

Propried. O cheiro he fragante, aromatico, suavissimo; o *sabor* he algum tanto doce, aromatico, agradável; depois acre, quente, e duradouro.

CANTHARIDAS. *Cantharides* Off.

Insecto.

Meloe Vesicatorius. Linn. Syft. Nat.

Lytta Vesicatoria. Fabric. Syft. Entomol.

Lugar: Habita nos Freixos, Sabugueiros, Alfenciros, Madresilvas, &c. da Europa toda.

Forma: O *Insecto* he de quatro azas, cujas duas de cima são duras, verdissimas, resplandecentes, douradas, dobradiças, e riscadas, e as de baixo pardas: o corpo he compridinho, verde, azulado, e as antennas pretas.

Propried. O cheiro he particular, enjoativo; o *sabor* allás acre.

CAPARROSA AZUL, vej. VITRIOLO DE COBRE.

CAPARROSA BRANCA, vej. VITRIOLO BRANCO, ou DE ZINCO.

CA-

CAPARROSA VERDE , vej. VITRIOLO DE FERRO.

CARDAMOMO MENOR. *Cardamomum minus* Off. *Fruto.**Amomum Cardamomum.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.**Lugar:* Habita nos terrenos apaulados da India Oriental, particularmente em Java. *Percnnal.**Forma:* O fruto he humcaixinha, ou follezinho verticalmente conico, arredondado, do comprimento de meia pollegada, e mais; de tres gumes; rombo, (muitas vezes aguçado,) levissimamente riscado, pálido, dividido por tapumes membranosos em tres casinhas, que encerrão muitas sementes duras, esquinadas, quasi quadrangulares, engelhadas, e de côr tirante a ruiva; com o miolo branco, e alguma coufa mucilaginoso.*Propried.* O cheiro he fragrante, aromatico, agradável; o sabor agradavelmente aromatico tirante para amargoso, e alguma coufa alcanforado: qualidades que se mostrão mais nas sementes, que são as que verdadeiramente se devem usar.CARDIO SANTO. *Carduus benedictus* Off. *Folhas.**Centaurea Benedicta.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.**Lugar:* Habita em Hespanha, Portugal, &c. (*Florece de Maio até Junho.*) *Annual.**Forma:* As folhas são oblongas, do comprimento de seis até sete pollegadas, rombas, engelhadas, ceroso-asperas, por baixo assinaladas de pequenos vasos enlaçados como rede, retalhadas de través em lobos oblongos, oppostos huns a outros, rombos, com hum espinho nas pontas, pestanosos, e guarnecidos de dentinhos, e espinhos na borda: as inferiores são pecioladas; as superiores são rentes, levantadas.*Propried.* O cheiro nenhum; o sabor amargosíssimo, e duradouro. Maceradas as folhas pouco tempo em agua fria, communicão-lhe sabor amargoso agradável.

vel , o que não acontece sendo demorada a maceração , ou fervendo-se , porque então he enjoativo o sabor : e maceradas no espirito de vinho , lhe communicão tambem sabor amargo mais agradável do que á agua.

CARRAPATOS, vej. MAMONA.

CARVALHO. *Quercus* Off.

Casca.

Quercus Robur. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita na Europa toda. *Arvore, vulgar.*

Forma : A *casca* he grossa , quasi lenhosa , de côr cinzenta , por fóra algum tanto gretada ao comprimido.

Propried. O *cheiro* nenhum ; o *sabor* affás estitico , e alguma coufa amargofo.

CASCARILHA. *Cascarilla* , f. *Chacarilla* , f. *Eleutheria* Off.

Casca.

Croton Cascarilla. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita na Jamaica , no Perú , Paraguai , &c. *Arvore.*

Forma : A *casca* he em pedaços enrolados em fôrma de canudo do comprimento de algumas pollegadas , e de meia pollegada até hum de diametro , da grossura de hum linha , dura , mas quebradiça , de côr entre cinzenta e parda , cuberta por fóra de humas tês branca , engelhada , riscada de travês , e muitas vezes cheia de musgos , a qual sendo raspada , apparece logo de côr parda desmaiada.

Propried. O *cheiro* he aromatico , fraco ; mas accendendo-se , arde em chamma clara , e espalha cheiro fragrante ; o *sabor* he amargofo , e aromatico juntamente.

CASTOREO. *Castoreum* Off.

Castor Fiber. Linn. Syft. Nat.

Lugar : Habita na Lapponia , Siberia , Canadá. *Animal quadrupede.*

For-

Forma: O *Castoreo* he huma substancia pingue, molle, e quasi liquida, quando he recente; mas sendo secca, he dura, denegrida, entremeiada de huma pellezinha delicadissima, e encerrada em dous follezzinhos, ou bolsos correentos, contiguos, os quaes estão ao pé da urethra do Castor, com a qual se communicão por meio de hum particular buraquinho.

Propried. O *cheiro* he forte, aromatico, e fedorento; o *sabor* he acre, amargoso, e enjoativo. Dissolve-se parte em espirito de vinho, e no ether, e parte em agua; e esta dissolução evaporada dá hum sal, cuja natureza ainda se ignora. Colhe-se pois d'analyse Chymica ser o *Castoreo* huma resina unida á mucilagem animal, ou geléa, e a hum sal.

CATO, ou **TERRA JAPONICA**. Catechu, f. Terra Japonica.

Extracto gommoso-resinoso.

Mimosa Cate. *Murray* Appar. medicam. vej. *Elem. de Bot.*

Mimosa Catechu. Linn. Suppl. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na India Oriental nos montes Rota, Pallamor, e n'outros lugares situados a fima de Bengala.

Arvore.

Forma: *Gomma resina* em pedaços seccos, duros, mas quebradiços, com a côr por fóra entre ruiva e negra, e por dentro avermelhada escura, aonde québra he irregular, facil de se reduzir a pó escuro avermelhado. He muitas vezes misturada de serradura de madeira.

Propried. O *cheiro* nenhum; o *sabor* alguma cousa estitico, e amargoso, e por fim doce. *Mastigado* esmigalha-se, e desfaz-se todo na boca, sendo puro, e tinge de vermelho a saliva. Dissolve-se todo em agua, atóra as fêzes; e a dissolução, que he avermelhada, depois de fria, parece mucosa: tambem se dissolve parte em espirito de vinho, mas sem que appareça coalho mucoso ainda depois de fria a dissolução. Não se accende á chamma; porém con-

ver-

verte-se em carvão , e fumea. Mettido em vaso de ferro , e posto sobre fogo , amollece ; e chegando-se-lhe a chamma , accende-se , arde em pequena lavareda amarelada , deixando por fim carvão negro , secco , quebradiço , resplandecente , que cuja pouco.

CEBOLA ALBARRÃ. *Scilla*, *Squilla* Off. *Raiz.*
Scilla Maritima. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar : Habita nos terrenos areentos , e saibrosos da Hespanha , Portugal , &c. (*Florece em Agosto , e Setembro.*) *Perennial* , vulgar.

Forma : A raiz he bulbosa , de feição de pera , do tamanho de hum punho , ou mais , composta de cascos , ou escamas carnudas , largas , adelgadas nos lados , cheias de çumo pegajoso , e de côr alvacenta , cubertas todas de pelles seccas , delgadas , nervosas , das quaes as de fóra são mais delgadas , e as de dentro çumarentas na base. Do fundo da cebola sahem infinitas raizinhas , que são a verdadeira raiz.

Propried. O cheiro quasi nenhum ; o sabor affás amargoso , acre , enjoativo , e que dura muito tempo. Na raiz secca conserva-se o amargoso , desvanecendo-se o acre.

CEGUDE , ou CIGUDE , vej. CICUTA.

CELIDONIA. *Chelidonium maius* Off. *Raiz , herva.*
Chelidonium Maius. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar : Habita nas terras incultas de Portugal , &c. (*Florece todo o Verão.*) *Perennial* , vulgar.

Forma : A raiz recente he cylindrica , do comprimento de hum palmo , quasi ramosa , com barbas , ou raizinhas , por fóra de côr vermelha , (preta , quando está secca) cuberta de pellezinhas denegridas ; com o parenchyma quasi carnudo , amarelo , o qual lança çumo amarelo , sendo cortado contra fio. Da raiz sahem muitos talos quasi de quatro esquinas com al-

alguma aspereza, levemente pennugentos, inferiormente singelos, sem folhas, e em fima divididos em ramos forquilhaes com folhas. Os ramos esparcidos algum tanto, roliços, pennugentos. As folhas são pinnuladas, por fima lizas, por baixo pennugentas, com as folhinhas quasi oppostas em pézinhos, ovadas, rombas, venolas, divididas em lobos rombos, serrados, cujas sinuosidades são obtusamente arredondadas.

Propried. O cheiro da raiz recente he algum tanto fedorento; o sabor he amargoso, acre; multigada tinge a saliva de amarelo; o cheiro da herba he tambem alguma coufa fedorento, e o sabor levemente amargoso, acre. A planta secca he mais amargosa, menos acre.

CENTAUREA MENOR, ou FEL DA TERRA.

Centaurium minus Off. Herba com summidades florentes.

Gentiana Centaurium. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*
Lugar: Habita nas terras saibrosas de Portugal, da Europa toda. (*Florece desde Junho até Agosto.*) *Annual, vulgar.*

Forma: Os talos são muitos na mesma raiz, direitos, roliços, de dous gumes, lizos, singelissimos. As folhas radicæes são amontoadas, de feição de cunha oblonga, inteirissimas, lizas, alguma coufa çumarentas, com pézinhos curtos; as do talo são oppostas humas a outras, lineares, rentes, rombas. As flores estão tres a tres em ramos dispostos em corymbo, e as suas corollas são vermelhas, affuniladas fendidas em finco partes, dentro de calices partidos tambem em finco.

Propried. O cheiro nenhum; o sabor amorgosissimo.

CERA. Cera Off.

Oleo fixo coalhado.

Lugar: Acha-se nas antheras das flores, donde as abelhas a recolhem, e dão certa preparação, para com ella formarem seus favos, e tapar suas casas:
acha-

acha-se também nas flores, frutos, e folhas de algumas plantas.

Forma: A *cêra* he em bocados, ou pães solidos, oleosos opacos, pegajosos, de côr mais, ou menos amarela.

Propried. Não tem *cheiro*, nem *sabor*. *Mastigada* se abranda, e apêga aos dentes, mas não se destaz na saliva. *Exposta* em folhas delgadas ao ar, ou ao orvalho, torna-se branca, mais dura, e quebradiça, e então chama-se *cêra branca* (*Cera alba*), o que também acontece com o *acido marinho desfogistificado*. *Posta* a fogo brando, amollece, e se derrete n'hum fluido oleoso, transparente, o qual depois de estriado torna a ficar como d'antes. Quando se aquece a hum certo grão, accende-se, e arde com chamma clara. Não se dissolve n'agua, nem no espirito de vinho; dissolve-se porém nos alcalis, e se combina com elles de forte, que vem então a dissolver-se n'agua; dissolve-se também nos oleos.

CEREFOLIO, ou CERFOLHO. *Ceressfolium*, f. *Chærophyllo* Off. *Herva*.

Scandix Cerefolium. Linn. Sp. pl. vej. Elem. ae Bot.

Lugar: Habita nos campos da Europa Austral, e se cultiva em Portugal. (*Florece em Maio.*) *Annual*.

Forma: O talo he algum tanto roliço, e esquinado, riscado, lizo, com leus nós, e de côr verdeoenga. Os ramos, que nascem dos nós, são solitarios, alternados, semelhantes ao talo. As folhas, que nascem também dos nós, são alternadas, com pézinhos, lizas por toda a parte, tenras, de côr verde agradável, duas vezes pinnuladas, com as pinnulas affastadas, e as folhinhas ovadas, algum tanto agudas, retalhadas, com a borda sutilmente pestanosa, com os nervos de huma, e outra parte pennugentos, fustidas todas em pézinhos convexo-planos, notados com hum sulco ao comprido, ou riscados.

Propried. O *cheiro* da planta recente aromatico, agradável, quando se esfrega; o que perde, quando es-

está secca ; o *sabor* aromatico tirante ao de herva doce, agradável, e he mais fraco estando secca.

CEVADA. *Hordeum* Off.

Sementes.

Hordeum vulgare. } *Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.*
Hordeum distichum. }

Lugar: Cultiva-se em Portugal, &c. *Annual*, vulgar.

Forma: As sementes são de figura entre oval, e oblonga, mais grossas no meio, adelgaçadas nas pontas, lisas, de côr pallida, com hum fulco ao comprimento da parte convexa, algum tanto esquinadas, e com huma pragana na ponta. O *parenchyma* he branco farinhoso.

Propried. O cheiro nenhum ; o *sabor* farinhoso, mucofo.

CHUMBO. *Plumbum* Off.

Metal imperfecto.

Lugar: Acha-se nas entranhas da terra em tres estados differentes ; a saber, 1.^o) mineralizado pelo enxofre, e de mistura com outros metaes ; 2.^o) combinado com os acidos fosforico, vitriolico, aereo, ou mefytico, e arsenical ; 3.^o) em cal ; 4.^o) puro nativo, ou virgem, segundo alguns Mineralogistas, o que outros negão.

Forma: O metal virgem he opaco, molle, dobradiço ; pouco, ou nada sonoro, e elastico ; cuja os dedos ; he de côr cinzenta, declinante a azulada, sobretudo sendo recentemente quebrado.

Propried. O cheiro he notavel, quando se roça ; o *sabor* nenhum. Hum pé cubico de chumbo fundido péza 794 libras, 10 onças, quatro oitavas, e quarenta e quatro grãos ; sua gravidade especifica he para a d'agua como 1,15:523 para 10:000, *Briffon*. Batido com martelo, ou entre dous cylindros, estende-se em folhas muito delgadas. Exposto ao ar, se altera, sua superficie brilhante torna-se insensivelmente de côr cinzenta, e com o tempo se cobre de huma pellezinha branca, terrea, como ferrugem. Posto ao fogo, derrete-se com tanta facilidade.

Tom. II.

E

de,

de , e com tão brando calor , que se pôde metter nelle a mão sem escalear-se no instante , em que se derrete ; e tocando-o então o ar , cobre-se de hum pó cinzento , o qual com a continuação do fogo se faz amarelo , e por fim vermelho , e se chama *Minio* , ou *Zarcão* ; mas pondo-se a dita cal amarela a fogo fortissimo , se derrete , e torna em escamas brilhantes , amarelas , meio vitrificadas , que se chamão *Fezes de ouro* , ou *Lythargirio* , o qual fundido com maior grão de calor , converte-se n' hum vidro amarelo , transparente. Experimentado com o *Maçarico* , derrete-se logo , apparece brilhante , ferve , fuma , formando sobre o carvão hum círculo amarelado ; tinge de amarelo o *fluxo* ; e este vem a ficar alvacentos , e mais , ou menos opaco , ajuntando-se-lhe mais chumbo. Pouco , ou nada se altera pela agua , afóra contendo esta saes. Dissolve-se mais , ou menos facilmente em todos os acidos , e todas as suas dissoluções são de sabor doce-estitico. Feito em folhas , ou laminas delgadas , e exposto assim aos vapores de vinagre , se converte n' hum cal branca , escamosa , que se chama *Alvaiade*.

CICUTA, ou **CIGUDE**. Cicuta maior Off. Herva. *Conium Maculatum*. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot. Lugar : Habita nos terrenos humidos , e incultos de Portugal , e de outros Paizes da Europa. (*Florece desde Maio até Julho.*) *Biannual* , vulgar.

Forma : O talo he do comprimento de tres até cinco pés , grosso , cylindrico , oco , ramoso , folhado , lizo , de côr verde claro , e marcado por baixo de nodoas denegridas , ou avermelhadas. As *folhas* são grandes , tres vezes pinnuladas , com as folhinhas ponteagudas , fendidas de través em tiras compridas , e horizontaes , dentadas , de côr verde denegrida , e alguma coufa luzidias.

Propried. O cheiro he fedorento , como de ratos ; o sabor he levemente aromatico , hervoso , e enjoativo.

CI-

CIPO', vej. IPECACUANHA.

COBRE. Cuprum, *Æs*, Venus Off. *Metal imperfeito.*

Lugar: Acha-se nas entranhas da terra em diferentes estados; a saber, 1.º) *virgem*, ou *nativo*; 2.º) *mineralizado* pelo enxofre, e misturado com outros metaes, e semimetaes; 3.º) *salino*, isto he, combinado com o acido vitriolico, ou com o marinho; 4.º) em *cal*, &c.

Forma: *Metal* avermelhado, solido; quando québra, he brilhante; assas sonoro, e elastico.

Propried. O *cheiro* he desagradavel, quando se roça; o *sabor* estitico, enjoativo. Hum pé cubico de cobre péza 545 libras; sua gravidade especifica he de 77880, *Brisson*. Batido com martelo, estende-se em folhas delgadissimas, e dellas se tirão á fieira fios assas estreitos, e tão fortes, que hum fio de cobre de diametro de hum decimo de pollegada sustem 299 libras, e 4 onças, sem romper-se. Exposto ao ar, altera-se, torna-se negro, e se cobre de ferrugem verde. Posto ao fogo, se faz azul, amarelo, e em fim arroxado; e depois de bem abrazado, se funde, e neste estado tocando-o o ar, calcina-se na superficie, e se converte em escamas de cor vermelha denegrida. Botadas suas limalhas sobre carvões abrazados, communica á chamma cor azul, e verdoenga. Não se altera com agua purissima, atóra sendo reduzida em vapores. Dissolve-se em todos os acidos, e da sua união resultão diferentes saes neutros metallicos de cor verde, ou azul; dissolve-se tambem nos oleos, e nos licores animaes, e materias untuosas; nos alcalis, mormente no volatil, que lhe communica cor azul.

COCHLEARIA. Cochlearia Off. *Herva recente.*
Cochlearia Officinalis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos terrenos humidos, ou vizinhos do mar em França, na Suissa, e nas regiões Boreaes

E ii

da

da Europa ; cultiva-se em Portugal, &c. (*Florece em Abril, e Maio.*) *Annual.*

Forma: Os talos são do comprimento de oito até dez pollegadas ; lizos, tenros, ligeiramente esquinados, ramosos, e fracos : sahem muitos de huma só raiz : as folhas radicaes são muitas com longos pézinhos, arredondadas, a modo de coração na base, lizas, verdes, grossas, çumarentas, e algum tanto conca-vas, imitando colhér ; as folhas do talo são quasi rentes, ou em pézinhos curtos, alguma cousa angulares ; as de cima são amplexicaules, ou abarcan-tes, ovaes, ponteagudas, e com hum dente de ca-da lado. Terminão os talos n' hum corymbo sim-ples, levantado, com pedunculos dispersos, e al-peros.

Propried. O cheiro, logo que se parte, ou se esfrega, he penetrante, e alguma cousa desagradavel ; o sabor he acre, picante, amargoso ; ambos seme-lhantes ao cheiro, e sabor dos Agriões, em quan-to a planta he recente. Depois de secca, apenas as folhas são ingratamente amargas.

COLCHICO. Colchicum Off. *Raiz recente.*
Colchicum autumnale. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.
Lugar: Habita nos prados de toda a Europa. (*Florece em Setembro, e em grande parte do Outono.*) *Pe-rennal.*

Forma: A raiz he quasi redonda, bulbosa, gibbosa d' huma parte, e da outra achatada, ou como ef-cavada. Cuberta de huma tunica correena, parda, e cheia de nervos parallellos ; e esta mesma cingida por huma pellezinha mais delicada, e amarelenta. O parenchyma he solido, carnudo, branco, algu-ma cousa succoso ; e mais no Outono, do que na Primavera. Tem ao lado annexo hum bulbo mais pequeno, que floresce no anno seguinte ; este vem a desvanecer-se : e se se ha de colher esta raiz na Primavera, não se aproveitão os bulbos, que flore-cerão no anno antecedente.

Pro-

Propried. O cheiro he fedorento como o de bode ; o sabor he acre , enjoativo. Maltigada a cebola , pica , e aquece a lingua , e os gorgomilos ; e cortada , não bota leite , mas sim hum çumo alvacento misturado com amydo , que se apêga á faca.

COLOQUINTIDAS. *Colocynthis Off.* *Fruto.*

Cucumis Colocynthis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nas Ilhas do Archipelago , na de S. Miguel , e no Levante sobre as coistas maritimas. *Perennial.*

Forma : O fruto he hum pomo arredondado , do tamanho de hum punho , lizo , de côr verdoenga , ou alvacentamarelada , quando está maduro ; assás leve , com a casca delgada , dura , ou correenta , que encerra polpa esponjosa , branca. Vem-nos porém de Alepo este pomo sem casca , secco , esponjoso , branco , molle como papel , repartido em seis cazinhas cheias de sementes ovadas , rombas , chatas de ambas as partes , lisas , de côr amarelada.

Propried. O cheiro fraco , desagradavel ; o sabor amargosissimo , enjoativo , alguma cousa acre.

COMINHOS. *Cuminum, Cyminum Off.* *Sementes.*

Cuminum Cyminum. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita no Levante , Egypto , na Ethiopia , e cultiva-se na Ilha de Malta. *Annual.*

Forma : As sementes são ovaes-oblongas , chatas , e algum tanto concavas de hum lado , e do outro convexas ; de ambos fulcadas ; de côr verdoenga , ou parda , e ás vezes amarelada.

Propried. O cheiro pouco agradavel , aromatico , forte ; o sabor he acre , aromatico , e algum tanto amargo , e ingrato.

CONCHAS DE OSTRAS. *Testæ ostreorum Off.*

Ostrea Edulis. Linn. Syst. Nat.

Lugar : Habita no Oceano , e no Téjo.

Forma : São duas conchas desiguaes , huma chata , e
ou-

outra convexa, unidas de maneira, que formão huma figura arredondada, sulcada, raiada, escamosa.
Propried. Não tem cheiro; nem sabor; ferve com os ácidos, e se converte em cal a fogo violento.

CONTRAHERVA. *Contrayerva* Off. *Raiz.*
Dorstenia Contrayerva. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Dorstenia Faria } vej. *Elem. de Bot.*
Dorstenia Vilella }

Lugar: Habita no Mexico, no Perú, na Ilha de S. Vicente, e no Brazil. *Perennial.*

Forma: A raiz he do comprimento de huma até tres pollegadas, e muitos nós como escamas, guarnecida de raizinhas, ou barbas compridas, e ramosas, que sahem de todos os lados, mormente debaixo: a côr por fóra he parda, e por dentro alvacenta.

Propried. O cheiro he fragrante, alguma cousa achegado ao das folhas de figueira; o sabor he acre, algum tanto amargoso, e aromatico. As fibras quasi que não tem cheiro, nem sabor; e por isso se ha de escolher a raiz grossa.

CORNO DE VEADO, ou DE CERVO. *Cornu Cervi* Off.

Cervus Elaphus. Linn. Syft. Nat.

Lugar: Habita na Europa. *Animal quadrupede.*

Forma: Os cornos são mocios, roliços, arqueados, esgalhados, engelhados, por fóra de côr parda, e por dentro branca: cortados contraffio, parece constarem de duas substancias, huma no meio, cujas fibras são menos achegadas, e outra em torno daquella, cujas fibras estão tão unidas, que se não distinguem.

Propried. Não tem cheiro, nem sabor; mas fervido em agua, larga nella a parte glutinosa, ou a geleia, que contém, ficando a terra por desfazer.

CRA-

CRAVO DA INDIA. *Caryophyllus aromaticus* Off.

Flor fechada.

Caryophyllus Aromaticus. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita nas Molucas, e cultiva-se na Cayenna, em S. Domingos, e na Martinica, &c. *Arvore.*

Forma: O Cravo da India como nos vem he a flor fechada, secca, e endurecida; côr de ferrugem, ou parda escura; do comprimento de meia pollegada, e mais; de feição de cravo de cravejar; quasi de quatro esquinas, engelhada; em cujo vertice ha quatro pequenas pontas, lanceoladas, agudas, concavas, e dispostas a modo de estrella, e no meio dellas huma bolinha, formada de pequenas escamas acostadas humas a outras, entre as quaes, sendo affastadas, e abertas, se vem muitos fios avermelhados. (*Cumpre estolber, o que for bem nutrido, pezado, oleoso, facil de quebrar, da côr já apontada, que tenha no remate, podendo ser, a dita bolinha, e que apertado entre os dedos, bote humidade oleosa, e que o sabor, e cheiro sejam activos.*)

Propried. O cheiro he fragrante, forte, aromatico, suave; o sabor aromatico, forte, quente, algum tanto acre, e amargo; mastigado aquece os gorgomilos, e a lingua.

CYNOSBATOS. *Cynosbatum*, *Cynorrhodon* Off.

Fruto.

Rosa Canina. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita pelos silvados, e bordas dos caminhos em Portugal, &c. (*Florece em todo o Verão.*) *Arbusto, vulgar.*

Forma: O fruto he huma baga carnosa, oval, coroadada com as folhinhas do calis, liza, luzidia, de côr avermelhada por fóra, e amarelada por dentro, que contém na concavidade sementes quasi ovadas, com felpa, e barbas rijas.

Propried. O cheiro nenhum; o sabor agri-doce, estético.

DE.