

LOUREIRO. *Laurus* Off. Folhas, bagas.

Laurus Nobilis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita em Portugal, na Hespanha, Grecia, e no Levante. (Florece em Março, ou Abril.) *Arvore*.

Forma : As folhas são alternadas, com pézinhos, lanceoladas, mais, ou menos ondeadas nas bordas, duras, correntas, cheias de nervos, verdes, lisas de ambos os lados, da largura de huma até duas pollegadas, e de tres até finco de comprimento. As bagas são verdadeiramente humas azeitonas, ovaes, de côr azulada, ou negra, quando estão maduras; algum tanto luzidias; de huma só cavidade, na qual ha hum caroço partivel em duas ametades, que, seccando-se, he algum tanto solido.

Propried. O cheiro he aromatico; o sabor acre, aromatico, alguma coufa amargo.

M

MACIS, MASSA, ou FLOR DE NOZ MOSCHADA, vej. NOZ MOSCHADA.

MALVA. *Malva vulgaris* Off. Folhas.

Malva Sylvestris. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Malva Rotundifolia. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nos terrenos incultos, ao longo dos vallados, nas bordas dos caminhos, &c. em Portugal. (Florece em Maio, Junho, e Julho.) *Annual*, vulgar.

Forma : As folhas da primeira especie são alternadas, com pézinhos compridos, arredondadas, chanfradas na base; divididas as de baixo em sete, as de cima em finco lobos rombos, recortados, de côr verde; aveludadas, da largura de quasi tres pollegadas. As folhas da segunda especie são pequenas, arredondadas, chanfradas a modo de coração na base; recortadas, e divididas em finco, ou sete lobos pouco notaveis; de côr verde cinzenta.

Pro-

Propried. Não tem cheiro, nem sabor; mas he affás mucosa.

MALVAISCO. *Althea Off.*

Raiz.

Althea Officinalis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos terrenos algum tanto humidos de toda a Europa. (*Florece de Maio até Julho.*) *Perennal.*

Forma: A raiz he grande, comprida, roliça; ramosa ao pé do talo, com os ramos roliços, singelos, da grossura de hum dedo, ou de huma pollegada; por fora de côr cinzenta-esbranquiçada, alguma cousa engelhada; com o parenchyma quasi carnudo, branco, o qual, cortado contra fio, se vê affinalado de riscos mais brancos, dirigidos do centro para a circumferencia, e de hum annel encarnado, algum tanto recortado no amago.

Propried. Não tem cheiro; o sabor he alguma cousa doce, e tem muita mucilagem.

MAMONA, ou CARRAPATOS. *Ricinus vulgaris, f. Cataputia maior Off.*

Sementes.

Ricinus Communis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita na India, e no Brazil; cultiva-se em Portugal. (*Florece desde Maio até o fim do Estio, e ainda no Outono.*) *Annual.*

Forma: As sementes são ovadas, chatas de ambos os lados, com a casca quebradiça, resplandecente, jaspeada, ou malhada de côr parda, verdoenga, e amarela, e com o caroço alvissimo, oco no centro, e embrulhado n' huma pellezinha affás delicada, e da mesma côr.

Propried. O cheiro nenhum; o sabor he mui pouco doce, e acre. *Mastigado* o miolo parece que se desfaz na saliva como as amendoas; porém depois sente-se a sua acrimonia nos gorgomilos, onde dura tempo.

MANGERONA. *Majorana Off.*

Herva.

Ori-

Origanum Majorana. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*
Lugar : Cultiva-se nos jardins , e hortas , mas igno-
 ra-se sua patria. (*Florece desde Maio até Agosto.*)
Annual.

Forma : Os *talos* são direitos , de quatro esquinas ,
 cheios de nós , ou juntas , pennugentos , logo em
 baixo ramofos , com os ramos alternadamente op-
 postos , singelos , semelhantes aos *talos*. As *folhas*
 são oppostas , nascem das juntas dos *talos* , e dos
ramos , alguma coufa çumarentas , ovaes , rombas ,
 com pézinhos , apenas pennugentas , riscadas , na
 margem alguma coufa tortuosas , ou colubrinas.

Propried. O *cheiro* he fragrante , forte , agradável ; o
sabor he aromatico , algum tanto amargofo , e acre.

MANNA. Manna Off. *Çumo coalhado-doce.*
Freixo do Manná , vej. *Elem. de Bot.*

Fraxinus Ornus. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Fraxinus Excelsior. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar : Habita na Europa Austral , particularmente
 na Calabria , e na Sicilia. *Arvore.*

Forma : O *Manná* he hum çumo coalhado , mello-
 fo , semelhante ao mel crystallizado , de côr branca
 amarelada , o qual nos vem ou em canudos , e pe-
 daços compridos , algum tanto molles , quebradi-
 ços , e que quebrão em grãoszinhos mais brancos ;
 ou em bocados de differente figura , apegados huns
 a outros , molles , pegajolos , tenros. O primeiro
 chama-se *Manná em lagrimas* , e he o melhor ; o
 segundo he o *Manná ordinario*. Além destes , an-
 da no Commercio outra variedade , assás mellofo ,
 pegajoso , e humido , que se chama *Manná de Ca-*
labria ; o qual , posto que mais purgante , deve-se
 rejeitar.

Propried. Não tem *cheiro* ; o *sabor* he doce como mel.
 Maltigado parece farinholo ao principio , mas de-
 pois desfaz-se na saliva , e por isso he mais notavel
 o sabor. Dissolve-se bem em agua , mas mais de-
 présta n'agua quente , da qual basta hum pezo
 igual ;

igual ; mas depois de esfriar esta dissolução , assenta o Manná no fundo em fôrma crySTALLINA. Dissolve-se tambem no espirito de vinho rectificado por meio do calor , mas não nos oleos fixos , ou expressos. Chegando-se á chamma , derrete-se , escuma , estala , e arde em chamma azul , lançando muitas faiscas amarelas.

MARCELLA GALEGA. Chamomilla vulgaris , f. nostras Off. *Herva com flor.*

Matricaria Chamomilla. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nos terrenos incultos , e nos cultivados. (*Florece desde Maio até Julho.*) *Annual.*

Forma : Os talos são roliços , levemente riscados , lizos ; em cima ramosos , com os ramos alternados , direitos , guarnecidos de folhas rentes , alternadas , algum tanto carnudas , pinnuladas , mui miudamente retalhadas , com as folhinhas assoveladas , agudas , de côr verde-clara. As flores são terminaes , pedunculadas , dispostas em fôrma de côpa , compostas no disco de florzinhas amarelas , affuniladas , e no raio de semiflorzinhas alinguetadas , brancas ; mettidas todas n'hum calis commum , hemisferico , composto de folhinhas , ou escamas compridinhas , acostadas humas sobre outras , como telhas em telhado ; na borda , e nas pontas alguma coufa membranosa , aridas , e transparentes como papel.

Propried. O cheiro he fragrante , agradável ; o sabor aromatico , acre , e amargo : e são mais notaveis estas qualidades nas flores ; e tanto as destas , como as da herva se não perdem , sendo seccas.

MARCELLA ROMANA. Chamomilla Romana , Chamæmelum nobile Off. *Flores.*

Anthemis Nobilis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nos prados na Europa toda , e em Portugal. (*Florece desde Maio até Julho.*) *Annual.*

Forma : As flores são compostas-radiola , com as florzinhas do meio hermafroditas , acanudadas , recór-

Tom. II.

K

ta-

tadas na borda, de côr amarela, e com as florzinhas do raio femeas alinguetadas, de côr branca; mas estas faltão ás vezes. Todas ellas estão dentro de hum calis commum, hemisferico, levemente pennugento, sulcado, composto de escamas estreitas, acostadas humas sobre outras, ou imbricadas, e quasi iguaes; de margem escariosa. As escamas superiores são hum pouco maiores, obtusas-arredondadas, e com a margem tambem secca membranosa, ou escariosa.

Propried. O cheiro he fragranté, forte, agradável; o sabor he semelhante ao cheiro, amargoso, acre. Estas propriedades são mais activas que as da Marcella vulgar, ou Galega, e por isso deve-se preferir a esta.

MARMELO. Cydonium, f. Cydonia Off. *Fruto, sementes.*

Pyrus Cydonia. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na Hungria, e cultiva-se nas vinhas, e hortas de Portugal, &c. (*Florece em Março.*)
Arvore.

Forma: O fruto he hum pomo arredondado, ou de feição de pêra, com a ponta a modo de embigo, em torno do qual ha finco cantos, ou outeirinhos, com a pelle amarelada, pennugenta, ou cuberta de hum finissimo cotão alvacentó, e a carne, ou parenchyma solido, amarelado, repartido em fincas casinhas, nas quaes estão as sementes ovadas, algum tanto aguçadas, chatas de huma parte, e convexas da outra, com a casca de côr de ferrugem, ou parda, e o miolo branco.

Propried. O cheiro do fruto, quando está maduro, he fragranté; o sabor estitico, algum tanto azedo-doce; e, quando ainda não está maduro, he affás estitico, azedo. O sabor das sementes he ensoço, mucoso.

MARROIOS. Marrubium album Off. *Folhas.*
Mar-

Marrubium Vulgare. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar : Habita nas bordas dos caminhos, nos terrenos incultos de Portugal, &c. (*Florece desde Maio até Julho.*) *Perennial, vulgar.*

Forma : As folhas são ovaes, as mais das vezes ovadas, ou arredondadas, engelhadas, pennugentas em ambas as superfícies; recortadas desigualmente, de côr verde-cinzenta, do comprimento de huma pollegada, e mais, fustidas todas em pézinhos riscados. Os talos são levantados, de quatro esquinas, cubertos de corão branco, e ramosos. Os ramos oppostos semelhantes aos talos.

Propried. O cheiro he fragrante, agradável, momentaneamente quando se esfregão as folhas; o sabor he amargo, e algum tanto acre, e duradouro.

MATRICARIA. *Matricaria*, f. *Parthenium* Off. *Herba florida.*

Matricaria Parthenium. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar : Habita nos terrenos incultos, e pedregosos da Europa, e cultiva-se nas hortas, e jardins em Portugal. (*Florece todo o Verão.*) *Perennial.*

Forma : Os talos são direitos, roliços, riscados, lizos, alguma coufa ramosos, do comprimento de dous pés, guarnecidos de ramos, e de folhas alternadas, pecioladas, mui largas, pinnuladas, e fendidas de través em tiras compridas, e horizontaes, retalhadas estas n'outras ovadas, compridinhas, serradas; de côr verde desmaiada. As fleres nascem das pontas dos talos, e dos ramos, pedunculadas, dispostas em fórma de côpa; e constão no disco de florzinhas hermafroditas, amarelas, acanudadas, e no raio de florzinhas femeas, brancas, alinguetadas, e ovaes-arredondadas, com tres dentinhos nas pontas, lizas, e aquilhadas por cima, e engelhadas por baixo; mettidas todas n'hum calis commum, hemisferico, fulcado, composto de escamas imbricadas, alguma coufa seccas, transparentes, ou esca-

riofas na ponta, cujas margens são membranaceas, e quasi pestanofas.

Propried. O cheiro he fragrant, semelhante ao da Marcella, porém mais forte; o sabor he algum tanto amargoso, aromatico.

MEIMENDRO. Hyosciamus Off.

Folhas.

Hyosciamus Niger. Linn. Sp. pl. vej. Elém. de Bot.

Lugar: Habita nas bordas dos caminhos, nos terrenos incultos, entre cascalho, e sobre paredes velhas em toda a Europa. (Florece no Estio.) *Biannual.*

Forma: As folhas são alternadas, rentes, abarcantes; ovas-lanceoladas, molles, alguma coufa felpudas, de côr verde-desmaiada, com as bordas retalhadas em lacinias lanceoladas, agudas, inteiras. O talo he levantado, roliço, de altura de dous pés; com alguma lanugem, e pegajoso; na parte superior ramoso; e os ramos são alternados, e levantados.

Propried. O cheiro he fedorento; o sabor he alguma coufa mucoso, e acre. Botadas as folhas secas sobre carvões accezos, faiscão, estourão, e detonão como o nitro, e ao mesmo tempo derramão fumo como o do tabaco.

MEL. Mel Off.

Lugar: Habita nos nectarios das flores, e dalli o chupão as abelhas, e o depõem ao depois, e guardão nos favos para seu sustento.

Forma: O Mel he verdadeiramente o assucar das plantas dissolvido na mucilagem das mesmas, em forma liquida, muitas vezes coalhado em grãozinhos, e ás vezes, mormente no Brazil, liquido como azeite, de côr branca, ou amarela. (Deste se ha de escolher o que for branco, doce sem mistura de outro sabor.)

Propried. O sabor he doce, aromatico; mas estas propriedades varião segundo as plantas, donde as abelhas o chupão, de sorte que o sabor doce muitas

ve-

vezes he misturado com o amargoso. As outras propriedades são semelhantes ás do assucar assima declaradas. Tem *cheiro* proprio, que tambem frequentemente participa do das differentes plantas, donde as abelhas o chupão.

MELILOTO, COROA DE REI, ou TREVO CHEIROSO. *Melilotus Off.* *Herva florida.*
Trifolium Melilotus Officinalis. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita entre as searas, e nas terras, que se lavrão na Europa toda, e cultiva-se tambem nas hortas, e jardins de Portugal. (*Florece todo o Verão.*) *Annual, ou biannual:*

Forma: Os talos são roliços, lizos, verdes, do comprimento de dous, tres, e mais pés; ramosos, com os ramos alternados, esquinados, riscados, e lizos. As folhas são alternadas, com pézinhos, em cujos remates estão tres folhinhas ovaes-compridas, de comprimento de quasi huma pollegada, despontadas, serradas, de ambas as superficies lizas, a de cima de cor verde escura, e a de baixo mais desmaiada: as duas folhinhas dos lados são quasi rentes, a do meio he maior, e com pézinho. As flores são dispostas em espiga, que consta da corolla amarela, aborboetada, cuja quilha he singela, e mais curta que as azas; e do estendarte; e de calis acanudado, fendido em cinco partes.

Propried. O *cheiro* he fragrante, suave, e mais activo na planta secca, do que estando fresca. O *sabor* he algum tanto amargoso.

MERCURIO, vej. AZOUGUE.

MEZEREÃO. *Mezereum Off.* *Casca da raiz.*
Daphne Mezereum. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na Europa Austral, e em Portugal nos outeiros. (*Florece em Março, e Abril.*) *Arbusta.*

Forma: A casca da raiz de *Mezereão* secca he em
pe-

pedaços compridos, molles, tecidos de feveras delicadissimas, tão fortes, que custão a quebrar; e cubertos por fóra de huma tez liza, de côr tirante a ruiva.

Propried. A casca da raiz secca não tem cheiro; e o sabor he quasi nenhum; mas conservando-se muito tempo na boca, he acre, ardente, e atura muito nos gorgomilos. Em quanto recente, he summamente acre, e chega a inflammare as fauces.

MILLEFOLIO. *Millefolium* Off. Folhas, e Flores. *Achillea Millefolium.* Linn. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita nos campos, e prados da Europa. (Florece desde Maio até Julho.) Perennial.

Forma: As folhas rentes, alongadas, amplexicaules, alternadas, pinnuladas; as pinnulas são duas vezes pinnuladas, oppostas, com as folhinhas quasi lanceoladas, dentadas; por cima alguma cousa pennugentas, e por baixo cubertas como de algodão. As flores são compostas-radiadas, de côr branca, com as florzinhas do meio hermafroditas, tubulosas, e as do raio femeas, alinguetadas; mettidas todas n'hum calis commun, ovado, pennugento, formado de escamas ovas, concavas, pestanósas, e acostadas humas sobre outras, ou imbricadas.

Propried. O cheiro he alguma cousa aromatico, momentaneamente esfregando-se; o sabor he alguma cousa amargo, aromatico, e acre, sem muita differença na verde, ou na planta secca: mas estas qualidades são mais notaveis, e evidentes na flor.

MOLARINHA, } vej. FUMARIA.
MOLEIRINHA, }

MOSTARDA. *Sinapi* Off. Sementes. *Sinapis nigra.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita nos campos da Europa; cultiva-se nas hortas. (Florece desde Maio até Julho.) Annual.

Forma: As sementes são miudas, arredondadas, de côr de ferrugem escura, alguma cousa engelhadas.

Pro-

Propried. O cheiro apenas sensível; o sabor he algum tanto amargo, acre, picante. Mastigadas esmigalhão-se facilmente, irritão, e aquecem a lingua, e os gorgomilos, e fazem a saliva alvacenta.

MURTA. *Myrtus* Off. Folhas, bagas.
Myrtus Communis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita na Europa Austral, nos bosques de Portugal: cultiva-se nas hortas, e jardins. (Florece desde Maio até Julho.)

Forma: As folhas são ovadas lanceoladas, pecioladas, agudas, lisas de ambas as superficies, mas alguma coufa engelhadas; as bagas, ou murteinhos são ovaes, do tamanho de ervilhas, engelhadas, denegridas, terminadas n'hum embigo.

Propried. O cheiro das folhas seccas he fraco; o sabor he aromatico, agradável; e sendo recentes, he o sabor tambem alguma coufa estitico, e amargo. O cheiro das folhas recentes he agradável, e fragrante. O cheiro das bagas he tambem fragrante; o sabor aromatico, levemente estitico, e doce.

MUSGO ISLANDICO. Lichen, f. *Muscus Islandicus* Off. Herva.

Lichen Islandicus. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita sobre a terra esteril, e secca, ou pedregosa na Europa; principalmente na Islandia, nas Regiões Septentrionaes, e tambem nas Austraes, como Italia, França Meridional, Suissa, Alemanha.

Forma: O Musgo Islandico he huma Alga folhuda quasi correenta, liza, de cor cinzenta, ou quasi cor de azeitona: as folhas são convexas por cima, e concavas por baixo, com manchas ás vezes, que se convertem em outeirinhos farinhosos, cheias de covinhas, e retalhadas em lacinias quasi lineares, rombas, e cujas margens sinuosas todas são pestanofas.

Propried. O cheiro nenhum; o sabor he alguma coufa amargo.

MYR-

MYRRHA. Myrrha Off.*Gomma-resina.*

He desconhecido o genero de planta, que a dá.

Lugar: Habita na Arabia, e na Abyssinia.*Forma:* A Myrrha he huma gomma-resina solida, em pedaços de differente tamanho, e figura, algumas vezes maiores do que nozes, de côr vermelha escura, quasi transparentes, quebradiças; aonde quebra, alguma cousa luzidios, com malhas, ou riscos semicirculares, que parecem unhas.*Propried.* O cheiro he fragrant; o sabor muito amargo, acre, e alguma cousa aromatico. Mastigada se apega pouco e pouco aos dentes; a maior parte se destaz na saliva, e a torna côr de leite. Chegando-se á chamma, arde em lavareda, mas com difficuldade, acompanhada de fumo, e estalos, e deixa carvão cinzento. Digerida em agua quente dissolve-se inteiramente; mas apenas estria, assenta no fundo a parte resinosa. Dissolve-se tambem no espirito de vinho, e a tintura he de côr amarela-avermelhada. Não se dissolve nos oleos fixos, nem nos volateis.

N

NITRO, ou **SALITRE.** Nitrum Off. *Sal neutro*
*perfeito.**Kali Nitratum*, f. *Alkali vegetabile nitratum.* Bergman
Sciagraph.*Lugar:* Acha-se nativo de mistura com certas terras barrentas nas Indias Orientaes, na China, em Hespanha, e no Brazil; e na Siberia em cavidades de rochedos; sobre a superficie de pedaços de cré ao redor de Rocheguyon, e ás vezes na superficie dos muros, abobadas humidas, &c.*Forma:* O Nitro he hum sal neutro perfeito, composto do Acido nitroso, e do Alkali fixo vegetal, em crystaes, ou prismas compridos de seis faces, quasi sempre sulcados ao comprido, e terminados
em