

*Propried.* O cheiro he aromático ; o sabor acre , ardente , picante , e duradouro.

POEJOS. *Pulegium* Off.

*Herva.*

*Mentha Pulegium. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.*

*Lugar* : Habita nas bordas dos rios , nos terrenos humidos de Portugal , Hespanha , França , Inglaterra , &c. ( *Florece em Julho , e Agosto.* ) *Perennial.*

*Forma* : Os talos são quasi roliços , ralteiros ; com nózinhos , pennugentos , ramosos , com os ramos alternadamente oppostos , semelhantes aos talos ; e as folhas ovadas , rombas , alguma cousa recortadas.

*Propried.* O cheiro he fragrante , activo ; o sabor aromático , picante , algum tanto alcanforado , quando se mastiga. Estas qualidades são iguaes na planta recente , e na secca.

PYRETRO. *Pyrethrum* Off.

*Raiz.*

*Anthemis Pyrethrum. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.*

*Lugar* : Habita na Arabia , na Syria , em Bohemia , ao redor de Montpellier , &c. *Perennial.*

*Forma* : A raiz he comprida , cylindrica , direita , apenas tortuosa , da grossura de huma penna de pato , e mais ; por fóra engelhada ao comprido , de côr parda-cinzenta , guarnecida de algumas raizinhas como cabellos ; com o parenchyma , quando he recente , branco , alguma cousa carnudo , e quando está secca , duro , quebradiço.

*Propried.* Não tem cheiro ; o sabor he particular , parece azedo ao principio , mas depois he assas acre , ardente , duradouro ; cuja sensação se refere mais particularmente á ponta da lingua , e aos beiços , provocando grande copia de saliva.

## Q

QUASSIA. *Quassia* Off. *Raiz , lenho com casca.*  
*Quassia Amara. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.*  
 Tom. II. M Lu-

*Lugar*: Habita em Surinam, nas Antilhas, em Santa Cruz. *Arvore.*

*Forma*: A *raiz*, que nos chega ás mãos, he lenhosa, da grossura de hum braço, a qual contém o amago unido ao cerne, cuberto de casca delgada, aspera, desigual, rachada ás vezes, de côr alvacenta declinando para amarela. O *lenho* he alvacento, solido, duro, rijo, em pedaços de diverso comprimento, quasi roliços; huns da grossura de hum braço; outros de hum dedo; e outros de hum penna, cubertos de casca delgada, aspera, engelhada, facil de separar-se, quebradiça, de côr alvacenta, ou pallida, malhada, ás vezes de côr negra. *Propried.* Nenhum cheiro; o *sabor* he amargosissimo, sem mistura.

QUINA, ou CASCA PERUVIANA. Chinchina, f. Cortex Peruvianus Off. *Casca.*

*Cinchona Officinalis.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

*Lugar*: Habita no Perú, principalmente nos montes ao pé de Loxa, nas vizinhanças do rio Bamba, Cuença no Quito, &c. *Arvore.*

*Forma*: A *casca* he em pedaços de diverso comprimento enrolados, ou chatos; delgada, algum tanto dura, mas quebradiça, por fóra engelhada, aspera, cheia de rachas de través, cuberta ás vezes de musgo esbranquiçado, de côr parda-cinzenta; por dentro côr de canella; ou de ferrugem, e avermelhada. Quebrando-se apparecem as extremidades lizas; ou tambem fibrosas, e asperas.

*Propried.* O cheiro he de mofo; o *sabor* he amargo, brandamente estitico, e por fim alguma cousa aromatico.

QUINA VERMELHA. Cortex Peruvianus ruber Off. *Casca.*

Não se sabe ao certo a especie d'arvore, donde se tira esta casca, mas sabe-se que he do mesmo genero da Quina ordinaria, vej. *Elem. de Bot.*

*Lu-*

*Lugar* : Habita nos mesmos terrenos, e paizes da precedente, e tambem no Brazil. *Arvore.*

*Forma* : *Casca* em pedaços mais compridos, mais grossos, e mais pezados do que os da *Quina ordinaria*, concavos por dentro ; de grossura de mais de duas linhas ; por fóra asperos, e cheios de rachas ao través, e muitas vezes cubertos de musgo amarelado, ou alvacento. Debaixo da primeira tes está huma camada, compacta, quebradiça, de côr vermelha-escura, e debaixo desta ha outra vermelha, mais fibrosa, lenhosa.

*Propried.* O cheiro he tambem de mofo, ou nenhum ; o sabor he mais amargofo, e mais estitico, do que o da precedente. Esta contém mais resina do que a *Quina vulgar*, a qual encerra mais extracto gomoso : e por isso a *Quina vermelha* he melhor para as preparações feitas com vinhos, ou Alcool, e a *vulgar*, ou *amarela* para as que se fizerem com agua.

## R

**R** ABÃO RUSTICO. *Raphanus rusticanus* Off.  
*Raiz recente.*

*Cochlearia Armoracia*. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

*Lugar* : Habita nos terrenos humidos, nas bordas dos ribeiros de Portugal, e da Eutopa Austral : cultivava-se nas hortas. (*Florece de Julho até Setembro.*)  
*Perennial.*

*Forma* : A raiz he d'huma pollegada, ou mais de grossura, comprida, carnuda, branca, liza ; mas com algumas rugas atravessadas, quasi annulares, affastadas humas das outras ; guarnecida muitas vezes pelos lados de nózinhos arredondados, huns longe dos outros, dos quaes sahem raizinhas fibrosas. O parenchyma he branco, carnofo, firme ; e cortado de través, mostra na borda hum anel delgado, cujo centro, ou miolo he cheio de pontos espalhados, e quasi transparentes.

M ii

Pro-