

Tercera Parte

Medicamentos Galénicos.

ACEITE DE SUB-ACETATO CÚPRICO

Oleum sub-acetatis cúprici.

BÁLSAMO VERDE.—*Balsamum viridis.*

Aceite de olivas	650	gramos
Trementina de pino . . .	110	"
Cardenillo en polvo fino .	20	"
Esencia de clavo	6	"

Disuélvase la trementina en el aceite á fuego lento; pásese por un lienzo; y después de frío, añádase el cardenillo, y por último el aceite de clavo. Agítese al suministrarle.

ACCION TERAPÉUTICA.—Detersiva y escitante.

ACEITE ALCANFORADO

Oleum camphoratum

LINIMENTO ALCANFORADO

Alcanfor	100	gramos
Aceite de olivas . . .	900	"

Pulverícese el alcanfor con unas gotas de alcohol, disuélvase por trituration en un mortero en el aceite y fíltrese.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica y resolutive; obra especialmente en las disurias ocasionadas por las cantáridas.

Uso externo.—En fricción.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

Oleum amygdalarum dulcium

Tómense almendras dulces bien secas y no rancias; fróntense con un lienzo áspero, para separar el polvillo que las cubre; pulverícense en mortero de piedra; envuélvase el polvo resultante en un lienzo; sométase á la acción de la prensa. y fíltrese el producto después de algunos días de reposo

Debe ser trasparente de color amarillo claro, siu olor ni sabor marcado. No ha de tomar coloración con el ácido nítrico de 35,° y con los vapores nitrosos se ha de solidificar completamente, sin coloración.

Acción terapéutica.—Emoliente y laxante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

Uso externo.—En fricción.

ACEITE DE ALTEA

Oleum althææ

Raíz de altea reciente.... 1,000 gramos

Aceite de olivas..... 2,500 “

Contúndase la raíz en un mortero de mármol, y póngase con el aceite á un calor moderado hasta la evaporación de toda la humedad; pásese el aceite por un lienzo, con expresión y fíltrese por papel.

Acción terapéutica.—Emoliente.

Uso externo.—En fricción.



ACEITE DE BELEÑO

Oleum hyoscyami.

Hojas frescas de beleño 500 gramos

Aceite de olivas. 1000 “

Contúndase las hojas en un mortero grande de mármol y expongase con el aceite á un fuego suave, hasta que se haya evaporado toda la humedad; pásese el aceite por un lienzo, con expresión, y fíltrese por papel.

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante.

Uso EXTERNO.—En fricción

ACEITE DE BELLADONA

Oleum Belladonnæ

Prepárese con hojas frescas de belladona como el aceite de beleño

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante,

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE CACAO

Oleum ex cacao

MANTECA DE CACAO.—*Bútyrum ex cacao*

Tómese cacao tostado y mondado; redúzcase á pasta, por contusión en un mortero caliente de mármol; póngase al calor del baño de maría; añádase una cantidad de agua hirviendo, igual á la décima parte del peso del cacao; envuélvase con prontitud en un lienzo y sométase á la acción graduada de la prensa entre dos planchas de hierro, calentadas previamente con agua hirviendo. El producto solidificado expóngase al aire sobre papel sin cola, para disipar la humedad; líquese en baño de maría, y fíltrese por papel en un embudo de doble pared, que contenga agua hirviendo. Vuélvase á licuar, y distribúyase en moldes de papel, hoja de lata ó porcelana.

Acción TERAPÉUTICA.—Emoliente.

Dosis.—De 4 á 8 gramos (1 á 2 dracmas).

Uso EXTERNO.—En linimento, pomada y supositorios.

ACEITE DE CALABAZA

Oleum cucurbitæ

ACEITE DE ZAPALLO.—*Bálsamo pleurítico*

Corteza del fruto verde de calabaza. 1.000 gramos.

Aceite de olivas. 1.000 “

Pístese la corteza en un mortero de mármol; mézclese con el aceite; caliéntese á un calor suave hasta evaporar toda la humedad; pásese el aceite por un lienzo con expresión; y clarifíquese por reposo, ó fíltrese por papel.

Acción TERAPÉUTICA.—Emoliente.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE CANTÁRIDAS

Oleum cantháridis

Cantáridas en polvo grueso . 100 gramos.

Aceite de olivas. 1000 “

Digiérase el polvo de cantáridas con el aceite, al baño de maría, en una vasija cerrada; por espacio de seis horas; teniendo cuidado de agitar la vasija de tiempo en tiempo; pásese con expresión y fíltrese.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE CICUTA

Oleum cicutæ

Prepárese con la yerba fresca de cicuta como el aceite de beleño.

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante y resolutive.

Uso EXTERNO.—En fricción.



ACEITE DE ESTRAMONIO

Oleum Stramonii

ACEITE DE CHAMICO

Prepárese con las hojas frescas de estramonio como el aceite de beleño

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante.

USO EXTERNO.—En fricción

ACEITE DE ESTRAMONIO COMPUESTO

Oleum Stramonii compositum

BÁLSAMO TRANQUILO.—*Balsamum tranquilans*

Hojas frescas de estramonio	200	gramos
" " " tabaco	200	"
" " " beleño	200	"
" " " solano negro	200	"
" " " belladona	200	"
" " " adormidera	200	"
Aceite de olivas	5,000	"
Aceite volátil de romero	5	decigramos
" " " salvia	5	"
" " " ajenjo	5	"
" " " hissopo	5	"
" " " tomillo	5	"
" " " mejorana	5	"
" " " hipericon	5	"
" " " ruda	5	"
" " " espliego	5	"
" " " menta	5	"

Contúndanse las hojas, y cuézanse con el aceite hasta evaporar completamente la humedad; pásese el producto por un lienzo, con

con fuerte expresión; clarifíquese por reposo; agréguense los aceites volátiles y fíltrese.

Accion terapéutica.—Calmante.

Uso externo.—En fricción.

ACEITE DE EUFORBIO

Oleum euphorbii

Polvo de euforbio 60 gramos

Aceite de olivas. 700 “

Disuélvase á un calor suave el polvo en el aceite y fíltrese.

Accion terapéutica.—Irritante.

Uso externo.—En fricción.

ACEITE FOSFORADO

Oleum phosphoratum

Fósforo blanco. 1 gramo

Aceite de almendras dulces decolorado. . . 95 “

Eter sulfúrico. 4 “

Póngase el aceite en un matraz de capacidad suficiente para quedar casi lleno; añádase el fósforo; tápese el matraz y póngase en un baño de agua hirviendo, agitándole de cuando en cuando; durante la operación, téngase cuidado de destapar el matraz con alguna frecuencia, volviendo á taparlo inmediatamente.

Cuando se disuélva el fósforo por completo; déjese enfriar, agréguense el éter y guárdese en frascos bien tapados.

Acción terapéutica.—Estimulante.

Uso externo.—En fricción.

Para uso interno conviene prepararlo al milésime en la forma siguiente:

Aceite fosforado 10 gramos

Aceite de almendras dulces decolorado. . . 90 “



ACEITE DE GRANO TIGLIO

Oleum ex grano tiglio

ACEITE DE CROTON TIGLIO.—*Oleum crotonis tiglii*

Pulverícense los granos tiglios en mortero de mármol; envuélvase el polvo resultante en una tela de hilo; exprímase, por medio de la prensa entre dos planchas de hierro calentadas, por inmersión en agua hirviendo; y fíltrese el aceite después de clarificado por reposo.

Debe procederse con precaucion, para evitar los efectos de la acritud de la semilla, y de su aceite.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante drástica.

DÓsis.—De 5 á 15 centigramos (1 á 3 granos).

Uso EXTERNO.—En fricción, como revulsivo; hasta que se produzca eritema y vesiculitas parecidas á las del eczema.

ACEITE DE HIPERICON

Oleum hyperici

Sumidades floridas de hipericon . . . 30 gramos.

Aceite de olivas 230 “

Digiéranse en baño de maría, por dos horas, en vasija tapada; pásese el aceite por un lienzo, con expresión y fíltrese.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE IODADO

Oleum iodatum

Iodo puro 2 gramos.

Aceite de almendras dulces . . . 500 “

Mézclese el iodo con una pequeña parte del aceite, en un mortero de vidrio, y tritúrese en él; añádase hasta la mitad del aceite; viértase la mezcla en un matraz de vidrio, y con lo restante del

mismo aceite, sepárese toda la porción del iodo que quede adherido al mortero, añadiéndolo al matraz; caliéntese la mezcla por espacio de media hora en baño de maría; déjese enfriar y fíltrese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE IODOFORMO

Oleum iodoformi

Iodoformo. 5 gramos.

Aceite de almendras dulces . 995 “

Esencia de almendras amargas. 25 centigramos.

Disuélvase en frío, el iodoformo en el aceite, en un matraz de vidrio, agréguese la esencia y fíltrese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anestésica, antiséptica y cicatrizante.

Uso EXTERNO.—En fricción y aplicación.

ACEITE DE LAUREL

Oleum é fructu lauri

Redúzcase á polvo las bayas de laurel recientes y secas; expóngase á la acción del vapor, durante el tiempo necesario para que éste penetre bien; envuélvase en una tela. y antes que se enfrie, del calor comunicado por el vapor; sométase á la presión entre dos planchas de hierro calentadas, por inmersión en agua hirviendo. Déjese en reposo el aceite, manteniéndolo líquido con la ayuda de un suave calor; decántese y fíltrese en caliente; y consérvase en frascos bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y nervina.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE LINO

Oleum séminis lini

Pulverícese la simiente de lino, y procédase en lo demás como para el aceite de almendras dulces.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente.

USO EXTERNO.—En fricción é inyección.

ACEITE DE LIRIO

Olium iridis

Rizoma de lirio comun, reciente y contundido	520	gsamos.
Flores de lirio	180	"
Aceite de olivas	1.050	"

Téngase el rizoma en digestión durante veinticuatro horas, y caliéntese á fuego lento hasta consumir casi toda la humedad; cuélese con expresión; infúndanse las flores, y déjese durante doce horas; cuézase hasta evaporar toda la humedad; cuélese y clarifíquese por reposo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

ACEITE DE MANZANILLA

Oleum chamomillæ

Flores secas de manzanilla	100	gramos
Aceite de manzanilla.	1000	"

Hágase digerir durante dos horas en un baño de maría, en vasija cerrada, agitando de tiempo en tiempo.

Pásese con expresión y filtre.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

USO EXTERNO.—En fricción.—

NOTA.—Prepárense del mismo modo los aceites de ajeno y alholvas.

ACEITE DE MANZANILLA ALCANFORADO

Oleum chamomillæ camphoratum

Alcanfor.	40	gramos.
Aceite de manzanilla.	400	"

Procédase como para la preparación del aceite alcanforado.

ACCION TERAPEUTICA.—Antiespasmódica y carminativa.

Uso EXTERNO.—En fricciones.

ACEITE DE NUECES

Oleum nucum juglandis

Prepárese con la semilla de nuez, como el aceite de almendras dulces.

ACCION TERAPEUTICA.—Astringente debil.

ACEITE DE NUEZ MOSCADA

Oleum nucis moschatæ

MANTECA DE NUEZ MOSCADA.—*Butyrum nucis moschatæ*

Redúzcase la nuez moscada á polvo, expóngase en este estado sobre un tamiz, á la acción del vapor de agua, hasta que la parte grasa del polvo, se haya liquidado por completo; exprímase rápidamente entre dos planchas de hierro estañado, calentadas por inmersión en agua hirviendo, y purifíquese filtrando por papel, á la temperatura del agua hirviendo.

ACCION TERAPEUTICA.—Escitante.

ACEITE DE RICINO

Oleum ricini

ACEITE DE CASTOR.—ACEITE DE PALMA CRISTI

Prepárese con la simiente de ricino mondada, como el aceite de almendras dulces.

Líquido espeso y viscoso, de color amarillo claro, trasparente, soluble en todas proporciones en alcohol anhidro, y en un peso igual al suyo de alcohol de 90°.

ACCION TERAPEUTICA.—Purgante minorativa.

Dosis.—De 15 á 50 gramos.

ACEITE DE ROSAS

Oleum rosarum

Prepárese con partes iguales de pétalos de rosas pálidas y de rosas rubras como el aceite de beleño.

Acción terapéutica.—Astringente débil. Se emplea en las grietas, y sirve para otros preparados.

ACEITE DE RUDA

Oleum rúthæ

Prepárese con la ruda como el aceite de hipericon.

Acción terapéutica.—Escitante y carminativa.

Uso externo.—En fricción.

ACEITE DE TARTAGOS

Oleum cataputiæ minoris

Contúndanse las semillas de tártago, y prepárese como el aceite de grano tiglio.

Acción terapéutica.—Purgante drástica.

Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos).

ACEITE DE TREMENTINA SULFURADO

Oleum trebinthinæ sulphuratum

Bálsamo de azufre trementinado.—*Balsamum sulphuris trebiuthinatum*

Esencia de trementina. . . 400 gramos

Azufre sublimado 100 “

Digiéranse en un matraz de vidrio y baño de arena, hasta que haya adquirido el aceite color rojo y consistencia de jarabe; déjese

enfriar, y después de clarificado por reposo, sáquese el líquido por decantación, y conservese en frascos bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, con especialidad de la piel y de las membranas mucosas.

DOSIS.—De 15 á 40 centigramos (3 á 8 granos).

USO EXTERNO.—En fricción.

ACEITE DE YEMAS DE HUEVO

Oleum ex vitellis ovrum

Tómense yemas de huevos frescos de gallina, separándolas bien de la albúmina; caliéntense en una cápsula de porcelana, en baño de maría, removiéndolas suavemente con una espátula, hasta que exprimiendo la materia entre los dedos, exhude fácilmente el aceite; envuélvase la masa caliente en un lienzo; exprímase con prontitud entre dos planchas de hierro calientes, y fíltrese el aceite antes que se enfríe.

Espeso, opaco, de color amarillo y sabor dulce.

Se enrancia fácilmente y debe conservarse en frascos pequeños bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente.

USO EXTERNO.—En las grietas y escoriaciones.

NOTA RELATIVA A LA PREPARACION DE LOS ACEITES

Interviniendo en la preparación de los aceites, algunas sustancias frescas no indígenas; sustitúyanse por secas, previa maceración de veinticuatro horas, con la cantidad de agua hirviendo, que corresponda al tanto por ciento de pérdida, en su desecación; según la *Tabla de mermas que experimentan las sustancias en su desecación* que va descrita en otro lugar de esta obra

ACIDO ACÉTICO DILUIDO

Acidum acéticum dilutum

Acido acético.	. . .	100	gramos.
Agua destilada.	. . .	900	"

Viértase el ácido por porciones sobre el agua, y agítese con una varilla de vidrio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, astringente y atemperante.

DOsis.—De 1 á 4 gramos con agua.

ACIDO CLORHIDRICO DILUIDO

Acidum chlorhydricum dilutum

Prepárese del mismo modo que el ácido acético diluido, sustituyendo el ácido acético por el clorhídrico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y refrigerante.

Se usa generalmente para la preparación de la limonada.

ACIDO FOSFORICO DILUIDO

Acidum phosphoricum dilutum

Prepárese del mismo modo que el ácido acético diluido, sustituyendo el ácido acético, por el ácido fosfórico oficial.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y refrigerante.

DOsis.—De 5 á 15 decigramos (10 á 30 granos).


ACIDO LACTICO DILUIDO

Acidum lácticum dilutum

Prepárese del mismo modo que el ácido acético diluido, sustituyendo el ácido acético, por el ácido láctico oficial.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante.

DOsis.—De 1 á 5 gramos. (20 á 100 granos).



ACIDO NITRICO DILUIDO

Acidum nitricum dilutum

Prepárese del mismo modo que el ácido acético diluido, sustituyendo el ácido acético por el ácido nítrico oficial.

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente ó refrigerante.

Dosis.—De 5 á 15 decigramos (10 á 30 granos).

ACIDO SULFÚRICO ALCOHOLIZADO

Acidum sulphuricum alcoholisatum

ALCOHOL SULFÚRICO. AGUA DE RABEL. ESPÍRITU DE VITRIOLO DULCE

Acido sulfúrico puro de 66°. . . 100 gramos

Alcohol de 90°. 300 “

Mézclense por agitación, echando poco á poco el ácido sobre el alcohol. Consérvese el producto bien tapado.

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente y diurética.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

ACIDO SULFÚRICO DILUIDO

Acidum sulphuricum dilutum

Prepárese del mismo modo que el ácido acético diluido, sustituyendo el ácido acético por el ácido sulfúrico oficial,

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente ó refrigerante.

Dosis.—De 2 á 15 decigramos (4 á 30 granos).

AGUA DE AJENJO

Agua absintii

Sumidades de ajejo. . . 300 gramos.

Agua. 5.000 “

Obténgase por destilación, 1500 gramos de producto.

Acción terapéutica.—Tónica:

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

AGUA ALBUMINOSA

Aqua albuminosa

Claras de huevos frescos. . . . dos.

Agua común 500 gramos

Agua de azahar. 6 “

Jarabe de corteza de cidra . 30 “

Bátanse las claras con una corta cantidad de agua: añádase el resto; cuélese, y agréguese el agua de azahar y el Jarabe.

Acción terapéutica.—Emoliente; de uso especial en las afecciones irritativas é inflamatorias del aparato digestivo.

Dosis.—De 90 á 150 gramos (3 á 5 onzas).

AGUA ALCANFORADA

Aqua camphorata

Alcanfor. 2 gramos

Agua destilada. . 1000 “

Redúzcase el alcanfor á polvo. por intermedio de unas gotas de alcohol; dilúyase en el agua; déjese en contacto por cuarenta y ocho horas, agitando de tiempo en tiempo, y fíltrese.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

AGUA DE ALCARABEA

Aqua carvi

Frutos de alcaravea. 200 gramos

Agua. 4000 “

Déjese en maceración por veinticuatro horas y destílense dos mil gramos de producto.

Acción terapéutica.—Carminativa.

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

AGUA DE ALMENDRAS AMARGAS

Aqua amigdalarum amararum

Almendras amargas. 1000 gramos

Pulverícense y exprímase el polvo en una prensa para extraer cuanto sea posible el aceite fijo. Pulverícese de nuevo el residuo de las almendras exprimidas; añádase bastante agua para formar una papilla líquida; téngase en maceración por doce horas en el baño de un alambique, construido, de modo que el vapor de agua producido en la cucúrbita, pueda ser conducido por medio de un tubo, hasta el fondo del baño donde está la papilla; y destílese por este sistema al vapor, hasta obtener mil gramos de producto. Póngase éste en un solo frasco; agítese bien; fíltrese por papel, y consérvase en frascos de vidrio negro, bien tapados y en sitio fresco.

Cada treinta gramos de esta agua, contiene algo más de 25 miligramos, de ácido cianhídrico anhidro, y un decígramo próximamente de esencia de almendra amarga.

ACCION TERAPÉUTICA.—Sedante, de uso peligroso: útil en las afecciones asmáticas.

Dosis.—De 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos), en mixtura.

AGUA DE ANIS

Aqua anisi

Anis 300 gramos

Agua. 3,000 “

Déjese en maceración por veinticuatro horas, y destílese 2,000 gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza), en mixtura.

AGUA DE AZAHAR

Aqua florum aurantiorum

Flor de azahar. 1500 gramos

Agua. 4000 “

Téngase en maceración por dos días, y destílense dos mil gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza), en mixtura.

AGUA DE BREA

Aqua pissæ

Brea 40 gramos

Agua comun 1,000 “

Téngase en maceración por diez días agitando la mezcla de cuando en cuando; déjese clarificar por reposo, fíltrese ó decántese.

ACCION TERAPÉUTICA.—Modificadora de las inflamaciones crónicas de las mucosas, y principalmente del aparato respiratorio.

Dosis.—De 60 á 180 gramos (2 á 6 onzas).

AGUA DE CANELA

Aqua cinamomii

AGUA DE CANELA LACTICINOSA Ó ESPIRITUOSA

Canela quebrantada 250 gramos

Agua 2,000 “

Alcohol de 90° 90 “

Ténganse en maceración por dos días, y destílense mil doscientos gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas) en mixtura

A G U A C A R B Ó N I C A

Aqua acidi carbonici

AGUA ACÍDULA. AGUA GASEOSA. *Aqua acidula. Aqua aërophora*

Póngase agua potable en un aparato de presión, y satúrese de gas ácido carbónico, extraído del mármol mediante el ácido clorhídrico.

Acción terapéutica.—Sedante de la inervación gástrica y refrigerante.

Dosis.—De 120 á 180 gramos. (4 á 6 onzas).

AGUA CARBONICA ALCALINA

Aqua acidi carbonici alcalini

AGUA LITONTRÍPTICA. — *Aqua lithontríptica*

Agua carbonica 1500 gramos

Bicarbonato potásico 25 “

Póngase el bicarbonato en una botella; añádase el agua; tápese inmediatamente; agítese y consérvase la botella tendida en un sitio fresco.

Acción terapéutica.—Alterante. Recomendada en la diatesis úrica

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

AGUA CARBONICA FERRUGINOSA

Aqua carbónica ferruginosa

Acido tartárico en polvo grueso. 4 gramos

Bicarbonato de sosa 3 “

Azucar en polvo 15 “

Tartrato férrico potásico en polvo. 1 “

Agua 750 “

Mézlense el ácido y el tartrato, añádase el azúcar, y después el bicarbonato. Colóquese el agua en una botella de vidrio fuerte; échense los polvos mezclados; tápese la botella rápidamente, sujetando bien el tapón, y agítese.

Acción terapéutica.—Reconstituyente y sedante de la inervación gástrica. Se recomienda en las dispepsias atónicas.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



AGUA CLOROFORMIZADA

Aqua clorofórmica

Cloroformo. 1 gramo

Agua. 200 “

Viértase el cloroformo sobre el agua en un frasco y agítese fuertemente, hasta que el líquido quede trasparente.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica, anodina.

Dosis.—De 15 á 60 gramos ($1/2$ á 2 onzas).

AGUA DE COLONIA

VEASE *alcohol de cidra compuesto*.

ALCOHOL DE CORTEZA DE CIDRA

Aqua corticis citrei

Corteza exterior fresca de cidra. 1000 gramos

Agua 2000 “

Alcohol de 90°. 110 “

Ténganse en maceración por dos días, y destílense mil gramos de producto.

Sirve para otros preparados.

AGUA DE CORTEZA DE LIMON

Aqua corticis limonis

Prepárese con la corteza de limon, fresca y exterior como el agua de corteza de cidra.

Sirve para otros preparados.



AGUA DE CORTEZA DE NARANJAS

Aqua corticis aurantiorum

Prepárese con la corteza exterior fresca de la naranja como el agua de corteza de cidra.

Sirve para otros preparados.

AGUA DESTILADA

Aqua distillata

Destílese agua común, lo más pura posible, en un alambique bien limpio, llenando únicamente las tres cuartas partes de la caldera; deséchense las primeras porciones de agua que destilen, hasta que los reactivos indiquen su pureza; recójanse las porciones siguientes, y suspéndase la destilación, cuando quede en la caldera próximamente una cuarta parte del agua empleada.

El agua destilada no debe alterar el papel de dalia. No ha de precipitar con el agua de cal, el nitrato de plata, nitrato de barita, oxalato amónico, sulfuro amónico y cloruro mercúrico, ni descolorar algunas gotas de solución diluida de Permanganato potásico. Evaporada en un vidrio de reloj, no debe dejar residuo.

AGUA DE EUCALIPTUS


Aqua eucalypti

Hojas secas y cortadas de eucaliptus . .	1000 gramos
Agua.	6000 “

Destílese hasta obtener cuatro mil gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica. Recomendada como antiperiódica.

DÓSIS.—De 15 á 60 gramos (1/2 á 2 onzas).



AGUA FAGEDÉNICA

Aqua fagedénica

Cloruro mercurico	1 gramo
Carbonato potásico.	4 “
Agua destilada.	345 “

Tritúrense las sales en un mortero de vidrio, y añádase poco á poco el agua.

No debe filtrarse. Extemporánea.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante y deterativa; usada especialmente en las úlceras sifilíticas.

AGUA FAGEÉNICA NEGRA

Aqua Fagedenica nigra

Calomelanos.	1 gramo
Agua de cal.	100 “

Introdúzcase el calomelanos en el frasco que contenga el agua de cal y agítese

Uso EXTERNO.—En aplicación á las úlceras.

AGUA FENICAA

Aqua phenicata

AGUA CARBÓLICA.—*Aqua carbólica.*

Acido fénico cristalizado.	3 gramos
Agua.	750 “

Disuélvase en un mortero de cristal.

Acción TERAPÉUTICA —Escitante, astringente, anti-pútrida parasitica.

Uso EXTERNO.— En loción, fomento y cura.

AGUA DE FLOR DE TILO

Aqua floris tiliae

Flor de tilo. 1.000 gramos

Agua. 6.000 “

Obténganse por destilación cuatro mil gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Dosis.—Se usa como escipiente: De 30 á 60 gramos.

AGUA DE GOULARD

Aqua Goulardensis

Sub-acetato de plomo líquido. 20 gramos

Alcohol vulnerario. 80 “

Agua comun. 900 “

Mézclese y agítese cuando se vaya á usar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y resolutive.

AGUA DE HINOJO

Aqua Fœniculi

Prepárese con el fruto de hinojo como el agua de anís.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

Dosis.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza), en mixtura.

AGUA DE HISOPO

Aqua hyssopi

Sumidades frescas de hisopo. 1.000 gramos

Agua. 4.000 “

Obténgase por destilación dos mil gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos ($\frac{1}{2}$ á 1 onza), en mixtura.

AGUA DE LAUREL CEREZO

Aqua lauro-cerasi

Hojas recientes de laurel cerezo. . . 1.000 gramos

Agua. 3.000 “

Córtense las hojas de laurel cerezo, introdúzcanse con el agua en la cucúrbita de un alambique, y obténganse por destilación mil gramos de producto.

Póngase éste en un solo frasco; agítese bien; fíltrese por papel y consérvese en frascos negros bien tapados, y en sitio fresco.

Cada 30 gramos de esta agua, contiene algo más de 25 miligramos de ácido cianhídrico anhidro, y un decígramo próximamente, de una esencia igual á la de almendra amarga.

Conviene siempre que se obtenga el agua de laurel cerezo, someterla al ensayo. Al efecto se prepara una solución titulada de sulfato de cobre, que contenga 23 gramos y 9 centigramos de esta sal cristalizada, en un volumen de mil centímetros cúbicos, (con agua destilada).

Tómese un vaso de precipitados; colóquese sobre una hoja de papel blanco; y viértase en él, cien centímetros cúbicos, del agua de laurel cerezo que se trate de ensayar; agréguesele unos diez centímetros cúbicos de amoniaco, y mediante una bureta dividida en décimos de centímetros cúbicos; añádase gradualmente y agitando, la disolución dosada, de sulfato de cobre, hasta que se produzca en el vaso de precipitados, una coloración azul-violácea, persistente.

Llegado este caso léase en la bureta el número de divisiones, que se hayan empleado, y éste será, el de miligramos de ácido cianhídrico contenidos en los cien gramos de agua laurel cerezo.

Calculándose en 50 miligramos de ácido cianhídrico, por 100 gramos de agua laurel cerezo, el agua medicinal; y observando que la que se obtiene por destilación de las hojas, dá una proporción mayor; en vista del ensayo, y por medio de un simple cálculo, se averigua la cantidad de agua destilada que hay que agregar al agua ensayada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante: útil en las afecciones asmáticas.

DÓSIS.—De 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos) en mixtura.

AGUA DE LECHUGA

Aqua lactucae

Tallos frescos de lechuga. . . 1.000 gramos
Agua 2.000 “

Contúndanse los tallos de lechuga; pónganse con el agua en la cucúrbita de un alambique, y destílese á fuego moderado, hasta obtener mil gramos de producto.

Acción terapéutica.—Calmante.

Dosis.—Se usa como escipiente, de 15 á 30 gramos.

AGUA DE LLANTEN

Aqua plantaginis

Prepárese con las hojas frescas de llanten, como el agua de lechuga.

Acción terapéutica.—Astringente.

Se usa como escipiente en colirios é inyecciones.

AGUA DE MANZANILLA

Aqua chamomillae

Prepárese con la flor seca de manzanilla, como el agua de flor de tilo.

Acción terapéutica.—Escitante antiespasmódica.

Dosis.—Se usa como escipiente, de 15 á 30 gramos.

AGUA DE MÁTICO

Aqua maticae

Prepárese con las hojas de Mático, como el agua de Eucaliptus.

Acción terapéutica.—Astringente y estimulante.

Dosis.—Se usa como escipiente.

AGUA DE MELISA

Aqua melissæ

Prepárese con las hojas y sumidades de melisa, como el agua de hisopo.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Dosis.—Se usa como escipiente, de 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

AGUA DE MENTA

Aqua menthæ

Prepárese con las hojas y sumidades frescas de menta, como el agua de hisopo.

Acción terapéutica.—Escitante y carminativa.

Dosis.—Se usa como escipiente. De 15 á 30 gramos.

AGUA MINERAL SULFUROSA ARTIFICIAL

Aqua mineralis sulphurosa artificialis

Sulfuro sódico cristalizado.	1 gramo
Carbonato sódico	1 “
Cloruro sódico	1 “
Agua hervida	5,750 “

Hágase la disolución, y póngase en botellas bien tapadas.

Acción terapéutica.—Escitante y diaforética.

Dosis.—De 115 á 230 gramos (4 á 8 onzas).

Uso externo.—En loción.

A G U A R E G I A

Aqua regia

Acido nítrico de 35°	10 gramos
Acido clorhídrico de 22°	30 “

MEZCLESE: Sirve para otros preparados.

AGUA DE ROSAS

Aqua rosarum

Pétalos recientes de rosa pálida . . 1000 gramos
Agua. 4000 “

Téngase en maceración por dos días, y destílense dos mil gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente débil.

Se usa como escipiente para colirio é inyección.

AGUA SALINA PURGANTE

AGUA DE SEDLITZ. — *Aqua Sedlitzensis*

Sulfato magnésico. 30 gramos
Bicarbonato de sosa cristalizado. 4 “
Acido tartárico cristalizado. . . 4 “
Agua 650 “

Disuélvase el sulfato y el bicarbonato en el agua; fíltrese la solución; introdúzcase en la botella; añádase el ácido triturado y tápese con un corcho, sujetándole fuertemente.

La proporción de sal purgante, puede variarse, pero siempre que no se determine dosis; se pone 30 gramos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

Dosis.—De 100 á 200 gramos.

AGUA DE SALVIA

Aqua salviae

Prepárese con las hojas y sumidades frescas de salvia, como el agua de hisopo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, difusiva.

Dosis.—Se usa como escipiente, de 15 á 30 gramos.

AGUA DE SAUCO

Aqua sambuci

Flor de sauco . . . 500 gramos.
Agua. 6.000 “

Obtégase por destilación dos mil quinientos gramos de producto.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis.—Se usa como escipiente, de 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

AGUA SEDATIVA DE RASPAIL

Aqua sedativa ex Raspail

Amoniaco de 22°. . . 170 gramos.
Alcohol alcanforado . . . 30 “
Cloruro sódico . . . 170 “
Agua comun. . . . 3.000 “

Disuélvase en frío la sal en el agua; añádase el alcohol alcanforado y el amoniaco, y agítese bien la mezcla.

El agua sedativa segun esta fórmula, es la de primer grado, para el segundo grado, se aumenta la cantidad de amoniaco á 240 gramos; y para el tercer grado á 300 gramos.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante, resolutive y antiespasmódica.


Uso EXTERNO.—En fomento.

AGUA DE TOMILLO

Aqua thimi

Prepárese con las sumidades frescas de tomillo, como el agua de hisopo.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiséptica.



AGUA DE VALERIANA

Aqua valerianæ

Prepárese con la raíz seca de valeriana, como el agua de flor de tilo.

ACCION TERAPEUTICA.—Escitante antiespasmódica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza), en mixtura.

AGUA VEJETO MINERAL

Aqua vejeto-mineralis

AGUA BLANCA.—*Aqua alba*

Sub acetato plúmbico líquido. 10 gramos.

Agua destilada. 800 “

Alcohol de 90°. 20 “

Mézlense.

ACCION TERAPÉUTICA.—Astringente y resolutive.

USO EXTERNO.—En formas variadas.

AGUA DE YEMAS DE ABETO

Aqua gemmarum abietis

Prepárese con las yemas de abeto contundidas, como el agua de flor de tilo.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante, béquica y diurética.

ALCOOL DE ANIS

Alcohol anisi

ESPÍRITU DE ANIS.—*Spiritus anisi*

Anis 85 gramos.

Alcohol de 90° 690 “

Destílense en baño de maría, hasta obtener 518 gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos en mixtura.

ALCOHOL DE ANIS AMONIAL

Alcohol anisatus ammoniacalis

LICOR ANISADO AMONIAL.—*Liquor anisatus ammoniacalis*

Esencia de anis.		10 gramos.
Alcohol de 90°.		240 “
Amoniaco líquido.		50 “

Mézclese la esencia de anis con el alcohol, y añádase el amoniaco.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante y carminativa.

DÓSIS.—De 5 decigramos á 1 gramo (10 á 20 granos).

ALCOHOL DE CANELA

Alcohol cinnamomi


ESPÍRITU DE CANELA.—*Spiritus cinnamomi*

Pulverícese gruesamente la canela; macérese con el alcohol durante cuatro dias, y destílese en baño de maría hasta que se obtengan 6.555 gramos de producto.

Canela de Ceylan.		1.035 gramos
Alcohol de 80°.		8.280 “

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

DÓSIS.—De 5 decigramos á 2 gramos (10 á 40 granos).



ALCOHOL DE CIDRA COMPUESTO

Alcohol citrei compositum

AGUA DE COLONIA.—*Aqua coloniae*

Esencia de bergamota. . .	85 gramos.
“ “ cidra. . .	85 “
“ “ limon. . .	85 “
“ “ romero . .	40 “
“ “ azahar. . .	40 “
“ “ espliego . .	40 “
“ “ canela. . .	20 “
Alcohol de 90° . . .	11.040 “
“ de melisa compuesto . .	1.380 “
“ “ romero. . . .	920 “

Disuélvanse las esencias en la mezcla de los alcoholes; y pasados ocho días, destílense en baño de maria 11,040 gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

USO EXTERNO.—En fricción.

ALCOHOL DE COCLEARIA

Alcohol Cochleariae

Hojas de coclearia. . .	500 gramos
Alcohol de 90°.	1.000 “

Déjense en maceración por veinticuatro horas, y destílense en baño de maria, mil gramos de líquido.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante. Recomendado especialmente en el escorbuto.

USO EXTERNO.—En colutorio y gargarismo, poniendo de 4 á 8 gramos de escipiente.



ALCOHOL DE COCLEARIA COMPUESTO

Alcohol Cochleariæ compositum

Hojas frescas de coclearia.	3.000 gramos
Raíces de rábano rusticano en rodajas	400 "
Alcohol de 80°.	3.500 "

Destílese en baño de maria hasta obtener tres mil gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante: utilizada especialmente como anti-escorbútica.

DÓsis.—De 2 á 4 gramos en mixtura.

ALCOHOL DE CORTEZA DE CIDRA

Alcohol corticis citrei

ESPIRITU DE CORTEZA DE CIDRA.—*Spiritus corticis citrei*

Corteza exterior de cidra.	500
Alcohol de 80°.	3.000

Déjese en maceración por dos días, y destílese en baño de maria hasta sequedad;

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

DOSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo, en mixtura.

ALCOHOL DE CORTEZA DE LIMÓN

Alcohol corticis limonis

ESPIRITU DE CORTEZA DE LIMÓN.—*Spiritus corticis limonis*

Prepárese con la corteza exterior del limón, como el alcohol de corteza de cidra.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

DÓsis.—De 6 decigramos á un gramo, en mixtura.

ALCOHOL DE CORTEZA DE NARANJA

Alcohol corticis aurántii

ESPIRITU DE CORTEZA DE NARANJA.—*Spiritus corticis aurántii*

Prepárese con la corteza exterior de la naranja como el alcohol de corteza de cidra.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo en mixtura.

ALCOHOL DE ENEBRO

Alcohol juniperi

Prepárese con los frutos de enebro como el alcohol de canela.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Uso EXTERNO.—En fricción.

ALCOHOL DE GARUS

Alcohol Gari

Aloes	5 gramos
Mirra	2 “
Clavo de especie	5 “
Nuez moscada	10 “
Canela de Ceylan	20 “
Azafran	5 “
Alcohol de 80°.	5.000 “

Macérense todas las sustancias con el alcohol, durante cuatro días; fíltrese el producto de la maceración; agréguesele un litro de agua, y destílese en baño de Maria para obtener cuatro mil quinientos gramos de producto.

Sirve para preparar el Elixir.

ALCOHOL DE MELISA

Alcohol melissæ

ESPIRITU DE MELISA.—*Spiritus melissæ*

Hojas de melisa recientes. 2.000 gramos

Alcohol de 60°. 4.000 “

Macérese por algunos días, y destílense dos mil gramos de producto.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo, en mixtura.

ALCOHOL DE MELISA COMPUESTO

Alcohol melissæ compositum

ESPÍRITU DE MELISA COMPUESTO.—AGUA CARMELITANA

Hojas frescas de melisa.	230	gramos
Corteza exterior fresca de limón.	60	"
" " " " naranja	60	"
Nuez moscada.	30	"
Cilantro.	30	"
Canela.	14	"
Alcohol de 60°.	1.380	"

Contúndanse las sustancias duras; córtense las otras en trozos pequeños; macérese todo en el alcohol por espacio de veinticuatro horas, y destílense en baño de maría 690 gramos de líquido.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante y antiespasmódica.

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo.

ALCOHOL DE MENTA PIPERITA

Alcohol menthæ piperitæ

ESPÍRITU DE MENTA PIPERITA.—*Spiritus menthæ piperitæ*

Prepárese con la yerba florida de menta piperita, como el alcohol de melisa.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos, en mixtura.

ALCOHOL DE MOSTAZA

Spiritus sinapis

Esencia de mostaza.	1	gramo
Alcohol de 90°.	50	"

Disuélvase la esencia en el alcohol, y consérvese en frascos bien tapados.

Acción TERAPÉUTICA.—Irritante.

Uso EXTERNO.—En fricciones.

ALCOHOL DE ROMERO

Alcohol rosmarini

ESPIRITU DE ROMERO—AGUA DE LA REINA DE HUNGRIA

Prepárese con las sumidades floridas recientes de romero, como el alcohol de melisa.

ACCION TERAPEUTICA.—Escitante

USO EXTERNO.—En fricción y como escipiente en otros compuestos.

ALCOHOL DE SALVIA VULNERARIO

Alcohol Salviæ vulnerarium

AGUA VULNERARIA ESPIRITUOSA.—*Aqua vulneraria spiritiosa*

Hojas frescas de ajeno.	100 gramos
“ “ “ angélica.	100 “
“ “ “ calaminta.	100 “
“ “ “ hinojo.	100 “
“ “ “ hisopo.	100 “
“ “ “ mejorana.	100 “
“ “ “ melisa.	100 “
“ “ “ menta.	100 “
“ “ “ orégano.	100 “
“ “ “ romero.	100 “
“ “ “ ruda.	100 “
“ “ “ salvia.	100 “
“ “ “ serpolet.	100 “
“ “ “ tomillo.	100 “
Sumidades floridas frescas de hipericon.	100 “
“ “ “ “ espliego.	100 “
Alcohol de 60°.	4.500 “

Dividanse y pónganse en digestión por espacio de seis días en alcohol; y procédase á la destilación para obtener tres mil gramos de producto.

ACCION TERAPEUTICA.—Escitante y astringente.

USO EXTERNO.—En las heridas y úlceras.

ALCOHOL DE TREMENTINA COMPUESTO

Alcohol terebinthinæ compositum

BÁLSAMO DE FIORAVENTI.—*Balsamum Fioraventi*

Galanga	45 gramos
Jengibre	45 "
Zedoaria	45 "
Canela	45 "
Clavo de especia.	45 "
Nuez moscada.	45 "
Fruto de laurel fresco.	115 "
Gálbano.	85 "
Mirra.	85 "
Resina elemi.	85 "
Tacamaca.	85 "
Succino pulverizado.	85 "
Estoraque líquido.	85 "
Trementina de pino.	460 "
Dictamo crético.	30 "
Alcohol de 80°.	2.760 "

Dividanse convenientemente todas las sustancias; macérense por seis días en alcohol; y destílese la mezcla en baño de maría, hasta obtener 2,070 gramos de producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

USO EXTERNO.—En fricción.

ALGODON COCAINIZADO

Clorhidrato de cocaína.	1 gramo
Agua destilada	} a 3 "
Algodón puro.	

Disuélvase el clorhidrato de cocaína en el agua, empápesse el algodón con la solución y séquese.



ALGODON MERCÚRICO

Ioduro mercúrico	8 gramos
Ioduro potásico	3 “
Glicerina	120 “
Agua destilada	800 “
Algodon puro	1500 “

Disuélvanse los ioduros en el agua y glicerina, empátese el algodón, deséquese y consérvese en paraje seco.

ALGODON SALICILADO

Acido salicílico en polvo . .	10 partes
Alcohol de 90°.	100 “
Glicerina	1 “
Algodon en rama	100 “

Disuélvase el ácido en el alcohol; añádase la glicerina, é impréguese el algodón en la solución resultante; exprímase; deséquese y y después de esponjado, consérvese para el uso en frascos bien tapados.

AZUCAR MERCURIAL

Saccharum mercuriale

AZUCAR VERMÍFUGO.—*Saccharum vermifugum*

Mercurio puro.	60 gramos
Azucar blanco en polvo. .	120 “

Mézclense en un mortero de piedra, con la suficiente cantidad de agua para reducirlos á una masa blanda, y tritúrese ésta, hasta que no se perciban á simple vista, glóbulos de mercurio; déjese secar al aire y pulverícese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vermicida.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

