

FUMIGACION DE OXÍGENO

Fumigium oxigeni

Clorato potásico puro y seco . . 100 gramos
Manganesa calcinada. 50 “

Mézclese el clorato potásico con la manganesa; póngase la mezcla en un matraz provisto de un tubo de Welther; adáptase un tubo de conducción de gases, que llegue á un frasco con solución diluida de sosa caustica, para que se lave el oxígeno, antes de que se desprenda en la habitación; y caliéntese hasta que deje de desprenderse gas.

La fórmula produce próximamente treinta litros de oxígeno.

Si el oxígeno se destina á inhalaciones, recójase en un gasómetro ó en sacos de cahuchú, y hágase pasar de éstos, por un frasco con agua, para que se lave nuevamente antes de aspirarle el enfermo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se ha recomendado como reconstituyente y antiséptico, y en ciertas enfermedades del pulmon y del corazón.

GARGARISMO ASTRINGENTE

Gargarisma astringens

Agua hirviendo 500 gramos
Sulfato de alúmina y potasa. 4 “
Miel rosada. 30 “

Disuélvase el alumbre en agua, y añádase la miel rosada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente.

GARGARISMO DE CLORATO POTASICO

Gargarisma chloratis potássici

Clorato potásico. 4 gramos
Agua destilada 500 “
Jarabe de moras. 30 “

Disuélvase el clorato en el agua, fíltrese y añádase el jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea en las estomatitis, y con especialidad en la pseudo-membranosa, ulcerosa y mercurial.

GARGARISMO EMOLIENTE

Gargarisma emolliens

Miel blanca 50 gramos
Cebada perlada. . . . 5 "
Agua C. S.

Hágase hervir la cebada, hasta que esté blanda en cantidad suficiente de agua, para obtener próximamente 250 gramos de decocción; pásese á través de una estameña, déjese reposar algunos instantes, decántese; agréguese la miel y complétese con agua para obtener 300 gramos de gargarismo.

GLICERINA FENICADA

Glycerina phœnicata

Acido fénico 1 gramo
Glicerina 100 "

Disuélvase.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y antiséptica.

GLICEROLADO DE ALMIDON

Glyceratum amyli

Almidón en polvo 10 gramos
Glicerina 150 "

Mézclese y caliéntese suavemente en cápsula de porcelana, agitando hasta que resulte una masa trasparente.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente.



GLICEROLADO DE BREA

Glyceratum picis liquidæ

Brea	10 gramos
Glicerolado de almidón	100 "

Mézclase exactamente.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y desecante. Usado en ciertas dermatosis.

GLICEROLADO DE EXTRACTO DE BELLADONA

Glyceratum extracti belladonæ

Extracto de belladona	10 gramos
Glicerolado de almidón	90 "

Reblandézcase el extracto con un poco de glicerina, y mézclase con cuidado al glicerolado de almidón.

Prepárense del mismo modo los glicerolados de extracto de cicuta y extracto de beleño.

GLICEROLADO DE IODURO POTÁSICO

Glyceratum ioduri potassici

Ioduro potásico	10 gramos
Agua destilada	10 "
Glicerolado de almidón	60 "

Disuélvase el ioduro potásico en el agua y mézclase al glicerolado de almidón.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva.

GLICEROLADO DE OPIO

Glyceratum opii

Extracto de ópio	2 gramos
Agua destilada	1 "
Glicerolado de almidón	30 "

Disuélvase el extracto en el agua y mézclese con el glicerolado
ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante.

GLICEROLADO DE ÓXIDO DE ZINC

Glyceratum oxydi zincici.

Oxido zincico. 10 gramos
Glicerolado de almidon . 100 “

Mézclese exactamente.

ACCION TERAPÉUTICA.—Emoliente y desecante.

GLICEROLADO DE SUBNITRATO DE BISMUTO

Glyceratum subnitratis bismuthici

Subnitrato de bismuto. . . 10 gramos
Glicerina. 100 “

Mézclese exactamente en un mortero.

ACCION TERAPÉUTICA.—Astringente y calmante.

GLICEROLADO DE TANINO

Glyceratum tannini.

Tanino en polvo 10 gramos
Glicerolado de almidón 100 “

Mézclese con cuidado.

ACCION TERAPÉUTICA.—Astringente.

GRASA DE CERDO

Axungia suilla

Tómese la grasa de cerdo en pella; quítense las membranas y partes carnosas adherentes; córtese; lávese con agua hasta que esta salga incolora; lícuese á un calor suave; manténgase á esta tempe-

ratura hasta que toda la humedad se haya evaporado; pásese por lienzo, y agítese de cuando en cuando durante el enfriamiento.

Sirve para otros preparados.

GRASA DE CERDO BALSÁMICA

Axungia suilla balsamica

MANTECA BENZOADA.—*Axungia benzoata*

Grasa de cerdo. 1,000 gramos

Benjui en polvo grosero 30 “

Mézclense las dos sustancias, y ténganse al calor del baño de maria por tres horas; pásese por lienzo, sin expresión; y agítese de cuando en cuando durante el enfriamiento.

Sirve para otros preparados.

GRASA DE MÉDULA DE VACA

Axungia medullæ vaccinae

Tómese médula de vaca; dividase, por contusión en un mortero de piedra con mano de madera; lávese con agua hasta que ésta salga incolora; líquese al calor del baño de maria; téngase á esta temperatura hasta la evaporación de la humedad; pásese por lienzo, y agítese de cuando en cuando durante el enfriamiento.

Sirve para otros preparados.

HARINAS RESOLUTIVAS

Farinae solventes

Harina de habas	} Partes iguales.
“ “ yeros	
“ “ cebada	
“ “ centeno	

Mézclense exactamente.

Sirve para la confección de la cataplasma.