

OXIMIEL ESCILÍTICO.

Oxymel Scilliticum

Prepárese con el vinagre de escila, como el oximiel de colchico.

Acción terapéutica.—Diurética y expectorante.

Dosis.—De 2 á 8 gramos, en pocion.

OXIMIEL SIMPLE

Oxymel simplex

MIEL DE VINAGRE.—*Mel aceti*

Prepárese con el vinagre blanco, como el oximiel de colchico.

Acción terapéutica.—Atemperante y astringente.

Dosis.—De 7 á 14 gramos en pocion.

Se úsa tambien en colutorio y gargarismo.

PAPEL ALQUITRANADO

Charta piscæa

EMPLASTO DEL POBRE HOMBRE

Colofonia.	300 gramos
Brea	200 "
Cera amarilla	100 "

Fúndanse las tres sustancias, y extiéndase la mezcla en capas delgadas, sobre hojas de papel, por medio del esparadrapero.

PAPEL ARSENICAL

Charta arsenicalis

Arseniato de sosa cristalizado . .	1 gramos
Agua destilada	20 "

Disuélvase la sal en el agua; hágase absorber, la solución por una hoja de papel de filtro, llamado de Berzelius; séquese y divídase en 20 partes iguales.

Contiene cada parte, cinco centigramos de arseniato sódico.

PAPEL EPISPÁSTICO

Charta epispástica

N.º 1

Grasa de cerdo	460 gramos
Cantáridas en polvo fino.	85 "
Cera blanca	260 "
Esperma de ballena	115 "
Tartrato antimónico potásico	30 "

N.º 2

Grasa de cerdo	460 gramos
Cantáridas en polvo fino.	100 "
Cera blanca	260 "
Esperma de ballena	115 "
Tartrato antimónico potásico	45 "

N.º 3

Grasa de cerdo	460 gramos
Cantáridas en polvo fino.	115 "
Cera blanca	260 "
Esperma de ballena	115 "
Tartrato antimónico potásico	60 "

Póngase la grasa de cerdo con las cantáridas al calor del baño de maria, por espacio de seis horas; filtrese despues por papel, colocado en un embudo de dobles paredes, que tenga agua caliente; añádanse la cera y esperma; expóngase la mezcla á un calor suave, hasta que estas sustancias se licuen; póngase despues el tartrato antimónico potásico, reducido á polvo fino; y déjese enfriar la masa agitando sin colar. Licuese de nuevo en una vasija de mucha superficie y poca altura; tómese tiras de papel sin cola, de seis centímetros de ancho; pásense horizontalmente sobre la masa licuada, de

modo que se impregnen bien por la superficie inferior; y déjese enfriar. Córtese, por fin, en porciones de nueve centímetros de largo, y colóquense en cajas numeradas de antemano, poniendo veinticinco papeles en cada una.

ACCION TERAPEÚTICA.—Irritante.

Usada para mantener la accion resulsiva de los vejigatorios.

PAPEL NITRADO

Charta nitrata

Tómese una solucion concentrada en frio de nitrato potásico; introdúzcanse en ella, hojas de papel blanco sin cola, y deséquense estendidas sobre una cuerda.

PAPEL SINÁPICO


Charta sinápica

Cahuchú en láminas	40	gramcs
Sulfuro de carbono	1,000	"
Polvo de mostaza, privado del aceite fijo, por presion	C. S.	"

Dividase el cahuchú en pedacitos pequeños por medio de unas tijeras; colóquese en un frasco de boca ancha con el sulfuro de carbono, y déjese bien tapado hasta que se disuelva. Extiéndase esta solucion con una brocha de pelo fino, sobre papel blanco y fuerte, y hágase caer por medio de un tamiz, el polvo de mostaza, de modo que resulte una capa igual. Pásese por encima un cilindro de madera, á fin de que se adhiera bien la mostaza y quede la superficie lisa. Déjese expuesto el papel al aire para que se seque, y córtese con unas tijeras en pedazos de tamaño apropiado.

Este papel se úsa humedeciéndole con agua templada, y aplicándole al sitio designado.

ACCION TERAPEÚTICA.—Revulsiva.



PASTA DE AZUFAIFAS

Pasta jujubarum

Azufaifas secas.	80 gramos
Goma arábica blanca	480 “
Azúcar blanco.	400 “
Agua de azahar	30 “

Hiérvanse las azufaifas por media hora en 350 gramos de agua; pásese el cocimiento por estameña, con expresión; hágase clarificar por reposo y decántese. Por separado disuélvase la goma en frío en 600 gramos de agua y cuélese la solución. Hágase un jarabe con el azúcar y el cocimiento de azufaifas, por ebullición y clarificación con albúmina; añádase la solución de goma y evapórese en baño de maría, hasta que tenga consistencia de extracto blando; mézclese el agua de azahar; póngase la vasija en baño de agua hirviendo; déjese en él por dos horas; sepárese la espuma de la pasta; viértase ésta en moldes de hoja de lata, frotados interiormente con aceite de almendras, y séquese en la estufa dentro de los mismos moldes.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Uso—En pastillas.

PASTA DE GOMA ARÁBIGA

Pasta gummi arábici

Goma arábica blanca en grano.	700 gramos
Azúcar puro	700 “
Agua de azahar	90 “
Claras de huevo diez	
Agua comun.	700 “

Póngase la goma en maceración con el agua común; agítese de cuando en cuando la mezcla para facilitar la solución, y pásese por una estameña mojada con agua caliente; échese en seguida el líquido en una vasija ancha; añádase el azúcar; y efectuada su solución, evapórese al calor del baño de maría hasta consistencia de miel espesa.

Bátanse por separado en otra vasija las claras de huevo con el agua de flor de azahar, hasta que queden convertidas en espuma; añádase poco á poco esta espuma á la pasta; agítese fuertemente, y sosténgase la evaporación, siempre en

baño de maria, hasta que una porción de la masa, extraída con la espátula y golpeada con el dorso de la mano, no se adhiera á ella; viértase entonces sobre pliegos de papel blanco; déjese al aire por dos días; sepárese el papel, humedeciéndole con una esponja mojada; dejese secar la nueva superficie de la pasta, y córtese en pedazos de la figura y tamaño que se deseen.

ACCION TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Uso.—En pastillas.

PASTA DE LIQUEN

Pasta lichenis

Líquen islándico	120 gramos
Goma arábica	600 "
Azúcar puro	480 "
Agua de azahar	30 "

Prívese al líquen de su principio amargo por medio de tres lociones con agua á 60° hágase despues, con el líquen lavado y cantidad suficiente de agua, decocción por una hora; cuélese; disuélvase la goma en esta decocción; pásese el líquido por estameña, con expresión suave del residuo; añádase el azúcar, y evapórese al baño de maria, agitando continuamente hasta la consistencia de miel espesa; añádase entonces el agua de azahar, y sosténgase la evaporación hasta que la masa adquiera consistencia fuerte, y no se adhiera al dorso de la mano. Viértase en seguida sobre una tabla de marmol ó sobre moldes de hoja de lata, cubiertos con una ligera capa de polvos de azúcar; déjese enfriar y córtese en pedazos de la forma y tamaño que se deseen.

ACCION TERAPÉUTICA.—Expectorante.

Usos.—En pastillas.

PASTA DE LIQUEN OPIADA

Pasta lichenis opiata

Líquen islándico	120 gramos
Goma arabiga	600 "
Azúcar	480 "
Agua de azahar	30 "
Extracto de ópio	1 "

Procédase como en la preparaci3n de la pasta de líquen, con la única modificaci3n de disolver el extracto de ópio en el agua de flor de azahar, ántes de añadirla á la masa.

Cada 30 gramos, contiene, 26 miligramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante.

Usos.—En pastillas.

PASTA DE MALVAVISCO

Pasta althææ

Goma arábica blanca en grano	700 gramos
Azúcar	700 "
Raíz de altea seca y cortada.	60 "
Agua de azahar.	90 "
Clara de huevos. . . . diez	

Póngase el malvavisco en maceración con 500 gramos de agua, y despues de doce horas, pásese el líquido por estameña. Disuélvase por separado la goma en frio, en 700 gramos de agua, y cuélese esta solución, tambien por estameña mojada con agua caliente. Reúnanse los dos líquidos; pónganse con el azúcar, al calor del baño de maria, en vasija ancha; y procédase en lo demás, como para la preparación de la pasta de goma arábica.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Usos.—En pastillas.

PASTA DE REGALIZ

Pasta glycyrrhizæ

Extracto de regaliz	20 gramos
Goma arábica	310 "
Azúcar puro.	200 "
Agua común	530 "

Disuélvase en el agua, el extracto de regaliz y la goma, al calor del baño de maria: pásese la solución por estameña añádase el azúcar, y evapórese, siempre en baño de maria, agitando continuamente hasta que la masa adquiriera consistencia de pasta fuerte.

Viértase sobre una tabla de marmol. ó sobre moldes de hoja de lata; déjese por algunos dias en la estufa, y córtese en pedazos de la forma y tamaño que se deseen.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Usos.—En pastilla.



PASTA PECTORAL BALSÁMICA

Pasta balsámica

Azufaifas	30	gramos
Malvisco.	15	"
Yedra terrestre	15	"
Flor de amapola	15	"
" " violeta	15	"
Goma arábica.	1,000	"
Azúcar	900	"
Tintura de bálsamo de tolú.	10	"
" " ipecacuana	20	"
Agua.	1,500	"

Macérense por 24 horas, las cinco primeras sustancias con el agua; cuélese con expresión, y fíltrese. Añádanse la goma y el azúcar; disuélvanse al calor del baño de maria, y evapórese hasta consistencia de pasta fuerte. Agréguese últimamente, las tinturas, viértase en moldes de hoja de lata, y córtese en pastillas cuadradas ó romboidales de 2 gramos de peso, próximamente.


Uso—Una pastilla cada dos horas.

PASTILLAS PARA EXAHUMAR

Tabellæ aromaticæ

Benjui en polvo	600	gramos
Estoraque liquido	100	"
Bálsamo del Perú	50	"
Esencia de geraneo	10	"
" " limon	5	"
" " bergamota.	5	"
" " almendra amarga	1	"

Mézclense todas las sustancias en un mortero, y dividase en bolitas de 1 gramo de peso próximamente, que se les dá la forma achatada, comprimiéndolas con la yema de los dedos; y envuélvanse en papeles de color, picados.



PILDORAS ANTE CIBUM

Pilulae ante-cibum

PILDORAS GOTOSAS. — PILDORAS ESTOMACALES

Acibar	10 gramos
Extracto de quina gris.	5 “
Canela en polvo	2 “
Jarabe simple.	c. s.

Háganse s. a. cien píldoras.

Acción terapéutica. — Tónica, digestiva y purgante.

Dosis. — Una ó dos antes de cada comida.

PILDORAS ANTI-DISENTERICAS (H. de C.)

Calomelanos	} @ 5 d. gm ^{os} .
Ipecacuana en polvo	
Extracto de ópio	1 d. gm ^{os} .
Agua	c. s.

Disuélvase el extracto en el agua; mézclense los polvos; hágase masa pilular y divídase en diez píldoras iguales.

Dosis. — La fórmula en las 24 horas.

PILDORAS BALSÁMICAS

Pilulae balsamicæ

Polvo de regaliz	22 gramos
Goma amoniaco	11 “
Acido benzóico	5 “
Azafran en polvo	1 “
Bálsamo peruviano líquido	1 “
Aceite de trementina sulfurado	c. s.

Háganse píldoras de á dos decigramos.

Acción terapéutica. — Expectorante y escitante de las mucosas.

Dosis. — De 2 á 8 por día.

PILDORAS DE ACIBAR

Pilulæ ex aloes

Acibar en polvo 4 gramos
Miel C. S.

Mézclese bien y háganse cuarenta píldoras.

Acción TERAPÉUTICA.—Estomacal y laxante.

Dosis.—Como estomacal, de 1 á 2 decigramos; como laxante, de 3 á 6 decigramos.

PILDORAS DE ACIBAR Y GOMA GUTA

Pilulæ ex aloes et gummi gutæ

PILDORAS DEL DR. ANDERSON

Aloes en polvo. 1 gramo
Goma gutta. 1 “
Esencia de anís. 2 gotas
Miel blanca C. S.

Hágase S. A. diez píldoras.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante.

Dosis.—De una á cuatro.

PILDORAS DE ACIBAR Y QUINA


Pilulæ ex aloes et quinquæ

Acibar en polvo. 4 gramos
Extracto de quina gris 4 “
Canela en polvo. 1 “
Jarabe simple. C. S.

Mézclese y hágase S. A. 80 píldoras iguales.

Acción TERAPÉUTICA.—Estomacal.

Dosis.—De 1 á 4 píldoras.



PILDORAS DE ACIBAR Y JABON

Pilulæ ex aloes et sapone

Aloes en polvo.	1 gramo
Jabon medicinal	1 “

Háganse diez pildoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓSIS.—De dos á ocho.

PILDORAS DE ACIDO ARSENIOSO

Pilulæ acidi arseniosi

Acido arsenioso en polvo fino.	1 decígramo
Goma arábica en polvo	1 gramo
Azúcar en polvo	2 “
Agua destilada	C. S.

Mézclese íntimamente la goma arábica, el azúcar y el ácido arsenioso; añádase el agua necesaria para obtener una masa de consistencia pilular, y háganse cien pildoras iguales.

Cada una contiene un milígramo de ácido arsenioso.

ACCION TERAPÉUTICA.—Alterante, febrifuga, y de uso especial en algunas dermatosis.

DÓSIS.—De una á dos pildoras.

PILDORAS DE BLAUD


Pilulæ ex Bland

Sulfato ferroso	15 gramos
Carbonato potásico.	15 “
Goma arábica	8 “

Tritúrense con prontitud las dos sales, en mortero de hierro ó de piedra, hasta que la mezcla adquiera consistencia de pasta blanda; añádase la goma, y háganse cien pildoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica-reconstituyente.

DÓSIS.—De una á cuatro pildoras.



PILDORAS DE CINOGLOSA

Pilulæ cynoglosi

Corteza de raíz de cinoglosa en polvo.	60 gramos
Extracto de ópio en polvo	12 "
Azafran en polvo	18 "
Castóreo en polvo	22 "
Azúcar en polvo.	7 "
Goma arábiga en polvo.	14 "

Mézclense exactamente, y consérvese el polvo compuesto resultante en frascos bien tapados. Cuando hayan de prepararse pildoras, hágase la masa con este polvo y cantidad suficiente de jarabe simple.

Cada gramo contiene 9 centigramos de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódica. Empleadas especialmente para calmar la tos.

DÓSIS.—De dos á cinco decigramos.

PÍLDORAS DE CLORURO MERCÚRICO

Pilulæ cloruri mercúrici

PILDORAS DE DUPUYTREN.—*Pilulæ ex Dupuytren*


Cloruro mercúrico	1 decigramo
Extracto de ópio	2 "
" " guayaco	4 "

Mézclense los extractos; añádase el cloruro, interponiéndole exactamente; y háganse veinte pildoras iguales.

Cada una contiene, cinco miligramos de cloruro mercúrico y un centigramo de extracto de ópio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antisifilítica.

DÓSIS.—Una pildora.



PILDORAS DE COLOQUINTIDA COMPUESTAS

Pilulæ colocynthis compositæ

PILDORAS DE LARTIGUE.—*Pilulæ ex Lartigue*

Extracto de colocuintida compuesto.	2	gramos
“ “ cólquico	2	“
“ “ ópío	0,10	“

Hágase S. A. píldoras de quince centigramos cada una.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. De uso especial contra la gota.

PILDORAS DE COPAIBA

Pilulæ copaibæ

Copaiba	60	gramos
Oxido magnésico	5	“
Polvos de altea	60	“

Mézelense el bálsamo de copaiba y la magnesia, por trituración en un mortero; déjese la mezcla por algunos días hasta que adquiera consistencia de trementina espesa; añádase entonces el polvo de altea, y hágase masa pilular.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante de las mucosas.

Dosis.—De 5 decigramos á 1 gramo, pudiendo aumentar en las blenorreas hasta 4 y aún 8 gramos.

PILDORAS DEL DR. CASTAÑO

N.º 1	{	Ioduro mercurioso	4 decigramos
		Iodoformo.	1 gramo
		Extracto de opio	2 decigramos
		Conserva de rosas	C. S.

Para diez píldoras.

N.º 2	{	Ioduro mercurioso	4 decigramos
		Extracto de opio. . . .	2 "
		Sulfato ferroso puro	4 "
		Iodoformo	1,50 gramos

Disuélvase el extracto con un poco de agua, pulverícese el sulfato ferroso, agréguese las demás sustancias; hágase masa pilular y divídase en diez píldoras.

PILDORAS DE EXTRACTO DE HELECHO MACHO

Pilulæ filicis

Extracto etéreo de helecho macho.	4 gramos
Goma arábica en polvo	1 "
Agua	1 "
Polvo de helecho macho	C. S.

Háganse 40 píldoras iguales.

ACCION TERAPEÚTICA.—Antihelmíntica. Empleadas especialmente contra la tenia.

DÓSIS.—Cinco píldoras, cuatro veces al día, con intervalo de un cuarto de hora.

PILDORAS DE FRANK

Pilulæ ex Frank


GRANOS SALUTÍFEROS DE FRANK

Acibar.	15 gramos
Jalapa.	15 "
Ruibarbo	4 "
Jarabe de ajénjos.	C. S.

Háganse píldoras de un decígramo.

ACCIÓN TERAPEÚTICA.—Purgante.

DÓSIS.—De una á cuatro.



PILDORAS DE IODURO FERROSO

Pilulæ ioduri ferrosi

PILDORAS DE BLANCARD.—*Pilulæ ex Blancard*

Iodo puro.	4 gramos
Limaduras de hierro puro	2 “
Agua destilada	6 “
Miel blanca	5 “
Polvo de regaliz.	} partes iguales. C. S. “
“ “ malvavisco	

Colóquese en un matraz de vidrio el agua y el hierro; añádase el iodo en porciones y agitando; déjese en contacto el tiempo suficiente, hasta que adquiriera el líquido color verde, agitándole á menudo; fíltrese, recogiendo el líquido en una cápsula, cuyo peso sea conocido, y en la cual se haya puesto la miel; lávese el matraz y el filtro con unas gotas de agua destilada, recogiendo también este líquido; evapórese la mezcla hasta que quede reducido á 10 gramos; y después de fría, añádase la cantidad necesaria del polvo de regaliz y malvavisco, para que la masa tenga consistencia pilular; háganse cien píldoras, que se cubrirán primero con hierro porfirizado, y después con un barniz preparado con resina, almáciga y bálsamo de tolú, disueltos en éter. Consérvense en frascos bien tapados.

ACCION TERAPÉUTICA.—Reconstituyente. De uso especial en la diátesis escrofulosa.

Dosis.—De una á dos píldoras.

PILDORAS DE IODURO MERCURIOSO

Pilulæ ioduri mercuriosi

Ioduro mercurioso	2 gramos
Extracto de opio.	0,50 “
Conserva de rosas	10,00 “
Polvo de regaliz.	C. S.

Mézclense el extracto y la conserva; añádase el ioduro y la cantidad necesaria de polvo de regaliz; y háganse cien píldoras.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antisifilítica.

Dosis.—De una á dos píldoras.

PILDORAS DE MEGLIN

Pilulæ ex Meglin

Extracto de beleño	1 gramo
“ “ valeriana	1 “
Óxido de zinc	1 “

Háganse pildoras de quince centigramos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica, calmante. De uso especial en las neuralgias faciales.

DÓSIS.—De una á dos.

PILDORAS DE MORISSON

Pilulæ ex Morisson

Acibar	1 gramo
Resina de jalapa	1 “
Extracto alcohólico de coloquintida	1 “
Goma guta	1 “
Ruibarbo	2 “
Mirra	2 “

Háganse cincuenta pildoras.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica.

DÓSIS.—De una á dos.

PILDORAS DE SEDILLOT

Unguento mercurial doble	3 gramos
Jabon medicinal	2 “
Regaliz en polvo	C. S. “

H. S. A. pildoras de á 20 centigramos.



PILDORAS DE SULFATO DE QUININA

Pilulæ sulphatis quininae

PILDORAS ANTITÍPICAS Ó ANTIPERIÓDICAS

Sulfato de quinina	1	gramo
Goma tragacanto en polvo	0,10	"
Jarabe simple	C. S.	"

Tritúrese el sulfato de quinina; mézclese con la goma y háganse diez píldoras con cantidad suficiente de jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antiperiódica y tónico-neurosténica segun la dosis

Dósis.—De una á 3 píldoras.

PILDORAS DE TREMENTINA

Pilulæ terebinthinæ

Trementina comun	5	gramos
Hidro-carbonato magnésico	7	"

Háganse S. A. cincuenta píldoras iguales.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante de las membranas mucosas. Se emplean en las flegmasías crónicas de las mismas, con aumento de secreción.

Dósis.—De tres á seis píldoras.

PILDORAS ESCILITICAS

Pilulæ scilíticæ

Jabon de sosa	8	gramos
Goma amoniaco en polvo	4	"
Polvo de escila	1	"
Bálsamo de copaiba	1	"

Hágase s. a. masa pilular.

Cada gramo de esta masa contiene, setenta y uno miligramos de escila.

ACCION TERAPEUTICA.—Expectorante, resolutive y diurética.

DÓSIS.—De dos á seis decigramos.

PILDORAS FERRUGINOSAS DE VALLET

Pilulæ ferruginosæ ex Vallet

Sulfato ferroso cristalizado	75 gramos
Carbonato sódico	90 “
Miel blanca	45 “
Agua azucarada al 7 p‰	c. s.

Disuélvase separadamente el sulfato ferroso y el carbonato sódico, en el cuádruplo de su peso del agua azucarada hirviendo; mézclense las dos soluciones salinas calientes, en una vasija que pueda taparse bien; acábese de llenar ésta, con agua hirviendo, y tápese de modo que el aire no tenga acceso.

Cuando el carbonato ferroso se haya precipitado bien, decántese el líquido claro; reemplácese prontamente con nueva cantidad de agua azucarada hirviendo; y cuando el precipitado se haya reunido de nuevo en el fondo, decántese otra vez el líquido claro.

Trasládese entonces el carbonato ferroso precipitado á un lienzo tupido é impregnado de jarabe simple, y exprímase fuertemente; mézclese la miel y evapórese la mezcla en baño de maria hasta consistencia pilular. Consérvese el producto en frascos bien tapados, para hacer extemporáneamente píldoras de 15 centigramos.

ACCION TERAPEUTICA.—Tónica-reconstituyente. De uso especial en las clorosis.

DÓSIS.—De dos á cuatro píldoras.

PILDORAS MERCURIALES SIMPLES

Pilulæ hydrargyri

PILDORAS AZULES Ó DE MASA PILULAR AZÚL

Mercurio purificado	10 gramos
Conserva de rosas	15 “
Polvo de regaliz	5 “

Tritúrese el mercurio con la conserva de rosas en un mortero de mármol, hasta la completa extinción del metal, añádase los polvos de regaliz

y divídase la masa en 200 píldoras. Cada una contiene cinco centigramos de mercurio.

Acción terapéutica.—Son muy usadas por los ingleses como colagogas

Dosis.—De dos á cinco.

POCIÓN AMONIACAL

Potio ammoniacalis

Amoniaco líquido . . .	1 gramo
Jarabe simple . . .	20 "
Agua	100 "

Mézclese el amoniaco con el agua y añádase el jarabe.

Acción terapéutica.—Estimulante y diaforética. Recomendada contra la embriaguez.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCIÓN ANTIDIARREICA (H. DE N.)

Subnitrato de bismuto	4 gramos
Agua de cal . . .	{ @ 60 "
" comun . . .	
Jarabe simple . . .	30 "

Mézclese S. A.

Dosis.—Por cucharadas.

POCIÓN ANTIESPASMÓDICA

Potio antispasmodica

MISTURA ANTIESPASMÓDICA.—*Mistura antispasmodica.*

Agua de azahar	80 gramos
" " melisa	80 "
Jarabe de corteza de cidra.	40 "
Eter sulfúrico alcoholizado .	2 "

Mézclense.

Acción terapéutica.—Escitante-antiespasmódica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCION ANTIESPASMÓDICA CON LAUDANO

Potio antispasmódica cum Laudano

MISTURA ANTIESPASMODICA LAUDANIZADA.—*Mistura antispasmódica laudanizata*

Agua de azahar	60 gramos
“ “ melisa	60 “
Jarabe simple.	30 “
Laudano de Sydenham . .	2 “
Eter sulfúrico alcoholizado .	1 “

Mézlense.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica-calmante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCION CONTRA LA CISTITIS

Emulsión alcanforada . .	125 gramos
Benzoato de sosa . . .	4 “
Jarabe de tolú	20 “

Disuélvase y mézclese.

DÓSIS.—Por cucharadas.

POCION CONTRA LA INFLUENZA

Infusión de tilo	120 gramos
Antipirina	2 “
Jarabe de azahar . . .	30 “
Tintura de aconito . .	doce gotas

Disuélvase y mézclese.

POMADA CONTRA LAS ÚLCERAS SIFILITICAS

Salicilato de mercurio . .	1 gramo
Lanolina	30 “

Mézclese S. A.

POCION CORDIAL

Pocio cardiaca

Vino seco	110	gramos
Tintura de canela	10	"
Jarabe de corteza de naranja amarga	40	"

Mézclese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante aromática.

DÓ SIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCION DE ACEITE DE BACALAO CON HIERRO

Potio olei hepatis morrhuae ferruginosum

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGINOSO

Percloruro de hierro.	1	gramo
Aceite de bacalao puro (amarillo).	200	"
Acido láctico concentrado	2	"

Pulverícese el percloruro en un mortero de porcelana; viértase encima el aceite para interponer ambos cuerpos de una manera perfecta; añádase luego el ácido láctico, y fíltrese el producto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-reconstituyente.

DÓ SIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCION DE ACEITE DE BACALAO CON PANCREATINA

Potio olei hepatis morrhuae cum pancreatina

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CON PANCREATINA

Pancreatina azucarada	30	gramos
Agua comun	120	"
Azúcar blanco en polvo	220	"
Aceite de hígado de bacalao (amarillo)	700	"
Esencia de anís	2	"
" " almendra amarga	0,10	"
Goma tragacanto	5,00	"

Hágase un mucilago con la goma, el azúcar y el agua, y emulsióñese poco á poco, agitando sin cesar, la pancreatina, el aceite de bacalao y las esencias.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se úsa para combatir afecciones del pulmón, linfatismo, úlceras, caries de los huesos, erupciones, enflaquecimiento y languidez.

DÓSIS.—De cuatro á seis cucharaditas durante el día para los adultos, y de dos á cuatro para los niños.

POCION DE CITRATO MAGNÉSICO

Potio citratis magnésici

LIMONADA DE CITRATO DE MAGNÉSIA PURGANTE

Acido cítrico en polvo.	30 gramos
Subcarbonato magnésico.	20 "
Agua	200 "
Jarabe de corteza de cidra	50 "

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el subcarbonato; y terminada la reacción fíltrese el líquido sobre el jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓSIS.—La fórmula en dos veces.

POCION DE METILOL

Agua de azahar	75 gramos
Metilol	2 "
Jarabe Simple	25 "

Mézclese exactamente.

POCION DE TOOD

Potio ex Tood

Ron de Jamaica	80 gramos
Tintura de canela	60 "
Agua destilada.	150 "
Jarabe simple.	10 "

Mézclense las tres primeras sustancias y fíltrese el líquido sobre el jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.
Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

POCION EMULSIVA DE STOOCH

LINIMENTO STOOCH.—*Linimentum stooch*

Yemas de huevo.	doce
Esencia de trementina.	1,000 gramos
Acido acético.	250 “
Agua.	1,750 “

Mézclese las yemas con la esencia de trementina, en un mortero; póngase la mezcla en un frasco de suficiente capacidad, y agréguese por porciones, el ácido acético diluido en el agua, agitando sin cesar hasta que la emulsión quede estable y homogenea.

Uso EXTERNO.—En fricciones.

POCION ESTIBIO-OPIADA

Potio stibio-opiata

Tartrato antimónico potásico	4 decigramos
Agua de azahar	180 gramos
Jarabe de meconio	15 “
“ simple	15 “

Disuélvase el tartrato en el agua de azahar y añádase los jarabes.

ACCION TERAPÉUTICA.—Resolutiva.—De uso especial en ciertas pneumonias.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

POCION GASIFERA DE RIVERIO

Potio gasífera

POCIÓN Ó MISTURA ANTIEMÉTICA.—*Potio vel mistura antiemética*

Bicarbonato de potasa	2 gramos
Agua comun.	50 “
Jarabe simple	15 “

Disuélvase el bicarbonato en el agua; filtrese sobre el jarabe, y colóquese en un frasco señalado con el N^o. 1.

Acido cítrico	2 gramos
Agua comun.	50 "
Jarabe de corteza de cidra	15 "

Disuélvase el ácido cítrico en el agua; filtrese sobre el jarabe de corteza de cidra, y colóquese en un frasco señalado con el N^o. 2.

Para administrar este medicamento, échese una cucharada del contenido de cada frasco en un vaso; agítese y tómese en el momento de presentarse la efervescencia.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antiemética.

DÓsis.—La señalada en la fórmula.

POCION GOMOSA

Potio gummosa

Goma arábica en polvo	10 gramos
Agua comun.	100 "
" de azahar.	10 "
Jarabe simple	50 "

Disuélvase la goma en el agua comun, en mortero de vidrio ó porcelana y añádanse el jarabe y agua de azahar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente.

DÓsis.—A cucharadas.

POCION IODURADA


Potio iodurata

Agua destilada	350 gramos
Ioduro potásico	10 "
Jarabe simple	50 "

Disuélvase el ioduro en el agua y añádase el jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y antisifilítica.

DÓsis.—De 15 á 60 gramos (1/2 á 2 onzas.)



POCION PECTORAL

Potio pectoralis

Infusion de flores cordiales.	120 gramos
Jarabe simple.	30 "

Mézclese.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 60 gramos (1/2 á 2 onzas).

POCION SEDANTE

Potio sedans

Cloruro mórfico.	5 centigramos
Nitrato potásico.	4 gramos
Agua destilada.	350 "
Jarabe de digital.	30 "

Disuélvanse las dos sales en el agua y añádase el jarabe.

Acción TERAPÉUTICA.—Sedante. De uso conveniente en las afecciones febriles de tipo continuo.

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

POCION TÓNICA DE JACOUD

Potio ex Jacoud

Vino francés.	30 gramos
" seco.	30 "
Acetato amónico	4 "
Tintura de canela.	3 "
Extracto fluido de quina gris.	6 "
Coñac	15 "
Jarabe de corteza de naranjas	15 "

Mézclense el acetato amónico, la tintura de canela, y el extracto fluido con los vinos; agréguese el coñac y fíltrese sobre el jarabe.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos. (1/2 á 1 onza).

POCION SIMPLE

Potio simplex

Jarabe simple. .	30	gramos
Agua de azahar. .	20	"
" comun . .	100	"

Mézclese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓSIS.—De 15 á 60 gramos. (1/2 á 2 onzas).

POLVO ASTRINGENTE

Pulvis astringens

Alumbre calcinado en polvo. .	10	gramos
Polvo de quina de Loja. . .	10	"
" " rosas rojas. . . .	10	"

Mézclese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y tónica.

Se úsa en heridas y úlceras fungosas y atónicas.


POLVO DE ACIBAR

Pulvis aloes

Divídase el acibar en pedazos, por contusión; séquese en la estufa; pulverícese por trituration en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamíz fino, sin dejar más residuo que el formado por los cuerpos extraños.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal y purgante.

DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos, como estomacal, y de 3 á 6 decigramos como purgante.



POLVO DE ALCANFOR

Pulvis camphoræ

Póngase el alcanfor en un mortero de porcelana; añádase alcohol rectificado; poco á poco y en cantidad suficiente; y tritúrese hasta que resulte un polvo igual y suave al tacto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓsis.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos.)

POLVO DE ANÍS

Pulvis anisi

Séquese el fruto de anís verde, en una estufa á la temperatura de 25°, pulverícese en mortero y pásese el polvo, por tamiz de cerda nº. 1.

Prepárese del mismo modo los polvos del fruto de *hinojo*, *alcaravea*, *cebadilla* y *sabina*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

POLVO DE ASAFETIDA

Pulvis assafetide

Prepárese en mortero de bronce ó de hierro por trituración suave, eligiendo para la operación un tiempo seco y frio; pásese por un tamiz entrefino, desechando el residuo formado por las impurezas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓsis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos.)

Se úsa tambien en enemas diluido convenientemente.

POLVO DE AZAFRAN

Pulvis croci

Prepárese como el de Santónico, dejando cuatro por ciento de residuo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, antiespasmódica y emenagoga.

DÓsis.—De 6 decigramos á 1 gramo.

POLVOS DE BELLADONA

Pulvis belladonæ

Deséquense las hojas de belladona en estufa; pulverícense por contusión en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de residuo la cuarta parte.

Acción terapéutica.—Anodina, antiespasmódica y sedante de la inervación motriz.

Dosis.—De 2 á 5 centigramos ($1/2$ á 1 grano.)

POLVO DE CANTÁRIDAS

Pulvis cantháridum

Expónganse las cantáridas al sol ó en estufa, por el tiempo puramente necesario para su desecación; pulverícense acto continuo, por contusión en mortero de hierro ó de bronce, y pásese el polvo por un tamiz entrefino sin dejar residuo.

El operador debe cubrir con gran cuidado el mortero y el tamiz para preservarse de este polvo.

Sirve para preparar emplastos vexicantes.


POLVOS DE CASTOREO

Pulvis castórei

Divídanse los castóreos en pedazos; séquense al aire; sepárese la membrana exterior y las interiores cuya eliminación sea posible; pulverícese el resto en mortero metálico, por trituration; y pásese el polvo por un tamiz entrefino, desechando el residuo que esté constituido tan solo por partes membranosas.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos).



POLVO DE CATECÚ

Pulvis catechu

Prepárese como el de acibar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente.

DÓ SIS.—De 6 decigramos á 1 gramo.

POLVO DE COLOQUINTIDA

Pulvis colocynthidis

Extraiganse las semillas de las coloquintidas; deséquese la parte carnosa en la estufa; pulverícese por contusión en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamíz fino sin dejar residuo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica.

DÓ SIS.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos).

POLVO DE CORNEZUELO DE CENTENO

Pulvis secalis cornuti

Deséquese el cornezuelo de centeno en una estufa; pulverícese por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamíz entrefino, dejando de residuo el seis por ciento.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante de la inervación motriz, y con especialidad del útero.

DÓ SIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

POLVO DE CUBEBA

Pulvis cubebae

Prepárese del mismo modo que el de cornezuelo de centeno.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante. De uso especial en las blenorreas.

DÓ SIS.—De 2 á 4 gramos.

POLVO DE DIGITAL

Pulvis digitalis

Prepárese del mismo modo que los polvos de belladona.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Regularizadora de la inervación cardíaca y diurética.

DÓSIS.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granos).

POLVO DE COLOMBO

Pulvis colombe

Contúndase la raíz de colombo, deséquese á la estufa á la temperatura de 40°; pulverícese en un mortero de hierro y pásese el polvo por tamiz de seda número 120.

Prepárese del mismo modo los polvos de rizomas y leños en general.

POLVO DE ESCAMONEA

Pulvis scamonii

Prepárese como el de asafétida, precaviéndose del polvo que se levanta durante la operación.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica.

DÓSIS.—De 1 á 4 decigramos (2 á 8 granos.)

POLVO DE ESCILA

Pulvis scillæ

Tómese las escamas intermedias de los bulbos de escila; córtense á lo largo ó al través en tiras estrechas; deséquense; pulverícense en mortero de piedra, y pásese el polvo por tamiz fino sin dejar residuo.

Debe conservarse en frascos bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética.

DÓSIS.—De 5 á 15 centigramos (1 á 3 granos.)

POLVO DE GOMO-RESINA AMONIACO

Pulvis gummi-resinae ammoniaci

Prepárese como el de asafétida.

Acción TERAPÉUTICA.—Expectorante.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos.)

POLVO DE IPECACUANA

Pulvis ipecacuanhae

Deséquese la raíz de ipecacuana en estufa; pulverícese por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz fino, dejando de residuo la cuarta parte.

Acción TERAPÉUTICA.—Emética y expectorante, según la dosis.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos, como emético; y de 5 á 15 centigramos, como expectorante.

POLVO DE IPECACUANA OPIADO

Pulvis ipecacuanhae opiatum

POLVO DE DOWER.—*Pulvis ex Dower*


Polvo de sulfato potásico . . .	40 gramos
“ “ nitrato potásico . . .	40 “
“ “ ipecacuana . . .	10 “
“ “ ópio . . .	10 “

Mézclese exactamente el ópio con la ipecacuana, por trituration, en mortero de piedra ó porcelana; añádanse las sales bien secas, y continúese triturando hasta que resulte una mezcla homogénea.

Cada gramo contiene diez centigramos de ópio en polvo, correspondientes á cinco de extracto de ópio.

Acción TERAPÉUTICA.—Anodina y diaforética.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos.)



POLVO DE JALAPA

Pulvis Jalapæ

Límpienese las raíces, de los cuerpos extraños adheridos; divídanse en pedazos por contusión; deséquense en la estufa; pulverícense también por contusión, en mortero de hierro, y pásese el polvo por un tamiz fino, dejando de residuo el seis por ciento.

Hay que precaverse del polvo que se levanta durante la operación.

Acción terapéutica.—Purgante drástica.

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo.

POLVO DE JALAPA COMPUESTO

Pulvis jalapæ compositus

Polvos de jalapa	10 gramos
“ “ cremor	10 “
“ “ óxido magnésico	10 “

Mézclense exactamente.

Acción terapéutica.—Purgante.

Dosis.—De 2 á 4 gramos.

POLVOS DE JAMES

POLVO ANTIMONIAL DE JAMES.—*Pulvis antimonialis Jamesi*

Oxido antimónico precipitado.	10 gramos
Fosfato cálcico	20 “

Mézclese exactamente por trituration.

Acción terapéutica.—Diaforética, laxante y febrífuga.

Dosis.—De 1 á 5 decigramos (2 á 10 granos.)

POLVO DE MAGNESIA CON RUIBARBO

Pulvis magnesiæ cum rheo

Hidro carbonato magnésico	60 gramos
Ruibarbo en polvo.	15 “
Azúcar en polvo	40 “
Esencia de hinojo	1 “

Interpóngase la esencia en el azúcar, y añádase el hidrocarbonato. Guárdese en frascos bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente, tónica y purgante. Se emplea en ciertas dispepsias.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, como absorbente, tónica y en las dispepsias; y de 10 á 20 gramos, como purgante.

POLVO DE NUEZ VOMICA

Pulvis nucis vomicae

Expónganse las semillas de nuez vómica sobre un tamiz á la acción del vapor de agua, hasta que se reblandezcan; quítese la cubierta exterior de las semillas: divídanse en pedazos pequeños por medio del cuchillo de palanca; pulverícense por contusión en mortero de hierro; pásese el polvo por tamiz entrefino, y deséquese en la estufa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante de la inervación motriz.

Dosis.—De 2 á 4 centigramos.

POLVO DE QUINA CALISAYA

Pulvis quinae calisayae

Ráspense con un cuchillo las cortezas, si tuvieren peridermo, para separarle; deséquense en la estufa; pulverícense por contusión en mortero de hierro, y pásese el polvo por un tamiz muy fino, dejando de residuo la cuarta parte.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica y antiperiódica, según la dosis y modo de administración.

Dosis.—De 2 á 4 gramos.

POLVO DE QUINA DE LOJA

Pulvis quinae ex Loja

Ráspense con un cuchillo las cortezas para separar el peridermo; séquense en la estufa; pulverícense por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz muy fino, dejando de residuo la décima parte.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica y antiperiódica, según la dosis y modo de administración.

Dosis.—De 4 á 8 gramos.

POLVO DE REGALIZ

Pulvis glycyrrhizæ

Ráspense las raíces con un cuchillo, para separar la epidermis parda que las cubre; córtense en rodajas muy delgadas; deséquense en estufa; pulverícense por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz muy fino, dejando de residuo la octava parte.

Sirve para varios preparados.

POLVO DE REGALIZ COMPUESTO

Pulvis liquiritiæ compósitus

Polvo de regaliz	20 gramos
" " hojas de sen	20 "
" " hinojo (frutos)	10 "
" " azufre lavado	10 "
" " azúcar	120 "

Mézclese exactamente.

Acción terapéutica.—Pectoral.

Dosis.—De 1 a 3 gramos.

POLVO DE RUIBARBO

Pulvis radicis rhei

Prepárese del mismo modo que el polvo de jalapa.

Acción terapéutica.—Tónica y purgante según la dosis.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos, como tónica; y de 1 á 4 gramos como purgante.

POLVO DE SANTÓNICO

Pulvis santonici

Tómese el santónico; deséquese en la estufa á un calor suave; pulverícese por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de residuo el ocho por ciento.

Acción terapéutica.—Vermífuga.

Dosis.—De 1 á 2 gramos.

POLVO DE VALERIANA

Pulvis valerianæ

Quebrántense ligeramente las raíces de valeriana en mortero de hierro y mano de madera; sepárese por medio de un tamiz de cerda la tierra adherida; séquense en la estufa; pulverícense por contusión en mortero de hierro y mano de lo mismo; y pásese el polvo por tamiz fino, dejando de residuo el ocho por ciento.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y tónica.

Dosis.—De 1 á 4 gramos.

POLVO DENTÍFRICO

Pulvis dentifricus

Polvo de cremor	60 gramos
“ “ sangre de drago	60 “
“ “ cuerno de ciervo calcinado	60 “
“ “ lírio de Florencia	30 “
“ “ clavo de especia.	15 “
“ “ cochinilla.	3 “

Mézclense exactamente.

POLVO DENTRÍFICO CARBONOSO

Pulvis dentifricus carbonosus

Carbon vegetal en polvo	200 gramos
Quina de Loja en polvo	200 “
Esencia de menta piperita.	1 “

Mézclese bien los polvos y añádase la esencia de menta.

Uso—El que designa el nombre de la fórmula.

POLVO DENTÍFRICO DE CRETA ALCANFORADO

Pulvis dentifricum cum creta et camphora

Alcanfor en polvo fino	10 gramos
Carbonato de cal precipitado	90 “

Mézclense ambos polvos y pásese la mézcla por tamiz de cerda
Nº. 1 para que resulte homogénea.

POLVOS DIURÉTICOS

Pulvis diuréticus

Polvo de nitrato de potasa . . .	10 gramos
“ “ goma arábica . . .	60 “
“ “ altea . . .	10 “
“ “ regaliz . . .	20 “
“ “ azúcar de leche . . .	60 “

Mézclese.

Se úsa mezclando diez gramos de este polvo en un litro de agua y agitándola al tiempo de tomar.

POLVOS EMOLIENTES

Pulvis emolliens

Polvo de raíz de altea . . .	100 gramos
“ “ hoja de malva . . .	100 “

Mézclense.

Sirve para la confección de cataplasmas.

POLVO GASÍFERO FERRUGINOSO

Pulvis aërophorus ferrugineus

Bicarbonato de sosa en polvo . .	25 gramos
Tartrato férrico potásico . . .	2 “

Mézclese y divídase en doce papelitos azules.

Acido tartárico en polvo . . .	15 “
--------------------------------	------

Divídase en doce papelitos blancos.

Acción TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación gástrica, y reconstituyente.

Dosis.—Un papel de cada color.

Para usarlos, tómese un vaso ordinario con una mitad de su capacidad de agua; disuélvase en ella, el ácido contenido en un papel blanco; añádase la mezcla de un papel azul; agítese, y bébase prontamente el líquido espumoso.

POLVO GASÍFERO LAXANTE

Pulvis aërophorus laxativus

POLVO DE SEDLITZ.—*Pulvis ex Sedlitz*

Polvo de tartrato potásico sódico. 90 gramos
" " bicarbonato sódico. 30 "
Mézclese y divídase en doce papeles azules.
Acido tartárico en polvo 30 "

Divídase en doce papeles blancos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación gástrica y laxante.

DÓSIS.—Un papel de cada color.

Uso.— En la misma forma, que el ferruginoso.

POLVO GASIFERO SIMPLE

Pulvis aërophorus simplex

POLVO DE SELZ.—*Pulvis ex Seltz*

Polvo de ácido tartárico 15 gramos
Divídase en doce papeles blancos.

Polvo de bicarbonato de sosa 25 "
Divídase en doce papeles azules.

ACCION TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación gástrica.

DÓSIS.—Un papel de cada color.

Uso.— En la misma forma que el ferruginoso.

POMADA ALCANFORADA

Pomatum camphoratum

Alcanfor en polvo. 30 gramos
Cera blanca. 10 "
Grasa de cerdo. 90 "

Calíentese suavemente en baño de maría la cera y la grasa, hasta que se licuen, añádase el alcanfor, y agítese durante el enfriamiento.

ACCION TERAPEUTICA.—Antiespasmódica y resolutive.

POMADA AMONIACAL

Pomatum ammoniacale

POMADA DE GONDRET.—*Pomatum ex Gondret*

Amoniaco liquido de 22° . . .	20 gramos
Grasa de cerdo.	10 “
Sebo de carnero	10 “

Licuense al calor del baño de maría, en un frasco de boca ancha y tapon esmerilado, el sebo y la manteca; retirese el frasco del fuego; déjese enfriar en parte, sin que llegue á solidificarse la materia: añádase el amoniaco; tápese el frasco, y agítese hasta completo enfriamiento.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vexicante rápida.

POMADA ANTIPSÓRICA

Pomatum antipsóricum

POMADA DE HELMERICH.—*Pomatum ex Helmerich*

Azufre sublimado	20 gramos
Carbonato potásico	10 “
Agua destilada	10 “
Aceite de almendras dulces.	10 “
Grasa de cerdo.	70 “

Disuélvase el carbonato de potasa en el agua; añádase el azufre y en seguida el aceite y la grasa; é interpónganse bien estas sustancias hasta obtener una masa homogénea.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra la sarna.

POMADA DE ACONITIMA

Pomatum aconitinæ

Aconitina.	1 gramo
Aceite de olivas.	2 “
Grasa de cerdo.	40 “

Tritúrese la aconitina con el aceite, y mézclese con la grasa.
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y resolutive en los infartos dolorosos.
Se úsa en fricción, de seis decigramos á un gramo (1/2 á 1 es-
crúpulo).

POMADA DE AZAHAR

Pomatum florum aurántii

MANTECA DE AZAHAR.—*Butyrum ex naphe*

Prepárese con la flor fresca del naranjo como la pomada de
rosas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

POMADA DE AZUFRE

Pomatum sulphuris

Azufre sublimado	10 gramos
Grasa de cerdo	40 “

Mézclense.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra la sarna.


POMADA DE BELLADONA

Pomatum belladonæ

Extracto de belladona	30 gramos
Grasa de cerdo	150 “

Reblandézcase el extracto por trituración en un mortero con un
poco de agua, y mézclese con la grasa fundida y medio fria, agi-
tando hasta homogeneidad.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina.



POMADA DE BREA

Pomatum picis liquidæ

UNGUENTO DE BREA.—*Unguentum picis liquidæ*

Brea	20 gramos
Alcohol	5 “
Grasa de cerdo	80 “

Reblandézcase la brea con el alcohol y mézclese la grasa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva y desecante.

Usada en varias dermatosis.

POMADA DE BISULFATO DE QUININA

Pomatum bisulphatis quinici

POMADA ANTIPERIÓDICA.—*Pomatum antiperiódicum*

Bisulfato de quinina	2 gramos
Grasa de cerdo ó vaselina	15 “

Disuélvase el bisulfato en la menor cantidad posible de agua, en un mortero de vidrio, y mézclese con la grasa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica.

Se emplea en fricciones, en las partes del cuerpo en que sea más fácil la absorción.

POMADA DE CLOROFORMO

Pomatum chloroformi

Cloroformo	10 gramos
Cera blanca	5 “
Grasa de cerdo	85 “

Lícuen e la cera y la grasa, en un frasco de boca ancha, al calor del baño de maria; déjese enfriar en parte; añádase el cloroformo; tápese el frasco; y agítese hasta completo enfriamiento.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anestésica.

POMADA DE CLORURO MERCURIOSO

Pomatum chloruri mercuriosi

POMADA DE PRECIPITADO BLANCO.—POMADA ANTIHERPÉTICA

Pomada de rosas. 30 gramos
Cloruro mercurioso precipitado. 4 “

Mézclense exactamente en un mortero de vidrio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva y antiherpética.

POMADA DE DESAULT

Pomatum ex Desault

Polvo de óxido mercurico rojo. . . . 4 gramos
“ “ tucia 4 “
“ “ acetato plúmbico. 4 “
“ “ sulfato aluminico potásico. . . 4 “
“ “ cloruro mercurico 0,60 “
Pomada de rosas. 30 “

Tritúrense los polvos en mortero de vidrio ó porcelana, hasta hacerlos impalpables, y mézclense exactamente con la pomada de rosas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva. Usada en algunas oftalmias.

POMADA DE LAUREL

Pomatum laurinum

Hojas frescas de laurel. 500 gramos
Bayas de laurel. 500 “
Grasa de cerdo 1,000 “

Contúndanse las bayas de laurel y las hojas; mézclense con la manteca, y expóngase la mezcla á un fuego suave, hasta que toda el agua de vegetación se haya evaporado. Pásese por una tela con fuerte expresión; déjese enfriar lentamente; sepárese el depósito; líquese de nuevo la pomada, y cuando esté medio fria, cuélese al tarro que ha de servir para el uso.

POMADA DE IODURO PLÚMBICO

Pomatum ioduri plumbici

Ioduro plúmbico 10 gramos
Grasa de cerdo benzoinada. . . . 90 “

Mézclese en mortero de cristal.

Acción TERAPÉUTICA.—Resolutiva y deterstiva.

Usada con especialidad en las úlceras escrofulosas.

POMADA DE IODURO POTÁSICO

Pomatum ioduri potassici

POMADA IODURADA.—*Pomatum ioduratum*

Ioduro potásico. 10 gramos
Agua destilada. 80 “
Grasa benzoinada 10 “

Disuélvase el ioduro en el agua, y mézclese exactamente con la grasa en un mortero.

Acción TERAPÉUTICA.—Resolutiva.

POMADA DE IODURO POTÁSICO CON EXTRACTO DE CICUTA

Pomatum ioduri potassici cum extracto cicutæ

Pomada de ioduro potásico 30 gramos
Extracto de cicuta 4 “

Reblandézcase el extracto por trituración en un mortero con una pequeña cantidad de agua; añádase la pomada, y agítese hasta que la mezcla resulte homogénea.

Acción TERAPÉUTICA.—Resolutiva.



POMADA DE IODURO POTÁSICO IODADA

Pomatum ioduri potásici iodatum

POMADA DE IODURO POTÁSICO IODURADA

Iodo puro	2 gramos
Ioduro potásico	10 "
Agua destilada	10 "
Manteca benzoïnada	80 "

Disuélvanse el ioduro y el iodo en el agua; incorpórese la grasa y mézclese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva.

POMADA DE NITRATO MERCURIAL

Pomatum nitratis mercurialis

UNGUENTO CETRINO.—*Unguentum citrinum*

Aceite de olivas	240 gramos
Grasa de cerdo	240 "
Mercurio puro	30 "
Ácido nítrico de 35°	45 "

Disuélvase el mercurio en el ácido á un suave calor; échese esta disolución en la grasa licuada con el aceite y medio fría; agítese bien, y cuando la mezcla tenga la debida consistencia, deposítese en moldes de papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante, antisifilitica é insecticida. Se úsa en fricción, de 2 á 4 gramos.

POMADA DE ÓXIDO MERCÚRICO AMARILLO

Pomatum óxidi mercúrici flavi

Oxido mercúrico amarillo	1 gramo
Vaselina	15 "

Mézclese exactamente en mortero de cristal.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva. De uso especial en ciertas oftalmias.

POMADA DE ÓXIDO MERCÚRICO ROJO

Pomatum oxidi mercurici rubri

Oxido mercurico rojo	1 gramo
Pomada de rosas	15 “

Tritúrese bien el óxido mercurico en un mortero, y mézclese exactamente con la pomada de rosas

ACCION TERAPÉUTICA.—Resolutiva. De uso especial en ciertas oftalmias.

POMADA DE ÓXIDO DE ZINC

Pomatum oxidi zincici

Oxido zincico	2 gramos
Grasa de cerdo	30 “

Mézclese en un mortero

ACCION TERAPÉUTICA.—Astringente. Se úsa en algunas oftalmias.

POMADA DE ROSAS


Pomatum rosarum

UNGUENTO DE ROSAS.—*Unguentum rosarum*

Pétalos de rosa pálida frescos	1,000 gramos
Grasa de cerdo	1,000 “

Póngase los pétalos de rosa en digestión con la grasa á un calor suave, por espacio de tres dias; caliéntese la mezcla hasta que esté próxima á hervir; pásese por un lienzo con fuerte expresión del residuo, y déjese enfriar en reposo. Sepárese por último, la pomada del sedimento; lícuense de nuevo, y déjese enfriar, agitándola hasta que adquiera consistencia.

Se úsa para las escoriaciones y como escipiente.



POMADA DE RUDA

Pomatum rutaë

UNGUENTO DE RUDA.—*Unguentum rutaë*

Ruda	60 gramos
Ajenjo	60 “
Menta	60 “
Grasa de cerdo	500 “

Contundanse las partes vegetales; mézclense con la grasa; y expóngase la mezcla á un calor moderado, hasta que se haya evaporado toda la humedad; pásese entonces por un lienzo con fuerte expresión, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un calor suave; apártese del fuego y agítese durante el enfriamiento.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

POMADA DE SALOL

Salol	10 gramos
Vaselina	90 “

Pulverícese bien el salol y mézclese exactamente con la vaselina.

POMADA DE SAUCO

Pomatum sambuci

UNGUENTO DE SAUCO.—*Unguentum sambuci*

Cortezas frescas de ramas de sauco	500 gramos
Hojas de sauco	100 “
Grasa de cerdo	1,800 “

Contúndanse las partes vegetales; pónganse en maceración por ocho dias con la grasa de puerco, y procédase en todo lo demás como en la preparación de la pomada de ruda.

Acción terapéutica.—Emoliente y resolutive en débil grado.

POMADA DE TOMATE

Pomatum lycopersici

UNGUENTO DE TOMATE.—*Unguentum lycopersici*

Tomates.	1,000 gramos
Grasa de cerdo.	1,000 “

Redúzcanse los tomates á pulpa; mézclense con la grasa, y expóngase la mezcla á un fuego moderado, hasta que se haya evaporado toda la humedad. Pásese entonces por un lienzo, con expresión del residuo; añádase al producto otra cantidad igual de tomates, relucidos también á pulpa; expóngase de nuevo al fuego para evaporar la humedad; pásese otra vez por un lienzo con expresión del residuo, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un suave calor; y déjese enfriar, agítandola, hasta que adquiera consistencia.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente.

POMADA DE VERATRINA

Pomatum veratrinae


Veratrina	1 gramo
Vaselina	20 “
Alcohol	C. S. “

Disuélvase la veratrina con unas gotas de alcohol, y mézclese exactamente la vaselina.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra la calvicie.

Se afeita bien la parte de cuero cabelludo, donde haya desaparecido ó vaya cayéndose el pelo, y se dá una fuerte fricción con esta pomada, valiéndose de los dedos.

Hay que tener cuidado de limpiarse en seguida los dedos, para evitar la incomodidad que le puede proporcionar cualquier partícula de esta pomada en los ojos, nariz ú oídos.



POMADA DE YEMAS DE ÁLAMO COMPUESTA

Pomatum gemmarum pópuli compósitum

UNGUENTO POPULEON. — *Unguentum populeum*

Yemas de álamo negro recientes . . .	1,000	gramos
Hojas recientes de beleño	350	"
" " " violeta	350	"
" " " siempreviva mayor	350	"
" " " ombligo de Venus	350	"
" " " solano negro	700	"
Grasa de cerdo	2,800	"

Mézclense las yemas de álamo con la grasa derretida; póngase la mezcla en una vasija de vidrio, para ir añadiendo las hojas vegetales contundidas, á medida que las presente la estación; expóngase la mezcla á un fuego moderado, agitándola continuamente hasta que se haya evaporado toda la humedad; pasese en seguida por un lienzo con fuerte expresión, y déjese en reposo.

Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un calor suave; apártese del fuego, y agítese durante el enfriamiento.

NOTA.—En vez de los 1,000 gramos de yemas recientes de álamo, pueden emplearse 400 gramos de las yemas secas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. De uso especial en los tumores hemorroidales.

POMADA ESTIBIADA

Pomatum stibiatum

POMADA DE AUTENRIETH.—*Pomatum ex Autenrieth*

Tartrato antimónico potásico polvo fino. . .	10	gramos
Grasa de cerdo.	30	"

Mézclase exactamente por trituration prolongada, en un mortero, añadiendo unas gotas de agua para disgregar la sal.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante que produce pústulas.

POMADA FOSFORADA

Pomatum phosphoratum.

Fósforo	1	gramo
Grasa de cerdo.	50	"

Póngase la grasa en un frasco de boca ancha con tapón esmerilado, y de una capacidad tal, que con ella se llene casi enteramente; hágase licuar al calor del baño de maría; añádase el fósforo; tápese el frasco; continúese calentándole, y agítese de cuando en cuando hasta que el fósforo se haya disuelto; sáquese entonces el frasco del baño, y continúese agitándole hasta que se haya enfriado.

Acción terapéutica.—Muy escitante.

Usada con especialidad en las úlceras escrofulosas.

POMADA MERCURIAL DOBLE

Pomatum mercuriale duplex

UNGÜENTO DE MERCURIO DOBLE.—*Unguentum hydrargyri dup*

Mercurio puro.	500 gramos
Grasa de cerdo.	500 “

Tritúrese el mercurio con la sexta parte de la grasa en un mortero de piedra, hasta la perfecta extinción del metal; añádase entonces el resto de la grasa, y mézclese exactamente.

Acción terapéutica.—Antisifilítica y alterante.

Se usa en fricción, de 1 á 2 gramos.

POMADA MERCURIAL SIMPLE

Pomatum mercuriale simplex

UNGÜENTO DE MERCURIO SIMPLE.—*Unguentum hydrargyri simplex*

Pomada mercurial doble.	200 gramos
Grasa de cerdo	400 “

Mézclese.

Se usa como la mercurial doble, pero aplicándose casi exclusivamente como insecticida.

POMADA OXIGENADA

Pomatum oxygenatum

UNGÜENTO OXIGENADO.—*Unguentum oxygenatum*

Grasa de cerdo.	400 gramos
Acido nítrico de 35.º	50 “

Líquese la grasa en una cápsula de porcelana añádase el ácido nítrico; téngase la mezcla expuesta al calor del agua hirviendo, agitándola continuamente con varilla de vidrio, hasta que principie el desprendimiento de vapores nitrosos: retírese entónces del fuego; continúese la agitación de la mezcla; y cuando se halle próxima á la solidificación, échese en moldes de papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detergente y caterética en débil grado. Se úsa con especialidad en algunas demartosis.

PULPA DE CAÑA FISTULA

Pulpa cassiæ

Abrase el fruto de la cassia, extraígase la pulpa, mezclada con las semillas y los tabiques internos y recójase en una vasija de porcelana; agréguese una pequeña porcion de agua; reblandézcase al calor del baño de maría; pásese comprimiéndole, á través de un tamiz de cerda, y evapórese en baño de maría tambien, hasta consistencia de extracto blando.

ACCION TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos.

PULPA DE CIRUELAS

Pulpa prunorum

Expónganse las ciruelas, sobre un diafragma ó un tamiz de cerda á la acción del vapor de agua, hasta que se ablanden bien; sepárense los huesos; pítese el resto en mortero de mármol con mano de madera, y pásese la pulpa por tamiz de cerda.

Sirve para preparar la conserva.

PULPA DE TAMARINDOS

Pulpa tamarindorum

Pónganse los tamarindos en una vasija de loza blanca con un poco de agua; déjense en digestión á un calor suave, hasta que se ablanden bien; pásense después por un tamiz de cerda, para separar

las semillas y las fibras; y evapórese el producto en baño de maría hasta consistencia de extracto blando.

ACCION TERAPÉUTICA.—Laxante.

DÓSIS—De 30 á 60 gramos. (1 á 2 onzas).

SOLUCION CONTRA LAS ULCERACIONES NASALES SIFILITICAS

Iodo	1 decígramo
Ioduro potásico	1 gramo
Glicerina pura	100 “

Disuélvase.

Para untar la mucosa nasal.

SOLUCION DE ACIDO ARSENIOSO

Acidum arseniosum aqua solutum

Acido arsenioso	1 gramo
Agua destilada	1,000 “

Póngase el ácido arsenioso con unos 500 gramos de agua en un matraz; hiérvase hasta su completa disolucion, y una vez enfriada la solución; complétese los mil gramos con agua destilada y fíltrese.

Diez gramos de esta solución contienen cinco centigramos de ácido arsenioso.

SOLUCION DE ÁCIDO CRÓMICO

Solutum acidi chrómici

Acido crómico	10 gramos
Agua destilada	10 “

Disuélvase en mortero de cristal.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escarótica.

