

las semillas y las fibras; y evapórese el producto en baño de maría hasta consistencia de extracto blando.

ACCION TERAPÉUTICA.—Laxante.

DÓSIS—De 30 á 60 gramos. (1 á 2 onzas).

SOLUCION CONTRA LAS ULCERACIONES NASALES SIFILITICAS

Iodo	1 decígramo
Ioduro potásico	1 gramo
Glicerina pura	100 “

Disuélvase.

Para untar la mucosa nasal.

SOLUCION DE ACIDO ARSENIOSO

Acidum arseniosum aqua solutum

Acido arsenioso	1 gramo
Agua destilada	1,000 “

Póngase el ácido arsenioso con unos 500 gramos de agua en un matraz; hiérvase hasta su completa disolucion, y una vez enfriada la solución; complétese los mil gramos con agua destilada y fíltrese.

Diez gramos de esta solución contienen cinco centigramos de ácido arsenioso.


SOLUCION DE ÁCIDO CRÓMICO

Solutum acidi chrómici

Acido crómico	10 gramos
Agua destilada	10 “

Disuélvase en mortero de cristal.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escarótica.



SOLUCION DE ARSENITO POTÁSICO

Solutum arsenitis potássici

LICOR ARSENICAL DE FOWLER.—*Liquor arsenicalis ex Fowler*

Arsénico blanco en polvo . . .	1 gramo
Carbonato potásico	1 “
Agua destilada	95 “
Alcohol de melisa compuesto . .	3 “

Mézclense el ácido, el carbonato y el agua destilada en un matraz de vidrio; hiérvase esta mezcla hasta completa disolución; filtrese y déjese enfriar; añádase el alcohol de melisa y suficiente cantidad de agua destilada, para que el producto total pése 100 gramos.

Acción terapéutica.—Alterante. De uso especial en las dermatosis.

Dosis.—De 1 á 2 decigramos, pudiendo llegar progresivamente hasta 5 á 6 decigramos.

SOLUCION DE ARSENIATO SÓDICO

Solutum arseniatis sódici

LICOR ARSENICAL DE PEARSON.—*Liquor arsenicalis ex Pearson*

Arseniato sódico cristalizado . .	1 gramo
Agua destilada	600 “

Disuélvase y filtrese.

Acción terapéutica.—Alterante, antiperiódica, y de uso especial en algunas dermatosis.

Dosis.—De 4 á 6 decigramos (8 á 12 granos).

SOLUCION DE BREA CONCENTRADA

Solutum picis liquidæ

LICOR DE BREA.—*Liquor picis liquidæ*

Bicarbonato de sosa	10 gramos
Brea de pino	20 “
Agua	1,000 “

Mézclese en un mortero la brea con el bicarbonato de sosa; añá-

dase el agua y póngase todo en un frasco, agitando con frecuencia hasta que el líquido tome color de café; filtrese despues de seis dias, y guárdese para el uso.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Modificadora de las inflamaciones crónicas de las mucosas con aumento de secrecion y especialmente de la del aparato respiratorio.

DÓSIS.—De 10 á 20 gramos, en un vaso de agua.

SOLUCION DE CAL

Solutum calcis

AGUA DE CAL.—*Aqua calcis*

Cal viva . . .	30 gramos
Agua comun . . .	C. S.

Apáguese la cal con agua suficiente; agítese con más agua; déjese en reposo; decántese el líquido claro, y deséchese por inutil. Añádanse al hidrato de cal, así lavado, 1,000 gramos de agua destilada; y téngase la mezcla en vasija bien tapada, sacando por decantacion el agua de cal, cuando se necesite.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiácida.

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

Se úsa tambien en loción en el tratamiento de algunas dermatosis.

SOLUCION DE CARBONATO POTASICO

Solutum carbonatis potássici


LOCION ALCALINA.—*Lotio alkalina*

Carbonato potásico .	10 gramos
Agua comun . . .	150 “

Disuélvase el carbonato en el agua y filtrese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y resolutive.

Uso EXTERNO.—En locion.



SOLUCION DE CLORURO FÉRRICO

Solutum chloruri ferrici

PERCLORURO DE HIERRO LÍQUIDO.—CLORURO FÉRRICO LÍQUIDO

Tómese cloruro férrico; disuélvase en suficiente cantidad de agua destilada, para obtener un líquido que señale 30° B. (1,26 de densidad), y fíltrese.

Esta solución contiene en 100 partes, 27 de cloruro férrico anhidro y 73 de agua.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica, reconstituyente y astringente, segun la dosis y modo de administración.

USO EXTERNO.—Coagulante.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE CREOSOTA

Solutum creosoti

AGUA DE CREOSOTA.—*Aqua creosoti*

Creosota. 2 gramos

Agua destilada. 350 “

Mézclese en un frasco; agítense hasta que la creosota se haya disuelto y fíltrese la solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antipútrida

USO EXTERNO.—En loción

SOLUCION DE GOMA ARÁBIGA

Solutum gummi arabici

AGUA COMOSA.—*Aqua gummosa*

Goma arábica. 10 gramos

Agua 400 “

Disuélvase, y cuélese la solución por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—Emoliente.

SOLUCION DE HIPOCLORITO CÁLCICO

Solutum hypochloritis cálcici

HIPOCLORITO DE CAL LÍQUIDO.—CLORURO DE CAL LÍQUIDO

Hipoclorito cálcico clorurado de 90.º. 30 gramos

Agua 1,200 “

Deslíase el hipoclorito en el agua, por trituration, en un mortero; pásese la mezcla á un frasco; tápese perfectamente, y decántese el líquido claro ó fíltrese. Extemporánea.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva.

Se emplea también como desinfectante.

SOLUCION DE HIPOCLORITO SÓDICO

Solutum hypochloritis sódici

HIPOCLORITO DE SOSA LÍQUIDO.—CLORURO DE SOSA LÍQUIDO

LICOR DE LABARRAQUE.—*Liquor ex Labarraque*

Hipoclorito cálcico clorurado de 90.º. 30 gramos

Carbonato sódico cristalizado. 60 “

Agua. 1,300 “

Deslíase el hipoclorito en las dos terceras partes del agua, y disuélvase el carbonato en la restante; mezclénse los dos líquidos; déjese en reposo la mezcla, y decántese el líquido claro, ó fíltrese.

Extemporánea.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva.

Se emplea además como desinfectante.

SOLUCION DE PERMANGANATO DE POTASA

Solutum permanganatis potassæ

Permanganato potásico. 10 gramos

Agua destilada 500 “

Disuélvase, y consérvase en frascos con tapón esmerilado.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiséptica.

SOLUCION DE IODO IODURADA

Solutum iodi iodurati

LICOR CAÚSTICO DE IODO.—*Liquor caustici iodi*

iodo sublimado	5 gramos
ioduro potásico	5 “
Alcohol de 90.º	50 “
Agua destilada	90 “

Disuélvase el iodo con el alcohol, y mézclese la solución de iodo potásico en el agua.

SOLUCION DE PARALDEHIDA

Paraldehida	3 gramos
Agua de azahar.	85 “
Jarabe de diacodion.	15 “

Mézclease exactamente.

SOLUCION DE PIROFOSFATO SODICO FÉRRICO

Solutum pyrophosphatis sodici ferrici

SOLUCION DE FOSFATO DE HIERRO.—*Solutum phosphatis ferri*

Solucien de cloruro férrico de 30º.	8 gramos
Agua destilada.	250 “
Mézclease.	
Pirofosfato sódico cristalizado.	9 “
Agua destilada	250 “

Disuélvase.

Mézclense las dos soluciones, agítese; déjese por algun tiempo hasta que se aclare el liquido y filtre.

ACCION TERAPÉUTICA.—Reconstituyente.

DÓSIS.—De 10 á 20 gramos.

SOLUCION DE POTASA CAÚSTICA

Solutum potasæ causticæ

LEJÍA DE POTASA.—*Lixivium potassæ*

Prepárese, disolviendo potasa caústica por la cal, en cantidad

suficiente de agua, para que la solución fría señale 36° en el arcómetro B. ó 1,32 de densidad.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE SOSA CAUSTICA

Solutum sodæ cáusticæ

LEJÍA DE JABONERO.—*Lixivium opificis saponis*

Prepárese, disolviendo sosa cáustica por la cal en cantidad suficiente de agua para que la solución fría señale 36° B. ó 1,32 de densidad.

Sirve para otros preparados.

SOLUCION DE SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO

Solutum sulphatis aluminico-potássici

AGUA ALUMINOSA.—*Aqua aluminosa*

Sulfato aluminico potásico.	5 gramos
Agua de rosas	500 “

Disuélvase.—Extemporánea.

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente.

De uso externo.

SOLUCION DE SULFATO ZÍNCICO ALUMINOSA

Solutum sulphatis zincici aluminosum

AGUA ESTÍPTICA.—*Aqua stíptica*

Sulfato zíncico	15 gramos
“ aluminico potásico	15 “
Agua de rosas	350 “

Hágase solución.

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente.

De uso tópico.

SOLUCION DE TARTRATO ANTIMÓNICO POTÁSICO

Solutum tartratis antimónico potássici

AGUA EMETIZADA.—*Agua stibiata.*

Tartrato antimónico potásico . . .	1 decígramo
Agua destilada	250 gramos

Disuélvase.

Acción TERAPÉUTICA.—Emética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

SOLUCION ALCOHÓLICA DE ALCANFOR

Solutum alcoholicum camphoræ

ALCOHOL ALCANFORADO.—*Alcohol camphoratum*

Alcohol de 90°.	900 gramos
Alcanfor	100 “

Hágase solución.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Uso EXTERNO.—En fricción.

SOLUCION ALCOHOLICA DE ALCANFOR DÉBIL


AGUARDIENTE ALCANFORADO.—*Alcohol camphoratus debilior*

Alcohol alcanforado . . .	250 gramos
“ de 40°.	750 “

Mézclese.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Uso EXTERNO.—En fricción.



SOLUCION ALCOHOLICA DE IODO

Solutum alcoholicum iodi

TINTURA DE IODO.—*Tinctura iodi*

Todo puro.	40 gramos
Alcohol de 90°.	600 “

Disuélvase, filtre, y consérvese el líquido en un frasco bien tapado, fuera de la acción de la luz.

ACCION TERAPÉUTICA.—Alterante.

DÓSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos).

Se úsa también tópicamente, como escitante y resolutive.

SOLUCION ALCOHOLICA DE JABON ALCANFORADO

Solutum alcoholicum saponis camphoratum

ALCOHOL ALCANFORADO JABONOSO.—LINIMENTO JABONOSO

Alcohol de 90°.	350 gramos
Jabon de sosa, seco y raspado	60 “
Alcanfor	20 “

Disuélvase.

ACCION TERAPÉUTICA.—Resolutive. Se úsa en fricción.

SOLUCION HIDRO-ALCOHOLICA DE CLORURO MERCÚRICO

Solutum hydro-alcoholicum chloruri mercúrici

LICOR DE VANSWIETEN.—*Liquor ex Vanswieten*

Cloruro mercúrico.	1 gramo
Agua destilada.	900 “
Alcohol de 90°.	100 “

Disuélvase el cloruro en el alcohol, y añádase el agua.

Cada 20 gramos contiene 2 centigramos de cloruro mercúrico.

ACCION TERAPÉUTICA.—Antisifilítica.

DÓSIS.—De 7 á 15 gramos, diluidos en líquido apropiado.

USO EXTERNO.—En el tratamiento de ciertas dermatosis pruriginosas, diluida en agua.

SOLUCION OLEOSA DE CREOSOTA

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO CREOSOTADO.—*Oleum hepatis morruhæ cum creosota*

Aceite de hígado de bacalao.	150 gramos
Creosota vegetal.	1 “

Mézclese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se usa para combatir la tisis.

DÓSIS.—A cucharadas ó en cápsulas.

SOLUCION OLEOSA DE ESENCIA DE EUCALIPTO

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO CON ESENCIA DE EUCALIPTO

Oleum hepatis morruhæ cum óleo eucalypti volátile

Aceite de hígado de bacalao.	100 gramos
Esencia de eucalipto.	1 “

Mézclese.


SUPOSITORIO DE ACIBAR

Suppositorium aloes

Acibar	2 gramos
Manteca de cacao	10 “

Procédase como en el de manteca de cacao, y cuando ésta se halle en disposición de verterla en los moldes, mézclese con el acibar, reducido á polvo fino; dividiendo la masa en dos supositorios.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante revulsiva y antihelmíntica.



SUPOSITORIO DE EXTRACTO DE RATANIA

Suppositorium extracti rathaniae

Extracto de ratania	2 gramos
Manteca de cacao	10 "

Opérese como en el de acibar, dividiendo la masa en dos supositorios

Acción terapéutica.—Astringente.

SUPOSITORIOS DE GLICERINA

Gelatina	30 gramos
Agua destilada	45 "
Glicerina	165 "

Añádase agua á la gelatina y déjese en contacto dos ó tres horas. fúndase luego la mezcla al baño de maria y añádase la glicerina; despues de bien unido todo, viértase en moldes y una vez enfriados se les cubre con carbonato de cal.

SUPOSITORIO DE MANTECA DE CACAO

Suppositorium butyri ex cacao

Manteca de cacao	12 gramos
----------------------------	-----------

Fúndase en una cápsula de porcelana al calor del baño de maria; déjese enfriar, y cuando esté á punto de solidificarse, viértase en dos moldes de papel de forma cónico-prolongada.

Acción terapéutica.—Emoliente.

SUPOSITORIO DE MIEL

Suppositorium mellis

SUPOSITORIO COMUN.—*Suppositorium communis*

Miel	30 gramos
Cloruro sódico	2 "

Evapórese la miel hasta que, enfriada una gota, aparezca sólida

y fragil; añádase entonces la sal, finamente pulverizada; mézclese bien; y viértase la mezcla en un cono de papel, impregnado de aceite comun, del tamaño de un dedo pequeño, cuidando de poner en el mismo cono, una pequeña cinta doblada, de modo que su extremo quede fuera de la base.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

SUPOSITORIO DE MIEL COPUESTO

Suppositorium mellis compositum

SUPOSITORIO IRRITANTE.—*Suppositorium irritans*

Miel.	30 gramos
Polvo de cloruro sódico	2 “
“ “ coloquintidas	1 “

Evapórese la miel hasta el grado prescrito para el supositorio anterior; mézclense despues los polvos, y procédase en lo demás como allí queda indicado.

ACCION TERAPÉUTICA.—Irritante.

SUPOSITORIO DE TANINO Y MORFINA

Suppositorium tanninum et morphinæ

Tanino	1,50 gramos
Morfina	0,05 “
Manteca de cacao	50,00 “

Opérese como en la preparación del supositorio de acibar, sustituyendo el acibar por la mezcla de tanino y morfina y divídase en diez supositorios.

TABLETAS DE AZUFRE

Tabellæ sulphuris

Azufre sublimado y lavado. . .	10 gramos
Azúcar blanco	60 “
Mucilago de goma tragacanto. C. S.	“