

SYRUPUS RADICIS APII COMPOSITUS.

(De quinque Radicibus.)

℞. Radicum Apii. }
Foeniculi, } singulorum un-
Petroselini, } cias quatuor,
Rusci, }
Asparagi. }

Aquae communis libras quatuordecim.

Incisis coquantur in vase terreo vitreato
ad remanentiam librarum octo ; postea cola
cum expressione , et adde
Sacchari albi libras sex.

Clarifica , et coque in Syrupum S. A. ad-
•dendo aquae Q. S.

Dosis ad uncias duas.

CAPUT XXVI.

MELLA MEDICATA.

MEL BACCARUM MORORUM.

℞. Succi Mororum nigrorum libram unam,
Mellis libras duas,

Aquae communis Q. S.

Coque in vase figulino ad Syrupi spissioris densitatem, et cola.

Dosis ab uncia ad uncias duas.

MEL ROSACEUM SEU RHODOMEL.

℞. Succi Rosarum Rubrarum... } ana libras duas.
Mellis optimi. }

Aquae communis Q. S.

Coque ad Syrupi spissitudinem. Cola.

MEL BACCARUM SAMBUCCI.

℞. Succi baccarum maturarum Sambuci libram unam,

Mellis libras duas,

Aquae communis Q. V.

Coque ad Syrupi spissioris densitatem, et cola ad usum.

Dosis à semuncia ad unciam.

ff

MELLA MEDICATA.

MEL ACETI SIMPLEX.

(Oxymel simplex.)

- ℞. Mellis optimi libras quatuor,
Aceti albi optimi, filtrati, libras duas.

Dissolve in vase figulino vitreato, igne
lento vapore ad debitam consistentiam, et cola.

Dosis ab uncia ad uncias tres.

MEL ACETI SCYLLITICI.

(Oxymel scylliticum.)

- ℞. Aceti Scyllitici recentis libras duas,
Mellis optimi libras quatuor.

In vase figulino vitri lactei coloris crustâ
obducto, balneo aquoso, dissolve, et cola.

Dosis à semuncia ad unciam.

Simili modo fit Mel

Aceti Colchici.

MEL DEPURATUM.

- ℞. Mellis optimi Q. V.

Coque in Aquae communis Q. S. ad des-
pumationem, et Syrupi consistentiam.